



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

ARISTOT.

Theophr.

Historia

502  
15  
Ar 4



AND CRATANDER LECTORI S

EN TIBI CANDIDE LECTOR,

# ARISTOTELIS ET

THEOPHRASTI HISTORIAS, QVIBVS CVNCTA FERE  
quæ Deus Opt. Max. homini cõttemplanda & usurpanda exhibuit, adamussim  
complectuntur: creaturas inquam omnes, & sensu præditas, quæ animalia di-  
cuntur, & sensus expertes, quas appellant plantas. Vbi hercle ne *γρὺ* quidem in  
speciem tam humile, tam abiectum, tamq; pusillum, in quo summus ille creator  
non sit summè suspiciendus, & cuius non sit usus amplissimus. Qua profectò re  
uix aliud quicquam existit, quod gloriam & amorem Dei, omnium parentis, in  
cordibus hominum magis excitet & inflammet. Quòd autē huiusmodi rerum  
cognitio, meditatioq; cum ad omne Philosophiæ genus, tum præcipuè ad Me-  
dicinam, tum ad uniuersam deniq; mortalium uitam utilissima sit, ac maximè ne-  
cessaria, nullus est adeò naris obesæ, & à cõmuni sensu tam alienus, qui nō intel-  
ligat. Quum uerò ARISTOTELES & THEOPHRASTVS mihi in primis ad  
hoc facti uidentur, per quos *δορυ καὶ ἀσπίς* uoluit eiusmodi mysteria benignissimè  
mortalibus effundere: ne tibi ea quoq; parte deesset, optime lector, placuit eorū  
quæ huc pertinent opera, sub incudē reuocata, multò quàm antehac diligentius  
emendatiusq; publicis potius studijs, quàm rei priuatæ consulens, excudere.

Proinde abs te uehementer contendo, ut meo in transcriben-

dis optimis authoribus studio, tuus etiam in

comparandis syncerus ani-

mus respondeat.

Vale, &

Librorum catalogum uersa pagina require.



BASILEAE

1534

H O C O P E R E C O N T I N E N T V R.

ARISTOTELIS

De historia animalium, Lib. IX.  
De partibus animalium, & earum causis, Lib. IIII.  
De generatione animalium, Lib. V.

*Theodoro Gaza interprete.*

De communi animalium greſſu, Lib. unus.  
De communi animalium motu, Lib. unus.

*Petro Alcyonio interprete.*

THEOPHRASTI

De historia plantarum, Lib. IX.  
Et Decimi principium duntaxat.  
De causis plantarum, Lib. VI.

*Theodoro Gaza interprete.*

A D H A E C,

Vocabula latina & græca, ex Aristotelis libris de animalibus, & Theophrasti de plantis.

Indices in præfatos libros, summo labore & diligentia digesti.

A D L E C T O R E M.

*Admonendum te duximus optime lector, priusquam indices nostros adgrediaris, priorem numerum paginam, alterum uerò uersum eiusdem pagina designare: non semper illum quem indicat, sed ab eo ipso ad subsequenter denarium numerum progrediendum esse: ita ut quicquid querere statueris, decem illis uersibus comprehensum, statim sit obuium.*

# IN ARISTOTE- lis de Historia animalū libros Index.



Bdomen. 14.4  
Abortioes quę uo-  
centur. 108.10  
Abortum facit &  
equa & mulier,  
odore exincta lucernæ. 129.30  
Acari nomine animal. 82.20  
Accipenseris branchiæ. 27.40  
Accipenseris fel. 29.10  
Accipiter auiū cor nō edit. 140.10  
Accipitribus exiguus lien. 28.40  
Accipitris tempus excubadi. 88.10  
Accipiter ubi fel habeat. 29.20  
Accipitrū pulli suauis sunt. 88.40  
Accipitres ubi nidificent. 88.40  
Accipitrum genera. 146.30  
Accipitres uenando inter se diffe-  
runt. 146.30  
Accipitres carniuori sunt. 117.20  
Acetabulum. 14.40  
Acetabula uulū quæ habet. 34.10  
Acetabulum quo loco fit. 39.10  
Acheolus amnis gignit piscem a-  
prum. 59.30  
Acheræ cicadæ unde dicat. 56.30  
Acia unde generentur. 76.20  
Aculeus iniectorum. 56.10  
Aculeo quæ armentur. 11.1  
Acus piscis quando pariat. 68.10  
Acus sero fertificat. 95.30  
Ac⁹ piscis quomō oua ædat. 92.30  
Adeps cōmunis animalib⁹. 34.20  
Adeps a sebo quid differat. 43.30  
Adeps ex sanguine fit. 44.40  
Adeps quæ pinguecant. 43.30  
Adipe pinguecentia minus fœ-  
cunda sunt. 44.1  
Adipis in animali locus. 43.30  
Aegithi & flori sanguis milceri  
nequit. 135.1  
Aegyptus gignit equum fluui-  
atlem. 24.20  
Aegypti mulieres fœcundæ. 109.1  
Aegypti canes. 131.1  
Ærica quo malo uexetur. 127.40  
Æsalo uulpi est inimicus. 234.40  
Ætas quadrupedum quâ ratione  
noſcatur. 102.30  
Ætæ multiformes sunt animan-  
tes. 131.20  
Ala. 15.10  
Alauda later. 125.10  
Alaudæ nidus. 84.1. & 139.30  
Alaudarum genera. 143.30

## I N D E X.

Albardeola quarit fluuios. 118.10  
Albicula cibis. 118.10  
Albugo oculi in omnibus ferē fi-  
milis. 13.10  
Albumen oui. 85.10  
Albumen complectitur originē  
pulli. 85.40  
Alcedo amat aquas. 118.20  
Alcedonum species, & nidus, &  
partus. 141.30  
Alcmaon putauit capras per au-  
res spirare. 13.30  
Alcmanes poëta quo morbo pe-  
rierit. 81.40  
Alcyon quor oua pariat. 67.10  
Alcyonis tempus coitus. 67.1  
Alcyonem uidisse rarū est. 67.20  
Alcyonei dies quare uocet. 67.10  
Alec grauis utero melior. 132.10  
Alec mutatur. 132.20  
Alecis quando pariant. 95.20  
Alecis fœcunditas. 95.20  
Alecis gregales sunt. 155.20  
Alecum fœtura est apuæ genus.  
94.20  
Alguia unde nascantur. 76.40  
Alimentum animalium. 114.20  
Allopecones piscis. 123.1  
Aluco auis. 117.30  
Aluus. 9.40  
Aluus hominis. 17.30  
Alui profluuiio mederi coagulū.  
46.20  
Amia piscis. 57.20  
Amia piscis gaudet fluuijs. 126.30  
Amiæ quid comedant. 116.20  
Amiæ incrementum. 95.40  
Amiæ q̄modo se defendat. 147.30  
Amiæ ubi reperiantur. 123.1  
Anas a gauiâ dissidet. 134.10  
Anas aquas amat. 118.20  
Anatomen primus tradidit Ari-  
stoteles. 5.40  
Angua canes interimit. 128.40  
Anguillæ fel. 29.10  
Anguilla q̄s pinnas habeat. 27.20  
Anguillæ quor pinnae. 10.40  
Anguillæ quomodo capiant. 58.  
20. & 117.1  
Anguillæ laues sunt. 27.40  
Anguillæ gula est. 29.40  
Anguilla non habet ouum neque  
semen. 40.20. & 95.30  
Anguillæ de lacu in mare ueni-  
unt. 95.30  
Anguilla neq; mas, neq; fœmina  
est. 62.1  
Anguilla non potest prolem ex se  
procreare. 62.1

Anguillæ quæ optima. 157.20  
Anguillis quā longa uita. 117.10  
Anguillæ quomodo pingueſcant  
43.40  
Anguillarum procreatio. 94.30  
Anguillæ imbre & uiuūt & alun-  
tur. 94.30  
Anguillis quibusdam lumbrici in  
sunt. 94.30  
Anguillæ prodeunt ex terræ inte-  
stinis. 94.40  
Anguillæ quid comedant. 117.1  
Anguillæ non superfluitant mor-  
ruæ. 117.1  
Anguillæ quando transferendæ  
sint. 117.10  
Anguillarū uita extra aquā. 117.10  
Anguium ictus differunt. 131.40  
Angues membrana uernationis  
exuuntur. 74.30  
Angues circa Æthiopiam uolan-  
tes. 11.1  
Anguium magnitudo in Africa.  
131.10  
Anguli oculorum. 13.1  
Anguli oculorū longiores quid fi-  
gnificent. 13.1  
Anima quid sit. 4.40  
Animal quibus rebus creati pos-  
sit. 82.30  
Animalium partes. 7.1. & 13.10  
Animalia quare degant locis di-  
iuncta. 114.30  
Animaliū differentia. 7.20. & 12.10  
Animalium minimum. 82.20  
Animalium coitus uarij. 64.1  
Animalibus quibusdam nullum  
munus p̄ter generationē. 114.10  
Animalia quæ quinq; ænijs ha-  
beant. 57.10  
Animaliū actiōes & mōres. 113.30  
Animalia mira in mari. 56.40  
Animalium differentia quæ ex lo-  
cis est. 150.20  
Animalia quæ cauta sint. 9.20  
Animaliū somn⁹ & uigilia. 60.40  
Animalium incessus. 20.30  
Animalium actio. 122.30  
Animalia mutant cœlum. 121.30  
Animalium genera summa. 28.20  
Animaliū diff. cia ob cibū. 13.40  
Animal p̄fectū quæ generet. 10.20  
Animalia uarie bibunt. 119.40  
Animalibus sunt partes quædam  
data uelut arma. 62.30  
Animalia alia ex semine, alia sine  
semine nascuntur. 65.20  
Animaliū motus quomodo aga-  
tur. 20.30

# I. N D E X.

- Animalium studiū in quibus uer-  
setur. 114.20  
Animaliū generatio uaria. 65.10  
Animaliū partes diuersæ. 19.30  
Animalium consideratio quanta  
sit. 4.30  
Animatorum & inanimatorum  
medium non uidetur. 114.1  
Anser gregalis est. 122.30  
Anseres amant aquas. 118.30  
Anseres quales sint. 9.30  
Anseris uerecundia. 5.20  
Anseres se à coitu lauant. 85.20  
Anseris tempus incubandi. 88.10  
Anseris appendices. 31.40  
Anseris gula. 31.30  
Anseres sterilia oua sæpe ædunt.  
84.40  
Anserum fœminæ tantū incubāt.  
88.40  
Antandriæ fluij duo mūrā colo-  
res pecoris. 42.20  
Antherina iuxta terrā parit. 95.10  
Aorta arctior uena maiore est.  
36.10  
Aortæ uenæ pulmo annectitur.  
17.20  
Aorta multas mittit uenas ad uul-  
uam. 37.30  
Aorta uena spinæ annectit. 37.20  
Aorta mittit ramos ad lacēs.  
37.20  
Aorta uena. 35.40  
Aorta quo pacto sit ossibus appli-  
cata. 38.1  
Aortæ duo sunt meatus ad testes.  
33.1  
Aortæ origo. 36.10  
Appellicon Teius qd deprauarit.  
3.20  
Aper exertos dentes habet. 23.10  
Aper piscis in amne Acheolo uo-  
catis excusimatus est. 59.30  
Aper quomodo bene, quandoq;  
male ineat. 70.40  
Aper quor branchias habet. 27.30  
Aper qua ætate castratur. 159.30  
Aperiū uisus est. 96.40  
Apro, coeunti hordeum apponi  
debet. 98.1  
Aperi quando inire incipiāt. 70.10  
Aperi quandiu coitu ualeāt. 70.10  
Aperes. 8.10. & 47.30  
Aperes mel sentiunt. 58.30  
Aperes habent aculeum. 56.10  
Aperes murmur ædunt. 59.20  
Aperes colligunt sine florum deri-  
mento. 79.1  
Aperes optimæ quæ sint. 78.20  
Apum fur. 78.20  
Apum duces non tantum in ex-  
amine. 78.30  
Apes quando melius proueniāt.  
78.30  
Apes tempestatē præfagiūt. 154.1  
Apes quādo mellificent. 78.40  
Apum morbus. 130.20  
Apis sibi domum facit. 9.1  
Apes unde accipiant operis sui  
materiam. 153.20  
Apes sonitu gaudent. 153.30  
Apes ualere quomodo noscātur.  
153.40  
Apum pennæ. 56.10  
Apes ut aues incubant. 79.10  
Apum sœtus candidus est. 79.10  
Apū reges fuluo colore sūt. 79.10  
Apes ubi mel faciunt sine fauis.  
79.30  
Apum mos in floribus petendis.  
150.40  
Apum genus optimum quod sit.  
151.10  
Apes cadauera foras educunt.  
151.40  
Apes singulis muneribus se distri-  
buunt. 152.10  
Apum puritas in gustu. 58.40  
Apibus quæ noceant. 152.20  
Apes q̄ odio prosequant. 152.40  
Apes quando potissimum ægro-  
tent. 130.20  
Apes uolant sicca membrana. 11.1  
Apum reges. 5.20  
Apes latent. 124.1  
Apis animal ciuile. 8.40  
Apum labores. 5.10  
Apū cibis. 9.1. & 121.30. & 152.20  
Apum generatio. 78.1  
Apū proles quando optima. 79.1  
Apum duces duplices. 78.10  
Apū duces matres uocant. 78.10  
Apum fedulitas. 149.10  
Apum uita sex annorū est. 79.20  
Apum genus in Ponto cādidum.  
79.20  
Apes in terra etiam fauos faciunt  
79.20  
Apum duces nō utuntur aculeo.  
78.20  
Apū duces quo pacto nascuntur.  
78.20  
Apum genera. 78.20. & 150.1  
Apis quādo sterces emittat, quan-  
do non. 79.10  
Apibus pro pabulo sunt uermes  
eorum. 79.10  
Apum penna euulsa renasci non  
potest. 42.20  
Apum ablato aculeo breui mori-  
antur necesse est. 42.20  
Apum uermes. 76.10. & 79.10  
Apes noctu quiescunt. 61.30  
Aphaca opimat pecus. 121.10  
Aphare<sup>9</sup> pinnula Thunnæ. 67.30  
Apuæ generatio. 94.1  
Apuæ genus encraulos parit.  
94.20  
Aquam quo pacto accipiant cru-  
sta intestia. 51.30  
Aquarum mutatio creat pedicu-  
los. 82.10  
Aqua quare dicat diuina. 145.40  
Aqua dulcis qua ratione ex mari  
colligenda. 115.30  
Aquæ usus quibusdam ad refrige-  
rationem, ut nobis aëris. 115.10  
Aquæ in generando uis. 98.20  
Aquilonis statu mares concipiunt.  
98.20  
Aqua quædam mutant animalīū  
colores. 42.10  
Aquatriculus. 14.40  
Aquatile quare dicatur animal.  
115.30  
Aquanilia aëre uiuentia. 8.1  
Aquanilia dormiunt. 61.1  
Aquatilium ordo duplex. 8.1  
Aquila ungues. 40.20  
Aquila bellum gerit cū dracone.  
134.1  
Aquila anguibus uestit. 134.1  
Aquiloniæ pres purpuras nigras,  
austring rubras ferūt. 70.40  
Aquila cū ardeola pugnat. 134.20  
Aquilæ carniuoræ sunt oēs. 117.20  
Aquila pygargus. 88.10  
Aquila marina humore gaudet.  
118.30  
Aquila quæ animalia uenetur.  
145.40  
Aquila diu uiuit. 145.40  
Aquilæ quot oua pariant. 88.1  
Aquilæ pulli. 88.1  
Aquila quot dieb<sup>9</sup> excubet. 88.10  
Aquilium sex genera. 144.40  
Aquila ex cartilagineis. 65.10  
Arabie cameli. 21.10  
Araneorum cibis. 9.1  
Araneorum genera. 149.10  
Araneus abiorbet humores. 82.20  
Araneorum alimentum. 118.40  
Aranei unde procreentur. 75.40  
Aranei quot diebus consumman-  
tur ad iustum incrementū. 80.30  
Aranei uermiculos pariūt. 80.20  
Aranei triduum incubant. 80.20  
Aranei

# I N D E X.

Aranei ubi pariant.	80.20	Afini sanguis.	44.30	membranam.	33.30
Araneus statim ex uermiculo for-		Afinus Indicus.	21.40	Aues pediculis infestantur.	82.1
marus salit.	80.20	Afinus non habet fel.	29.1	Aues quę breuem, quęq; longam	
Aranei pratenſes quo pacto pari-		Afinę urina.	97.30	habeant caudam.	26.40
ant.	80.20	Afina à coitu interpellanda, aliàs		Auium lingua.	26.40
Araneus quibus temporibus ue-		ſemen reijcit.	101.40	Aues palmipedes in aqua magna	
netur.	149.30	Afini coitus.	101.30	ex parte uerſantur.	118.10
Araneus etiam maiora animalia		Afini dentes.	101.30	Aues hyeme petunt cāpos.	122.1
uincit.	149.40	Afinus non habet pediculū.	82.1	Aues æſtate petunt montes.	122.1
Archanas æſtate extenuat.	126.40	Afinus qñ incipiat inire.	70.20	Aues quomodo ſuos inflexus a-	
Arcti quo tempore ſint iau datiffi.		Afina quando gerat uterū.	70.20	gant.	20.20
mi cibi.	74.30	Afina cōtinue parere poteſt	101.20	Aues mammis carent.	45.30
Ardeola auis petra aquas.	118.10	Afinorum morbus.	130.1	Auium oua.	10.30
Ardeolę inimica pipo eſt.	134.10	Afinorum alimentum.	120.30	Auium os peculiare.	26.30
Ardeolarum uita.	142.30	Afinę lac.	45.40	Aues parum diſſerre poſſunt.	
Ardeolę genera.	134.30. et 142.30	Afinę uerecundia.	101.40	85.30	
Argathylis ingenioloſa auis eſt in-		Afinorum uitę ſpaciū.	102.1	Auium appendices.	31.10
faciendo nido.	141.20	Afina equū in coitu recipit.	102.10	Aues aquaticę ubi nidificant.	
Arietes tempore coitus ferociſſi.		Afinos, quos hippotheias uocāt,		80.40	
96.20		admittunt equę.	102.10	Auium mares multi oua frangūt.	
Arietes cornigeri generantur in		Afinum qui ſuxit equam, admittunt		87.1	
Africa.	131.1	tunt equę.	102.10	Aues quę puluere ſe uolunt, &	
Arietes nouellas ſemellas minus		Afininum lac miſcent ad caſeū		quę aqua lauuntur.	159.10
perſequuntur in coitu.	70.30	conficiendum.	46.10	Auium uenę.	86.10
Arietis lingua ad colorem fœtus		Aſio auis.	117.30	Aures homini ſoli immobiles.	
facit.	98.20	Aſionum genera.	144.1	13.30	
Arita piſcis iuxta terrę generat.		Aſpidis icūs nullus eſt remediū.		Auium ſemina quando canant.	
95.10		131.40		60.20	
Ariſtorelis præconiū.	4.10	Adii montis ſues.	131.40	Aues omnes fel habent.	29.10
Aritulę piſces gregatim habitāt.		Atramentū in mollibus eſt.	48.30	Aues habent teſtes.	32.10
135.20		Atticapilla.	117.40	Aues pleręq; pullos manuſ ex-	
Aro herba ſibi mederi uſum.		Atticapillę partus & nidus.	142.1	peſiunt.	88.20
125.30		Attelabum genus locutię quod		Aues apedes.	8.30
Arteria conſtat cartilagine.	17.1	Greci uocent.	3.40	Aues penniſ plurimum ualentes.	
Arteriam habent quibus pulmo		Attendo pars quę ad uires corpō		8.30	
eſt.	17.1	ris uiuat.	38.10	Aues æſtate incubantes celerius	
Arteria ouiparis oibus eſt.	28.30	Aucupandi ratio.	134.1	excludunt.	84.40
Arterię officium.	17.20	Auditus in animalib⁹ ſedes.	57.20	Aues quibus temporibus melius	
Arteria quo pacto tendat ad pul-		Auditus piſciū argumēta.	57.40	ualeant.	126.10
monem.	17.10. & 30.1	Audiendi meatus.	13.40	Auium odorandi meatus in ro-	
Arteria non oibus ſimilis.	28.30	Audiendi meatus piſcium.	28.1	ſtro continetur.	26.30
Arteria quę pars nominet.	14.30	Aues quę amicę.	135.1	Auium oculi.	26.30
Arterię origo iuxta os ſerpenti-		Auium ouū putamine duro cō-		Aues in nidis pariant.	83.40
b⁹ poſita eſt.	30.40	ſtat.	84.10	Aues ſylueſtres quoties pariant.	
Articulus digitorum.	15.30	Aues quę apud aquas degant.		69.1	
Arundinis flore apes naſci.	78.1	140.30		Aues quōt notis ſe moueant.	11.10
Aſcalaph⁹ appēdices habet.	31.40	Auium coitus.	64.10	Auib⁹ quę ungues habent adun-	
Aſcarides unde naſcantur.	76.1	Auiū partus præcipue uere.	83.40	cos, femora ſunt maxima.	26.20
Aſellus piſcis later.	124.40	Aues quibus ungues adunci, par-		Aues omnes oua pariant.	83.30
Aſiæ beſtię efferaciore.	131.20	cus generant.	83.40	Auium ſemen genitale.	84.20
Aſili os.	52.40	Aues quo loco fel habeant.	29.20	Auia ſemina ubi concipiat.	84.20
Aſilus thunnorum.	82.10	Auium ſitus in utero.	11.30	Auium aurium meatus.	26.30
Aſil⁹ aculeus.	11.10	Aues plurimę habent tenue inte-		Auium morborum ſigna.	126.20
Aſilis qualis ſit lingua.	56.10	ſtinum.	31.40	Aues niſi pariant moriunt.	85.20
Aſili ſanguiuori ſunt.	121.20	Auium odorandi foramina.	57.20	Aues à coitu inhorreſcunt.	85.20
Aſili unde proueniant.	8.10.	Aues urbanę quoties pariant.		Aues pleręq; lienem exiguum ha-	
& 76.30		69.10		bent.	28.40
Aſinę purgatio à partu.	92.20	Auium uulvę ceruix.	33.30	Auium oua uento concepta infe-	
Aſinus frigoris impatiēs eſt.	130.1	Aues qualem habeant in uulua		cunda ſunt.	63.30

**A**uium incubitus. 88.40  
 Auium partes. 26.10  
 Auium crura. 26.10  
 Auius quid peculiare inter cat-  
 ra animalia. 26.20  
 Auium femur. 26.20  
 Auium cibus. 117.30  
 Aues quibus sunt adunci ungues  
 carniuoræ omnes sunt. 117.20  
 Auium mares canunt quidam, ut  
 feminae suæ. 60.20  
 Aues quo pacto efficiant ne quid  
 in pulmonem delabatur. 27.1  
 Auius quibusdam natura calcar  
 dedit. 27.1  
 Aues quæ uolaces sint. 27.1  
 Aues quæ calcarigeræ, ad uolan-  
 dum ineptiores sunt. 27.1  
 Auium crista. 27.1  
 Auium generatio in ouo quid cū  
 piscibus cōmune habeat. 89.30  
 Auium testes. 31.40. & 65.20  
 Auius quibus locutionis præci-  
 pua facultas sit. 60.10  
 Aues minores linguaciores sunt.  
 60.10  
 Aues tempore coitus loquaciores  
 60.10  
 Aues nouellæ oua edunt paucio-  
 ra. 69.30  
 Aues quomodo bibant. 119.40  
 Auium rostrum augeri in tene-  
 scute. 42.1  
 Aues quibus parribus & à seipsis  
 & ab alijs animalibus differant.  
 31.20  
 Auium duces. 122.20  
 Auium pennæ p ætatem nōnullæ  
 mutantur. 42.10  
 Auium ossa parum inter se disse-  
 runt. 39.20  
 Aues multæ conduntur. 125.1  
 Aues quas uocemus. 11.1  
 Aues exiguo, aut etiam quædam  
 nullo potu contentæ sunt. 118.30  
 Aues renes non habent. 29.20  
 Auius quibusdam maribus da-  
 ta sunt calcaria, feminis nō itē.  
 63.40  
 Aues quædam uento cōcipiunt.  
 63.30  
 Aues omnes copiam unguis ha-  
 bent. 26.20  
 Aues multitudine sunt. 26.20  
 Aues planipedes. 26.20  
 Auium digiti. 26.30  
 Auium pulmo. 29.40  
 Auium quædā genera literas p-  
 ferre possunt. 27.1

I N D E X.

Auis cuiusdam scythicæ mores.  
 145.40  
 Auicula quo pacto mutet uocē.  
 60.30  
 Auicularum uentriculus. 31.30  
 Auratæ dormientes capiuntur.  
 61.20  
 Aurata litoralis piscis. 122.40  
 Aurata piscis frigore laborat.  
 126.40  
 Aurata partus. 95.20  
 Aurata q̄t pinnas habeat. 10.40  
 Auratæ ubi pariant. 68.1  
 Auratæ pauca appendices. 31.20  
 Aureliæ. 76.10  
 Aures simia hominis more habet  
 24.30  
 Auris pars capitis. 13.30  
 Auris pars interior. 13.30  
 Auris meatum nullum habet ad  
 cerebrum. 13.30  
 Auris ex qua materia confuta  
 sit. 13.30  
 Auium meatus auium. 26.30  
 Aurem solus homo non mouet.  
 13.40  
 Aurium differentia multæ. 13.40  
 Aures ad audiendum aptissimæ.  
 13.40  
 Aures non sunt indices morum.  
 13.40  
 Aurium magnitudo. 13.40  
 Auricula auris pars exterior. 13.30  
 Auriculæ quorundam cartilagi-  
 ne constant. 39.40  
 Auriculis quæ careant. 25.30  
 Auriuitis quid edat. 117.40  
 Auster impedit uolat<sup>9</sup> auiū. 122.10  
 Austri flatu feminæ cōcipiuntur.  
 98.20  
 Auxumæ uocatur catuli thunni.  
 95.40

B

**B**alena habet mamas. 45.30  
 Balenæ generant animal.  
 91.10  
 Balenæ natura. 114.40  
 Balenis desunt branchiæ. 10.20  
 Balenæ ubi habeant fistulā. 10.20  
 Balenæ quot ædant. 91.10  
 Balenæ quo pacto dormiāt. 61.20  
 Balerus piscis. 1.40  
 Balerus quo loco pariat. 93.20  
 Baieri morbus. 127.30  
 Barbæ diuersitas. 41.40  
 Beldium quando sit suscipiendū.  
 1.10  
 Belsolæ pennarū in igne nascun-

tur in Cypro. 77.20  
 Bilis communis est animalibus.  
 34.20  
 Bipedium situs in utero. 111.30  
 Bisulca animalia. 21.30  
 Bisulca sunt quæ cornua habent.  
 21.40  
 Bivaluia quo loco habeant papa-  
 uer. 53.30  
 Bivaluæ quod genus appeller.  
 52.10  
 Blattæ ubi gignantur. 76.30  
 Bolitæna species polypi. 49.10  
 Bombyx unde fiat. 76.20  
 Bōbycia texisse quandā in Coo  
 insula. 76.20  
 Bombycum industria in facien-  
 dis nidis. 80.1  
 Bombycum uermes. 8.1  
 Bombycum cera. 8.1  
 Bombycum genus. 155.40  
 Bonafus. 20.40  
 Bonafus in Pæonia. 22.1  
 Bonafus ubi gignantur. 156.40  
 Bonasi uox. 156.40  
 Bonasi caro. 157.1  
 Bonasi excrementum. 157.10  
 Bonafus omnia interiora ut bo-  
 ues habet. 29.20  
 Bosca gaudet aquis. 118.20  
 Bos sorbendo bibit. 119.40  
 Bos ex cartilagineis. 65.10  
 Bos piscis oua non habet. 91.10  
 Boues quidam in corde suo ossi-  
 culum continent. 28.40  
 Boum uox. 62.30. & 70.1  
 Boues claram aquam desiderant.  
 120.30  
 Boues quibus rebus uestantur, et  
 pinguescant. 120.10  
 Boum morbi. 129.1  
 Boum pedum cura. 120.20  
 Boues quando dentes mutant.  
 100.1  
 Bos quinquennis in uigore est.  
 100.1  
 Boues laborat pedibus. 100.1  
 Boum societas in pascendo. 136.1  
 Boues magni in Epiro. 46.30  
 Boues pediculos habent. 82.1  
 Boum coitus. 99.30  
 Boues quandiu uiuant. 99.40  
 Boues mites sunt. 92.20  
 Boum potus. 129.40  
 Bouis dentes. 23.10  
 Boues seniores quomodo pos-  
 sint pingues reddi. 110.10  
 Boum cornua. 22.1  
 Boues syluestres ubi sint. 21.1  
 Boues

# I N D E X.

Boues syluestres quales sint. 21.10  
 Boues syluestres quid differat ab  
 urbanis. 21.1  
 Boues in Phrygia sunt qui cor-  
 nua, ut aures, mouent. 40.10  
 Boues etiam somniare. 60.40  
 Boum ungulae pice illitae ualent  
 melius. 129.1  
 Bouis morbus struma qualis sit.  
 129.1  
 Bouis languentis signa. 129.1  
 Bubus copiam lactis augent fabae  
 46.40  
 Bubulum lac. 45.40  
 Bubulum lac aptum ad caseum.  
 46.10  
 Bubulo ex tergore fit glutinum.  
 40.40  
 Brachium. 15.30  
 Brachium inflexum in interiora  
 agitur. 15.30  
 Brachia simia. 24.40  
 Brachium quomodo inflectitur.  
 15.30  
 Brachia simiae ad modum homi-  
 nis sunt, sed hirtiuscula. 24.40  
 Brachiale quid uocetur. 15.30  
 Brachia simia ut homo inflectit.  
 24.40  
 Brachij partes. 15.30  
 Brachium etiam ulnam appella-  
 mus. 15.30  
 Branchias quae animalia detectas  
 habeant. 10.20. & 27.30  
 Branchiae delphinis defunt. 10.20  
 Branchiarum usus in locustis. 50.30  
 Branchiae quot sint gladio pisci.  
 27.40  
 Branchiae piscium partim testae,  
 partim detectae sunt. 27.30  
 Branchiarum in piscibus usus. 27.20  
 Branchias integras quae non ha-  
 beant. 27.20  
 Branchiatorum discrimina. 27.30  
 Branchias balenae non habet. 10.20  
 Braccia generat erucas. 76.1  
 Brenthus auis montes, & syluas  
 colit. 140.20  
 Brenthi uox & uictus. 140.20  
 Briffi echini. 54.20  
 Brucus genus locustae. 3.40  
 Bruci unde procreantur. 75.40  
 Bruci quando pariant. 81.1  
 Brucorum oua quoniam intereat. 81.1  
 Bubali sanguis fibras non habet.  
 38.30  
 Bubo. 117.30  
 Buccina quando generet. 68.40  
 Buccina scabra. 52.20

Buccinis etiam est fau\* quiddam. 71.30  
 Buccinis longum est uiuendi tem-  
 pus. 72.20  
 Buccinis qui modus gignendi sit  
 72.10  
 Buccinis quae sit pascendi ratio.  
 72.10  
 Buccina quando lateat. 123.40  
 Buteo auis similis miluo. 117.30  
 Buteo hostis ranae est. 134.10  
 Buteo hostis rubetae est. 134.10

## C

Aebus simia gerens caudam.  
 24.30. & 25.10  
 Calcar quibus auibz datum sit. 27.1  
 Calculi quo pacto gignent. 43.10  
 Calidris aquas petit. 118.20  
 Calli qui uocentur. 52.10. & 55.1  
 Calua os capitis. 38.40  
 Caluae uertex quid uocetur. 12.30  
 Caluae ferrata pars. 38.40  
 Calua mulieris unam habet sutu-  
 ram. 12.30  
 Caluae uertex quibusdam geminus  
 12.30  
 Calua quae fit in homine. 12.20  
 Calua canis futuris caret. 38.40  
 Caluae partes. 12.20  
 Calua quale os. 12.30. & 38.40  
 Calua tres suturas habet. 12.30  
 Caluae sunt min\* quibus uarices  
 sunt. 42.1  
 Calui parte priore fiunt, sed par-  
 te posteriore nemo. 41.20  
 Caluitium quid uocemus. 41.20  
 Caluitium mulieres pueri & spa-  
 dones non patiuntur. 41.20  
 Calx. 15.40  
 Camelus quo pacto urinam red-  
 dat. 71.10  
 Camelus tempus coeundi. 71.10  
 Camelus singulos parit. 71.10  
 Camelus quandiu terat uterum.  
 71.10. & 102.30  
 Cameli cauda. 21.10  
 Cameli aquam desiderat turbidam.  
 120.30  
 Cameli sitis patientes sunt. 120.30  
 Camel\* etiam laborat rabie. 128.40  
 Cameli nomen usitatum uniusque  
 linguae. 3.40  
 Camelus mas saeuit tempore coi-  
 rus. 96.20  
 Camelus est cum equis odium na-  
 turale. 96.20  
 Cameli feminae etiam castrantur  
 160.1  
 Camelos quot quidam in Asia

possideant. 160.1  
 Cameli celeris cursus sunt. 160.1  
 Cameli papillae. 21.10  
 Cameli genitale. 21.10  
 Cameli genua. 21.10  
 Cameli clunes. 21.20  
 Camelus animal bifidum. 21.20  
 Cameli pes. 21.20  
 Camelos calceant. 21.20  
 Camelus diu uiuit. 102.30  
 Camelorum gressus. 20.30  
 Camelus quomodo mingat. 22.30  
 Cameli ardor in coitu. 64.20  
 Cameli lac. 45.40  
 Cameli caro suauissima. 102.40  
 Cameli genitale. 22.40. & 64.20  
 Camelum matrem non superue-  
 nire. 157.30  
 Cameli dentes utriusque non habent.  
 23.10  
 Cameli Baetiani ab Arabijs disse-  
 runt. 21.10  
 Cameli coitus. 64.20  
 Cancelli\* quomodo generet. 72.40  
 Cancelli descriptio. 53.30  
 Cancer. 49.20  
 Cancro\* gen\* crusta testu. 11.30  
 Cancrorum forceps dexter uali-  
 dior. 51.20  
 Cancri, psumuntur, serpenti. 156.40  
 Cancri quidam in nonnullis testa-  
 operis nascuntur. 72.30  
 Cancrorum intestinum. 50.40  
 Cancrorum pedes. 49.30  
 Cancri quo pacto ore mare ex-  
 cipiant. 50.30  
 Cancro\* gen\* multiplex est. 49.20  
 Cancri exuuntur senectute. 126.1  
 Cancri ambulare possunt. 8.20  
 Cancrorum genus. 47.30  
 Cancer mas quid differat a mare,  
 66.20  
 Cancri quo pacto coeant. 66.10  
 Cancrorum oculi. 50.1  
 Cancrorum gen\* mirae uelocitatis.  
 49.30  
 Cancri puer crusta exuunt. 74.30  
 Cancri fluuiales. 49.30  
 Cancri maiore. 49.20  
 Cancer quomodo incedat. 11.20  
 Cauda farr\* unde generent. 98.20  
 Canes idici unde generent. 131.30  
 Canes ut coeant cum feris, quo pa-  
 cto efficiendum. 131.30  
 Canes herba quadam uomitum  
 mouent. 137.10  
 Canes quo pacto mingant. 99.10  
 Canes quot pariant. 99.10  
 Canis quandiu uiuat. 99.10

# I N D E X.

Canibus iuuenibus quales sint dentes.	23.40	Capitō carne abstinet.	116.20	sum continetur.	38.10
Canes quales habeant dentes.	23.10	Capitonis partus.	95.20	Capitis pars posterior.	16.40
Canum mammae.	22.20	Capitonum alimentum.	116.20	Capitis magnitudo uaria.	16.40
Canī angustus est uenter.	30.20	Capitones quando pariāt.	64.20	Capita minus laborant quorum pediculus in capillo est.	82.1
Canum amor.	5.20	Caper lac prēbuit in Lēno.	45.40	Capitis fœditas unde ueniat.	81.40
Canis tempus ad uenerem.	67.1	Capras somniare.	60.40	Capitis pars quæ sit in homine.	12.20
Canis calua sine futuris est.	38.40	Capræ non spirant per aures.	13.30	Caput animalium.	16.10
Canes ad duodecimum annum coeunt.	71.10	Capræ quo pacto cubent.	136.1	Cardueli cibus.	117.40
Canum ingenium.	9.30	Capræ coitus.	70.1. & 98.10	Carō testa intestorum.	52.1
Canes laconici unde generentur.	131.30	Capræ Aethiopicae lōge sunt uitæ.	98.20	Carō communis quibus sit.	34.20
Canes quomodo incrementa capiant.	23.1	Capræ ius quamobrem congregat.	43.30	Carō squillarum.	51.10
Canibus ricinus peculiaris.	82.1	Capræ ueneris expertes qua ratio nelac prēbeant.	45.40	Carō diuisibilis undiq; est.	43.10
Canum rabies.	118.40	Capris duces non sunt.	98.30	Carō aboletur quando animal gracilescit.	43.20
Canes propter catellos sæuiunt.	96.20	Caprarum solertia.	137.10	Carō uertitur in pingue.	43.20
Canes quando canire dicantur.	97.10	Capris lactus copiam augēt fabæ.	46.40	Cartilaginea dormientia capiuntur.	61.20
Canis pes.	21.30	Caprarum cibus.	121.1	Cartilagineorū fœcūditas.	90.20
Canis os est rescissum.	24.20	Capræ quot menses ferant uterū.	98.10	Cartilaginea particulatim sœtus ædunt.	90.20
Canes an mutant dentes.	23.30	Capræ quā longa uita.	98.10	Cartilago quid differat ab ossē.	39.40
& 99.20		Capræ ubi sint longis auribus.	130.40	Cartilagineorum oua.	10.30
Canis corpus est hirtum.	20.40	Capræ pinguescunt gerentes uterum.	97.40	Cartilago rupta non reparatur.	39.40
Canum genera plura.	98.30	Capris uox propria ad coitum.	60.10	Cartilago in quibus medullā continet, in quibus non.	39.40
Canes laconici quando coeant.	98.30	Capræ pes.	21.30	Cartilaginei generis mares quidam a fœminis differunt.	65.10
Canum coitus.	98.40	Capræ menstruum signum ostendunt.	97.20	Cartilagineorum quædā aspera, quædā læuia.	27.40
Canum menstrua.	98.40	Capræ qua occasione obstupescant.	135.40	Cartilagineorum coitus.	65.1
Canum prurius.	99.1	Capræ sunt impatientes frigoris.	136.1	Cartilaginei generis fœmina mare maior.	65.10
Canum lac.	99.1	Capræ urina.	97.30	Cartilaginea quæ sint.	65.10
Canes quibus morbis laborent.	118.40	Capræ rediuos habent.	82.1	Cartilago quibus sit communis.	34.20
Canum ætas ex dentibus iudicatur.	23.30. & 99.30	Capræ ualeutudinariæ sunt.	121.20	Cartilagine, extrema nonnullorū ossium constant.	39.40
Canes anginae morbo moriuntur.	118.40	Capriceps aus non habet lienem.	28.40	Cartilaginea quies pariāt.	67.40
Canes magni in Epiro.	46.30	Capriceps locus fellis.	29.20	Cartilaginea oua gignunt.	10.20
Canum uox.	69.40	Caprificus generat calices.	82.20	Cartilagineum genus omne hyme conditur.	124.30
Canum purgatio.	99.1. & 119.10	Caprificum quare agricolæ iuxta ficus ferant.	82.40	Cartilagineorum iecur.	43.30
Canes enī somniant.	60.40	Caprimulgi forma.	144.30	Cartilaginei carniuori sunt tantum.	116.20
Canes anniculi coeunt.	70.10	Caprinum oculorum, bonorum morum indicium est.	13.10	Cartilaginea quomodo sonent.	59.40
Canis quādiu uterum gerat.	70.10. & 98.40	Caprinum lac ad caseum aptum.	46.10	Carulus apud mare uersat.	118.20
Canes herbam tritici comedunt contra lumbricos.	137.30	Caprire.	105.40	Caseus.	45.30
Canis Vlystis.	99.10	Caput uiri sine sutura.	12.30.	Caseus ex quo lacte fiat.	45.30
Caniceps quale sit animal.	24.30	& 39.1		Castrandi duæ rationes.	33.1
Canicula piscis semel anno parit.	90.40	Caput omnibus animalibus superius in matre est.	111.30	Castratione mutantur animalia.	159.2
Canicē celerius sentiunt temporā homines.	41.10	Capitis ossa sex.	39.1	Castratorum uox.	70.1
Canices unde sit.	41.10	Caput testa testorum.	52.40	Cataractæ gula.	31.30
Cantharidæ unde nascantur.	77.10	Caput non neruis, sed futuris ossum continetur.		Cataracta	
Canis animalium tempus.	9.10				
Capella aus perit aquas.	118.30				



# I N D E X.

- Catarracta auis in mari uisitata. 140.30  
 Catelli cæci gignuntur. 98.40  
 Cauda quibus sit pro parte inferiori. 22.40  
 Caudarum pili. 21.10  
 Cauda cameli. 21.10  
 Caudis natantia. 10.40  
 Cauda uolucrum. 26.40  
 Caudam quæ habeant. 20.30  
 Cauda simiarum. 25.10  
 Caudæ serpentibus renascuntur. 31.10  
 Cauernas quæ animalia subeant. 9.1  
 Causæ quæ primæ, quæque secundæ. 3.10  
 Centipeda quomodo euomet ha-  
 mum. 147.20  
 Centipeda. 47.30  
 Centipedes maris incolæ. 28.10  
 Centipedes quomodo moueant. 56.1  
 Cera bombycum. 80.1  
 Cera ex qua materia fingant. 78.40  
 Ceranthemos. 79.1  
 Cerebrum quibus animalibus sit. 16.30  
 Cerebrum hominis. 16.30  
 Cerebrum in chameleone ubi po-  
 situm sit. 26.1  
 Cerebrum sensu caret. 44.10  
 Cerebrum adipem pinguescentium  
 pingue est. 43.40  
 Cerebrum sanguine caret. 16.40  
 & 36.40  
 Cerebrum frigidum. 16.40  
 Cerebrum quibus membranis mu-  
 niatur. 42.30  
 Cerebrum ouis squalidum est. 43.40  
 Cerebrum ubi situm sit. 12.30. &  
 16.30  
 Cerebri membrana. 16.30  
 Cerebrum bipartitum. 16.30  
 Cerebellum. 16.30  
 Cerinthi flore apes nasci. 78.1  
 Cernua quibuscumque temporibus  
 latet. 124.20  
 Cernua piscis cito crescit. 68.1  
 Cernua quid comedant. 116.20  
 Cernuus mutat colorem. 132.20  
 Certhia auicula qualis. 142.20  
 Cerui pes. 21.30  
 Cerui colli pars. 14.30  
 Ceruix nulli est piscium. 27.20  
 Ceruices plurimis neruis continen-  
 tur. 38.20  
 Ceruus ruminat. 160.10  
 Ceruorum sanguini defunt fibræ. 38.30  
 Ceruo mari uox grauior. 69.40  
 Cerui genitale neruosum. 22.40  
 Ceruorum natura. 9.20  
 Ceruis in capite gignuntur uer-  
 mes. 29.1  
 Ceruorum prudentia. 136.10  
 Ceruus fel non habet. 28.40  
 Ceruæ statim à partu edunt inuo-  
 lucrum. 136.40  
 Ceruarum inuolucrum creditur  
 habere uim medicam. 136.40  
 Cerui quo pacto capiuntur. 137.1.  
 Ceruus erectis auribus acerrime  
 sentit. 137.1  
 Cerui ætate pinguescunt. 103.30  
 Cerui qua causa in aqua fugiant. 103.30  
 Ceruorum caro ut hircorum olet  
 tempore coitus. 103.30  
 Cerui habent intestinum imbecille. 103.30  
 Ceruæ ubi pariant. 136.10  
 Cerui morfi à serpente canculos e-  
 dunt. 136.40  
 Cerui cornua decidua. 22.10  
 Ceruus solus omnibus annis cor-  
 nua amittit. 40.10  
 Ceruus Achænos fel in cauda ha-  
 bere. 29.1  
 Ceruus senes quo pacto cognos-  
 camus. 136.30  
 Ceruorum adminicula. 136.30  
 Cerui donec recipiunt cornua no-  
 ctu nascuntur. 136.30  
 Cerui qua ratione præparent cor-  
 nua. 136.40  
 Ceruorum intestinum amarum. 29.1  
 Ceruus captus est hederam suis  
 in cornibus habere uiridem. 136.40  
 Cerui cornua. 22.1  
 Ceruus cornua tota solida. 40.10  
 Ceruorum sanguis quo pacto spi-  
 setur. 38.30  
 Ceruarum ubera. 103.20  
 Cerui quomodo oleant, quidque  
 faciant post coitum. 103.30  
 Cerua docet hinnulum suum. 136.20  
 Cerua pugnat pro hinnulis suis. 136.20.  
 Ceruus præpinguis cur secedat. 136.20.  
 Ceruus ubi amittit cornua. 136.20  
 Ceruorum coitus. 103.10  
 Ceruorum partus. 103.10  
 Ceruus celeriter crescit. 103.20  
 Ceruæ à partu purgatio. 103.20  
 Ceruæ qua ratione hinnulos suos  
 defendant. 103.20  
 Ceruorum uiræ spaciunt. 103.20

- Ceruæ ubi sint scissæ aure. 103.20  
 Ceruus mas cornua habet, non fe-  
 mina. 62.40  
 Ceruæ raro parantur mare. 64.10  
 Cete. 10.20  
 Cete quibus branchiæ non sunt,  
 animal generant. 91.10  
 Cete dare mammæ sunt. 45.30  
 Cetarij odores pisces excitant. 58.10  
 Cerarij generis coitus. 65.10  
 Chalcida. 129.30  
 Chalcis piscis quo malo infestet. 127.40  
 Chalcis qualis sit auis. 140.40  
 Chamæ ortus. 72.20  
 Chamæleo quando mutet suum  
 colorem. 26.1  
 Chamæleo niger crocodilo non  
 dissimilis. 26.1  
 Chamæleonis color mutat in to-  
 to corpore. 26.1  
 Chamæleo pigre mouetur. 26.1  
 Chamæleo qualis sit mortuus. 26.1  
 Chamæleonis gula. 26.1  
 Chamæleo ubi habeat arteriam. 26.1  
 Chamæleo ubi habeat sanguinem. 26.1  
 Chamæleonis pedes. 25.40  
 Chamæleonis membrana firmæ. 26.1  
 Chamæleo dissectus, spirare ta-  
 men diu potest. 26.1  
 Chamæleonis internæ partes. 26.1  
 Chamæleo corporis partes mo-  
 uere ad arbitrium potest. 26.10  
 Chamæleonis domicilia. 26.10  
 Chamæleo lacerta similis. 25.30  
 Chamæleonis descriptio. 25.30  
 Chamæleonis cauda. 25.30  
 Charadrium auem unde nomi-  
 nemus. 140.10  
 Chenalopeces. 84.40  
 Chromis offenditur algore. 126.40.  
 Chromes semel pariunt. 67.30  
 Chromis piscis liquide audit. 58.10  
 Chromis piscis uidetur uocalis. 59.30  
 Chrysalides. 76.10  
 Cibi quomodo differant. 114.20  
 Cibi qui inilant, obfunt nutri-  
 bus. 113.20  
 Cicada sola ore caret. 56.30  
 Cicadæ alimentum ros est. 56.30

# I N D E X.

Cicada nō habet excrementum.

56.30

Cicadarum multa genera.

56.30

Cicadæ canunt.

59.30

Cicadæ ubi non sunt arbores, nō

proueniunt.

81.10

Cicadæ oleis delectantur.

81.10

Cicadarum coitus.

81.10

Cicadæ mares canūt, feminæ si-

lent.

81.30

Cicadæ quo pacto capiuntur.

81.30

Cicadæ unde generentur.

75.40

Cicadarū duo genera sunt.

81.10

Cicadæ quæ canunt, quales sint.

81.10

Cicadæ mutæ.

81.10

Cicadæstris quale corp<sup>9</sup> sit.

56.40

Cicere pinguescunt sues.

128.30

Cicindela.

47.40

Cicindela unde nascantur.

76.30

Ciconiæ cibus.

118.10

Ciconia fecedit.

125.10

Ciconiæ uulneri quæ herbam ad-

ponant.

137.30

Ciconia montana.

145.10

Ciconiæ pietas.

5.10. & 141.10

Ciconiæ appendices.

31.40

Ciconia.

146.1

Cicumia auis aduncis unguibus.

87.30

Cicures animantes.

9.10

Cilia quos pilos uocemus.

13.1

Cilium simiarum.

24.40

Cilium in palpebris.

20.40

Ciliciæ capræ tendentur.

131.1

Cimices unde uiuant.

81.40

Cimices unde proueniant.

81.40

Cinchilus auis unde petat cibum.

118.10

Cinclus uitam apud mare tradu-

cit.

140.30

Cinctus præcordia appellantur.

28.30

Cinctū uocant septentransuerfum

18.20

Cinnamomum ex qua materia fa-

ciatur nudum.

141.20

Cinnamomum quo pacto legat.

141.20

Circus accipiter uulpem inuadit.

134.20

Cirri unde proueniant.

76.30

Cirri lolliginis.

48.20

Ciuiles animantes quæ sint.

8.40

Clerus nocet fauis.

130.20

Coagulo lac cogitur.

46.10

Coagulum quid sit.

46.20

Coagulum quæ habeant.

46.20

Coagulum præstantius quod sit.

46.20

Coarmentari.

97.10

Cocalia.

52.1

Cochleg.

52.1

Cochleæ bestiolas quasdam in se

continent.

54.10

Cochleis quales dentes.

52.40

Cochleæ quo pacto lateat.

123.40

Coëunt auersa quæ retro urinam

mittunt.

64.1

Coëunt diutius quæ animal gene-

rant, quam quæ ouum.

65.10

Coitus tempus plurimorū uer est

66.40

Coitus tempora certa.

66.40

Coitus insectorum.

66.30

Coitus crusta insectorum.

66.10

Coitus quadrupedum oua pa-

rientium.

64.30

Coitus tempus omne quibus op-

portunum.

67.1

Coitus tempore humor mittitur

in genitalia.

65.40

Coitu quæ animalia nascantur.

65.20

Coitus ante partum facit ad faci-

litatem pariendi.

109.1

Coitus serpentū.

64.40

Coitus homini omne tēpus op-

portunum.

67.1

Coitus uarij animantium.

64.1

Coitus mollium.

66.1

Coitus matura ætas q̄ sit.

69.20

Coitus tempore elephantū solitu-

dinem quæunt.

64.20

Coles.

15.10

Collum quibus hirtum sit.

20.40

Collum quod sit.

14.30

Colli partes.

14.30

Collurio auicula.

143.20

Colore hostis asinus est.

134.30

Colubris Thebanis cornu uesti-

gium est.

22.1

Columba quo loco fel habeat.

29.20

Columbæ etiā hyeme pariūt si lo-

cum apricum habeant.

69.10

Columbarum pulli quando me-

liores sint.

69.20

Columbis exiguus lien.

28.40

Columbi cum hominibus degūt

9.10

Columborum cibus.

118.1

Columbæ ante coitum mutuo o-

sculantur.

85.30

Columbæ quandiu uiuāt.

138.30

Columbæ primo marem, deinde

feminam generant.

87.20

Columbæ ambo incubāt, mas & femella.

87.20

Columbæ Aegyptiæ.

87.30

Colūbæ semeiæres coëunt.

87.30

Columbæ partus.

83.40

Columbarū species plures sunt.

69.10

Colūbæ coniugiū seruant.

138.10

Columbæ castitas.

5.30

Colūbæ fortant tota æstate.

69.10

Columbæ caudam post coitū dis-

tendunt.

85.20

Columbi gregales sunt.

8.40

Columbarum genus parit bina

oua.

87.10

Columella quæ sit.

14.20

Commotis quid dicatur.

150.30

Conceptus post menstruorū p-

sumum contigit.

107.1

Conceptus signa.

107.40

Conchæ.

52.1

Conchæ uiuunt immutabili sede

8.10

Concharum genus.

47.30

Conchæ ubi generentur.

72.20

Conchæ galadæ.

52.10

Conchæ testa contectæ.

11.20

Concharū genus uarijs locis na-

scitur.

72.30

Conchæ quædam sedem mutat,

quædam non.

72.40

Concharum quædam pectinatum

diuisæ sunt.

52.20

Concha quæ pictorib<sup>9</sup> in usu est,

qualis sit, ubiq<sup>9</sup> reperiat.

72.40

Concharum hospes cancellus.

72.40

Conger ubi habeat fel possum.

29.20

Conger quibusdam temporibus

latet.

124.20

Congros uincunt locustæ.

116.1

Congri polypos uincunt.

116.1

Congri uiuūt abscessa cauda.

135

Congri branchiæ.

27.40. (20

Congri caput habēt serpentes in

mar.

28.10

Congro gula est.

29.40

Congri ferura.

98.1

Congri in alto sunt.

122.40

Congri leues sunt.

27.40

Congri tantum sunt carniuori.

116.20

Congri q̄t pinnas habeāt.

10.40

Coniugij uis.

110.20

Consonantes quo pacto proie-

rantur.

59.20

Conuulsione plenilunio infestā-

tur pueri.

113.20

Conuulsione

# I N D E X.

- Cōuulsiōe excipiunt pueri. 113.20  
 Conuulsiō a scapulis orta pericu-  
 losa est. 113.20  
 Cor quomodo inter duas uenas  
 sit. 35.40  
 Cordis sin⁹ in qbus pexigui. 36.1  
 Cor suo mucrone in quam par-  
 tem spectet. 17.40. & 36.1  
 Cordis sinus dexter maximus est  
 sinister minimus. 36.1  
 Cordis sinus omnes ad pulmonē  
 habent foramen. 36.1  
 Cor tres habet sin⁹. 17.40. & 36.1  
 Cordis situs. 17.40. & 29.30  
 Cor membrana opertū. 17.40  
 Cor homini ad sinistram uergit  
 potius. 18.1  
 Cor hominis rotundius. 18.1  
 Cordis sinus peruij ad pulmonē.  
 18.10  
 Cordis meat⁹ ad pulmonē. 18.10  
 Cor uenarū principium. 35.40  
 Cordis uenæ. 34.40  
 Cor primū in ouo uidetur. 85.40  
 Cor quam partem in animalibus  
 obtineat. 29.30  
 Cordis mucro. 29.30  
 Cor arteriæ iungitur. 17.20  
 Cor subit spiritus. 17.20  
 Cor est obis qbus sanguis. 28.30  
 Corde boues quidam ossiculum  
 continent. 28.40  
 Cor esse neruorū originem. 38.1  
 Cordis uentriculus uenæ quadā  
 pars est. 36.10  
 Cor serpentum. 31.1  
 Cor in medio sinu sanguinē te-  
 nuissimum habet. 18.20  
 Cordula aquatile animal. 8.10  
 Cordulum nomine animal. 115.10  
 Cornua à radice caua i mucronē  
 solidum exeunt. 40.10  
 Cornigera animalia. 21.40  
 Cornix etiam uolantes suos pul-  
 los pascit. 88.20  
 Cornicis gula. 31.30  
 Cornix cū noctua bellum gerit.  
 134.1  
 Cornices petunt litora. 118.20  
 Cornicū fœmīnq tñ incubāt 89.1  
 Cornu ceruini incensu fugantur  
 plurima insectorum. 58.40  
 Cornua ceruorum. 40.10  
 Cornua q̄ solida, q̄ caua sint. 22.1  
 Cornua q̄ ratiōe flectūt. 120.20  
 Cornua discrepāt ab ossibus 40.1  
 Cornua cū adherēt pot⁹ quā  
 offi. 40.10  
 Cornu cerui sinistrum non inue-  
 nitur. 136.20  
 Cornuum color. 40.1  
 Cornua in Phrygia boues mo-  
 uent. 40.10  
 Cortice intecta latent. 124.10  
 Cortice quæ animalia integantur.  
 46.20  
 Cortice intecta latendo exuūt fe-  
 nestutem. 125.30  
 Corui pennæ frigore mutantur.  
 42.10  
 Coruus hostis tauri est. 134.20  
 Coruorum nidificatio & fœnus.  
 144.30  
 Corui gula. 31.30  
 Coruo bino cornua oriunt⁹ 136.20  
 Coruus quor pariar. 88.10  
 Corui tempus incubandi. 88.10  
 Coruo ubi fel sit. 29.20  
 Coruus uulpi amicus est. 134.40  
 Coruinam speciem gerentes ue-  
 nere non ualent. 9.20  
 Coruulus piscis cum uterum fert  
 optimus est. 132.20  
 Costæ à spina oriuntur. 39.1  
 Costis pectus impositum est. 39.1  
 Costæ octonæ. 15.20  
 Costæ turdolorum. 15.20  
 Costæ quor sint serpentib⁹. 31.10  
 Coturnices sibi nidū non faciunt  
 138.40  
 Coturnices qñ pinguiorē. 122.1  
 Corti quo pacto capiantur. 58.1  
 Coxa. 14.40. & 20.20  
 Coxarū doloribus unde mitten-  
 dus sanguis. 35.20  
 Crabronum uermes. 76.10  
 Crabronum fauus. 79.30  
 Crabronum fœtura. 79.40  
 Crabronū proles qñ fiat. 79.40  
 Crabrones ducē habentes in ter-  
 ra nidificant. 79.30  
 Crabrones ubi nidificant. 79.30  
 Crabrones unde uiuant. 135.20  
 Crabronum cubilia. 135.20  
 Crancrorum saxatiliū cibus. 116.1  
 Crangines. 49.20  
 Crea. 15.40. (20)  
 Crex bellū habet cū gulgulo. 134.  
 Crista auiū partim ex pinnis, par-  
 tim ex alia materia. 27.10  
 Crocodilus. 8.1  
 Crocodili quo pacto purgēt den-  
 tes. 137.20  
 Crocodilus fluuiatilis superiorē  
 maxillam mouet. 39.1  
 Crocodili non possunt sine aqua  
 uiuere. 114.40  
 Crocodilus quem Aegyptus fert,  
 linguam non habet. 25.20  
 Crocodili lien. 28.40  
 Crocodilus fluuiatilis noctu in  
 aqua, interdū in terra agit. 25.30  
 Crocodili magnitudo. 83.10  
 Crocodili augeri quandiu uiuat  
 83.10  
 Crocodili quo loco & quor pari-  
 ant oua. 83.1  
 Crocodili fluuiatilis cutis. 25.30  
 Crocodilo quo pacto crura fle-  
 ctantur. 20.10  
 Crocodili latent. 124.10  
 Crocodili intestina. 30.30  
 Crocodilus q̄modo naret. 10.40  
 Crocodili cauda. 10.40  
 Crocodili fluuiatilis oculi. 25.30  
 Crocodili testes. 32.20  
 Crocodili genus innocuū. 133.40  
 Crus. 15.40  
 Crura quomodo flectunt anima-  
 lia. 20.10  
 Crura quadrupedum ossē & ner-  
 uo constant. 21.30  
 Crura hominis. 16.10  
 Crusta intecta omnes sensus ha-  
 bent. 58.30  
 Crusta intecta animalia. 11.20. &  
 49.20  
 Crusta intecta qbus cōueniant cū  
 his quæ sanguinem habēt. 51.20  
 Crusta opera dormiunt. 61.1  
 Crustata hyberno tempore con-  
 duntur. 124.30  
 Crustaceorū cibus. 115.10. & 116.1  
 Crustatum nullum ædit naturale  
 sonum. 50.30 (20)  
 Crustata q̄modo oua foueant. 75  
 Cresta de genitura elephatorum  
 falsa scripta. 47.10  
 Cubitus. 15.30  
 Cuculus saxa petit, ut nidificet.  
 84.1 (59.30)  
 Cuculus piscis uocalis existimat.  
 Cuculi natura & grus eius. 88.20  
 Cuculus quid cōmune cum acci-  
 pitre habeat. 88.20  
 Cucul⁹ in alienos nidos oua sua  
 ædit. 88.30  
 Cuculus immutat colore. 138.20  
 Cuculi fœtus. 144.10  
 Cuculi timiditas. 144.20  
 Cucumere pingues reddūtur su-  
 es. 120.1  
 Cucurbita caput salpa. 116.20  
 Culices unde generentur. 76.30  
 Culex exiit fenestutem. 135.40  
 Culices palustres. 8.10  
 Culicis aculeus. 11.19

Culices uinarij unde nascantur. 77.10  
 Culices quomodo pugnet. 56.10  
 Culices acida petunt. 58.40  
 Culicilega qualis auis sit. 118.1  
 Cuniculi timidi. 9.20  
 Cunilam aues ad uulnera utuntur. 137.30  
 Cunila aduersatur ueneno uiperæ. 137.20  
 Cursores pisces gregales. 8.40  
 Curuca. 117.40  
 Cutis non habet sensum. 41.1  
 Cutis non coit uulnerata. 41.1  
 Cutis constat perpetuo contextu. 41.1  
 Cutem omnia habere quibus est sanguis. 41.1  
 Cutis quibus sit communis. 34.20  
 Curi omnium inest lentor quidam mucosus. 40.40  
 Cymidem quam aue nominent Iones. 140.40  
 Cynoraiffa uocatur ricinus. 82.1  
 Cyprini quoties anno pariant. 93.1  
 Cyprini branchiæ. 27.40  
 Cyprini palatum. 57.20  
 Cyprini morbus. 127.30  
 Cyprinorum generatio tarda. 93.20  
 Cyprini oui magnitudo. 93.20  
 Cyrenensis ager copiam habet cicadarum. 81.20  
 Cytifus auget lac. 46.30  
 Cytifus dum florēt, lacū in cōmōdus. 46.30

## D

Damæ sanguis non concre scit. 38.30  
 Damæ deest fel. 29.1  
 Daquilli quid comedant. 116.20  
 Decretorij dies in morbis. 77.40  
 Delphinus lacte nutrit fœtum iu um. 91.20  
 Delphinus dormiens spirat. 115.1  
 Delphino ubi testes locati sint. 32.20  
 Delphini sagaciter odorant. 58.30  
 Delphino peculiaris natura. 114.40  
 Delphinus felle caret. 29.10  
 Delphini animal generant. 10.20.  
 & 91.10  
 Delphini qua ratione capiantur. 57.30. & 58.30  
 Delphinus in Ponto est. 123.10  
 Delphini ubi habeant fistulā. 10.20  
 Delphinus enām mammam habet. 27.20. & 45.30

## I N D E X.

Delphinorum mores. 157.40  
 Delphini genitale. 22.20  
 Delphinorum celeritas. 158.1  
 Delphini in terrā erūpunt. 158.10  
 Delphino nō sunt auriculæ. 13.40  
 Delphini nomen & Græcis & Latinis usitatum. 3.40  
 Delphinus quo loco cōtineat suas mammas. 27.20  
 Delphini stridor. 59.40  
 Delphinus uocem habet. 60.40  
 Delphini quomō dormiant. 61.20. & 91.20  
 Delphinorum coitus. 65.10  
 Delphinus quot annis ad iustam magnitudinem perueniat. 91.20  
 Delphini q̄ rēpore lateant. 91.20  
 Delphini erga fœtū charitas. 91.30  
 Delphinorū uita est longa. 91.30  
 Delphinus ossa habet. 39.20  
 Delphini quot procreent. 91.10  
 Delphini brachias nō habent. 10.20  
 Demonstratio quibus rebus fiat. 12.10  
 Dentes (serpentum). 31.10  
 Dentes maxillares quando homini nascantur. 24.1  
 Dentes piscium serrati sunt. 23.20. & 27.40  
 Dentes crocodili. 25.30  
 Dentes simia ut homo habet. 24.30  
 Dentium ordo triplex mantichoræ belluæ. 23.20  
 Dentes echinorum. 54.40  
 Dentes canini qui sint. 23.40  
 Dentes maribus plures quā fœminis. 23.40  
 Dentes ossei gingiuis impotiti sunt. 14.20  
 Dentes puerorum. 113.1  
 Dentes scari. 27.40  
 Dentes amulantur ossium naturam. 40.10  
 Dentes equorum. 100.30  
 Dentes canini declarant maxime ætatem equi. 101.30  
 Dentes quibus mutantur. 25.20  
 Dentes asini quos gnomonas uocant. 101.30  
 Dentes qui homini mutant. 23.20  
 Dentes maxillares octogesimo anno creuerūt quibusdam mulieribus. 24.10  
 Dentes elephanto utrinque quatuor, quibus molit. 24.10  
 Dentes alios habent elephanti matres, alios feminas. 24.10  
 Dentes maxillis inhaerent. 39.1  
 Dentes firmissimi. 39.1  
 Dentes priores acuti. 23.20

Dentes interiores plani. 23.20  
 Dentium uarietas. 23.10  
 Dentes utrinque non habent quæ cornua gerunt. 23.10  
 Dentes quibus plures uiuaciora sunt. 23.40  
 Dentes quibus rariores, sunt breuioris uitæ. 23.40  
 Dentes nigri sunt canibus atate prouectis. 23.40  
 Dentes equo cãdidiore redduntur. 23.40  
 Dentes caninos canes mutare. 23.30  
 Dentes nouos enasci prius quā extrudantur ueteres. 23.30  
 Dentes serrati quibus sunt, habent os rescissum. 24.20  
 Dentibus indicat anni canis. 23.30  
 Dentes serrati quibus. 23.10  
 Dentex liroralis piscis. 122.30  
 Dentices gregales sunt. 135.20  
 Dentices quid comedant. 116.20  
 Dentices fel. 29.10  
 Dentis branchiæ. 27.40  
 Dentire incipiunt pueri septimo mense. 112.40  
 Dictamnū capræ sagitta transfixa querūt in Creta insula. 137.10  
 Digni quot aubis sint. 26.30  
 Digitorum partes. 15.30  
 Diogenis Apolloniata de uenis opinio. 34.30  
 Dissimilares partes. 7.1  
 Dissimilariū partiū officia. 10.10  
 Dolentibus iumbis unde mittatur sanguis. 35.20  
 Domicilia sibi parantia. 9.1  
 Dorsum. 15.20  
 Dorsum polypi. 48.1  
 Dorsum piscium. 39.20  
 Dorsum ipineum aut osseum habent sanguine prædita. 39.30  
 Dorsū doloribus unde sanguis mittatur. 35.20  
 Draco q̄ pascio medeat sibi. 137.30  
 Draco diffidet cū aquila. 134.1  
 Duces habentia. 8.40

## E

Echinus uidetur nō habere olfactum. 59.10  
 Echinorū genera. 52.1. & 54.20  
 Echinorum aculei. 11.40  
 Echinis uis ad distillationes urinae. 54.30  
 Echini toti candidi apud toronē. 54.30  
 Echinorum spinæ. 54.30  
 Echini

# I N D E X.

Echini cibo idonei agilius ceteris mouentur.	54.30	Elephas linguam exiguā habet.	100.30
Echinis omnibus oua sunt.	54.30	Elephāti facile māsueſcunt.	9.10
Echinis quiddam nigricans non eſculentum ineſt.	54.40	Elephanti naſus.	20.1
Echinorum caput.	54.30	Elephantum natura.	9.30
Echinorū excrementi oſiū.	54.30	Elephantorum morbus.	128.40
Echinis quando ſit copia ouorū.	68.40	Elephantus ſcēmina quo etatis anno coire incipiat.	71.10
Echini quādo meliores ſint.	68.40	Elephantus mas quando inire incipiat.	71.10
Echinis ſunt quini dentes.	54.40	Elephas quantum ſcētum ædat.	71.20
Echinis quid ſit proprium.	54.20	Elephas ſingulos parit.	71.20
Echinis nulla eſt caro.	55.1	Elephantus grauidam non tangit.	71.20
Echinis ſtella nocet.	72.40	Elephāto nō ſunt ungues.	40.20
Echinorum corpus.	55.1	Elephanti digiti & crura.	19.40
Echini quo pacto ſpinis utantur.	55.1	Elephanti iuniores & ſeniores capiuntur.	135.20
Echinometra.	54.20	Encauli ſue (ut alij uolunt) encraſicholi unde generent.	94.20
Elapho monte ſunt ceruæ ſciſſa aure.	103.20	ἐπαμφοτεſβύη, id eſt, uitā degit ambiguum.	127.1
Elegini gregales ſunt.	135.20	Ephemerum animal.	77.30
Elephas q̄ habitu quieſcat.	20.10	Ephemerum quot notis ſe moueat.	11.20
Elephanti mamme.	20.10. & 22.10	ἐπιγλωττίδα nō habet quæ oua pariunt.	27.0
Elephāti pugnat inter ſe.	135.1	Epiroticæ uacæ lactis abundantes.	46.40
Elephanti inter ſe diſſerunt multum.	135.10	Epirus gignit magnas quadrupedes.	46.30
Elephantorum uenatio.	135.10	Epiragæ piſces.	62.10
Elephantorū coitus.	64.20. & 102.40	Equæ libidine concitate in quâ cœli partem currant.	96.30
Elephantis naſus.	14.10	Equæ incenduntur libidine.	96.30
Elephantis diſciplina.	53.30	Equæ lac.	45.40
Elephanti ubi habeant teſtes.	32.20	Equa ſecundas deuorat.	101.20
Elephanti inteſtina.	30.30	Equa regis Scytharum.	157.30
Elephantorum ſemineſ genitale.	22.30	Eguas euentari.	96.30
Elephas quandiu uterum ferat.	71.20. & 102.40	Equæ purgatio poſt partū.	92.20
Elephanti pullus.	102.40	Equæ indicium ſuæ libidinis præſtant.	97.1
Elephanto iecur ſine felle.	29.1	Equa grauida marē parit.	109.30
Elephantorum cura in uariis caſibus.	130.10	Equa facile parit.	92.20
Elephantorum morbi.	130.1	Equarum libido quomodo extinguitur.	97.1
Elephanti etiam lapides deuorant.	130.10	Equi feminas ſuas norūt.	97.10
Elephantus minime hirtus.	21.10	Equarum cōceptus indicium.	92.30
Elephanti genitale.	22.30	Equa ſtans emittit partū.	100.40
Elephanti ad coitū efferat.	96.30	Equorum uitæ ſpaciū.	100.40
Elephantus qualem uocē ædat.	60.40	Equis quādiu augeatur.	101.1
Elephanti ingenium.	157.10	Equarum ſocietas.	136.10
Elephantorum atas.	157.20	Equarū ergo pullos amor.	136.10
Elephanti paſtus.	120.40	Equicerui cornua.	21.10
Elephanti porus.	120.40	Equicerui barba.	21.1
Elephanti uitæ ſpaciū.	120.40	Equicerui magnitudo.	21.1
Elephantis nomē uſitatum utriusque lingue.	3.40	Equiceruus ubi gignatur.	21.1
Elephanti extra.	30.30	Equi ſeniores ſcēcundiores ſunt.	100.30
Elephantus ſtatim dentes habet aditus.	24.10		
		Equi fluuiatilis os.	24.20
		Equi fluuiatilis pes.	21.30
		Equus fluuiatilis qualis.	24.20
		Equi fluuiatilis uox.	24.20
		Equi fluuiatiles aqua carere non poſſunt.	114.40. & 129.40
		Equi matri ſimiles mammæ habent.	22.20
		Equi dentes in ſenectute.	23.40
		Equi amant aquam turbulentā.	120.30
		Equorum natura non eſt ſtabilis.	101.30
		Equorum morbi.	129.10
		Equi quibꝰ paſcuis letent.	129.40
		Equi etiam ſomniant.	60.40
		Equorum oculi uariant interdū colorem.	13.20
		Equi dentes.	23.10. & 100.20
		Equi pes.	21.30
		Equorum uox.	69.40
		Equorum uilli.	20.40
		Equis apud Opunta annorum quadraginta ponit coire.	101.1
		Equos tot morbis quot homines infeſtari.	129.30
		Equos quæ animalcula necent.	129.30
		Equis quādo coire incipiat.	70.20. & 100.1
		Equa quādiu ferat uterū.	100.20
		Equis animal ſalaciſſimū.	100.20
		Equis ſorbendo bibit.	119.40
		Equi etiam cani ſunt.	41.1
		Equi quando ſanguine detraſio inueniuntur.	129.10
		Equis quādo ſit in uigore.	101.1
		Equis balneum amat.	129.40
		Equorum abus.	120.30
		Equæ quādiu generare utiliter poſſunt.	70.20
		Equis quādiu uiuat.	70.20
		Equis non habet fel.	29.1
		Equire.	96.30
		Equis ſolis uere tantū parit.	68.1
		Erica piſcis uocalis habitus.	59.30
		Erica quoties anno pariat.	93.1
		Erithaca.	79.10
		Eruca ſauis nocent.	130.20
		Eruca unde naſcantur.	76.1
		Eruca ſunt cicindela.	76.30
		Eruum augeſt lac.	46.30
		Eruum pręgnantibus non prodeſt.	46.30
		Eruo boues pingues redduntur.	120.10
		Etelis piſcis oua parit.	92.1
		Europæ animalia ſortiora.	131.20

Exanguia quæ sint. 10.10  
Excrementa communia animalibus sunt. 34.20  
Excrementi ostium testaceorum. 53.30  
Excrementum duplex. 9.40  
Exemplorum uis. 5.1.

## F

**F**aba & fabarum herba bo-  
ues pinguescunt. 120.1  
Fabæ lactis copiâ faciunt. 46.40  
Facies quæ pars sit in homine. 12.30  
Facies partes. 12.30  
Falcula auis pennis plurimum ua-  
let. 8.3  
Farrago quando utilis iumentis. 120.30  
Fasiana pulueratrix est. 159.10  
Fauaginem quâ nominent. 71.20  
Fauces. 14.10  
Fauum conficiunt primo apes. 78.30  
Fauis quid noceat. 130.20  
Fauos è floribus contrahunt. 78.40  
Fauos extruunt cælis sexangu-  
lis. 79.30  
Fauis crabronum. 79.30  
Feles quomodo coeant. 64.20  
Fellum femine libidinosæ sunt. 64.20  
Felis partus. 104.40  
Felinon est delphino. 29.10  
Fel quo loco in piscibus positum  
sit. 20.10  
Fel serpentum. 31.1  
Fel quibus animalibus non sit. 18.30. & 18.40  
Fel ubi ad miraculum usq; grâde. 18.30  
Fel in aibus quem locum for-  
tium sit. 29.20  
Fellis locus in animalibus. 28.40  
Femur. 14.40. & 15.40  
Femoris uenæ. 34.40  
Femora. 39.10  
Femora hominis carnosâ. 21.30  
Fere quæ perpetuo sint. 9.10  
Fiber ex aqua uictum quatit. 119.30  
Fibra in animalibus. 10.10  
Fibræ quædam saniem continent. 38.30  
Fibrarum natura. 38.30  
Fibræ tendunt à neruis ad uenas. 38.30  
Fibræ in sanguine. 38.30  
Fibra omnibus cõmunis. 34.20

## I N D E X.

Fibula à spina oritur. 39.1  
Ficarij culices unde generentur. 82.40  
Ficedula. 117.40  
Ficulno succo lac cogitur. 46.10  
Ficu pinguis fit fus. 120.1  
& 128.30  
Fidiculæ appendices. 31.20  
Fimbra auriculæ pars inferior. 13.30  
Fistula quibus fit. 10.20  
Flores purpurarum. 72.1  
Florus odit equum. 134.30  
Florus, spinus, ægithus odiū in-  
ter se exercent. 135.1  
Fluore alui laborant elephantia. 130.10  
Femina. 9.40  
Femina in marem facile muta-  
tur. 115.20  
Femina in sinistro latere mouet. 108.10  
Femina tractabiliores maribus  
sunt. 133.10  
Femina minus sunt animosæ. 133.20  
Feminarum genitalia. 32.10  
Feminis sanguis nigrior. 44.40  
Feminae malitiosiores maribus  
sunt. 133.20  
Feminae ualidiores habent infe-  
riores partes. 62.30  
Femina mare infirmior. 62.30  
Feminae caro humidior quàm  
maris. 62.30  
Feminae acutiores uocem ha-  
bent. 69.40  
Feminae ferociunt à partu. 96.10  
Feminae maiores euadunt quàm  
mares in quibusdâ animalibus. 62.20  
Feminae quomodo mingant. 22.30  
Fetus quomodo se moueat. 111.40  
Fetus iam editus quomodo cu-  
randus. 112.20  
Fetus quando in utero mouea-  
tur. 108.10  
Fetus pcedit in pariendo aqua. 112.10  
Fetum quædam similia habere  
cum parente. 110.40  
Fetum in utero læsum metachæ-  
rum uocant. 98.1  
Formicæ. 47.30  
Formica ciuilis est. 8.40  
Formica sibi domum facit. 9.1  
Formicarum labores. 5.10  
Formicarum coitus & partus. 80.1

Formicæ quâdo nascantur. 67.20  
& 80.10  
Formicæ origani puluere fugiunt. 58.40  
Formicarum ingenium. 149.10  
Fratrare quid sit. 106.1  
Frigus mutat pennas auiū. 42.10  
Fringillarius accipiter. 117.20  
Fringillago. 117.30  
Fringillæ cibus. 117.30  
Frons quæ sit pars hominis. 12.30  
Frons indicat mentem. 12.40  
Frōs magna segnē indicat. 12.40  
Frons in homine parua mobilē  
significat. 12.40  
Frons lata mentē mobilē indicat. 12.40  
Frons rotunda iracundum ar-  
guit. 12.40  
Frugilega. 117.40  
Fucæ cibus. 116.40  
Fuca piscis mutat colorē. 132.20  
Fuca sola inter pisces nidificat. 132.20  
Fucæ pusillæ bis pariunt anno. 92.20  
Fucis ut apes pennas erodant,  
quo pacto efficiendum sit. 79.20  
Fuci unde proueniant. 78.10  
Fuci carent aculeo. 78.20  
Fuci quid agant in aluearijs. 150.30  
Fulica ubi uictetur. 118.20  
Fulicarum aucupatio. 146.20  
Fullo ubi pariat. 93.30  
Fulloni pennæ uagina includæ. 55.40  
Fusaneis pisces. 67.30  
Fusanei quando optimi. 123.30  
Fusaneis quies noctu est. 123.20  
Fuscina qui pisces capiant. 61.20

## G

**G**aladæ conchæ. 52.10  
Galem Græci mustelam uo-  
cant. 4.1  
Galerita. 143.30  
Galgul? cū Lybio pugnat. 134.10  
Galguli auis magnitudo et color. 118.1  
Gallerucæ unde oriantur. 77.1  
Gallerucæ pennæ uagina includit. 55.40  
Galli post uictoriam canūt. 60.20  
Gallinago qualis sit. 143.40  
Gallinago nidificat humi. 139.30  
Gallinæ ouum à coitu decem die-  
bus perficiunt. 85.20  
Gallinæ nonnullæ bis pariūt. 83.40  
Gallina pulueratrix est. 159.10  
Gallina

# I N D E X.

Gallinæ ferme omnibus anni temporibus pariunt. 69.10  
 Gallinæ quot diebus fœtum excludant. 84.40  
 Gallinarum iuuentæ fœcundiores sunt ueteribus. 85.20  
 Gallinæ quo pacto coëant. 64.10  
 Gallinarum generosarum fœcunditas. 83.30  
 Gallinæ hadrianæ. 83.30  
 Gallinaceus qualem cristam fortitus sit. 27.10  
 Gallinacei quomodo castrantur. 159.20  
 Gallinacei libidinosi. 9.10  
 Gallinacei ingluuiæ. 31.20  
 Gallinacei appendix. 31.40  
 Gallis maribus iolis in suo genere cantus est datus. 60.20  
 Gammarus. 49.20  
 Gammarum quando exuantur senectute. 126.1  
 Gammarorum genus crusta refectum. 11.30  
 Gammarorum coitus. 66.10  
 Gammarum ubi proueniant. 74.20  
 Gammarum qua ratione capiantur 58.40  
 Gammarorum intestinum. 50.40  
 Gammarum color. 50.1  
 Gavia alba aquas amat. 118.20  
 Gaviæ quot oua pariant. 67.20  
 Gaviæ gula. 31.30  
 Gavia unde petat cibum. 118.10  
 Gavia ab harpa diffidet. 134.10  
 Gaviæ magna ex parte similes sunt. 111.1  
 Genæ nō possunt coalescere. 15.1  
 Generandi ratio. 110.20  
 Generationes animalium uariæ. 63.10  
 Generosum quod sit. 9.20  
 Genitale membrum. 19.10  
 Genitalis mēbri foramina. 19.10  
 Genitale marium. 22.20  
 Genitale quomodo formetur in utero. 111.10  
 Genitale membrū mulieris quale 15.10  
 Genitalia fimiæ. 25.10  
 Genitale cicadæ. 81.10  
 Genitale cameli. 64.20  
 Genitalis differentia munerosa est. 22.30  
 Genitale hominis carnosum carnaginosumq; est. 22.30  
 Genitale neruosum quibus sit. 22.40  
 Genitalium meatus pisciū. 27.20

Genitale & testes quæ contineant conditos. 25.30  
 Genitale osseum quibus sit. 22.40  
 Genu. 16.1  
 Gibbæ. 49.20  
 Gibber. 15.30  
 Gingiæ carne constant. 14.20  
 Ginni, quos uocant, ex equa prodeunt. 102.20  
 Gladius piscis unde dictus. 27.40  
 Gladij pisces a silo agitant. 127.10  
 Gladiolum. 43.40  
 Glandes animalcula testacea ubi generentur. 72.30  
 Glande recte saginanti fues. 120.1  
 Glandes carnem humidam faciunt in suis. 128.40  
 Glaucus quando sit melior. 132.20  
 Glaucus ætate later etiam. 124.40  
 Glauci appendices. 31.20  
 Glires in arboribus latendo pingues fiunt. 125.30  
 Glutinum ex qua re fiat. 40.40  
 Gobio litoralis est piscis. 122.40  
 Gobionis appendices. 31.20  
 Gobiones ubi pariant. 92.20  
 Gobionis cibus. 116.40  
 Gobiones gregales sunt. 135.20  
 Gobiones gaudent fluuijs. 126.30  
 Gobionaria apua. 94.20  
 Graculus piscis parit autumnus. 95.20  
 Graculi gregales sunt. 135.20  
 Grandines suum tolluntur tipha 128.30  
 Grandinosi quomodo cognoscantur. 128.30  
 Grus animal ciuile. 8.40  
 Gruæ quomodo uolent. 122.10  
 Gruæ nō tenere lapidem, ut qui dam putant. 122.10  
 Gruæ nigrescunt in senectute. 42.10  
 Gruæ quod se conferant. 121.40  
 Gruæ ubi pugnent cū pigmæis. 121.40  
 Gruæ inter se pugnant. 141.1  
 Gruæ quot oua pariant. 141.1  
 Gruæ gregales sunt. 8.40  
 & 122.20  
 Gruæ stāte fœmina coëunt. 64.10  
 Gruum prudentia. 140.1  
 Gruum dux uigilat. 140.1  
 Gula. 17.1  
 Gula serpentum longa est. 30.40  
 Gula uiuiparis omnib; est. 28.30  
 Gula ad uentrem tendit. 30.1  
 Gula crusta intestorum. 51.30  
 Gula non omnibus similis. 28.30

Gula finit in uentriculum. 17.30  
 Gula colli pars. 14.30  
 Gulam pauci pisces habent. 29.30  
 Gustus hominis. 16.20  
 Guttur colli pars. 14.30

## H

Adrianæ gallinæ quotidie pariunt. 83.30  
 Halictus. 145.10  
 Halosachna. 141.30  
 Hamæ pisces gregales. 8.40  
 Hamæ sel. 29.10  
 Heracleoticæ cancri. 49.20  
 Hercules quomodo procreatus sit. 109.40  
 Hercules laus. 4.10  
 Hercules unam tantum fœminā genuit. 110.30  
 Herinacei testes. 32.20  
 Herinacei quales pilos habeant. 11.40. & 40.40  
 Herinaceorum solertia. 137.30  
 Herinaceorum coitus. 64.10  
 Herodorus Brysonis rhetoris pater. 87.40  
 Hesiodus nesciuit aquilam non aut certe raro bibere. 126.10  
 Hiarula omnis grauida capitur. 92.10  
 Hiarula in alto est. 122.40  
 Hiarulæ carne uescuntur sola. 116.20  
 Hiarulæ uenter sæpe procidit. 116.30  
 Hiarularum genus piscium. 62.20  
 Hinnuli coagulum laudanissimū. 46.20  
 Hippardium capronas gerit. 21.1  
 Hippeas quosdam cancores appellat. 49.30  
 Hippelaphus iubam habet. 21.1  
 Hippelaphus unde dictus. 21.1  
 Hippomanes. 96.40  
 Hippomanes adheret nascentis pulli fronti. 101.20  
 Hippurus piscis abscondit. 124.10  
 Hircescere uites. 70.30  
 Hirsi pingues minus sunt fœcundi 70.30  
 Hirsi tempore coitus ferociunt. 96.20  
 Hirundo bis anno parit. 69.1  
 Hirundo bis anno nidificat. 87.40  
 Hirundinis pullorū oculi. 87.40  
 Hirundines maris frigidit. 59.40  
 Hirundo etiam carne uescitur. 117.30

# I N D E X.

Hirundinem pennas mutare frigore.	42.10	Hominis ætas ad coitū apta	69.30	Imbrium tempore multa animalium in mari uidentur.	124.40
Hirundinis fellis locus.	29.20	Hominis genitale.	22.20	India producit mantichorā.	23.20
Hirundinum nidi.	84.1	Hominis partium situs.	16.10	India habet paruū serpentem,	
Hirundinis ingenium.	138.1	Hominis cerebrum.	16.30	cuius remedium ignorat.	132.1
Hirundinum oculi.	31.10	Hordeatio morbus equorum.	129.20	Indiam suam non habere.	130.40
Hirundinum uentriculus.	31.30	Hordeo pinguescit fus.	120.1	Infans iam natus uocem emit.	
Hirundines quō secedant.	125.1	Humerarius neruus.	38.10	Ingluuius auium.	31.20
Hirundo magis pennis quā pedibus ualet.	8.30	Humerorum ossa scapulæ uocantur.	39.10	Ingluuius qualis sit.	31.20
Homo plurimum seminis genitalis emit.	47.1	Humor est omnibus animalibus.	10.1	Inguen.	15.10
Homo mas quādiu generare possit.	70.30	Hyænæ natura.	104.10	Innum, pcreari ex mulo & equa.	102.10
Homo femina quādiu parere possit.	70.30	Hyænæ genitalia.	104.1	Insecta.	47.30
Homo superiorem partem habet minorem.	22.40	Hyænæ molitur homini insidias.	119.10	Insecta impennata.	47.30
Homo quādo somnare incipiat.	61.30	Hyemis & imbrium signū.	100.10	Insecta latent.	124.1
Homo omnes sensus habet.	57.1	Hypanis fluuii quadrupes uolucres fert.	77.20	Insecta plurima q̄ pacto nascantur.	63.20. & 75.40
Homo animal ciuile.	8.40	Hypanemia oua.	84.30	Insecta quo pacto coeant.	66.30
Homo solus faciem habet.	12.30	Hypenemia quæ uocentur.	63.30	Insecta etiam dormire.	61.30
Homo quid cum animalibus habeat commune.	113.40	Hypocondrium.	14.40	Insecta senectutem etiam exuunt.	125.40
Homo solus aurem non mouet.	13.40	Hyrix later.	103.40	Insecta procul sentiunt.	58.30
Homo solus ambidexter.	20.1	Cyfrices conduntur certo tempore.	125.20	Insectorum feminæ maiores euadunt quā mares.	62.20
Homo qualis.	16.10	Hyfrices quales pedes gerant.	11.40	Insecta uermem pariunt.	75.30
Hominis os.	24.20			Insecta quando potissimum ualeant.	130.10
Hominis salua contra uenenosos ictus facit.	132.1			Insecta pereunt oleo.	130.20
Homo aliter quā quadrupes obinet pilum.	24.30			Insectorum genera plura.	55.40
Homo quid peculiariter habeat.	9.30			Insecta aculeos habent.	56.10
Homine prorsus extenuato mulæ uenę uidentur, quæ nō possunt in mortuis uideri.	34.30			Insectorum sonus.	59.20
Homini maxillares dentes quando nascantur.	24.1			Insecta quæ saluiunt.	56.20
Hominis uenter.	30.20			Insecta quid pro carne habeant.	56.20
Hominis quot notis moueantur.	11.1			Insectorum intestinum.	56.30
Hominis partes.	12.20			Insecta pennata.	47.30. & 56.10
Hominis cutis est tenuissima.	40.40			Insecta membranis uolant.	11.1
Hominis pili.	20.40			Insectorum partes.	55.40
Hominis semen genitale quando incipit.	105.40			Insecta diuulsa etiam uiuere possunt.	56.1
Hominis uenæ crassiores.	18.20			Insectorum discrimen in sexu.	62.10
Hominis gressus.	23.1			Insectorum oculi.	56.1
Hominis natura anceps est.	8.40			Insectorum partes sensoriæ.	56.1
Hominis testes.	32.20			Insectorum passio.	121.20
Hominis proprium est loqui.	60.20			Insecta intereunt sulphuris odore.	58.40
Hominis sterco contra uenenuū ualet.	137.10			Insectorum generationis tempus.	77.40
Hominis partes exteriores.	16.20			Insecta fugantur suffitu cornu ceruini.	58.40
				Insecta quo tempore coeant.	67.20
				Insectorum mutationes in figuras quot diebus perficiantur.	77.40
				Insecta quo pacto intereat.	78.1
				Insecta quæ sint.	8.10
				Insecto	



# I N D - E X .

Insectorum ingenium. 149. 1  
 Internodium digitorum. 15. 30  
 Intestinum simplex. 17. 30  
 Intestina elephantini sinuosa sunt. 40. 30  
 Intestinorum discrimina. 30. 20  
 Intestina maiora quæ habeant. 30. 30  
 Intestinum rectum quibus sit. 30. 30  
 Inuidorum supercilia. 12. 40  
 Iubara animalia. 20. 40  
 Iugale à spina oritur. 39. 1  
 Iuxta alicula quid peculiariter habeat, qualisq. sit. 26. 30  
 Iugulum. 15. 10  
 Iuli. 47. 30  
 Iulæ gregales sunt. 135. 20  
 Iumenta quæ nominemus. 12. 1  
 Iumenta potu pinguescunt. 120. 30  
 Iumenta quo pacto incrementa capiant. 23. 1  
 Iuuentæ quæ ratione augentur. 120. 20

## L

**L**abeo quando coeat. 95. 10  
 Labeones quando pariat. 68. 10  
 Labra quæ sint. 14. 10  
 Lac quando definat. 113. 10  
 Lac quid in se contineat. 45. 30  
 Lac cameli. 102. 40  
 Lac mulieris quædò utile sit. 110. 10  
 Lac in maribus non gignitur. 45. 40  
 Lac in mulierum mammis. 113. 1  
 Lac quando utile. 100. 1  
 Lac qua re cogatur. 46. 10  
 Lac quorū sit caseo inutile. 46. 10  
 Lac extinguit quoddam genus pabuli. 46. 30  
 Lac cameli. 45. 40  
 Lac equæ. 45. 40  
 Lac asinæ. 45. 40  
 Lac tenue & crassum. 45. 30  
 Lac quod plus contineat casei. 45. 30  
 Lac eorum quæ non utriusq. dentata sunt coit. 45. 30  
 Lac leporinum. 104. 30  
 Lac in uiris quibusdam effectum. 14. 30. & 46. 1  
 Lacti inest pinguedo. 46. 1  
 Lac caprinum miscere quosdam ouillo. 46. 1  
 Lac quod potissimum spissetur. 46. 1  
 Lac bubulum crassissimū. 45. 40  
 Lac non coit frigore. 45. 40

Lacigne spissatur. 45. 40  
 Lac quando fiat in animalibus. 45. 40  
 Lac quod sit utile. 45. 40. & 46. 40  
 Lac aliquando edulij quibusdā efficitur. 45. 40  
 Lac quo pacto in capris quæ non pariunt, fiat. 45. 40  
 Lac quando utile. 97. 40  
 Lac mulierum quod sit optimū. 46. 40  
 Lac melius habent fusca quam candida. 46. 40  
 Lac quale infantibus salubrius. 46. 40  
 Lac in oibus animalibus in mammis est. 45. 20  
 Lactis copia quibusdā. 46. 1  
 Lac ad caseos aptum. 46. 10  
 Lactis copiarū indicium. 46. 40  
 Lac diu durat, si non coeant animalia. 46. 40  
 Lactis copiam habent edaciora. 46. 30  
 Lactes. 17. 30  
 Laceræ lien. 28. 40  
 Laceræ uulua. 33. 30  
 Laceræ crura. 20. 10  
 Laceræ chameleo simile animal. 25. 30  
 Laceræ quo pacto conuiueant. 26. 40  
 Laceræ ubi pariant oua. 83. 1  
 Lacerarum coitus. 64. 40  
 Laceri uenter intestinaq. 30. 30  
 Laceri gregales sunt. 135. 20  
 Lacerus agilis. 15. 30  
 Laceris quales testes sunt. 32. 20  
 Lacerus latendo exiit senectam. 125. 30  
 Laceri Arabiæ. 131. 10  
 Laceri neruorum frequentia præditi sunt. 38. 20  
 Laceri quot pedes habeant. 10. 30  
 Laceris caudæ amputatæ renascuntur. 51. 10  
 Laceri quandiu lateant. 124. 10  
 Laceri cauernas subeunt. 9. 1  
 Lamiæ ex cartilagineis. 65. 10  
 Laceri serpens. 131. 40  
 Latax. 8. 1  
 Latax gaudet fluminibus. 119. 30  
 Lataxis pilus. 119. 30  
 Latina lingua an à Græca superetur. 4. 1  
 Leana à Leone quid differat. 104. 10  
 Leana mammæ. 22. 20  
 Leguminum uermibus sunt ani

malia pennata. 77. 1  
 Lendes à quibus generentur. 81. 40  
 Leo quomodo mingat. 22. 30  
 Leonis ungues. 40. 20  
 Leonum gressus. 20. 30  
 Leonum mores. 9. 20. & 156. 1  
 Leonis fortitudo. 5. 10  
 Leo & lupus ceruarius inimici sunt. 135. 1  
 Leo constat ossibus solidissimis. 39. 20  
 Leo quot canulos pariat. 104. 1  
 Leo quibus locis nascatur. 104. 1  
 Leo quos dentes mutet. 104. 10  
 Leonis ossa uidentur nullam habere medullam. 39. 20  
 Leones quo pacto coeant. 64. 1  
 Leoni quid loco tali sit. 21. 40  
 Leonis uenter. 30. 20  
 Leoni corpus hirtum. 20. 40  
 Leoni sunt dentes serrati. 23. 10  
 Leonis edendi modus. 119. 20  
 Leo in ediam diu perferre potest. 119. 20  
 Leo raro excrementum emittit. 119. 30  
 Leonis alui status. 119. 30  
 Leonis urina. 119. 30  
 Leonis interiora grauiter olent. 119. 30  
 Leo ignem timeret. 156. 10  
 Leonum aras. 156. 20  
 Leonum genera. 156. 20  
 Leonis pes. 21. 30  
 Leones coitu efferrantur. 96. 20  
 Leonis ceruix osse rigida constat. 19. 30  
 Leonis os. 24. 20  
 Lepus acetabula habet uulua. 34. 10  
 Lepus quo pacto mingat. 22. 30  
 Lepus habet coagulum. 46. 20  
 Lepores quo pacto coeant. 64. 1  
 Lepores superferant. 104. 20  
 Leporis lac. 99. 1  
 Lepores Aegypti. 131. 1  
 Leporis coagulum medetur p-fluui alui. 46. 20  
 Leporum genus quoddam uidetur habere bina iecora. 29. 40  
 Leporum femina marem saepe in coitu superuenit. 64. 1  
 Leporum sanguis quomodo con crescat. 38. 30  
 Lepores timidi. 9. 20  
 Lepores superferant. 67. 30  
 Leuiraia quo loco habeat fel. 29. 10

# I N D E X.

Libellæ fel.	29. 10	Literarium studium.	1. 20	Locustarum nomina.	4. 1
Libidinosis quidam pili celerius sese promunt, quidam maturius desuunt.	41. 40	Liua columba.	69. 10	Locustæ moriuntur metu poly-	116. 1
Librorum Aristotelis de animalibus ordo.	3. 10	Liuiæ discendunt.	122. 10	porum.	116. 1
Lienem in dextro latere inuenire, prodigiosum est.	29. 40	Loca in mores animalium uim habent.	131. 40	Locustis data est uita diuturna.	74. 30
Lien uenæ annexus est.	18. 40	Loca plurimum tenent uirium ad plantas & animantia.	68. 20	Locustarum genus.	47. 30
Lien quibus fit exiguus.	28. 40	Locellorum appellatio.	33. 20	Locutio quid sit.	59. 20
Lien quibus fit.	28. 40	Locusta.	49. 20	Locutio hominum uaria.	60. 30
Lien serpentibus exiguus est.	31. 1	Locustæ quo pacto sonant.	59. 30	Lolligo.	10. 40
Lien elephantis.	30. 30. & 29. 40	Locusta marina caret sanguine.	10. 10	Lolligo mas à femina quid differat.	75. 30
Lienis situs.	18. 30	Locusta mas à femina quid differat.	49. 40	Lolligini uita est breuis.	75. 30
Lien hominis suillo similis est.	18. 30	Locustarum oculi.	50. 1	Lolliginum coitus.	66. 1
Lienaria uena.	34. 40	Locustæ optimæ sunt grauidæ.	132. 10	Lolligines ubi pariant.	75. 20
Ligula.	17. 10	Locustæ unde generentur.	75. 40	Lolligines piscibus uestuntur.	116. 10
Ligula linguae pars.	14. 20	Locustarum corpus asperum est.	50. 30	Lolligines quomodo capiant cibos.	47. 40
Ligurini alimentum.	117. 40	Locustæ nare possunt.	8. 20	Lollij quo pacto cibum capiant.	47. 40
Ligurini uoce ualent.	142. 20	Locustæ dormiunt.	61. 1	Lollius quid à lolligine differat.	48. 20
Limaces quomodo lateant.	123. 40	Locustarum genus crusta tectum.	11. 30	Lollij gregales sunt.	135. 20
Limariæ ubi pariant.	68. 1	Locustarum uulua.	51. 1	Lollius lolligine grandior.	48. 10
Limariæ gregatim ambulant.	135. 20	Locustæ pugna solers cū serpente.	137. 30	Lolliorum os, cerebellū & oculi.	48. 20
Limariæ quoties pariant.	67. 30	Locustarum dentes & caruncula pro lingua.	50. 30	Loqui proprium hominis.	60. 20
Limariarum uita.	95. 30	Locustarum pedes.	49. 30	Lumbi.	15. 20
Limosæ pisces gregales.	8. 40	Locustæ quibus locis proueniāt.	74. 20	Lumbis dolentes uix parturiunt.	112. 1
Limus producit testacea.	72. 20	Locustæ quando exuant fenestratem.	126. 1	Lumbrici unde generentur.	76. 1
Lingua elephantis exigua est.	24. 10	Locustæ exuuntur crusta sua per uer.	74. 30	Lumbricorum genera.	76. 1
Linguae color uarius est, quibus sunt uarij pili.	41. 40	Locustarum ouum.	74. 1	Lumbricum latum quo iudicio medici inesse deprehendāt.	76. 1
Lingua uiruli marini bifida.	31. 1	Locustarum coitus.	66. 10	Lupus inimicus est asino.	134. 20
Lingua piscium.	28. 1	Locustarum mares minores sunt quam feminae.	80. 30	Lupus ceruarius.	30. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ ubi pariant.	80. 30	Lupi canarij partus.	104. 40
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustarum uermes.	80. 40	Luporum mores.	9. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ in fine ueris pariunt.	80. 40	Lupi ceruarij partus.	104. 40
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ quo casu pereant.	80. 40	Lupus piscis oua parit.	92. 1
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustarum oua per hyemem durant.	80. 40	Lupi quo pacto coeant.	64. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ maiores pisces conuincere possunt.	116. 1	Lupus liquide audit.	58. 10
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustarum intestinum.	50. 40	Lupi carne uestuntur tantum.	116. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustarum cubilia & cibus.	116. 1	Tupus piscis melior est cum non fert uterum.	132. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ incestus.	116. 10	Lupi pisces ubi pariant.	68. 1
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ quomodo pugnent.	116. 10	Lupi faciunt coitus tempore.	96. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustarum collegium.	116. 10	Lupus perpetuo ferus.	9. 10
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ quo pacto generent.	74. 1	Lupi pisces quomodo capiantur.	61. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40	Locustæ oua quādiu in utero gerant.	74. 1	Lupi genitale.	22. 40
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40			Lupus quando pariat.	68. 10
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40			Lupi ubi cum canibus coeant.	131. 20
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40			Lupus piscis bis in anno parit.	67. 30
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40			Lupi Aegypti.	131. 1
Linguae loco echinis est quadam caruncula.	45. 40			Luporum	

# I N D E X.

- Luporum cibus terra etiam est. 119.10  
 Lupi quando comedant herbas. 119.10  
 Lupi qui hominem petāt. 119.10  
 Lup⁹ quot pinnas habeat. 10.40  
 Luporum partus. 104.40  
 Luscinia quando canat. 158.40  
 Luscinia pullos suos modulus docet. 60.30  
 Luscinia quor oua pariat. 67.20  
 Luscinia quandiu condatur. 67.20  
 Lusciniæ canrus. 5.20  
 Lusciniæ & mares & fœminæ canunt. 60.20  
 Lutea auis unde dicta sit. 141.20  
 Luteæ nidus. 141.20  
 Luteolæ cibus. 117.30  
 Lutris. 8.1  
 Lutris unde uictum quæritet. 119.30  
 Lycurgus in condendis legibus belli maiorem quàm pacis rationem habuit. 1.1  
 Λυμναῖον τὸ αὐτὸ, id est liguriunt. 127.10  
 Lymphari equum quid sit. 129.20  
 Lynx ex auresio mingit. 22.30  
 Lynx fœminalium habet. 21.40  
 Lynces auresi coeunt. 64.17  
 Lyra piscis uocalis existimatur. 59.30
- M**  
 Aena uterum ferens melior est. 132.10  
 Maie exuunt fenesturam. 126.1  
 Malia afinorum morbus. 130.1  
 Malleoli hominis. 16.10  
 Malleolus pars pedum. 39.10  
 Malleoli pars calcar est. 39.10  
 Mammæ. 14.30  
 Mammæ ursæ habet quaternas. 22.10  
 Mammæ uarias habet animalia. 22.10  
 Mammæ elephantis. 22.10  
 Mammæ hominis. 20.1. & 22.10  
 Mammæ quæ animalia non habent. 25.30. & 27.10  
 Mammæ cameli. 22.20  
 Mammæ uirorum. 106.30  
 Mammæ quibus datæ sint. 45.30  
 Mammis carent oua parientia. 45.30  
 Mammæ delphini. 27.20  
 Mammæ puellarum uariæ. 106.30  
 Mammis declaratur ætas ad coitum matura. 69.30  
 Mammæ in uentre quibus. 22.20  
 Mandibula maxillæ pars. 14.20  
 Mantichoræ descriptio. 23.20  
 Mantichoræ dentium ordo. 25.20  
 Manus. 15.30  
 Manus multis continentur neruis. 38.20  
 Manus partes. 15.30  
 Mare habet dulcem humorem. 115.30  
 Mare tempore canis eueritur. 124.40  
 Mare mira habet animalia. 56.40  
 Mares tempore coitus ferociunt. 96.10  
 Mares à fœminis segregantur. 97.10  
 Mares dentes plures quàm fœminæ habent. 23.40  
 Mares magis quàm fœminæ habent has partes quas ceu arma natura animalibus dedit. 62.30  
 Mares habent superiores partes ualidiores. 62.20  
 Mares longioris uitæ quàm fœminæ sunt. 62.20  
 Marinarum animalium diuisio. 9.20  
 Mariscæ unde fiant. 44.40  
 Marra mustela. 3.40  
 Mas. 9.40  
 Mas in fœminā facile mutari potest. 115.20  
 Masculus in dextro latere mouetur. 108.10  
 Matrix est ostium uulvæ. 33.20  
 Matricis auis forma. 122.20  
 Maxilla duplex. 14.10  
 Maxillæ quibusdā pilis integuntur. 41.40  
 Maxillæ ossa. 39.1  
 Maxillam inferiorem animalia omnia mouent, excepto crocodilo. 39.1  
 Maxillares dentes quando homini nascantur. 24.1  
 Maxillares nullum animal mutat. 33.30  
 Medica herba. 120.30  
 Medica extinguit lac. 46.30  
 Medicina exempla unde peti possunt. 5.30  
 Medullam sensu carere. 44.10  
 Medullæ ratio. 45.10  
 Medullæ uas os est. 45.10  
 Medulla nouellorum animalium cruenta. 45.20  
 Medullæ parū suæ habent. 45.20  
 Medullam leo non uel certe parum habet. 45.20  
 Medullam alia ossa habent, alia non habent. 39.10  
 Mel optimum. 153.20  
 Mel candidum in quibusdā locis. 79.30  
 Mel autumnale melius est. 78.40  
 Mel unde fiat. 78.40  
 Mel quando spissetur. 79.1  
 Mel dulcius est quod crassius. 79.1  
 Mella siccitas auget. 78.30  
 μελαγχρόσις Ⓞ auicula. 117.40  
 Meleagridum oua. 84.10  
 Membra animalium. 7.10  
 Mēbradas apua phalerica gignit. 94.20  
 Membrana præciua non coit. 42.40  
 Membranae in animalibus. 42.30  
 Membranae maximæ quæ cor & cerebrum uestiunt. 42.30  
 Membrana quibus sit communis. 34.20  
 Membranae continentes cerebrū. 16.30  
 Membrana uolantes. 11.1  
 Mensū profluua lunæ cursum sequuntur. 107.1  
 Menstrua quæ difficiliter fluunt. 107.1  
 Menstrua quæ nō habeant. 107.20  
 Menstrua in quas res absorbantur. 107.20  
 Menstrua quando primum appareant. 106.1  
 Menstrua alba ex qua causa proueniant. 106.1  
 Menstrua alba extenuant corpus. 106.1  
 Menstrua sunt in mulieribus. 45.1  
 Menstrua quando defināt. 110.10  
 Menstruorum purgatio nulli fœminæ inter animalia æque fit ac mulieri. 97.20  
 Menstruorum signum & in ouibus. 97.20  
 Menstrua etiā prægnantibus usq; in postremum gerendi tempus euenire. 107.10  
 Mentum maxillæ pars. 14.10  
 Mergi. 8.1  
 Mergus ubi uictetur. 118.20  
 Mergi quor oua pariant. 67.20  
 Mergus ubi pariat. 8.1  
 Merops ubi pariat suā prole. 84.1

# I N D E X.

- Meropis pietas.** 5.10. & 141.10  
**Meropis descriptio.** 141.20  
**Merula bis anno parit.** 69.1  
**Merulæ pisces mutantur.** 132.20  
**Merula turturem amat.** 135.1  
**Merula later.** 125.10  
**Merulæ nidus.** 141.20  
**Merula avis mutat colore.** 158.40  
**Merularum genera duo.** 142.40  
**Merachærum uocât fœtum in utero læsum.** 98.1  
**Milio sus pinguis fit.** 120.1  
**Miluus paucos dies later.** 125.10  
**Miluus ubi fel habeat.** 29.20  
**Miluus pugnat cū coruo.** 134.10  
**Miluus exiguus lien.** 28.40  
**Milui carnuori sunt.** 117.20  
**Milui quod fecedant.** 125.1  
**Miluum bibere rarum est.** 118.30  
**Milui tempus excubandi.** 88.10  
**Mitili.** 52.10  
**Mitilis qualia sint labra.** 52.20  
**Mitili etiam solent fauificare.** 72.20  
**Mitilis innasçi cancos.** 72.30  
**Molaris piscis partus.** 95.20  
**Molliceps avis.** 143.10  
**Mollium differentia est in sexu.** 61.40  
**Mollia quæ uocant, sensibus omnibus prædita sunt.** 58.30  
**Mollia quando pariant.** 68.30  
**Mollia quomodo dormiant.** 61.1 & 20  
**Mollia ouum concipiunt.** 74.40  
**Mollium partes.** 47.40  
**Mollia quæ uocât, humoræ propter cibum petunt.** 115.10  
**Mollia grauida optima sunt.** 132.10  
**Mollium genera ubi grandiora reddantur.** 11.10  
**Mollia quo pacto coeant.** 66.1  
**Mollia naturalem sonum non edunt.** 59.30  
**Mollium ouum quomodo crescat.** 74.1  
**Mollia effundunt atramentū metu perculsa.** 48.30  
**Mollia omnia habent quædā capillamenta.** 48.30  
**Mollium differentia.** 48.10  
**Mollia non habent uiscera.** 48.30  
**Mollia quæ uocet.** 47.20  
**Monedulæ ingluuies.** 31.30  
**Monedulæ pisces semel in anno pariunt.** 67.30  
**Monedulæ pisces quædo optime.** 123.20  
**Monedularū genera tria.** 143.30  
**Montifringilla avis.** 117.40  
**Mora profunt suis.** 128.20  
**Mordellæ ex uermiculis nascuntur.** 77.10  
**Mores uariant iuxta diuersitatem locorum.** 131.40  
**Morum in animalibus uestigia.** 113.30  
**Mormur quando pariat.** 95.20  
**Morphna aquila cuius Homerus meminit.** 145.1  
**Morus animalium.** 11.20. & 20.30  
**Muco quandiu uterum ferat.** 95.10  
**Mucos quando pariant.** 68.20  
**Mugilis carne abstinet.** 116.20  
**Mugilis appendices.** 31.20  
**Mugilis melior est cum non fert uterum.** 132.20  
**Mugilis in litore uersatur.** 122.40  
**Mugilis quando pariat.** 68.10  
**Mugiles quosdam limo nasci.** 68.20  
**Mugiles ubi pariant.** 68.1  
**Mugilibus quorū sint pinnae.** 27.20  
**Mugiles qua ratione capiantur.** 65.30  
**Mugilis piscis oua parit.** 92.1  
**Mugiles uiuunt abscessa cauda.** 135.20  
**Mugilis liquidius inter pisces audit.** 58.10  
**Mugilis partus.** 95.20  
**Mugiles quoties pariant.** 67.30  
**Mugiles de mari in lacū ascendunt.** 93.30  
**Mugiles dormientes capiuntur.** 61.20  
**Mugiles sponte nascentes.** 93.40  
**Mula aliquādo gemellos peperit.** 100.20  
**Mula in Syria.** 12.1  
**Mulam quoque grauidam factam esse.** 102.10  
**Mula in Syria pariunt omnes.** 102.10  
**Mula non menses, sed crassiorē urinam habent.** 92.30  
**Muli cibus.** 120.30  
**Muli pes.** 21.30  
**Muli coitus.** 102.10  
**Mulus quandiu lactet.** 101.1  
**Mulus quando fit in uigore.** 101.1  
**Muli uilli.** 20.40  
**Mulus semper cicur.** 9.10  
**Mulo fel non est.** 29.1  
**Mulorum uita longa est.** 102.20  
**Mulier ut non concipiat, quomodo faciendum.** 107.40  
**Mulieris conceptus indicium.** 107.40  
**Mulieribus quid eueniat à conceptione ad partum usque.** 108.30  
**Mulieres quo tempore pariant.** 109.1  
**Mulieribus grauidis defluunt piluli congeniti.** 109.1  
**Mulierum in partu dolores uehementissimi.** 112.1  
**Mulier apta ad concipiendum.** 107.40  
**Mulieri in terra Caria quid eueniat.** 41.20  
**Mulieres uehementius in partu laborant quàm alia animalia.** 112.1  
**Mulieres quæ facilius pariant.** 112.10  
**Mulierum grauidarum morbi.** 108.30  
**Mulieres impubes.** 106.20  
**Mulieres non crescant post tertium partum.** 106.10  
**Mulier ætuo tempore magis ad coitum stimulat.** 67.1  
**Mulier etiam aliquando superfœtauit.** 109.40  
**Mulieris mores.** 133.30  
**Mulier quorū annos generare possit.** 70.30  
**Mulieris membrum genitale.** 15.10  
**Mulieres quorū pariant.** 109.30  
**Mulier grauida uirum patitur.** 109.40  
**Mulieres uaria concupiscunt uterum ferentes.** 109.1  
**Mulieris calua unam habet futuram.** 12.30  
**Muliones culices sentiunt.** 58.30  
**Mullus parit autumnus.** 95.20  
**Mulli appendices.** 31.20  
**Mulli gregales sunt.** 135.20  
**Mullus piscis ter parit.** 67.30  
**Mullorum cibus.** 116.20  
**Mullus litoralis est.** 122.40  
**Murena quomodo reparat.** 10.40  
**Murenæ fel.** 29.10  
**Murenæ carnem comedunt, præterea nihil.** 116.20  
**Murenæ partim in litore, partim in alto uersantur.** 122.40  
**Murenæ non habent pinnas.** 27.20  
**Murenarum branchiæ.** 27.20  
**Murena later.** 124.20  
**Mureng**

## I N D E X.

Murenx coirus. 64. 20  
Murena omnibus anni temporibus parit. 67. 40  
Murena ouum. 40. 20  
Mux aquatilis q̄ loco pariat oua. 83. 1  
Mus domicilium sibi parat. 9. 1  
Mures potu moriuntur. 131. 20  
Mures pontici latent. 125. 30  
Mures Arabiæ. 131. 10  
Mures aquatilis lien. 28. 40  
Murus à murena differt. 68. 1  
Mures aquatiles. 114. 40  
Murium nonnullis deest fel. 29. 1  
Murium mira fecunditas. 105. 10  
Mures uasant fegetes. 105. 20  
Mures citò abolentur. 105. 20  
Murem in mure grauidâ inueniãt. 105. 20  
Mures si falem lambant impleuntur. 105. 20  
Mures Aegyptij. 105. 20  
Mures bipedes. 105. 30  
Murium plura genera. 105. 30  
Muscæ coitus diu durat. 66. 30  
Muxta quibusdam pilis obducitur. 41. 40  
Muscæ uolando sonant. 59. 30  
Muscæ unde oriuntur. 77. 1  
Muscis binæ pennæ. 56. 10  
Musculus piscis pilos in ore loco dentium habet. 42. 20  
Muscarum coitu gignuntur uermiculi. 63. 40  
Muscæ quædo generentur. 67. 20  
Musa fibi domum facit. 9. 1  
Muscarum gustus. 121. 20  
Muscæ quomodo pungant. 56. 10  
Musa anteriore parte aculeum gerit. 11. 10  
Mustela odit cornicem. 134. 10  
Mustela quo pacto aues capiat. 137. 30  
Mustela serpentes impugnat. 137. 30  
Mustelorum partus. 67. 40  
Mustelæ genitale. 22. 40  
Mustela dimicatora cum serpente rutam comedit. 137. 20  
Mustelorum omne genus ex cartilagineis. 65. 10  
Mustelæ nomen. 4. 1  
Musteli nebrj. 90. 1  
Mustelo sunt branchiæ detectæ. 10. 20  
Mustelæ rusticæ genitale. 22. 40  
Musteli stellares bis mense pariunt. 90. 40  
Musteli leues quibus locis oua in

se continent. 90. 10  
Musteligenis quales branchiæ. 27. 40  
Mustis unde dicatur. 48. 30

N  
Nandi uim habentia. 8. 20  
Nares urthomo fimia habet. 24. 30  
Nares gressiliû, quæ animal gignunt, cartilagine consistant. 59. 40  
Nares mobiles sunt. 14. 10  
Naris elephantis. 14. 10. & 20. 1  
Narium foramina. 17. 10  
Nasus parus faciei. 14. 1  
Nasus spiritus instrumentum. 14. 1  
Nasi interseptum. 14. 10  
Nasi inane. 14. 10  
Nates. 14. 40  
Nares hominis. 21. 30  
Narex qualis sit. 54. 1  
Naticis passio. 54. 1  
Natices faxis adhærescunt. 54. 10  
Naticem quem uocemus. 54. 1  
Natices ubi nascuntur. 72. 30  
Natices qua industria capiantur. 59. 10  
Natrix. 8. 1  
Natura opera. 4. 20  
Naturæ ingenium ubi contemplandum. 4. 40  
Necydaalus unde fiat. 76. 20  
Nerui natura fissilis est. 38. 10  
Neruorum alimentum quale sit. 38. 20  
Neruus incisus solidari non potest. 58. 20  
Nerui plurimi in pedibus, manibus & scapulis sunt. 38. 20  
Neruos omnia habent, quibus sanguis est. 38. 20  
Nerui animalibus communes. 34. 20  
Neruorum rigore capiuntur equi. 129. 10  
Nerui piscium. 38. 20  
Nerui prætenues quibus sint. 38. 20  
Nerui quomodo per totum corpus diducti. 38. 10  
Neruorum summæ partes. 38. 10  
Neruorum originem in corde esse. 38. 1  
Nigri fetus unde generentur. 98. 20  
Nigrum oculorû in animalibus uariat. 13. 10  
Niuæ uermes creantur. 77. 10

Nuis alumnus infectorum ge-  
nus. 77.20  
Nobile quod fit. 9.20  
Noctua. 146.1  
Noctu ambulancia. 9.1  
Noctua noctu uagatur. 9.1  
Noctu appendices. 31.40  
Noctuis exiguis est lien. 28.40  
Noctua belium habet cū orchilo.  
134.1  
Noctu gula. 31.30  
Noctua quomodo capiat. 122.30  
Noctu speciem gerentes conui-  
uent etiam superiori palpebra.  
26.40  
Noctua uis aduncis unguibus.  
117.30  
Noctua non diu abscondit. 125.10  
Nōmina olim septimo die im-  
posita in fannibus sunt. 113.20  
Nema Pompilius pacis studiosus  
fuit. 1.10  
Numicibus quæ obfint. 113.20  
Nymphæ appellantur infecta, cū  
vermes incipiunt formari 76.20

O

O Estercis officium. 112.10  
Occiput. 16.40  
Occiput quæ capitis pars sit. 12.30  
Occiput uacuum esse. 113.30  
ὀφθαλμὸς id est fubligit. 138.10  
Oculata quid comedat. 116.20  
Oculi crusta infectorum. 51.20  
Oculorum uariis color. 13.10  
Oculi fæpiarum primum gran-  
des. 75.10  
Oculi habent neruofos meatus  
ad cerebrum. 57.10  
Oculi in cerebrum finiunt. 13.30  
Oculos habent omnia animalia,  
p̄ter testa infecta & imperfecta.  
13.1  
Oculi hirundinum. 31.10  
Oculi chamæleonis. 25.40  
Oculi auium sine clijs. 26.30  
Oculi hoīs quantum dicunt. 16.20  
Oculi nigrum quod dicatur. 13.10  
Oculi candidum. 13.10  
Oculorum anguli. 13.10  
Oculorum in animalibus uarie-  
tas. 13.10  
Oculorum in homine situs. 12.40  
Oculi ceph sunt equis quibudam  
13.20  
Oculi modici peropimi. 13.20  
Oculorum situs. 13.20  
Oculi conditi clarissime cernuntur.  
13.20

Nuis alumnus infectorum ge-  
nus. 77.20  
Nobile quod fit. 9.20  
Noctua. 146.1  
Noctu ambulancia. 9.1  
Noctua noctu uagatur. 9.1  
Noctu appendices. 31.40  
Noctuis exiguis est lien. 28.40  
Noctua belium habet cū orchilo.  
134.1  
Noctu gula. 31.30  
Noctua quomodo capiat. 122.30  
Noctu speciem gerentes conui-  
uent etiam superiori palpebra.  
26.40  
Noctua uis aduncis unguibus.  
117.30  
Noctua non diu abscondit. 125.10  
Nōmina olim septimo die im-  
posita in fannibus sunt. 113.20  
Nema Pompilius pacis studiosus  
fuit. 1.10  
Numicibus quæ obfint. 113.20  
Nymphæ appellantur infecta, cū  
vermes incipiunt formari 76.20

O

O Esteticis officium. 112.10  
Occiput. 16.40  
Occiput quæ capitis pars sit. 12.30  
Occiput uacuum esse. 113.30  
ὀφθαλμὸς id est fubligit. 138.10  
Oculata quid comedat. 116.20  
Oculi crusta infectorum. 51.20  
Oculorum uariis color. 13.10  
Oculi fæpiarum primum gran-  
des. 75.10  
Oculi habent neruofos meatus  
ad cerebrum. 57.10  
Oculi in cerebrum finiunt. 13.30  
Oculos habent omnia animalia,  
p̄ter testa infecta & imperfecta.  
13.1  
Oculi hirundinum. 31.10  
Oculi chamæleonis. 25.40  
Oculi auium sine clijs. 26.30  
Oculi hoīs quantum dicunt. 16.20  
Oculi nigrum quod dicatur. 13.10  
Oculi candidum. 13.10  
Oculorum anguli. 13.10  
Oculorum in animalibus uarie-  
tas. 13.10  
Oculorum in homine situs. 12.40  
Oculi cefij sunt equis quibudam  
13.20  
Oculi modici peropimi. 13.20  
Oculorum situs. 13.20  
Oculi conditi clarissime cernuntur.  
13.20

# I N D E X.

Oculi qui modice conuiuent, optimos subesse mores demonstrant.	13.20	Offa leonis uidentur nullā omnino habere medullam.	39.20	Oua quo pacto reddantur sœcunda.	85.1
Oculi rigidi impudentiam significant.	13.20	Offa leonis in primis solida sunt.	39.20	Oui uitelli & albuminis discrimen.	85.10
Oculi nimium conuiuentes, impudentiæ indices sunt.	13.20	Offa auiū inter se differunt.	39.20	Oua piscium.	92.1
Oculi soli homini uarij.	13.10	Offa qua ratione cohæreant.	38.30	Oua parientia sanguinem etiam habent.	25.10
Odorandi meatus auium.	26.30	Offa capitis quot sint.	39.1	Oua in repidis uasis sponte ederunt pullos.	84.20
Olea opimar oues.	121.10	Offium initium spina est.	38.40	Oua quædam uento concipiunt.	63.30
Oleaster opimar pecus.	121.10	Offa suis membranis nudata lyderantur.	42.40	Quorum differentiæ.	10.30
Oleæ flore apes prouenire.	78.1	Offium quædam medullam habent, quædā non.	39.10. & 45.20	Quum crocodili quantum sit.	83.10
Oleas amant cicadæ.	81.10	Offa non multum diuersa quæ habeant.	39.10	Cua parientium quadrupedum coitus.	64.30
Olera iuuantur pluuia.	126.20	Offa humerorum.	39.1	Cua locustarum.	74.1
Olfactus sedes.	57.20	Offa fragilia sunt.	40.1	Cua echinorum.	54.30
Olfactus unde administratur.	14.10	Ossifraga.	146.1	Quorum in pisceloca.	89.40
Olfactus piscium.	57.30	Ossifragæ magnitudo, eiusq; clibus.	117.30	Cua piscium magna parte pereunt.	92.10
Olfactus piscium argumenta.	58.10	Ossifragæ benignitas.	5.10	Cua quæ pariunt omnia, cortice muniuntur.	11.30
Oliuæ copia simul & apum quare fit.	78.30	Ossifolem quendam polypum appellant.	49.10	Cua parientia incertum an foeminent.	60.40
Ololyginem ædunt ranæ.	60.1	Cisphys.	14.40	Cuum urinum.	87.20
Olor aquas amat.	118.20	Cisrea.	8.1. & 47.30. & 52.1	Cuum polypi quale fit.	74.40
Olor repugnat aquilæ.	134.40	Cistreg se nequeunt mouere.	8.20	Cuipara quæ uocet.	11.30
Olor alter alterū deuorat.	134.40	Cistreis ubi origo sit.	72.20	Cuiparis omnibus est arteria & gula, sed uariæ.	28.30
Oloris mores.	140.40	Cistrea scabra iunt.	52.20	Cuum mammae.	22.10
Olores canunt morituri.	140.40	Cistreis innascuntur cancri.	72.30	Oues frustæ iunt.	135.40
Oloris appendices.	31.40	Cistream genus.	11.20	Ouis ex potu pinguescit.	121.1
Olores gregales sunt.	8.40	Cistreis qualia sint labra.	52.20	Cuibus sal dandum.	121.1
& 122.30		Cistrearium genus omne optimum est, cum fert uterum.	132.10	Oues quid edant.	121.1
Omasi descriptio.	30.10	Citus qualis auis.	122.20	Oues bibita quadā aqua nigros agnos generant.	42.10
Omentum.	17.30	Cuum quale primum sit.	84.20	Cuium coitus.	70.10. & 98.10
Omenti pinguedo.	43.30	Cua bicolora testudinis sunt.	82.40	Cuium urina.	97.30
Omentum quibus sit.	42.40	Cuum mollium quale sit.	74.40	Quillū lac accommodū ad casē.	46.10
Omenti origo.	42.40	Cua hyphenemia humidiora sunt.	84.30	Ouibus fabæ augent copiam lactis.	46.40
ὄντος τρυχέος quomodo transiule rit.	71.40	Cua quæ generent.	10.20	Oues pauciores pariunt quæ iuniores sunt.	70.40
Orcinæ ubi pariant.	68.1	Cua quædam etiam infœcunda coitu concepta.	87.1	Oues pinguedine renum moriuntur.	43.40
ὄργυρον conilam esse.	137.20	Cua gemina binis constant uitellis.	87.1	Oues quot annos parere possint.	70.30
Origan puluere formicæ fugantur.	58.40	Cua quædam binos pullos ædunt.	87.10	Cuium pes.	21.30
Orisodagnæ ubi creentur.	77.10	Cuum omnium auium durum habet putamen.	84.10	Ouibus uox propria ad coitum.	60.10
Oryx unicornis & bisulcus.	21.40	Cua aquaticarum differunt a terrestribus.	84.10	Oues seniores si tempestiue libidine incitantur, quid significet.	98.30
Os quod sit.	14.10	Quorum color.	84.10	Cuium iuniorum libido tempestiua quid significet.	98.30
Os hominis.	24.20	Cua oblonga feminam ædunt.	84.20	Oues somnare.	60.40
Os quid differat a cartilagine.	39.40	Cua rotundiora marem ædunt.	84.20	Quis iura quæ concreuant.	43.30
Os præcisum non recrescit.	39.40	Cua in Aegypto fimo obruta ædunt pullos.	84.20	Cues	
Os quam partem uocet.	9.40	Oui piscium color.	89.30		
Os quibus sit commune.	34.20				
Oris magnitudo in animalibus.	24.20				
Os rescissum quibus animalibus sit.	24.20				
Ossium extrema nonnulla constant cartilagine.	39.40				
Ossa neruis ligantur.	38.10				
Os calig.	38.40				

# I N D E X.

Oues qua causâ geminos pariât.  
98.20  
Oues magnâ in Epiro. 46.30  
Oues quæ sint frigoris patientio-  
res. 121.10  
Oues quot menses uterum ferât.  
98.10  
Ovis cerebrum non est pingue.  
43.40  
Ovis lanissima cauda. 130.40  
Oues cōgregantur factō strepitu  
136.1  
Ovis abortum facit ob tonitrua.  
136.1  
Oues quomodo cubent. 136.1  
Ouibz diu durat lac. 46.40  
Oues grauidæ abortum faciunt,  
si glandem copiosius edierint.  
128.40  
Oues pinguescunt gerentes ure-  
rum. 97.40  
Ouium sanguis quo pacto spif-  
setur. 38.30  
Ouium uitæ longitudo. 98.10  
Ouium duces. 98.10  
Oues Aethiopice longioris sunt  
uitæ. 98.20  
Oues reduios habent. 82.1

## P

**P**Abulorum diuerfitas. 46.30  
Pacem nihil melius. 1.10  
Paguri cancri. 49.20  
Palatum pars oris. 14.10  
Palatum carnosum quibuscūq̃ pro-  
lingua est. 57.20  
Palea opimat pecus. 121.10  
παλεισγῆαι, id est allecitrices.  
138.30  
Palpebræ oculorum. 13.1  
Palpebræ non possunt coalescere  
15.1  
Palumbarius accipiter. 117.20  
Palumbes. 69.10  
Palūbes hyeme nō gemit. 159.10  
Palumbes camporum incolæ sunt.  
9.10  
Palūbes trimestres coeunt. 87.30  
Palumbium uita. 87.30  
Palumbium incubitus. 89.1  
Palumborum quidam latent, qui  
dam non. 125.10  
Palumbium cibus. 118.1  
Palumbi ingluuies. 31.20  
Palumbes bina oua pariūt. 83.40  
Palumbes discedunt. 122.10  
Palustrium oua pallida. 84.10  
Pamphila, Platis filia dicitur pri-  
ma texisse bombycia. 76.30

Panthera qua ratioe uenēt. 137.20  
Pantheræ odore belluæ delectan-  
tur. 137.20  
Pantheræ pes. 21.30  
Pantheræ ubi sunt. 131.20  
Panthera perpetuò fera. 9.10  
Pantherę dentes sunt ferrati. 23.10  
Pantheræ mamma. 22.20  
Panthera femina animosior ma-  
re. 133.20  
Pantheræ remedium. 137.10  
Papauer quid uocet in testa inte-  
ctis. 53.1  
Papauerculum uocant mulieres  
excrementum infantis primum.  
112.30  
Papilionī antennæ ante oculos  
preſtenduntur. 56.20  
Papilla. 14.30  
Papiliones ex erucis nascuntur.  
76.1  
Papilionum genus quoddā qua-  
lem producat partum. 75.40  
Papillæ fimix. 24.40  
Papillæ non sunt conspicuę del-  
phinis. 27.20  
Papillę quaterne uaccis sunt. 22.10  
Pardalianchis uenenum. 137.10  
Pardalus qualis sit auis. 143.20  
Pari auis cibus. 117.30  
Pariendi tempus hominis. 109.20  
Parus multa ædit oua. 142.1  
Pascua ad carnis bonitatē faciūt.  
121.10  
121.10  
Pascueres pisces quoties pariant.  
67.30  
Pascueres mares diutius uno anno  
non posse durare. 138.30  
Pascuerum uentriculus. 31.30  
Pascuerum genus piscium. 62.20  
Pascueris cibus. 117.30  
Pascueris fel. 29.20  
Pasinaca prolem non potest reci-  
pere. 90.20  
Pasinaca pinnis caret. 10.40  
Pasinaca q̃modo uenēt. 147.10  
Pasinacæ coitus. 64.30. & 65.1  
Patellæ. 52.10  
Patellę ostium excrementi. 53.30  
Patellæ ubi nascantur. 72.30  
Patella mouetur. 52.20  
Patellæ uagantur. 73.10  
Patellæ ubi habent papauer. 53.20  
Patellæ absoluuntur ut quærant  
cibum. 115.40  
Patellam aurem marinam appel-  
larunt quidam. 53.30  
Pauoues saepe infecunda oua pa-  
riunt. 84.40

Pauonum mores. 9.30  
Pauo quot dies incubet. 89.10  
Pauo quot quotiesq̃ pariat. 89.10  
Pauones quo tempore coeant.  
89.10  
Pauonum oua gallinis subijciū-  
tur. 89.10  
Pauonis superbia. 5.20  
Pauonis uita. 89.10  
Pectines. 52.20. & 59.10  
Pectines frident. 59.40  
Pectines locis arenosis nascunt.  
72.20  
Pectines quomodo lateant. 123.40  
Pectines cum uterum ferunt, me-  
liores sunt. 132.10  
Pectines citò crescunt. 73.30  
Pectus. 15.20  
Pectus animalium. 20.1  
Pectus coctus est impositum. 39.1  
Pectoris situs. 14.30  
Pectunculi. 52.10  
Pectunculis quosdam cæcos in-  
nasci. 72.30  
Pedatim incedere. 20.30  
Phalangia unde procreet. 75.40  
Pedestrium animalium diuisio. 8.20  
Pedes cancrorum. 49.30  
Pedum fissura multiplex. 21.30  
Pedes carnosii quibus. 21.30  
Pedis partes. 15.40  
Pedis ossa. 39.10  
Pedes multis continentur nervis.  
38.20  
Pedes solidos habentes. 21.30  
Pedes chamæleonis. 25.40  
Pedes plures quam quatuor ha-  
bentia. 10.30  
Pedes bifiduli. 21.30  
Pedes quæ animalia habeant.  
10.30  
Pedes duos habentia. 10.30  
Pedes quaternos habentia. 10.30  
Pedum in simis officium. 24.40  
Pediculi qua causâ largius proue-  
niant. 82.10  
Pediculos procreat uestis ex ou-  
um pelibus facta. 121.20  
Pediculus etiam aues infestantur.  
82.1  
Pediculus piscis circa delphinum  
82.10  
Pediculus carnis humore aluntur.  
81.40  
Pediculi unde nascantur. 81.40  
Pediculorum coitu lentes procre-  
antur. 63.40. & 81.40  
Pediculis uexantur pisces. 61.10  
& 82.10

# I N D E X.

<b>Pediculi genus ferum uocatur.</b>	Phalangij quo pacto pariant.	Pili pubis indicant ætatem matu-
82.1	80.20	ram ad coitum.
<b>Pediculi magis pueros infestant.</b>	Phalagijis partus numerosus est.	69.30
82.1	80.30	<b>Pilorum mutatio unde fiat.</b>
<b>Pediculos fœminę magis sentiunt.</b>	Phalangij proles matrem occidit.	40.30
82.1	80.30	<b>Pili duri in regione calida sunt.</b>
<b>Pediculi genus marinum quale sit.</b>	Phalangia fœmina maior quàm	40.30
82.10	mas.	<b>Pili molles in regione frigida cre-</b>
<b>Pelagius lollius.</b>	62.20	<b>scunt.</b>
48.20	<b>Phalaris aquas adamat.</b>	40.30
<b>Pellæ coitus difficilis est.</b>	118.20	<b>Pilorum natura qualis sit.</b>
134.30	<b>Phalerica apua.</b>	40.40
<b>Penelops desiderat aquas.</b>	94.20	<b>Pili fissiles sunt omnes.</b>
118.30	<b>Phasianæ pediculus uexant.</b>	40.40
<b>Penis propria pars maris</b>	82.1	<b>Pili cani sunt uiligine.</b>
15.1	<b>Phasianorum oua.</b>	41.10
<b>Penna apum renasci non potest.</b>	84.10	<b>Pili palpebrarum desuunt rebus</b>
42.20	<b>Pherecydes Syrius quo morbo pe-</b>	<b>ueneris.</b>
<b>Penna uolantes.</b>	81.40	41.30
10.40	<b>Philosophandi in naturalibus or-</b>	<b>Pili euulsi subnasci in quibus pos-</b>
<b>Pennas habentes aues uocamus.</b>	do & ratio.	<b>sint.</b>
11.1	4.20	41.30
<b>Pennis uolantium pedes.</b>	<b>Phocænæ partus.</b>	<b>Pili in sua radice lentorem habet.</b>
11.1	91.20	41.40
<b>Pennæ auium frigore mutantur.</b>	<b>Phocænæ etiam Pontus habet.</b>	<b>Pili uersicolores quibus sunt, ha-</b>
42.10	123.10	<b>bent etiã eiusmodi cutē.</b>
<b>Pennæ caule constant.</b>	<b>Phœnice fert caneros miræ uelo-</b>	<b>Pilos quę habent, animal gignit.</b>
26.40	<b>citatis.</b>	11.40
<b>Pennæ quedam auium mutant.</b>	49.30	<b>Pili cani quibusdam reddit ex æ-</b>
42.10	<b>Phoici peculiare est, ut oculos ap-</b>	<b>gritudine.</b>
<b>Pennæ quibus crusta cõtegantur.</b>	<b>petat.</b>	41.10
11.1	142.30	<b>Pili ocyus cani sunt operiti.</b>
<b>Pennas quaternas habentia.</b>	<b>Pholis quomodo se tueat.</b>	41.10
11.1	148.1	<b>Pilorum color mutantur in sene-</b>
<b>Pennæ præfectæ non possunt re-</b>	<b>Phoxini admodum parui adhuc</b>	<b>ctute.</b>
<b>parari ut pili.</b>	<b>oua habent.</b>	41.1
42.20	92.10	<b>Pili à qua parte primũ candē-</b>
<b>Pennæ quæ integuntur, quales ha-</b>	<b>Phoxini ubi pariant.</b>	<b>scant.</b>
<b>beant audiendi meatus.</b>	93.1	41.1
13.40	<b>Phrigius caseus.</b>	<b>Pili in morbis quibusdam crescūt</b>
<b>Percæ appendices.</b>	46.10	1.70
31.20	<b>Phycos appellant purgamētum</b>	<b>Pili cõgeniti libidinosis celerius</b>
<b>Percæ branchiæ.</b>	<b>maris Pontici.</b>	<b>desuunt.</b>
27.40	92.30	41.40
<b>Percæ ubi pariant.</b>	<b>Picare quid dicatur.</b>	<b>Pili qui in homine primũ na-</b>
93.1	108.30	<b>scantur.</b>
<b>Percæ conduuntur.</b>	<b>Picæ nidus.</b>	41.10
124.20	141.10	<b>Pili capitis primi per ætatem de-</b>
<b>Perdices ingluuiet.</b>	<b>Pica uocem mutat sape.</b>	<b>fluunt.</b>
31.20	118.1	41.20
<b>Perdix pulueratrix est.</b>	<b>Picus martius.</b>	<b>Pili animalibus cõmunes.</b>
159.20	<b>Picus martius cur tundat arbo-</b>	34.20
<b>Perdices ubi pariant.</b>	<b>res.</b>	<b>Pilos non omnia habent.</b>
83.40	139.40	11.30
<b>Perdibus uox ante pugnam.</b>	<b>Pici genera.</b>	<b>Pilosa quæ sint.</b>
60.10	139.40	20.40
<b>Perdices appendices.</b>	<b>Picus martius in arbore nidos fa-</b>	<b>Pilulario pennæ uagina inclusæ</b>
31.40	<b>cit.</b>	55.40
<b>Perdicum uox.</b>	<b>Pigargus.</b>	<b>Pinguescunt ferè melius fame præ-</b>
60.30	144.40	<b>fangata.</b>
<b>Perdices qua ratione incubent.</b>	<b>Pigmæi.</b>	120.1
89.1	121.40	<b>Pinguescūt quib⁹ est paruus uen-</b>
<b>Perdicum libido.</b>	<b>πικγῖο</b> , idē esse quod agrestis	<b>ter.</b>
9.10. & 89.1	<b>lactuca.</b>	43.20
<b>Perdices afflatu concipiūt.</b>	137.30	<b>Pinguescunt arate prouecta po-</b>
65.40	<b>Pilare malum in mammis mulie-</b>	<b>tius quàm nouella.</b>
<b>Perdices uoce marium concipi-</b>	<b>rum.</b>	44.1
<b>unt.</b>	113.10	<b>Pinnę pinnotheræ.</b>
65.40	<b>Pili præcisi nō ab incisura augen-</b>	72.30
<b>Perdices uolatu mariũ utero in-</b>	<b>tur, sed ab radice.</b>	<b>Pinnæ erectæ quo loco quoque</b>
65.40	42.1	<b>pacto proueniant.</b>
<b>Perdicum coitus.</b>	<b>Pili proportionalia quæ dicantur.</b>	72.20
65.40	40.20	<b>Pinnæ an plātæ, an animalia sint</b>
<b>Perdix quomodo cõcipiat.</b>	<b>Pilos qui habeant.</b>	<b>dubitantur.</b>
25.20	40.20	140.1
<b>Perdicum olfactus.</b>	<b>Pili hominis.</b>	<b>Pinna auriculæ pars superior.</b>
85.20	20.40	13.30
<b>Perdicum uita.</b>	<b>Pilorum discrimina.</b>	<b>Pinnæ se non mouent.</b>
87.30	40.30	52.20
<b>Perdices suos pullos resouēt ut</b>	<b>Pili duriores proueniunt ex cute</b>	<b>Pinnæ sedem non mutant.</b>
<b>gallinæ.</b>	<b>durior.</b>	72.40
139.1	40.30	<b>Pinnas binas quæ habeant.</b>
<b>Perdix ingeniosa est.</b>	<b>Pili lepori sunt in bucca, etiam &amp;</b>	10.
139.1	<b>refupina pedum parte.</b>	40
<b>Phager piscis frigore lędit.</b>	42.20	<b>Pinnas habent pisces rem peculi-</b>
126.40	<b>Pili herinaceorum.</b>	<b>arem.</b>
<b>Phalangia coitus.</b>	40.40	27.20
66.40	<b>Pili in mento mulierum non na-</b>	
<b>Phalangia diu in ediam pferit.</b>	<b>scuntur.</b>	
119.1	41.20	



# I N D E X.

- Pinnis quæ utantur. 10.30  
Pinnothera qua ratione pisces capiatur. 73.10  
Pinnothera qualis sit, ubique nascatur. 73.10  
Pipo cum lutea certat. 134.1  
Pipo uenatu culicum uiuit. 118.1  
Piro pinguescunt fues. 120.1  
Piscatores quid caueant. 57.40  
Piscatores quomodo capiant pisces. 61.10. & 65.30  
Piscatores quid obseruent in litore in alto piscaturi. 74.20  
Pisces fel habent. 29.10  
Pisces olfaciunt. 57.30  
Pisces quo tempore optimi sint. 132.10  
Piscibus ferme omnibus gula deest. 29.40  
Piscium cor. 29.30  
Pisces mares turgidos habent meratus genitali femine. 90.30  
Piscium coitus. 65.1  
Pisces nidorem sanguinis fugiunt. 58.20  
Piscium appendices. 31.10  
Pisces feturam deuorant. 116.10  
Piscium genitale uirus. 45.20  
Piscibus os est effissum. 28.1  
Piscium oculi. 28.1  
Pisces nare possunt. 8.20  
Piscium ouiparorum coitus raro cernitur. 65.40  
Piscium discrimen loca faciunt. 68.20  
Piscium lingua. 25.20. & 28.1. & 57.20  
Piscium meatus in quibus continentur semen. 65.20  
Piscium oua etiam sine mare concepta fecunda sunt. 63.30  
Piscibus extenuatis squamæ duriores efficiuntur. 42.1  
Pisces quot notis se moueant. 11.1  
Piscibus præcidit uenter in os. 30.1 & 115.30  
Pisces quare dormientes non facile capiuntur. 61.1  
Pisces pulicibus uexantur. 61.1  
Pisces infestant pediculi. 82.10  
Piscium nerui. 38.20  
Pisces nonnulli animal gignunt. 11.40  
Pisces quibusdam cibo sunt. 9.1  
Pisces capiendi ratio. 57.40 & 127.40  
Pisces multi semel pariunt. 67.30  
Piscium oculi primam apparent. 93.10
- Pisces quibus ab alijs animalibus differant. 27.40  
Pisces plurimi squamosi. 27.40  
Pisces pauci scabri. 27.40  
Pisces quo tempore maxime capiuntur. 127.20  
Piscibus uulgaris pestis non uidetur accidere. 127.20  
Piscium oua parientium coitus. 65.30  
Pisces uorant maris semen prolificum. 65.30  
Pisces mares oua feminarum uorant. 65.30  
Pisces sunt sanguinis participes. 28.1  
Pisces quid differant quod ad partum attinet. 28.1  
Pisces qui oua pariant. 28.1  
Pisces qui gignant animal. 28.1  
Piscium ossa. 39.20  
Piscium peculiare spinulæ per carnem passim. 39.20  
Piscium genus numerosum. 27.10  
Piscium pars supina. 27.10  
Piscium cauda. 27.10  
Piscium partes. 27.10  
Piscium ouum unicolor est. 89.30  
Piscium generatio in ouo quid differat ab auum. 89.30  
Pisces optimi quibus in locis. 126.30  
Pisces infestantur frigore. 126.40  
Pisces qua ratione in ouo augeantur. 89.30  
Piscium uulæ figura unde petenda. 89.40  
Pisces quod animal, quique ouum generent. 89.20  
Pisces suauis sunt cum latet. 124.20  
Piscibus uermes innascuntur. 95.10  
Piscium diuersa pariendi tempora. 95.10  
Pisces quidam dentes in lingua habent. 28.1  
Piscium semen genitale. 32.30  
Pisces quid loco testium habeant. 32.20  
Pisces non habent testes. 32.10  
Piscium conceptus magna ex parte uere agitur. 68.20  
Pisces etiam loca ut aues mutant. 122.1  
Piscium senectutis signa. 132.30  
Pisces uerbascio herba moriuntur. 127.40  
Piscium greges duces habent. 123.1  
Pisces branchias habent. 27.20  
Pisces qui optimi sint post partum. 132.30
- Piscibus odorandi meatus nulli conspici. 28.1  
Piscibus imbres cōducunt. 126.10  
Piscibus inest materia ex qua glutinum concoquitur. 41.1  
Piscium ouum quomodo crescat. 74.1  
Piscibus magna ex parte pinnæ quaternæ sunt. 27.20  
Piscium longorum pinnæ. 27.20  
Pisces gregales. 8.40. & 135.20  
Pisces tortiores deuorant infirmiores. 135.30  
Pisces quibus mensibus pariant. 68.10  
Piscium auditus. 57.30  
Piscium oua quæ dissipantur. 93.30  
Piscium feminæ maiores euadunt quam mares. 62.20  
Pisces humore uiuunt. 8.1  
Pisces cur iuxta litora pariant. 92.20  
Pisces in Ponto circa Thermoodontem annum plurimi pariunt. 92.20  
Piscium somni argumenta. 61.10  
Piscium lacustrium partus. 92.40  
Piscium ouorum multitudo. 92.10  
Pisces qui generent animal. 91.1  
Piscium genera multa latent quibusdam temporibus. 124.10  
Piscium uulæ 30.40. & 33.30. & 89.132.20  
Pisces ouum generantes. 40.20  
Piscium sebum. 43.30  
Pisces carent pulmone. 28.40  
Pisces celeriter crescunt. 95.40  
Piscium dentes. 23.20. & 27.40  
Pisces paucissimi laues. 27.40  
Pisces pelagii. 122.40  
Pisces mammas non habent. 27.10 & 45.30  
Piscium feminæ uiuaciores. 62.20  
Pisces non habent renes. 29.20  
Piscium capnura quando fiat. 124.40  
Piscium maris & feminæ genitalium differentia. 90.40  
Piscium coniugia aguntur. 95.1 & 135.20  
Piscium greges constituent. 95.1  
Piscium situs in utero. 111.30  
Pisces nocte pascere solent. 117.20  
Piscium in sexu discrimen. 62.1 & 92.1  
Pisces in aqua exigua uiuere non possunt. 117.10  
Piscibus plerisque fel intestino annexum est. 29.10

# I N D E X.

- Pisces** quidam nec mares nec foeminae sunt. 69.30  
**Pisces** dormiunt. 61.1  
**Pisces** citò crescunt. 68.1  
**Pisces** saxatiles bis pariunt. 67.30  
**Pisces** habent sensum gustus. 57.20  
**Piscibus** quæ esca fit grata. 57.20  
**Piscium** naturam regiones mutant. 95.40  
**Piscis** uarijs delectantur escis. 58.10  
**Piscibus** apta loca. 127.1  
**Pisces** qui mutantur. 132.20  
**Piscium** saxatiliu cibis. 116.40  
**Pisces** qui squamis teguntur, oua pariunt. 92.1  
**Pisces** saxatiles conduntur. 124.20  
**Piscium** genera ex limo etiam pueniunt. 93.48  
**Pisces** uocis expertes sunt. 29.30  
**Pituita** cõmunis animalib⁹. 34.20  
**Planta**. 15.40  
**Planta** non caua uersutum ingenium significat. 16.1  
**Plantarum** munus. 114.10  
**Plateæ** mutant cõlum. 121.40  
**Platea** gregalis est. 122.30  
**Plinij** libros deprauatissimos fuisse. 2.30  
**Podagra** equos uexat. 129.10  
**Podagra** equorũ signum. 129.10  
**Podagra** canum. 128.40  
**Podagra** bubus qd noceat. 129.1  
**Podex**. 30.1  
**Pollex**. 15.30  
**Polybij** de uenis sententia. 35.20  
**Polypus**. 10.40  
**Polypum** quandam nautam uocant. 49.10. & 148.40  
**Polypi** quo pacto coeant. 66.1  
**Polypi** comedunt locustas. 116.1  
**Polyporum** genera multa. 49.1  
**Polypus** quando pariat coeatq. 68.30  
**Polypi** ouum. 48.40. & 68.30  
**Polypus** animal fecundum est. 68.40  
**Polypus** mas quid differat à foemina. 68.40  
**Polyporum** brachia quanta fiant. 48.10  
**Polypi** uita. 75.30  
**Polyporum** cibis. 116.10  
**Polypus** quomodo foueat oua. 75.20  
**Polypi** ingenium. 148.20  
**Polyp⁹** tibi obnoxius est. 148.30  
**Polypi** quo pacto ex oua prodeant. 74.40  
**Polypi** primũ perexigui. 74.40  
**Polypus** in quo loco adat ouum. 74.40  
**Polypi** quomodo capiant. 58.40  
**Polyporum** genus. 47.40  
**Polypus** uno brachio in coitu utitur. 48.1  
**Polypi** fistula. 48.10  
**Polypus** quomodo nater. 48.10  
**Polypis** astitis utuntur piscatores. 58.20  
**Polypi** caput. 48.40  
**Polypus** qua ratioe suis brachijs utatur. 48.1  
**Polypi** optimi sunt grauidi. 132.10  
**Pompilus** polypus. 49.10  
**Pontus** belluas piscibus inimicas non habet multas. 123.10  
**Poples**. 16.1  
**Poples** quæ pars dicatur. 38.10  
**Porphyrio** qualem gulã habeat. 31.30  
**Porphyrio** q pacto bibat. 119.40  
**Porus** ex pure fit. 44.40  
**Præcordia**. 18.20. & 28.30  
**Præputium**. 15.1  
**Primadæ** in cerno se abduunt. 124.20  
**Principis** officium. 1.10  
**Pristes** oua non habet. 91.10  
**Proferum**, humorem uocãt mulieres. 111.20  
**Profluuium** sanguinis. 45.1  
**Promuicidas** quæ habeant. 52.40  
**ῥῆσιν ἄλλῃ** quid significet. 71.30  
**Pruina** nocet armentis. 120.20  
**Psitacus** loquitur. 122.30  
**Psychrus** amnis. 42.20  
**Pubescunt** soli homines. 69.30  
**Pubes** tardissimè canescit. 41.10  
**Pubescere** quãdo incipiat homo. 96.30. & 105.40  
**Pubescant** oportet qui sunt habiles ad gignendum. 41.30  
**Puellæ** quo ætatis tempore præcipue debeant custodiri. 106.10  
**Pueri** qñ incipiãt dentire. 112.40  
**Pueri** sua membra regere nequeunt. 60.20  
**Pulex**. 149.20  
**Pulices** unde nascantur. 81.40  
**Pulices** unde uiscitent. 81.40  
**Pulicum** coitu uermiculi proueniunt. 69.40  
**Pulicarie** herbe usus in polypis capiundis. 58.40  
**Pulium** ante pullum emittitur ab equa. 129.30  
**Pullus** in ouo quo pacto augetur. 85.40  
**Pullus** in ouo quo pacto locatus fit. 86.30  
**Pullus** in ouo dormit, sed non semper. 86.40  
**Pulmo** auium. 29.40  
**Pulmo** qbus animalibus fit. 28.30  
**Pulmonem** pisces non habent. 28.40  
**Pulmone** quæ careant. 28.40  
**Pulmo** plurimum sanguinis continet. 18.10  
**Pulmo** non retinet sanguinem, dissectis animalibus. 18.20  
**Pulmo** non omnibus in eodem loco. 28.30  
**Pulmo** in duas partes discret⁹ est. 17.10. & 36.20  
**Pulmo** qua causa sanguine refferus uideatur. 36.20  
**Pulmo** serpentum. 31.1  
**Pulmo** hominis. 17.10  
**Pulmo** ouiparorum. 17.10  
**Pulmo** quibus uenis connectat. 17.20  
**Pulmone** animalcula testa recta sponte proueniunt. 72.40  
**Pulmo** quibus deest, uocem non habet. 59.20  
**Pulmo** excipit arteriam. 30.1  
**Pulmonem** habentia spirat. 8.10  
**Pumilio**. 102.20  
**Pupilla** oculi quæ fit. 15.1  
**Pupillarum** institutio communis est animalibus. 44.1  
**Purgationes** ante partum periculo sũt. 112.30  
**Purgationes** post conceptũ. 108.1  
**Purgationes** etiã quibũdam lactantibus fiunt. 113.10  
**Purpuræ** quemadmodum se cõdant. 71.20  
**Purpuræ** unde nascantur. 71.30  
**Purpurarũ** genera multa. 71.40  
**Purpuræ** flos quãdo deterrimus. 72.1  
**Purpuræ** quo pacto tundantur. 72.1  
**Purpuræ** qñ generentur. 68.40  
**Purpuræ** apud Siccum et Lectum Idæ promontoria. 71.40  
**Purpuræ** Cariæ. 71.40  
**Purpuræ** pelagiæ. 71.40  
**Purpuræ** ubi magnæ, ubiq paræ sint. 71.40  
**Purpuræ** sunt carniuoræ. 115.49

Purpuris quis sit pascendi modus 72.10  
Purpuræ ubi nigræ, ubi rubræ sint. 71.40  
Purpuræ quando capiantur. 72.1  
Purpuræ quando lateant. 72.1 & 123.40  
Purpuræ ubi habeat florē. 72.10  
Purpuris longum uiuendi tempus. 72.20  
Purpuræ breui crescunt. 72.30  
Purpuris qualis lingua. 56.10  
Purpuræ pluuijs infestant. 128.1  
Pyraus euripus qualis ferat echinos. 63.40  
Pyrausta fauis nocet. 130.20  
Pyrrhicæ oues. 46.30

**Q** Vadripedes brachiorum uice crura habent. 19.30  
Quadrupedum pars maior caudam habet. 20.30  
Quadrupedū fitus in utero. 111.30  
Qualitate affectuum differentes partes. 7.20

**R** Abies canum. 128.40  
Rabie tentant equi. 129.20  
Raia ouum. 90.1  
Raia fecunditas. 95.20  
Raia branchiæ. 10.20 & 27.30  
Raia pinnis caret. 10.40  
Raia quomodo coeat. 65.1  
Raia fel. 29.10  
Raia hyeme conduntur. 124.30  
Rana. 8.1  
Rana quo pacto generet. 28.1  
Ranæ coitum noctu magna ex parte agunt. 60.10  
Ranarum fetus. 93.1  
Ranarum ulularus. 60.1  
Rana qua ratione pisces capiat. 146.1  
Ranæ uulua. 33.30  
Ranæ coitus. 64.30  
Ranæ femina maiores euadunt quam mares. 62.10  
Ranæ uiuere sine humore nequeunt. 114.40  
Ranis lingua est. 60.1  
Ranæ lien. 28.40  
Raucedo sum. 128.10  
Rediuos quæ animalia habeat. 82.1  
Rediui unde oriuntur. 77.1  
Regulus auis. 117.40  
Reguli auiculæ fortitudo. 5.10  
Reminiscencia folijs hois. 9.30

## I N D E X.

Remora pisciculus an habeat pedes. 28.20  
Remoræ usus. 28.20  
Renes maxime pinguescunt. 43.40  
Renes testudinis marinæ. 29.20  
Renes uituli marini. 18.40  
Renes canum. 18.40  
Renes an sanguinē habeat. 19.1  
Renum mearus. 19.1 & 33.1  
Renum uenæ. 19.1 & 37.10  
Renes quæ habeant. 29.20  
Renum situs. 18.40  
Renum dexter quid differat à sinistro. 18.40  
Reticulus uentris sinus. 30.10  
Rhinobati piscis nomen. 91.1  
Ricinus proprius canum. 82.1  
Riparia auis. 8.30  
Romani pontifices quo pacto pace uisunt. 1.20  
Rostrū aues habet propriū. 26.30  
Rostrum auium ab osse quid differat. 40.1  
Rubecula. 159.1  
Rubelo omnis grauida capitur. 92.10  
Rubelio in alto uersatur. 122.40  
Rubeliones genus pisciū. 62.20  
Rubera occidit apes. 152.40  
Rubetæ lien. 28.40  
Rubetæ alimentum. 117.30  
Rubecula. 117.40  
Rubicilla. 117.40  
Ruminando delectantur animalia. 160.1  
Ruminantium uenter. 30.10  
Rupex ubi uictetur. 118.20  
Rutæ odor infestus serpentibus est. 137.30  
Ruticilla. 159.1

**S** Al facit ut pecudes maturius coquant. 98.30  
Salamandra igne non absumitur. 77.20  
Salamandræ nomen est græcum & latinum. 3.40  
Sale si mulier immodicè utitur, sine unguibus infans nascitur. 110.1  
Salinum quid nuncupemur. 41.20  
Sandaracæ. 79.1 & 152.20  
Sandaracæ ueneno iumenta intereunt. 129.30  
Salpa quid edat. 116.20  
Salpa liquide audit. 58.10  
Salpa autumno parit. 68.10  
Salpæ pisci fiercus cibus est. 68.10

Salpa semel parit. 67.30  
Salus auis. 142.1  
Sanguine carentes animantes non habent uiticus. 56.30  
Sanguis in fœminis. 45.1  
Sanguine abundat mulier. 45.1  
Sanguinē habentia magis adolefcunt. 11.10  
Sanguis affini. 44.30  
Sanguinem quæ multum, quæ non multum habeant. 44.20  
Sanguinis uasa. 44.10  
Sanguis integer qualis, qualis corruptus sit. 44.20  
Sanguinis integri sapor. 44.20  
Sanguis temperatus quibus sit. 44.20  
Sanguis concrefcit. 44.20  
Sanguis quorundā non coit. 44.20  
Sanguis taurorum concrefcit celerrime. 44.20  
Sanguis quorundam fibras non habet. 38.30  
Sanguis bubali quo pacto concrefcit. 38.30  
Sanguinis & uenarum natura uidetur principium. 34.20  
Sanguinem quæ habeant. 10.10 & 11.20 & 28.30  
Sanguis rubentior quibus multum carnis est. 43.20  
Sanguis in animalibus. 10.10  
Sanguinem à carne ebibi. 35.10  
Sanguis sensu caret. 44.10  
Sanguinem non habent quæ pedibus pluribus quam quaternis constant. 10.10  
Sanguinea facile putrent. 44.30  
Sanguis hominis. 44.30  
Sanguinis mitrendi ratio. 35.10  
Sanguis putrefcens pus fit. 44.40  
Sanguinis profluuium unde ueniat. 44.40  
Sanguis nigrior quibus parum carnis. 45.20  
Sanguinis participes pisces sunt. 28.1  
Sanguis non spissari potest fibris detractis. 38.30  
Sanguis communis omnium est. 34.10 & 44.10  
Sanguinē quæ habet, iecore prædita sunt. 28.40  
Sanguis in dormientibus interiora petit. 44.40  
Sanguis ex sanguine fit. 44.40  
Sanguis palpitat. 44.30  
Sanguis sparsus est per totum corpus. 44.30  
Sanguis primū oritur in corde. 44.30

# I N D E X.

- Sanguine effuso uita interit. 44.30  
Sanguine ualde humefcete mor-  
bus infestat. 44.40  
Sanguis cordis tenuissimus ubi  
fit. 18.20  
Sanguinis & uenarum difficilis  
cognitio. 34.20  
Sanguis in uenis continetur .  
34.30  
Sanguinis aliquid in corde est fi-  
ne uenis. 34.30  
Sanguinis morbo minus infestā-  
tur mulieres quam uiri. 45.1  
Sanguis recipit discriminē ætatum  
ratione. 45.1  
Sanguis in iuvene & sene. 45.1  
Sanguis nonnunquam in corpo-  
ribus concrefcit. 45.10  
Sanies fibris continetur. 38.20  
Sanies quibus fit cōmunis. 34.20  
Sanies quid fit. 45.10  
Sanies in animantibus. 10.10  
Sarda piscis adeundo pontum ca-  
pitur. 123.10  
Sarda bis parit. 67.30  
Sardē unde oriantur. 94.20  
Sardinae unde oriantur. 94.20  
Sargiaci gregarij sunt. 135.20  
Sargus bis in anno parit. 67.30  
Sargus quando coëat. 95.1  
Sargus autumnio parit. 68.10  
Sargi alimentum. 116.40  
Sargones quando pariant. 68.10  
Sarpes cū fert, cōmendat. 132.30  
Satherium unde querat cibum .  
119.30  
Saryrij cibis. 119.30  
Scamander amnis mutat oues .  
42.20  
Scapulæ. 15.20. & 39.1  
Scapulæ multis continentur ner-  
uis. 38.20  
Scarabei. 47.30  
Scarabei senectute exuuntur .  
125.40  
Scarabei gignunt ex uermibus .  
76.30  
Scarabei uirides unde oriantur .  
77.1  
Scarabei membrana uolant. 11.1  
Scarabeorū pennæ crusta tegunt.  
11.1  
Scarabei pilularij conduntur per  
hyemem. 77.1  
Scarabeis diu durat coitus. 66.40  
Scarabei quales habeant pennas.  
56.20  
Scarabeus litoralis piscis. 122.40  
Scarurus unus piscium ruminat.  
31.10. & 116.40  
Scarurus quid comedat. 116.20  
Scari uenter. 31.10  
Scari dentes. 27.40  
Scari branchiæ. 27.40  
Schadones crabronura quando  
fiant. 79.40  
Schadones quando optimæ. 79.1  
Schadones aliquando sine pedi-  
bus prodeunt. 79.10  
Schadones, quomodo transferunt.  
108.10  
Scolopendræ maris incubæ sunt.  
28.10  
Scombri gregales sunt. 135.20  
Scombri qñ coëant. 95.40  
Scordulæ ex ovo thunni prode-  
unt. 95.40  
Scorpionis aculeus. 56.10  
Scorpionis appendices. 31.20  
Scorpionis brachia. 56.10  
Scorpiones ubi pariant. 68.1  
Scorpiones uermiculos pariunt.  
80.10  
Scorpiones à suis liberis perimū-  
tur. 80.10  
Scorpiones quot pariant. 80.10  
Scorpio bis parit. 67.30  
Scorpiones ubi nocui, ubi non .  
131.40  
Scrophæ lac. 99.1  
Scrotum. 15.1  
Scrotum quod uocemus. 33.1  
Seythæ equabus grauibz equi-  
tant. 100.40  
Sebum ab adipe quid differt. 43.30  
Sebum piscium non concrefcit.  
43.30  
Sebo quæ pinguescant. 43.30  
Sebū q loco aialis cōsistat. 43.30  
Semen infecundū & fecundum  
quale fit. 106.40  
Semen genitale omnia emittunt  
quibus sanguis est. 47.1  
Semen genitale quando genere-  
tur in animalibus, quandoq; fe-  
cundum fit. 69.20  
Seminis qui plus reddant. 107.30  
Semen quando reddatur fecun-  
dum. 106.30  
Semen genitale piscibus copio-  
sum. 90.30  
Seminis generatio in hoīe quoto  
anno incipiat. 69.30  
Semen genitale cum spiritu exit.  
111.10  
Seminē emittendo quomodo di-  
ferant animalia. 9.40  
Semen genitale lentum est. 47.1  
Seminis genitalis color. 47.1  
Semē genitale frigore non coit.  
47.1  
Semē genitale in aqua probatur,  
an fecundum sit. 47.10  
Semina genitalia. 25.10  
Semperaffiones. 144.1  
Senectus generadi uim tollit. 71.10  
Senectute etiam pisces deteriores  
fiunt. 132.20  
Senectutem quæ exuant. 125.30  
Sensuum instrumenta. 16.20  
Sensus quot sint. 57.1  
Sentiendi uis lata est. 114.10  
Sepia mas feminā adiuuat. 133.30  
Sepia quomodo natet. 10.40  
Sepiæ corpus. 47.30  
Sepia quo loco pariat. 75.20  
Sepia caret sanguine. 10.10  
Sepiæ quo pacto capiant. 58.40  
Sepiæ arramenti usus. 148.10  
Sepia quomō oua foueat. 75.20  
Sepiæ maiores pisces uincunt.  
116.10  
Sepiæ promiscides habēt. 47.40  
Sepiæ qñ uterum ferant. 75.10  
Sepia uere parit. 68.30  
Sepia femina quid à mare diffe-  
rat. 68.30  
Sepiæ uita breuis. 75.30  
Sepia habet plurimum arramenti  
48.30  
Sepiæ optime sunt grauidæ. 132.10  
Sepiarum coitus. 66.1  
Sepiæ oua qualia sint. 75.1  
Sepiolæ quomodo ex ouis exeāt.  
75.1  
Sepiæ alius & oua. 49.1  
Sepiæ mas quid differat à femi-  
na. 49.1. & 75.30  
Sepiarum magnitudo. 48.10  
Sepia mas ouis aditis semen aspi-  
git. 92.20  
Sepiarum partus quō colloctur.  
74.10  
Sepiarum carunculas deustas ha-  
mis affigunt ad capiendos pisces  
58.20  
Sepium. 48.40  
σπυρίον medicamentū. 131.40  
Septūtransuerfum. 28.30. & 28.20  
Serpens marina. 147.20  
Serpens multelæ est aduersarius.  
134.40  
Serpēs feminæ maiores quā  
mares euadunt. 62.20  
Serpentes longum sibilum edunt  
60.1  
Serpentum linguæ bifidæ sunt. 31.1  
Serpentes

# I N D E X.

Serpentes sine cibo diu uiuunt.	119.1	Sexus discrimen in animalibus.	61.40	Simonidis cuiusdā carminis sententia.	67.10
Serpentibus pedes nō sunt.	28.20	Siciliæ agri leontini pascua.	43.40	Sincipiti cerebrum subditiū est.	12.30
Serpentes quando exuant fenestam.	125.30	Siculi maris loca semper per brumā habēt dies alcyoneos.	67.10	Sinciput quæ pars sit capitis.	12.20
Serpētes testes non habent.	32.10	Siennesis medici Cyprii opinio de uenis.	34.30	Sinistra imbecilliora.	15.20
Serpentum caudæ renascuntur.	31.10	Silicea testa intesta coitum ignorant.	71.20	Sipharum lacus.	27.20
Serpentes oua ædunt in lucem.	11.40. & 33.40. & 34.1	Siliceo regmine operta olfactum habent.	59.1	Sirenis minor.	150.1
Serpentes quomodo moueantur.	11.1	Silpha exiit senectutem.	125.40	Sirenis maior.	150.1
Serpentum coitus.	64.40	Silua.	117.40	Sitta cum aquila pugnat.	134.30
Serpentum dorium.	39.20	Siluro quo loco fel positum sit.	29.10	Sittæ auis mores.	142.20
Serpentis uernatio, senectusue.	74.30	Silurus femina p̄ fiat mari.	132.30	Somniare multa præter hominē animalia.	60.40
Serpentum cor.	31.1	Siluri oua diu à mare custodiuntur.	93.10	Somniare quando pueri incipiunt.	61.30
Serpentum discrimina.	28.10	Siluri quomodo pariant.	93.1	Somnium nonnullos homines immutauit.	61.40
Serpentes pleriq̃ terrestres.	28.10	Siluri ouum quantum fiat.	93.20	Somnus & uigilia animalium.	60.40
Serpentes maris indigenæ.	28.10	Siluri branchiæ.	27.40	Somniant etiā recens nati pueri.	112.40
Serpentum lien.	31.1	Siluri morbus.	127.30	Sonus in animalibus quomodo elidatur.	59.20
Serpentes infidiosæ.	9.20	Simiarum umbilicus.	25.1	Sopistam Græci uocant Rhetorem.	5.1
Serpentum uulua.	30.40. & 34.1	Simiarum corporis quæ pars maior.	25.1	Spadones caluitij immunes sunt.	41.20. & 159.30
Serpentum uiscera.	30.40	Simiæ quibus causis degenerent.	25.1	Spargi p̄ces per æstatem parit̃r.	68.10
Serpentum arteria.	30.40	Simiæ plus temporis degunt p̄næ quàm erectiæ.	25.1	Spatagi echini.	54.20
Serpentum mare inhabitantium genera plura.	28.10	Simijs nates non sunt.	25.1	Spinax prolem recipere non potest.	90.20
Serpentem sacrum minutum fugiunt ali j magni.	132.1	Simiæ caudam non habent.	25.10	Spina.	15.20
Serpentes latent.	124.10	Simiæ partim hominem, partim quadrupedem referunt.	24.30	Spina constat uertebris.	38.40
Serpentum pulmo.	31.1	Simiæ species.	24.30	Spinarum in echinis usus.	55.1
Serpentum iecur.	31.1	Simiæ ubi pilosa sit.	24.30	Spina ossium initium.	38.40
Serpentum genus sanguineum.	11.40	Simiæ brachia.	24.40	Spina quibus sit cōmunis.	34.20
Serpentum oua.	83.20	Simiæ cilium.	24.40	Spinaces musteli quo loco continent oua.	90.1
Serpentum uenter.	30.40	Simiarum lacerti.	25.1	Spini auis cibis.	117.40
Serpentibus eadem partes quæ la ceris sunt.	30.40	Simiarum femora.	25.1	Spiratio animalium.	8.10
Serpentum lingua.	30.40	Simiæ binas mammarum papillas habent.	24.40	Spiritus quo pacto subeat caua pulmonis.	17.20
Serpentum fellis situs.	31.1	Simiæ habent partes interiores humanis similes.	25.10	Spongiarum genus triplex.	73.10
Serpentes quo pacto se exuant.	125.40	Simiæ quo pacto moueant pedes & brachia.	24.40	Spongiæ achilleæ.	73.10
Serpens mures persequēs.	137.30	Simiarum manus.	24.40	Spongiæ hirci.	73.10
Serpentum uiscus.	118.40	Simiæ omnia rudiora quàm homo habēt.	24.40	Spongiæ ubi nascantur.	73.1
Serpentes uini cupidi sunt.	118.40	Simiarum uestigiū quale.	24.40	Spongiorum alimentum.	73.20
Serpentes quid loco testium habeant.	32.20	Simiarum pedum officiū.	24.40	Spongij sensum inesse.	73.20
Serpentum semen genitale.	32.30	Simiæ rectæ sunt crassiore pilo q̃ homines.	24.30	Spōgij insunt bestioli q̃dā.	73.20
Serpentum oculos renasci.	31.10	Simiæ quibus cum homine conueniant.	24.30	Spongia renascitur.	73.20
Serpentum meatus in quibus cōtinetur semen.	65.20	Similares partes.	7.1	Spongiæ mollissime.	73.30
Serpentes cauernas subeunt.	9.1	Similares animalium partes quæ sint.	34.10	Spongia sensum creditur habere.	8.20
Serpentes cæciliæ.	92.30	Similari parte sensus continetur.	10.10	Spongia similiis plantæ est.	114.10
Serpentum uentriculus.	31.1			Spongiæ Helleis ponti quales sint.	43.30
Serpentes quale habeant intestinum.	31.1			Spongiæ calorem immodicū nō patiuntur.	73.30
Serum lactis.	46.30				
Seselim herbam edit cerua positum.	136.20				

# I N D E X.

- Spongiæ optimæ** quo loco reperiuntur. 73.30  
**Spongiæ** uivis q̄lis sit color. 73.30  
**Spongiorum** genus uocant aplyfias. 73.40  
**Spuriæ** quoties pariant. 67.30  
**Squama** pisces tantum integunt. 7.30. & 40.20  
**Squatina** quo loco fel positū fit. 29.10.  
**Squatina** bis parit. 67.40  
**Squatina** quando pariat. 68.10  
**Squatina** q̄modo pariant. 90.20  
**Squatina** duo partus. 91.1  
**Squilla** quo pacto coeant. 66.10  
**Squilla** quale ouum habeant. 51.1  
**Squilla** animal crusta intestum. 49.20  
**Squilla** mutantur. 132.20  
**Squilla** gibbæ quandiu uterum ferant. 74.20  
**Squilla** parua. 54.1  
**Squillarum** intestinum. 50.40  
**Stella** animal testia rectum, calida est. 72.40  
**Stellati** ex mustelorum genere quoties pariant. 67.40  
**Stellio** cum araneo belliger. 134.10  
**Stellio** mutat cutem. 125.30  
**Stellionum** morsus ubi exitiales sint. 132.1  
**Stelliones** quandiu lateat. 124.10  
**Stelliones** feminae maiores quam mares. 62.20  
**Stercus** cōmune animalibus. 34.20  
**Sternutamentum** qua parte agitur. 14.1  
**Stefichorus** de Alcyone. 67.20  
**Stirpes** quomodo proueniant. 63.20  
**Stirpium** alimentum. 63.20  
**Stirpibus** quid commune sit cum animalibus. 63.20  
**Scruma** morbus suum. 128.20  
**Sturnus** auis. 143.40  
**Sturnus** fecedit. 125.10  
**Styracis** suffusus fugat multa insecta. 58.40  
**Subaquila**. 145.10  
**Subare**. 96.30  
**Subnatale**. 15.10  
**Subulones** unde dicantur cerui. 136.30  
**Sudor** cruentus unde fit. 44.40  
**Sulphuris** odore intereunt insecta. 58.40  
**Sulphure** fugantur formicæ. 58.40  
**Sumen**. 14.40  
**Supercilia** hirsuta redduntur per senectutem. 41.30  
**Suppuratione** equi etiā infestantur. 129.20  
**Sura**. 15.40  
**Surdi** qui sunt, iidem etiam muti. 60.20  
**Sues syluestres** ab urbanis quid differant. 21.1  
**Sui** corpus hirtum. 20.40  
**Suum** uenter amplius. 30.20  
**Suum** uox ad coitum. 60.10  
**Suum** os. 24.20  
**Suum** mamma. 22.20  
**Sus** non amittit dentem ullum. 23.30  
**Sues** parum medullæ habent. 45.20  
**Sues** feminae dentes non habent exertos. 62.40  
**Suis** feminae genitale. 22.30  
**Suum** ferarum coitus & partus. 103.1  
**Suum** pedes. 21.30  
**Suis** cerebrum pingue est. 43.40  
**Sus** primo partu ædit paucos. 70.40  
**Sus** grandinem sola concipit. 128.40  
**Sues syluestres** peruicaces. 9.20  
**Sues** gaudent pabuli mutatione. 128.30  
**Suum** pediculi. 82.1  
**Suum** morbi. 128.10  
**Sues** cum excitantur libidine, ag-grediuntur homines. 97.10  
**Sues** uirulentos ictus minime sentiunt. 113.40  
**Sues** quibus rebus pingues fiant. 120.10  
**Sus** lupo obfistere potest. 120.10  
**Suis** uiui & mortui pōdus. 120.10  
**Sus** præcipue radicibus gaudet. 119.40  
**Sus** facile pinguescit. 120.1  
**Sues** capite sæpe laborant. 128.20  
**Sues** laborant alui profluuiio. 128.20  
**Sues** quando rauescunt. 128.20  
**Sues** quo pacto curandi. 128.20  
**Suis** urbani & feri differētiæ. 103.1  
**Sues** feri quo pacto castrantur. 103.1  
**Sues** fieri faciunt. 96.10  
**Sues** fieri quomodo se arment. 96.10  
**Sues** quo pacto grandinosi fiant. 128.20  
**Sus** annum quintumdecimum nacta, non generat. 70.40  
**Sus** fera femina melior est mare. 103.1  
**Sus** ferus quādiu cū feminis conuerferur. 103.1  
**Suem** altero oculo amisso, breui extingui. 98.1  
**Sus** quor annos uiuat. 98.1  
**Sus** pinguis procliuior ad coitū. 70.40  
**Sus** pinguis ferra minus habet lactis. 70.40  
**Suis** proles quando optima. 70.4  
**Sus** mas si pinguis est, omni anni tempore inire potest. 71.1  
**Sus** quo pacto aliquando coeat. 70.1  
**Suis** concipientis signa. 71.1  
**Sues** in terra Illyriorum. 21.30  
**Sues** in Pæonia solidos pedes habent. 21.30  
**Suibus** quomodo pendeant testes. 32.20  
**Sues** quot menses uterum ferant. 97.40  
**Suum** coitus. 97.40  
**Sues** quando incipiāt coire. 70.10 & 67.1  
**Sus** femina quando pariat. 70.10  
**Supercilia** iuxta nasum inflexa. 12.40  
**Supercilia** sub fronte. 12.40  
**Supercilia** indicant animū. 12.40  
**Supercilia** recta mollem arguunt animum. 12.40  
**Suturæ** quot sint in calua uiui. 39.1  
**Suturæ** caluæ. 12.30. & 38.40  
**Syraculis** quomodo potator quidam, ouis terra obrutis, excluderit fœtum. 84.20  
**Syria** quales oues habeat. 130.40  
**Syriæ** mulorum genus. 105.1

## T

- T**abanus anteriore parte aculeum gerit. 11.10  
**Tabani** quomodo moriantur. 78.1  
**Tabani** os. 52.40  
**Tabanis** qualis lingua. 52.40  
**Tabani** sanguiuori sunt. 121.20  
**Tabani** unde nascantur. 77.1  
**Tabificis** pili crescunt. 41.40  
**Tactus** hominis. 16.20  
**Tactus** omnibus animalibus cōmunis. 10.40. & 57.10  
**Tactus**

# I N D E X.

Tactus in qua parte corporis con-  
sistat. 10.10  
Talpa oculis caret. 13.10  
Talpe oculorum uestigium quo-  
modo inueniatur. 13.10  
Talpe domiciliū sibi parant. 9.1  
Talpis uisus deest. 57.1  
Talparum oculi. 57.10  
Talum quo loco cōtineant. 21.40  
Talum quæ habeant. 21.40  
Tauri genitale membrum rigidū  
est. 64.10  
Tauri Epiri. 97.10  
Tauri tempore coitus cum fœmi-  
nis, aliās non. 97.10  
Tauri quando fœuiant. 96.20  
Tauris robustiora sunt quā uac-  
cis cornua. 62.40  
Taurorum sanguis citō durescit.  
44.20  
Tauri sanguis crassius. 44.30  
Tempora capitis pars. 14.1  
Tempora hominum celerius ca-  
nitē sentiant. 41.10  
Tendo quæ pars sit. 38.10  
Teredo similis crabronibus est.  
155.40  
Terre intestina, quæ uocant, ubi  
quomodoq; generentur. 94.40  
Terre intestina pariunt anguillas  
94.40  
Terrestre animal qbus ex causis  
dicatur. 115.30  
Terrestriū animantiū diuīsiō. 8.10  
Teſta inſecta oīa latent. 123.30  
Teſtaceorum os. 52.40  
Teſta inſectorū nullum eſt diſcri-  
men in ſexu. 61.40  
Teſta inſecta omnes ſenſus ha-  
bent. 58.30  
Teſta inſecta optima, cum graui-  
da ſunt, habentur. 132.10  
Teſta inſecta plātis ſimilia. 114.10  
Teſta inſectorum animalium de-  
ſcriptio. 52.1  
Teſtis inſcluſa unde oriant. 71.30  
Teſtarū uarietas magna eſt. 52.10  
Teſtes. 19.10  
Teſtibus iā exēptis, initu prius  
aſto, taurum progeneraſſe. 33.10  
Teſtes ouiparorum. 32.30  
Teſtes q animalia nō habeāt. 65.20  
Teſtium in animalibus ſitus. 32.10  
& 159.20  
Teſtes elephantī. 22.30  
Teſtibus dolentibus unde mitta-  
tur ſanguis. 35.20  
Teſtes auium quādo grandiores  
efficiantur. 89.20

Teſtes gemini. 15.1  
Teſtes cuius naturæ. 15.1  
Teſtes qbus rebus contineant. 33.1  
Teſtes non ſunt piſcibus. 27.20  
& 32.10  
Teſtium capita accipiunt uenas  
ex aorta & a renibus. 33.1  
Teſtium flexuoſi meatus. 33.1  
Teſtium meatuum deſcriptio. 33.1  
Teſtibus exciſis quid meatibus eo-  
rum accidat. 33.1  
Teſtudinum coitus. 64.30  
Teſtudo ex genere ouiparo ſola  
haber ueſicam. 43.1  
Teſtadini amarū quiddam ineſt.  
54.40  
Teſtudinis teſtes. 32.20  
Teſtudines marinq; non uidentur  
poſſe abſq; aqua uiuere. 114.40  
Teſtudo cum ederit uiperam, cu-  
nilam edit. 137.20  
Teſtudo marina renes habet. 29.  
Teſtudinis oua. 82.40 (30  
Teſtudinis uenter. 30.30  
Teſtudinis lien. 28.40  
Teſtudinum marinarum cibus.  
115.40  
Teſtudines lutarię humore carere  
non poſſunt. 114.40  
Teſtudo lutaria quo loco pariat  
oua. 83.1  
Teſtudines marinq; quot oua pa-  
riant. 83.1  
Teſtudines habent ueſicam. 65.20  
Teſtudo eſt in genere oua parien-  
tium. 65.30  
Teſtudines abruptum ſibulum æ-  
dunt. 60.1  
Tetrix ubi pariat. 84.1  
Tetrigometra. 81.20  
Themifcytæ apes. 79.20  
Thos quales intus partes habeat.  
30.20  
Thoës uocant lupo ceruarij. 156.30  
Thorax hominis. 12.20  
Thoracis pars. 14.30  
Thunna quando pariat. 68.10  
Thunna ſemel parit. 67.30  
Thunnus mas diſert a fœmina.  
67.30  
Thunni aſilo uexantur. 127.10  
Thunni quando coeant. 95.40  
Thunni quid comedant. 116.20  
Thunni pingues ſunt. 95.30  
Thunni gregales piſces. 8.40  
& 135.20  
Thunnos quomō capiāt. 61.10  
Thunnus poſt arcſurum melior.  
122.40

Thunni dextro oculo magis ui-  
dent. 123.20  
Thunni ubi lateant. 124.20  
Thunni laues ſunt. 27.40  
Thunni ubi pariant. 68.1  
Thunnus quantus uiſus capnisq;  
ſit. 132.30  
Thymo deſeſtantur apes. 153.10  
Tibia. 15.40. & 39.10  
Tibia hominis. 21.30  
Tilloni piſci qd accidat. 127.30  
Tineę naſcunt in lana, ſi araneus  
includatur. 82.20  
Tineę qbus lanis innāſcant. 82.20  
Tineę unde naſcantur. 76.1  
Tinunculus raro bibit. 118.30  
Tinuculus auis fœcūdus eſt. 83.40  
Tinunculi ouum rubrū eſt. 84.10  
Tinunculi uentriculus. 31.30  
Tiphæ tollunt grādines ſui. 128.30  
Tipulę unde oriantur. 76.30  
Tipulę in quo genere aquæ cele-  
rius proueniant. 76.40  
Tirſio lac habet. 91.20  
Toſus lapis unde proueniat.  
44.40  
Tonitru, incubante gallina, oua  
pereunt. 84.40  
Tonſillę. 14.20  
Torpedo ex cartilagineis. 65.10  
Torpedo quomodo capiat piſces  
147.10  
Torpedinis fel. 29.10  
Torpedines quomō pariat. 90.20  
Torpedinis numeroſus fœt. 90.  
Torpedo quādo pariat. 68.10 (20  
Torpedinis branchię. 27.30  
Torquilla auicula unde appella-  
ta. 26.30  
Trix pilare malū i māmīs. 113.10  
Trix auiculę cibus. 118.10  
Triſci herbā comedūt canes ad-  
uerſus lumbricos. 137.30  
Trochil. cū aquila pugnat. 134.30  
Trochilus aquas amat. 113.20  
Trochili ingenium. 140.20  
Trochili aues purgant dentes cro-  
codili. 137.20  
Trogloditę unde dicant. 121.40  
Tuber cameli. 21.10  
Tubera. 52.10  
Tuberū natura carnoſa eſt. 114.10  
Turbinatorum differentiæ. 52.30  
Turbinatorū genus omne ſe mo-  
uet. 52.20  
Turdus mutat colorem. 158.40  
Turdorum genera tria. 143.1  
Turdorum nidi. 84.1  
Turdus etiam latet. 125.10

# I N D E X.

Turdus in litore uersatur. 122. 40  
Turdi branchiæ. 27. 40  
Turdulorū gentis costæ. 15. 20  
Turtur. 69. 10  
Turtur & luteus pugnāt. 134. 10  
Turtur cū ignaria dissidet. 134. 10  
Turtur bina parit oua. 83. 40  
Turturi euenit crepit⁹ alui. 159. 10  
Turturis cibus. 118. 1  
Turturum uita. 138. 30  
Tyrannus auicula. 117. 40

## V

Accarum urina. 97. 30  
Vaccæ purgatio à partu. 92. 20  
Vaccarum libido. 97. 1  
Vaccæ inciduntur uenere. 96. 30  
Vaccæ minores natu ad coitum proniores. 97. 1  
Vaccæ coitum affectantis purgatio. 92. 20  
Vaccam anniculam peperisse. 70. 30  
Vaccæ cum grauida sunt & patiuntur marē, portendit hyemes & imbres. 100. 10  
Vaccæ quando coctant. 99. 40  
Vaccæ quandiu uterum gerant. 99. 40  
Vaccis infirmiora quā tauris sunt cornua. 62. 40  
Vaccis quandiu lac durer. 46. 40  
Vaccarū conceptus indicii. 92. 30  
Vaccæ tauros quare raro ferant. 64. 10  
Vaccas quasdam nominant setauras. 120. 20  
Vaccæ coitum cupientes crebrius mingunt. 97. 1  
Vaginipennes q̄ uocentur. 11. 1  
Varices quibus sunt, minus caluesunt. 42. 1  
Varices ex q̄ materia fiāt. 44. 40  
Vbera fungoia sunt mulierum. 113. 1  
Vberum diuersitas. 106. 30  
Velæ auis descriptio. 142. 10  
Venarum concursus. 17. 40  
Venę hominis quō modo cōstent. 34. 30  
Vena in animalibus. 10. 10  
Vena maior qua re constat. 36. 10  
Venæ quomodo per corpus spargantur. 35. 20. & 35. 10. & 38. 1  
Vena aorta. 35. 40  
Vena aorta neruosa est. 38. 1  
Venæ hominis. 18. 20  
Venæ in utero. 11. 40

Venæ multæ ac tenues sparſæ in iecur oblitterantur. 37. 1  
Vena maior quas corporis partes adeat. 36. 10  
Vena maior oritur in cordis sinu maximo. 36. 10  
Venę iugulariæ. 35. 20. & 36. 30  
Vena lenis. 37. 1  
Vena omenti. 37. 10  
Vena pancrei. 37. 10  
Venæ aortæ gressus. 36. 40  
Vena communis omnibus quibus sanguis est. 34. 20  
Venæ sanguinis conceptacula. 44. 10  
Venarum ortus. 35. 30  
Venarum cognitio unde possit haberi. 35. 40  
Venæ ad testes tendentes. 35. 10  
Venę seminariæ. 35. 10  
Venæ sunt arctiores quibus multum carnis est. 43. 20  
Venę ad uescicam peruenientes. 37. 20  
Venæ ad genitalia peruenientes. 37. 30  
Venæ ad uterū pertinentes. 37. 30  
Vena transiens iecur. 18. 40  
Venæ quæ ad renes perueniunt. 37. 10  
Venarum aortę & maioris in capitis renum figura. 37. 10  
Venæ quo pacto cor cōplectantur. 35. 40  
Vena cuius meminit Homerus. 36. 20  
Vena ad cerebrum perueniens. 36. 30  
Venę nō omnibus eadem. 37. 40  
Vena maior etiam in paruis animalibus euident est. 37. 40  
Venæ principales abolentur in mortuis animalibus. 34. 20  
Venarū & sanguinis natura principium putatur. 34. 20  
Venter. 14. 40  
Venter simplex quibus sit. 30. 20  
Venter auium. 26. 20  
Venter piscium. 31. 10  
Venter hominis. 30. 20  
Venter arctior est ijs quæ habent multam carnem. 43. 20  
Ventris differentia. 30. 1  
Ventris quaternos sinus quæ habeant. 30. 10  
Venire plurima pinguescunt. 43. 40  
Ventris situs in animalibus. 30. 1  
Ventriculus. 9. 40

Ventriculus serpentum. 31. 1  
Ventriculus humanus qualis. 17. 30  
Venti spongias reddūt duriore. 37. 30  
Vento quædam concipiunt. 63. 30  
Venus quo ætatis tempore uitanda puellis sit. 106. 10  
Venereę uoluptatis cupidine gestuunt omnia animalia. 96. 10  
Venere non ualentes. 9. 20  
Ver tempus plurima animalia excitat ad uenerem. 66. 40  
Vere piscium conceptus agitur. 68. 20  
Verbascio herba moriūtur piſces. 127. 40  
Veretile quale animal. 56. 40  
Vermes ex quibus prodeunt insecta. 76. 10  
Vermes quales sint qui in capite ceruorum nascuntur. 29. 1  
Vermiculi araneorum. 80. 20  
Vermes nati in aridis lignis fiunt scarabei. 76. 30  
Vermes ex niue fiunt. 77. 10  
Vermium generationis primordium. 76. 40  
Vermium oua. 10. 30  
Vermium differentia. 10. 30  
Vertebre foramine medio peruię sunt. 38. 40  
Verticem quam partē caluæ uocemus. 12. 30  
Vertices duas habentes. 12. 30  
Vertibula. 52. 10  
Vertibula olfactum non habere. 59. 10  
Vertibuli excrementum. 55. 10  
Vertibuli os. 55. 20  
Vertibulorum color. 55. 20  
Vertibula quæ appellantur. 8. 20 & 55. 1  
Vertibula ubi nascantur. 72. 30  
Vescicam membranam esse. 43. 1  
Vesica ualde tendi potest. 43. 1  
Vesica quibus animalibus data sit. 43. 1  
Vesica ouipari generis soli testidini data est. 43. 1  
Vesica in defunctis nullum recipit humorem. 43. 1  
Vescicam quæ non habent, idem meatus sicco & humido excremento est. 65. 20  
Vescicę situs. 19. 10  
Vesica hominis. 19. 10  
Vescicam quæ habent, habent & alium. 9. 40  
Vesica



# I N D E X.

Vesica præcisâ coire nō potest.	43.1	Vires hircescere quid sit.	70.30	Vngues ab offe differunt.	40.1
Vesica recipit etiam sicca.	43.10	Virellus oui.	85.10	Vngues animalibus communes.	
Vespræ.	8.10. & 47.30	Viriligo uitium cutis.	41.10		34.20
Vespræ intrus conditum habent a-		Vitta quor habeat pinnas.	27.20	Vngues in quibusdam durissimæ	
culum.	56.10	Vitulo marino pedes sunt.	8.30		40.40
Vesparum fœtura.	79.40		8 & 20.20	Vngues hominis.	40.20
Vespris diuulsis non deest uiuaci-		Viruli marini inuicem pugnant.		Vngues habent quibus sunt digi	40.10
tas.	56.1		131.30	ti.	
Vespræ quomodo capiâtur.	154.1	Virulus marinus non habet auri		Vngues omnes aues habent.	
Vesparum uermes.	76.10	culas.	13.40		26.10
Vespræ ubi nidificent.	79.30	Viruli marini aqua carere nō pos		Vngues quo loco generentur.	
Vespræ phalangia perimūt.	77.30	sunt.	114.40		72.20
Vespa animal ciuile.	8.40	Vitulorū tempus castradi.	159.40	Vngues quæ aues habent, calcare	
Vesparum genera.	154.10	Viruli marini coitus.	64.30	carent.	27.1
Vespræ quibus locis & temporibus		Virulis marinis maribus grande		Vniualue qd genus uocet.	52.10
orientur.	155.1	genitale est.	64.30	Vocæ gregales sunt.	135.20
Vesperilio cute uolat.	11.1	Virulus marinus mammas habet		Vola quæ manus pars sit.	15.40
Vesperilio acerabula habet uul-			45.30	Vola scissuræ indices longitudi-	
uæ.	34.10	Viruli marini cauda.	20.30	nis uitæ sunt.	15.40
Vesperilio noctu uagatur.	9.1	Viruli marini renes.	18.40	Vulcres quo genere testis regan	
Vesperilioni pedes sunt.	8.30	Virulorum uox.	70.1	tur.	26.40
Vigilia & somnus animalium.		Virulus marinus lingua scissa est.		Volucrum cauda.	26.40
	60.40		31.1	Volucres quomodo uolēt.	10.40
Vinago quid edat.	118.1	Virulus marinus ambiguum ani		Volucrum differentiæ.	8.20
Vinago columba.	69.10	mal.	91.30	Volucres multæ partum eiciunt	
Vinago duo oua parit.	83.40	Viruli marini partus.	91.30	ex nido.	88.10
Vinum cōuulsioni causa.	113.20	Virulus partum nutrit mammas		Volucres quæ gregales.	8.40
Vinum nocet grauidis.	110.10	& lacte.	91.30	Volucrum agrestium domicilia.	
Viperæ uino capiuntur.	118.40	Viruli marini descriptio.	91.40		140.10
Viperæ sub saxis condunt.	124.10	Virulo marino mugit in somno		Volucres in aqua degentes.	8.1
Vipera animal gignit.	11.40		91.40	Volucrum tempus ad uenerem.	
& 83.10		Viruli marini genitale.	91.40		67.1
Vipera quo tempore exuat senec-		Virulus marinus fel non habet.		Voluptas animalium in quo con	
stutem.	125.30		29.1	sistat.	114.20
Viperæ uulua.	34.1	Viruli marini dentes serrati sunt.		Vox feminarum acutior.	62.30
Vipera quo pacto generet.	35.40		23.20	& 69.40	
Vipera deuorat scorpionum.	132.1	Vierra.	4.1	Vox differt à sono.	59.20
Vipera quor pariat.	83.10	Vierra genitale.	22.40	Vox equarum & equorū.	69.40
Viperæ ouum.	83.10	Viupara quæ sint.	11.30	Vox hominis qñ mutetur.	105.40
Vireo auis.	143.10	Vlna.	15.30	Vocis murano indicat tempesti-	
Vireo docilis est.	142.10	Vlula.	117.30	uam ueneri atatem.	69.30
Vir ad coitum hymene procliuior.		Vlula colarem rapit.	134.10	Vocis differentiæ.	60.30
67.1		Vlula descriptio.	142.20	Vox qua re sine mutatione serue	
Vir quandiu sit habilis ad gene-		Vmbilico aluntur animalia in u-		tur.	106.1
randum.	70.30. & 110.20	tero.	111.20	Vocales quomodo proferantur.	
Vir impubes.	106.20	Vmbilicus pulli oritur à corde.			59.20
Vir calua quor futurus habeat.			86.30	Vpupa parit sine nido in cauis.	
12.30		Vmbilicus simiæ.	25.1		84.1
Vir mores.	133.20	Vmbilici quando sua oua habeāt		Vpupa mutatur colore.	158.30
Vitus crocodili.	25.30		69.1	Vpupæ nidificatio & partus.	142.1
Virtutes unde commodè accipi-		Vmbilicus pars uentris.	14.40	Vpupæ montium incolæ.	9.10
antur.	5.1	Vmbilici animalcula resta intacta		& 140.20	
Vitui certa sedes est.	57.20	sunt.	52.1	Vragem quam auem Athenien-	
Vita breuis quibus sunt rariores		Vngulæ ab offibus differūt.	40.1	ses uocent.	84.1
dentes.	23.40	Vnguium & ungularum incre-		Vrina quadrupedum crassior q̃	
Vitæ ambiguae animalia quæ sint		mentum augetur in senectute.		hominum est.	97.30
114.30			42.1	Vrinæ distillationib⁹ aptum me-	
Vita longior quibus sunt plures		Vnguium discrimina.	40.20	dicamentum.	54.30. & 137.40
dentes.	23.40	Vnguium color.	40.1	Vrinatrices.	8.1

# INDEX.

Vrinatrix aquas adamat. 118.20  
 Vrisa urfo animosior. 133.20  
 Vrisa qua causa lateat, ambigitur. 135.30  
 Vrisi uenter amplior. 30.20  
 Vrisa propter suos canulos ferociunt. 96.20  
 Vrisi seuiunt coitus tempore. 96.20  
 Vrisus morfu bibit. 119.40  
 Vriso corpus hirtum. 20.40  
 Vrisorum coitus. 64.10  
 & 103.40  
 Vrisa fugientes suos portant catulos. 137.1  
 Vrisi arum herbā comedunt cum ē lanbulo egrediuntur. 125.20  
 & 137.10  
 Vrisus animal omniuorum est. 119.10  
 Vrisus quo pacto suos feros capiat. 119.20  
 Vrisus qua ratione uincat taurum. 119.20  
 Vrisi incesus. 119.20  
 Vrisa uterum fert triginta dies. 103.40  
 Vrisa fetus parius. 103.40  
 Vrisa latet. 103.40. & 125.20  
 Vrisa quando prodeat cum suis catulis. 125.20  
 Vrisa feta non capitur. 125.20  
 Vrisi intestinum. 125.20  
 Vrisa quot mammas habeant. 22.10  
 Vritica adharet saxi. 55.20  
 Vritica caro. 55.20  
 Vritica os. 55.20  
 Vritice genus a saxi aberrat. 55.30  
 Vritica excrementum non habet. 55.30

Vriticarum genus duplex. 55.30  
 Vritica per hyemem cibo sunt idonea. 55.30  
 Vritica aestate rarefcunt. 55.30  
 Vritica ubi nascantur. 73.1  
 Vritica natura carnofa est. 114.10  
 Vritica piscibus uescantur. 115.40  
 Vritice genus duplex. 73.1  
 Vritica genus quoddam. 8.20  
 Vterus foeminae propria pars. 14.40  
 Vterus est uuluae pars interior. 33.20  
 Vterini fratres. 33.20  
 Vteri situs. 19.20  
 Vuae nominae quae uocentur. 14.1  
 Vulneratam uesciam aliquando curatam. 43.1  
 Vulpanfer. 118.30  
 Vulpi cum circo accipitri inimici sunt. 134.20  
 Vulpi genitale osseum. 22.40  
 Vulpes quot pariat. 104.30  
 Vulpes grauida secedit. 104.30  
 Vulpes cum serpente amice uiuit. 135.1  
 Vulpium ingenium. 9.20  
 Vulpecula cute uolat. 11.1  
 Vulpeculis piscibus quis generandi modus. 90.10  
 Vultures quot oua pariant. 87.40  
 Vulturum genera. 117.30  
 Vultures ex diuerso orbe aduolare opinio fuit. 87.40  
 Vultur ubi nidificet. 87.40  
 Vultur & asalo inimici sunt. 134.40  
 Vultur repugnat aquilae. 134.40  
 Vulua pars foeminae propria. 15.1

Vulua quo pacto paranda fit, ut concipiat. 107.40  
 Vulua animalium. 19.20  
 Vulua testudinis. 33.30  
 Vulua serpentum longa est. 34.1  
 Vuluae ceruix matrix uocatur. 33.20  
 Vulua bipedi & quadrupedum omnium infra septumtransuersum. 33.20  
 Vuluae auium iuxta septumtransuersum. 33.20  
 Vuluae piscium. 33.30. & 89.20  
 Vulua serpentum. 30.40  
 Vuluae non sunt similes omnium. 33.1  
 Vuluae sinus geminos habent iuxta genitale. 33.20  
 Vuluae initium quale sit. 33.20  
 Vulua supra aluum est. 34.1  
 Vuluae acetabula quae habeant. 34.1  
 Vuluae pars interior quibus nominibus appelletur. 33.20

## X

X Anthum pro scamandro  
 Homerum dixisse. 42.20  
 Xylophthorus uermiculus. 82.30

## Z

Z Ephyria oua. 84.40

FINIS.

# IN RELIQVOS

Aristotelis de animalibus libros Index.

A



Cetabula quæ habeant. 256.10  
Adeps & seuū quid differat. 175.1  
Aduſta habent caliditatem omnia. 172.20

Africa quare ſemper aliquid noui adferat. 256.40  
Alimentum qua ratione diſſeretur natura. 254.40  
Alimenti ratio duplex. 255.1  
Amiæ fel. 201.40  
Anaxagoras de maris & ſæminæ generatione. 274.30  
Anguillæ quo pacto nentur. 220.40

Anima an in ſemine ſit. 244.30  
Animæ plena omnia. 272.40  
Animæ officiū. 176.40  
Animæ præſtantia. 241.10  
Anima uegetalis. 246.10  
Animalium munus. 240.30  
Animalia quor modis generentur. 223.30

Animalia uitæ breuiſſime. 107.40  
Animalium & plantarū quodāmodo ſimilis generatio eſt. 271.40  
Animalium magnitudinis meta. 255.1  
Apes ſucos generant. 271.40  
Apes ſine coitu generare. 271.30  
Apes officiōſæ ſunt. 271.10  
Apes ſequunt ſuos reges. 271.10  
Apes à regibus proficiſci. 271.10  
Apes multæ à regibus paucis generantur. 271.20  
Apum ſæus quando ſuperetur. 271.10

Apum reges à laboribus immunes ſunt. 271.10  
Apum reges uidentur nati ad ſobolis procreationem. 271.10  
Apum duces quomodo generentur. 271.20  
Apum reges alijs apibus maiores ſunt. 271.20

Araria ex qua materia conſtit. 190.30  
Arbores quomodo naſcantur. 223.1

Aſina quandiu ferat uterum. 258.40

## INDEX

Aſina conceptus incontinens eſt. 258.30

Aſinæ mammæ. 214.30  
Aſinus frigidū animal eſt. 258.30

Aſinus ubi non ſit. 258.30

Aſinus fel non habet. 201.40

Aues quædam cæcos pariunt pullos. 286.10

Aues ſæminæ minus uenerem appetunt quàm mares. 285.10

Auium uterus. 225.10

Auium oua bicolora. 259.40

Auium & piſcium generationes cur differant. 265.10

Aues uncæ ſalaces nō ſunt. 260.10

Auibz menſtruorū deceſſio non ſit. 261.1

Auium uenter. 199.30

Aues acuti uifus ſunt. 182.40

Auibz omnibus teſtes ſunt. 219.10

Auium meatus auditorij. 182.10

Auium lingua. 185.40

Auium generatio ex ouo. 265.10

Aues hyperinæ ſiunt. 260.40

Auibz qualis cura erga prolem. 263.30

Aues quid inter ſe differant. 218.1

Aues quæ propria habeant. 218.10

Aues carent mammis. 217.30

Aues quæ uolaces, quæ non uolaces ſint. 219.10

Auibz quibz dā pedes ad nandum apri. 219.20

Aues parue uolaces ſunt. 260.20

Aurium ſitus in quadrupedibus. 182.1

Aurium meatus. 181.20

B

Bifida perfectū animal pariunt. 285.40

Bonafis cornua inutilia ſunt. 189.1

Boues quidam quomodo paſcuntur. 184.30

Boum teſtes. 225.10

Brachiorum flexus. 213.30

Branchiarū multitudinis & paucitatis cauſa. 221.20

Buccina quomodo regatur. 205.1

Buccina quid loco ſeminalis naturæ emitat. 272.20

Buccinæ ouum. 274.1

C

Cæcos quæ pariant. 286.1

Cæpe quomodo ſobole o-

riantur. 272.20

Calidiora quæ ſint animalia. 242.20

Calidius quid ſit. 171.40

Calor mouet. 241.30

Caloris participia omnia uiuentia. 173.20

Cameli fel. 201.40

Cameli mammæ. 214.30

Cancellorum pedes. 209.40

Canes Indici unde generentur. 256.40

Canis cæcos generat. 252.1

Canum mammæ. 214.10

Canis catuli. 286.1

Cancrorum dentes. 204.30

Capitis ſanguis temperatus. 211.40

Capræ mammæ. 214.30

Caprarum uenter. 199.20

Cartilagineorum generatio. 227.30

Cartilagineorum oua. 259.40

Cartilaginea quo tegumenti genere conſtit. 221.40

Cauda animalium. 183.30

Cauda piſcium. 220.20

Caudam quæ habeant. 215.10

Caudarum differentiæ. 215.30

Cauſarum genera. 223.10

κεφάλων uas fictile ſignificat. 253.10

Cerebrum calorem corporis moderatur. 177.1

Cerebri fluxiones unde ſint. 177.1

Cerebri qui plus habeant. 177.20

Cerebrum bipartitum eſt. 196.1

Cerebrum quid à medulla diſſeratur. 176.20

Cerebri morbi. 177.30

Cerui cor. 193.20

Chamaeleo nimidiſſimus. 217.40

χόλια uocantur ſecundæ. 249.30

Cibus in ſemen conuertitur. 260.40

Cibi continentiora quæ ſint animalia. 200.30

Cicadæ quo pacto generentur. 230.1

Cicadarum natura. 107.30

Clunis auibus eſt. 219.40

Coagulum quæ habeant. 200.40

Coagulum ex qua materia conſtitat. 201.1

Cochleæ coſunt. 275.1

Cœleſtium rerum certior ſtatus, quàm terrenarum mortalium. 163.30

# I N D E X.

Caelum & solem cur parentis no-  
mine uocant. 224.20  
Coerunt animalia diuersi generis  
256.40  
Coitus prouocat mēstrua. 261.20  
Columba cecos generat. 286.10  
Columbarium bina parit. 260.30  
Columbarium genus saepe parit.  
260.10  
Collum. 190.10  
Colli usus. 212.1  
Collum habent quibus est pul-  
mo. 211.40  
Collum auium. 218.10  
Compositio rerum triplex est.  
169.10  
Conceptus fit sine uoluptate fœ-  
minę non raro. 237.1  
Conceptus habet in se animam  
uitalem. 246.10  
Concoquendi modus. 173.30  
Cor principium uenarum. 179.1  
Cor uitrijs nō obnoxium, ut alia  
uiscera. 193.30  
Cor quorundam animalium os  
etiam habet. 192.40  
Cor sanguinis initium. 170.30  
Cordis discrimina quod ad mo-  
res attinet. 193.10  
Cordis situs. 192.30  
Cordis in animalibus locus.  
191.30  
Cornix cecos generat. 286.10  
Cornua quibus sunt, non habet  
utrinque dentes. 190.1  
Cornuum constitutio. 188.30  
Cornuum usus. 179.40  
Cornua quomodo fiant. 253.10  
Costarum usus. 179.10  
Crabronum generatio. 271.30  
Crocodilo fluuiantili lingua non  
est. 216.20  
Crustati generis mas & femina.  
266.20  
Crustacea quomodo coeant.  
229.30  
Crustatorum dentes. 204.30  
Crustatorum summa genera.  
209.30  
Cuculus parum generat. 260.30  
Cutis generatio. 253.30

**D**  
Dama non habet fel. 201.40  
Definiendi usus Socratis  
temporibus increuit. 164.10  
Delphini testes. 225.10  
Delphini ossa. 179.20  
Democritus Abderites de gene-

ratione maris & feminae. 274.30  
Democriti falsa sententia. 257.30  
Dentes semper accrescunt. 255.1  
Dentes alijs decidunt, alijs non.  
255.40  
Dentium in animalibus usus.  
180.1  
Dentium hominis diuisio. 187.10  
Differētia uniuersalis, species ha-  
beat necesse est. 164.40  
Digni hominis breues quare sint  
in pedibus, in manib⁹ uerō lon-  
gi. 216.10  
Digitorum compositio ingenio-  
sa. 213.20  
Diuidendi ratio. 164.40  
Diuini officium. 212.10

## E

**E**chinus optime munit⁹ est.  
205.10  
Echini ouum. 105.40  
ἐκ τῆς ἐσώτης, id est retraheretur.  
164.10  
Elementorum compositio. 169.10  
Elementorum naturalium initium  
171.40  
Elephanti nasus. 184.10  
Elephantis quid sit loco narium.  
218.10  
Empedoclis error. 274.30. &  
257.40  
Epipetrum Parnasus fert. 106.30  
Equa menstruosa non est. 285.10  
& 258.30  
Equa grauida coitum patitur.  
285.1  
Equae mammae. 214.30  
Equus felle caret. 201.40  
Equi qui mammas habent. 214.30  
Equi genitura calida est. 258.40  
Excrementorum meatus diuersi.  
228.40  
Exercitatio dum mulier gestat u-  
terū, facit ut facile pariat. 286.40

## F

**F**acies hominis. 188.30  
Fel quae animalia habeant.  
201.40  
Fel quo loco animalia habeant.  
201.40  
Fibrae in sanguine terrenae sunt.  
174.10  
Fieri aliud ex alio. 233.30  
Femina praeber hospitium semi-  
ni. 276.20  
Femina quare sanguine abun-  
det. 276.20

Feminae quae saepe generant, mi-  
nus libidinosae sunt. 285.10  
Feminae & maris ratio. 224.20  
Femina quare marem desideret.  
251.1  
Femininum sexum laesionē na-  
turae esse. 286.30  
Feminae maribus frigidiores de-  
bilioresq; sunt. 286.30  
Femina prouenit a sinistra parte  
274.30  
Feminae solidae libidinosiores  
sunt. 285.10  
Feminis prius quam maribus ui-  
gor uenit. 286.30  
Femina tardius in utero perfici-  
tur quam mas. 286.20  
Fœtus in utero nimio motu frā-  
guntur. 286.20  
Fœtus in utero per umbilicū au-  
gentur. 256.1  
Formicarum generatio. 230.1  
Fuci sunt ociosi. 271.10  
Fucorum prouentus uberior. }  
271.1  
Futis quid significet. 253.10

## G

**G**alliae prouincia frigida est.  
258.40  
Gallina plura parit. 260.10  
Gallinae hadrianae. 26.20  
Gallinae perierunt fecunditate a-  
liquando. 260.40  
Gemini homines nati quare uix  
seruentur. 286.30  
Generis per differentias diuisio.  
164.30  
Generandi uis in asino exigua.  
259.1  
Generare quare execta non pos-  
sint. 225.40  
Generatio animalium quare fit.  
241.10  
Generationis principium marem  
& feminam esse. 224.10  
Genitale membrum quare fit qui-  
busdam, quibusdam non. 226.30  
Genitale membrum neruosum est.  
226.10  
Genitalis membri mutatio. 215.1  
Genitura quibus desit. 257.10  
Genitura asini frigida. 258.40  
Genituram asina emingit. 258.30  
Geometricae rationes. 258.20  
Ginnus ex mulo. 259.20  
Gula ex qua materia conficit.  
190.20  
Gulae usus. 190.10  
Gula

# INDEX.

Gula quid sit. 190.10  
Gulæ situs. 190.20  
Gulam quæ non habeant. 190.10  
Guttur ex quibus conficitur. 190.20  
Gutturis usus. 190.10

## H

Erinacei testes. 226.20  
Hirundo cæcos excludit. 286.10  
Hirundinis pullorum oculi puncti sanantur. 286.10  
Homo diuinitatis particeps. 180.30. & 212.10  
Homo quare erectus incedat. 177.30  
Homo copiosius alijs purgatur. 238.1  
Homo præfecundum animal est. 285.1  
Hominis caro. 185.20  
Hominis nuditas. 213.10  
Homo multa habet arma. 213.10  
Homines pilosi libidinosiores. 285.40  
Hominis pedes. 216.1  
Homo cur titilletur. 198.30  
Humida potentia aut actus. 173.1  
Humor multiniformia producit. 1272.1  
Hyenæ cor. 193.20  
Hyenæ, membranæ. 249.30  
Hyperinæ aues & plantæ fiunt. 260.40

## I

Iecur multum ad longam breuius uitam facit. 202.30  
Iecur quomodo se habeat. 196.10  
Ignis in alio corpore est semper. 272.10  
Imbribus crebris sætus fucorum multus fit. 271.10  
Infantes pomiliones sunt. 212.20  
Infantes quo pacto in utero nutriantur. 256.30  
Insecta quas partes ad cibum conficiendum habeant. 204.1  
Insecta quædam diu coeunt. 271.30  
Insectorum partus. 271.30  
Insecta cur habeant multos pedes. 108.1  
Insectorum aculeus. 108.30  
Insecta quare habeant pedes priores longiores. 209.1  
Insecta quid loco linguæ habeant. 186.30

Insectorum genitalia. 225.20. & 230.10  
Insectorum coitus & generatio. 230.1. & 242.1  
Intestina terræ uermis habent naturam. 273.20  
Intestinorum natura. 200.10  
Intestinorum usus. 199.1  
Instrumentariæ partes omnes dissimilares sunt. 170.1  
Iulorum pedes. 208.1

## L

Abor excrementa consumit. 286.40  
Lacerti testes. 225.10  
Lacertis qualis sit lingua. 216.30  
Lactæ quæ carcant. 217.30  
Lactes. 203.10  
Leænæ partus imperfectus. 286.1  
Leænæ effera redditur. 260.40  
Leo cæcos generat. 252.1  
Leonis ossa. 176.1  
Leonis collum. 212.1  
Leonis mammæ. 214.10  
Leonum generatio. 271.20  
Leopanis sententia de generatione. 276.1  
Lepus superferat. 285.30  
Lepus pilos multos habet. 285.30  
Lepus coagulum habet. 200.40  
Leporis cor. 193.20  
Lienis in animalibus usus. 196.40  
Lien quibus exiguus fit. 196.40  
Lienis morbi. 197.1  
Lingua hominis. 185.20  
Lingua quibus animalibus sit, quibus non sit. 190.40  
Locustæ quo pacto generentur. 230.1  
Locustis nantibus cauda utilis est. 209.40  
Logica demonstratio. 258.10  
Lolliginum pedes. 210.40  
Lunæ locus. 272.20  
Lupus cæcos generat. 252.1  
Lupæ partus. 286.1  
Lupus ceruarius imperfectum gignit. 286.1  
Lupi collum. 212.1

## M

Ammis carent aues. 217.30  
Mamma conceptaculum lactis est. 217.30

Mammæ ceruarum. 214.30  
Mammarum usus in maribus. 214.1  
Mammarum officium in feminis. 214.1  
Mammæ elephantis. 214.10  
Manus cur homini data. 213.1  
Manuum uarius usus. 213.20  
Mas calidior femina est. 276.20  
Mas proficiscitur à parte dextra. 274.30  
Mas in generatione quid præstet. 276.10  
Mas & femina quid differant. 224.20  
Mas præstat feminæ. 241.20  
Maris partes quæ sint. 224.30  
Mas animal est quod in alio gignit. 224.20  
Mares in hominum genere potius imperfecti nascuntur quam femina. 286.20  
Maris qualitates. 272.10  
Mare plurima gignit. 271.40  
Mariscæ non accidunt feminis menstrua habentibus. 236.30  
Membrarum officium. 199.10  
Mellis copia quando proueniat. 271.1  
Menstruorum purgatio, feminis exitus est. 285.10  
Menstrua semen incoctum sunt. 285.10  
Menstrua formidarum. 214.40  
Menstruorum & feminis initium. 238.10  
Menstrua auiibus & piscibus nulla sunt. 261.1  
Menstrua quo tempore potissimum fiant. 248.1  
Menstrua quibus desint. 257.10  
Menstrua esse excrementa. 256.20  
Mentem diuinam esse. 246.30  
Metachærum in porcis. 259.20  
Merus quid faciat. 174.20  
Mitulorum ouum. 274.10  
Mollia cur tergis copulentur, ignoratur. 230.1  
Mollium partes exteriores explicantur. 210.20  
Mollium generatio. 227.40  
Mollium coitus. 229.40  
Mollium mas & femina. 266.20  
Mulorum corpora magna quare sint. 259.10  
Mula concipere potest. 259.10  
Mulieres quæ sint steriles. 257.10

# INDEX.

Mulierum fecunditas quo pacto  
probetur. 257.20  
Mulieres differunt à ceteris ani-  
malibus uterū ferendo. 286.40  
Mulierum uterus. 225.10  
Mulier grauida coitū patit. 285.1  
Mulieres agrē degunt quū ferūt  
uterum. 286.40  
Mulierum uita ociosa. 286.40  
Mulieres quæ se exercēt, facile pa-  
riunt. 286.40  
Mulieribus quibusdam grauidis  
purgatio fit. 285.30  
Multitūda complura imperfectū  
pariunt. 285.40  
Mulus felle caret. 201.40  
Mulorum genus solum sterile est  
257.1  
Muri cor magnum est. 193.20  
Muscarum generatio. 230.10  
Mustelæ cor. 193.20

## N

Natorū generatio. 259.20  
Narium situs. 181.30  
Nares habet homo. 215.10  
Nates. 205.1  
Natura uitat infinitum. 223.40  
Naturæ opera omnia mirabilia.  
167.40  
Naturæ operum omnium finis est.  
168.10  
Nerui ex lentore. 247.10  
Nerutorum copia in corde est.  
192.30

## O

Oculi quomodo gignantur.  
254.1  
Oculi uenere immutantur. 257.20  
Oculos animalia contestā habēt.  
182.20  
Oculorum meatus. 181.20  
Omentum pingue est. 202.40  
Omenti usus officium ē. 203.1  
Omentum qualis membrana sit.  
202.40  
Omenti ōrtus. 202.40  
Oryx habet unum cornu. 189.10  
Os animalium. 188.1  
Ossa quo pacto fiant. 253.20  
Ossū in corporibus usus. 178.10  
Ossa continua sunt. 178.40  
Ossium principium. 179.1  
Ossa ab igne resoluī nō possunt.  
253.70  
Ouium syderatio. 198.1  
Ouium uenter. 199.20  
Oua imperfecta ædita quomodo

augeantur. 265.40  
Oua quo pacto corrumpantur.  
265.40  
Oua urina. 263.40  
Oui luteum & candidum diuer-  
sam habent naturam. 264.1  
Oua palustrum. 262.10  
Ouum quomodo in utero hæ-  
reat. 262.30  
Ouum piscium unicolor. 259.40  
Ouum à uerme quid differat.  
241.40  
Oua subuentanea quare fiant.  
261.1  
Ouum auium. 259.40  
Ouum cartilagineorum. 265.1  
Ouum quæ gignant perfectum.  
241.40  
Oua quæ ædita augeantur. 242.1  
Oua pisciū cur imperfecta ædan-  
tur. 227.10  
Oua q̄ pacto perficiantur. 227.20  
Oui luteum abus est pullis. 264.30

Ouum quo pacto augeatur.  
261.30  
Oui testa quo pacto fiat. 262.40  
Ouum quomodo gignat. 263.10  
Oui uitellū lactis loco est. 263.20  
Oua quomodo foueantur ut ex-  
cludantur. 263.20  
Ouum nullum exangue animal  
generat. 261.40  
Oua subuentanea minus suaui-  
sunt. 261.20  
Ouorum putamina humore li-  
quescent. 253.10  
Oui pararum quadrupedum den-  
tes. 216.40  
Ordinem habet quicquid secun-  
dum naturam est. 271.1  
Ostreæ quo pacto proueniant.  
273.40  
Ostreæ non emittunt semen.  
274.1  
Ostrearum oua. 274.1  
Ostreæ plantæ aquatiles. 272.1

## P

Alpebra uulnerata non co-  
alescit. 182.30  
Palumbes cæcos generat pul-  
los. 286.10  
Pantheræ cor. 193.20  
Parmedes putauit mulieres cali-  
diores uiris esse. 171.30  
Parrus qua ratione reddatur faci-  
lis. 286.40  
Passer parit cæcos. 286.10

Pecūnum ouum. 274.10  
Pectus auis ad uolandum aptum  
218.40  
Pectoris situs. 213.40  
Pedes unde dicti sint. 220.30  
Pedes in generatione nullum ha-  
bent differentiam. 242.10  
Pedum differentia. 215.30  
Penis quib⁹ longior est, infecun-  
diores sunt. 226.40  
Perdix plura parit. 260.10  
Perdicum partus. 261.30  
Perdix & coles dicitur. 276.30  
Phalangia quomodo generentur.  
230.1  
Phalangia, delatio. 276.40  
Phrenes. 198.20  
Phosæ, corruptio. 276.40  
Pica cæcos generat. 286.10  
Pili argumento sunt libidinis.  
285.30  
Pilorum hominis in capite causa.  
183.30  
Pinguedo sensu caret. 175.20  
Pinguia quare sint infecundio-  
ra. 236.40  
Pisces qui diutius in sicco uiuere  
possint. 221.1  
Piscium coitus. 226.20  
Piscium dentes. 187.40  
Piscibus exiguus linguæ usus.  
216.20  
Piscium fel. 201.40  
Piscium uteri. 225.10  
Piscium gen⁹ mutilatum est par-  
tibus exterioribus. 220.20  
Piscium fecunditas. 227.10. &  
261.40  
Piscium generationes cur disse-  
rant à generatione ouium.  
265.10  
Piscium quorundam uterus præ  
multitudine ouorum dirumpi-  
tur. 265.40  
Piscium genus ouiparum est.  
264.40  
Piscium oculi. 183.10  
Pisces feminæ paulatim pariunt  
266.30  
Pisces mares paulatim emittunt  
semen. 266.30  
Pisces omnes feminæ non sunt,  
ut quidam opinantur. 266.10  
Piscibus non sunt testes. 222.1  
Piscibus menstrua nulla prodeunt  
261.10  
Piscium conceptus sine mare.  
261.20  
Podex. 200.20  
Pollices

Pollicis usus. 213.20  
Pollutionem & maribus & fœminis accidere. 249.1  
Polypi generatio. 230.1  
Polypi promulcide cur careant. 211.10  
Pomilionum generatio. 259.20  
Pomilionis forma. 212.20  
Plantis & animalibus non abfimilis generatio est. 271.40  
Plantæ hyperinæ fiunt. 260.40  
Plantarum feminis principium. 262.40  
Plantarum ortus. 224.1  
Plantarum munus. 240.20  
Plantæ in terra multæ nascuntur. 272.1  
Plantæ sunt ostrea terrena. 272.1  
Præcordia. 198.10  
Principium in quibus querendū, in quibus non. 252.40  
Principiū in generatione. 276.10  
Prius multiplex est. 252.10  
Pubes fœminis prius uenit quam maribus. 286.30  
Pueri quidam imperfecti nascuntur. 286.10  
Pueri mobiliore sunt in utero quæ fœmina. 286.20  
Pueri quare nequeant continere caput. 254.20  
Pulicum generatio. 230.10  
Pulmonis usus. 195.10  
Pulmonis differentia. 195.30  
Pulmo uolucrum. 195.30  
Pulmonem quæ habent, calidiora sunt. 242.20  
Purpura. 205.1  
Purpura ouum. 274.10  
Putredo quid fit. 272.40  
Pygmæorum generatio. 259.20

## R

Rana quomodo nateat. 221.10  
Rana non parit animal. 259.40  
Rana corpus. 264.40  
Ranarum pinna. 221.10  
Rationi quando credendum. 271.20  
Rationes inanæ quæ sint. 258.20  
Renes quæ habeant. 197.40  
Renes hominis. 198.1  
Renes quid faciant in corpore. 196.30  
Renes ouium opplentur obesitate. 198.1  
Renum dexter superior sinistro

est. 198.20  
Renes quare reddant fœdum odorem. 198.10  
Renes humidi excrementi receptacula. 198.10  
Rhinobati creduntur ex squatina & Raia gigni. 256.40  
Rostra auium differunt. 218.20  
Rostra auium. 179.40. & 185.10  
Rostra quo pacto fiant. 253.10  
Rubelliones pisces omnes fœminæ. 251.20

## S

Sanguis tenuior & calidior ingeniosior est. 171.10  
Sanguinis fons cor est. 170.30  
Sanguinis differentia. 171.1  
Sanguis fortior qui fit. 171.10  
Sanguine omnes partes corporis constant. 194.10  
Sanguinis profluua. 194.40  
Sanguis cibo augetur. 174.1  
Sanguis bonus unde fit. 174.10  
Sanguis non omnis fibras continet. 174.10  
Sanguis sensu caret. 175.20  
Sanies sanguinis. 174.40  
Scarabei quo pacto nascantur. 230.10  
Scrofa habet commodum alimentum porcellis suis. 286.10  
Semen esse excrementum. 234.10  
Semen emissum quare aliquando iuuat. 235.1  
Semen propter calorem fœcundum. 246.30  
Semē an habeat animam. 244.30  
Seminum principium. 262.40  
Seminis fœcunditas. 257.20  
Semen quale fit fœcundius. 276.10  
Semen frigidum infœcundū est. 226.40  
Semen quæ emittant, quæ non. 230.30  
Semen an ex toto corpore ueniat. 230.40  
Seminis in animalibus differentia. 235.10  
Seminis natura. 244.1  
Semē omnium album est. 245.40  
Semen quid fit. 233.20  
Senectus prius uenit fœminis quam maribus. 286.30  
Sensūs similitudinis partibus adscribitur. 170.10  
Sensoria bipartita sunt. 195.10  
Sensorium primū quid fit. 181.30

Sensuum principium cor esse. 181.1  
Sepiæ pedes. 210.40  
Septitransuersi officium quod fir. 198.10  
Serpentibus nō sunt testes. 222.1  
& 225.1  
Serpentum natura. 201.10  
Serpentum pulmo. 201.20  
Serpentum uiscera oblonga sunt. 201.30  
Serpentum fel. 201.40  
Serpentes quomodo narent. 220.40  
Serpentum coitus. 226.20  
& 227.1  
Seuum & adeps quid differant. 175.1  
Seuum habent quorum sanguis corpulentior est. 175.1  
Seuum quæ habeant, & quæ adipe. 175.10  
Sicca actū & potentia quæ sint. 173.1  
Simia forma ambigua est. 215.30  
Simia non habet nates. 215.30  
Simia caudam non habet. 215.30  
Similares partes humidæ. 170.40  
Similares partes siccæ. 170.40  
Similium partium differentia. 169.40  
Somnus unde proficiatur. 177.10  
Spina in corpore quid dicatur. 179.1  
Spongia quatenus uiuat. 206.20  
Squannæ pinna. 221.10  
Squillæ quid à cancri differant. 209.40  
Sterilitatis causæ. 257.1  
Steriles sunt & mulieres & uiri. 257.1  
Sterile est totum mulorū genus. 257.1  
Stirpium excrementum. 180.20  
Stirpium uenter. 173.30  
Struthio plura parit. 260.10  
Struthio Aphricus qualis fit. 222.30  
Substantia partim mortales, partim immortales. 167.20  
Suis partus. 286.1  
Sus quæ fit partus numerosi. 286.1  
Sues inueniuntur solida ungula. 286.1  
Sus copia alimentī abundat. 286.10  
Suum testes. 225.10  
Suum mammæ. 214.10

**T**actus primus sensus. 178.1  
Tali usus. 215.40  
Terra quare mater dicat. 224.20  
Testa in testaceis qd faciat. 178.20  
Testatorum generatio. 267.40  
Testatorum genera. 205.1  
Testatorum bivaluium discrimen. 209.20  
Testatorum corpus non multiplex est. 209.10  
Testatis quis fit augendi modus. 273.40  
Testes hominis. 225.10  
Testes quæ non habeant. 222.1  
Testes quare quibuscumque intus, quibusdam foris habeantur. 228.20  
Testiculos cur natura dederit. 225.30  
Testudo lutaria uesica & renibus caret. 197.40  
Testudo uesicam habet. 197.30  
Testudinis testes. 225.10  
Tinnunculus fecundissimus est. 260.30  
Tubera quomodo uiuant. 106.30  
Turbinatorum differentia. 209.20  
Turtur generat cæcos. 286.10

**V**Accarum mamma. 214.30  
Vena maior quantum ab aorta differ. 195.1

# INDEX.

Venarum principium cor est. 119.40  
Venarum gratia uiscera esse. 196.20  
Venæ omnes unius pars sunt. 178.40  
Venus unde dicta. 245.40  
Venus quare debilitet. 235.1  
Venæ duæ principales. 192.40  
Veneris uoluptas. 233.10  
Veneris celerioris quæ sint. 225.40  
Venter suillus. 200.10  
Venter caninus. 200.10  
Ventris officium. 199.1  
Vermis ab ovo quid differat. 241.40  
Vermes nati quo pacto augeantur. 265.30  
Vertibula parum à plantis differunt. 106.20  
Vesicam quæ habeant. 197.20  
Vesicæ officium. 197.20  
Vespæ quo pacto generentur. 230.1. & 271.30  
Vespertilioes. 222.10  
Viri qui sint steriles. 257.10  
Viscera quibus animalibus sint, quibusque non sint. 191.20  
Viscera quid à carne differant. 199.40  
Viscerum corpus quo pacto coagmentetur. 199.1  
Viscera quibus similia. 201.10  
Viscerum forma. 196.1  
Visus ubi habeat uim suam. 181.1  
Vites hircire quid sit. 235.20  
Vituli marini pedes. 222.20  
Vituli marini meatus auditorij. 182.10  
Vitulorum marinorum lingua. 216.30  
Vitulus marinus felle caret. 201.40  
Viui parorum alia perfectum, alia imperfectum animal pariunt. 285.40  
Viui parorum generatio. 227.30  
Vmbilicus uenis constat. 250.10  
Vmbilicus auium. 219.1  
Vmbilico augentur fetus. 256.1  
Vngues quomodo fiant. 253.10  
Vnguibus quare digiti muniant. 216.10  
Vnguium usus. 213.30  
Vngularum usus. 179.40  
Vniuersalia quæ sint. 166.40  
Vrina profluuium. 235.30  
Vrina catuli inarticulati. 286.1  
Vrina quatenus uiuant. 106.40  
Vterum ferentes à cæteris mulieres differunt. 286.40  
Vteri omnium bipartiti sunt. 225.10  
Vterorum differentia. 260.1  
Vulnere morientem aliquando ridere. 198.30  
Vulpes cæcos parit. 252.1  
Vulpis partus. 286.1  
Vuluarum discrimina multa sunt. 227.10

FINIS.



# THEODORI GAZAE THESSALONI

CENSIS PRAEFATIO IN LIBROS DE ANIMA-  
LIBVS ARISTOTELIS AD NICOLAVM  
QVINTVM PONTIFICEM MAX.



10 **L**YCVRGVM Lacedæmonium, qui leges ciuibus suis consti-  
tuit, reprehendunt nōnulli, Pontifex summe Nicolaë quin-  
te, quod ita tulerit leges, ut belli potius, quā pacis rationem ha-  
buisse uideretur. Numam uero Pompilium regem Romanū  
laudent maiorem in modum, quod pacis adeo studiosus fuerit,  
ut nulla causa moueri ad bellum pareretur, quorū sententiam,  
et si aliās probo, ut debeo (nihil enim pace cōmodius, nihil san-  
ctius) tamen cum uita hominū ita ferat, ut bella uitari interdum nequeant, sic cen-  
seo præfiniendum, consulendumq̃, ut & bellum interdum sit suscipiendū, si res ur-  
get, & pax seruanda sit semper, si fieri potest: nec belli ratio unq̃ probanda sit, nisi ut  
demum rebus compositis, quieto, tranquilloq̃ animo uitamus. Non enim ad pu-  
gnam, & homicidia, non ad discordias, & bella nati sumus, sed ad concordiam, &  
humanitatem. Itaq̃ principis institutum, atq̃ officium id esse reor, ut pacem sum-  
ma opera petat, seruet, & colat. Quod cum Romanos pontifices ferē omnes fecisse  
20 quoad potuerint, intelligam, laudo illorum animum, quod neq̃ ab instituto nature  
bonæ recesserint, & præceptū autoris diuini seruarint, quod sapissime pacem conci-  
liarint, & cōmendarint. Sed usum nōnullorū ausim reprehendere. Pace enim, qua  
uti debuerant ad literarum, & artium bonarū studia, et uirtutum officia, illi quidem  
ad uoluptates parum honestas abusi sunt. quod cum omni hominū ordini sit turpe,  
tum pontificis personæ turpissimū est. Fuerunt tamen & qui recte pace uterentur,  
& pontificatum magna cum laude gererent, quibus te similem uideo planē successis-  
sisse. Præstas enim doctrina, & moribus: quo fit, ut nomen tuum immortalitati man-  
dandum censeas, studio potius literarum, quæ nuncq̃ pereunt, quā uel ædificio-  
rum, quæ breui tempore delentur, uel thesauri gemmarū, & auri, cuius heredes ini-  
30 mici plerunq̃ succedunt: utq̃ uoluptates, quæ animi lumen extinguunt, res quas,  
unamq̃ literarum uoluptatem, quæ animum illustrare potest, expetas, atq̃ in ea re  
quiescas. Itaq̃ omnes pontificem talem habuisse letamur, & quisq̃ siue ciuis, siue pe-  
regrius studet pro uiribus rem afferre, qua & uirtutum tuarum laudem, & animi  
tui uoluptatem augeat. Quem enim ob eius merita nō solum ueneramur, & obser-  
uamus, sed etiam perinde ac patrem amamus, ei perlibenter opera studiorum no-  
strorum dedicanda putamus. Alij igitur alia: ego tibi libros Aristotelis philosophi,  
quos de natura animalium scripserat, conuertere in latinū sermonem uolui, existi-  
mans rem tibi gratam me facturū, si hi libri latinis literis mera industria mandaren-  
tur, & cultius, atq̃ integrius, quā actum ab alijs adhuc est, exponerent. Videbam  
40 per multa errasse interpretes, tum imperitia linguæ, tum Aristotelicę discipline insci-  
tia. Itaq̃ officium esse putauī, ut si quid facultatis in me esset, qua præstare hæc pos-  
sem meliora, rem aggredier, & pro uiribus dignius quicq̃ efficere conarer. Labo-  
raui equidem hac in re uehementer, quoniam nihil adiumenti ab ijs, qui eadem in-  
terpretari uoluer, capere poteram. Aut enim græce illi dixerunt, quæ latine audire  
homines latini desiderant, aut rerum aliarum nomina alijs improprie tribuerūt,  
aut noua ipsi inepte finxerunt. Sententiam uero autoris passim adeo deprauarunt,  
ut argumento quidem interpretationis eorum nemo tam indoctus sit, qui non re-  
ctius iudicare de rebus naturæ, quā Aristoteles posse uideatur. Locutionis etiam  
genus ne tale quidem, quod legi posset, non modo non Aristotelis eloquentia di-

gnum, adhibere potuerunt. Quod si quid præ sua facilima cognitione peruerit ab omni ueritate non potuit, id etiam propter incultum, horridum & ineptum sermonem interpretis uix intelligi potest. Afferrem hoc loco scripta illorum interpretum, erroresque ligillatim enumerando reprehenderem, nisi longior essem in re non dubia, præsertim apud te princeps doctissime, qui ut ante doctor pro tuo singulari iudicio semper damnaui illorum interpretationem, melioremque desiderasti, sic nunc facis princeps accuratius agis, ut hæc aliquando explanentur, & una cum sui autoris sententia lucem latinæ linguæ recipiant. Vtinam tantum facultatis in me esset princeps sapientissime, ut hoc meum interpretandi genus esse optimum illud, quod quæris, confirmare possem. Sed quoniam hoc pius est, quam ut uel homo modestus de se polliceri debeat, uel meæ uires attingere possint, nihil ego tale de me. Illud uero dicere licet, hanc esse omnibus, quæ adhuc factæ sunt, horum librorum interpretationem, & philosophis ad eloquendum commodiorem, & eloquentibus ad disputandum utiliore, et utriusque ad Aristotelis sensum percipiendum aptior. Nec acta equidē egi, sed à male conuersis primus ego latinis hoibus aperui, quæ his libris Aristoteles scripserat. Sed illuc redeo, Me plurimum elaborasse in his libris interpretandis fateor, cum nihil à primis interpretibus illis iuuari possem: sed omnia ex comicis ueterum autorum petere necesse haberem, lectione longa, notationeque uaria. Plinium, Corneliū, Columellā, Varronē, Catonē, M. Tulliū, Apuleiū, Gellium, Senecam, complures alios linguæ latinæ autores euoluere diligentius oportuit: quorum libros, uel semel accurate legisse laboriosum est, nedum ad usum interpretandi accommodasse. Non enim ita usum uerborum accipit interpret, ut suo arbitratu rem disponat, mandetque elocutioni: sed totidem ferè uerbis sensus alienos accommodare exprimere cogitur, quod perdifficile est. Accedit ad hæc altera causa laboris, quod exemplaria græca, libros hos de animalibus dico, mendosa admodum habemus, uel librariorum culpa, uel eo casu, quem apud Strabonē geographū legimus. In his enim emendandis elaborare interpret sine dubio debet, ne ipse errasse in conuertendo uideatur. Ita enim plerique iudicant, ut si quid bene ab interprete dicitur, id auctori operis tribuant: Si quid male, id interpreti uitio ascribant. de his interpretibus loquor, qui non minus laudis mereantur in conuertendis aliorum libris, quam illi, qui eos magna cum laude ediderunt: non de his, qui & sibi, & auctori, quem interpretantur, dedecus pariunt. Quid autem: cum uel ipsa latina exemplaria, quorum ope iuuari nitimur, non minus sint emendanda, quam græca. Quæ enim utilitas librorum Plinij satis interpreti afferretur, nisi emendarentur, & corrigerentur: lam ante ætatem nostram, seculis multis iacuit inutile opus eius auctoris, quod de historia naturali inscribitur, scilicet propter innumeros librariorum errores. Quis enim auctoritate, tum scriptoris, tum rerum scriptarum peteretur, & à pluribus scriberetur, tamen legi ne à doctissimis quidē uiris poterat, usque adeo mendosum, corruptumque habebatur. Caruerunt certe diu latini hoies magno fructu eorum librorum, quantum nunc doctrina insigni, singularique industria Ioannis Andreae, prefulus Halerientis, facili facta est, & lectio eorum librorum, & imitatio. Hic enim primus hos libros emendauit, atque utiles reddidit. Quod munus, si in cæteris quoque libris corrigendis hic subisset, labor sanè aut nullus, aut longe minor scriptoribus interpretibus relinqueretur. Sed quoniam hunc uirum, alia munera tui felicissimi principatus, & reipublicæ à literarum studiis priuatis diuerterint, accidit res cuique proculdubio difficilior. Mihi autem uel illa difficultas laborē accumulatur, quæ non ad eos interpretes spectat, qui res difficiles græce dicant, faciles uero latinis uerbis improprie peruertant: sed ad eos, qui ne ea quidē inconsiderata relinquunt, que antiqui auctores negligentia quadam non facile excusanda prætermiserunt, qualis quæstio, de Thoe quadrupede, & panthere, de dasypode, de lynce, de alijs plerisque occurrat.

currit. Sed an ego dignū quicquid uel meo tanto labore, uel tuo desiderio efficere poterim, tu mihi eris & iudex, & censor. Fuit quidē studiū mihi certandi, nō cum interpretibus illis, quos uincere nullū negociū est, sed cum Aristotele ipso, ut libros, quos ille Alexandro regi suo principi nō minori industria, quā doctrina conscripserat, hos ego tibi principi meo latinos reddere nō deteriores. Sed an effecerim, quod mihi statueram, tu uideris. Habes uero in hoc codice libros duodeviginti: scilicet nouem de historia animalium, quatuor de partibus, quinque de generatione. Historia primū obtinet locū, atque ut nomen ipsum significat, expositionē continet rei, quod est, siue ut sit; quod scholæ philosophorum nostræ ætatis, quia est dicere solent. Mox libri de partibus, ac de generatione, causam cur ita sit, declarant: alteri finalem præcipue, alteri agentē. Cum enim rem, cuius causam reddere uolumus, exploratā cognitione quod est, habere debeamus, recte & scribitur historia animalium, & præcedit in edocendis causis, unde nam, aut quē ad finē, siue cuius gratia, condita quæque sunt à natura, præcipue in quā finalem, agentēque causam. Nam obiter quidē materialis quoque passim pro rei desiderio exponitur, ut simul aut necessitatis, notæque melioris ratio declaratur, aut ex quo, undeque consistant, quæque demonstratur. Sed quanquam libris nouem interpretatio hæc historiarum consummat, tamen qui nonus in exemplari graeco continetur, hunc ego septimū collocaui; nec id temere factū existimo. Agitur enim in eo de hominis generatione, quā rem Aristoteles continuō à generatione cæterorum animalium pollicetur explicaturū. Itaque cum quinto & sexto libro cæterorum animalium generationē exposuisset, nulli dubio esse debet, quin ille septimū hunc collocatione locaret. Sed Appellicon Teius, de quo Strabo plura, ut alia permulta in exscribendis Aristotelicis libris deprauauit, sic id permutasse uidetur, existimans ultimum esse totius historiarum collocandū: quoniam cum Aristoteles agere de generatione inciperet, ultimo loco de homine dicturū pollicitus est. At ille nō ultimo totius historiarum dixit, sed eius loci, quē de generatione tractaret: quod patet ex istis, quæ in sexto, qui secundus de generatione est, locū eum absoluit, scribit: Sequitur, inquit, ut pari modo de istis, quæ in terrestriū genere animalium pariunt, atque etiā de homine disseramus. Tertius igitur hic à primo de generatione collocandus est: quo fit, ut idem septimus totius ordinis historiarum habeatur. Sūt etiam exemplaria, tum græca, tum uero latina, quæ habent fragmentū quoddam historiis additū: sed id causas quasdam materiales, agentesque generationis humanæ exponit, nō historiam completit. Itaque nō inter historiarum libros hoc ego ponendū duxi: sed si collocandū uspiam est, libris de generatione, meo quidē iudicio coniungendū est. Inspicere singulos hos libros, ac legere uelis summe princeps, quoad tuarum occupationes patientur: ut & re explorata iudicare, & si quid uoluptatis est in legendis naturæ operibus, oblectari possis. Nō enim me offensurū tuas aures puto, quanquam nō græco mihi patrio, sed peregrino uitor sermone. nō quod ab interprete dicitur id ex græco exemplari intelligere desiderabis, ipsa latina oratio sensum Aristotelis ita explicabit, ut minime græcā desideres: nihil miscet, nihil inculcat, nominat usu ueterum probatissimorum autorum genera animalium. Si quid noui imponit, ita inserit, ut familiare, cognatūque id quoque uideri possit. Si quid græce appellat, id nō durum occurrit. aut enim usitatū, & (ut ita dixerim) uagū latinis est, quale est nomen delphini, cameli, elephantis, crocodili, ichneumonis, aspidis, salamadræ, & reliquorum generis eiusdem: aut ita sonat, ut nō minus latinū esse, quā græcū uideatur. Cur enim triticeam auem, aut crecem, aut derum, nō eodem hoc nomine uocē, si nō comperio latinū, cum quasi latinū sit, ita congruat: Quis latracem ambiguum illam belluam, aut balerum, fluuiatilem piscem ita nominans, peregrinū sonare uidebitur? Nec uero contemnendū uulgus interdū est, si quid nōdum à literarum professoribus nuncupatum, suo ipsum nomine appellat: ut brucum genus locustæ terrestris, quod Græci atelabum uocant. Aut martam genus mustelæ rusticæ, quod Græci

ci iſtūda dicunt, quāuis plura eius genera ſint. nec temere actum dixerim, ſi quis ui-  
 uerē nomine ea complectitur: planius enim ita docebimus, ſi id martam, aut uiuer-  
 ram uocemus. muſtelæ aut nomen in eo tantum remaneat, quod græci Galem ap-  
 pellant. eodemq; modo, ſi locuſtæ illius terreſtris alterū genus locuſtam, alterū bru-  
 cum nuncupemus. Sedenim ſufficit lingua latina ſingulis græcæ orationis, ſiue uo-  
 cabulis, ſiue ſententijs: quanq; nōnulli, quæ latine exprimere nequeunt, hæc inopiæ  
 linguæ tribuunt latinæ, ſuamq; pauperiem uitio dare linguæ locupletiffimæ audēt:  
 quos ſatis conuinci à M. Tullio puto, cum ille linguā Romanā ne copia quidē uer-  
 borum à græca ſuperari aut uimet. Exclamat ille aliquantulū quidem importune: O  
 inopem interdū linguam græcam, ſed nō ſine cauſa, quando nōnulli ita cōtendunt, 10  
 ut Græcis nihil deſſe, Latinis permulta deſiderari pronūciant. Sed de his hæcenus.  
 Ariſtotelis uero laudem, quāuis mos interpretū ſit, eum, quē interpretantē autorem,  
 uberius laudare, tamen ſi latius perſequar, uereor ne mihi idem obijciatur, quod illi,  
 qui apud Lacedæmonios, de Herculis laudibus agere uoluit: Quis Herculem uitu-  
 peret, aut minus bene de eo ſentiat? Quis illum nō inter deos immortales enume-  
 ret, colat, obſeruet, ut tu laudare uelis, Lacedæmoniꝝ ſubdiderunt. Tanta eſt enim  
 Ariſtotelis exiſtimatio, tanta autoritas iam apud omnes mortales, ut fruſtra quis præ-  
 dicet, quo ingenio, qua doctrina hic fuerit, quo artificio rem quācunq; explicandā  
 ſibi ſtatuerit, tractet: quanta uis in hoc diſſerendi, quanta in cognoscendis, expo-  
 nendisq; rebus diligentia. Hunc & Latij decus M. Tullius ita laudat, ut excepto Pla- 20  
 tone, facile philoſophorū principē appellet. Excipit ille quē amat, laudat uero, quem  
 doctiſſimū eſſe iudicat. Miſi hæc facio. Librorū quos interpretatus ſum, fructum,  
 quantus ſit, explicare quoad poſſum, & locus hic patitur, non ab re fuerit fortaiſſe.  
 Omnis enim philoſophandi ratio naturalis, ubi à primis illis naturæ initijs, materiā  
 dico, formā, finem, agens, & motū (ut ita loquar) emerſerit, hic uerſatur, ac diutiſſi-  
 me immorat, hic ſuas uires exercet, atq; multiplicē, uariam, & admirabilē rerum cō-  
 ſtitutionē ampliffime explicat. Perſequit ordine diſcrimina omnia, quibus natura  
 ſuas animantes diſſerre inter ſe uoluit: colligit ſumma genera, reliqua ſigillatim ex-  
 ponit: partitur in ſpecies genera: & ſingula, quæ circiter quingenta numero in his  
 continēt libris, deſcribit: pergit quæq; explanans, quemadmodū oriāt, ſiue terre 30  
 ſtria, ſiue aquatica: quibus nam conſtent membris, quibus uelcant alimentis, qui-  
 bus afficiant rebus, quibus moribus prædita ſint, quantū uiuendi ſpatiū datū cuiq;  
 eſt, quanta corporis magnitudo, quod maximū, quod minimū eſt: quæ forma, quis  
 color, quæ uox, quæ ingenia, quæ officia: deniq; nihil omittit, quod in animalū ge-  
 nere natura gignat, alar, augeat, & tueatur. Quæ omnia eō ſpectant, ut, quod ſan-  
 ctiſſimus quoq; autor ille, quē deus ſibi ueluti ſupellectilem quandā precioſam ele-  
 gerat, admonet, ex ijs, quæ à natura proueniūt, deum immortalē, ex quo ipſa pen-  
 det natura, intelligamus, admiremur, atq; colamus: qua re nihil pulchrius, nihil gra-  
 uius, nihil dignius homini eſſe poteſt. Tantus fructus horum librorū eſt. Nec audi-  
 endi ſunt, qui inquit: Multa Ariſtoteles de muſca, de apicula, de uermiculo, pau-  
 ca de deo. Permulta enim de deo is tractat, qui doctrina rerum conditarū exquisitiſ-  
 ſima, conditorē ipſum declarat: nec uero muſca, nec uermiculus omittendus eſt, ubi  
 de naturæ mira ſolertia agitur. Vt enim artificis cuiuſuis, ſic naturæ ingeniū in minu-  
 tiſſimis potius cōtemplandū eſt. Quinetiā cum rerum cauſas cognoscere pulcherri-  
 mum ſit (hac enim una cognitio, homo perfici, abſoluiq; poteſt, ut deo immortalī  
 ſimilis, quoad eius fieri poteſt, euadat) his ſanē libris plene docemur, cur quæq; res in  
 animalū genere ita ſit: planeq; felicitatē aſſequimur illam nobiliorē, quæ in actione  
 animi conſiſtit, quā ſapiens quoq; poëta prædicans: Felix, inquit, qui rerū potuit co-  
 gnoscere cauſas. Quid de anima loquar, de qua toties publice, priuatimq; diſputat?  
 Nuſq; ſuorū librorū, tam aperte philoſophus hic ſuam opinionē exponit, quā in  
 his libris,

his libris, quid anima sit, undeque in corpus recipitur. Ad haec mores illi, & uirtutum officia, quibus uirum appellamus bonum, laudeque prosequimur, longe melius hinc accipere possunt, quam uel a rhetore, quem Graeci sophistam uocant, uel a predicatorum nomine iam trito latinis auribus. His enim saepenumero uita discrepat a praecipitis, & melius hortantur alios, quam ipsi officio fungantur: ut interdum frustra illa uirtutis egregia laus recitata sit, prolixaque eorum praecipio uacet, & iaceat, cum exempla desiderent uitae, praepetoris & autoritas, quam qui respicit, facilius & mouetur ad uirtutem, & in officio tenetur. At uero in contemplandis animalium moribus exempla suppetunt omnium officiorum, & effigies offerunt uirtutum summa cum autoritate naturae omnium parentis, non simulatae, non comentitiae, non inconstantes & labiles: sed uere ingenuae atque perpetuae. Quis enim tam peruersa natura hostis sui generis est, quin emendetur, & mitigetur, cum nullum animal occidi a sui generis bestia uideat? Quis tam in parentes impius, ne cum ciconiae auis, aut meropis pietatem erga parentes intelligat, pietior efficiatur? Quis adeo inhumanus, illiberalisque est, quem ossifragae benignitas in pullos aquilae non faciat benigniores? Quis tam piger, iners, & segnisis est, quin excitetur ad uitae munera, cum formicarum, aut apum labores, atque industriam intuetur? Quem non pudeat per merum peccare, cum non solum leonis animi inuictum cogitat, sed etiam reguli auiculae, quae cum aquila pugnat, certatque de imperio? Quis principem bonum non colat atque obseruet, cum si rex apum in inuere aberrauerit, omnes eum inquirere, odoratumque sagaci persequi, donec inuenerint, cognitum habeat gestari: etiam regem a plebe, cum uolare non potest, & si perierit, omnes discedere? Nunquid parum exempli ad boni principis siue desiderium, siue obseruantiam datur? Quis princeps non ad clementiam facile inuitetur, cum reges apum armari quidem aculeo, sed eo nunquam uti intelligat? Quae fides, quis amor in canibus? Quanta in elephantis mansuetudo? Quae in anserem uerecundia? Quantum studium ornatus, ac politurae in pauone? Quanta opera uocis amoenae, suauisque in lusciniis? Quid de iustitia apum dicam, quae colligunt quidem ex iis, quibus aliquid dulcedinis inest, sed sine ullo fructuum detrimento? Quid de castitate elephantis, qui quam impleuerit coitu, eam rursus non tangit? Aut columbae, quae neque coire cum pluribus patitur, neque coniugium tam inde a primo ortu initum deserit, nisi uidua, aut celebs? Disciplina autem & eruditio elephantis, quem non faciat studiosior? Omnino nulla pars uitae humanae est, quae non suorum officiorum exempla commodissime hinc accipiat. Nam, ut omittam artes illiberales, quae & ipsae ingenij animalium non parum iuuantur, ualitudinis exempla quae uel unde commodius peti, quam ex animalibus possint? Loca pro temporis conditione solent illa mutare: non plus edunt, aut bibunt, quam sibi salubre sit: non diutius dormiunt, quam ratio ualitudinis postulat: modum mouendi, quiescendique seruant: nouit sua quodque medicamenta: uiuit sua quodque sorte contentum, & gaudet. haec late a medicis praecipiunt. At uero exempla, in quibus uis maior, quam in praecipitis est, ab animalibus certiora praebent. Ad do utilitatem, quae in dicendi facultate ex hac animalium ratione afferri potest. Comparationes enim, assimilationesque illas, quas Graeci parabolas uocant, quae plurimum orationem exornant, auditoresque tenent, hinc uarie, copiose, aptissimeque accipi possunt: ut siue oras, siue communem partem cum alijs sermonem, eloquens, aptus, suauisque esse possis. Poeta uero unde nam pulchrius sua illa rara, & mira accipiat, quam ex his libris, qui naturae arcana rimantur, enarrant, aperiunt? Medicus autem, quod fateatur, se sua inde ordiri, ubi philosophus definit, nusquam plenius, quam hic uiderit: quodque a Galeno medicorum principe traditur, Aristotelem primum anatonem, hoc est, membrorum dissectionem scripsisse, hic agnosceret: & quod idem & primus, & optimus fuerit autor, percipiet. Iam & philosophi nostrae aetatis, qui quadrifariam rerum causam ex prima illa librorum naturalis auscultationis institutione, accipiunt quidem

cōmuni quadam ratione: sed quemadmodum his natura utatur, in constitutione, generationeque animalium, parum, autore Aristotele, uident, inopia scilicet exemplaris Aristotelici, quod legere possint, hic uidisse aliquando gaudebunt, & Physici, quo se appellant, dignius de cetero profitebuntur. Rationes enim ideo quaerimus uniuersales, ut demum res particulares, & sensiles teneamus. Accedit adhuc uoluptas, qua iuuari, ac perfici quāuis actionem Aristoteles ait, quam in contemplandis rebus naturae auidissime capimus. Nam si pictor nos uehementer oblectat, cum animal scite pinxerit: quanto uehementius natura ipsa afficiet uoluptate, cum eius tam multa, & uaria animalia, mira membrorum conuenientia, inauditaque moderatōne, & elegantia facta: Cum hos legimus libros, contemplamur profectō quā uariis, ac pulcherrimis fructus horum librorum, & utilitas amplior, quā ut uerbis exprimi possit. Sed quorsum haec? Vt si in traducēdis his tam necessarijs, tamque commodis, & amoenissimis libris, satis ego interpretis munere functus sum, tu sententiam feras princeps doctissime, & adasque in usum publicum opus, quod ego sine tua autoritate addere nec possum, nec debeo. Si quid etiam dignum ex meo ingenio exiit, quod in ea bibliotheca ponatur, quam magnifice consulens hominū cōmuni utilitati, condere statuisti: si quid inquam tale effici mea opera potuit, censeas ea ipsa bibliotheca tanquam ciuitate donari hunc codicem, nōdum cognitum, aut ullam in sedem receptum. Non ego primus te constituo iudicem: iam pridem consensu omnium doctorum uirorum habitus es existimator, & architectus eorum, qui in studijs liberalibus elaborant. Facit enim tua illustris doctrina, tuumque summum ingenium, ut nemo te uel iudicio grauior, uel autoritate locupletior habeatur. Principem etiam summum te nuper quidem habuimus: sed, quod optauimus, talem habemus, ut facile temporibus his tuis sperare possumus publicam illam felicitatem, quam Plato uir doctissimus futuram confirmat, cum aut philosophi regnant, aut reges philosophantur. Tu enim & philosophus es illustris, & fortunae summū imperij uirtuti tuae coniuncta est. Lege igitur princeps sapientissime, & iudica, an ego rem tibi non repudiandam attulerim: & si bene, ut spero cesserit, age pro tua liberalitate, ut pari studio laborem suscipere alterum, pluraque indies afferre huiusmodi opera possim.

# ARISTOTELIS STAGI

RITAE DE HISTORIA ANIMALIVM LIBER  
PRIMVS, INTERPRETE THEODORO.

In quibus animalia inter se differant, quibus uel cōueniant, eorundēq; naturae diuersitas. Cap. I



ANIMALIVM partes, aut incōpositae sunt, quae scilicet in  
similes sibi partes diuidunt, ut caro in carnes, & ob eam  
rem similes appellant: aut cōpositae, quae aptae secari in  
partes dissimiles sunt, nō in similes: ut manus nō in manū  
secat, aut facies in facies: quapropter eas dissimiles no-  
minemus. Quo in genere partium sunt quae nō modo par-  
tes, uerum etiā mēbra appellant: uidelicet quae cum ipse  
totius integritate describant, habeant tamē intra se par-  
tes diuersas suiq; generis opificia, ut caput, ut pes, ut ma-  
nus, ut totū brachiū aut pectus: quippe quae & ipsa par-  
tes sint totae, & ex partibus cōstent diuersis. Quaeq; aut pars dissimilis ex similarib.  
constat, ut manus ex carne, ossibus, neruis. Habent uero animalia partes, aut easdē  
sibi omnes, aut diuersas. Partes easdem uel specie intelligi uolo, ut hoīs nāsus, aut oca-  
lus, specie cum nāso, aut oculo hoīs alterius cōuenit, et caro cū carne, et os cum osse.  
20 Quod idē de equo, & ceteris quae specie inter se cōsentire statuimus, intelligi debet:  
ut enim totū se habet ad totū, sic partes singulae sese ad singulas habeant necesse est.  
uel genere, quanq; excessu, defectu uel inter se differant. De ijs loquor, quorū idem  
est genus: uerbi gratia, auis, aut piscis: id enim utrūq; differentiis consumit generis.  
Et species cōplures, tum pisciū, tum etiā auium habent: differūt uero inter se partes  
penē plurimē eorū contraria affectuū qualitate, ut coloris, aut figurae, eo qd aliae ma-  
gis, aliae minus affectae ijs ipsis qualitatibus sint. Multitudine etiā & paucitate, & ma-  
gnitudine, paruitateq; & omnino excessu, defectuq; discrepāt, cum alijs crusta, alijs  
testa pro tegmine habeat: et alijs rostrū porrectius sit, ut gruius: alijs breue. Penna  
item alijs uberior, alijs parcius data est. Sed tamē in ijs quoq; ratio partium nōnullarū  
30 diuersa est, cum alia calcari, aut aliquo armentū acutius, alia nihil eiusmodi habeant:  
& alijs apex in capite sit, alijs desit. Sedenim qd propē dixerim, partes plurimē, et ex  
quibus tota moles cōpacta est, aut easdē sunt, aut ratione contrariorū, & per excessu-  
sum, defectumq; differunt. Pluris enim, minorisq; rationē, referri ad excessum defe-  
ctūq; putauerim oportere. Nō desunt quibus partes nec species sint easdē, neq; ex-  
cessu, defectu uel, sed proportionē cōueniant: quomodo os cum spina, & unguem  
cum solida ungula, & manū cum forcipato pedis, et pennā cum squama conuenire  
animaduertimus. Quod em penna in auisū genere est, idem squama in piscibus ha-  
betur. Partes quas singula animalia habent, hunc in modū diuersas, easdem uel intel-  
ligimus, atq; etiā situ contemplamur. Sunt enim complura, quae easdē habeant par-  
40 tes, sed non situ eodem: uerbi causa, mammas alia in pectore habent, alia in femini-  
bus. Partes aut similes, aut molles, ac humidae sunt, aut siccae, & solidae. Molles in-  
quam, uel omnino, uel quādiu in sede maneat naturalis, ut sanguis, sanies, adeps,  
seuum, medulla, semen genitale, fel, lac, ubi haberi id potest, caro, & quae ijs propor-  
tione respondeant. Item excrementa omnia, modo tamen diuerso, ut pituita, & se-  
dimenta alui, atq; uellica. Siccas ac solidas intelligi uolo, neruū, cutem, uenā, pilum,  
os, cartilaginē, unguem, cornu: aequiuoce enim ad genus appellamus, cum cornu  
tūm figurā, tum toto dicimus. Item quae ijs proportionē respondent. Animalium ue-  
ro differētiās, aut per uitas, aut per actiones, aut per mores, aut per partes cōstitui di-  
gnū est. Quibus de rebus primū formulā quadā agendū, deinde generatim discus-  
sione diligentiore differendū cēsemus. Profecto differētiā quae in morū, uictuū, actio-

nūq̃ ratione uersant̃, colligi debēt, eo q̃d alia sint aquatilia, alia terrestria. Et aquatiliū ordo duplex: alia em̃ in fluido degūt, uicūq̃ petūt ex humore: quē etiā humorē per uices recipiūt, & reddūt: nec uiuere possunt, nisi uersent̃ in humore. quod plurimā pisciū parti euenire apertū est. Alia degūt quidē in fluido, uicūq̃ inde emolitur: sed aērē nō humorē recipiūt, & foris parere solēt. Cōplura huius generis sunt partim gressilia, ut lutris, lara, crocodilus: partim uolucres, ut mergi, ut urinatrices. Quinetiā quē nullis pedib, innitant̃, ut natix. Nōnulla cum uicū in humore exercent, nec foris uiuere queāt, nihil uel aērē uel humoris recipiūt, ut urticę, ut ostrea. Aquatilis aut̃ generis alia marina, alia fluuialia, alia lacustria, alia palustria, ut rana, ut cordula. Terrestriū uero animantiū, alia accipiūt, reddūtq̃ aērē (quę res spiratio 10 nominat̃) ut homo, & quacūq̃ terrestria habēt pulmonē. Alia q̃uis aērē recipiāt, tamen sedē in terra perpetuō tenēt, & uicū indidē capiunt, ut uespę, apes, & reliqua insecta, quo noīe ea appello, quorū corpus incisuris p̃cingit̃, aut parte tantū supina, aut etiā prona. Sed cū terrestriū plura, ut dictū est, cibū ab aquis petant, nullū generis aquatilis est, q̃d & aquā recipiat, & terrā cibi causa petat. Sūt porro, quę primū uiuāt in humore, deinde forma immutata, foris uitā incipiant agere, ut culices palustres: ex ijs em̃ asili proueniūt. Ad hęc, alia sede stabili degunt, alia mutabili, & uaga. Sedes stabilis in humore tantūmodo est. Terrestriū nulla statu immutabili uiuūt. At aquatiliū plura faxis affixa uitā omnē traducūt: ut conchę genera cōplura. Quinetiā 20 sp̃ogia sensum habere aliquē credūt: argumēto, q̃d multo difficilius abstrahunt: nisi clanculū agat̃, ut referūt auulsores. Sūt item, quę & adherere soleant, & q̃ties libuit absoluit: ut genus quoddā eius, quā urticā uocamus: quippe cum nōnullę ex ijs noctu absolute pascant̃. Nō desunt cōplura, quę cū sint absoluta, mouere tamen se nequeant, ut ostree, & quę tota simplici, mitioriq̃ testa operta, uertibula appellant̃, & calli, aut tubera. Vis item alijs nandi tributa est, ut piscibus, ut mollibus, ut crustatis, uelut locustis. Quadā ambulare possunt, ut genus cancrorū: quippe q̃d quanq̃ supapte natura aquatile est, tamen uim habet ambulādi. Terrestriū uero, alia uolucres sunt, ut aues, ut apes: quę modo inter se quodā alio differunt. Alia pedestria, quorū item alia gressilia, alia reptilia, alia tractilia sunt. Animal q̃d uolucres tantū sit, ut piscis natatile solūmodo est, nullū nouimus. Nam & quę p̃nīs cuteis uolāt, ingredi possunt. Vnde uespertilionī etiā pedes sunt, & uitulus marinus pedes habet minutos. Sic nōnullę aues de pedes sunt, quę ob eam rem apedes, à paruitate pedū nūcupantur: q̃d genus auiculę pennis plurimū ualeat, sicut cętera q̃q̃ propē similia, ut pennis preualere, sic pedib, degenerare uident̃, ut hirudo, & falcula, siue riparia: hęc enim omnia, & moribus, & uolatu, & specie proxima inter se conspiciunt̃. Apparet apes omnibus anni tēporibus. Riparia æstate tantū, cū imber incessit: tunc em̃ & apparet, & capis̃, deniq̃ rara hęc auicula est. At uero quę gressilia, eadēq̃ natatilia sint, cōplura reperiunt̃. Necnō differētiās illas uitę, actionesq̃ animantiū cōtinent. Sunt enim alię gregales, alię solitaria, tum uolucres, tum nantes, tum etiā pedestres. Vitā alię accipiūt degūt, ut eadē modo societate, modo solitudine gaudeāt. Item alię ciuiles, alię inciuiles. Tū ex gregalibus, tum etiā ex solitarijs sunt, gregales in uolucrū genere colūbi, grues, olores. Nullū cui unguis adunci gregatilis esse perpēdimus. Cōplura etiā inter nantes pisciū genera gregatim degere scimus, ut q̃s cursores uocant, & thunnos, & limosas, & hamias. Hoīs naturā ancipitem societatis, ac solitudinis esse, apertū est. Ciuiles appello animātes, quę labori cōmunicāt idem, quarū opus communis efficiē opera, munusq̃ idē omī est, q̃d nō omib, gregalibus cōpetit. Ciuilis generis est homo, apis, uespa, formica, grus. Quarū alię sub duce degunt, ut grues, ut apes: alię nulli subdite imperio sunt, ut formicę, & alia innumera penē genera. Sunt item tam ex gregalibus, q̃ ex solitarijs, alię quę sedē nunq̃ mutant, alię quę mutare 40 stato tēpore soleāt. Et alię, quę carne uescant̃, alię quę frugibus, alię omīa attingāt.

Non



## LIBER PRIMVS.

Nō defunt, quę cibo sui generis utant, ut apes, ut aranei. Apes em̄ melle, & quibusdam alijs dulcibus alunt. Aranei uenatu muscarū uiuūt. Nōnulla piscibus uesti natura uoluit. Ad hęc, alię aut uim habent uenandi, aut ingenio recōdendi cibi dotatę sunt. Alię nec ad uenandū aptę, nec ad recondendū. Itē alię domicilia sibi parant, ut talpa, mus, formica, musca, apis. Alię nullis se includere casis patiunt, ut plures tam insecti generis, q̄ quadrupedis. Quinetiā locis discrimen aliud existit: quippe cū alię cauernas subeant, ut lacerti, ut serpētes: alię per summa telluris degant, ut canis, ut equus: ac alię foramina sibi excauent, alię nunq̄ eo munere fungant: & alię noctu uagent, ut noctua, uestertilio: alię interdiu tantū. Adde etiā alias esse cicures, alias feras. Et alias perpetuō cicures, ut hoiem, ut mulū: alias perpetuō feras, ut pantherā, ut lupū: nōnullas etiā facile posse māfescere, ut elephātos. Sed quin aliter partientū est. Genera em̄ quęcūq̄ placida sunt, hęc eadē fera q̄q̄ possunt reperiri, ut fues, equi, hoies, oues, caprę, canes, boues. Itē alię mutę omnino sunt, alię strepitū tantū elidūt, alię uocē etiam formāt. Quarū alię loqui possunt, alię uocē solam nullis exprimendā literis reddūt. Atq̄ alię loquaces, alię taciturnę, alię oscines, alię inoscines. Omniū uocaliū animantiū cōmunis mos est, ut sui initus tēpore potissimū canāt, & blaterēt. Alię preterea camporū incolę sunt, ut palūbes: alię mōtis, ut upuę: alię cū hoibus degere solent, ut colūbi. Item alię copia libidinis gaudēt, ut perdicū genus, & gallinaceorū. Alię minus Venere ualēt, ut quę coruinā speciem gerūt: quippe quę raro soleant coire. Marinarū etiā animantiū alię pelagicę, alię litorales, alię saxatiles sunt. Ad hęc, alijs data uis est dimicādi, alijs ingeniū cauēdi, & euitādi. Viribus polent, quę iniuriā uel inferant alijs, uel illatā sibi propulsent, seq̄ defendant. Cautę & prouidę sunt, quę aliquid in seipsis pręsidij habent cōtra inferendā iniuriā. Differūt præterea moribus. Nam alię mites, remissę, & minime peruicaces sunt, ut boues. Alię animosę, peruicaces, brutę omnino, ut fues syluestres. Alię ingeniosę ac timidę, ut cerui, lepores, cuniculi. Alię illiberales, perfidę, insidiosęq̄, ut serpentes. Alię liberales, fortes, & nobiles, ut leones. Alię generosę, feroces, insidiosę, ut lupi. Nobile em̄ id est, qđ ex bono prodijt genere: generosum aut, qđ nō à sua natura degenera rit. Et alię astutę, malitiosę, callidę, ut uulpes. Alię animosę, & amatrices, & assentatrices, ut canes. Alię mites, & māfuetudini addictę, ut elephātes. Alię uerecūdę, & cautę, ut anseres. Alię inuidę, & ornatus ac politurę studiosę, ut pauones. Homo unus ex numero animalū omniū uim obtinet cogitandi. Et cū memorię, atq̄ discipline cōplures animātes esse participes possint, nulla tamē præter hoiem potest reminisci. Sed de moribus, uitęq̄ generis cuiusq̄ diligentius pōst.

*Quę corporis partes animalibus communes, quę item proprię sint.*

Caput II

**M**niū aut partes cōmunes animalū sunt, quā cibis recipiūt, et in quā deuorat. Quas quidē partes & easdē esse, & diuersas, nihil prædictis rationibus prohibet. Aut em̄ specie, aut excessu, aut proportionē, aut situ determinandū est. Ab ijs alię cōmunes plurimorū animalū partes habent, & quā cibi excrementū emittūt. Non em̄ hęc omnibus data est. Partē, quā cibis recipiūt, os appellamus: in quā deuorat, uentriculū. Reliqua pars multiplici nomine significat. Sed cum duplex sit excrementū, hoc est siccū, ac humidū: quę partē illam humidū excrementū capientē habent, hęc siccū quoq̄ recepraculū cōtinent. Quę uero hoc habēt, nō illud etiā habere omīa nouimus. Quamobrē quę uesticā habēt, aluum eadē etiā obtinēt. At uero quę aluū habēt, nō omīa & uesticā possidēt. Humidi nāq̄ excrementū cōcepraculū, uesticā: siccū, aluū nominamus. Reliquis magna ex parte tum ea, quas enumerauimus partes tributę sunt, tum etiā quā semen genitale mittat.

*Quomodo animalia inter se differant in seminis prolifici emissionē.*

Caput III

**V**ā modo gignere animal possint, aut in se ipsa semen prolificū mittūt, aut in alterū. Fœmina qđ in se mittit, appellat. Mas, quod in alterū, Sed in nōnullis

discrimē id ſcēming & maris nō eſt. Species quoq; partiū quę ad ipſam pertinet procreationē, diuerſa eſt, cū alia uulua habeant, alia quod uulua proportionē reſpōdeat. Partes hæ ſunt quę neceſſarię uel om̃ibus, uel plurimis datę animalibus ſunt. Omnibus uero ſenſus unus tactus ineſt communis. Itaq; pars qua ſentiendi uis iſta contineatur, nomine uacat. Alijs enim eadem, alijs ex proportionē habetur.

*Humorem quodq; animal habere, aliter tamen uel huic, uel illi ineſſe.*

Caput IIII

**H**umorem quoq; animalium cōtinet, quo ſi aut per uim, aut per naturā ipſam priuet, in perniciē agatur neceſſe eſt. Habent etiā id diuerſum, in quo humor ille & fiat, & contineat. Sunt hæc in alijs ſanguis, & uena: in alijs, quod ijs proportionē reſpondeat: quę quidē imperfecta ſunt: atq; alterū fibra, alterū ſanies dicit. Tactus itaq; in parte corporis ſimilari conſiſtit, ut in carne: aut in aliqua generis eiꝰdē, deniq; in parte ſanguinea, aut in ea, quę ex proportionē uice illius habeat. Om̃ibus tamē parte ſimilari ſenſum hunc cōtinere certū eſt, ſicut ē cōtrario potētias agētes partibus diſſimilaribus tributas eſſe apertum eſt: ut ori ciborū confectionē: pedibus, aut alis, aut quibꝰ uſus proportionē accōmodatis, officiū incedendi. Ad hæc, animalium alia ſanguinē habent, ut homo, equus: deniq; omnia, quę aut perfectā pedibus carent: aut binis, quaternis uel pedibus cōſtant. Alia exanguia ſunt, ut apes, ut ueſpę. Atq; inter marina, ſæpia, locuſta, deniq; omnia, quę pedibus plus, quā quaternis innitantur.

*Quę animalia perfectū animal, quę oua, quę uermem gignāt: quōue ritu quęq; incedāt.* Cap. V 20

**U**tem alia animal gignūt perfectū, alia ouū, alia uermem. Procreār animal, homo, equus, uitulus marinus: & reliqua, quę pilis integunt: atq; in genere aquatili, quę cetę appellamus, ut delphini: & quę cartilaginea uocantur. Quorū alteris fiſtula data eſt, brāchię deſunt, ut delphinis, & balenis. Habēt delphini fiſtula à dorſo, balenę à fronte. Alteris brāchię detectę, ut muſtelo, raia, reliquisq; generis eiꝰdē. Ouū id ex fortibus perfectis uocamus, cuius ex parte principio animal conſiſtit. Reliquū uero alimēto ei, quod gignit, eſt. Vermis id eſt ex quo toto, animal totū per ſubiecti fortis formationē, incrementūq; gignit. Animalium ergo quę animal generant, aut oua intra ſe prius conſiciunt, ut cartilaginea: aut illico animal intra ſe formāt, ut homo, ut equus. At uero in lucem fortis perfectio, aut animal editur, aut ouū, aut uermis. Ouū ipſum aut putamine continet teſtaceo, & bicolor eſt, quale autū eſſe uidemus: aut cute molli obducit, unicolorq; eſt, quale cartilaginea, uermesq; pariūt. Vermes item aut cōtinuō mobiles ſunt, aut immobiles. Sed de ijs accuratius poſt, cū de generatione ageſ, diſſeremus. Nunc animalium reliquas differentias addimus. Enim uero alijs pedes natura dedit, alijs negauit. Et quę obtinent pedes, aut binos hæc habēt, ut hoies, atq; aues, duo hæc tantūmodo genera. Aut quaternos, ut lacerti, ut canes. Aut plures, ut centipedes, & apes. Verū quę cūq; ambulāt, om̃ia pedes pari numero poſſidēt. Quę aut in genere natante pedibus carēt, hæc aut pinnis natant, ut piſces (quorū alij quaternas, binas ſcilicet parte prona, & binas ſupina habēt, ut aurata, ut lupus: alij binas tantū, qui longi leuesq; ſunt, ut anguilla, ut congre) aut nullas om̃ino habēt, ut murena: ſed ita mari utunt, ut terra ſerpentes, modoq; ſimili repunt in humore. Cartilaginei quoq; generis alia quę pinnis carent, uidelicet quę plana ſunt, & caudā habent, ut raia, & paſtinaca, ſuaq; ipſa latitudine natant. Raia tamē pinnas habere uidemus, & quęcūq; ſuam latitudinē nō colligunt in mucronē. Quę aut pedes habere putant, ut mollia, tum pedibus ipſis, tum pinnis natant, & quidē ijs celerius, iners aut alueus ducit: ut ſæpia, lolligo, polypus poteſt, ſæpia & lolligo nequeunt. Cruſta intacta, ut locuſta ſuis caudis natant, celerrimeq; retrorſum, pinnarū caudæ adiunctarū beneficio. Crocodilus etiam pedibus natat, & cauda: quā ſimilem ſiluro habet, quoad paruum magno licet conferre. Volucrū aut alia penna uolant, ut aquila, ut accipiter: alie membrana

Raia certe  
Theodor. pro  
uatracho, ſiue  
ranā quādoq;  
uerit: niſi alie  
terutra lingua  
librarius erra  
uerit.  
i Cordula

brana sicca, ut apes, ut scarabei: alię cute, ut uulpecula, ut uespertilio. Volant pennis, aut cute, quę habent sanguinē. Membranis siccis, quę sanguine carent, ut insecta. Sūt porro, quę uel pennis, uel mēbranis uolant, omnia bipeda, aut apeda. Angues enim circa Aethiopiā tales uolare narrant. Genus pennarū, auem appellamus: reliqua duo genera nomine carent cōmuni. Volucris autē generis exanguis alijs pēnarū tutelę crusta superuenit, ut uaginipennes possint nūcupari, uelut scarabeis. Alijs penna nulla crusta integunt: quorū alia bipennes sunt, alia quadripennes. Gerunt pennas quaternas, quę aut grandiora sunt, aut aculeo in aluo armanť. Vaginipennis illius ordinis nullum est, quod aculeū gerat. Bipeda anteriore parte aculeos gerunt: ut musca, tabanus, asilus, culex. Omnia quę sanguine carent, minus, q̃ quę habent sanguinē adolefunt, paucis marinis exceptis, ut molliū nōnullis: quę quidē genere a grandiora locis tepidis redduntur, & mari potius, aut dulcibus aquis, q̃ terra. Omnia quę se mouent, aut quaternis notis mouent, aut pluribus. Quaternis tantum, quę habent sanguinē: ut hoīes binis manibus, binisq̃ pedibus: aues binis alis, & binis pedibus: quadrupedes pedibus quaternis, pisces pinnis quaternis. Nam & quę pinnis aut nō amplius binis, aut nullis, ut serpentes, utunt, quaternis ea quoq̃ notis nihilominus mouent: flexus enim quaterni ijs agunt, aut bini cū pinnis binis. At uero quę sanguine uacua pedibus se pluribus moueant, siue uolucres sunt, seu pedestres, ijs certe motus per notas plures exerceť: ut animal, quod a uita die uno describenda ephemerū appellatū est, pedibus quatuor, pennisq̃ totidem mouetur. Quippe quod nō solū uitę suę ratione propriū id meritō habeat, sed etiā cum quadupes sit, uolucres quoq̃ est. Omnia porro tam quadrupeda, q̃ multipeda modo simili moueri solita sunt: cunctis enim motus per diametru agitur. Verum cum catera ducibus binis pedibus incedant, cancer unus quaternis regi solitus est.

*Quę animalia habeant sanguinem, quę uo eodem careant.*

Caput VI



Vmma uero animalū genera, in quę singula digerant, rediganturq̃ animalia, quibus scilicet illa cōsummant, & consent, hęc sunt, auis, piscis, cerus: quę quidē omnia habent sanguinē. Ad hęc genus testa insectū est, quod osfreū, siue conchā appellamus: & crusta inclusum aliud, quod noie uacat cōmuni, ut locustarū, & cancerorū, & gammarorū genera: aliud item molle, ut lolligenes, ut lollij, ut sepię. Adde genus insectum: quę omnia genera sanguine carent. Et quorū natura pedes habere patit, multis hęc pedibus cōstant. Sed insectorū uel aliqua uolucres esse apertū est. Reliquorū animalū genera nulla pręterea ampla intelligunt, unū enim quod plura genera cōtineat, nullū est. Sed aut simplex est, nullis ipsum specificis euariās discriminibus, ut homo: aut diuidi quidē potest in species, sed nullis noibus distinctas. Quę enim genere quadrupe de nō pēnato continent, sanguinē quidē omnia habēt: sed alia animal pariūt, alia ouū. Dixerim hęc ouipara, illa uiuipara. Quę igitur animal generant, pilos nō omnia habent: quę aut oua pariūt, cortice omnia muniunt. Cortex hic loco squamę similitis potest appellari. Pedestre sanguineū, quod pedibus careat ex natura, genus serpentū est, idq̃ insectū cortice est. Verū cum caterę serpētes oua pariant, uipera una animal gignit. Nō enim pilos omnia habent, quę animal generant: quippe cū nōnulli ex piscibus animal procreent. Quę tamē pilos sortita sunt, animal omnia progignūt. Nam pilos quoq̃ effigie aculei spiculatos, genus quoddā esse pilorū putandum est, quales herinacei, atq̃ hystrices gerunt, uicem enim uillorū, nō pedum, ut echinorum aculei pręstant. Generis quadrupedū, quę animal gignunt, plures quidem species intelliguntur, sed nullis ferē notatę nominibus. Singulorū enim nomina habentur, ut hominis, leonis, equi, cerui, canis, reliquorumq̃ ad hunc modū. Nullis ferē inquam, quoniā genus unum, uel super ijs omnibus, quę iumenta nō

minamus, est: ut equo, asino, mulo, ginno, inno, & mulis, quas terra Syria fert, quæ similitudine quadam nomen mularum acceperūt, quanquam non omnino eadem qua mularum specie continentur. Coeunt enim & mutua inter se ratione progenerāt. Naturam itaque eorum, quæ minus genere certo continentur, seorsum sigillatim consideremus, necesse est. Hæc ita impræsentiarum formula exposuisse quadam preguſtandi gratia placuit, uidelicet ut quibus de rebus tractandū, et quatenus esset persequendum intelligeretur: post accuratius de iisdem differemus, ut primum differentias, atque accidentia, quæ iuncta cuius sunt, accipiamus, deinde ad eorum comperiendas causas enitmur: ita enim effici potest, ut uia, rationeque docendi utamur naturæ congrua, cum commentatio singulorum antecedit. Hinc enim aperitur quibusnam de rebus, & ex quibus effici demonstrationem oporteat. Primum itaque partes animalium, ex quibus constant, enumerasse par est: ijs enim potissimum, atque in primis, tota quoque ipsa inter se differunt, uidelicet, aut eo, quod alia habeant, alia careant: aut situ, & ordine, aut differentiis, quas antehac exposuimus, id est specie, excessu, proportionem, & affectuum contrarietate. Sed primū partes hominis explicare debemus. Ut enim numeros ad id quod sibi quisque exploratū, certumque habeat, probare solet, ita cæteris quoque in rebus agendum est. At homo animalium maxime omnium notum nobis necessario est. Partes igitur hominis exteriores, & si non sensum effugiunt, tamen ne sequela, & series continuanda doctrinæ præmittatur, atque etiam ut sensum ratio comitetur, partes primum enumerabimus officiales, siue instrumentales, deinde similia ordinem prosequemur.

De summis in hominis corpore partibus, & quid caput, quid item thorax sit. Caput VII



Vmmæ igitur partes, in quas primas totum diuiditur corpus, hæ sunt: caput, collum, thorax, brachium duplex, crus duplex. Thoracem eam partem appello, quæ a collo ad pudenda usque trunca pertendit. Capitis autem pars, quæ capillis intacta est, calua appellatur, cuius pars prior sciput, nouissime consistere solita. Omnium enim ossium corporis, ultimum id concreuit, & induratur. Posterior occiput est. Media inter occiput & scinciput, uertex. Cerebrum scincipiti subditum est: occiput inane. Calua ipsa sanè tota, os rarum, rotundum, cute gracilentia obductum est. Habet suturas, quæ mulieris est, unam in orbem: quæ autem uiri, tres in idem magna ex parte coeunt. Iam uisum etiam sine ulla futura caput uiri est. Verticem caluæ, medium discrimen, & æquamentum capillorum uocamus: quod nonnullis geminum est. Sunt enim qui facti à natura biuertes sint, uerum non osse, sed capillorum æquamento.

Quid facies in homine.

Caput VIII



Faciem partem eam nominamus duntaxat in homine, quæ caluæ subiecta est. Nam piscis aut bouis faciem dicere non solemus. Partes faciei frons, quæ sub scincipite posita inter id ipsum, & oculos est. Quibus hæc magna, segnes: quibus parua, mobiles: quibus lata, mente moueri idonei: quibus rotunda, iracundi.

De supercilijs, oculis, palpebris, cilijs, pupilla, nigro, candido, angulis: & de ijs animalibus quæ oculis careant.

Caput IX



Per cilia sub fronte bipartito distincta: quæ si in rectum porriguntur mollem subesse animum significant. Si iuxta nasum inflexa sunt, austerum notant, & acerbum. Sed si iuxta tempora inflectuntur, derisorem dissimulatoremque indicant: si uero in totum demissa, notam inuidiæ habent. Oculi ijs subiacent duo, legitimo scilicet naturæ officio: quorum partes

partes superius inferiusq; tegentes, palpebræ appellantur. Pilos, qui extremo palpebrarum ambitui adhaerēt, cilium nominamus. Humor oculi interior, quo uidemus, pupilla est. Quod eam ambigit, nigrū dicitur. Quod postremo nigrum circumdat, candidum, siue albugo. Pars cōmunis superioris, inferiorisq; palpebræ, angulus est, quem duplicem uterq; oculus habet: alterū iuxta nasum, alterum iuxta tempora. Qui si iusto sunt longiores, notam morum maleficorū præbent: si carnosi more peccuncolorum sunt, qui naribus iunguntur, malitiam præferunt. Habent profectio oculos, tum cætera animalium genera omnia, præterquam testa intacta, & si quid imperfectum aliud est: tum ea, quæ animal generant omnia, præter talpam: quam modo quodam habere dixerim, cum tamen omnino habere negem: quippe cum omnino quidē nec uideat, nec perspicuos habeat oculos. Verum si quis prætentam membranam detrahit, locus oculorum apparet, & pars nigra eorundem: situs deniq; & descriptio eadem, quam legitimam conspiciui oculi obtinent, urpote cum obducta cute oculi pressi, confusi, oblaesiq; essent, dum crearentur.

De oculorum uarietate in quibsq; animantibus.

Caput X



Andidum oculi magna ex parte simile in omnibus est. At quod nigrum dicitur, uariat. Alijs enim atrum, alijs admodum cæsum, alijs fuluum, alijs caprinum, quod morum optimorū indicium est, & ad cernendi claritatem primum obtinet. Solus ergo potissimum animalium homo numerosa oculorum uarietate notatur, quum cæteris in suo singulis genere, color sit idem, equis exceptis, qui interdum oculis proueniāt cæsis. Sunt oculorum alijs grandiores, alijs parui, alijs modici, qui optimi habentur: item alijs nimium prominentes, alijs conditi, alijs modice siti. Qui conditi sunt, clarissimi cernere in genere quocq; brutorum animalium possunt. Modicus tamen situs, nota morum est optimorum. Et, aut nimium conuiuent, aut rigidi, intentiq; constant, aut modice nutant. Notam morum laudabilium habēt, qui mediocriter conuiuent. Reliquorum alteri impudentiæ, alteri inconstantia indices sunt.

De aure, naso, temporibus, maxillis, labris, gingiuis, dentibus, lingua, palato, columella, eorumq; in quibsq; animantibus differentijs.

Caput XI



Vis, pars capitis qua audimus, est, ita ut nulla spiratio desideretur. Erat enim Alcmaeon, qui capras spirare per aures credidit. Auris pars exterior, cui est nomen auriculæ, parte constat superiore, pinna: inferiore simbra: tota autem ipsa ex cartilagine, carneq; constituta est. At pars interior forma anfractui cochleæ similis desinit in os, quod auriculam planè imitatur, in quod quasi nouissimū uasculum strepitus deuenit. Hinc meatus ad cerebrum nullus est. At in oris palatum usq; semita pertendit, & uena de cerebro descendit eodem. Oculi quoq; in cerebrum finiunt, & uterq; positus super uenula est. Aures homini tantū immobiles: nam eorum quæ sensum obtinent audiendi, alijs auriculæ sunt, alijs defunt, meatusq; patent ipsi audiendi, ut ijs quæ penna, aut cortice, squama ue integuntur. At ea quæ animal generant, omnia auriculas habent, excepto uitulo marino, & delphino, & reliquis ita cetarijs. Nam & quæ cartilaginea appellauimus, animal parium. Verum homo unus, aurem non mouet. Vitulus ergo marinus meatus continet manifestos, qua audit: at delphinus audit quidē, sed nullis cauernis, quæ uicem præsent aurium. Cætera suas auriculas omnia mouent. Situm aures hominis eundem in orbe, quo oculi obtinent: non ut quadrupedum nonnullis positæ superius sunt. Aurium aliæ leues, aliæ pilosæ, aliæ medium tenent, quæ quidem ad audiendū aptissimæ sunt. Morum hinc præscita nulla habentur. Item aliæ maiores, aliæ paruæ, aliæ mediocres: & aut nimium, aut

parum, aut mediocriter arrecta. Notam moram optimorum habent quæ mediocres. At quæ magnæ, arrectæque, ultra modum stultitiæ indices sunt, aut loquacitatis. Partem inter utrumlibet oculum, & aurem, & uerticem positâ, tempora appellamus. Item pars faciei nasus, quæ meatum præbet spiritui: aerem enim ea parte reddimus, & accipimus. Sternutamentum quoque eadem agitur parte, quod flatus uniuersi erupit, est, signum augurale, & unum ex spirituum omnium generibus sanctum, & sacrum. Tum etiâ spiritum trahi in pectus, & inde reddi necesse est: quod fieri non potest, nisi naribus spiremus: cum recipatio spiritus de pectore per gurgulionem, non de capite parte aliqua acitetur: sed datur uiuendi facultas, etiam si desit spiratio. Olfactus quoque, id est, sensus odoris, hac eadem parte sumministratur. Mobiles esse nares natura uoluit, nec sicut aures immobiles sua compage. Pars nasi, quæ cartilaginea nares discriminat, interseptum uocamus. Meatum uero utrumque, inane. Nasus enim bipartito distinctus est tramite. Elephantis proluxa, ualidaque naris augetur: eiusque usus idem qui manus: ea namque cibos tam siccos quam humidos colligunt, capiunt, & in os admovent soli animalium omnium. Est præterea maxilla duplex, cuius pars prior mentum, posterior mandibula est. Mouent animalia omnia maxillam inferiorem, crocodilo fluuiatili excepto: is enim unus superiorem mouet. Labra mox à naso habentur, caro permobilis. Quod autem intra maxillas, & labra describitur, os est: cuius partes palatum, & fauces. Inest pars sentiens saporem, lingua, uim istam sentiendi præcipue obtinens parte sui primore. Nam si interiore tangat, minus sentiet. Omnia præterea quæ caro sentire potest, lingua etiam potest: ut durum, calidum, frigidum, sua quauis parte, sicut & saporem. Hæc aut lata est, aut angusta, aut mediocris, quæ quidam optima, & explanatissima est. Item aut absoluta, aut constricta, qualis tortorum, balborumque est. Carne soluta, rara, fungosa, lingua constat. Eius pars quædam ligula est. Bifida oris compago, tonsillæ. Multifida gingiuarum appellantur: carne hæc constat, intusque dentes ossei cohærent. Parte uero penitioris partícula pendet, alia uuigera, uenæ applicata, columella nomine, quæ si immodice humefacta intumescat, inflammaturque, nomine uuæ uocatur, & strangulat.

De collo, pectore, eorumque partibus.

Caput XII



Ollum, quod inter pectus, & faciem est. Cuius pars prior guttur, posterior gula. quantumque colli ipsius cartilagineum priorem obtinens situm, uocem transmittit, & halitum, id arteria nominatum est. At uero quantum interius carneum spinæ præiacet, gula dicitur. Pars autem posterior colli extrema, ceruix appellata est. Partes thorace tenus dispositæ hæc sunt. Thorax ipse parte priore, posterioreque constat. Mox à collo pectus priorem obtinet situm bipartitum, in mammam parte sui utraque extuberans. Mammis laxior contextus corporis est, iuncta papilla, per quam foeminae lac transmissum elicitur. In maribus etiam lac fieri potest: uerum caro ipsa spissa, mulieribus fungosa, foraminulentaque est.

De uentre, inferioribusque, usque ad feminale membrum.

Caput XIII



Enter infra pectus est parte priore, eiusque radix umbilicus est. Cuius dici pars subiecta in latus utrumque, illa dicitur. Quæ autem recte subiungitur, sumen est, siue abdomen. Cuius postremum, aquaticulus. Sed super umbilicum hypochondrium est, à cartilagine, quasi subcartilagineum denominatum. Cauum autem commune subcartilagine, & ilium, chologo est. Partem posteriorem lumbi pari structura præcingunt, unde nomen osphys inditum est. Partis uero excretoriæ, quod subditum quasi stragulum est, nates appellatur. In quo autem femur uersatur, coxa, & acetabulum, Pars foeminae propria, uterus

uterus, aut uulua est. Maris, penis, foras postremo thorace propendēs, parte sui prima carne propemodum confās, & æquabili facie turbinata. Nomen à glande pars hæc mutata est: quam quæ integrit cutis, uacat nomine: quæ uulnere obductio coalescere nequit, sicut nec genæ, aut palpebræ præcisæ reduci ad unitatē queūt. Totū tamen, quod ex ea cute, glandeq; cōstat, præputium est. Reliqua pars cartilaginea est, & augeri ampliter potest, & ingredi, atq; egredi contrā, q̃ iumentorum. Subiacent membro genitali testes gemini, cute obducti, quod scrotū nominamus. Testes ipsi nec eiisdē naturæ sunt, cuius caro, nec multū à carne dissidēt. Sed quēadmodū hæc se habeāt, ac oīno de cæteris huiusmodi partibus, postea accuratius differemus.

10

De uarietate seminalis membri, uiri, &amp; mulieris.

Caput XIII



Ulieris autem genitale contrā, quā uiri formatum est. Cauum enim subditū pubi est, nō sicut maris propensum, ac prominens. Ceruix ab utero effertur, accessum prolifico maris semini præbēs. Exitū humidi excrementi suo sexus uterq; genitali habet subministrandū. Communis colli, & pectoris pars, iugulū est. Costæ, brachij, & humeri, ala. Femoris, & imi uentris, inguen. Pars item interior femoris, & natis communis, coles: exterior, subnatale. Thoracis iam partes omnes primores diximus.

De dorso, cæterisq; partibus posterioribus.

Caput XV

20



Orsum ponē, pectus est. Cuius partes scapulae, & spina, infraq; è regione uentris, lumbi habētur. Communes autē partis superioris, inferioresq; costæ octonæ. Nam de hominibus gentis turdulorum, quos septenis costis ferunt creari, nullius idonei autoris testimonio conitat. Haber sanē homo suas partes ita dispositas, ut in eo & superius sit, & inferius, & prius, & posterius, & dextrum, & sinistrum. Constat sanē dextrum & sinistrum ex similibus ferē partibus, atq; eisdem. Verum sinistra omnia sunt imbecilliora. At posteriora prioribus, & superiora inferioribus discrepant: præterq; quod inferiora similitudinem superiorem præferre ea dixerim ratione, qua uenter imus respondere aſſolet faciei, in corpulentia, uel gracilitate: & crura cum brachijs communem ineunt rationē. Itaq; quibus cubiti breues, ijs etiā femora magna ex parte breuia sunt: & quibus pedes exigui, ijs manus quoq; paruæ habētur. Membri uero superioris bipartitam compactionem, brachium, siue ulnam appellamus. Cuius partes, lacertus agilis, gibber, cubitus, manus. Partes manus, palma, & digiti quinque numero. Digiti pars quæ se inflectit, nodus siue articulus est: quæ rigida constar, internodium dicitur. Digitus pollex nuncupatus, uno inflectitur nodo, cæteri binis adducuntur. Inflexus uero, tum brachij, tum digitorū omnium agitur in interiora. Brachium ad gibberum appellatū inflectitur. Nodus quo cum brachio manus iungitur, coartaturq; brachiale uocamus. Pars interior manus uola dicit: carnosā est, & scissuris uitæ indicibus distincta: lōgioris scilicet uitæ, singulis aut binis ductis per totam breuioris binis, quæ nō longitudinē totam designent. Exterior neruosa est, & nomine carens. Membri inferioris bipartita compactio crus est. Huius femur, quod biceps. Mola, quod locum orbiculatum foris adiectum est. Tibia, quod gemino osse subiacet. Cuius pars prior crea, posterior fura, caro neruosa, uenosa ue, alijs retracta à poplite, quibus nates sunt pleniores: alijs detracta, quibus graciliores. Postremū curis malleolus geminus utriq; partitus lateri est. Pes autē, quod multiplici osse constar. Cuius pars posterior calx, prior discreta in digitos quinque est: media plantæ nomine explicatur, cuius quod carnosum inferius, solū attingit. Vestigium est, quod superius, pronam conficit partē, neruosum, & nominis adhuc indigū est. Hæret summis digitis unguis, & nodus interuenit: sed non nisi uno inflexu addu-

cuntur. Quibus pars interior plantæ nō caua, sed ita pleniūscula est, ut solum toto attingat uestigio, ij uersuti sunt, & fraudulentī. Cōmune femoris, & tibiæ, genu poplesq; est. Partes maris, ac foeminæ cōmunes hæ sunt: quarū situs, quemadmodum ad superius, inferius, prius, posterius, sinistrū, dextrū se habeat, tametsi per corporis summa uisū explorat, ac patet, describēdus tamen is quoq; recitandusq; est eadem illa de causa, qua superiora enumerauimus omnia, scilicet ut series cōmentandi seruetur perpetua, dum ordinē persequimur omnium, quo minus lateat ea, quæ non modo eodē homines, quo cætera animalia possidēt. Ergo superiora, inferioraq; hominem omnium maxime animalū habere, ratione locorū naturalū intelligimus. Eius enim partes tam superiores q̃ inferiores, ad situm orbis uniuersū superiorem, 10 inferiorēq; dispositæ sunt. Iudem quæ priores, posterioresq; atq; etiā dextræ, sinistræq; habentur: cum cæterorum animalium genus, uel omnino respectu eiusmodi careat, uel cōfusus ita cōsistat. Caput itaq; cæteris omnibus superiorē obtinet situm, corporis sui ratione. At homo, quoniam (ut modo diximus) ad uniuersū orbis habitum institutus est, idcirco partē etiā istam habet respondentē parti sublimi uniuersū. Caput, ceruices, & collum, excipiūt tum pectus & dorsum. Alterū prius, alterum posterius est. Subiacent ijs uenter, & lumbi, genitale, & nates; mox femur, & tibia; postremo pedes. Crura uero anteflectūt eodē scilicet quo & incedūt. Pedis etiā pars mobilior eodē se flectit. Calx ē tergo positus est. Malleoli, sitū imitant auriū: quippe qui latera teneāt imi cruris, quomodo aures iūctæ lateribus capitis habentur. Brachia 20 ex latere corporis sinistro, dextroq; dependēt, atq; se introflectūt, ita ut homini potissimum de uera crurum & brachiorum aduersa inter se sint. Sensus autē, partesq; eorū sensorias, oculos dico, nares, linguā, eodem scilicet priorē in partē spectantes habemus. At auditū, eiusq; partem sensoriam, id est aures, à latere, eodē in orbe, quo oculos. Dissit oculi hominis sibi interuallo, proportionē magnitudinis respectu cæterorum animalium, minimo. Tactus ē sensibus homini exquisitissimus, deinde gustus: reliquis superatur à multis. Ita partes exteriores collocatæ, atq; dispositæ sunt, nominatūq; præcipue, & cognitæ per usum, situmq; euidentiorē habentur.

*Cum quibus animantibus hominis cerebrum, gula, arteria, & uenter conueniant.*

Caput XVI



T uero interiores contrā. Sunt enim hominum in primis incertæ atq; incognitæ. Quamobrem ad cæterorū animalū partes, quarū similes sint humanæ, referentes, eas cōtemplari debemus. Primum igitur cerebrum capitis priorē obtinet situm, non modo in homine, uerum in cæteris etiā animalibus, quibus ea pars data est. Omnibus autem in ijs est, quæ sanguinē obtinent; & ob eam rem sanguinea appellatur: atq; etiā quæ mollia nomine speciali nuncupatur. Sed homo plurimū cerebri proportionē magnitudinis, ac humidissimū habet. Continent id membranæ duæ: altera ossi adhærens, ualida; altera ipsum cerebrum attingēs, infirmior. Bipartitum omnium cerebrum est, postremumq; iūgitur, quod cerebellū appellatur, quod certe & tactū, & specie for- 40 mam habet diuersam. Pars uero posterior capitis, inanis, & caua omnibus est, prout in singulis magnitudine uariatur. Quibusdā enim caput grande, facies subiecta capiti parua, ut quæ rotūda sunt facie. Alijs caput parū, maxillæ lōgæ, uelut generi omnium mētorum. Cerebrū omnibus priuatū sanguine est, nec uenā intra se ullā continet, & ad tactum frigidū per naturā est. Habet suo in medio plerisq; omnibus cauum quoddā exiguū: membrana obhærente uenosa, cuticulariq; obducitur. Osse postremo cōtinetur tenuissimū, infirmissimūq; omnium capitis ossium, cui nomen occipiti. Meatus ab oculis terni ad cerebrū pertinet, ita ut maximi, & mediocres ad cerebellū tendat, minimi ipsum cerebrū adeant. Minimi ij sunt, qui propiores nari- bus



bus oriuntur. Maximi porrò illi æqui distāt, nec usquam coire possunt. Mediocres  
coeunt; quod præcipue in genere piscium pater; & cerebro sunt ij propiores, q̃ ma  
gni. Minimi perq̃ laxo inter se distant intervallo, & nunq̃ ob eam rē possunt coire.  
Gula intra collū est, ab angustia & longitudine nūcupata: cui comes arteria iūgitur,  
priorē obtinēs sitū in omnibus ijs, quæ eam habere naturæ placuerat. Habēt autem  
omnia, quibus pulmo est. Natura cartilaginis arteria constat, & sanguinis perq̃ exi  
gui compos est, uenulis cōplexa tenuibus. Quod ad superiora, id est oris habitum  
pertinet, e regione posita est foraminibus nariū, quæ in oris partem patefcūt. Vnde  
sit, ut quoties inter bibendū humor retrahitur, effluat ex ore per nares. Iūgitur lin  
guæ postremæ, quæ ligula nominata est, posita inter ea, quæ modo dixi, foramina:  
10 uidelicet apta, quæ per uices arteriæ foramentū, quod ad os spectat, operiat. Arteria  
altero sui extremo, cū lingua ima cōiungitur, altero ad pulmonis intercapedinē de  
scēdit, tum in utraq̃ finditur partē pulmonis. Effe nanq̃ bipartitus pulmo omniū  
expetit. Verū in ijs, quæ animal generāt, distinctio non æque apparet, minimeq̃ in  
homine. Est præterea hominis pulmo simplicior, nec ita multifidus, ut nonnullorū  
animal procreantiū est, nec leuis, sed inæquabilis est. At in ouiparo genere, ut aui  
bus, & quadrupedibus, quorū partus oui primordio inchoari solitus est, pars altera  
pulmonis multū discissa ab altera est, ita, ut binos habere pulmones uideātur. Atq̃  
a singulari arteria partes in utraq̃ pulmonis latus duæ dependent. Venæ quoq̃  
20 maiori, ac alteri, cui nomen est aortæ, pulmo connectitur. Spiritus uero quoties in  
flatur arteria, caua subit pulmonis. Hæc mucronata specie cartilagineis diducuntur  
corpufculis, de quibus foramina quoquouerfus per diminutiones arctioribus, sub  
inde ampliora excipiētibus transmittuntur. Cor etiā arteriæ iungitur, obefis, cartila  
gineis, fibrosisq̃ uinculis: & qua annectitur, cauum est. Spiritus dū arteria inflatur,  
an subeat cor, minus in nōnullis cōstat scilicet minutis. At in grādiōribus animalū,  
spiritum cor subire ipsum apertum est. Arteria ita se habet: & accipiēdi, reddendiq̃  
tantūmodo spiritus officio fungitur. Nihil etenim aliud uel siccum, uel humidū pa  
ti ipsa uidetur: sed ubi in eam tale quid deerrauerit, tandiu torquetur, dum excutiat  
quod delapsum est. Gula ab ore & ipsa dependet, continua tum spinæ, tum arteriæ  
30 nexu fibrarum: & per seipsum transuersum in uentriculū finit, carnis speciem refe  
rens, & pariter distendi in longum latumq̃ habilis. Venterculus autē humanus ca  
mino similis est, quippe qui nō multo amplior sit, quā intestinū, sed quasi intestino  
similis ampliori. Tum intestinū simplex flexuosis orbibus est, a quo proximū inte  
stinum admodum amplum. Alius autē ipsa suilla similis est: quippe quæ & ampla  
sit, & quod usq̃ in sedē porrigitur, breue id, corpulentumq̃ transmittat. Omentum  
medio à uentre dependet, quod non nisi pinguis membrana est: sicut etiā in cæteris  
animantibus, quæ unum continent uentrem, & utraq̃ parte oris dentata sunt. La  
40 ctes super intestina positi sunt, qui & ipsi latiore constāt membrana, & pinguescūt.  
Pendunt ex uena maiore, atq̃ aorta, uenasq̃ per multas frequenti concursu defe  
runt ex pari illo uenarum grandium ad intestina, de summis ad ima usq̃ spargen  
tes. Gula, arteria, uenter, ita se habent.

De corde hominis, cæterorumq̃ animantium, & eius sede.

Caput XVII

Lactes reddit  
Theod. pro me  
fenterio. Quos  
modo autē exa  
cusetur, uide æ  
pud Hermol.



Or sinum triplicē continet, iacet paulō a pulmone superius ad arteriæ  
fissuram, opertum membranæ inuolucro pingui, & corpulento, qua  
uenæ maiori adnectitur, & aortæ. Iungitur cum aorta suo mucrona  
to turbine, in pectusq̃ parte eadem uergit omniū pariter, quæ pectus  
fortiuntur. Omnibus uero tam pectore cōstitutis, quā ea ipsa parte  
carentibus, cor æque suo mucrone in partem uergit priorem: uerum latere sapius

potest, quoniā dissectio animāte dimoueat. At parte sui ampliore, & gibba, superiora corporis spectat. Habet maiore partem sui mucronis carnosam, & spissam, & nervulos suis in cauis continet. Situm ceteris animalibus in medio pectore est, in quibus scilicet pectus inest. Homini tantū in partem sinistram potius uergit, paulo à mammarū distinctione ad laeuam inclinās papillam pectoris parte superiore: nec magnū est, & specie tota nō oblongū, sed rotūdius. Parte tamen extrema in acutū se colligit, exitq; penē in mucronē. Habet, ut modo exposui, sinum triplicem: maximum dextro in latere, minimū in sinistro, medium magnitudine inter sinistrum & dextrum. Omnes ad pulmonem foraminibus peruij redduntur. Quæ res in uno tantū perspicua est. Inferius uero à nexu suo, maximo sinu uenæ coniungitur maiori, ad quam lactes etiā sunt. Sinu autē medio aortæ annexum est. Quinetiam ad pulmonē meatus à corde ducitur perpetui, finditurq; eodem, quo arteria, modo, in omnes pulmonis partes: & meatus, qui eodem ab arteria tendunt, sequuntur. Verum hi superiorem obtinent firum, neq; ullo communi foramine ad illos commendant, sed sua ipsi copulatione spiritum, quem cordi transmittant, recipiunt, pertinet enim alter ad cauum dextrum, alter ad sinistrum. De uena maiore, ac de aorta separatim ratione cōmuni post differemus. Sanguinis autē plurimū pulmo ex ceteris cōtinet membris, quæ animal pulmonis compos, idemq; uiuiparum intus, foris ue constituunt: quippe qui totus inanis sit, & fungosus, ac riuulos uenæ maioris singulis suis fistulis excipiat. Errant enim qui sanguinis uacuum pulmonem esse arbitrantur, decepti scilicet cōspectu eorum pulmonū, quos dissectis detraxerint animalibus, quorū sanguis ilico effluit uniuersus. Cor unum ex reliquis uisceribus sanguinem habet. Et cum pulmo nō intra se, sed in uenis cōtineat sanguinē, cor eundē intra se cōtinere apertū est: singulis enim suis sinibus sanguinē tenet, uerū tenuissimum medio. Sub pulmone septū transversum pectoris est, quæ præcordia, & cinctum appellat, costis, & subcartilagineis, & spinæ annexū, parte media tenue, membranaq; exilitate contextū. Venas etiam per se continet porrectas. Sunt porro hominis uenæ crassæ proportionē humani corporis.

*De iecinore, liene, felle, renibus & uesica.*

#### Caput XVIII



Ecur supra seprum positum à dextro latere est. Lien à laeuo æque in omnibus, quæ membra ista disposita habent per naturam, non prodigio. Iam enim legitimū illud locum in nonnullis quadrupedum lienem cum iecinore permutasse uisum est. Venti lien annectitur, quæ omentum obducit. Est hominis lien suillo similis, sed specie angusta, & longa. Iecur magna ex parte, maximoq; animalium numero felle caret. Verum in nonnullis id habere sibi adnexum uidetur. Rotundum iecur hominis est, ac simile bubulo. Fellis priuationem uel in uictimis non usquam percipi certum est: quippe cum parte quadā agri Chalcidici Eubotæ fel nullū pecori sit. At in Naxo, omnibus ferme quadrupedibus adeo grande, ut qui sacra fecerint aduenæ stupefcat, rem scilicet prodigij loco sibi arbitantes, nō talem esse naturam terræ illius quadrupedum. Iecur uenæ maiori adnexum est, nulla ex parte aortam attingens. Vena enim quæ à maiore proficiscitur, iecur transigit, qua portæ appellatæ iecoris habentur. Lien quoq; uenæ uni maiori adnexus est. uena enim inde ad lienem pertendit. Renes post hæc iuxta spinam ipsam adherēt, bubulis similes. Dexter in omnibus, quibus sunt renes animalibus, superiorem obtinet locum, minusq; pingui obducitur, & siccior est: quod uel in omnibus æque liquidō manifestatur. Pertinet ad renes meatus tam ex uena maiore, quàm ex aorta, sed non ad cauum. quod alij amplius, alij arctius sua media parte continent: præterquam in uitulo marino, cuius sanē renes, quamuis bubulis similes sint, tamen omnū solidissimi uisuntur. Meatus uero qui

eò pertinent, omnes in renum corpus absumuntur: cuius rei argumentũ est, quod sanguine carent, nec intra se quicquam con crescere ostendunt. Habent igitur, ut modo dixi, sinum exiguum, à quo meatus duo insignes ad uesicam deueniunt. Alij etiam ex aorta frequentes, ac ualidi eodem pertendunt. Ex medio autẽ renum singulorum uenæ singulae, cauae, neruosae dependent, spinam prætereuntes ipsam angusto itinere: tum in utranq; abolentur coxam, ac denuò ibi porrectæ apparent, demumq; in uesicam descendunt. Hæc enim loco ultimo posita est, meatibus annexa illis porrectis à renibus ad ceruicem, urinarium producentem meatum, & ferè circumundiq; extenuatis in fibras membranulis proximis, quodammodo septo illi transuerso pectoris deligata. Est profectò uesica hominis proportionẽ, quàm cæterorum, amplior.

*De genitali membro, et testibus: quibus uel corporis partibus mas à foemina dissentiat.*

## Caput XIX



Enitale ceruici uesicæ adnecitur, foramine foras directo peruium: sed paulò inferius altero intra eandem semitam cõuio deductum. Quorum foraminum alterũ ad testes, alterum ad uesicam, neruosum, cartilaginofum mçq; tendit. Testes ex eo maribus pendet: de quibus postea partium communi examine, quemadmodum se habeant, differemus. Hæc eodem modo uel in sexu foemineo omnia natura conformauit, atq; disposuit. 20 Nulla enim parte interiore sexus inter se differunt, nisi utero: cuius forma qualis nam sit, ex confectionum descriptione petendũ, expectandumq; est. Situs eius ad intestina infra alium à parte priorẽ: tum uesica iuncta supra uterũ est. Sed de uteris quoq; pariter omnibus differendum postea est. Neque enim similes dati omnibus sunt, nec forma simili constituti, si uterus cæterorum quoq; animalium uulua dicenda est. Partes hominis, tum interiores, tum exteriores, has, talesq;, & ad hunc modum haberi perspectum est.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SECVNDVS,

INTERPRETE THEODORO.

*Quæ animalia in quibusdam conueniant, in quibusdam autẽ differant.*

## Caput I



40 AETERORVM animalium partes, aut cõmunes omnium sunt, ut superiore uolumine explicatum est: aut aliquorum generum propriae. Eadem autẽ, diuersæ uel inter se sunt, eo modo quo superius dictum est: quippe cum omnia ferè animalia genere diuersa, partium quoq; suarũ plurimas specie habeant diuersas: & aut proportionẽ tantũ easdem, genere autẽ diuersas: aut genere tantũ easdem, specie autẽ diuersas. Sunt etiam complures, quæ alijs datae, alijs denegatae sunt. Ergo quadrupedes quæ animal generant, caput, collum, & omnes capitis partes sortiuntur: uerum ipsæ singulae partes forma inter se differunt. Iam leonĩ ceruix ossẽ uno rigida constat, nec uertebis ullis iungitur. Interiora autẽ omnia canibus similia continentur. Habent quadrupedes, quæ animal generant, omnes uice brachiorum crura priora: sed præcipue, quæ multitudine sunt, hæc manibus suo digitato pede respondent. hoc enim ad plura quasi manu utuntur. Partem etiam lauiam minus quàm homo absolutam habet, & agilem: excepto elephanto, qui digitos numero quinq; indiuisos, leuiterq; discretos, crura priora multo posterioribus longiora, & malleolos posterioribus imis cruribus possi

det. Habet præterea talem tantamq; narem, ut ea manus uice utatur: quippe qui non nisi ad os illam admouens, & bibat, & edat: suo etiam rectori eam erigit, atq; offert. & arbores quoq; eadem prosternit. & quoties immerfus per aquam ingreditur, ea ipsa edita in sublime, reflat, atq; respirat. A dunciuscula parte sui postrema, naris hæc est, sed flexi non potest, cartilaginea enim, & proinde rigidiuscula est. Solus etiã animalium homo ambidexter, hoc est, dexter manu utraq; nascitur. Pectus animalia omnia humano proportionatum pectori habere uisuntur, uerum non simile, latum enim pectus humanū est, cætera angusta. Nullum est enim quod præter hominem mammas parte gerat priore. Elephātus mammas duas quidem, sed non in pectore habet, sed paulo citra. Flectunt autē crura priora contrā, atq; posterio- 10  
rora: & e contrario quā homo membra inflectunt, excepto elephanto. Quadrupes enim quæ animal generant, genua ante se flectunt, suffragines in auersum: aduersaq; inter se habent conuexa curuaturæ crurum suorum. Elephas, non ut alii qui retulerunt, agit: sed considendo crura inflectit, nequit tamen præ nimio pondere, utrunq; in latus æquilibrio quodam uergere: sed aut læuo incubat, aut dextro, atq; eo ipso habitu requiescit. Flectit hic certe suos posteriores poplites modo homini- 20  
nis. At ouiparis quadrupedibus, ut crocodilo, lacertæ, & reliquis generis eiusdem crura, tum priora, tum etiam posteriora retro flectuntur, paulum in latus uergentia. Nec secus in cæteris multipedibus agitur, nisi quod medijs pedes subinde ambigui amplius in latus flectuntur. Homo inflexum membrorū suorum eodem econ- 20  
trario agit: quippe qui brachia retrorsum flectat, quanquam ita, ut paulum uergat in latera exteriora, crura autē contrahat recte. Sed quod ante tam priora, quā posteriora inflectat, nullum est. Omnibus uero humeri, armi ue contrā, quā cubiti, aut crura priora flectuntur. Coxæ etiam contrā quā suffragines. Cum itaq; homo contrā, quā magna pars cæterorum animalium flectat, fit, ut si qua alia membris huiusmodi constant, ea quoq; e contrario flectant. Aues etiam suos inflexus similes quadrupedibus agunt: crura enim quæ bina habēt, in posteriora curuant. alas, quas uice brachiorum, aut crurum priorum obtinent, in priora. Vitulus marinus tanquam læsa, imperfectaq; quadrupes est: quippe qui continuo à scapulis pedes habeat manibus similes modo ursæ. In quinos enim finduntur digitos, qui singuli 30  
ternis articulis flectantur, & unguibus muniuntur non magnis. Pedes quoq; posteriores quinis discretos digitis habet, & curuatura & unguibus cum primis conuenientes; uerum forma proximos piscium caudis. Motus animalium quadrupedum, ac multipedum, per diametrum agitur: quo modo subsistere etiã solent. Initium autem incedendi omnibus à dextris partibus. Gradiuntur pedatim leones: & genus camelorū utrunq; bacrianū dico, atq; arabium, pedatim incedit, cum pes sinister non transit dextrum, sed subsequitur. Partes, quas homo habet priores, quadrupes infra habet supinas. Quas autē ille posteriores, hæc pronas. Magna item quadrupedum pars cauda habet: nam uitulo quoq; marino cauda inest, quamuis exigua, cerui modo. De genere fimiariū postea dicemus. Omnia ferē quadrupeda, eademq; 40  
uiuipara, sunt pilosa: nec hominis modo læuia esse nouimus. Homo certe paucissimis, exiguisq; integris pilis, nisi in capite, qua quidē parte hirtissimus omnium ipse est. Cæteris quæ pilis uestiunt, partes prone pilosiores sunt, supinæ aut glabræ omnino, aut minus pilosæ habentur. At homo contrā. Cilium etiã homini utraq; in palpebra, & alæ oppletæ pilis & pubes: quod cæteris abest. Carent enim cilio palpebræ inferioris, sed paulo inferius pilis rari nonnullis exeunt. Ipsorū autē quadrupedū pilis interiorū, alijs corpus totū est hirtū, ut sui, ursæ, cani. Alijs collū hirtius pari undiq; modo, ut leoni, & reliquis iubat. Alijs prona tantū ceruicis, à capite ad summos ar-  
mos uilli geritur, ut equo, ut mulo, & reliquis capronatis, quo in genere bonasus, quoq;

quoq; ē syluestribus cornigeris enumerāduſ est. Quinetiā hippelaphus facis iuba  
summis continet armis, qui à forma equi, & cerui, quam habet compoſitā, nomen  
accepit, quaſi equiceruus dici meruiſſet. Necnon fera, quæ & ipſa ab equo & ppar  
dium nominata eſt, capronas parte gerit eadem. Sed utruq; id genus tenuiſſimo  
iubæ ordine à capite ad ſummos armoſ crineſcit. Propriū equiceruo uilluſ, qui eiꝯ  
gutturū modo barbæ depēdet. Gerit cornua utruq; excepta fœmina equiceruini  
generis: & pedes habet biſulcoſ. Magnitudo equicerui non diſſidet à ceruo. Gigni-  
tur apud Arachotas: ubi etiā boueſ ſylueſtreſ ſunt, qui differant ab urbanis, quan-  
tum inter fueſ urbanuſ, & ſylueſtreſ intereſt. Sunt colore atro, corpore robuſto, ri-  
10 ctu leuiter adunco, cornua gerūt reſupinatioꝝ. Equiceruo cornua ſunt capræ pro-  
xima. Elephātꝯ in quadrupedū genere hirtuſ minime eſt. Caudæ etiā animaliuꝯ  
pili corporiſ modum imitantur, dummodo cauda nota aliqua auctioꝝ dependeat:  
eſt enim nōnulliſ tam exigua, ut uix dignoſci à ſenſu poſſit. Cameluſ propriū inter  
ceteraſ quadrupedeſ habet in dorſo, quod tuber appellāt: ſed ita, ut Baſirianæ ab  
Arabijſ differant. Alteriſ enim bina, alteriſ ſingula tubera habentur. Sunt etiā  
omnibuſ ſingula parte ima, quale in dorſo tubera, quibuſ incubat reliquū corpꝯ,  
& firmetur, quoteſ in genua inclinātur. Papillaſ quatuor modo uaccae habet came-  
luſ, caudam aſino ſimilem, genitale retro. Genua ſingula in ſinguliſ cruribuſ ſunt,  
& flexuſ artuum, nō ut quidā perhibent plureſ: ſed propter aliuꝯ interualliū plureſ  
eſſe uidentur. Habet etiā talum ſimilem bubulo: ciuneſ proportionē magnitudiniſ  
20 paruoſ. Biſulcuꝯ id animal eſt, nec utruq; dentatuꝯ. Sed biſulcuꝯ ſic eſt, ut peſ  
parte ſuperiore ſciſſuſ paululū ſit ad flexuꝯ digiti ſecundū: parte autē priore ſum-  
ma, quadriparti to ſindatur diſcrimine paruo, quantū primotenꝯ digiti in flexu, &  
quiddam inter ſiſſuraſ, perinde ut in aſeruꝯ pedibuſ adiectuꝯ contexat. Peſ ue-  
ſtigio eſt carnoſuſ, ut uſſæ: qua de cauſa eaſ quæ per exercituꝯ longiore itinere ſa-  
tiſcunt, calceant carbatiniſ. Omnium quadrupedū crura oſſe neruoꝝ abundanti,  
carne deſiciunt. Quinetiā nullū, quod pedibuſ conſtet, excepto homine, pedeaſ ha-  
bere carnoſoſ perſpectū eſt. Coxarū etiā carne exuberante, in ciuneſ uacant, quod  
in genere auiū conſpici apertiuſ poteſt. At homo contrā: quippe qui nullā fere ſui  
30 corporiſ partē tam carnoſam habeat, q̃ nateſ, ſemora, tibiaſ. Quae enim ſuraſ uo-  
camuſ, nō niſi carniſ copia, parte tibiaſ poſteriore complētur. Quadrupedū autem  
quæ ſanguine conſtāt, eademq; animal generāt, aliæ multiſidæ ſunt, quae homi-  
niſ manuſ, pedeaſq; habēt. Sunt enim quæ multiplici pedū ſiſſura digitentur, ut  
caniſ, leo, panthera. aliæ biſulcae ſunt, quæ forcipem pro ungula habeāt, ut oueſ, ca-  
pra, cerui, equi fluuiatiliſ. aliæ inſiſſo ſunt pede, ut quæ ſolipedeſ nominantur, ut  
equuſ, muluſ. Genuſ ſanē ſuilluꝯ ambiguꝯ eſt. Nam & in terra ſiliyrioruꝯ, & in  
Paonia, & nonnulliſ alijs lociſ fueſ ſolipedeſ gignūt. Biſulca igitur binis ſiſſuriſ  
utruq; id eſt à parte priore, poſterioreq; diducit. Solipeda eam partē continētē  
ex toto habēt. Sunt item animantiū, alia cornigera, alia mutila. Quæ cornua gerūt,  
40 biſulca magna ex parte per naturā ſunt, ut boſ, ceruꝯ, capra. Quod autē idem &  
ſolipeſ, & bicorne ſit, nullū eſt, quod noſ adhuc norimuſ. At ſolipeſ, idemq; unicor-  
ne eſt, quanq; rarū, ut aſinuſ Indicuſ. Ille enim & unicorniſ, & ſolipeſ eſt. Vnicor-  
niſ uero, idemq; biſulcuſ oryx eſt. Taluꝯ etiā aſinuſ ille Indicuſ ſoluſ in ſolipeduꝯ  
genere poſſidet. Suſ enim, ut modo dixi, ambiguꝯ eſt: quo ſit etiā, ut talo careat  
probiore. Per multa ex biſulcorū numero taluꝯ habēt. At uero multiſidū nulluꝯ  
adhuc talū eiꝯmodi habere cognitū eſt, ut ne hominē quidē habere certū eſt. Sed  
lynci ſemitalo ſimile quiddā: leoni autē tortuoſuꝯ in anfractu eſt, quale eſſigunt.  
Omnia uero q̃buſ datuſ eſt taluſ, cruribuſ eū poſterioribuſ continēt, ita ut erectuſ  
in ſuffragine parte ſui prona foras, ſupina introrſuꝯ ſpectet, & quæ ueneres uo-

cantur, intus aduersæ sibi positæ sint: quæ canes, foris: quæ antennæ, suprà habeantur. Situs talorum omnium talis est. Sunt nonnulla, quæ simul bisulca sint, & iubam habeant, & cornua bina, orbem inflexu mutuo colligentia gerant, ut bonafus, qui in Pæonia terra, & Medica gignitur. Quæ autem cornuta sunt, eadem omnino quadrupeda esse certum est, nisi quid per translationem cornu habere dicatur: quemadmodum Aegyptij de colubris Thebanis perhibent, quasi aliquid illis ueluti uestigium cornus extuberet. Ceruo ex cornigeris uni cornua tota solida, cæteris caua quodā tenuis, & mucrone demum cōcreta sunt. Pars caua ex cute potius oritur, quàm solidum quiddam osse enascens subit, impletq; totam: quomodo cornua bouum constare uidemus. Soli etiam ceruo cornua omnibus annis decidua, initio à bimatu: cæ- 10  
teris perpetua, nisi per uim aliquam amittant. Mammas item haberi uarie certum est. Nam & inter se ipsæ quadrupedes, & ab homine mammarum differunt ratione. Membrorum etiā quæ ad uenerem coitum accommodata habentur, discrimen planè est. Paret ratio uaria mammarum: cum alijs mammae parte priore, hoc est, in pectore, aut iuxta pectus sint binæ, binisq; papillis, ut homini, ut elephanto sub armis duæ, tam mari, quàm fœminæ perquam exiguæ, nec pro corporis uasitate, ita ut eas à latere conspicere propemodum nequeas. Vrsæ mammas habent quaternas. Alijs mammae inter fœmina binæ, papillæq; binæ, ut ouibus. Alijs papillæ quaternæ, ut uac- 20  
cis. Quibusdam nec in pectore, nec in feminibus mammae, sed in uentre habentur, & quidem plures, uerum non omnes pares, ut canibus, ut suis. Cum itaq; cætera 20  
id genus habeant plures, pantheræ quaternas uentre medio gerunt. Camelus quoq; in uentre mammas duas cum papillis quatuor habet, ut bos. Læna etiam duas in uentre. Maribus solipedis generis nullæ sunt mammae, nisi ijs, qui matri similes prodierunt: quod in equorum genere euenit. Genitale marium alijs foris est, ut homini, equo, & alijs multis: alijs intus, ut delphino. Quibus foris est, ijs aut antè habetur, ut homini, & reliquis quæ modo dixi, aut retro. Quinetiā ijs, quæ antè gerunt, aut & penis, & testes absoluti pendent, ut homini: aut aluo adhærent, & aut plus, aut minus absoluuntur. Non enim pariter apro, & equo membrum hoc absolutum est. Elephantus etiam genitale equo simile habet, sed paruum: nec pro corporis magnitudine. Testes idem non foris conspicuos, sed intus circa renes conditos habet: 30  
quocirca initum celerius agit. Alijs itaq; testes absoluti, ut equo: alijs non absoluti, ut apro. Sus fœmina, genitale ea continet parte, qua pecoris ubera habentur: & cum per libidinem turget, ac prurit ad coitum, sursum tantisper hoc retrahit, uertitq; foras, ut inde mari coitus sit facilius. rescissum id longe productius, & dehiscens amplius est. Genitale maxima animalium parte ita se habet. Nonnulla ex auerso mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus. Mares igitur ita inter se discrepant, ut expositum est. Fœminæ omnes ex auerso mingunt: quippe cum etiam fœmina elephantorum genitale, ut cætera, inter femora habeat. Genitalis uero ipsius differentia numerosa est. Alijs enim cartilaginosa, carnosumq; est, ut homini: quod ut parte carnosam inflari nequit, sic cartilaginosa intumescit, excrescitq;. Alijs neruosum, ut 40  
camelo, ut ceruo. Alijs osseum, ut lupo, uulpi, mustelæ, icidi, id est mustelæ rusticæ, quam uiuerram interpretor: nam is quoq; osseum gerit. Ad hæc, homo cum ad iusta incrementa peruenit, partem superiorem habet minorem quàm inferiorem, contrā, atq; cætera animalia, quæ sanguine consent. Partem superiorem intelligi uolo, quantum de capite ad eam pertendit partem, qua exitus patet excrementis. Inferiorem autem, quantum ab ea ipsa subsequitur reliquum corporis. Animalibus ergo, quæ pedibus inniti natura uoluit, crura posteriora partem complent inferiorem. Quæ autem pedibus carent, ijs cauda, & quicquid uice caudæ, simileq; habetur, pro parte inferiore est. Tales perfectis iam incrementis animantes euadunt. Discrimen

men autē in crescēdo est. Homo enim prius quā aduultior sit, partem superiorem corporis habet maiore, quā inferiore: & quo per aetatem amplius augetur, eo contrā uenit, ut inferiora sint superioribus longiora. Quamobrē unus ipse non modo eodem ingredi solet, infirma adhuc aetate, quo iam firma ingreditur: sed primum dum infans est, quadrupes reptat, deinde se erigit, bipesq; incedit. Sunt quā ex proportionē incrementa partis utriusq; capere soleāt, ut canis. Nonnulla primum parte superiore minora sunt, post maiora cum creuerint, eadē parte euadunt: ut iumentā. nullū enim ex ijs addita aetate auctius redditur ea parte, quā ab ungula ad clunem porrecta est. Dentes etiā ceterorū animalū multiplici differentia, tum inter se, tum hominis ratione euariant. Habēt enim dentes omnia, quā quadrupeda, sanguinea, quā uiuipara sunt, sed uarie. Sunt enim alia utrinq; dentata, alia altero dentium ordine carent. Quā enim cornua gerunt, hāc non dentata utrinq; sunt: quippe quā primoribus maxillā superioris careāt dentibus. Quāquam sunt nonnulla, quā & cornibus uacent, & utrinq; dentata nō sint, ut cameli. Item alia dentes habent exeros, uelut aper: alia sine ijs sunt. Et alijs dentes ferrati, ut leoni, pantherā, cani. Alijs continui, ut equo, ut boui. Sunt enim dentibus ferratis, quorū series acutorum dentium mutua insertionē pectinatim se cōstipat. Quod autē simul & dentē exertum, & cornu habeat, nullū est: nec uero quod simul & ferratis dentibus sit, & alterutrum habeat illorum, hoc est uel cornu, uel dentem exertum. Primores maxime ex parte habent acutos, interiores planos. Vitulus marinus ferratis omnibus est, ut generi piscium affinis: piscibus enim ferē omnibus ferrati sunt dentes. Genus autē, quod duplicem dentium ordinem habeat, nullum nostrō in orbe est: uerum apud Indos (si Ctesia credendū est) bellua gignitur (ut ille scribit) cui nomen mantichorā, dentes triplici utrinq; ordine, magnitudo, hirtitudo, & pedes leonis, facies & aures hominis, oculi caelii, color rubricā, cauda scorpionis modo terrestri aculeo armata, spiculaq; agnata iaculans, uox fistulae, tubae uel non absimilis, cursus non minoris pernicitatis quā ceruus, feritas tanta, ut nunquam possit mitescere, appetitus praecipue carnis humanae. Mutantur dentes, tum homini, tum etiā quibusdam alijs animalibus, ut equo, mulo, asino. Homini primores mutantur. Maxillares autē nullum animal mutat. Sus, nullum omnino dentem amittit.

An canes mutant dentes, quo uel modo uetustiores à recentioribus distinguantur.

Caput II



Ex canibus diuersa sententia est, quippe cum alij nullum ijs decidere dentem opinentur, alij caninos tantū appellatos mutare uelint, quos etiam homo amittit: uerum hoc latere, propterea quia nō ante mutant, quā pares intus enascantur. Quod idem uel in ceteris scilicet feris euenire uerisimile est. Et quidem caninos tantum mutare perhibentur. Aetas uetustiorum, recentiorumq; canum dentibus iudicatur. Iuuenibus enim dentes canidi, & acuti: aetate prouectis, nigri, obtusi.

Dentes equorum in senectute candidiores fieri, pluresq; mares, quā foeminas habere dentes.

Caput III



Gitur certe in equis cōtra, atq; in ceteris animalibus: cum enim ceteris senectute dentes nigrescant, equo candidiores redduntur. Planos ab acutis determinat, qui canini appellantur, formae utrorumq; participes: quippe qui infra latiusculi, supra acutiusculi sint. Maribus dentes plures q; foeminis, ut in genere hominū, ouīū, suū, caprarū parent. In ceteris nondum exploratum est. Quibus plures, hāc uiuaciora magna ex parte sunt. Quibus pauciores & rariores, hāc magna ex parte uitae sunt breuioris.

*Hominibus circiter uicesimum annum genuinos dentes gigni.*

*Caput IIII*



Omini nouissimi maxillares, quos genuinos uocamus, circiter uicesimum annum gignuntur, & uiris & mulieribus. Iam uero quibusdam mulieribus anno etiam octogesimo maxillares illi nouissimi non sine dolore exierunt. Viris quoque idem euenisse accepimus: quod certe ijs accidit, quibus in iuuentute ipsi genuini nati non fuerint.

*Elephantes mares à foeminis distare in ordine dentium.*

*Caput V*



Lephanto dentes utrinque quatuor, quibus conficit cibum, atque in farinæ speciem molit. Duo præterea prominent grandes, quos mares grandiores, resimatosque habent: foeminae minores, & contrà quàm mares: uergunt enim deorsum, pronique deuiant. Statim cum natus est elephantus, dentes habet: quanquam grandes illos, non illico perspicuos obtinet.

*Exiguam esse elephantis linguam.*

*Caput VI*

Linguam perquam exiguam habet, atque interius positam, quàm in cæteris sit, ita ut uix eam uidere possis.

*Quæ animalia in oris magnitudine discrepent, ibique de equo fluuiatili ægyptio.*

*Caput VII*



Ris etiam magnitudine discrimen existere animalibus planè est: alijs enim os rescissum, ut cani, leoni, denique omnibus quibus dentes serrati. Alijs paruum, ut homini. Alijs mediocri, ut generi suum, equo fluuiatili, quem gignit Aegyptus: iuba equi, ungula qualis bubus, rostrum refimum. Talus etià inest bifulcorum modo, dentes exerti, sed leuiter, cauda apri. Vox equi, magnitudo asini, tergoris crassitudo tanta, ut ex eo uenabula faciant: interiora omnia, equi & asini similia.

*De genere simiarum, quod partim hominem, partim quadrupedes imitatur.*

*Caput VIII*



Vnt quæ natura ancipite, partim hominè, partim quadrupedem imitantur, uelut simiæ, cæbi, canicipites. Sic enim cynocephalos appello. Cæbus, simia gerens caudam est. Caniceps etià eadem forma, quæ simia est, sed maior, ualidiorque, & facie caninæ similior, unde & nomen accepit: ad hæc moribus ferocioribus est, & dēte robustiore, caninoque propiore. Simia tam parte sui corporis prona pilosa est, utpote quadrupes, quàm supina, ut speciem gerens hominis, qui contrà, atque quadrupedes, obtinet pilum, ut dictum iam est. Sed crassiore pilo simiæ uestiuntur, longeque hirtiores parte utraque sunt. Conueniunt cum homine plurimum sua facie, quippe quæ nares, aures, dentes, tam primores, quàm maxillares hominis more habeant. Cilium etià cum cæteræ quadrupedes nō in utraque palpebra habeant, simiæ habent, quanquam prætenue ac prolixius, potissimum in inferiore. Cæteræ enim quadrupedes inferioribus carent cilijs. Habent simiæ in pectore binas mammarum papillas, & brachia hominis modo, sed hirtiuscula, quæ & ipsa, & pedes ut homo inflectunt, hoc est, ita ut circumferentiæ membrorum utrorumque obuersæ inter se adducantur. Ad hæc manus, digitos, ungues homini similes, uerum omnia rudiora, efferacioraque. Pedes sui generis habent: sunt enim uelut manus maiusculæ, & digitis ut manus constant medio longiore. Vestigium etiam manui simile est, nisi quod in longum se porrigat, & uolam referens tendat ad postrema. Callosius hoc altera sui parte extrema est, & calcem inepte, atque exiliter imitatur. Pedum officiū duplex est: ijs enim & ut pedibus, & ut



& ut manibus utuntur, infleſtuntq; eoſdē perinde, ac manus. Lacertos & femora habent breuia proportionē cubitorum & ubiarum. Vmbilicum qui emineat, nullum habent: ſed durum quiddam continetur loco umbilici. Partem corporis ſuperiorem multo maiorem habent, quā inferiore, uidelicet more quadrupedum: quinarij enim ſerē ad ternarium ratione conſtant. Degenerant ergo, tum ea de cauſa, tum etiam quod pedes manibus habeant ſimiles, & quaſi ex manu, pedeq; conſtitutos. Calcis enim poſtremum ad pedem, reliquæ autem particule ad manum facile referunt: digiti namq; uolæ ſpeciem gerunt. Degunt plus temporis pronæ quadrupedū more, quā erectæ. Carent nauiſ, utpote quadrupedes. Priuatē cauda ſunt, utpote bipedes. Exigua enim omnino cauda ineſt, quatenus nota ſolum habetur. Genitale etiam ſemina: mulieris eſt: mari potius canis, quā hominis.

De cæbis.

Caput IX

**C**æbi ( ut ſuperius dixi ) omnes caudam habent. Partes uero interiores humanis ſimiles, genera hæc omnia continent. Partes animalium uiuiparorum exteriores ita ſe habent.

Viui para quadrupeda quibus cum cæteris quadrupedibus conueniant, & diſſentiant. Cap. X

**Q**uadrupedes quæ oua pariunt, eadēq; ſanguinem habent ( Terreſtre autem ac ſanguinis particeps nullum oua ædit, quin idem aut quadrupes ſit, aut pedibus careat omnino ) omnes caput, collū, dorſum, pronā atq; ſupina corporis poſſident: pedes etiam priores, poſterioresq; & quod peſtori proportionetur, modo uiuipari quadrupedum generis. Caudam quoq; habent longiorem, exceptis paucis. Sed hæc omnia pedes in plures digitos habent diſcretos. Ad hæc, omnibus his ſenſus totidem, quot cæteris quadrupedibus ſunt: & lingua omnibus data eſt, excepto, quem Aegyptus fert, crocodilo: nam ille ſimilis quibuſdam piſcibus eſt. Cum enim piſces omnino ſpineā, nec abſolutam continent linguam, tum uel maxime nonnulli adeo læuem indiſcretūq; eum ipſum linguæ tributum locum fortiuntur, ut niſi admodum labrum diſdixeris, ne ueſtigium quidem linguæ inſpicere queas. Auriculis tamen hæc omnia carent, meatuſq; tantum habent audiendi. Carent etiam mammis. Nec genitale, aut teſtes foris obtinent manifeſtos, ſed intus conditos. Nec pilo, ſed cortice omnia reſta ſunt. Dentibus etiam ſerratis ſunt omnia. Crocodilo ſtuiti oculi ſunt ſuis, dentes magni, exerti, ungues robuſti, cutis corticoſa, contra omnē iſtum inuiſta, uſus in aqua hebes, extra acerrimus. Dies itaq; in terra parte maxima agit, noctes in aqua teporis ratione: tepidiorem enim aquam experitur, quā aërem.

De chameleone, &amp; eius cum cæteris ſimilitudine.

Caput XI

**C**hamæleo figura totius corporis lacertam planē repræſentat. Latera deorſum ducta uentri iunguntur, ut piſcibus: & ſpina modo piſcium eminet: roſtrum ſimilæ porcaræ ſimiliſimum, cauda prælonga, in tenue deſinens, & longis implicata in ſe orbibus lori modo permuſta. Elatiōr à terra eſt, quā lacerta: inflexus crurum perinde, ut lacertæ. Pedes ſinguli bipartito ſecantur, partesq; talem inter ſe habent ſitum, qualem pollex ad manus reliquam partem obiectum. Sed ipſæ etiam reliquæ partes paulotenus in digitos quoſdam ſinduntur: uidelicet primores, triplici ſiſſura interius, duplici exterior: poſteriores interius duplici, exterior triplici. Vnguiculi adunci. Corpus aſperū totum, ut crocodilo. Oculi in reſeſſu cauo intus recepti, prægrandes, rotundi, cute ſimili, atq; reliquum corpus obducti, media ſui parte perquam exigua detecti, qua uideant. Quæ quidem uidendi ſedes nunq; cute operitur, nec pupillæ motu: ſed totius oculi uerſatione in orbem mutationemq; quoquo uerſus aſpicit, quæ uelit. Mu

tat suum colorē inflatus. Verum & niger nō longe dissimilis crocōdilo est, & palli-  
 dus, ut lacertā, maculis distinctus, ut pardus, nigris. Mutatur color toto in corpore,  
 nam & oculi concolores reliquo corpori redduntur, & cauda eundem colorem ac-  
 cipit. Motus ei piger admodū, ut testudinis est: pallefcit cum moritur, defunctusq;  
 colorem eundem seruat. Gulam atq; arteriam situ eodem continet, quo lacerta: car-  
 nem nusquā nisi in capite & maxillis, & postremo caudæ admodum exiguae possi-  
 det: nec alibi sanguinem quā in corde, & oculis, & loco à corde superiore, & ue-  
 nulis hinc tendentibus. Verum nec in ijs quidem ulla copia, sed pauxillum habe-  
 tur sanguinis. Cerebrum paulō superius oculis positum est, & propē ijs contiguū.  
 Cute autem exteriore detracta oculis, quiddam lucens ueluti anulus æneus tenuis, 10  
 nulla pelle interceptus cingit. Membranæ in omnis ferē corporis partes multæ, ac  
 ualidæ, longeq; firmiores quā in cæteris, tendunt. Dissectus hic totus spirare præ-  
 terea diu potest, motu admodū exiguo adhuc circa cordis sedem extante. Et cum  
 omnes corporis partes cōtrahit, tum uel maxime costas cogere, atq; adducere potest.  
 Lienem conspicuum nusquam continet. Subit cauernas, & latitat more lacertarū.

De animi natura, & quibus cum cæteris terræ animalibus conueniant.

Caput XII



Nauibus etiam partes nonnullæ similiter, atq; in ijs, quæ exposui, ani-  
 malibus habentur. Omnibus enim caput inest, & collum, & dorsum, 20  
 & supina pars corporis, & quod pectori proportionetur. Crura etiam  
 bina hominis modo, sed quæ in auersum flectantur, eodem ritu, quo  
 quadrupes facit, ut dictum iam est. Carent manibus, pedibusq;  
 prioribus. Peculiare inter cætera animalia alas possident, & clunem femori similem  
 longiorē, uentremq; medio tenus porrectū, cohaesione perpetua, ita ut ipsum diui-  
 sum femur esse uideatur. Sedenim femur parte alia iunctū ubiæ est. Sunt femora sa-  
 nē maxima ijs auibus, quæ ungues habent aduncos, & pectus, quā cæteris robu-  
 stius. Copia omnibus auibus unguis est. Multifidæ etiam omnes quodāmodo sunt,  
 quippe cum pars maxima digitata sit, & nantes quāuis planipedes, tamen & ipsæ di-  
 gitos perfectos, distinctosq; habeant. Omnibus quæ se efferunt, quaterni digiti da-  
 ti sunt, terni in priore parte, singuli in posteriore maxima ex parte pro calce. 30  
 Paucis  
 quibusdā utrinq; bini, ut auiculæ, quæ Iyngem uocant. Hæc paulō maior, q; singula  
 ia est, colore uario. Habet sibi propriā digitorū, quā modo dixi, dispositionē, & lin-  
 guam serpentibus similem: quippe quā in longitudinē mensura quatuor digitorū  
 porrigat, rursumq; contrahat intra rostrū. Collū etiam circumagit in auersum, reli-  
 quo quiescente corpore, modo serpentū: unde torquilla uulgō appellata est, quan-  
 tū turbo ab antiquis. Ungues ei grandes, & similes ut monedulis exeunt: uoce autē fir-  
 det. Os sibi propriū uolucres possident: nō enim labra, non dentes, sed rostrum ha-  
 bent. Auriculis etiam carent & naribus, meatusq; odorandi in rostro continent, au-  
 diendi in capite. Oculi omnibus, sicut cæteris animalibus bini, sine cilijs. Grauiore  
 palpebra inferiore conuiuent. Nictantur omnes ab angulo obeunte membrana. 40  
 At uero quæ speciem noctuæ gerunt, superiore etiam palpebra conuiuent. Hoc  
 idem cortice infecta animalia quoq; faciunt, ut lacertæ, & reliqua generis eiusdem.  
 Conuiuent enim palpebra inferiore omnia, quanq; nō more auium nictant. Volu-  
 cres item nō pilis, nō squama, nō cortice, sed pennis teguntur. Pennæ omnes caule  
 constant. Cauda etiam talis, qualis data quadrupedibus est, uolucres carent: sed pen-  
 nis cōditam gerunt, breuem, quæ longipedes, ac planipedes sunt: maiorem autem,  
 quæ e contrario constant, quæ uel contractis ad uentrem pedibus uolant, cum illæ  
 caudæ pusillæ gerulæ, porrectis in caudam cruribus ferantur. Lingua omnibus est,  
 sed uarie: alijs enim longa, alijs breuis, alijs lata, alijs angusta. Omnium maxime  
 anim aliū

animaliū post hominē literas proferre nonnulla auium genera queunt, uidelicet ea præcipue, quibus lingua latior est. Linguā autem illam minorem operiendi minifram, nullum ex ijs, quæ oua pariunt, superimpositā suæ arteriæ continet: sed meatum ipsum modo trahunt, modo laxant, pro sui cōmodi desiderio: atq; ita efficitur, ne quid ponderis in pulmonem delabatur. Sunt nōnulla ex auibus genera, quibus natura calcar etiam dedit: sed nulli datum hoc est, cui ungues adunci sint. Volaces porrō notantur, quæ ungues habent aduncos: calcarigeræ, quæ præ sua grauitate sint ad uolandū ineptiores. Ad hæc, auium nōnullis crista addita est: quam cum cæteræ pennarū eminentia quadam extruciam gerant, gallinaceus unus peculiare sibi fortitus est: sic enim institutā, ut nec caro sit, nec à natura carnis omnino aliena.

De genere piscium, eiusq; differentijs.

Caput XIII



Piscium genus inter ea, quæ aquas incolunt, unū distingui à cæteris iure potest, cum forma euariet numerosiore. Habet id caput, & prona, & supina. Parte qua uenter, & uiscera continent, supina habet: caudā continuā, indiuisāq; parte gerit posteriore uarie. Piscium nulli ceruix, nulli manus, aut pedes, nulli testes, nulli mammae. Sed mamma cæteris quoq; negata est omnibus, quæ animal nequeant generare. Nec uero uituiparis omnino data est, sed ijs tantū quæ protinus intra se animal formāt, nec primū ouū, deinde animal. Vnde fit, ut delphinus etiā mammas habeat: animal enim concipit illico, & creat. Continet hic suas mamas nō parte superiore, sed prope genitale, nec modo quadrupedū papillas cōspicuas habet, sed uelut alueolos quosdā humoris durōs, utroq; de latere singulārē, ē quibus lac fluit, quod ore carulorū sectionū parentē excipitur: idq; iam à nōnullis perspectū est. Pisces igitur (ut modo dixi) nec mamas habent, necq; meatū genitaliū ullum intus conspicuū. Branchias aut rem habent peculiarem, quibus humorē, quē ore acceperint, reddūt. atq; etiā pinnas, quas magna ex parte quaternas gerūt. Attamen longis, ut anguillæ, binæ iuxta branchias herēt. mugilibus etiā quos lacus Siphartū gignit, binæ: atq; etiā ei quā uitam appellāt. Nōnullis ē longis nullę omnino sunt pinne, ut murenæ. nec branchię integrę, ut cæteris piscibus habent. Qui aut branchias habent, aut intectas continent eas, aut detectas, ut cartilaginea genera omnia. Qui intectas habent, ijs in obliquū utroq; latere tenent. Quæ tegumēto carent, cartilaginea dico, ijs si plana sunt, parte inferiore, supinaq; habent: ut torpedini, ut raia. sed si oblonga sunt, eorū lateribus adherent, ut in quouis mustelino genere cernit. Raia tamen si deductas in latera habet brāchias, tamen nō spineo intectas operimento, ut quæ nō cartilaginea sunt, sed cuticulati. Item branchiatorū ipsorū alijs simplices branchię sunt, alijs duplices. omnibus tamen simplex, quæ nouissima corpori admota est. & alijs pauca, alijs multa: uerum in utroq; latus æque partitæ omnibus sunt, habent quibus paucissime sunt, singulas branchias utrinq; easq; duplices, ut aper. alijs binæ utrinq; alteræ simplices, alteræ duplices, ut congro, ut scaro. alijs quaternę utrinq; simplices, ut accipenferi, dentici, murenæ, anguillæ. alijs quaternæ duplici ordine, nouissima excepta, ut turdo, perca, siluro, cyprino. Musteligenis etiā duplices, & quinę utraq; ex parte sunt. gladio à rostri mucrone ita appellato, octonę duplices. Ita branchiarū colligitur numerus. Sed præter branchiarū discrimē, pisces à cæteris animalibus differūt, eo quod nō pilis ut terrestria, quæ animal generāt, nō cortice, ut nōnulla oua parientes quadrupedes, nō penna, ut genus auium integunt: sed plurimi squamosi sunt, pauci quidam scabri, paucissimi læues. Ergo cartilagineorū alia aspera, alia læuia sunt. Congri etiā & anguillæ, & thunni, læues sunt. Dentes omnia piscium genera habent ferratos, pectinatimq; coeuntes, excepto scaro: ac omnia serie dentium acuta, atq; multiplici

fulciunt, in lingua etiam dentes nonnullis. Lingua autem ipsam durā, & penē spinā habent, & ita adherentē, ut interdū carere lingua uideant. Os relictissimum, ut nonnullis ouiparis quadrupedibus est, partes audiendi, odorandi, denique sentiendi nullae conspicuae, praeterquam oculi habent. latent etiam meatus, quibus sentire necesse sit. Oculi omnibus sine palpebris, sed non duri. Est omne sane piscium genus sanguinis particeps: discrimine autem partus sic discrepant, ut alij oua pariant, alij animal. Pariunt oua omnes qui squama conteguntur. Animal omnes, qui genere cartilagineo continentur, excepta rana.

De genere serpentum.

Caput XIII

**R**eliquum ex ijs, quae sanguinē habent animalibus, genus serpentū est, quod cōmune ambobus superioribus esse potest. Sunt enim alij terrestres, alij aquatiles; quanquam maxima pars sit terrestris, exigua uero aquatilis, scilicet fluminū incola. Sunt etiā maris indigenae serpentes terrestribus similes, nisi quod caput habeant congrui. & quidē genera eorū complura sunt, colore numerosae uarietatis. nasci eos nō in altissimis gurgibus certum est. Scolopendras etiā, quas centipedes uoco, maris incolae esse nouimus, specie terrestribus similes, magnitudine paulo minores, colore rubetiores, numero pedum copiosiores, & crurū tenuitate graciliores. nasci locis saxosis solent, & modo serpentum, nō magna altitudine gurgitū. Caret pedibus genus omne serpentū, ut pisces, nam remora errore nonnulli pedes habere prodiderunt, expes enim omnino est. Sed quoniam pinnae habeat pedibus similes, hinc fit ut pedibus instare uideatur. pisciculus quidā haec est, saxi affuerus, in cibos nō admittendus, nomē a remorandis nauibus adeptus, utilis ad iudiciorum causas, & amatoriae ueneficia, ut aliqui uolunt. Partes exteriores sanguineorū animalium quānam sint, & quot numero, & quibus inter se differentiis dissonent, explicatum iam est.

Quae membra quodque animalium genus interiora sortiatur.

Caput XV

**N**unc interiorū ordinē persequemur, & primū in eo genere quod sanguine constat: hac enim ratione summa genera a ceteris differunt, quod haec sanguinea sunt, illa exanguia. Sanguine praedita sunt, homo & quadrupes, quae animal, ouum uel pariunt: atque etiā aues, pisces, cetae: & si quid aliud uacans nomine, quoniam genus nō sit, sed species simplex in singulis intelligat, ut serpens, ut crocodilus. Igitur quae quadrupedes uiuiparae sunt, ijs gula atque arteria omnibus est, & eodem situ, quo homini. Ouiparis etiā quadrupedibus, atque auiibus eadē illa adiuncta uidemus, sed discriminē species affert earum partū. Denique omnia quae aërem accipiunt, & reddunt, habent pulmonē, arteriā, gulā, & sitū gulae atque arteriae similē, quanquam eas partes dissimiles: pulmonē autē ne sitū quidē simili continent. Cor item omnibus est, quibus sanguis & septū transuersum, quod praecordia, & cinctus appellat: uerū hoc in minutis praesua tenuitate, exiguitateque, nō aequē spectari potest, nisi in corde. Peculiare est, quod de nonnullis bubus proditū est: genus enim quoddā bouum suo in corde officulū cōtinere aiunt. At uero pulmo nō omnibus datus est: pisces enim & omnino quae branchias habent, carent pulmone. Iecur in omnibus est, in quibus sanguis. Lien magna ex parte omnibus, quibus sanguis: sed magnae parti eorum, quae nō animal, sed oua pariunt, lien usque adeo exiguus est, ut propemodū sensum effugiat: quod magna in parte auium experimur: uerbi causa, in columbis, miluis, accipitribus, noctuis. Capriceps aui liene omnino caret. In quadrupedibus etiam ouiparis similis ratio est: nam ea quoque admodū exiguum habent lienem, ut testudo, mus aquatilis, rubeta, lacerta, crocodilus, rana. Fel alijs adnectitur iecori, alijs minime. Ex genere enim quadrupedū quae animal generant, ceruo, & damo

damæ deesse notatū est: atq; etiā equo, mulo, asino, uitulo marino, & muriū nōnulis. Ceruis Achainis cognomine, fel cōtineri in cauda credit. Est, qd ibi cōtineri aiūt, colore quidē simile felli, sed nō ita ut fel humidū, sed lieni simile parte interiore. Vermes tamē cerui cōtinent omēs suo in capite uiuos, qui nasci solent sub lingua in cōcauo circiter uertebam, qua ceruici innectūt caput, magnitudine haud minores ijs uermibus, quos maximos carnes putres ædiderint. Gigni uniuersi atq; cōtigni solent numero adeo circiter uiginti. Sed ceruus felle (ut dictum est) uacat: quanq; eius intestinū amarū adeo est, ut ne a canibus quidē attingat, nisi ceruus præpinguis sit. Elephanto etiā iecur sine felle: inciso tamē parte qua fel adhærere solet, humor fel-

10 leus effluit plus minus. Delphinus inter ea quæ mare excipiūt, pulmonēq; habent, unus felle priuatus est. Aues, piscesq; omēs fel habent: & quadrupes quæ oua pariunt, dixerim in uniuersum, omēs aut plus aut minus fellis sortiant. Sed pisciū, alijs in iecore positū est, ut musteligenis, & siluro, & squatinæ, leuiraiæ, torpedini: atq; ex longis anguillæ, acui, libellæ. Pulchro etiā, in iecore inest proportione corporis maxime omniū copiosum. Alijs intestino annexū est, dependēs a iecore, meatibus qui

20 busdā perpetuis summe tenuitatis. Ergo hamia suo intestino parī processu obducit habet, sæpe etiā replicatū, reduxq; aliquatenus: reliquis collectim intestinis cōmissum est, aut femotius a iecore, aut propius, ut raia, accipenseri, dentici, murene, gladio. Sæpe etiā genus idem ut unq; patitur sitū, ut conger: alijs enim ad iecur, alijs in

30 fra se positū adhæret. Qd etiam in auiibus parī modo perspectū est: alijs enim uentri, alijs intestino iungitur, ut columbe, coruo, coturnici, hirundini, passeri, alijs iecori simuli, & uentri, ut capricipiti. alijs iecori simul, & intestino, ut accipitri, miluo.

Que animalia renibus, & uescia cavant.

Caput XVI



Enes atq; uescia omēs, quæ animal generāt, quadrupes possidēt. At uero ex ijs, quæ oua pariunt, aues, piscesq;, non habent. Quadrupedū una testudo marina habet magnitudine ad ceterarū partiū rationem. Similes bubulis renes ei omnino adhærent, quasi ex multis exiguis constituti. Bonasus etiam interiora omnia bubus similia continet, situs idem earum parium est omnibus, quæ ex ijs constant.

Quam corporis partem in quibusq; animantibus cor, iecur, pulmo, lien, fel, & uenter obtineant.

Caput XVII



Or prorsus in medio pectore omnibus præterq; in homine est: huic em parti potius leuæ cōmissum est, ut antè exposui. Tendit omnibus priorem in partē, suo turbinato mucrone, præterq; piscibus: ijs enim nō ita esse uideri potest, cum eorū cor suū mucrone nō ad pectus spectantē, sed ad os habeat, extremūq; inde pendens, qua branchiæ dextræ, atque sinistræ inter se cōeunt, copulanturq;. Sūt etiam meatus alijs de corde ad branchias tendentes singulas pro desiderio magnitudinis: hoc est, maioribus laxiores, minoribus arctiores: inter quos crassa admodū, & candida fistula est, quæ de cordis extremo oritur. Gula paucis in piscibus inest, ut congro, anguillæ, ijsq; exigua. Et iecur qui habent, si nō fissum est, dextro latere totum continet: sin fissum a principio usq; dextro maior pars applicata est. Quibusdā em partes sepositæ sunt, nec eadem certa origine continent, ut inter pisces mustelino generi, & inter quadrupes leporum generi cuidā, quod idem uel in pulmone spectare auiū licet. Lien etiam parti sinistræ adnectitur iecori aduersus, sitūq; ualet iusto naturæ. Quod si qua dissecta quadrupede lienē latere cōtineri dextro, iecur sinistro uisum est, prodigiose id euenisse

putandū. Tendit arteria omnibus ad pulmonē, quemadmodū post explicabimus. Gula ad uentrē perfertur, transigens septū transuersum, scilicet in ijs quæ habeant gulam: pisces enim magna ex parte gula carent, ut dictum est, ut qui annexum statim ori uentrem habeant. Quocirca sapius euenit grandibus nōnullis, ut dum per impetū insectantur minores, uentriculus in os procidat. Habent omnia quæ adhuc enūmerauī, uentrē situ consimili: septo enim transuerso, cōtinuū subest, intestinūq; de eo porrectū finit ad exitū cibi, & eam partem quæ podex dicitur. Sed uentris dissimilitudo primū, quod quadrupedes uiuiparæ, cornigeræ, altera maxilla dentata, quaternos eiusmodi habet: sinus: quæ quidē & ruminare dicunt. Gula em̄ incipiens ab ore deorsum tendit ad pulmonē, septūq; transuersum: hinc se ad uentrem applicat maiorē, qui parte interiore asper, interceptusq; est, ac prope gulæ cōmissurā statim sibi adnexū habet, quæ ex argumēto reticulū uocant: est enim uentri extrinsecus similis, intus reticulis mulierum implexis, magnitudine multo q̄ uenter minor. hūc excipit omasum parte interiore asperū, cancellatū, crustatū, magnitudine reticuli. Ab omasum uenter ab eo alius iungit, magnitudine amplior omaso, forma oblongior, cancellis intus, & crustis multis, magnis, & leuibus innormatus: mox intestinum iam sequit. Cornigera altera maxilla dentata, omnia ad hunc modū suū habere uentrē certum est. Sed differūt inter se magnitudine, aut figura, atq; etiā quod gula, uel in mediū uentris tendat, uel in latus uergat. At uero omnia dentata maxilla utraq; uentres singulos habēt, ut homo, canis, sus, ursus, leo, lupus. Quæ etiā thos, quæ lupum ceruariū appellem, interna omnia lupi similia habet. ijs igitur omnibus simplex uentriculus est, quæ excipit intestinū: uerum alijs amplior, ut sui, ut urso: & suillo quidē crustæ leues pauciores sunt. Alijs arctior, nec multo amplior intestino, ut canis, leonī, homini. Ceterorū etiā species omnī respectu eorū, quos modo enūmerauī, distinguuntur. Alijs enim uenter suillo similis, alijs canino, tam in maiore, q̄ in minore animalū genere. Sed discriminē in ijs quoq; magnitudine, figura, corpulentia, exilitate ue oritur: atq; etiā situ gulæ, quo meatū ad uentrē ducat, & conuio iungat forāmini. Intestinorū etiā natura utriq; illi animalū generi, hoc est, utraq; dentato, et altera maxilla dētato, sibi differt magnitudine, crassitudine, replicamētis. Sūt certe maiora omnia intestina nō utriq; dentatis: nec immerito. nam ipsa ita dentata omnia sunt auctiora: pauca enim parua eo in genere habent. Admodū parū inter cornigera nullū est. Quibusdā etiā appēdices sunt intestinorū. Rectū autē intestinū nullū est, cui nō parte utraq; dentes. Elephanto intestinū ita est sinuosum, ut alios habere quatuor uideat. in hoc etiā cibus recipit: nullū enim conceptaculū cibi aliud separatū adest. Exta quoq; eidē suillis proxima, sed maiora. Iecur enim quadruplo maius bubulo est: & reliqua pari ratione, excepto liene: hic enim minor ex proportionē est. Hæc eadē ratio uētris, intestinorūq; uel in ouiparis quadrupedibus est, ut in testudine tum terrestri, tum etiā marina, in lacerto, crocodilo utroq; omniūbus deniq; generis eiusdē. Simplicē enim unūq; habent uentrē, aut canino, aut suillo similem. Genus serpentū nulla euariat ratione: & omnia ferē proxima lacertis ex terrestri ouiparo genere habere species, si pedes ijs demas, lōgitudinē addas: quippe quod intestū cortice sit, & prona, supinaq; perinde atq; lacerti habeat, sed testibus deniq; generis eiusdē. Arterię origo ita iuxta os ipsū posita est, ut esse sub lingua uideat. & quidē uidet linguæ preminere, quoniā lingua contrahit, nec ut ceteris manet. Lingua autē ipsa tenuis, longa, & atrī coloris est, atq; si extrahas, porrigi longius potest. Peculi-

Peculiare præter cæterorū linguas serpentibus, & lacertis est, ut summa eorū lingua bifida sit: sed præcipue serpentū, quippe quæ tenuissimis quibusdā quasi capillamentis discreta uibret. Vitulo etiā marino lingua scissa est. Ventriculū serpentes, uelut intestinū laxius habent, canino similē: tum intestinū longū, tenue, & ad exitum usq; uniforme. Cor arteriæ postremæ adheret exigū, sed longū, & renū speciem referēs: quā ob rem uideri interdū potest minus mucronē suum dirigere ad pectus. Pulmo deinde adnecū simplex, fibrosus, fistulosus, prælongus, longēq; à corde sepositus. Iecur item longū, & simplex. Sed lien exiguus, rotundusq; ut lacertis. Fel similiter atq; in piscibus habet: natricibus enim adnecū iecori est, ceteris intestino magna ex parte adhaeret. Dentes exerti omnibus sunt. Costæ totidē, quot dies mensem integrū complent: singulis enim tricenā. Euenire serpentibus idem, quod pullis hirundinū nonnulli aiunt: oculis enim serpentū laceratis subnasci alios referūt. caudā etiā laceratis, atq; serpentibus amputatā renascunt. Hæc eadem ratio intestinorū, & uētris piscium quoq; est. Venter enim ijs unus, & simplex, sed figura uaria est: nonnullis enim diuersa omnino species uentris est, ut ei quæ scarum uocant, qui & ruminare solus pisciū creditur, intestinū etiam simplex replicans se, qd in unum, continuūmq; resoluatur. Peculiare piscibus, & magna ex parte aibus appendicum agnatio est. Sed aibus subter, & pauca: piscibus superne circa uentriculū exeunt, & nonnullis complures, ut gobionū, mustelo, perca, scorpioni, fidiculæ, mullo, scaro, mugil: cui parte altera plures exeunt, altera una tantū. alijs pauca, ut iecorino, glauco. auratæ etiam pauca. Tum aut ipsi eiusdē speciei consortes inter se differunt. Auratarū em̄ alijs plures, alijs pauciores. Sunt etiam quibus nullæ omnino sint, ut magne cartilagineorū parti: cæteris ita ut alijs pauca, alijs uel plurimæ habeant. Omnes tamen pisces ad ipsum uentrem eas appendices continent. Aues, & inter se ipsas differre, & à cæteris discrepare animalibus, interiorū partium ratione, apertū est. Alijs enim ingluuiēs præposita uentriculo est, ut gallinaceo, palumbo, columbo, perdici. Inguuiēs cutis in amplū sinuata est, qua primū cibus ingestus continet incoctus, hæc parte qua iungitur gulæ, angustior est, mox amplior, tum qua definit in uentriculum, arcior. Ventrículus parti plurimæ carnosus, callosusq; est, cutis intus robusta, crustisq; facile detrahi integra potest. Alijs ingluuiēs deest, sed eius uice gula pertinet latior, & potentior, uel tota, uel qua propius uentriculū adit, ut monedula, coruo, cornici. Quinetiā coturnici gula amplior infra, & capricipiti pars inferior paulo latior est, atq; etiam noctuæ. At anati, anseri, gaudiæ, cataractæ, tardæ, gula tota ampla, & lata est. Multis etiam alijs aibus gulā huiusmodi esse perspectū est. Nec defunt quibus uentriculus ipse similis sit ingluui, ut tinunculo. Sunt item quibus neque gula, neq; ingluuiēs amplior sit, sed uentriculus longior, scilicet auiculis omnibus, qualis passer, aut hirundo est. Sunt etiam, quāuis pauca, quæ ingluui, gulæq; amplitudine careant: longitudine aut admodū prolixa utantur, uidelicet quæ longa, angustaq; colla habent, ut porphyrio: quæ ferē omnes alui excrementū humidius, q; cætera solent, reijciunt. Coturnici præ cæteris hæc propria habent, ut & ingluui, & gulam prope uentriculū amplam, & latam habeat. Distat ingluuiēs à parte gulæ propinqua uentriculo multū, pro magnitudinis proportionē. Tenue quoq; intestinum parti plurimæ auium est, & simplex resolui potest. Appendices autem ille paucæ in aibus sunt, ut dictum est: nec suprā, ut in piscibus, sed infra qua definit intestinum. habent eas non omnes, sed plurimæ, ut gallinaceus, perdix, anas, ciconia, alcalaphus, anser, olor, tarda, noctua. minoris etiam generis nonnullæ habent, sed perexiguæ, ut passer.

32 ARISTOTELIS STAGIRITAE DE HISTORIA ANIMALIUM LIBER TERTIUS, INTERPRETE THEODORO.

*De situ & forma genitalium membrorum omnium animantium, eorumque differentiis. Caput I*



DE CAETERIS interioribus partibus, quot nam, aut quales sint, & quas inter se habeant differentias, dictum iam est. Restat ut de ijs, quæ ad generationem ministrant, differamus. Ergo & scemi 10 nis omnibus intus conditæ habent, maribus autem multiplici differentia evariant. Nam inter animalia sanguinei generis, alijs testes nulli omnino sunt: alijs sunt quidam, sed intus. Et ijs quæ intus continent, aut lumbis adheret circiter sedem renum, aut alio crediti sunt. Alijs foris dependent, quibus genitale aut alio annexum sustinet, aut demissum pendet cum testibus. Nec uero modo eodem ad aluum omnibus continetur, sed alter ijs, qui ex aduerso mingunt, aliter ijs, qui ex auerso. Piscium igitur nulli sunt testes, nec cæteris quibus branchiæ, neque ulli serpentum, nulli denique quod pedibus careat, nisi intra se formare animal possit. Auius testes dati omnibus sunt, non tamē qui foris pendeant, sed qui intus adherent lumbis: quo modo quadrupedibus quoque ouiparis habent, ut lacerto, testudini, crocodilo, & inter ea quæ animal generant, herina- 20 ceo. Quæ autem intus continent, ijs ad aluum neciunt, ut delphino ex ijs quæ pedibus uacant: ut elephanto, ex ijs quæ quadrupedes uisiparæ sunt. Cæteris conspicuos esse testes natura uoluit. Discrimen autem eorum, qui ad aluum, aut locum proximum positi in propatulo sunt, diximus. Aut enim hærent annexi retro, nec tremuli pendent, ut fuis: aut ante propensum, demissi gerunt, ut homini. Pisces, ut modo dixi, & serpentes, testibus carent: sed meatus continent binos, qui de septo exorti, latus spinæ utrunque perreptent, coeuntque superne in unum, atque ita ad ostium excrementi finiant: quod enim ad spinam est, id superius nomino. Pleni hi meatus humoris foetifici red- 30 duntur tempore coitus, attrituque mutuo semen effluit genitale candidum. Sed quibusnam ipsi inter se differentiis discrepent, in dissectionibus speculari oportet. nos etiam diligentius post exponemus, cum sua singulis reddiderimus. Omnibus autem quæ oua ædunt, siue bipeda, siue quadrupeda sunt, testes lumbis innexi infra septum continentur, uel candidiores, uel pallidiores, uenulis admodum tenuibus circumdati. Meatus de singulis singuli pertinent, eodemque coeunt supra ostium excrementi, sicut agi in piscibus dictum est: isque meatus qui ex coitu amborum consistit, genitale est. Quod in minoribus latet, in maioribus uero, auferem dico, & reliqua huiusmodi, euidentius est, cum recens inierint. Meatus autem tam ijs, quam piscibus lumbis adherent, subter aluum, uentrem, & intestina, inter uenam maiorem, de qua meatus ad testem pertinent utrunque. Sed ut piscibus lentor ille prolificus tempore initus haberi 40 sentitur, meatusque latissime patent: ubi uero id tempus præterijt, incerti uel meatus ipsi interdum redduntur: sic auium testes, prius quam coire incipiant, alijs exigui, alijs omnino obscuri sunt: at uero cum uenerem exercent, insigni tantisper magnitudine augentur, quod apertissime palumbis & perdicibus euenit: atque ita ut hybernis mensibus ne ullos quidem testes in ijs haberi nonnulli arbitrentur. Quibus autem parti priori testes commissi sunt, ijs autem intus iuxta aluum conduntur, ut delphino: aut foris in aperto ultima aluo positi sunt. Quibus utrisque cum cætera sint eadem, unum illud discrimen existit, quod quæ intus continent suos testes, nulla cute habent obductos: quæ autem foris, hæc coniectos in conceptaculum,



culum, quod scrotum uocamus, gerunt. Testes uero ipsi omnibus gressibus uiriparis sunt ad hunc modum. Meatus duo uenales ad capita testium de uena aorta pertendunt, & alij totidē a renibus eodem deueniunt: sed ij sanguinolenti, illi quos mittit aorta, exangues sunt. A capite autem ipsorum testium meatus excipit spissior illo superiore, atq; neruosior: qui progressus per testem flectit sese inde, & caput eiusdem repetit: unde rursus in idem coeunt, & in parte priore subeunt genitale. Qui caput repetunt, ipsi tam continua membrana obuelant cum ijs, qui residēt testibus, ut unus esse meatus uideantur, nisi membrana diuortium feceris, humorē adhuc sanguineum continet is, qui residet, sed minus quā illi superiores. At uero qui reuersi ceruicē subeunt genitalis, humorem iam habent candicantē. Quinetiam de uesica meatus perferitur, & se ad ceruicē applicat, quē ueluti putamen cannalicu latum ambit id, quod penem uocamus. Specta ea quā dixi descriptione hac: Sit α. initium meatus, qui de aorta profisciscunt. x. x. meatus descendentes ad capita testium. ω. ω. qui ab ijs affident testibus. β. β. qui repetunt scilicet quibus humor candicans continetur. A. genitale. e. uesica. γ. γ. testes. Excisus detractis ue testibus, meatus sursum se retrahit. Castrare solent duobus modis: aut enim testes nouellos adhuc frangūt, aut adultos iam firmosq; excidunt. Taurū aliquando excisum initū protinus actō, progenerasse traditū est. Testes animalū ita se habere cognitū est. Vuluā siue uteri, nec eodem situ habent, nec similes omniū sunt: sed differunt inter se, tum eorum quā animal generant, tum illorum, quā oua pariunt. Habent omnes qui iuxta genitalia continent, sinus geminos, alterum in latere dextro, alterū in sinistro. Initium uero unum est, & cōmune ostium, quasi ceruix carnosā admodum, cartilagineaq; parti plurimā auctissimāq; animantium tributum est. Pars uulua interior, loci, & uterus appellatur: unde fratres uterinos cognominamus. ostium autē & ceruix, matrix dicitur. Sed bipedes, atq; etiam quadrupedes quā animal procreant, omēs uulua aut uterum infra septum trāuersum continent, ut homo, canis, furs, equus, bos. Cornigera quoq; omnia situm habent eundem. Extrema plurimarū uuluarū, quā cornua uocant, inuolui perpectū est. At eorum quā oua edunt, situs nō similis omniū est. Sed auium uulua iuxta septum annexa sunt: pisciū infra, sicut bipedū, aut quadrupedum quā animal pariunt: sed tenues, & membrana constantes, & longae, ita ut in minutissimis pisciculis sinū uulua utrunq; iungi in faciem oui unius uideatur, tanq; bina habeant oua ij pisces, quorū ouum arenidū est: non enim continuū, sed quoddam arenulentū est. ita diffundi in multa potest. Vulua autē ceruicem habet carnosā, callosāq; parte inferiore: at superne qua septo iungitur, membrana cōstat, & prætenuis adeo est, ut oua extra uulua esse existimes. Auib; ergo auictioribus membrana conspectior est, & per ceruicē inflata extollit, atq; sinuat. At in minoribus obscuriora hac omnia habent. Quadrupedū quoq; ouipararū hac eadem ratio uulua est, ut testudinis, lacertae, ranae, & reliquorū generis eiusdē. Enimuero ceruix una in uno, & carnulentior est: fissura autē & oua proxima septo sustentur.

Necnō ea, quā in genere pedibus priuato animal aedunt in lucē, posteaq; oua inter se pepererūt, ut musteli, & reliqua cartilaginea dicta (quicquid enī inter marina pedibus orbatū, & branchias habens animal generat, sub eo nomine intelligit) ijs uulua partita, pertinetq; ad septū quomodo auib; est, atq; etiam de medio sui bipartitū sinus, arcior ad septū usq; pertendit: ac oua tam hic, q; supra ad septi originē constitunt: mox prolapsa in spaciū latius foetus animales excludunt. Sed eorum ipsorum differētia uulua, qua tum inter se, tū uero a ceteris piscibus discrepent, accuratius per dissectiones spectari figuris singulis potest. Serpentes etiā tam ab ijs supradictis, q; inter se differre apertum est. Vipera enim animal aedit, postquam intra se oua peperit, cum cetera serpentum omnia genera oua aedant in lucem, quo fit, ut uipe-

rae uni uulua similis, ut cartilagineis sit. Tendit porrò serpentibus uulua prolixior modo corporis ex orla inferius uno cōtinua meatu, diducta q̄ in latus spinæ utrunque, quasi duplex meatus usq; ad septū: in qua oua ordinatim gignunt, & a di inde, nō singulatim, sed serie continente solent. V ulua omnibus quæ & intra se, & foras animal generant, supra aluū posita est: quæ oua pariunt, ijs infra, lumbis adhaeret. Quæ animal ædunt in lucem, cum intra se oua generarūt, ijs anceps ratio est: nam & infra lumbis adiungit ea pars uulua, qua oua continent, & supra intestina ostiū eius sustinet. Ad hæc discrimen uuluarū est, quod cornigera, & una parte dentata, acetabula habent uulua, dum partū gerunt: atq; etiā parte utraq; dentatorū, lepus, mus, uespertilio, eadē illa acetabula suis cōtinent locis. At cetera utrinq; dentata ani-  
malis focunda, pedibus prædita, uulua m læuem omnia habent, & partus ipsi uul-  
ua, non acetabulis adhaeret. Partes dissimilares animalium interiores, exterioresq;, hunc in modum haberi cognitum est.

De partibus animalium similibus, ibiq; Syennesis Cyprij, Diogenisq; Apolloniatae  
opiniones de sanguine, & uenis.

Caput II



Imilarium sanguis potissimū cōmunis animalibus sanguineis om̄ibus est, nec minus cōmunis ea pars est, qua sanguis continet, quæ uena dicitur. Locū aut cōmunitatis secundū obtinent ea, quæ ijs proportionē-  
tur, hoc est sanies, & fibra, atq; etiā caro, quod præcipue corpus anima-  
lium inest. Os item, & quod uice fungitur ossis, ut spina, & cartilago.  
Adde cōmunitati eiusmodi, cutem, membranā, neruos, ungues, pilos, & quæ ijs ex  
proportionē respondeant. ad hæc, adipem, sebū, atq; excremēta, sterces dico, pitui-  
tam, bilem, tum flauam, tum etiā atram. Sed cum natura sanguinis uenarūq; princi-  
pium esse uideat, primum de ijs differendū est: præsertim cum autores nōnullos ex  
ijs, qui res eas tractarint, minus recte dixisse intelligā. Causa uero ignorationis occul-  
tioni earum partiū, ac perdifficili cōtuitui tribuenda est: nam in animalibus mortuis  
natura uenarū principaliorū abolet, propterea qd ipsæ in primis effluente sanguine  
languescant, & collabant, ex ijs em̄ quasi uase, uniuersus sanguis effundit: quippe  
qui omnis in uenis contineat, præter exiguū, qui in corde est. In uiuis aut fieri nō po-  
test, ut quemadmodū habeant, cernant: intus em̄ natura earum occultat. Itaq; aliq;  
cum in cadaueribus dissectis inspicerent, summa principia cernere nequiuērūt. Alij  
in hominibus admodū extenuatis per ea, quæ extrinsecus uiderent, interna uena-  
rum principia definire. Syennesis medicus Cyprius ita scribit: Venæ corporis cras-  
siores oriunt ad hunc modū, & tendunt de oculo propter supercilium, per dorsum  
ad pulmonē sub mām̄is. Altera de latere dextro ad sinistrū, altera de sinistro in dex-  
trum: & altera per iecur in renem, ac testem, altera ad lienem, & renem, & testem.  
Postremo ad genitale perferit. Diogenes Apolloniata hæc: Venas hoīs consistare ad  
hunc modū nouimus: duæ maxime habent, quæ per uentriculū propter dorsi spinā  
pertendūt, altera dextrorsum, altera sinistrorsum, utraq; ad pedē sibi subiectū: & in  
caput eadē per iugulū propter humeros efferunt: hinc sparsa ramorū serie, alia mi-  
nores membris om̄ibus sanguinē riuant, de dextra dextrorsum, de sinistra sinistror-  
sum. Maxime aut illæ duæ cor adeūt, circa ipsam spinā dorsi: alteræ item duæ paulo su-  
perius per pectus sub ala utraq; in manū dispensatæ pertendūt, quarū altera lienar-  
ia, altera iecoraria uocāt. Harū postrema ita scindunt, ut parte pollicē adeant, parte  
uolam: tamen ex ijs ramorū tenuiorū frequētia in digitos, manūq; spargitur totam.  
Propagines tenuiores à primis uenis mittunt, à dextra ad iecur, à sinistra ad lienem,  
& renes. Quæ aut pertinent ad pedes, scinduntur qua femur iungit, tenduntq; per  
totum femur: quarum maxima femur ex auerso perreptat, crassiq; apparet: al-  
tera

tera paulò interius minus crassa procedit per femur: tum propter genu tendunt ad crus, pedemq; imum, quo modo ad manus. hinc subeunt plantam, & se spargunt in digitos. Complures etiam renues de eisdem illis ad uentrem & costas sparsæ obrepunt, quæ porrectæ per iugulum petunt caput, apparentq; crassiusculæ in ceruice: quarum extrema fissura multiplici permeant per caput, dextra dextrorsum, sinistra sinistrorsum: atq; utraq; ad aurem desinunt. Sunt præterea uenæ collo commissæ iuxta maiorem, paulò minores, utroq; ex latere transeuntes, ad quas pluri-  
 10 ma illarum capitis pars contendit: quæ immersæ per iugulum mittunt alias ad scapulas, & manus. apud lienariam etiam, & iecorariam, aliæ paulò minores apparent, quibus adigere cultellum solemus, quoties aliquid sub cute affligit. At si quid circa uentrem infestat, sanguinem ex iecoraria, & lienaria mittimus. Quinetiam ad mam-  
 20 mas hinc aliæ pertinent. Sunt item quæ de utraq; perferantur ad testes, per dorsum medullam, tenues: atq; etiam aliæ quæ subditæ cuti tendant per carnem ad renes, celsentq; ad testes uiris, ad uterum mulieribus. Prodeunt primæ à uentriculo ampliores: tum attenuantur, dum de parte dextra in læuam, indeq; transeant ad dextram, quæ feminariæ nominantur. Sanguis crassior à carne exhibitur: sed cum ad loca deuenerit, tenuis redditur, et calidior, & spumofus, Syennesis, ac Diogenes ita.

*Polybij sententia de uenarum ordine, ibiq; falsarum opinionum refutatio. Caput III*

20 **P**olybius hæc. Venarum paria quatuor habentur: primum quod à sinistripite ortum tendit per ceruicem, summa perreptans latera spinæ, ad clunes & crura: deinde per tibias ad malleolos exteriores, & pedes, quam ob rem doloribus dorsi, & coxarum, de poplitibus malleolis uel exteris sanguinem mitti solitum est. Secundum uenarum par de capite circum aures per ceruicem, quæ iugulariæ dictæ sunt, intrus propter spinam & lumbos ad testes & femora perfertur: atq; per poplites & tibias, tendit ad interiores malleolos & plantas: quapropter doloribus lumborum & testium sanguinem ex poplitibus, aut malleolis mittimus. Tertium par uenarum à temporibus per ceruicem sub scapulis porrigitur ad pulmones: & altera de parte dextra in sinistram  
 30 pergens, mammam subit, & ad lienem, renemq; descendit: altera de sinistra in dextram procedens, à pulmonibus mammam subit, mox iecur petit, & renem: utraq; postremo ad testes desinit. Quartum par ortum parte priore capitis, de sede oculorum per ceruices ad humerorum clauiculas deuenit: unde per lacertos ad agilent, mox per cubitos ad uolam & digitos, ad malas etiam de humero propaginem mittit: quæ costas perreptat, dum altera ad lienem, altera ad iecur perueniat, deinde utraq; eminens per uentrem ad genitale desinit. Hæc ferè sunt, quæ à cæteris medicinæ autoribus dicta accepimus. Nec defunt naturæ interpretes, qui tametsi accuratius perinde ut medici non tractarunt de uenis, tamen omnes earum ortum à capite, atq; cerebro deducunt: quod error est. Cum itaq; perdifficile sit uenarum exa-  
 40 men, solis in strangulatis animalibus iam antè extenuatis effici potest, ut satis percipiatur, cui hæc res curæ sit. Sedenim natura uenarum ita se habet. Duæ intra pectus uenæ continentur spinæ appositæ, altera maior, altera minor: maior partem priorem adit, minor posteriorem: & maior dextram potius sedem obtinet, minor sinistram: quam aortam nonnulli uocant, eo quod neruosa eius pars conspici uel in mortuis potuit. Ambæ ex corde originem ducunt: transigunt enim totæ cætera uiscera per quæ tendunt, sua seruantes naturam, ut nihil contrahant detrimenti, quo minus & sint uenæ, & appellentur. Sed cor non eodem permeat modo: uerum ei tanq; suæ parti continuantur, magisq; ea, quæ prior, & maior est. Situ autem tali oriuntur, ut altera supra, altera infra sit, & cor inter se positum amplectantur. Habent

intra se corda omnia sinum triplicem, sed magnitudine uaria, minutissimorum enim animalium sinus arctiores sunt, ita, ut unus, qui amplior est, uix conspici possit, reliqui sensum effugiant. Mediocrum animalium secundus etiam conspicuus est: maximorum perspicui omnes possunt. Et cum priorem in partem cor suo mucrone spectet, ut dictum est, sinus qui amplissimus est, dextrum supremumque recipit situm, minimus sinistrum, mediocris medium. qui autem maximus inter eos est, hic longe reliquis ambobus amplior est: omnes tamen ad pulmonem foramine spectant perpetuo, sed propter exiguitatem meatuum latent, præterquam in uno. Oritur ex eo amplissimo, supremoque sinu uena maior, sedemque dextram tenet, mox per medium sinum formam recipit uenæ, utpote cum ipse uentriculus cordis uenæ particula sit, in qua sanguis restagnet. Aorta de sinu medio exit, non eodem modo, sed per fistulam multo arctiorem in initio societatem, & tendit ad latere cordis, cum uena maior sua radice cor transigat, cum se promit. Vena item ipsa maior membrana, & cute constat. Aorta arctior est, & uehementer neruosa, deductaque longius, hoc est, ad caput, aut imas partes in angustum admodum coarctatur, ac nerui naturam ex toto accipit. Pars prima uenæ maioris sursum a corde proueniens, scinditur bipartito. Adit alterum membrum pulmones, alterum spinam & uertebrae colli nouissimam, rursus membrum, quod pulmonem adierit, bipartito se scindit, quia pulmo in duas partes discretus sit: deinde singulas fistulas, singulaque foramina subit, amplius ampliora, arctius arctiora, ita, ut pars nulla sit sine foramento, et uenula: quamquam postrema diminutionum præ sua exiguitate uisum effugiunt: quo fit, ut pulmo omni ex parte refertus sanguine uideatur. Hos autem uenæ meatus induci supra fistulas ex arteria pertinentes, certum est. Membrum alterum, quod ad spinam, & colli uertebrae diximus tendere, per spinam ipsam porrigitur, quam uenam Homerus notat, cum ait: Venamque inciderat omnem, Quæ per dorsa means ceruices fertur ad imas. Hinc uenulae singulae ad singulas costas, & uertebrae feruntur. Finditur etiam bipartito hæc eadem uena iuxta uertebrae, quæ supra renes posita est. Ita hæc membra uenæ maioris, in ramos sparguntur: sed rursus parte superiore, qua ex corde protendit scissa numerosiore uenarum propagine, duo petit loca: quippe quæ alias in latera, & humeros mittat, quæ mox per alas homini ad manus feruntur, quadrupedi ad pedes priores, auibus ad alas, piscibus ad pinnas, quæ parte prona continentur. quarum uenarum capita iugulares, qua primum scinduntur, appellamus. sed qua scissa ceruicem subeunt, iuxta pulmonem arteriam tendunt, quibus interdum foris apprehensis corruunt homines sensibus ereptis, & palpebris compressis, ita porrectæ, amplexæque arteriam ad interuallum aurium feruntur, qua maxillæ faucibus coeunt. Denuo inde scinduntur in uenas quatuor, quarum una remeans per collum, & humerum descendit, & cum priore propagine ad flexum brachij copulatur. secunda ad palmam & digitos cessat. tertia de utraque sede aurium ad cerebrum pertinet, atque in multos prætenues ramulos spargitur: itaque membranam custodem cerebri subit. Cerebrum autem ipsum omnium expers sanguinis est, nec aliquid uenæ, uel auctioris, uel minoris in id cessat. Reliqui rami, qui ab eadem uena mittuntur, partim ambiunt caput, partim ad sedes sensuum, dentesque, gracili uenularum serie terminantur.

De aorta uena minore, eiusque sede.

Caput IIII



Ena etiam minor, quam aortam diximus nominari, eodem spargitur modo in ramos, qui partes uenæ maioris consequantur: uerum meatus eius, & uenulae multo minores sunt, quam uenæ maioris. locis a corde superioribus, uenas hunc in modum haberi nouimus. Pars autem maioris

uenæ

uenæ cordi subiecta, fertur elatior, per septūq; applicata, tum ad aortam, tum etiam  
 ad spinā membraneis flaccidisq; meatibus continet, mox uena ad iecur ab ea mittit  
 breuis, sed lata: de qua multæ ac tenues sparsæ in iecur oblitterantur. Rami inde ab  
 ipsa iecur transigente duo procurrunt, quorū alter ad septum, & præcordia dicta  
 cessat: alter supera repetit, ductusq; per alam ad lacertum brachij dextri se porri-  
 git, quæ cæteris uenis se applicat iuxta flexum interiorem. Quamobrem sanguine  
 hinc misso, dolores iecoris quidam leuari possunt. Pars altera uena eiusdem breuis  
 quidem, sed crassā, latus petit sinistrum, pergitq; ad lienem, quæ sparsa in ramulos  
 subit, itaq; aboletur. Quinetiam ab eadem maiore propago pari modo ad lacertum  
 10 sinistri brachij mittitur: sed quæ ad brachium dextrum procedit, eadem quæ pertin-  
 git ad iecur, est. Hæc uero diuersa ab ea, quæ ad lienem pertinet, est. Aliæ item a ue-  
 na maiore duæ propagantur, quarum altera ad omentū, altera ad id, quod a carne  
 pancreum appellatum est, de qua uenarū frequentia per lactes tendunt, quæ omnes  
 in unam desinunt uenam grandem, per totum intestinum & uentriculū ad gulam  
 usq; porrectam, quæ & ipsa ramos de ijs quas perrepat partibus, spargit complu-  
 res. Vtraq; igitur, tam maior, quàm aorta, renum tenuis, una atq; perpetua tendit,  
 hic capitibus renū potius adhærescunt, findunturq; bipartito, uelut in literam lam-  
 bda, aut V literam inuersam, uergitq; magis in partē posteriorē corporis uena ma-  
 ior, quàm aorta. Spinæ annecti aortam potissimū circa cor uenulis prætenuis &  
 20 neruosis, notum est. Ducitur eadem de corde nimirū amplitudine insigni, sed pro-  
 cedens arctior, atq; neruosiior euadit. mittit ea quoq; ad lactes ramos, quemadmo-  
 dum maior, uerum longe minores: per angustos enim & fibris proximos, quippe  
 quos extenuatos in fibras, cauas tamen, cessare aduerterimus. Ad iecur aut lienem,  
 nulla ab aorta pertinet uena. Rami autem illi, in quos uenam scindi utraq; dixi, ad  
 coxam utraq; proficiscuntur, atque os ipsum attingunt. ad renes etiam a maiore,  
 aorta q; uenæ deueniunt: sed cauum non subeunt renum, uerum in corpus eorum  
 absumentur. Necnon alij duo meatus ab aorta ualidi & perpetui ad uescicam pro-  
 cedunt: atq; etiam alij de cauo renum eodem ueniunt, qui nihil commune cum ue-  
 na maiore fortiuntur. Singulis item renibus de medio uenæ exorsæ, cauæ, neruo-  
 30 sæq; iuxta spinam ipsam per uenas se porrigunt: mox in coxam utraq; condun-  
 tur, ac delitescunt, deinde denuò porrectæ in clunes apparent: quarum & ipsarum  
 postrema, ut in sexu uirili ad uescicam, genitaleq; coniungunt: sic in fœmineo ad uul-  
 uam, aut uterum pertinet. Nullam sanè uenam de maiore uuluam adire uidemus,  
 cum de aorta multæ, frequentesq; ueniant. Ramis etiam tum aortæ, tum etiam ma-  
 ioris, aliæ mittuntur propagines: quæ primum ad inguina ampliusculæ, cauæq; ac-  
 cedunt: deinde per femora, cruraq; in plantas, & digitos finiūt. Atq; etiam duæ aliæ  
 per inguina & femora commutatis uicibus perferuntur: altera de parte dextra in si-  
 nistram, altera de sinistra in dextram, ac cæteris uenis circa poplites se coniungunt.  
 Quemadmodum uenæ se habeant, & undenam suam originem ducant, apertum  
 40 iam est. Continet autem genus animantium omne sanguinis compos, uenarū ini-  
 tia, & genera summa, eo quo exposuimus modo: nam reliqua copia uenarum non  
 simili ratione in omnibus est. neq; enim partes eodem modo, aut eadem in omni-  
 bus habentur. nec uero æque in omnibus patet uenarum series, sed potissimum in  
 ijs constat, quibus sanguinis copia & præcipua magnitudo est. nam in minutis, san-  
 guinis ue inopibus, uel per naturam, uel per immodicam corporis obesitatē, haud  
 æque inspicere possunt. Alteris enim meatus quasi a ueoli quidam multo intersepti li-  
 mo permiscetur: alteris paucæ, eademq; fibræ potius quàm uenæ continentur.  
 una tamen, quam maiorem ex præcipua magnitudine cognominamus, potissimū  
 euident in omnibus etiam minutis animalibus est.

**N**ervorum mox ordinē persequemur. Origo eorum quoq; in corde est. Id enim nervulos suo ampliore ventriculo continet. & uena aorta ap-  
pellata, nervosa est, & quidem postrema eius nervo omnino constant: quippe quę nullo intus cauo distinguant, tendanturq; modo nervorū,  
qua desinunt, applicata ad nodos ossium lubricos. Ceterū natura nervorū nō mo-  
re uenarum continua de eodem initio procedit. Venę enim, ut in depictis canābis,  
hoc est fontibus riuo multiplici sparsis patet, figuram totius corporis distribuūt, ita,  
ut corporibus admodū extenuatis, partes omnes uenulis refertę conspiciant. Lo-  
cus enim idem uenulis in macilentis, carne in corpulentis redundat. Sed nervi di-  
ducti distractiq; passim ad artus, & flexus ossium applicant. quod inde etiā percipi  
potest: nam si eorum natura esset cōtinua, late iam in extenuatis corporibus con-  
tinentia omniū pareret. Summę nervorū partes, quę membrū ad salendum accō-  
modatum continet, poples dicta: & quę se geminam porrigit, tendo nomine: &  
quę ad vires corporis iuuant, attendo, & humerarius. reliquę quibus ossium nodi  
deligantur, nomine uacant. Nam ossa omnia siue foris uicissim tangunt, siue alterū  
infitur alteri, nervis ligantur: & circiter ossa quāuis nervorū copia ducitur, capere  
excepto: id enim non nervis, sed futuris ipsorum ossium continetur. Nervī natura  
fissilis in longitudinē tendit. scindi per latitudinem nō potest. intendiq; uehementē  
idonea est. Humor circa nervos mucori similis, albidus, glutinosusq; consistit: quo  
ipsos nervos & nasci, & ali certum est. Nervus ignem nō patitur, cum uena patia-  
tur: & incisus solidari nō potest. Pars corporis nulla stupore tentatur, quę nervo  
caret. Nervis plurimis, pedes, manus, & scapulę continent: atq; etiā ceruices, &  
Iacerti. Quibus datus est sanguis, iisdem omnibus nervi adiuncti sunt. Sed quę nul-  
los habent articulos, priuatq; pedibus, & manibus sunt, ijs prætenues, incertiq;  
habentur. quapropter in piscibus, qui iuxta pinnas positi sunt, ijs præcipue ueniunt  
in conspectum.

**F**ibrę inter nervum, & uenam, suam habent naturam: & nonnullę hu-  
morem saniem appellatur, continent. tendunt a nervis ad uenas, ac  
inde ad nervos. Secundū etiā genus fibrarum est, quod consistere in  
sanguine solet: quāq; nō cuiusq; animalis. Spissari autem sanguis nō  
potest, si id genus fibrarum detrahatur: spissatur uero, si non detrahat.  
Genus id ergo fibrarum tamen si maiore ex parte in sanguine animalium inest, ta-  
men cerui, damę, bubali, & aliorum quorundam sanguini deest: quocirca eorum  
sanguis non similiter, atq; ceterorum concrevit. Sed ceruorum perinde ut leporū  
solet spissari, uidelicet non coitu firmiore, ut ceterorum, sed fluido, quale lac est, qd  
sine coagulo sponte coierit. Bubali sanguis aliquantulo amplius spissatur: quip-  
pe qui proxime ouillo, aut paulo minus cōsistat. Vena, nervus, & fibra ita se habēt.

**S**si alia ab alijs nexa, & omnia inter se apta, unam continuant seriem  
modo uenarum: nec est ullum os, quod seorsum ipsum per se maneat.  
Initium uero in omnibus, quę ossibus constant, spina est: quę compa-  
cta ex uertebis a capite ad coxas porrigitur. Vertebrae omnes forami-  
ne medio peruia sibi iunguntur. Extrat os capitis continuum, nouissi-  
mis superimpositum uertebis, quod calua dicitur. Eius pars ferrata, futura nomine  
significatur. Pars hæc non simili modo in quoq; genere animalium habetur. Alijs  
enim osse continuo calua perficitur, ut canis: alijs compacto, ut homini, eiusq; foemi-  
na sua

nae futura circulariter est. Mari tres in summū uerticem ascendunt future, coeuntq; in figurā triangulā speciem. sed iam & uiri caput uisum sine ulla futura est. Constat sane caput non quatuor ossibus, sed sex. quorū duo exigua, scilicet reliquorū comparatione circa aures posita sunt. Maxillae à capite protenduntur, ossa duo: quarum inferiorem animalia omnia mouent, excepto fluuiatili crocodilo. hic enim unus nō inferiorem, sed superiorem mouet. Maxillis, dentium genus inhaeret. os partim cauum, partim solidum, & adeo firmum, ut solum inter ossa ferri aciem respuat. Oritur à spina, fibula, iugale, & ordo costarum. Pectus etiam costis impositum est. quae quidem aduersae inter se coeant, cum reliquae breuiores sint, quam ut facere idem queant. Nullum enim animal est, quod circa uentrem os habeat. Sunt item ossa humerorum, & quae scapulae appellantur, & quae ijs annexa dependent, brachia, & manus. Modus idem compaginum, uel in ijs est, quae crura habent priora. Acetabulum infra, qua spina desinit, à coxa est: & ossa iam crurum oriuntur, quibus femora & tibiae constant, pernae, aut culinā nomine, quorum pars malleolus est, & malleoli calcar: uidelicet in ijs, quae habent malleolos, ab ijs ossa pedis minuta, & plura subiacent. Quae igitur ex sanguineis pedestribus animal generant, haec ossa non multo diuersa habent: sed ad proportionem tantūmodo duritia, mollitie, magnitudine differant. Ossium item animalis eiusdem, alia medullam intra se continent, alia minime. Sunt nonnulla, quae suis in ossibus nullam omnino habere medullam uideantur, ut leo: quod admodum exiguum ac tenuem habeat, eamq; in paucis ossibus. solis enim inferioribus, atq; brachijs. Constat profecto leo praecipue omnium animalium ossibus solidis: sunt enim adeo dura, ut ex eis concussis, ignis uelut à filice elidatur. Delphinus etiam ossa habet, non spinas. Ceterorum animalium sanguineorum ossa, aut paulo inter se differunt, ut auium: aut proportionem eadem sunt, ut piscium. Qui enim inter eos animal generant, cartilaginem pro spina habent: ut ea, quae cartilaginea appellauimus. qui autem oua pariunt, spinam continent: quae perinde ut dorsum in quadrupedum ordine habetur. Sed proprium in piscibus est, quod nonnullis spinulae quaedam praetenuis separatim per carnem inhaerent. Serpentinibus etiam dorsum piscium more compleri apertum est. At uero ea quae inter quadrupedes oua pariunt, os aut spinam pro suae magnitudinis modo meruerunt. maiora enim ossis naturam potius obtinent, minora spina potius in ossis uicem fulciuntur. Omnia prorsus animalia quae sanguinem habent, dorso constant, aut osseo, aut spinea. cetera ossa alijs insunt, alijs desunt. ut enim partes corporis quaeque habentur, ita ossa quoque ad partes accommodata habentur. Quibus enim crura, & brachia desunt, ijs pernae aut culinā praedictae etiam desunt. Nec uero ijs quibus partes, eadem quidem, sed dissimiles sunt, eadem ossium ratio seruatur: sed aut pluris minoris uel modo differunt, aut proportionem. Ossa igitur ita se habent.

De cartilagine, eiusq; cum osse differentia.

Caput VIII

40 **C**artilago differt ab osse pluris, minoris uel ratione, cum alias natura eadem, qua ossa constet. Et quemadmodum os praefectum nunquam recrescit, ita & cartilago rupta nunquam reparatur. Terrestrium, quae & animal gignunt, & sanguinem habent, cartilago nullo foramine hiscit, nec ossium more medullam continet. At uero aquatiliū cartilagineis, quod per dorsum proportionatum ossibus tendit, cartilago est, huiusmodi in medullae speciem continens. Gressilium quae animal gignunt auriculae, nares, extremaq; ossium nonnulla cartilagine constant.



Vnt item alia partium genera, quæ naturam nec eandem habent, quæ ea quæ exposita sunt, nec longe ab ijs remotam, ut unguis, ungula, cornua: præterea rostrum, quale darum auiibus est. hæc enim & flexilia & fissilia sunt, cum nullum os uel flecti, uel findi possit, sed fragile quodq; habeatur. Colores cornuum, unguium, ungularum, pro cutis pilorumq; colore sequuntur. etenim cutis nigra, cornua nigra, & ungula nigra oriuntur: & candida pari modo in colore respondent, & cornua, & unguis, & ungula, medijs etiam medium eadem colorem præferunt. At dentes naturam ossium 10 æmulantur: quam ob rem hominum nigrorum, ut Aethiopum atq; similibus, dentes & ossa candent: unguis nigri modo suæ cutis apparent. Cornua parte plurima caua sunt ab radice, quatenus ambiunt os, quod ortum à capite cauo cornu in feritur, totumq; implet: in mucronem tamen solidum exeunt, & simplici parte extrema constant. Cervi tantummodo tota solida, & sparsa in ramos, & omnibus annis decidua, nisi castrentur: cum ex cæteris cornigeris nullum cornua amittat. De castratis autem postea differemus. Adhærent cornua cuti potius, quàm ossi: unde fit, ut in Phrygia & alibi boues sint, qui cornua perinde ut auriculas moueant. Quæ habent unguis (habent autem quibus digiti, digiti uero ijs sunt, quibus pedes, excepto elephanto: huic enim digiti diuisi, ac leuiter formati, nec unguis omnino sunt) 20 hæc ergo, aut rectis unguibus sunt, ut homo: aut aduncis, ut inter pedestria leo, inter uolatilia aquila.

De pilis, &amp; ijs quæ pilorum uice funguntur.

Caput X



De pilis, atque de ijs quæ uicem pilorum suppetunt, & ob eam rem pili proportionalia dicuntur, atque etiam de cute, res ita se habet. Pilos habent quæ pedestria, eademq; uiuipara sunt. Cortice autem integuntur, quæ ouipara sunt pedestria. Squama uero pisces tantum, qui outi arenidum illud pariunt. Nam ex longis conger, tale ouum non adit, nec murena, anguilla uero nullum omnino ouum generat. Crassitudinis, tenuitatis, copiae, & magnitudinis pilorum discrimina, pro partium quibus adhærent conditione, atque pro cutis qualitate proueniunt. fit enim magna ex parte, ut pili & duriores, & crassiores cuti crassiori enascantur. Plures autem longiores humidioribus locis, atque cauatiorebus (dummodo sint ad gignendum pilum idonei) prodeunt. Hoc idem de genere quoque tam squama munito, quàm cortice intelligi licet. Quæ igitur molles suapte natura pilos habere solent, hæc per usum pabuli melioris, duriores incipiunt gerere: contra autem molliores, paucioresq; ea, quæ duros, copiososq; habuerint, eadem illa scilicet ratione. Regionum etiam tepore, aut frigore differentia est, ut pili hominum locis calidis duri, frigidis molles oriuntur. Sunt molles, qui promissi & simplices: duri, qui crispi. 30

De pilis &amp; cute, &amp; ijs quibus pili &amp; cutis.

Caput XI



Atura omnium pilorum fissilis est: sed plurius minoris uel ratione inter se differunt. Nonnulli paulatim adeo duritate degenerat, ut non pilis præterea, sed spinis similes esse uideantur, ut pili herinaceorum. Quod idem unguibus etiam euenit: quippe cum in nonnullis animalium, genus unguium præ nimia duritudine, nihilo ab ossibus differat. Cutis homini proportionem magnitudinis tenuissima est. Inest in cute omnium lentor quidam mucosus: uerum alijs minus, alijs magis: ut in tergore bubulo, ex quo glutinum facere solent. 40



lent. Quinetiam ē piscibus glutinum à nonnullis excōquitur. Sensu cutem ipsam carere constat, maximeq; in capite, quoniam ibi nulla interposita carne ossi adhæreat. Vbiq; cutis per se, ac sine carne est, uulnerata non coit: ut in gena, bucca, præputio, palpebra. Contextu perpetuo cutis in omnibus animalibus continuatur: nec alibi interpellatur, quàm ubi naturales meatus solent euaporare, atq; etiam in ore, & unguibus. Cutem omnia habent quibus est sanguis: pilos non omnia: sed sicut distinctum iam est. Mutatur color pilorum in senectute, candidiq; pili efficiuntur in hominibus. quod uel cæteris animalibus accidit, sed non satis aperte, præterquam in equo. Candescunt pili à parte sui postrema. Plurimus tamen canorum numerus candicans illico existit: qua ex re patet canitiem non ariditate committi, ut quidam uolunt. nihil enim illico aridum gigni solet. Cutis autem uitio, quod uirginem appellamus, pilos omnes produci canos apertum est. Iam nonnullis pili dum ægrotarent, incanuerūt: quibus in bonam ualeitudinem restitutis, nigri renati sunt, canis defluxis. Canescere pilos ocyus opertos, quàm detectos, difflatosq; aduertimus. Tempora hominum, & partes primores quàm posteriores celerius canitiem sentiunt. pubes nouissime canescit. Pili in homine animalium omnium uno partim simul, partim postea per ætates gignuntur. Congeniti sunt pili capitis, & superciliorum, & palpebrarum: post geniti, pubis primum, mox alarum, postremo menti. Loca enim quibus pili proveniant, totidem sunt congenitis deputata, quot post genitis. deficiunt ac defluunt maxime, primiq; per ætatem pili capitis, non tamen omnes, sed tantum priores: parte nanque posteriore caluus nemo efficitur. Ergo capitis leuitatem, caluitium nuncupamus: quam rem in supercilijs salitum appellamus, quoad melius uocabulum inuenerimus. neutrum eorum priusquam cœptus coitus ueneris sit, accidere nouimus. Caluitij mulieres esse immunes, & pueros, & spadones, apertum est. Pili post geniti, ijs, qui ante pubertatem castrati sunt, non exeunt: & post pubertatem excisis, soli decidunt, præterquam pubis. Pili in mento mulieris non prodeunt, nisi interdum pauci, cum menstrui cursus substiterunt: & ut in terra Caria mulieribus sacerdotibus euenire aiunt: quod diuinationis indicium interpretantur. Reliqui pili, qui postea gigni solent, mulieribus quoque proueniunt, sed parcius. Fieri potest, ut homo, tum mas, tum etiam foemina, pilis post genitis careat, iam inde ab ortu naturæ uitio contracto: & nisi ut pubescant, contingat, steriles in gignendo sunt. Crescunt cæteri pili plus minus uel, prout singulorum ratio postulat, maxime in capite, mox in barba, & præcipue quibus pili tenuiores. Nonnullis etiam supercilia per senectutem adeo hirsuta redduntur, ut tondendum sit. quod propterea euenit, quia cohæsioni apposita sint ossium, quæ senescente ætate laxantur, & inde plus humoris transmitti pariuntur. At uero pili palpebrarum, nunquam plus iusto excrescunt. defluunt rebus ueneris incœptis, eoq; magis, quo usus ueneris fuerit amplior. eosdem etiam lentissime omnium canescere clarum est. Pili euulli subnasci denuò possunt, dum citra ætatis florem degitur, nec ulterius. Habet autem genus quodq; pilorum ad suam radicem lentum quendam humorem, quo protinus ubi euulsum est, si qua leuiuscula tangat, adheret, ut ea trahere possit tenacius. Quibus uero animalibus uersicolores sunt pili, eisdē etiam in cute uariis ille color habetur, atque etiam in lingua. Barba non pari modo effunditur omnibus, sed alijs tam maxillæ, quàm mustax, & mentum, pilorum frequentia integuntur: alijs mentum leue, & mustax: maxillæ pilosæ cernuntur. Caluescere minus solent, qui mento sunt bipartito. Crescunt etiam pili quibusdam in morbis, ut præcipue in tabificis. Quinetiam in senectute & defuncto augefcunt, durioresq; redduntur: quod idem unguibus quoque etienit. Libidinosis pili congeniti maturius defluunt: post geniti, celerius sese promunt. Minus, qui uarices habent,

caluescunt. Et si calui habere inceperint, pilos nonnulli producunt. pili præcisi non ab incisura augentur, sed inferius ab radice exeunt: atque ita euadunt longiores. Piscibus quoque extenuatis ac senescentibus, squamæ duriores, crassioresque efficiuntur. Quadrupedum etiam uilli, lanæ uel senectute prolixius augentur, quanquam rarefiant, fiantque pauciores, & ungulæ quoque maiores in senectia redduntur, quod idem rostris etiam autum euenit. Incrementum ungularum idem, quod unguis est.

De pennis autum, & earum mutatione, aliorumque animalium, è potu  
quorundam fluminum. Caput XII



Ennæ autum nullæ per ætates mutantur, præterquam gruum, quas nigrescere in senectia perspectum est. At uero per affectus temporarios, quoties frigora urgent acriora, pennæ uolucrum unicolores interdum è nigris, aut nigritusculis, albidis uel, in albas transeunt, ut corui, passeris, hirundinis, cuius rei contrarium, ut quicquam ex genere albo ueniret in nigrum, nunquam uisum est. Temporum quoque uicissitudine bona pars autum ita colore immutatur, ut quænam sint, latere possint, nisi rem peritius noueris. Aquarum item diuersarum usu, nonnulla suos immutant colores: alibi enim candida, alibi nigra redduntur. Sunt etiam aquæ multis in locis, quas cum oues biberint, moxque inierint, nigros generent agnos: ut in terra Assyritide agri Chalcidici Thraciæ facit amnis, quem præ nimia frigiditate Psychrum uocant. Et in Antandria quoque duo sunt fluij, quorum alter candorem, alter nigritiam pecoribus facit. Scamander etiam amnis flauas reddere oues creditur: quæ ob rem Xanthum pro Scamandro nuncupatum ab Homero autumant. Lepori uni pili, & in bucca intus, et sub pedibus sunt: cum cetera animalia nec intra os habeant pilos, nec parte pedum resupina, sed prona. Musculus etiam piscis pilos in ore intus habet uiscerum, quibus omnino caret, suillis similes. Sed pili, ut dictum est, præcisi augeri ab radice possunt, superne non possunt. pennæ autem nec ab radice, neque superne ab incisura possunt reparari, sed cadant, necesse est. Nec penna apum, aut quæuis in fissa renasci potest, cum euulsa est. Aculeo etiam apibus detractio, nullus subnascitur alius: imò breui moriantur, necesse est.

De membranis in sanguineis animalibus. Caput XIII



Vnt & membranæ in sanguineis animalibus: quæ quidem pars similis cuti prætenui, spissæque est. Sed diuersum sanè genus id adest, quippe quod hæc nec fissile, nec euulsile sit. Ambit singula, tum ossa, tum etiam uiscera membrana, tam in maiore, quam in minore animalium genere: uerum in minore sensum effugit, quoniam admodum tenuis, atque exigua sit. Maximæ inter membranas duæ sunt illæ, quibus cerebrum operitum munitur, altera supra adhæret ossi, quæ firmior, & crassior est: altera infra contigua cerebro, mox quæ operit cor, magna habetur. Præcisa membrana ipsa synce-  
ra non coit: & ossa suis dispoliata membranis syderantur.

De omento. Caput XIII



Mentum quoque non nisi membrana est: quod omnia habent, quæ sanguine non carent, sed alia pingue, alia macilentum. Oritur id, & dependet in ijs, quæ animal generant: eademque dentata parte utraque sunt, à medio uentre qua ueluti quædam futura ducitur. nec secus in ijs, quæ altero dentium ordine carent, à maiore uentre dependet.

De uesti-

De uestica, &amp; quomodo generentur calculi.

Caput XV



10 **V**esica etiam membrana est: sed genus id aliud membrana est, quippe quod tendi ingenue possit. Non omnibus data uestica est, sed ijs tantum, quæ animal gignunt. ouipari autem generis nulli, præter testudinem, data est. Nec uestica præcisa coire potest, nisi ad ipsum exordium suæ cervicis. quanquam non ignoro ita aliquando contigisse, ut uulnerata uestica solidesceret. sed quod admodum raro contingit, parum id obseruandum censeo. Defunctis nihil humoris in uesticam transmittitur. At uiuis non solum humor, sed etiam sicca quædam concrementa descendunt, ex quibus calculi conficiuntur. Iam nonnullis talia in uestica constiterunt, quæ nihilo differre à conchylijs uiderentur. Ergo de uenis, nervis, fibris, cute, membranis, atque etiam de pilis, unguibus, ungulis, cornibus, dentibus, rostro, cartilagine, ossibus, eorumque proportionabilibus statuendum ad hunc modum est.

De carne.

Caput XVI



20 **C**arnis autem hæc, & quod carni simile in genere sanguineo, est omnibus inter cutem, & ossa, aut quæ ossi proportionem continentur. Ut enim se habet spina ad os, ita carnis æmulum illud ad carnem. Diuisibilis undique caro est, nec uenarum aut neruorum more in longum secari tantum idonea. aboletur, & in uenas, fibrasque transit, quoties animal extenuatur, & gracilescit. Vertitur item in pingue, quoties pabuli copia suppetit. Quibus multum est carnis, ijs uenæ artiores, & sanguis rubentior, & uenter ac uiscera parua. Quibus parum, ijs uenæ ampliores, sanguis atrior, uiscera maiora, & uenter auctior. Pinguescunt intra carnem, quibus paruus est uenter.

De adipe, &amp; sebo: &amp; quæ animalia adipe, quæ sebo pinguescant.

Caput XVII



30 **A**dipes autem & sebum differunt inter se, cum sebum fragile usquequaque sit, & cum refrixit, concreseat: adeps liquidus sit, minimeque aptus durari. Iura enim sebo opimorum concrescunt, ut ouis, ut capra. Adipe pinguium liquida resistunt frigori, ut equi, ut suis. locis etiam discrepant. Adeps enim inter carnem cutemque solet consistere; sebum in fine carnis semper est. Omentum quoque adipe pinguescentibus adipeum est, sebo obefis sebale. Quæ parte utraque dentata sunt, adipe pinguescunt: quæ una, sebo. Iecur est uisceribus adipeum nonnullis consistit, ut inter aquatilia cartilagineis: quorum iecinoribus colliquis oleum facimus. ipsa tamen cartilaginea nullo discreto adipe carni, uentriue adhærente pinguescunt. Piscium sebum adipem præ se fert, nec concrecere solet. Animalia quæuis aut intra carnem, aut seorsum pinguescunt. E quibus autem pingue separatum non est, ea minus per uentrem, omentumque pinguescunt, ut anguilla. paucum enim est eis sebum in omento. Plurima tamen pars animalium uentre pinguescit, & præcipue quæ parum se moueant. Cerebrum, ut adipe pinguescentium, pinguiusculum est, uelut suis. Sic sebo obeforum, squalidiusculum sentitur, ut ouis. Renes ex uisceribus maxime pinguescunt. uerum dexter minus semper, quam sinister. & quamuis uehementer fuerint pingues, tamen aliquid semper medijs deest. Quæ sebo pinguescunt, magis quam quæ adipe, in renibus opimandis luxuriant, ac omnium præcipue oues, quippe quæ renibus pingui undique obductis intereant, quod ubertate pabuli sit, ut in Sicilia agro Leontino fieri constat. Quocirca fero

diei agere oues ad pascua pastores locis illius solent, quo minus capiant pabuli.

*Pupillas omnibus animantibus easdem esse.*

Caput XVIII



Minium uero animalium commune pupillæ institutio est. omnibus enim quæ partem hanc possident, nec duris oculis sunt, sebo constat. Minus esse fecunda, quæ adipe pinguescunt, siue mares, siue fœminæ, notum est. Omnia ætate prouecta potius quàm nouella pinguescunt: sed præcipue, cum iam suæ longitudinis ac latitudinis modum adeptæ, augeri in profundum incipiunt.

*Sanguinem omnibus & communem, & necessarium esse animantibus sanguinis: de quibus sanguinum uarietate.*

Caput XIX



Anguis in primis necessarius, communisq; sanguineis omnibus animalibus est: nec aduentitius suppetit, sed uernaculus atque intîmus in omnibus integris, atque imputidis habetur. Venas hic uasa sibi, & conceptacula habet: nec in ullo alio, nisi in corde, præter uenas continetur. Tactum nullo in genere sentit: sicut excrementa quoque in aluo contenta, sensu carere certum est. Quinetiam cerebrum & medulla tactum non sentiunt. Effluit sanguis quancunque partem incideris carnis uiuæ, ac incorruptæ. Si sanguis integer est, rubet, & dulcis saporis est: sed si uel natura, uel morbo sit uitiatus, atrior cernitur. Nec uero admodum crassius, aut admodum tenuis est, qui optimo habitu constet. humidus & calidus semper est, quandiu in corpore animalis continetur. At ubi effluxerit, concrefcit omnium, præterquam ceruorum, & damarum, & si quid aliud natura eiusmodi sit. Itaque cæterorum omnium sanguis spissari solet, nisi fibræ quibus refertus est, eximantur: sed celerrime omnium sanguis taurorum coit, durefcitq;. Copia sanguinis in primis animalibus ijs, quæ animal & intra se formant, & in lucem edunt: mox ijs sanguineis, quæ pariunt oua. Quæ autem uel natura, uel arte, bono habitu sunt, ijs nec multum admodum sanguinis est, uelut ijs, quæ per aliquam portionem recentē sanguine exundant: nec parum, uelut ijs quæ nimium sunt obesa, quippe cum præpinguia omnia sanguinem, quamuis purum, tamen paucum habeant: & quo pius pinguedinis, eo minus possideant sanguinis. pingue enim omne exangue est. Obesa item sanguinem habent imputidum, quamquam sanguis & quæ sanguinea sunt facile putrent: ac præcipue quæ ad ossa propius applicantur. Homini sanguis tenuissimus ac mundissimus, tauro & asino inter ea quæ animal generant, crassissimus & nigerrimus: parte etiam inferiori crassior, & atrior est, quàm superiore. Palpitat intra uenas sanguis omnium animalium, pulsusq; simul undique mouetur: solusq; omnium humorum sparsus per totum corpus animalium est. Et semper quâdiu uita seruat, sanguis unus animæ, & feruet, oritur primū in corde, anteq; totum corpus forme. Si multum sanguinis effluat, anima deficit: si nimium, uita interit. Si sanguis immodice humescit, morbus infestat: sic enim in speciem saniei diluitur, & adeo ferefcit, ut iam nonnulli sudore cruento exundant. Idem etiam interdū causæ est, ut qui effluxerit, aut omnino non concrefcere nequeat, aut incompte particulatimq; spissetur. Dormientibus porro sanguinis copia partes inferiores deserit, subitq; interiores, ita ut adacto cultello nō æque effluere possit. Fit per cōcoctionē ex sanie sanguis, ex sanguine adeps. Vitæ aut excrefcensq; sanguine, profluuiū uel ē naribus, uel per infera mariscis mouet, ut uarices fiunt. Idem putrescens pus reddit, quo demū cōcalescente porus, id est, totus lapis consistit. Forminis sanguis nigrior & crassior, quàm maribus est, dummodo cætera assint, pariter quæ uel ab ætate, uel à sanitate proficiant, & minus san-

guinis

guinis per summa corporis foeminarum est: plus enim parte interiore continetur. Sed omnium foeminarum maxime mulier sanguine abundat. Et quæ menstrua appellamus, plurima fieri in mulieribus solent: quod genus sanguinis uitiatum ægro-  
ransq; fuit immodice, atq; profluuium ob eam rem dictum est. Ceteris morbis san-  
guinis minus mulieres infestantur, quàm uiri. paucis item mulieribus fiunt mar-  
iscæ, aut uarices, aut è naribus profusio sanguinis. & si quid eorum acciderit, detri-  
mentum in menstrua decumbit. Aetatum etiam ratione sanguinis discrimen, tum  
in modo, tum in genere recipit. etenim in etate admodum iuuenili saniem trahit, &  
largior est: in senectute autem crassius, niger, & paucus. medium tenet in media fir-  
maq; etate. Concrescit etiam facile senum uel in corpore sanguis, qui per summa  
est: quod idem nunquam iuuenibus euenit. Sanies, sanguis incoctus est: aut quia  
concoctus nondum est, aut quia in serum degenerauerit.

De medullis, lacte, sero, &amp; caseo.

Caput XX



Edullæ rationē ips addere debemus: nam ea quoq; humidis annume-  
randa generibus in nonnullis sanguineis animalibus est. Omnia uero  
quæ suapte natura humida in corpore sunt, conceptaculis quibusdam  
tanquam uasculis continentur: ut sanguis in uenis, medulla in ossibus.  
Alia in membranis, aut cutibus, aut uentribus. Nouellis adhuc anima-  
libus, medulla cruenta admodū est: etate prouectis, ut adipe pinguescentibus, ad-  
ipem trahit, sic sebo deputatis generibus, sebum præ se fert. Sed quanq; medulla nō  
nisi inclusa ossibus est, tamen nō ossa omnia medullā intra se continent: sed ea tantū  
quæ caua habent: tamen ipsa quidē omnia continent, ossa enim leonis partim  
nullā, partim admodū exiguā habent, quamobrē nullā omnino medullā leones ha-  
bere nonnulli putarunt, ut dictū est. In suillis etiam ossibus minus medullæ est: et nō  
nullis omnino deest. Hæc ferē semper in animalibus natua & cōgenita humidi ge-  
nera habent. Adnata aut posterioraq; sunt, lac & geritura: quorū alterum non eo-  
dem modo in omnibus est, sed quibusdā pro genitura thorax genitale uirus sui ge-  
neris habet, ut piscibus. Quæ uero lac habent omnia, māmīs id continent. Mamme  
aut datæ ips sunt, quæ animal & intra se concipiunt, & in lucem ædunt: ut ea quæ pi-  
lis integuntur, uelut homo, & equus. Cetæ etiam in aquatili genere, ut delphinus,  
uitulus marinus, balæna. Hæc enim māmās habent, & lac. At ea quæ oua pariunt,  
aut ouo intrus concepto, animal post in lucem excludunt hæc, & māmīs carent & la-  
cte, ut pisces, ut aues. Genus aut unumquodq; lactis habet tum saniem dilutam, qd  
serum uocamus: tum corpulentū quiddā, qui caseus dicitur. Plus casei lac illud ha-  
bere uidemus, quod crassius est. Coit lac eorum, quæ nō utrinq; dentata sunt, quæ  
propter caseus ex ipsis fit, quæ inter urbana, dentium ordine carent superiore, eorum  
autem quæ utrinq; dentata sunt, lac coire nō potest, sicut nec pingue, & tenue, dul-  
ceq; est. Tenuissimū cameli est, mox equæ, tum asinæ: crassissimū bubulū est. Nullū  
lac coit frigore, sed serum potius trahit. Igne nimirum omne spissatur, & crassescit.  
Nulli ferē animalium lac fieri solet, antequam uterum ferat: nec dum ferunt, utile  
omne est, sed primū, nouissimūq; inutile. Non pregnātibz aliquādo, sed raro, edu-  
līs quibusdā efficitur, ut lactescant, etiam quibusdā mulieribus natu maioribus,  
suctu frequentiore, lac prodijt, & copia tanta, ut infantem enutrire potuerint. Vbe-  
ra etiam caprarū, quæ coitū non patiunt, pastores mōtis Oetæ urtica perficāt uehe-  
menter, ut dolorē infligant, itaq; primū cruentū humorē eliciunt, mox purulentū,  
postremo lac non minus, quàm ex ipsis, quæ uenerem pariant. Maribus magna ex  
parte, nec bestijs, nec hominibus gignit lac, fieri tamē potest, ut aliquibus interdū gi-  
gnatur, nam & in Lemno insula caper ex māmīs, quas geminas iuxta genitale ge-

rit, tantum lactis emulgebatur, ut colostrā inde conficerent, quod idem etiam proli masculā capri illius euenisse accepimus. Sed hæc ostentis annumeranda potius ducunt, nam & Lemnio illi pecoris domino consulenti, Deus amplius incrementū peculij futurū respondet. Viris post pubem exiguū nonnullis exprimit: ueruntamen per suctū frequentiorē, uel multū prodisse aliquibus traditū est. Lactis inest pinguedo, quæ etiam concreto oleū propē trahit. Caprinū lac miscere cum ouillo Siculi, & quibuscūq; sit copia caprini, consueuerunt. Coit, spissaturq; potissimū, non modo quod plurimū habet caseum, uerum etiam quod squalidiorē. lactis copia quibusdā maior, q̄ ad foetus alendos satis sit. Cōmodum ad conficiendū, reponendūq; caseum præcipue ouillum, caprinūq; est: mox bubulum, equinū, ac asininum miscent ad phrygium caseum conficiendū. Bubulum fertilius caseo est, quā caprinum, cum enim ex amphora lactis caprini formagines obolæ unde uiginti conficiantur, bubulum eadem mensura triginta facit, ut pastores cōfirmant, quibusdam quantum satis ad foetum sit, tantum gignitur: nec ulla copia, aut ad reponendum cōmoditas suppetit, ut quibus mammæ plures, quā binæ, nulli enim in eo genere lac, uel copiosum, uel caseo utile. Cogitur lac succo ficulno, & coagulo. Succus lana exceptus paulillo lacte abluitur, quod iniectū lactis copiam densat, atq; collostrat.

De coagulo, & pabuli genere, quod lactis copiam extinguat, quodq;  
idem augeat.

Caput XXXI

20



Oagulū, lactis substantia est: quippe quod in eorū uentriculo, quæ adhuc lactent, contineat. Est ergo coagulū lac, ignē habens intra sese, qd cum animalis tepore concoquere, caseum traxerit. Habent coagulum omnia ruminantia, & inter dentata utrinq; lepus. Quo uetustius coagulū est, eo præstantius. tale profluuiū alui mederi præcipue potest: atq; etiam qd teporis est, sed laudatissimū hinnuli. Plus minus ue emulgeri, discrimen aut pabuli, aut magnitudinis animalium efficit. Nam pusillæ buculæ, quas Phasiana regio fert, singulæ abunde beneficio pabuli mulgent. & Epiroticæ uaccae præ sua præcipua magnitudine, amphoras singulas singulæ implent lactis, mensuræq; eius dimidium mammis duabus præstant. erectus qui mulget, aut paululū se inclinat, quoniam sedendo ubera contingere nequeat. Cæteras etiam quadrupedes magnas terra eadē Epirus gignit, excepto asino: sed præcipue boues et canes. Pastu opus est grandibus largiore, quæ terram illam abunde præbere, & loca singulis anni temporibus accommodata habere certū est. Boues igitur egregia magnitudine ibi sunt: atq; etiā oues pyrrhicæ, à Pyrrho rege ita cognominatæ. Papuli genus aliud copiam lactis extinguit: ut medica herba, & præcipue ruminantibus. Aliud auget, ut cytisus, ut eruū. Sed cytisus dum floret, incōmodus est: urit enim tantisper, atq; extinguit. Eruum prægnatibus nō prodest: facit enim partū difficiliorē omnino. Quæ in quadrupedū genere sunt edaciora, eadē ut ad possidendū meliora, ita ad lactis etiam copiam esse fecundiora, uidelicet dum alimēti copiam habeant, planū est. Nonnulla etiā flatuosa, pastu exhibitā, copiam efficiunt lactis: ut fabæ largius data ouibus, capris, bubus, capellis. faciūt enim ut ubera demittant. Indiciū aut futuræ copię lactis, cum ante partū ubera spectant deorsum. Edurat diu lac omnibus, si nō coëant, nec pastu careant copioso, sed omnū maxime quadrupedū, ouibus: quippe quibus multā mensium octo spacio continuet. Deniq; ruminantibus lac & copiosius, & caseo utilius emulget. Boues circa Toronam, paucis ante partū diebus, lacte carent: reliquo tempore habent perpetuū. Mulierū lac cōmodius lactentibus est, quod liuorem trahit, quā quod candidum est. & fuscæ salubrius habent, quā candidæ. Est porro ad alendum ualidius, in quo plus casei est: sed infantibus salubrius, quod minus casei contrahat.

De semina



Emen genitale omnia emittunt, quæ habent sanguinē. Quid & quæ admodū conferat hoc ad generationē, suo loco dicitur. plurimū uero proportionē corporis homo emittit. Pilos habentiū semen lentū est: cæterorū nullam habet lentitiā. Album omnium est. nec audiendus Herodotus, qui Aethiopes geniturā colore nigro promere scripserat. Exit profectō semen hoc genitale, albū & crassum, si integrū est: sed foris tenue totū redditur & nigrum. Nunq̃ id gelu concrefcit: imō admodū extenuat, & aque tum colorem, tum etiam substantiā trahit: calore aut̃ coit, & crassescit. & quod de uulua effluerit, aliquandiu in ea iam immoratū, id crassius prodit. nō nunq̃ etiam siccum, contortumq̃. Delabitur in aqua quod fecundū est, atq̃ subsidit: quod aut̃ infœcundum est, diffunditur, atq̃ exolefcit. Falsū etiam est quod Ctesias de genitura elephantorū scriptum reliquit.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIVM LIBER QVARTVS,

INTERPRETE THEODORO.



DE PARTIBVS animalū habentiū sanguinē, quas cōmunes, quas ue proprias singula habent genera: atq̃ etiā de ijs quas similes, dissimilesq̃ appellauimus: deniq̃ de omnibus, tam interioribus, quā exterioribus partibus, dictū iam est. Nunc ordinem animalium, quæ sanguine carent, persequemur. Genera in hoc ordine plura sunt. Primū quæ mollia appellauimus, hoc est, quæ sanguine carent, & foris carne molli obducta, solidū intus, modo sanguinei generis cōtinent: quale sepia est. Secundū quæ crustis tenuib. operiuntur, hoc est, quæ partē solidam foris, mollem carnosamq̃ intus continent. Durū illud eorū tegmen, nō fragile, sed collisile est: quale cancrorum genus, & locustarū. Terriū quæ liicea testa cōclusa muniunt, hoc est, quibus pars carnea intus, solida foris, fragilis atq̃ ruptilis, nō collisilis: quale genus concharū, & ostrearū est. Quantum insecta omnia, quod quidē genus multas, & uarias cōplectūt species animalū. Sunt porro insecta, quæ, ut nomē ipsum declarat, incūsuras parte sui uel supina, uel pro-na, uel etiam utraq̃ habent: nec osseū quicq̃ discretū aut carneū, sed quiddam inter hæc ipsa mediū cōtinent: quippe quæ corpore pariter intus, forisq̃ duro consistunt. Sūt alia impēnata, ut iuli, ut cētipedæ: alia pēnata, ut apes, uestpe, scarabei, alia utroq̃ modo, ut formicæ. est em̃ pars formicarū pēnata, pars impēnis. q̃d idē uel in ijs, quas cicindelas uocat, licet cōtēplari. Partes eorū quæ mollia nominauimus exteriores, pedes uulgarī nomine, siue brachia: & ijs continuū caput: tum alueus siue sinus cōtinent interiora, quæ pinnulæ ambiunt in orbem. caput enim nonnulli minus recte appellant. Euenit in mollibus sanē omnibus, ut caput inter pedes, et uentrem habeatur. Brachia tergo octona omnibus binis acetabulorum ordinibus, ductū perpetuo omnibus, excepto genere uno polyporum. Sepiæ, lolligenes, & lolij, peculiare binas sortiuntur promuscides longas, a cetabulo parte extrema bino asperiusculas, quibus capiunt, & ad ora admouent cibos. ijs etiam quoties tempestates urgent, ad laxa aliqua adherentes se ueluti anchoris iactis stabiliunt. pinnulis

autem, quibus alueum circundari diximus, natant. Polypus ergo suis brachijs, ut pedibus ac manibus utitur: quippe qui duobus supra os positus cibum admoveat. Vltimo uero quod & acutius, & solum albicans est, & parte sui extrema bifurcarum, dorsoq; adnexum (Dorsum autem partem leuiem appellant, à qua acetabulorum ordo inchoatur) hoc ultimo inquam brachio in coitu utitur. Fistulā idem ante alueum positam supra brachia gerit cauam, qua mare transmittit, quantum suo admiserit alueo, quoties aliquid ore capit: eamq; modo in dexteram partem transfert, modo in sinistram, hac eadem fistula suum quoq; atramentū fundere assolet. Natus obliquus, pedes in eam porrigens partem, quod capitis nomine appellatū est. Atq; ita efficitur, ut cum natat, prospiciat in aduersum (nam oculi supra sunt constituti) 10 & os habeat ex aduerso. Caput illud polypis quandiu uiuūt prædurū, & quasi inflectum est. Tangunt, ac tenent brachijs supinis, membranamq; interiectā totam extēdunt in arenam tamen elapsis, facultas apprehendendi, retinendiq; nulla est. Differunt polypi à cæteris quæ modo enumeraui mollibus, eo quod alueus polyporum paruus, & crura prælonga: cæteris ē diuerso, alueus amplius, crura breuia, ita ut potestas nulla sit ingrediendi. Ipsa autem inter se discrepant, quatenus lolligo longior, sepiā latior est. Lolligine uero longe grandior, qui lollius nominatur: quippe qui uel in cubita quinq; excreseat. Sepias quoq; aliquas in bina augeri cubita notū est. Brachia etiam polyporū tantundem, atq; etiam plus magnitudinis capiunt. Sed lolliorum genus pusillū admodū est, & facie quoq; à lolligine dissidens. Pars enim lollij, 20 quæ exit in acutum, latior est. Pinnulæ etiam circundantes illæ totum in lollio alueū ambiunt, cum in lolligine partem aliquā relinquunt. Pelagius tamen lollius nō alio modo, quā lolligo constitit. Caput omnibus inter crura, quæ & brachia, & barbe, & cirri appellantur. Eius pars oris habitus est, in quo dentes duo, supra quos oculi totidem grandiusculi, quibus discrimen exigua quædam præstat cartilago cōtinens cerebellum. Inest etiam in ore caro quædā exigua, qua uice linguæ utuntur. Lingua enim nullis hoc in genere data est. Alueus à capite amplioris capacitatis propentius, cuius caro fissilis est, uerum nō per directum, sed in orbem, cuteq; omnibus interiecta est. Os gula excipit angusta, & longa. quam guttur sequitur ampliusculū, neq; absimile aubus, cui iungitur uenter, tanq; omasum, facie clauiculæ buccinorum. Intestinum ab eo tenue, partem repetens superiorē ad os fertur, quod laxius, quā gula est. Viscera molliū nullis, sed habent quam mutem appellant: atrumq; illum humorem, cui nomen atramentū, quod plurimū in sepiā est. Effundunt suum id atramentum omnia metu perculsa, sed præcipue sepiā, mutis ergo sub ore est, & gula per eam tendit. At uero atramentū infra continet, qua intestinū petere incipit superiora: foramenq; suum eadem obuolutū habet membrana, qua intestinū, atq; idem 30 meatus emittendi atramenti, excrementiq; est. Capillamenta etiam quædā in corpore omnium habentur. Sepiæ, lolligini, & lollio, partes duræ, ac solidæ intus per dorsum, & corporis prona continentur, quas nō eodem appellant nomine: sed quod inferum sepijs est, sepiū uocant: quod lolliginibus, id gladiolū. Differūt enim, quod 40 sepium robustum, latumq; est, inter spinam & os mediam præ se ferens naturā, fungosā intra se complectens, & friabilem corpulentiam. Gladiolus arctior, & cartilaginiosior est, forma etiam discrepat, uidelicet pro alueorum modo, quibus ipse infertur continetur. Polypis nihil solidum intus, sed caput cartilagine propē constat, quæ senescentibus maiorē in modum indurescit. Differūt scemina à maribus, quia in mare meatus ille subditus gulæ à cerebello in ima aluei pertendit, idq; ipsum ad quod fertur, speciem māmæ imitatur. In scemina duplex idem illud, supraq; habet. utroq; tamen in sexu corpuscula quædā rubentia parti eiufmodi subiuncta spectantur. Quum polypi unum incomptum foris, & grande, intus humorem candicantē concolore

Μούτις, id est, mutis, ἀπὸ τοῦ μῦς, id est mutire, pro mutum facere. Id in sepijs, & omnino mollibus aspicitur: alio nomine papauer appellatum.



concolorem totum, atq; æquabilem cōtinens. Tanta est eius oī ubertas, ut uas impleat amplius capite polypi ipsius. Sepiæ alueus bipartitus est, oua candidātia grandini similia complectens permulta. Sed quīnam situs singularum quas enumeramus, partium sit, ex descriptione dissectionum contemplare. Cum uero mares in hoc genere à foeminis differunt, tum uel maxime sepiæ id probant. Mas enim pro-  
na sui corporis nigriora supinis potius, partesq; omnes asperiores habet quā foemina, & lineis interuenientibus uarias: caudam etiā acutiorem. Sed polyporum genera  
10 elodonam uotāt, crurum prolixitate diuersum, & quod unum ex mollium numero simplicem acetabulorum ordinem agat. Cætera nanq; omnia duplici calculantur. Ad hæc, quod alij bolitænam, alij ossilem appellāt. Duo item uiſuntur genera conchis indita, quorum alterum nautam aliqui uocant, alterum pompilum, siue ouum polypi. testa ijs ut pectunculis cōcaua, simplex tamen nec ita destinata, ut ei  
inhæreant. sapius iijuxta terrā pascitur: unde euenit ut fluctibus iactati in aridam elidantur, & testa dilapsa nudi capiātur, aut in terra anima extinguantur. Constant exiguo corpore, facie similes bolitænis. Est etiā qui cochlearū more siliceo tegmine ita muniatur, ut nunquam egredi soleat, suaq; interdum brachia exerat. Sed de generibus mollium satis dictum iam est.

Plin. nautilū  
& pompilium  
eundem facit.

20

De animalibus, quæ crusta integuntur.

Caput II



Rusta autem insectorum genus primum locusta: cui proximum genus alterum est, quem gammarū uocant. Differt is à locusta brachijs, quæ denticulatis forcipibus protendit: atq; etiā quibusdā alijs discriminibus, quanquam nō multis. Tertiū genus squilla est. Quartum cancer. quorum sanè plura habētur genera. Squillarum enim genere continentur gibba, crangines, & parua, quæ maiores nunquam effici possunt. Cancrorum etiā genus multiplex est, nec facile enumerandū. Maximum quas Maias appellant. Secundum paguri, & quos heracleoticos uocant. Tertium fluuiales, cæ-  
30 teri minores, & nullis penè nominibus annotati. Genus cancrorū litorale Phoenice fert, tantæ uelocitatis, ut uix consequi sit: unde hippeas, hoc est equites illos appellarunt. ijs nihil ferè intus propter inopiam pabuli. Genus item aliud est, quod magnitudine cancrum non excedat, facie gammaris simile, sed ijs omnibus (ut antè dixi) pars dura, & testacea foris pro cute est, mollis & carnea intus. supina corporis planiora & tabellatiora sunt, quibus & oua deponunt cum pariunt. Pedes locustis utroq; ex latere quini, ultimis annumeratis, qui in forcipem exeunt denticulatum. Cancris etiā omnes deni cum forcipibus sunt. Squillarum generi, quas gibbas uocamus, quini utrinq; situ, quo cæteris. quorum proximi capiti acutiores, & quini utrinq; alij uētri subiuncti, quorum extrema latiuscula sunt. tabellæ ijs nullæ parte  
40 supina: prona similis locustarum est. cancris ē diuerso: quippe quibus primi utrinq; quaterni, tum terni alij, ordinem eodem modo explentes, reliqua bona pars corporis pedibus caret. Flectuntur omnium crura in obliquum, sicut & insectorum. Brachia forcipata quibus sunt, introrsum se flectunt. Locustis & cauda est, & pinna quinæ affunt. Squillis etiā gibbis cauda, & pinna quaternæ. Cranginis quoq; lateri caudæ utrinq; pinnae adnexæ sunt: quarum pinnarū media utroq; in genere spinulis horret. Verum in Crangine latiora, in gibbis acutiora sunt. Cancris ex crustaceis solis cauda deest, & corpus rotundum est, cum locustis squillisq; longum sit. Differt mas locusta à foemina, quod foeminæ primus pes duplex, mari simplex. pinnae etiā parti supinae adnexæ, foeminæ maiores, & quæ collo proximæ sunt.

minores habentur. mari omnes aque minores, nec usquam per diminutionem dissimiles. Ad hæc, mari in nouissimis cruribus, uelut calcaria maiuscula prominent acuta, quæ scemina parua habet & leuiora. utriq; tamen cornua ante oculos bina, longa, & aspera, quibus alia minuta & leuiora cornicula subiacent. Oculi ijs omnibus duri & apti, tum intro, tum foras, tum etiam in obliquum moueri: quales etiam sunt parti plurimæ cancrorum, imò uero mobiliores. Gammaro color, quod ex toto dixerim, nitet: nigrisq; maculis dispersis euariat. pedes inferiores ad grandes usque dispositi octo. tum grandes ipsi longe maiores, extremaq; parte latiores, quàm locustæ habentur: sed non specie eadem. dexter enim suum extremum, latum, & oblongum, & tenue habet: sinister crassum, & rotundum. Vterq; tamen scissus in extremo, perinde ut maxilla tam infra, quàm supra dentatus est. Verum dexter pusillos, ferratosq; dentes continet omnes: læuus primos ferratos, intimos uelut maxillares, scilicet parte inferiore quatuor, & continuos: superiore tres non continuos. Vterq; tamen partem mouet superiorem, ad inferioremq; astringit. Blefus item uterq; situ inferiore tanquam nati ad capiendum, premendumq;. Duo supra eos grandes habentur: alij hirtiufculi, paulò ab ore inferiores, mox branchiæ os circundant, non sine hirsutia frequentes, quas assidue mouet. Flectit, atque in os adducit duos illos hirtiufculos pedes, surculi etiam graciles geruntur à pedibus, qui ori proximi habentur. Dentes huic quoq; duo, ut locustæ. supra quos cornua breuiora, tenuioraq;, quàm locustæ. Quatuor item alia adsunt cornua, specie quidem duobus illis similia: sed tenuiora, & breuiora. super hæc oculi constituti sunt parui, crassiusculi, non ut locustæ, maiusculi, frons quasi quædam acuta & aspera supra oculos extat latior, quàm locustæ. Denique facies acutior, & pectus latius quàm locustæ, totumq; corpus mollius, & carnosius. Pedum autè octo numero, pars scissa in extremo biurcatur: pars desinit in diuisa. quatuor enim bifurces sunt, reliqui quatuor simplices ex toto pertendunt. Quod autem collum appellat, quinq; partium foris est: & sextum latius illud situm loco nouissimo habetur, tabellis continuatum quinq;. interiora uero, in quibus scemina prius pariunt, quàm scetum ædant, hirtiufcula quædam quatuor continentur, quibus singulis spinæ singulæ breues, arrectæq; eminent ad exteriora. Pectus, corpusq; totum læue est, non more locustarum aculeatum, & asperum. Verum in pedibus magnis aculeos partis exterioris maiores esse manifestum est. Fœminam hoc in genere nullum discrimen à mari distinguit. nam & mari & scemina forceps alteruter grandior more incerto est. parem uero utrumque neuter unquam habere uisus est. mare omnia eius generis ore excipiunt. Sed cancri parte oris exigua adducta respuunt: locustæ suas ad branchias transmittunt, quas ipsæ plures, quàm cætera habent. Communis enim omnibus branchiarum adnexus est. Dentes omnibus bini, locustis enim duo primores, & in ore caruncula quædam constituta pro lingua est. Tum uenter os protinus excipit, præterquam locustis. Iis enim gula ante uentrem exigua, mox à uentre intestinum, quod locustis, & squillis, & gammaris recte in caudam finit, qua excrementa emittunt, & oua pariunt. Cancris autem, qua applicatum illud operculum geritur medio applicaminis ipsius: uerum ijs quoque parte exteriorè, qua oua pariunt, desinit. Fœminis item huius generis locus utis deputatus iuxta intestinum omnibus est. Et quam mutem, siue papauer appellarunt, amplius parcius ue habent hæc omnia genera. Discrimina propria contemplari in singulis congruum est. Locustis igitur, ut modo dixi, dentes bini maiusculi, & uenter quo humor similis muti continetur. caruncula etiam inter dentes linguae representans effigiem: & gula ab ore breuis, quam uenter membraneus excipit, cuius ostio tres denticuli inhaerent: duo aduersi, reliquis infra. Intestinum uero à uen-

tris latere simplex, pari crassamento ad excrementi usque ostium fertur. Hæc locustæ, & gammari, & cancri fortiuntur. sed locustis meatus quoque à pectore pendens, ad excrementi exitum pertinet: qui foeminis pro uulua est, maribus genitalis seminis receptaculum sufficit. meatus hic iuxta cauum carnis continetur, ita ut media caro interiaceat: intestinum enim de uexum pertingit, meatus uero cauo applicatur, nec secus, quàm in quadrupedum genere hæc habentur. Nulla maris meatum ac foeminæ differentia distinguit: quippe cum uterque tenuis sit, & albidus, & humorem intra se continens pallentem, uterque etiam ex pectore pendet. Squillas etiam ouum, clauiculasque, similem in modum habere certum est. Maribus sanè præ  
 10 foeminis propria in pectoris carne bina quædam candicantia constant, discreta à cæteris partibus colore, formaque promiscidi sepiarum proxima: uerum hæc torta in uertiginem more buccinorum papaueris, quorum origo ab acetabulis, quæ subdita pedibus nouissimis ordinantur. Caro in ijs quoque est colore sanguinis rubra, & tactu lento, nec similis carni. ab hoc, pectori anfractus alter strue buccinea, crassitudine lineæ sese porrigit: sub quo duo quædam arenæ conditioni similia, semini genitali accommodata, intestino adnectuntur. hæc in mare. Foemina autem ouum rubidum parit, membranasque obuolutum prætenui, uentri laterique utrique intestini annexum, atque ad carnem usque adhærens. Partes has habet interiores atque exteriores.

De partibus animantium crusta intestorum, quibus ut cum ijs, quæ sanguinem habent, conueniant.

Caput III



Ed cum animalia quæque sanguinea, partes tum interiores, tum etiam exteriores, suis quasque appellatas nominibus habeant, genus quod sanguine caret, pluribus uacat. Iam enim uiscera, quæ cuique sanguineo insunt omnia, nullum ex angue quod habeat, nouimus: sed communes generi utrique partes, gula, uenter, intestinum. Cancris autem forcpes, pedesque haberi, & ij quales essent, dictum iam est. omnibus uero magna ex parte grandior ac ualidior forceps dexter, quàm laeuis est. Quineriam de oculis diximus, uisum parti plurimæ esse in obliquum. Alueus uero rotius corporis  
 30 indifcretus est: nec enim caput distinctum, nec aliud quicquam. Oculi non eodem situ omnibus positi, sed alijs è latere supra, continuo sub prono, amplo distantes discrimine: alijs in medio breui discrimine, ut Heracleoticis, aut marjs. Os oculis subditum, in quo dentes duo, ut locustis: uerum non rotundi, sed longi. Tegmina dentes operiunt duo, inter quæ talia interiacent quædam, qualia locustarum  
 40 dentibus adnecti exposui. Humorem igitur ore accipit, tegminibus illis depellendo: emittitque meatu oris superiore, obductis meatibus, quæ interfluxit. Duplex ille meatus sub oculis est. Quoties ergo aquam acceperit, utroque tegumento os obturat, atque ita respuat humorem. Gula post dentes breuis admodum est, ita ut pro  
 40 dio intestinum simplex & tenue procedit, quod sub applicato exteriori operculo definit, ut dictum est. Quod autem inter tegumenta interiacet, huius, sicuti locustarum, dentibus adnectitur. Humor intus in alueo pallidus, & minuta quædam oblonga, albida continentur. Ruffa etiam alia, maculis dispersis. Differt à foemina mas, magnitudine, crassitudine, & operculo, id enim  
 amplius in foemina est, & distantius, & hirsutius, & opacius, quale etiam foeminæ locustarum  
 fortiuntur. Partes crusta intesti  
 generis, ita se habent.

visus continuo,  
 & nullo medio



Væ uero testa operiuntur animalia, ut umbilici, cochleæ, purpuræ, & omnia quæ ostrei, aut conchæ nomine appellamus, atq; etiam echinorum genus, carnē quæcunq; habent, similiter atq; cruitata habent: quippe quæ intus eam contineant, testaq; foris claudantur, nec intra se durum habeant quicquam. Sed ipsa inter sese numerosa discrepant differētia, tum testæ, tum carnis interioris ratione. Alijs enim in eo genere nulla est caro, ut echinis: alijs est, sed penitus inclusa, nec ulla ex parte conspicienda, excepto capite, ut terrestrium limacibus, & ijs quæ cocalia quidam appellant, & aquatiliū purpuris, buccinis, cochleis, & reliquis omnibus turbinatis. Cætera aut duplici constant ualuula, aut simplici, ut genus alterum biualue, alterum uniualue possit nuncupari. Biualue appello, quod gemina testa continetur: uniualue, quod testa singulari clauditur. Sunt item quibus altera pars superficiei detecta, carnem ostendat, ut patellæ. Biualuis generis pars clausilis est, ut pectunculī, & mitili. eiusmodi nanque omnia parte altera ligata, altera soluta constant, ut & concludi possunt & aperiri. Alia binis quidem conclusa ualuulis sunt, uerum utroq; latere connexa, ut ungues, siue digiti. Nō defunt quæ testa tota occultentur, ut nulla ex parte carnem detectam habeant: ut quæ uertibula, siue tubera, & callos appellamus. Ipsarū etiam testarum magna uarietas: nam aliæ leues, ut ungues, mitili, & cōcharum quædam, quas aliqui Galadæ appellant, aliæ scabræ, ut ostreæ, pinnae, & conchæ nonnullæ, 20 & buccina, quædam etiā pectinatum diuisæ, ut pectunculī, & concharū nonnullæ. Crassitudine quoq; differunt, & tenuitate, tum totius, tum partis, uelut labrorum. Alijs enim labra tenuia, ut mitilis: alijs crassa, ut ostreis. Item alia se mouent, ut pectines, quos etiam uolare nonnulli aiunt. Nam & de ferramento quo capiuntur, saepe exiliunt. alia item natura immobili sunt, ut nunquam sedem, in qua hærent, sponte ipsa mutare ualeant, ut pinna. Omne sanē turbinatorū genus mouetur & serpit. patella etiam saxis absolui, in pastumq; ferri solita est. Commune autē & ijs quæ adhuc enumerauit, & cæteris testacei generis, ut testa intus æqualis laeuisq; habeatur. Caro biualuis & uniualuis generis ita testæ adhæret, ut nisi per uim nequeat detrahi. At turbinatū laxior continetur & absolutior, cui generi peculiare est, 30 ut testæ postrema à capite intorqueantur. Operculum etiā eadem iam inde ab ortu naturæ omnia gerunt. Mouentur item eadem omnia parte dextra, non ad uertiginem siue clauiculam, sed in aduersum. Partes exteriores eius generis differentijs ijs uariantur. Interiorum natura similis quodāmodo in omnibus est, maximeq; in turbinatis. differunt enim inter se magnitudinis excessusq; affectu. Nec uero multum uniualue, ac biualue genus conclusile sibi dissident: quippe quæ parum differentia inter se afferant: quamquam longe ab immobilibus discrepent, quod latius postea patebit. Natura ergo turbinatorum similis constat, nec nisi magnitudine uariat, ut modo dixi. alijs enim partes maiores, atq; euidentiores: alijs minores obscurioresq; sunt. Ad hæc discrimen illud duritiæ, mollitiæ, cæterarumq; generis eiusdem affectionū. Caro enim prima in ore testæ, quam omnia torosusculam habent, alijs magis talis, alijs minus. Caput eius medio partis prominulum iungitur, & cornicula duo, quæ pro magnitudine animantis plus minus capiunt incrementi. Exerunt caput more omnia eodem, idemq; per motum retrahunt intrò. nonnullis etiam os, & dentes acuti, breues, & tenues, ut cochleis. Promuscidas item gerunt modo muscarum: quod quidem membrū linguæ effigiem præ se fert. Habent hoc idem & purpuræ & buccina firmū, & torosum, quo similiter ut asili atq; tabani, quadrupedum tergora penetrant: imò longe ualidius, testas enim eucarum possunt perforare. Venter os protinus excipit, similis in umbilicis gutturi auium: habentq; parte inferiore

inferiore duo quædam albida, torosa, mammis similia, cuiusmodi carunculas uel in  
 sepijs esse aduertimus: sed hæc torosiora. Gula à uentre duplex longa porrigit se usq;  
 ad papauer: quod postremum, fundo commissum est. Hæc ergo, ut in purpuris &  
 buccinis cōspicua, in clauicula testæ cōtinentur. Quod autē gulæ subiungitur, inte-  
 stinum est, gulæ ipsi continuum, simplexq; ex toto, usq; ad exitum. cuius initium cir-  
 ca anfractum papaueris est, qua & laxius hæret. quod enim papauer appellamus,  
 quasi materia uacans, atq; excrementitia, magna sui parte in omnibus testaceis ge-  
 neribus inest. Hinc sursum uersus replicans, carnis repetit sedem, finitq; ad caput:  
 unde eijcitur excrementum, pariter in omnibus turbinatis generibus, tam aquaticis  
 10 quàm terrestribus. Membrana in grandiusculis umbilicis à uentre gulæ attexitur  
 continua, per quam meatus prolixior albicās colore, similis superioribus illis mam-  
 millantibus carniculis tendit. Habet etiā incisuras, quales in ouo locustarum habentur:  
 uerum hoc albidum, illud rubidum est. Nullus exitus huic, nullū foramen pos-  
 streum patet, sed prætenui membrana cauo perductus angusto cōtinetur. Ten-  
 dunt ab intestino ad imum nigrātia quædā aspera, atq; continua, qualia uel in testu-  
 dine uisuntur, sed minus nigra. Cæteri quoq; umbilici h. habent eadem: sed quo  
 minores, eo minutiora. Vniualue autē & biualue genus, partim ijs simile est, par-  
 tim diuersum. caput enim & cornicula, & os obtinent, atq; etiā quod linguæ speciem  
 gerat: uerum hæc in minoribus sensum præ sua exiguitate effugiunt. Nonnulla  
 20 etiā in exanimatis, aut nō mouētib; percipi nequeunt. Papauer illud, quod etiam  
 mutem appellamus, omnia habet, sed nō loco eodem, nec par, nec ex æquo manife-  
 stum, sed patellæ in imo, biualuia uero ad partē, qua mutuo testarū complexu con-  
 tinentur. Capillamentis etiā illis hæc omnia circundantur: & quod ouum appellat,  
 tempore quo gigni solet, ambitu alterius lateris oræ cōtinetur, uidelicet ijs, quibus  
 datum id à natura est, sicut etiā albugo umbilicis, id enim illis iunctum simile intelli-  
 gimus. Sed eiusmodi partes, ut dixi, cum conspicuæ in magnis habeantur, in paruis  
 tamen aut nullo pacto, aut uix sentiuntur: quamobrē in magnis pectunculis præci-  
 pue patent, quod genus id est, cui altera ualuularum latior, uelut tegmen superpo-  
 sita est. Ostium excrementi cæteris à latere est. foramen enim quo egerant, omnia  
 30 habent: quippe cum papauer illud, ut dictū iam est, excrementitiū quiddam omnia  
 membrana contentū foruatur. At illi, quod ouum appellant, foramen, nullo in ge-  
 nere tributū uidemus, sed carni ipsi intumescit: nec eadem qua intestinū parte con-  
 tinetur, sed dextera, cum intestinū habeat sinistra. Cæteris ergo talis excrementi exi-  
 tus est. At uero patellæ ferē, quam marinam aurem quidam appellarunt, parte ima  
 testæ excernit, qua foramen habetur. Vētreū etiā post os esse, in hoc eodē patellæ  
 genere constat, atq; etiā ouis illa similia. Sed quis eorū cuiq; situs sit, diligētius ex dis-  
 sectionibus petendū est. Quem autē cancellū appellant, cōmunis ferē socius crusta-  
 torum, & testatorū generum est: quippe qui specie locustis similis spectetur, nasciq;  
 forsum per se solitus sit. Verū quod testam deinde petit, quam ingressus uitā tradu-  
 40 cat, hinc similis testæ cōtectis animātibus est: quapropter is in ancipiti esse, genusq; si  
 bi uēdicare utrunq; uidetur. Forma tamen (quod simplicius dixerim) similis araneis  
 est, nisi quod partem capiti & pectori subditā ampliorem, quàm aranei habeat. cor-  
 nicula duo rufa tenuia gerit, quibus oculi totidē subiacēt, qui nunquam intrō rece-  
 dant, ut cancrorū, sed semper eminentes appareant. os sub ijs est, quod uelut capil-  
 lamentis quibusdā pluribus circundatur. ijs pedes subiuncti duo bifurces, quibus  
 cibum ori admoveat. Bini item utriq; adhærent lateri, & tertius paruus. Thoracis  
 pars inferior mollis tota est, dissectoq; sinu pallidū intus cernitur. Meatus ab ore ad  
 uentrē pergit, foramen excrementi perspicere nullū potest. pedes ac thorax duriem  
 præ se ferunt, sed minus quàm cancri. Nexu nullo testis adhæret, purpurarum mo-

do & buccinarum, sed absolutus liberq; uagatur. Oblongior est qui turbinē subit, quam qui neritem, quem naticem interpretamur. genus enim diuersum est, quod in natice degit, cetera quidem nō absimile: sed dextrum bifurculatum pedem paruum habens, cum laeuum grandiusculum habeat, & ingredi eodem ipso grandiore potissimum solet. Tale profectō genus, uel intra conchas, quarum adhæsiō similis ceteris est, reperitur: quod & squillam paruam appellant. Natex testa leui, ampla, & rotunda, forma buccinis proxima est: papauere tamen non nigro, ut illa, sed rubro, testæ adnexum corpus mediū eius summiter est. Pascuntur hæc mari tranquillo, absoluta faxis. At quoties flatus urgent, cancelli hospites illi sese in faxa recipiunt, atque latibulis tutantur. Natices faxis adhærescunt more patellarum, & muricum, ac cæterorum generis eiusdem: nec nisi tegmine dimoro adherent, quod uelut operculum sibi possident. Vsum enim quem bivaluibus pars utraque administrat, eundem altera exhibet turbinatis. Caro intus, qua oris habitus. Modus hic idem muricibus, purpuris, atq; omnibus generis eiusdem. Quibus uero sinister pes grandior est, ij nunquam cum turbinatis hospitantur, sed cum naticibus tantum ineunt societatem, ut dictum est. Sunt inter cochleas, quæ intra se bestiolas habeant similes gammaris pusillis, qui uel in flumine gignuntur: sed ea differentia, ut præmollem intra testam carunculam habeant. Forma quales nam sint, ex dissectionibus contemplare.

## De echinorum genere.

## Capit V

20



Chinis caro negata est, idq; ipsum habent peculiare, ut nullam intus carnem contineant. Nigra quædam in omnibus uice carnis spectamus. Genera echinorum plurima. Primum quod cibo idoneum est, in quo quæ oua appellant, magna, esculentaq; consistunt, pariter in maiore corpore & minore. nam nouelli adhuc paruicq; pleniuculi illis constant. Secundum ac tertium spatagi, & brissi, quæ genera pelagia sunt, raraq; inuentu. ad hæc, quæ echinometra appellatur, quasi matrem, aut matricem dixeris echinorum, quæ quidem omnes magnitudine excedit. Genus item aliud est minutum, spinis longis, prædurisq;, gigni in alto gurgite solitum, quo nonnulli ad distillationes urinæ medicamento utuntur. Circa toronem echini nascuntur candidi, & testa, & spina, & ouo: augeri forma productiore, quam ceteri soliti. Spina ijs parua, nec rigida, sed mollior. nigra autem illa ori applicata, plura, & ad foramen exterius coeuntia habentur, sed disiuncta inter sese, quibus quasi interuentu limitum discriminantur. mouentur agilius, & frequentius, qui sunt cibo idonei: cuius rei argumentum, quod semper aliquid algæ suis spinis implexum gerant. Sunt ergo omnibus oua, sed nonnullis exigua, nec cibo apta. Euenit autem, ut quod caput appellant & os, uersum in terram sit. quod uero ad excrementi exitum deputatum est, id supra habeatur. quod idem omnibus turbinatis, patellisq; euenit. pastus enim de imis peratur, necesse est. Vnde fit, ut os inuersum ad pastum sit, excrementum uero superius parte prona testæ contineatur. Dentes quini echinis omnibus sunt, caui intrinsecus: inter quos caruncula quædam interiacens linguæ officio fungitur, mox iungitur gula, deinde uenter in partes quinque distinctus, plenus excrementi: cuius meatus omnes in exitu excrementi coeunt, qua testa forata est. uentri autem subdita sunt, quæ oua appellant, membrana obducta diuersa, eodem in omnibus impari quinario numero: quorum quod nigricat, parti creditum est superiori, ex dentium origine pendens, amarum, nec esculentum, quale in multis inesse animaduertimus, aut certe eius proportionale. nam & in testudine, & in rubea, & in rana, atq; etiam in turbinato genere, & in molli, sed colore diuerso, & aut omnino

omnino ingustabili, aut magis ab usu cibario alieno. Corpus echinis priore atq; no-  
uissima parte spissum, & continens; cætera uero nō continuum, sed simile laternæ,  
cui non obducta membrana est. Spinis suis echini utuntur, perinde ac pedibus: ijs  
enim nitibundi mouentur, sedemq; permutant.

*De uertibulis, & urticis, deq; eorum animantium natura.*

*Caput VI*



Væ autem uertibula, siue callos speciali nomine à tegminis *qualitate*  
appellamus, naturam inter hæc genera peculiarem fortiri notum est:  
ijs enim solis corpus totum tegumēto includitur, cuius durities inter  
testam & corium est: quamobrem modo præduri bubuli tergoris seca-  
tur. Adhæret ergo id genus faxis sua testa, duoq; seposita inter se fora-  
mina exigua admodum habet, & uisum uix patientia, quibus humorem accipit &  
reddit. Excrementū enim nullum in eo spectatur, quale in cæteris ostreis, uel echis-  
næ: um, uel quod appellant papauer, continetur. Dissectis, primum membrana ner-  
uosa, crusta ambiente obrenta ostenditur, qua uertibuli caro ipsa continetur, nulli  
ē cæteris similis, in omnibus tamen sui generis eadem. Adhæret hæc utroq; ex late-  
re membranæ circumdanti, & corio: & qua adhæret, arctius in partem utranq; est,  
uidelicet quā tendit ad meatus ductos foras per crustam, quibus redditur & acci-  
pitur cibus & humor, quasi alterum sit os, alterum ossium excrementis delegatum.  
Nec modus idem, sed alterum crassius, alterum tenuius est, cauumq; intus utrin-  
que, exiguu quodam interueniente cōtinuo, humorq; in altero cauo consistere so-  
litus est. pars uero alia quæ uel instrumentalis, uel sensualis sit, nulla omnino perci-  
pitur: neq; excrementitium quicquam (ut dictum iam est) quo in cæteris more con-  
tinetur. Color uertibulis, aut pallidus, aut rubidus est. Urtica etiam sui generis cer-  
nitur: quippe quæ & adhæreat faxis, more nonnullorum interiorum testa: & in-  
terdum faxis abiuncta uagetur. Nulla huic testa, sed corpus omni ex parte carnem  
præ se fert. Sentit, & manū admotā corripit: adhærescitq; perinde ac polypus suis  
brachijs, ita ut caro intumescat. Os medio in corpore continet, & de faxo quasi de  
testa uiuit, & prænatantes pisciculos excipit, retinetq; sicut manu admota homi-  
nis agi dictum est, deuoratq; in hunc modum quæcūq; nacta est esculenta. Ab-  
solui etiam faxis genus quoddam urticæ (ut modo dixi) notatum est, quod & echis-  
nos, & pectunculios, in quos offenderit, corrodit. Excrementum nulla in urtica  
esse uidetur, sed hac re similis stirpibus est. Duplex genus percipitur urticarum:  
alterum corpore paruo, quod cibo aptius est: alterum maiusculo duroq; quale cir-  
ca Euboia Chalcidem gigni scimus. sunt omnes hybernis mensibus carne constan-  
te atq; rigidiuscula, quamobrem per id tempus capiuntur, ciboq; idoneæ sunt. At  
æstate rarescunt, & resoluuntur, præmadent enim & marcent, ut si tetigeris facile  
discerpantur, atq; dispereant. Deniq; nulla tantisper euelli integra potest, ac æstus  
impatientia faxa subire interius solent. Partes iam exposui mollium, & uel crusta,  
uel testa interiorum, tam exteriores, quàm interiores.

*De insectis, eorumq; uarietatibus, & natura.*

*Caput VII*



Vnc de insectis pari ratione tractandum est. Continet genus uel *species*  
plures: quarū nonnullis, quamuis cognatis, nomen nullū commune  
est inditū, ut apī, crabroni, uespæ, cæterisq; generis eiusdē. Item quibus  
pennæ uagina inclusæ continentur, ut gallerucæ, fulloni, pilulario, &  
reliquis generibus eiusdem. Omnium ergo partes cōmunes tres illas haberi constat,  
caput, aluum, & quod inter hæc sitū est: quale in cæteris pectus, dorsumq; habetur,  
unum, id quod interiacet, magna ex parte est. Quæ tamen sunt longa & multipe-

da, ijs ferē totidem sunt quæ interiarent, quot incisuræ. Insecta diuulsa etiā uiuere possunt omnia, exceptis ijs, quæ uel admodū frigeāt, uel præ sua exiguitate quamprimū refrigerētur. Nam uespis quoq; diuulsis, nō deest uiuacitas. Viuit ergo cum pectore, tum caput, tum etiam aluus: at sine eo caput auulsum uiuere non potest. Diutius ea uiuunt diuulsa, quibus corpus longū, pedesq; multi, & pars quæ abscisa est, in utrumq; se mouet extremū. nam & caput uersus ingreditur, & in caudam: ut in ijs, quas uocat centipedas, moueri uidemus. Oculi in omnibus patent: sed nulla ex cæteris partibus sensorijs manifesta est, præterquam lingua in nōnullis, quæ uel testa intectis omnibus data est, qua & gustant, & cibū attrahūt. hæc alijs mollis, infirmaq; est: alijs dura, & ualida, ut purpuris, tabanis, asilis, atq; alijs plurimis. Omnia enim quibus nō in aluo aculeus est, linguā eiusmodi ueluti arma gerūt. nec dentes habent quibus iunctū id est, exceptis quibusdā paucis. Nam & muscæ eo ipso pertingentes, cruorē mouent, & culices eodē acrius pungunt. Habēt aculeos item pleuraq; insectorum, uel intrus cōditos, ut apes, & uespæ: uel extra prominentes, ut scorpio: qui etiā unus inter insecta longo spiculo armatur. is brachia quinq; bisulcis dentata forcipibus habet, atq; etiā bestiola, quæ in libris similis scorpionis creatur. Quæ autē in eo genere uolucrū fortuntur naturam, ijs præter cætera membra pennæ adnexæ, alijs binæ, ut muscis, alijs quaternæ, ut apibus. nullis binæ, quibus in aluo aculeus. Item ex uolucris ipsis, alia pennas crusta superueniēte, quasi uagina inclusas gerunt, ut scarabei: alia detectas habent, ut apes. nullis uolatus regitur gubernaculo caudæ. & penna ipsa nullo caule constat, nulla scissura discernitur. Ad hæc, antennæ nonnullis ante oculos prætendūtur, ut papilionī, & fullonī. Quæ uero ex ijs salūt, hæc uel crura posteriora habēt longiora, uel gubernaculis quibusdā saltui accommodatis fulciūtur retrō curuatis, ut crura quadrupedū. Omnibus partes corporis pronæ differūt a supinis, sicut uel in cæteris animantibus est. Quod autem pro carne in ijs habet, id nec testā imitatur: neq; quod in testaceis genus carnis continetur, sed mediā quandā inter hæc refert naturam: quamobrē his nō spina, nō os, non aliquid sepio simile, nō testā ambientē natura dedit: ipsum enim corpus se sua durtia tueri potest, & seruare: nec est quod aliunde muniri desideret. Certe omnia circumdātur, sed admodū tenui. Partes insectorū exteriores has esse, atq; in hūc modum se habere cōstat. Intra sinū ab ore intestinū pluribus directū, ac simplex usq; ad exitum fertur: paucis id est replicatū. Viscus nullū in ijs, nullū pingue, sicut neq; in cæteris, quæ sanguine carēt. Ventrem etiā nonnulla habere aduertimus, a quo reliquum intestinū uel simplex, uel replicatū proficiat, ut locustas. Cicada inter hæc, & omnino in animalī genere una ore caret. prolixum quiddā compactum, indiuit sumq; gerit, simile ei quod linguæ speciem refert, in ijs quibus aculeus in ore: eoq; ipso rore haurit, alimentū unū & peculiare. Excrementū cicadis nullū in aluo reperitur. Plura earū sunt genera, quæ magnitudinis modo differūt: atq; etiā quod alijs corpus sub transuerso septo præcinctū distinguitur, membranamq; liquidō refert: ut ijs quas ab argutiolo sono, acheras appellant: alijs nō ita est, ut cicadastris. Sunt uel in mari nōnulla animalia effigie insolenti, & sui generis: quæ quoniā rara inuentu sint, cōstitui in genus nō decet. iam enim piscatores uidisse se retulerūt quædā trabunculis proxima, pullo colore, tereti figura, pari ex toto crassamento. Item alia scutorū effigie, colore rubro, pinnulis crebris. Ad hæc alia, quæ genitale niri imitent, tum specie, tum magnitudine, sed pennis subnexis binis loco testī, eiq; ueratile nomen inditum est. exceptumq; est aliquādo genus tale hamorum frequētia usitata. Partes animalīū omniū interiores exterioresq; generatim, tum propriæ tum communes, ita se habent.



*Quibus animalibus insit sentiendi uis.*

*Caput VIII*



Vnc de sensibus differendum est. Non enim pariter in omnibus uis inest sentiendi: sed alijs sensus omnes, alijs pauciores dedit natura. Sunt sanè sensus qui plurimi habeantur, & supra quos nullum adesse alium generis sui nouerimus, numero quinque: uisus, auditus, olfactus, gustus, tactus. Homo igitur, & quaecumq; terrestrium animal generant, atque etiam quæ & sanguinem habent, & animal pariunt, omnia hos omnes habere sensus uidemus, nisi quid læsum, laceffitumq; sit: quale genus talparum, cui uisus deest. Non enim oculos in aperto id habet: cute tamen detracta, quæ crassiuscula obtenta sedem luminum opacat, oculi intus laceffiti imperfectiq; uisuntur, sed ita, ut partes easdem habeant omnes, quibus oculi integri constant. Habent enim nigricantem illum orbiculum, & quod intra eum cōtinetur, quam uocant pupillam, atq; etiam portionis albidæ ambitionem: sed non tam liquidò, quàm oculi conspecti & eminentes, nec in partem exteriorē apparere hæc possunt, propter cutis obductæ corpulentiam, utpote cum natura inter generādum lædatur, atq; ita opus inchoatum relinquatur. pertinent enim à cerebro, qua cum nervo coniungitur, meatus duo neruosi ualidi ad ipsas oculorum sedes, qui in dentes superiores finiunt. Cætera igitur, & colores & sonos sentiunt, atque etiam odores, saporesq;. Quintum autē sensum, quem tactum appellamus, omnia habent animalium genera. Ergo in nonnullis uel ipsæ sensoriæ partes latissime patent, ac præcipue uidendi. Nam uisui sedes certa descriptaq; est, atq; etiam auditui: cum alijs auriculæ promineant, alijs foramina pateant meatus audiendi. Olfactus item pari modo constitutū est diuersorium. Nam auium generi foramina tantū sunt odorandi, cum alijs permultis nares etiam habeantur. Similis & linguæ partis saporum percipiendorum ministræ ratio est. Aquatiliū tamen generi quos pisces uocamus, data quidem est lingua, sed imperfecta, incertaq;: ossæ enim, nec absoluta. Sed palatum nonnullis carnosum pro lingua est, uelut inter fluuiales cyprino, ita ut nisi diligenter inspexeris, lingua id esse uideatur. Pisces autē sensum gustus habere constat, eo quod multi suis quibusdam saporibus gaudent, & escam in primis ex pisce amia expectunt, & piscium pingue, ut qui gustatu eiusmodi delectentur, uoluptatemq; ex eo genere esculenti capiant. Auditus uero, olfactus uel nullum cōtinent membrum manifestum. Quod enim tale uideri potest per loca narium, id non ad cerebrum usq; transmeat, sed partim obseptum & cæcum mox desinit, partim ad branchias fertur. Audire tamen, atque olfacere pisces palam est. sonos enim immodicos, ut triremium remigia, fugere uisuntur. Itaque sit, ut facile intra sua stabula capiantur. Nam etsi externus strepitus paruus est, ijs tamen qui demersum in humore suum auditum habent, æque omnibus ingens, molestus, grauisq; occurrit, quod certe uel in delphinorum captura euenit. Cum enim piscatores repente alueis uniuersum circundederint gregem delphinorum, inde obstrepentes in mare, efficiunt ut territi erumpant uniuersi in littora, capianturq; tentato grauatoq; capite, præ strepitus insiliti nimietate. quam ne in delphinis quidem pars ulla est manifesta, quæ sensum ministrat audienti. Ad hæc, inter piscandum quammaxime cauent, ne uel remo, uel rebus moueant strepitum: sed cum aliquo in loco gregatim pisces stabulari intellexerint, certo interuallo coniectantes retia dimittunt, ut neque remo, neque impetu cymbæ strepitus ad locum deueniat piscium: & omnibus præcipitur nautis silentio quammaximo nauigent, dum gregem circundant. Nonnunquam ubi aggregare pisces placuerit, idem faciūt quod in delphinorum captura: obstrepunt enim iactis lapidibus, ut deterriti in arcibus coeant, atque ita uniuersi irretiantur: & antequam circumue-

niant, omnem, ut modo dixi, strepitum uerant. At cum circumdatum iam est, claudendum, obstrependumque iubent: strepitum enim tumultumque sentientes perterriti compelluntur, interrumpuntque incauti. Item ubi piscatores e longinquo pisces agminatum pascentes, ac per tranquilli sereni que maris summa oberrantes aspexere, libuitque magnitudinem generis cognoscere, si silentio sensimque accesserint, latent, supernatantesque adhuc comperiunt. At si quem priusquam occuparint strepitum citarint, fugam inde plane arripere uidentur. Addo etiam pisciculos fluuiatiles cottos nomine, qui sub saxis stabulantur. Capiuntur enim a nonnullis saxo percusso, sub quo latent: protinus enim inde exturbantur, ut qui audiant, & caput per strepitum tententur. Pisces igitur audire ipsi ac alijs eiusmodi documentis constat. Sunt autem qui uel maxime animalium pisces auditu ualere arbitrentur, uidelicet hominum experimento, qui assidue in mari uersantur, remque piscatoriam percallent. Sunt uero qui liquidius inter pisces audiant, mugilis, chromis, lupus, salpa, & reliqui id genus. Cetera piscium genera minus audiunt: quamobrem minus gurgitibus uersari potius solent. Olfactus quoque similis intelligitur ratio: escam enim non recentem attingere pars plurima piscium recusat. nec eisdem escarum generibus omnes capiuntur, sed uarijs, scilicet sui agnitione odoris: quippe cum uel fœtida nonnullis accommodetur, ut salpæ stercus. Complures item piscium in speluncis latentes, quoties euocare captum piscator uoluit, fauces specus odoribus illinunt cerarijs, itaque protinus excitant. Anguillam item hoc eodem capi modo palam est. Vas enim falfamentarium ponit obstaculo in eius os indito, quod colum uocant. Nidores denique potius genera quaque piscium appetunt: unde etiam carunculas sepiarum deustas, odoris gratia escam hamis affigunt. ita enim fit, ut pisces audius accedant. Polypos etiam affatos, non nisi nidoris causa nassis inditos dimitti affuerant. Quinetiam fluta quoties uel piscium lotura, uel naui sentina eiecta est, fugiunt, ut odorem sentientes. Sanguinem quoque suum sagaciter pisces odorari dicuntur. quæ res eo parer argumento, quod quoties sanguis effusus piscium est, fugiunt, & loca petunt longinqua. Omnino ut esca putrida nassis infecta, nunquam subire, aut appropinquare patiuntur: sic recente nidorulentaque, protinus uel e longinquo festinantes irrumpunt. Constat hæc eadem in delphinorum genere latius, cum enim nullam partem auditui deputatam aperte delphini habent, tamen capiuntur per strepitum capite aggrauato, ut dictum iam est. Et cum olfactus quoque partem nullam sensoriam habeant manifestam, tamen sagaciter odorantur. His igitur in animalibus sensus inesse omnes, apertum iam est. Reliquis animantium ordo, qui quadripartito diuiditur, hoc est molli, crustato, testato, infecto, quemadmodum se habeat uideamus. Ergo mollia, & quæ uel crusta uel testa operiuntur, atque etiam infecta, sensibus prædita esse omnibus constat: nam & uisu, & olfactu, & gustu. Infecta enim tam pennata, quam non pennata procul sentiunt, ut mel apes, & culices dicti muliones: quod nisi odore agnoscerent, nunquam e longinquo sentirent. Sulfuris item odore genera insectorum multa intereunt. Ad hæc formicæ, origani sulfurisque puluisculo insperso, suas relinquunt cauernas, alioque migrant. Cornus præterea ceruini, factio incensu, plurima insectorum pars fugiunt: sed præcipue styracis suffitu. Iam sepiæ, polypi, gammari, odore escarum allectati capiuntur: & polypi quidem ita adhæserunt, ut auelli inde non possunt, sed truncari potius patiuntur. At uero pulicaria herba admoda, protinus ab odore eius resiliere dicuntur. Gustus etiam similis ratio: interdum enim cibum persequuntur diuersum, nec eisdem saporibus omnia delectantur. Nam apes nullam ad rem putidam solent aduolare, sed dulcia petunt, culices nulla dulcia gessiunt, sed acida. Tactu uero sentire

(quod

(quod etiam ante dixi) omnibus datum animantibus est. Quæ autē siliceo tegmine operiuntur, olfactum gustumq; habere constāt, argumento escarū. purpuris enim escas putidas purpurarij emoluntur, & accedunt ipsæ ad eiusmodi escam à longe, utpote odorantes. Sensus item saporū ijs inesse, eisdem illis rationibus patet. sapore enim rerum earundem quæq; delectantur, ad quas ueniūt odoribus inuitata, quos gratos senserunt & discreuerunt. Adde quod quæcunq; os obtinent, ijs & uoluptas per saporum attractionem euenit, & dolor. De uisu & auditu quanquam nihil certi, manifestiq; habemus: ungues tamen ad strepitum se subtrahere, inferiusq; subsidere cernuntur, quoties ferramentū sentiunt admoueri. exiguo namq; extant; reliquo autem toto corpore perinde ac in cubili occultuntur. Pectines quoq; admo-  
 10 to digito dehiscunt, mox comprimūt se ut cernentes. Natice item qui capiunt non aduerso flatu, sed secundo adeunt, quoties esca persequuntur: nec uoce ulla, sed silentio agunt, utpote cum & olfaciant, & audiant, nec fieri posse aiunt, quin subterfugiant, si uox proferatur. Echinus inter testacea genera, quibus facultas ingrediendi est: uertibula, glandesq; inter immobilia eiusdem generis olfactum minime habere uidentur. Sensus ad hunc modum animalium generi natura diu-  
 fauit & tribuit.

*Quæ animalia uocem, quæ sonum, quæ murmur edant, quæ item loquantur.*

## Caput IX

20 **M**ox quemadmodum uox se habeat, differemus. Differt proculdubio uox à sono, & tertia his adnumeranda res est locutio. Gutturē parte una uox agitur: quocirca quibus pulmo deest, ijs nulla uocis emittenda facultas est. Locutio nō nisi uocis per linguam explanatio est. Vocales igitur literæ à uoce & gutture: consonantes lingua, & labris proferruntur: quibus literis omnē locutionem confici nulli dubium est. Quamobrem quibus animantium lingua libera absolutaq; nō est, ea neq; uocem emittunt, neq; sermocinātur: at sonus elidi uel alijs partibus potest. Ergo insectis animalibus, neq; uocis, neq; locutionis ulla facultas: sonusq; ijs spiritu interiore mouetur, non ex-  
 30 riore. Nullum enim ex ijs spirat, sed alia murmur ædunt, ut apes: alia canere dicuntur, ut cicadæ. omnia uero in eo genere membrana, septo transuerso subdita, qua præcinctum corpus distinguitur, sonāt: ut genus cicadarum attritu spiritus. Muscæ etiam, apes & reliqua ijs similia, cum uolant, sese attollūt & cōtrahunt. Sonus enim attritus interioris spiritus est. Locustæ suis gubernaculis atterētes sonāt, nullū mole, nullū crustatum, uel uocem uel sonū aliquē mittit naturalē. Pisces uocis quidem experti sunt: quippe qui neq; pulmōē, neq; arteriā, aut guttur obtineant: sed sonos quosdam, stridoresq; mouent, qui uocales esse existimātur, ut lyra, ut chromis. his enim quasi grunnitus quidā emittitur. Aper etiā piscis, quem amnis Acheolus gignit, uocalis habitus est, & erica, & cuculus. alter enim quodāmodo stridet, alter  
 40 perinde ut cuculus aus obstrepat, unde nomen accepit. Quæ omnia creditā illam uocem emittunt, aut attritu branchiarum, quas horridiusculas continent: aut suis interioribus, quæ circa uentrē habētur. spiritus enim inclusus in his est, quem dum atterunt atq; agitant, sonos illos elidunt. Necnon cartilaginei generis nonnulla stridere uidentur: uerum ab his uocem emitti ulla, recte dici non potest. at sonum, siue strepitum reddi uerius dixeris. Nam & pectines quoties per summa humoris nitibundi feruntur, quod uolitare dicunt, stridere sentiuntur: atque etiam marinæ hirundines, quæ sublimes uolitant, haudquaquam mare attingentes. sunt enim his pennæ latæ & longæ. Vt igitur per uolarum auium strepitus, quem alæ excutunt, nulla uox est: ita nec eiusmodi sonorū aliquis uox iure appelletur. Delphinus item stridet ac mutit, efferens se in aërem: sed non quemadmodū ea, quæ superius

enumeravi, hic enim & pulmonem & arteriam habet, proindeq; nōnihil uocis potest promouere. lingua tamen libera absolutaq; caret, & labris, quibus uocis aliquē possit articulum afformare. At uero quæ & linguam habent & pulmonem, si quadrupedes aut omnino pedestres ouiparæ sunt, uocem quidem emittūt, sed exilem. & alia longum sibilum ædunt, ut serpētes; alia abruptum & perexiguū, ut testudines: alia uocē exilem atq; imbecilem. Rana lingua sui generis est, pars enim prima, quæ cæteris absoluta est, ijs coheret, modo quo tota ferē piscium, intima uero absoluta ad guttur applicatur, qua suam uocem solent emittere. Et quidem genus illud ululatus, quam ololyginem nominant, mares intra aquam reddunt, ut cieant ad coitum foeminas. Sunt enim singulis animalium uoces propriæ ad initum & uenereum coitum, ut & suis, & capris, & ouibus. Reddunt rana suā ololyginem illam, maxillæ inferioris labro demisso pari libra, cum aqua modice recepta in fauces, superioreq; intenta. Flagrant tantisper oculi modo lucernæ, cum sinus buccarum maxillis distētis interluceat. Coitum enim noctu magna ex parte agere uisuntur. Genus autem uocem mittere potest: ijsq; præcipue facultas conficiendæ locutionis, quibus lingua mediocriter lata, uel tenuis. Mares ac foeminæ partim uocem reddunt eandem, partim diuersam. Garrulæ linguacioresq; sunt autem minores: & circa coitum maxime talem effici unamquaq; autem moris est. Alijs in pugna uox, ut coturnicibus: alijs ante pugnam, ut perdicibus, dum suos aduersarios prouocant: alijs cum uicere, ut gallinacis. Canunt item nonnulli mares perinde ut suæ foeminæ, sicut in lusciniarum genere patet. Foemina tamen cessat cantu, cum incubat, pullosq; educat. Sed in nonnullis generibus cantus maribus tantū datus est, ut gallinacis, ut coturnicibus. Quadrupedum autem genus, quod animal procreat, uocem uarie mittit; nec est quod loqui possit, sed proprium id hominis est. Quibus enim locutio, ijs etiam uox. At quibus uox, nō ijs omnibus & locutio est. Qui surdi iam inde ab ortu naturæ sunt, ijsdem etiā muti, uocem ergo emittere possunt, locutionem autem nullam. Pueri ut cætera sua membra cōtinere ac regere nequeunt, sic etiam linguæ sunt impotentes, & quidem imperfecti, & serius lingua absoluntur, itaq; magna ex parte balbutiunt, tortiq; lingua sunt. Differūt tum uoces, tum etiam locutiones, trāctus ratione & regionis. Vox igitur acumine grauitateq; maxime notescit: nec species discrepāt generis eiusdem. At uox explanata, quam esse quasi locutionem uel brutorum dixeris, differt & cæterorū animalium, & eorum quæ genere eodem continentur loci ratione, uerbi gratia: Perdicum alij caccabant, alij strident. Et auicularum nonnullæ haud uocem eandem mittunt, quam sui parentes, si prærepta paterna caruerint educatione, moribusq; & cātibus cæterarum autem insueuerint. Iam uero lusciniā modulos suos pullos docere, uersusq; quos imitarentur tradere uisa est: utpote cum non perinde locutio ut uox per naturam proueniret, sed acquiri posset per disciplinam & studium. unde homines quoq; locutione utuntur uaria, cum uocem omnes reddant eandem. Elephantus citra nares ore ipso uocem elidit spirabūdā, quemadmodū cum homo simul & spiritum reddit, & loquitur. At per nares simile tubarum rauicātū sonat.

De somno & uigilia animalium, multa; præter hominē animalia somnare.

Caput X



E somno & uigilia animantium, nulla quæstionis obscuritas est. Nam omnia pedestria, & prædita sanguine, dormire ac uigilare sensu ipso percipiuntur. Quibus enim palpebræ adiunctæ sunt, conuiuendo obdormiscunt. Item somnare nō solum homines, sed etiam equos, & canes, & boues passim est: atq; etiā oues, & capras: deniq; genus omne quadrupedum, idemq; animalis foecundum. Declarant id canes suo latratu, quem per

per quietem agunt. quanq̃ de ijs quæ oua pariunt, incertum hoc est. Sed dormire ea, item certum. A quatiliū quoq̃ somnus apparet, ut piscium mollium, & crusta opertorum, locustarum inquam, & ceterorum generis eiusdem. Sunt autem isthec omnia somno exiguo contenta: dormire tamen uidentur. Argumentum uero quamuis nullum deduci ab oculis potest, quia palpebris carent: ipsa tamen quiete cernuntur placida seu soporata. Pisces enim uel manu facile caperentur, dum dormiunt, nisi pediculis & pulicibus appellatis sollicitarentur. Nunc uero si somno dati immorentur, noctu ab innumera multitudine illarum bestiolarum occupati absūmuntur. Gignuntur hæc in profundo maris tanta fecunditate, ut etiam escam de pisce emolitam, si diu in uno manserint, totam corrodant atq̃ absument. & quidem sæpenumero piscator escam demissam glomeratis undiq̃ his bestiolis, perinde ut pilam recipit. Sedenim pisces dormire argumentis potius huiusmodi arbitrari licet. Sæpius enim piscator adorsus pisces usq̃ adeo latet, ut possit etiam manu tollere, aut certe fuscina nullo indice sensu ferire. Quiescunt tantisper ex toto: neq̃ parte alia, quam cauda leuiter mouentur. Constat hoc idem uel ipso impetu quem faciunt, si dum quiescunt, motum aliquid fuerit. expauescentes enim uelut somno exturbati feruntur. Quinetiam in petris stabulantes capiuntur, uidelicet propter somnum. & sæpe thunnarij circumretiunt thunnos dormientes, quod argumento constat, quia admodum quiescentes, leuiterq̃ pendentes albida oculorum capiuntur. noctu potius quam interdiu dormiunt, ita sopiti, ut ne iacta quidem fuscina moueantur. & magna ex parte uel ad arenam, uel ad terram, uel ad lapidem aliquem procumbentes quiescunt imis gurgitibus, uel sub saxo, aut littore abditū. Plani autem piscium arena sese occultant. deprehendunt situ ipsius arenæ, tollunturq̃ fuscina percussī. Lupi quoq̃, & auratæ, & mugiles, & id genus alij, fuscina interdiu sæpenumero dormientes capiuntur: alioquin ex ijs nullus fuscina posse capi existimatur. Cartilaginea uero ita interdum dormiunt, ut uel manu tollantur. Nam delphini, balenæ, & quæcunq̃ fistulam gerunt, ædita per summa æquoris fistula, dormiunt: quæ etiam spirant, pinnas suas mouendo leuiter. Iam delphinum stertentem etiam nonnulli audire. Mollia quoq̃ ad morem similem dormiunt, ut pisces, nec secus quæ crusta operiuntur. Insecta etiam animalium dormire argumentū, quod requiem capiunt, motuq̃ omni proculdubio cessant, quod præcipue patet in apibus: quiescunt enim noctu, & conticescunt, ut nullus omnino bombus sentiat. Constat hoc idem uel argumento eorum, quæ maxime in conspectu nostro, & intra nostros parietes uersantur. Non enim modo quia clare non uideant, idcirco noctu quiescunt (nam omnia quibus oculi duri, exiliter uident) sed etiam ad lucernarum lucem nihilominus quiescere uidentur. Homo maxime animalium somniat. Aeditis nuper in lucem, & infantibus adhuc nullum penitus contrahitur somnium: sed plurimis anno circiter quarto aut quinto ætatis uisa incipiunt. Produntur tamen & uiri & mulieres, qui nunq̃ quicquam somniarint. quorum nonnullis in processu ætatis accidit, ut uiso somnio mutarentur habitu sui corporis, uel in mortem, uel in morbum.

De sensu, de uigilia, de somno, res ita se habet.

De sexu masculino foemineoq̃, eorumq̃ in animantibus differentijs.

Caput XI



Exus autem masculinus foemininusq̃, non in omnibus animantibus est. Sunt enim quibus id desit, ac similitudine quadam & parere dicantur, & ferre uterum. Sexus ergo discrimen in animalibus quæ uitam stabilem uiuunt, aut omnino in ijs quæ resta integuntur, nullum omnino est. At in mollibus & crusta opertis mas habetur, & foemina. In pedestribus quoq̃ tum bipedibus, tum quadrupedibus, sexus uterq̃ est: atq̃ etiam in

ijs quæ animal per coitum generant, aut ouum, aut uermem. Cæteris igitur in ge-  
 neribus simplici rationis modo, aut est, aut deest: uerbi causa, ut in quadrupedibus  
 omnibus, alterum mas, alterum fœmina est: sic in testa opertis, sexus deest discriminẽ.  
 sed quemadmodum in genere stirpium, aliæ fructum ferunt, aliæ sterilem sortiun-  
 tur naturam: ita etiam in ijs est. At uero in genere insectorum, & piscium, sunt quæ  
 omnino sexus hoc discrimen alterutram in partem non habeant. nam anguilla ne-  
 que mas, neq; fœmina est: neq; prolem ex se aliquam potest procreare: sed qui eam  
 capillamentis & lumbricis quædam similia interdum adnexa sibi gerentem uidisse  
 aiunt, inconsiderate id asserunt, anteq; aduertant, qua parte illa gerantur. Neq; em̃  
 aliquid eiusmodi est, quod animal creet, nisi prius generarit ouum, quod in nulla an-  
 guilla uisum est. Et quæ animal gignunt, suo in utero fœtum continent, non in uen-  
 triculo. Ita enim non secus, quàm cibus concoquerentur primordia genitura. Quã  
 autem differentiam maris & fœminæ anguillæ notarunt, scilicet alteram caput ha-  
 bere amplius atq; oblongius: alteram, hoc est fœminam, repandius: hæc non maris,  
 ac fœminæ differentia est, sed generis. Sunt enim piscium nonnulli epitrageæ, ab  
 hirci sterilitate appellati: quo in genere carini & balagri ex amnicis annotantur, qui  
 nec ouum nec semen ullum prolificum unquam habeant, sed qui solidiores pingui-  
 oresq; in eo genere sunt, ijs intestinum paruum est, & laus præcipua in pastu. Ad  
 hæc, in testaceis atq; in stirpibus, quod pariat & generet, est: quod autem maris fun-  
 gatur officio, deest. Sic etiam inter pisces genus passerum est, & rubellionum, & hia-  
 rularum: oua enim in ijs omnibus reperiuntur. Sed in pedestribus sanguineis non  
 ouiparis, maxima ex parte maiores longiorisq; uitæ sunt mares quàm fœminæ: præ-  
 terquam in genere mullorum: eius enim fœminæ & maiores sunt & uiuaciores,  
 quàm mares. At in ijs quæ aut ouum pariunt, aut uermem, ut piscibus atque inse-  
 ctis, fœminæ maiores suis maribus euadunt: ut serpentes, phalangia, stelliones, ran-  
 næ, & inter pisces pusilli cartilaginei generis, & pars plurima gregalium, & genus  
 omne faxatile. Fœminas autem piscium maribus esse uiuaciores constat, eo quod  
 fœminæ uetustiores quàm mares capiuntur. Partes superiores prioresq; in quo-  
 cunque animalium genere, maribus sunt potiores, ualidiores, & aptiores. Quæ au-  
 tem dici possunt inferiores, posterioresq; eas fœminæ habent robustiores, tum in  
 hominibus, tum in cæteris animalibus omnibus, quæ pedestria sunt, atque animal  
 generant. Quod tamen omnino dixerim, fœmina innერიორ atque infirmior est, pi-  
 lum etiam habet tenuiorem, quàm mas: aut quod uice pili ad proportionem ha-  
 beri natura statuerat. Caro quoque humidior est fœminæ quàm maris, & genua  
 planiora, & crura tenuiora: sed pedes elegantiores, uidelicet quocunque in genere  
 hæ partes habentur. Vox item fœminis omnibus tenuior & acutior, boue excepto.  
 bubus etenim fœminis uox grauior, quàm maribus est. Partes autem quas uelut ar-  
 ma natura animalibus dedit, ut dentes, cornua, calcaria, & cætera generis eiusdem,  
 eas certe in nonnullis generibus omnino ut mares habent, sic fœminæ non habent.  
 uelut generis ceruini, fœmina cornuum inops, mutila est: & auium nonnullarũ,  
 quibus data calcaria sunt, fœminæ omnino ijs carent. pari modo, ut fœ-  
 minæ dentibus uacant exertis. At in nonnullis generibus  
 sunt quidem hæc sexui utrique, sed maribus potio-  
 ra: ut cornua tauris robustiora, q̃ uaccis.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE 63  
HISTORIA ANIMALIVM LIBER QVINTVS,  
INTERPRETE THEODORO.

*Omnium animantium generis partitio.*

*Caput I*



10 **X** P O S V I partes animalium omnium, tum interiores, tum  
extiores: atq; etiā de sensibus, de uoce, de somno, & quæ foe  
minæ mares ue sint, satis iam explicasse existimo. Restat ut eo  
rundem generationes persequamur: exoriscq; item à primis, or  
dine apto & commodo differamus. Sunt porro generationes  
animalium multæ ac uariæ: partim dissimiles, partum quodam  
modo similes. Sed cum genera antè, ut res exigit, digesserimus,  
nunc quoq; eodem modo tractare tentemus, præterquam quod initium tunc ab  
homine, cum de partibus ageremus, sumēdum censuimus. Nunc de eo nouissime  
differere placet, quoniam plurima ipse de se afferat explicāda. Ergo ordiendum ab  
ijs est, quæ testa integuntur; mox de ijs, quæ crusta ambit, agendum. & reliqua de  
inceps ad hunc modum exponenda sunt, hoc est, mollia & insecta. deinde piscium  
genus duplex, ouiparum dico, atq; uiuiparum, tum auium genus. ad postremū de  
pedestri dicendum est: quo in genere quæ animal generent, quæ oua pariant, præ  
20 terminanda non sunt. Euenit ut commune animalia cum stirpibus habeant, quod  
alia semine, alia sponte naturæ oriuntur. ut enim stirpes, aut semine stirpiū aliarum  
proueniunt, aut sponte erumpunt, primordio quodā contractio ad ortum idoneo:  
quarum aliæ ex terra alimentum sibi hauriunt, aliæ in stirpibus alijs & nasci, & au  
geri solent, ut in libris de stirpibus siue plantis exposuimus: sic animalia nasci alia ex  
animalibus solent per formæ cognationem, alia sponte, nullo cognationis semine  
anteccedente creantur. quorum alia humo, aut stirpe putrescente consistunt, ut  
complura insecta generantur: alia in animalibus ipsis excrementisq; partium gi  
gnuntur. Quæ igitur nisi sui cognati semine nunquam procreentur, ijs omnibus  
ortus per coitum est, dummodo sexus discrimen id habeant, quod marem ac foemi  
30 nam describere potest. Nam in piscium genere, nonnulla nec mares nec foemi  
næ gignuntur: quæ licet genus idem cum alijs sortiantur, tamen specie differunt.  
Quædam etiam sui generis omnino consistunt. Nec desunt quæ mare uidua, sexu  
uno foemineo formentur: quæ perinde ut aues pariunt, quæ uento oua concipi  
unt: quibus ab argumento conceptus nomine hypenemīa, quasi subuentanea  
inditum est. Verum ea quæ aues concipiunt, omnia sunt infœcunda. Ita enim eo  
rum natura nihil ultra ouum creare potest, nisi quo alio modo maris opera contin  
gat. Sed de his diligentius post differemus. Piscium uero nonnullis cum sponte  
na ædiderint oua, euenit ut ex ijs animal progeneretur. Sed alia ex se ipsa id faci  
unt, alia non sine opera maris: ut de his quoque sequenti disputatione commen  
40 tabimur plantis. simile enim ferè, & in genere auium existit. Quæ autem per se,  
uel in animali, uel in terra, uel in stirpe, uel etiam in eorum ipsorum partibus crean  
tur, eademq; maris ac foeminæ sexu distincta sunt, ijs coëuntibus gignitur quidem  
aliquid, sed ex quo nihil amplius gigni possit: uerbi gratia, coitu pediculorum, len  
des dictæ procreantur: muscarum, uermiculi, pulicum, genus uermiculorum oui  
speciem referens, ex quibus nec ea quæ generarint proueniunt, nec aliud ullum  
animal, sed id quod sunt, sordes tantum persistunt. Primum igitur de ijs quæ so  
lent coire dicendum est: mox de cæteris ex ordine, quæ uel singulatim, uel ex com  
muni accidunt ratione, exponemus.



Oitus nec similes omniū sunt, nec similem in modum aguntur. Quæ enim ex sanguineis pedestria uiuipara sunt, eorum omnibus masculis datum quidem est membrum ad officium generationis aptum. Verum non omnia simili modo coniunguntur: sed quæ retro urinam mittunt, auersa coeunt, ut leones, lepores, lynces, leporum etiam foemina sæpenumero marem prior superuenit. Cæterorum magna ex parte modus coeundi idem est. plurimæ enim quadrupedes more coeunt iusto, foeminam scilicet mare supergrediente. Genus quoque auium omne eodem illo ac simplici more coniungitur. Differentias autem uel in auius has annotamus, ut alia foemina confidente humi, mare superueniente coeant, ut gallinæ: alia non confidente foemina, sed stante, ut grues. & quæ ita coeunt, rem quamcelerrime peragunt: mas enim supersiliens citò, ut passeris, perficit. Quadrupedum ursæ demissis cruribus, quemadmodum cætera, quæ pedibus innitendo exercent uenerem, admodum parte maris supina, ad dorsum foeminæ coeunt. Herinaceis coitus erectis partibus, supinis hærentibus sibi aduersis. Inter ea, quæ animal generant, augenturq; magnitudine insigni, nec ceruæ mares suos patiuntur, nisi raro: nec uaccæ tauros, propter rigorem genitalis, nimiamq; tentiginem, sed clunibus subsiditibus semen recipiunt genitale. sic in ceruis mansuetis fieri uisum est. Lupi eodem coeunt modo, quo canes. Feles non parte posteriore se iungunt, sed mas stat, foemina subiacet. Sunt porro in eo genere foeminæ ipsæ natura libidinosæ & salaces: itaque mares ad coitum ipsæ frequentes alliciunt, inuitant, cogunt: puniunt etiam nisi pareant. Cameli sedente foemina coeunt, nec auersi, sed complectente mare, ut cæteræ quadrupedes agunt, & coitum toto die exercent, petunt recessuum solitudines cum liber coire, nec aliquis eò potest tutò accedere, præterquam pastor armenti. Genitale camelis neruo ita constat, ut uel ex eo confici possit, quo arcus fidissime intendatur. Elephantum etiam solitudines petunt coituri: sed præcipue secus flumina, & quæ pasci consueuerunt. Subsidit foemina, clunibusq; submissis insistit pedibus, ac innititur. Mas superueniens comprimit, atq; ita munere uenero fungitur. Vituli marini modo animalium retrò mingentium coeunt, & diu ligati in coitu cohærent, ut canes, genitale ijs maribus grande est.



Vinetiam pedestrium quadrupedes, quæ oua pariunt, eodem coeunt modo, quo ea quæ animal generant, mare superueniente: ut testudo tam aquatilis quàm terrestris. habent uero in quod meatus contingant, & quod per coitum adhæreant, ut rana & pastinaca, & reliqua generis eiusdem.



Væ autem pedibus carent, & longo sunt corpore, ut serpentes, ut murænæ, ijs coitus circumplexu mutuo supinarum partium agitur. & quidem serpentes ita circumuolutæ sibi ipsæ cohærēt, ut unius serpentis bicipitis corpus totum esse uideatur. Hoc eodem modo lacertarum etiam genus complexu simili coit.



## De coitu piscium.

## Caput V



Pisces omnes exceptis planis cartilaginei generis, admotis inuicem  
 paribus supinis copulantur. Plani autem eius generis, iidemq; ha-  
 bentes caudam, ut rata, pastinaca, & reliqua huiusmodi, non solum  
 admotis supinis, sed etiam tergo foeminarū supinis marium superpo-  
 sitis, modo cauda impedimento nullo ob crassitudinem sit, coeunt.  
 At squatina, & quibuscunq; plenior cauda est, his attritu mutuo tantum partium  
 supinarum coitus agitur. Sunt qui se uidisse confirmant nonnulla ex cartilagineis  
 auersa modo canum terrestrium coherere. Foemina in omni cartilagineo gene-  
 re maior quam mas est, quod idem ferè uel in ceteris generibus piscium esse con-  
 stat. Cartilaginea uero præter ea quæ enumerauimus, sunt bos, lamia, aquila, torpe-  
 do, rana, omneq; genus mustelorum. Sed omnia cartilaginea hunc in modū coire  
 apertius notatum à pluribus est: morantur enim in coeundo diutius omnia quæ ani-  
 mal generant, quam quæ oua. Delphinis quoq; omniq; cetario generi hic idem mo-  
 dus est coeundi: planis enim admotis partibus agunt: nec parū multum ue tēporis,  
 sed mediocre in coitu ipso cōsumunt. Differūt nonnulli mares cartilaginei generis  
 à suis foeminis, eo quod maribus bina quædā circa excrementi ostium pender, qui-  
 bus foeminæ careant, ut perspici in genere mustelorum potest: in his enim quod dixi,  
 omnibus est. Testes igitur nec pisces habent, nec ullum aliud genus quod careat pe-  
 nibus: sed binos meatus, tum serpentes, tum etiam pisces masculi continent, qui  
 foetifico semine cum coeundi est tempus, implentur, & lacteum omnes emittunt  
 humorem. Colligunt hi sese in unum caput, quemadmodum in auium genere u-  
 nitur quod subeat. Continent enim aues intus suos testes, ac cetera animalia quæ  
 & pedes habent, & oua pariunt. Hoc ergo inferitur, atq; in locos, & receptaculum  
 tenditur foeminarum. Pedestribus uiuiparis idem meatus foris extat, & seminis, &  
 excrementiij humoris, alter intus meatus ducitur, ut dixi, cum partium differētiis  
 explicarem. Sed quibus uesica deest, ijs idem meatus sicco etiam excremento perti-  
 net foris: intusq; alter iuxta habetur, quæ quidem similiter tam in foeminis eorum,  
 quam in maribus sunt. Carent enim uesica, præter testudines, quarum foeminæ sin-  
 gularem habent meatum, quantq; uesicam obtineant. Sed testudo in eorum, quæ oua  
 pariunt genere est. Piscium oua parientium coitus minus patet: quamobrem com-  
 plures foeminas prolificum maris uorando impleri crediderūt. Id enim fieri sæpius  
 cernitur, nam tempore coitus foeminæ mares sequētes id faciūt, uentremq; eorum  
 suis percutiūt rostris, quo etiam fit, ut mares semen & celerius fundant, & largius.  
 tempore autē partus mares foeminas sequentes, quæ illæ oua adiderint, ipsi mordi-  
 cus uorant: pisces uero ex ijs quæ remaserint, oriuntur. Circa Phoenicem pisces uel  
 mutuo sexuū aspectu capi accepimus. mugiles enim mares à piscatore subducun-  
 tur, quoruū aspectu foeminæ congregantur, atq; ita obretiuntur. uersaq; uice mares  
 capiuntur subductis foeminis. sed deuoratio illa seminis genitalis, quia sæpius cer-  
 nitur, argumentum coitus talis ementitur. Faciunt hoc idem quadrupedes quoq;  
 tempore enim coitus nonnihil humoris suo genitali, tum mares, tum etiam foeminæ  
 emittunt, atq; admotis ad genitalia naribus odorantur. Perdices si aduersæ maribus  
 steterint, uentusq; inde afflet, ubi mares stant, concipiunt, & maritantur. plerunq;  
 etiam uoce marium utero ingrauescūt, si gestiunt, ac libidine turgent, uolaru quoq;  
 superne marium effici idem potest: uidelicet dum mas ipse in foeminā foetificum spi-  
 ritum demittit, ore hiant, exertaq; lingua, & mares & foeminæ coeunt. At uerus  
 piscium ouiparorum coitus raro cernitur, quoniam congressionem quamprimum  
 digressio sequatur, fieri tamen ita eorum coitum uisum est.



Ollia, ut polypi, sepia, lolligines, modo eodem omnia coeunt: oribus enim inuicem admotis, complexuq; mutuo brachiorum libidinem explent. Ergo polypis coitus, cum alter capite uulgo appellato in terram uerso, nitubundoq; explicat porrigitq; sua brachia, alter superuenit, passisq; brachijs singulis ad singula subiacētis acetabulorum conceptu mutuo adhærescit. Marem etiam nonnulli aiunt gerere, quod genitalis speciem referat suo brachio, in quo duo amplissima acetabula habentur. neruo id quasi constare porrectum ad medium usq; brachium confirmant, totumq; nari foeminae annecti. Sepia, ac lolligines ora applicantes, & brachia inter se componentes, nantesq; in aduersum coeunt. narem etiā dictam in narem inferunt. natatus alteri retrorsum, alteri anteuerfus in os agitur. Pariūt ea sui corporis parte, quæ fistula dicitur, qua & coire eas nonnulli arbitrantur.

De coitu piscium crusta opertorum.

Caput VII



Enera crusta operta, ut locustæ, gammari, squillæ, & huiusmodi reliqua, more quadrupedum retro mingentiū coeunt, scilicet, ut foemina caudam supinam exponat, mas suam superponat, & applicet. coire solent ineunte Vere iuxta terram. Iam enim coitus omnium id genus exploratus est, interdum etiā cum ficus maturescunt, coire incipiunt. Hoc eodem modo gammari quoq; & squillæ coeunt. Cancri parte priore copulantur, sua ope: cula loculosa illa, rugosaq; mutua consertione componentes. Primum cancer minor ab auerso superuenire solet, tum maior ubi ille superuenerit, uertit se in latus. Nulla re differt foemina à mare, nisi quod operculum applicat illud amplius, & distantius, & hirsutius foeminae gerant, in quo oua pariunt, & qua egerunt excrementum. membrum autem quod mas in foeminam inferat, nullum omnino habetur.

De coitu insectorum, quo uel tempore ueneris stimulus magis animalia quæq; excitet.

Caput VIII



Insecta auersa coeunt. deinde quod minus est, superuenit maius, hoc est, mas foeminam, nec mas in foeminam genitale ullum inserit membrum more animalium cæterorum: sed foemina sursum in maris receptum, caudæ ultimum suæ meatum quandam præducens reflectit: qui in nonnullis maior quam proportionem totius corporis esse uidetur, cum ipsa parua admodum sint. Sed sunt etiam in quibus minus inconueniens æstimeretur. planum hoc fuerit, si muscas coitu uenero copulatas diuiseris. tardo etiam quæ coiuerint, seiunguntur digressu: diu namq; eorum copulatio durat: quod in ijs quæ in nostro conspectu uersantur, facile patet: uerbi causa, in muscis, in scarabeis. Omnia enim ad hunc modum coeunt, uidelicet muscæ, scarabei, uerticilla, phalangia, & si quid aliud generis eiusdem coire solet. Phalangijs, quæ texunt, coitus agitur hoc modo. cum foemina deductam araneam traxerit, mas eandem mutuo trahit, quod ubi sapius fecerint, coeunt, & auersis clunibus copulantur: nam propter alium orbiculatam modus hic coniungendi ijs congruit. Coitum omnium animalium fieri ad hunc modum apertum est. Tempora autem coitus descripta, & ætates certas ad uenerem singulis animalium natura fixit, & statuit, ergo plurimorum animalium natura uult quidē rem uenerē per id tempus, cum hyemis cessante sæuitia, æstatis clementia oritur: quod sanē tempus ueris est, quo plurima & uolatilia & pedestria & natantia ad coitum excitantur. Sed sunt quæ per autumnum etiam & hyemem

mem coeant, atq; pariant: ut nonnulla cum aquatiliū, tum uolucrum genera. Homini maxime temporibus omnibus oportunus coitus est: atq; etiam plura alia pedestris generis, quæ cum homine uiuunt, coitum nullo tempore aspernantur, uidelicet propter teporem, & pabuli ubertatem. quorum tempus etiam gerendi utri breue est, ut suis, ut canis, & uolucrum quæ sæpius pariunt. Complura etiam educationi suorum partuum consulendo, non nisi commodo tempore coeunt. Stimularur ad uenerem mas hominum magis tempore hyberno, foemina aestiuo. Genus autem auium (ut dictum est) parte plurima Vere, ac ineunte aestate coit, & parit, excepta alcyone, quæ circa brumam parere solita est. quamobrem quoties bruma serena existit, dies alcyonei appellantur, septem ante brumam, & septem à bruma, ut Simonides quoque suo carmine tradidit, ut: Cum per mensem hybernum Iupiter bis septem molitur dies teporis. clementiam hanc temporis nutricem sacram uariæ, & pictæ alcyonis mortales dixerunt. tranquillum uero tantisper tempus efficitur, si ita euenit, ut bruma austrina uergilijs aquilonijs fiat. Septem primis diebus nidum conficere auem hanc fertur, reliquis septem parere, educareq;. Dies alcyoneos fieri circa brumam, non semper nostris locis contingit: at in Siculo mari penè semper id euenit. Parit alcyon circiter quinq; oua.

*Quæ animalia semel, quæ uel pluries in anno pariant.*

Caput IX

**E**rgi, & gauræ saxæ maritimis oua bina, terna uel pariunt: sed gauræ aestate, mergi à bruma ineunte Vere, & incubant cæterarum auium more, sed neutra earum auium conditur. Omnium rarissimum uidisse alcyonem est: ferè enim circa uergiliarum occasum, brumamq; ipsam apparet: & ubi primū per portum non plus quàm nauem circumuolat, statim abit, ut nusquam præterea uideatur. quomodo Stesichorum quoq; eius meminisse notum est. Luscina etiam parit aestate quinq; aut sex oua. conditur ab autumno usq; ad uernos dies. Insecta hyberno quoq; tempore coeunt, & serenis austrinisq; diebus nascuntur ea, quæ se abdere non solent, ut muscæ, formicæ. Semel anno magna pars syluestrium animalium parit, quæ scilicet non, ut lépores, superfoetant. Pilces plurimi etiam semel pariunt: ut ij quos susaneos, ex argumēto cognominant, quia fulsum retibus capiuntur, ut thunni, limariæ, mugiles, spuria, mone-dula, chromes, passeret, & reliqua generis eiusdem, excepto lupo: huic enim soli ex eo genere partus bis anno exercetur: sed posterior infirmior est. Sarda quoq; & saxatiles bis, excepto mullo: hic enim solus ter parit: quod ex foetu ipso, staturaq; intelligit. ter enim aliquibus in locis partus apparet. Scorpio bis, & sargus Vere, ac autumno. salpa semel autumno. Thunna etiam semel. Sed quoniā partem præmature, partem serò producat, hinc foetificare bis creditur. ædit primam partem circa mensem Decembrem à bruma, alteram Vere. Differt mas thunnus à foemina, eo quod foeminæ pinnula iuncta sub uentre est, aphareus nūcupata, quæ mari deest.

*Quoties, quibus uel anni temporibus cartilaginea pariant.*

Caput X



Artilagineorum squatina una bis parit: nam & incipiente autumno, & circa uergiliarum occasum: sed per autunnum felicius. Singulis uero foeturis partus septeni, aut octoni proueniunt, nonnulli ex mustelorum genere bis mense putantur parere, uidelicet qui stellati appellantur: quod ideo uidetur, quia oua eorum non simul perficiuntur. Non desunt quæ omnibus anni temporibus pariant, ut murena: cuius partus & numerosior est. & quæ prodierint ex paruo, celeri incremento adolefcunt, ut & equiselis, nam eius etiam partus de minimo in maximum celerrime augetur. Sed

murena omnibus anni temporibus parit. equis felis uere tantum. Murus non idem quod murena est: quippe cum murena sit uaria, atq; infirmior: murus unicolor, & robustus, colore larici arbori similis. dentes etiam tam intus quam foris possidet. Sexus discrimine perinde ac in cæteris uolunt, ut alterum mas sit, alterum fœmina. exeunt hæc in terram, & sæpe in ea capiuntur. Fit ut pisces omnes celeri incremento perficiantur: sed præcipue graculus inter minora. Solet hic parere iuxta littora, algosis, densisq; locis. Cernua etiam breui ex paruo insignem magnitudinem accipit. Limariæ ac thunni in ponto pariunt, nec uspiam alibi. Mugiles, auratæ, lupi, locis ijs maxime ædunt, quæ flumina exeunt. Orcinæ, scorpiones, & multa alia genera in alto fecundant.

Quibus mensibus pisces pariant, maiori ex parte.

Caput XI



Ariunt pisces plurima sui parte mensibus his tribus, Martio, Aprili, Maio. autumno pauci, ut salpa, fargus, & nonnulla alia generis eiusdem, paulò ante æquinoctium. Adde ijs torpedinem, & squatinam. Sunt certe quæ uel per hyemem, æstatem uel, suos ædant partus, ut dictum est. per hyemem lupus, mugilis, acus. per æstatem mense Iunio Thunna circa solstitium parit. hæc folliculo quiddam simile, in quo oua exigua, multaq; consistunt. spargi etiam per æstatem pariunt, mugilum labeones, fargones, mucones, capitones. grauescere uero mense Decembri incipiunt, geruntq; diebus tricenis. Mugiles aliquos non coitu, sed limo, arena uel nasci constat. Conceptus igitur piscium magna ex parte uerno agitur tempore: sed tamen, quod dictum est, & æstate, & autumno, & hyeme nonnulla coitu implentur. Verum nec pariter omnibus, aut simpliciter, aut generatim id euenit: nec plurimæ parti, ut uerno tempore. nec uero cæteris illis temporibus tam numerofo partu fecundatur, quam Vere. Denique latet non decet, ut stirpium, & quadrupedum animantium generi plurimum interesse ex regione, non solum ad cæteram corporis felicitatem, sed etiã ad coitum, partumq; ampliorem: sic in pisciũ quoq; ratione locis ipsis discrimen plurimum oritur, non ad magnitudinem tantũ, habitumq; uegetiorem, uerum ad coitum etiam & partum, ut eadem alibi pluries generent, alibi minus.

Molle genus piscium uerno tempore parere, sepia uero omnibus anni temporibus.

Caput XII



Ollia quoq; uerno tempore pariunt, & sepia in primis. parit hæc omnibus anni temporibus, perseveratq; in ædendo ouorũ numero dies quindecim. quoties autem ædiderit, mas e uestigio sequens, atramentum ouis superinfundit, atq; ita efficitur, ut solidescant. incedere coniugati solent. Mas uariis magis, quam fœmina, dorsoq; attriore est. Polypus hyberno tempore coit, uerno parit. latet circiter menses duos. Ouum ueluti circum ædit, fructui populi albæ simile. perquam fecundum hoc animal est. nam de eo quod ædiderit, copia innumera prouenit. discrepat mas à fœmina, eo quod capite est productiore, & quod genitale piscatores appellant, albidum suo in brachio continet. fœuet polypus oua quæ ædiderit: quamobrem deterrimè tanisper efficiuntur: haud enim in pastum prodire patiuntur. Quinetiam purpuræ Vere generantur, & buccina hyeme abeunte. Genus denique omne quod testatur, uerno autumnaliq; tempore habere cernuntur ea, quæ oua appellant, exceptis echinis cibo idoneis: quippe quibus est per ea tempora præcipue ubertas ouorum est, tamen nullo tempore committitur, ut ouis omnino careant: sed maxime plenilunijs, diebus quæ tepidis restituuntur, redduntq; pleniores, præterquam ijs quos Pyraus fert Euripus: nam illi hybernis mensibus meliores sunt, parui

parui quidem, sed pleni ouorum. Ad hæc umbilici pariter omnes, hoc eodem tempore sua oua habere uisuntur.

*De autum foetura, & quoties, quibus uic anni temporibus hirundo, merula, columba, & gallina pariant.*

Caput XIII



Vium syluestres, ut dixi, semel magna ex parte coeunt, atq; pariunt. Verum hirundo bis parit, & merula, sed eius primi partus intereunt frigore hyberno: omnium nanque autum prima hæc parit, posterior rem autem partum educat, & feliciter ducit ad finem. At uero quæ aut urbana sunt, aut traduci possunt ad mores mitiores, hæc sæpius generant, ut columbæ, quæ tota æstate fuerant. Gallinæ etiam ineunt, & pariunt omnibus anni temporibus, exceptis brumalibus diebus. Columbacei uero generis plures species sunt: est enim liuia dicta à liuore, diuersum certe à columba genus, quippe quæ minor, quàm columba sit, & minus patiens mansuescere, liuet etiam plumis, & penè nigricat, & pedibus rubidis, scabrosisque est: quas ob res nullus id genus cellare alit. Maximo inter hæc genera corpore sunt palumbes, secundum magnitudinis locum uinago obtinet, paulò maior quàm columbus est. minimum ex ijs turtur est. Pariunt columbæ omnibus anni temporibus, pullosq; educant, si locum apricum habeant, & cibum, sin minus, æstate tantummodo fecerant. Sed proles præstantior uere, quàm autumno est: deterrima æstate, & omnino tempore calidiore.

*Cellare, in cella.*

*De foetura uiuiparorum animalium, & quo ætatis tempore incipiat, quo uic desinat.*

Caput XIII



Etate etiam differunt ad coitum animalia: primum enim magnæ eorum parti semen non simul incipit & excerni, & posse generare: sed uis illa prolifica postea accedit. nouellorum enim in omnibus animalium generibus, prima emissio seminis, aut infœcunda est, aut si fecunda sit, imbecilliora tamen generat & pauciora, quod potissimum in hominum & quadrupedum animal gignentium genere, atque etiam autum patet: alterum enim prolem pauciorē procreat, alterum oua ædit pauciora. Aetas uero accommodata ad coitum quæq; suo in genere plurima ex parte ferè tempus idem sortitur: nisi quid præmaturet, & aut aliquam ob rem monstrosam, aut ex detrimento naturæ, & uitio anticipet. Res igitur homini innotescit, tum uocis mutatione, tum etiam testium, non magnitudine tantū, uerum etiam specie, quemadmodum mammis etiam declaratur: sed præcipue ortu pilorum pubis. Semen autem ferè incipit circiter annos bis septem: sed uim genitalem recipit circa annos ter septem. Cateris animalibus denegata pubertas est. alijs enim nulli cernino dati sunt pili, alijs supina in parte nulli, aut pauciores, quàm in prona. At uocem immutari nonnullis apertum est. Alijs partes corporis aliæ quædā significant: semen iam initium, uiresq; prolificas sibi trahere. Vox fœminæ magna ex parte acutior, & iunioribus quàm uetustioribus acutior est, nam ceruini etiam generis mares uocem grauiorem, quàm fœminæ mittūt. Vox autem maribus in hoc genere, cum tempus coeundi est: fœminis autem cum metuerint, breuis uox fœminæ est, maris productior. Canibus item senescentibus uox grauior redditur. Equorum etiam uoces differre palam est. fœminæ enim simul ac natæ sunt, uocem exiguam mittunt, ac tenuem: mares exiguam quidem & ipsi, sed pleniorē tamen, & grauiorē, quàm fœminæ, & in dies maiorem reddūt. Bimus cum est, atq; inire incipit, uocē magnam, grauiorēq; mas mittit: fœmina maiorem, quàm ante, & clariorē usq; ad uigesimali ætatis annum magna ex parte, sed ab hoc tempore imbecilliorē tam mares, quàm fœminæ.

nā reddunt. Magna igitur ex parte, ut dixi, uox marium, fœminarumq; differt, eo  
 quod mares grauius sonāt quā fœminæ: quorum scilicet uox, aliqua cum produ-  
 ctione emititur. Verum non in omnium animalium genere ita agitur. Sunt enim  
 in quibus econtrario fit, ut in bubus. nam bouū fœmina, grauiorē quā mas agit  
 uocem: & uitulis grauior quā adultis, perfectisq;: quamobrem his castratis uox  
 econtrario mutatur. transeūt enim quæ castrātur in fœminā. Tempora autē coitus  
 ad hunc modū per ætates natura suis animalibus statuit. Oues & capræ anniculæ  
 coeunt, atq; uterū ferūt: sed capræ potius, mares quoq; in ijs ipsis generibus eodem  
 illo tempore ineunt, sed proles differt, quatenus præstantior ea est, quā senescen-  
 tes mares & fœminæ procrearint. Sues tum mares, tum fœminæ coire incipiunt  
 mense suæ ætatis octauo: quanquam mas antequam sit anniculus, prolem generat  
 uitiosam, fœmina annicula parit, sic enim tēpus gerendi uteri exigit. Sed nō omni-  
 bus locis eadem ætatis ratio est, ut dixi: iam enim sues, nonnulq; tam mares quā  
 fœminæ quarto coeunt mēse: sexto tamen ita, ut uel progenerare & educare poss-  
 sint, nōnulquam apri mense decimo inire incipiunt. Valent ij coitu ad triennium.  
 Canes tam mares quā fœminæ anniculi, magna quidē ex parte coeunt: sed non  
 nunq; uel mense octauo, quod magis fœminæ euenit, q; mari. Gerit uterū diebus  
 sexaginta & uno, aut duobus, aut ad summū tribus: nec minus q; sexaginta diebus.  
 quod si quid celerius prodierit, educari ac perfici nequit. Cū peperit, rursum sexto  
 possit mense, nec prius coitu impletur. Equus inire tam mas, q; fœmina incipit bien-  
 nis, ita ut ualeat procreare, proles tamen per id tempus minor, & imbecillior est. At  
 uero (quod ex more plurimo agitur) in trimatu coeunt, & proficiunt subinde in ge-  
 nerando, ut proles præstantior aduſq; annos uiginti procreetur. Coeunt mares ad  
 annos tricenos ternos: fœminæ ad quadragenos: ita ut per totam ferē uitā coitum  
 equis feruari eueniat. Viuit enim magna ex parte mas annos circiter quinq; & tri-  
 ginta, fœmina plus q; quadraginta, iam & quinq; & sexaginta annos uiuisse equū  
 prodiū est. A sinu tam mas q; fœmina mēse tricesimo coit: sed magna ex parte ne-  
 queunt generare: uerū in bimatu, aut trimatu, & semisse. Sed iam uel anniculā uen-  
 trem gessisse asellā aiunt, ita ut quod pepererat, educari ac perfici potuerit. Bos etiā  
 annicula peperit, ut educari, augeriq; quantum genus exigeret, licuerit. Primordia  
 generationis horū animalū ita se habere perpētum est. Homo mas ad annum usq;  
 septuagesimū, uidelicet termino ultimo potest generare: fœmina usq; ad quinquā-  
 gesimū, uerū id raro, paucis enim proles in eo ætatis tempore procreata est. Sed ma-  
 gna ex parte maribus quintus & sexagesimus annus finis prognerandi est: fœmi-  
 nis, quintus & quadagesimus. Oues parere usq; ad annū octauū possunt, & si be-  
 ne curētur, uel in undecimum facultas pariendi protrahitur, & quidem fieri potest,  
 ut etiam per totam ferē uitam coeant, tam mares quā fœminæ. Hirsi pingues mi-  
 nus fecundi sunt, quorum argumento uites, quoties per nimiam alimentum copiam  
 luxuriantes fructum non ferunt, hircescere rustici dicunt. Verum cura extenuan-  
 dra dhibita, efficitur, ut coeant, atq; procreent. Arietes primum uetustiores fœmi-  
 nas ineunt, nouellas enim minus persequūtur. Pariunt, ut dixi, iuniores pauciora,  
 quā uetustiores. Apro ad triennū probitas coeundi edurat, uetustioribus proles  
 deterior gignit. nullus enim præterea profectus ei accedit, nulla uirū recreatio. so-  
 let inire pabulo satiatuſ, & cum alterā nō subegerit, uel inuitu breuior agitur, & fœ-  
 tus corpore minore creatur. Paucissima sus ad ita prima partione, uiget secūda, nec  
 senescēs copia fœtus deficitur, quanq; lentius coit. ubi uero quintumdecimū annū  
 nacta est, nō præterea generat, sed efferat. Si pinguet, ocyus & iuuenis & senescēs  
 mouetur ad coitum, si grauida admodū pingueſcat, efficitur, ut fœra minus habeat  
 lactis. Proles, quod ad ætatē attinet, optima est, cum uigēt parētes, quod ad tēpora,  
 præstans

præstantior quæ hyemis initio gignitur: deterrima, quæ æstate: quippe quæ parua, exilis, & perhumida sit. Mas si pinguet, iure omnibus anni temporibus potest, nec solū interdiu, sed etiam noctu, aut certe matutino potissimum tempore. senescens autem minus subinde agit, ut dictum est. saepe qui uel per ætatem, uel per infirmitatem suæ naturæ nequeant expedite coire, quū fœmina impotens sustinendi maris fessa clunes demittat, cubantes unā cum fœmina coeunt. Concipit præcipue sus, cum præ libidine gestiente pruriens auriculas flaccidas demittit: aliter semen à uulua respuitur, relapsūque euanescit. Canes non per totam coeunt uitam, sed usque ad quendam ætatis uigorem: ad annos enim duodecim magna ex parte, & coeunt, 10 & implentur. Verum iam aliquibus, tum fœminis, tum maribus, uel annum octauum, & decimum, atque etiam uigesimali natis facultas non defuit prolifici coitus. nam ijs quoque senectus uim generandi, pariendi, ut & cæteris tollit. Camelus ab auerso urinam reddit, sed coit quemadmodum dictum iam est. Tempus coeundi in terra Arabia, mense Septembri. fert uentrem menses duodecim: parit singulos: uiui parum nanque est. Incipit & mas, & fœmina coire in trimatu. fœmina post partum uno interposito anno coit. Elephantus fœmina incipit coire anno, aut duo decimo, cum celerrime: aut quintodecimo, cum lentissime. Mas quinque aut sex annos natus, superuenit ineunte Vere. coitum triennio interposito repetit. Quam grauidam reddidit, eandem præterea tangere nunquam patitur. Vterum biennio 20 gerit: parit singulos: uiui parum nanque est. fœtum magnitudine bimæstris, aut trimæstris uituli ædit. Coitum animalium, quæ non nisi coeundo progredient, ad hunc modum habere se intelligimus.

*De ijs, quæ silicea integuntur testa, quæ coitus omnino expertes sunt.*

Caput XV



Ox de generatione eorum, quæ uel coeant, uel non coeant, commentabimur: & primum de ijs, quæ siliceo tegmine operiuntur. hoc enim unum ferè genus totum expers coitus est. Purpure uerno tempore eundem in locum sese colligentes condunt, quam fauaginem nominant, quæ uelut fauus est apum. uerum non ita elegans, sed quasi è 30 putaminibus cicerum alborum, multa inter se composita, struem unam sua cohæsione coagmentarint. nullum ijs patet foramen, neque ex ijs purpuræ enascuntur, sed cum purpuræ, tum etiam reliqua testis inclusa, è limbo ferè, & materia putrescente oriuntur. Illa uero coagmentatio fauo similis, tanquam purgamentum, tam ijs, quam buccinis euenit. nam buccinis quoque fauificare in more est. Itaque ne ea quidem, quæ ex testaceis fauos saluant, alio modo, quam cætera testis inclusa generantur. uerum melius, atque uberius quoties præfunt, quæ eiusdem sunt generis. præfunt enim, cum suos ordiuntur fauos, mucorem quandam, ex quo putamineæ cellulæ illæ consistunt. hæc ergo rupta diffusaque omnia humorem quem continebant, in terram dimittunt. Mox eo quo effuderint loco gignuntur purpuræ 40 læ, exordio admodum exiguo consistentes, quas sibi annexas gerunt, quæ grandes capiuntur. nonnullæ etiam forma nondum distincta cernuntur, si fortè prius quam pepererint, capiantur. Fœtus interdum per crates, & tegetes, non quælibet elidunt, sed congregatæ eodem, ut facere in mari solent. itaque per angustiam, ueluti uuæ specie fœtus conformatur. Genera purpurarum plura, & nonnullæ magnitudine augentur insigni, ut quæ ad Sigæum, & Lectum Idæ promontoria gignuntur. Aliæ paruæ, ut quas Euripus fert, & Caria. pelagiæ magnæ, scabraeque sunt, quarum flos magna ex parte niger: sed nonnullis rubidus pusillum, nonnullas ex magnis, uel ad precium minæ euadere nouimus. Paruæ ad litora, & oras reperiuntur flore rubro, partes item Aquiloniæ nigras, Austrinæ

*πρὸν πᾶσι  
σι, præfunt,  
id est, præexistunt.*

*ὅπου ἐρυχθῇ,  
qualibet, id est,  
quouis loco.*

rubras magna ex parte ferunt. capiuntur tempore uerno, cum fauos extruunt. Cuniculæ tempore nullæ ferè capiuntur, non enim tantisper pascuntur, sed se abscondunt, & latent. florem suum inter papauer dictum, et collum continent, textu spissiore, aspectu ueluti membranæ candicantis, quam detrahunt. tingit hæc pressa, & inficit manum, pertinet eadem suo situ, perinde ut uena, idq; flos ille celebratur, reliquum contextus quasi alumen est. Cum fauiscant purpuræ, tunc deterrimum habent florem. Paruas tundunt cum testis: non enim detrahere facile est. maiorum florem testa ablata detrahunt: quam ob rem euenit, ut collum à papauere separetur. Flos enim positus inter hæc est, supra eam partem, quam uentrem appellant. Itaq; detractio flore diuidantur partes istæ, necesse est. Dant operam ut uiuæ frangantur. nam si prius, quàm fregeris, expirarint, florem omnem cum uita euomunt, quapropter solent eas asseruare in nassis, dum ipsæ se colligant, atq; requiescant. Veteres nassam escæ adiunctam demittere non solebant: itaq; sæpe accidebat, ut purpura iam extracta decideret. At homines nostræ ætatis adiungunt nassas, ne si decidat, abfoluatur. quod tunc potissimum euenit, cum plena est. nam si inanis sit, difficile se euellere potest. hæc propria eueniunt purpuris. Buccinis etiam modus idem gignendi, qui purpuris, tempusq; idem est. operculū item oris idem tam huic utriq; generi adheret natium, quàm cæteris turbinatis omnibus. pasci quoq; exerta lingua appellata sub illo operculo solent. longior digito lingua hæc purpuris est, qua pascitur: & tum conchulas, tum etiam sui generis testam perforare potest. Tempus uiuendi & purpuris, & buccinis longū. Annos enim circiter sex purpuræ uiuunt, & singulis annis incrementum earum patet per orbis: quibus totidē quot annos habent, testa intorta cuniculatum in crepidinem definit. Mituli etiam fauificare soliti sunt. Ostreis qua coenium, ibi origo consistit. Conchæ, chammæ, ungues, peccines, locis arenosis sui ortus initia capiunt. Pinnæ erectæ locis arenosis, coenosisq; ex bysso, id est uillo siue lana illa pinnali proueniūt. quæ custodem intra se continent, aut squillam paruum, aut cancellum: quo quidem custode priuata pereunt breui tempore. Testacea deniq; omnia sponte naturæ in limo diuersa, pro differentia limi oriuntur, nam in coenoso ostreæ, in arenoso conchæ, & reliqua, quæ modo enumeravi. Rimis, cauernisq; faxorum uertibula generantur, & glandes, & quæ per summa adherent, ut patellæ, ut natices. Omnia id genus celeri incremento augentur: sed præcipue purpuræ, atq; peccines, quippe quæ anno perfici possint. Cancri colore albido, corpore admodum parui in nonnullis testa operti generis nascuntur: & plurimi quidem in mitulis foliatis: mox in pinnis, quos pinnotheras uocant. Quinetiam in peccunculis, atq; ostreis. Verum ij nullum conspicuum capiunt incrementum. Piscatores cancos eiusmodi nasci confirmant, unā cum illis, quorum testam inhabitant. Latent aliquandiu in arena peccines, sicut etiam purpuræ. Nascitur ergo concharum genus quemadmodum expositum est, sed locis uarijs: nam alia uadis, alia gurgite, alia duris locis atq; asperis, alia arenosis: & alia sedem mutant, alia stabiliter degunt. Pinnæ ex ijs, quæ sedem nuncq; mutare solent, radice innituntur. Ungues, & conchæ nulla innitentes radice permanent. euulsæ uiuere præterea nequeunt pinnæ. Quæ stella uocatur adeo natura calida est, ut omnia contacta protinus decoquat. detrimento etiam summo echinis Euripi Pyrrheni eandem esse confirmant. forma eius stellis, quæ pinguntur, similis est. Quinetiam qui pulmones appellantur, sponte proueniunt. Concha, quæ pictoribus usui est, crassitudine plurimum excedit: & florem illum nō intra testam, sed foris habet. comperiri id genus locis Carie potissimum nouimus. Cancellus ille concharum hospes, principio exterius, limoq; consistit, mox conchulas ingreditur uacuas: ubi cum excreuerit, transit in concham ampliolem, uidelicet aut naticis, aut turbinis, aut alicuius similis, sæpe etiā parua

πελωδεσι,  
foliatis.



parua buccina subit, ingressusq; ampliore illam gerit pari modo, & uiuit in domicilio capaciore, rursusq; excrescens aliam petit ampliore.

De urticis, & spongiarum genere, quo uero modo gignantur.

Caput XVI



Odus idem gignendi ijs etiam est, quæ nulla testa integuntur, ut urticis & spongijs, qui testa inclusis: per rimas enim, & cauernas, & fauces saxorum oriuntur. Genus duplex urticæ est: aliæ enim sinuosis adhærent, quæ nunquam à saxis absoluuntur: aliæ plana, & littora amant, quæ suis abiunctæ sedibus uagantur. Patellæ quoq; absolutæ solent, aliq; transire, nasci etiam in cubilibus spongiarum nouimus bestiolam araneæ similem, nomen pinnothera mutuantes, degit hæc intra spongiarum cubile: & aperiendo, claudendoq; pisciculos capit, aperit antequam ingrediantur: claudit, & contrahit cum ingressi sunt. Genus spongiarum triplex statuitur: nam aliæ raræ, aliæ spissæ, aliæ quas nominat achilleas, tenuissimum genus id tertium, & spississimum, & ualidissimū est, quod galeis ocreisq; inseritur: eoq; minus ciere strepitum posse notatum est, genus hoc inuentu perquam rarum est. Quæ autem in genere illo spisso præduræ sunt, atque asperæ, nomine hirci nuncupantur: quæ quidem omnes aut ad saxa nascuntur, aut iuxta littus, lutoq; aluntur: cuius rei argumentum est, quod captæ, limo refertæ omnes cernuntur, quod certe indicat, cæteris quoq; adhærentibus, cibum per ipsum annexum hauriri. Imbecilliores propterea sunt spissæ, quàm raræ, quia minus alto radicis hæsu innituntur. Sensem etiam spongijs esse aiunt, argumento, quod ad euulsoris accessum contrahuntur, ita ut euelli difficile sit, quod idem etiam faciunt, quoties flatus, tempestasq; urget, ne sua de se de pellantur. Sed sunt qui de hoc dubitent, ut qui Toronam incolunt, Narrant tamen proculdubio bestiolas quasdam, uelut tineas, lumbricos uero, & eiusmodi alias consistere intra spongas, atque ali: quas & euulsis spongijs pisciculi saxaniles deuorent, qui uel radices absumunt toras, quæ inhærentes saxi remanserint. Si euenierit fortè, ut spongia abruptatur, residuo item renascitur & completur. Magnitudine amplissima solutæ illæ & raræ spongiæ augentur plurimæ, quæ circa Lyciam sunt. Sed mollissimæ, quæ spissæ: nam achilleæ torosiores ijs constant, omnino quæ altis, tranquillisque insunt gurginibus, mollissimæ sunt: flatus enim ac tempestates, spongas quoque ut cætera altitia reddunt duriores, & incrementum impediunt, quamobrem spongiæ Helleponti spissæ, ac duræ sunt, & omnino quas mare ultra Maleam promontorium, citraq; fert, differunt inter se mollitiæ, duritateq; nec calorem immodicum spongiæ patiuntur: sit enim eo, ut more pullulantium putrescant, quocirca optima iuxta oras comperiuntur spongiæ, si gurgite alto demersæ sunt: commode enim temperantur propter altitudinem gurgitis. Color illotis, uuisq; nigricans est, adhærent nec parte, nec toto: inter sunt enim fistulæ quædam inanes: sed pluribus passim particulis hæsitat, & quasi membrana extenta subesse radicibus earum uidetur. superne autem cæteri meatus concreti propemodum latent. At uero quaterni, aut quini patent, per quos pasci existimantur. Genus item aliud est, quod nomen aplyfias inde accepit, quia nunquam lauetur, quasi illorariam uoces, habet hoc ampliores illos meatus, sed reliquo toto corpore densum est: nihilo tamen densius, quàm quæ antè enumerauimus genera, quanquam lentius, & ex toto pulmonis similis cernitur. Sensem id genus habere, diuq; uiuere inter omnes præcipue conuenit, cognosci præ cæteris spongijs eo facile potest documentum, quod cum illæ albicent limo subsidente, id semper nigrore offendit. Quod ad spongas, & testatorum generationem pertinet, res ita se habet.



Ocusta inter crustata, quæ per coitum conceperunt, oua gerunt utero  
tribus mensibus his, Maio, Iunio, Iulio: tum deinde sub aluo in rugas  
deponunt, qua oua more uermium augentur. quod idem de mollibus  
etiã, ac de piscibus ouiparis intelligitur: ouum enim omnium ita ac-  
crescit. Fit igitur locustarum ouum arenidum in partes octo diductum:  
singulis enim operimentis, quæ de latere extant, singula quædam cartilaginea iun-  
guntur, quibus oua adherent: totumq; quasi species unæ consistit: unumquodq;  
enim illorum cartilagineorum in plura scinditur: quæ si discreueris, patent: sin aspi-  
cis, tantum compositum quiddam apparet. sunt maxima, non quæ iuxta meatum, 10  
sed quæ media sita sunt, minimaq; nouissima continentur. Magnitudo minimis,  
quanta granis ficuum est. nec meatum ipsum ulla contingunt, sed per medium hæ-  
rent: utraque enim ex parte, caudam dico, & aluum, bino maxime distinguitur  
intervallo: sic enim operimenta quoque disposita sunt. Sed quoniam latera ipsa  
complexi satis non possint, addito extremo cuncta teguntur, idq; uelut opercu-  
lum obruratur. Videtur prorsus locusta cartilaginosis illis particulis mandare oua,  
cum enititur, caudam adducens, & protinus comprimens, inflectensq; sese, pa-  
rere. Cartilagineæ uero illæ appendices per id tempus augentur, atque ouorum  
capaces redduntur. partus enim in ijs recipitur, ut sepiarum in sarmentis, & qua-  
libet collatione collocatur. locustæ ad hunc pariunt modum, mox ubi ea sui cor- 20  
poris parte intra diem maxime uigilum oua concoxerint, abigunt uniuersa,  
conglomerataq; ita in idem, ut & foris congesta appareant. Tum ex eo locustæ pro-  
ueniunt intra diem maxime decimum quintum, & sæpe minores, quam ut digiti  
magnitudinem expleant, capiuntur. excludunt igitur oua ante arcturum: abigunt  
iam concocta, atq; absolunt ab arcturo. Squillæ gibbæ uterum menses circiter qua-  
tuor ferunt. locustæ asperis, saxosisq; locis proueniunt. gammari leuioribus ac ter-  
renis. neurrum genus limosa amat: unde fit, ut gammari apud Hellepontum, &  
circa Thasum gignantur: locustæ circa Sigæum, & Athon. Coniectantur loca aspe-  
ra, limosa uel piscatores, oris littoralibus, atque alijs id genus indicijs, quoties captu-  
ram in alto liber exercere. littora potius uernis, hybernisque temporibus expetunt,  
conferunt se in altum, æstate uidelicet, cum aliàs calorem, aliàs frigus persequuntur, 30  
his etiam quas nomine ursæ arctos appellant, idem pariendi tempus natura statuit,  
quod locustis: quocirca per hyemem, & Vere priusquam oua excludant, cibo lau-  
dantur: cum excluderint, deterrimæ fiunt. Crusta sua, & locustæ & cæcri, tam nuper  
nati, quam post, exuuntur per Ver, quemadmodum angues membrana uernationis,  
quam senectutem appellant. Locustis omnibus uita diuturnior data est.

De polypo, sepiâ, lolligine, cæterisque mollibus ouiparis, deq; eorum  
foetura & partu.

Caput XVIII



Ollia copulatione, ac uenereo coitu, ouum concipiunt candidum, quod 40  
in dies arenidum, quale illud crustati generis euadit. ædud polypus su-  
um ouum, uel in cubilibus, uel in figulino, uel in quo alio cauo simili  
labruscæ florentis racemulis, aut fructui arboris populi albæ, ut di-  
ctum iam est, pendunt utiq; per cubile oua tanta fecunditate, ut col-  
lectis uas impleatur longè amplius, quam caput sit, quo continebatur. Polyporum  
itaq; ouis diebus post quinquaginta maxime ruptis, polypuli modo araneorum per-  
quam multi exerpunt, quorum natura sigillatim nondum conspicua est, quanquam  
forma satis tota apparet: sed ob exiguitatē imbecillitatemq; copia interit. iam non-  
nulli adeo spectantur exigui, ut nulla partium consistent distinctione, quamuis ad-  
tactum

factum moueantur. Oua quæ sepiaæ ædunt, magnitudinem myrtorum capiunt, & nigrescunt, emissio enim atramento parentis infunduntur, atque ita inficiuntur, coherent inter se ad speciem racemi cuncta uni obducta cuidam nexui; nec facile alterum detrahi ab altero potest. mas enim humorem quendam mucoris mittit, cuius lentore tenaciter oua sibi cohaerescunt, ac crescunt, etiam hæc & cum primum ædita candida sint, atque exigua, mox atramento perfusa, nigra, maioraq; redduntur. Cumq; sepiola iam intus constiterit, uidelicet tota ex candido oui interno concreta, tum rupta oui membranula proles exit, primum pars illa interior cædida, ueluti grando consistit, cum foemina suum atramentum asperferit. Nascitur enim  
 10 sepiola ex eo ipso candicante corpusculo uersa in caput, modo auium uentre annexo. Sed qualisnam sit in his annexus umbilici, nondum exploratum habemus. Constat tamen candidum illud subinde diminui, dum sepiola augetur: & ad postremum, ut luteum auibus, sic candidum his aboleri, primum oculi grandes in his quoque, perinde ut in cæteris, apparent. Sit ouum a, b, c. oculi, d, sepiola ipsa, e hoc ipsum, ferunt uterum sepiaæ uerno tempore. Pariunt intra diem decimū quintum, mox oua ædita crassitudinē acinorum uiaæ minorū, intra diem item decimū quintum capiunt, quibus obruptis sepiolaæ excluduntur, quæ, si quis prius, prole iam perfecta obsiderit oui membranam, stercofulculum mittunt, suumq; præ metu colorem immutant ex candicante in rubriusculum. Sed cum genus omne crustatum  
 20 sibi iuncta contineat oua, itaq; foueat, polypus & sepia, & reliqua generis eiusdem, oua quæ pepererint absoluta fouent, & præcipue sepia: quippe cuius sæpenumero alueus iuxta terram, dum hoc facit, appareat. Polypus foemina modo incubat ouis, modo in ore sui cubilis assidens, brachium super ouis exporrectum tenet. Sepia parit iuxta terram inter algas & harundines, & si quod aggestum tale infectum sit, ut farmenta, aut lapides, aut quælibet alia materiei congeries. Et quidem piscatores de industria faeces farmentorum disponūt, hæc perlibenter in eis loculamentis parit prolixam illam, continentemq; seriem ouorum, qualis cirri muliebris species est, enicitur, aluum per interualla reprimens, inspergitq; atramentum, interposita quiete: utpote, cum non nisi cum labore emittat. Lolligines in alto pariunt, con  
 30 fertum ijs quoque ouum, quale sepijs est. Viuendi spacium tam sepiaæ, quam lolligini breue; nam exceptis paucis bimarum nō complent, polypis etiam tantundem temporis ad uiuendum datum est, prodeunt ē singulis sepiarum ouis sepiola singula: quod idem in genere etiam lolliginum sit. Inter lolliginem marem & foemina nam hoc interest, quod foemina intestina continet duo, ueluti mammas: quæ si aluo dissecta inspectæ, facile uideris. Mas omnino ijs caret. Sepia tum hoc idem discrimen habet, tum uero quod mas uariis plus, quam foemina est, ut exposui.

De ijs insectorum generibus, quæ aut ex crucis, aut ex uermibus, aut ex fimo gignuntur. Caput XIX

40 **I**nsecti generis mares foeminis esse minores, ac superuētu coire, uixq; absolui, dictum iam est. Breui à coitu pariunt, maxima sui parte, quæ solent coire. Vermem autem omnia faciūt, excepto genere quodam papilionum, quod durum quiddam simile cartamo, id est, enici semini producit, sed intus fluidum. Vermibus uero ipsis non parte aliqua, sicut in ouis animal creatur, sed totus uermis accrescit, & particularim discretus formatur in speciem destinati animalis. Procreantur porro insecta, aut ex animalibus generis eiusdem, ut phalangia, & aranei, ex phalangijs & araneis, ut bruci, locustæ, cicadæ, aut non ex animalibus, sed sponte, alia ex rore, qui frondibus insudat, uidelicet uerno tempore, ut natura fert. Sæpe tamen & hyberno, quoties tran-

quillum, australeq; tempus diutius consistit. Item alia ex coeno, aut fimo putrescente oriuntur: alia in lignis aut stirpium, aut caësis: alia in animalium pilis: alia in excrementis, aut iam excretis, aut adhuc intra animantem contentis, ut quæ tineæ siue lumbrici appellantur, quorum genera tria sunt, latum, teres, & quod ascarida appellatum est, ex quo nihil procreari aliud potest. Latum autem illud solum intestino adhærens, parit simile cucumeris semini, quo indicio medici genus id lumbrici inesse intelligunt. Nascuntur papiliones ex erucis, erucæ ex uirentibus folijs, maximeq; ex brassica. Primum minus quid milio consistit in folio, mox uermiculi inde contrahuntur, & accrescunt, tum intra triduum eruculæ afformantur, quæ auctæ motu cessant, suæq; forma immutantur, appellanturq; tantisper chrysalides, quasi aurelias dixeris. duro intestæ putamine sunt, ad tactum mobiles, meatibus araneolis obductæ. non es, non aliud ex membris, quod conspicuum sit, possident. longo post tempore, putamine obrupto euolât inde animalia pennigera, quos papiliones uocamus. Itaq; primum dum erucæ sunt, cibo aluntur, atque excrementum emittunt. At uero cum in aurelias dictas transferint, nihil uel gustant, uel excernunt. Hæc eadem gignendi ratio cæterorum etiam est, quæ ex uermibus consistant: siue ex coitu animalium uermes, seu sine coitu prodire. nam & apium, & crabronum, & uespærum uermes, quandiu recentes sunt & aluntur, tantisper & sterces emittere uidentur. At cum formæ liniamētā receperint, sub qua faciē nymphæ appellantur, iam neque cibum præterea capiunt, neque ullum reddunt alui excrementum, sed coërciti & cōtracti quiescunt, nec ullo pacto mouere se patiuntur, usq; dum species destinata perficiatur, quo facto euolat proles, rupto, quo continebatur, folliculo. Quinetiam superæ, & aciæ dictæ quibusdam eiusmodi alijs generantur erucis, quæ undent ingressu. Parte enim innitentes priore contrahunt sese, adducentes posteriorem, arcuatimq; incedunt. Verum quæq; orta, sibi colorem à sua eruca trahunt. Fit ex quodam uerme grandiore, qui uelut cornua gemina protendit, suiq; generis est, primum toto immutato, eruca: deinde quæ bombyx appellatur, ex quo necydaus, inualidam dixerim, quæ uaria formarum successio, in semestri temporis spacio cōpletur. Ex hoc animalis genere bombycia illa mulieres nonnullæ rerorquando in filum deducunt, deinde texunt, prima texisse in Cōinsula Pamphila Platis filia dicitur. Eodem modo scarabei tauri gignuntur ex uermibus, qui in lignis aridis nascuntur. primum enim uermes ipsi immobiles fiunt, mox disrupto putamine id scarabei genus exit. Blattas in aluearijs gigni apertum est, quæ & ipsæ pennatæ sunt. Asilus latiusculus quibusdam bestiolis, quæ in fluuijs supernatant, enascitur: quamobrem magna asilorum copia circa aquas, ubi id genus bestiolarum est. Erucis quibusdam corpore piloso, non grandi primum, cicindela à clunium fulgore nomine indito, fiunt non uolucres: quibus deinde mutatis, pennigera animalia gignuntur, quos cirros uocant. Culices muliones ex ascaridis, hoc est tipulis generantur. tipulæ ferè in puteis, & ubicunque aqua se colligit, terrena subsidente concretionē oriuntur. fit ut principio sex ipsa putrescens color rem candicante trahat, mox nigricantem, postremo cruentum. talis cum fuerit, minutissima quædam & rubra specie algulæ prodeunt: quæ ad tempus hærentia suæ origini mouentur, deinde absoluuntur, itaq; feruntur per aquam, tipulæ nuncupata: tum paucis post diebus erigunt se super aqua duræ, atque immobiles, mox disrupto putamine, culcx emergit, ac insidet, donec uel sole, uel flatu moueatur & uolet. Commune omnium uermium est, & eorum quæ ex uermibus proueniunt animalium, ut primordium generationis, aut à sole, aut à spiritu præstetur. sed copiosius ac celerius fiunt tipulæ in aquis, quarum sedimentum uarium ac promiscuum sit, quale in agro Megarico in operis solet misceri: putrescit enim hoc facilius

Hermo. redæ  
ait Blattas in  
brassicis

cilius, & autumno quoque uberius generatur: minus enim humoris esse tunc accidit. Rediui gramine oriuntur. Scarabei uirides, galleruæ iam uocari incipientes, uermibus fimo bouis aut iumentis creatis gignuntur. Scarabei pilularij in fimo quem uoluunt, conduntur per hyemem, paruosq; uermiculos pariunt, ex quibus ipsi procreantur. Quinetiam leguminum uermiculis pennata animalia ratione simili prodeunt. Muscæ ex uermiculis fimi digesti in partes gignuntur, quamobrem qui eo funguntur munere, contendunt reliquum fimi promiscui discernere, etiam confectum concoctumq; esse finum confirmant. Principium autem uermiculorum ipso rum exiguum est, quod primum rubescit, atque ex immobili quasi hærens adhuc fibris moueri incipit: mox uermiculus immobilis redditur: qui cum postea motus est, rursus immobilis fit: demumq; generat muscam, quæ flatus, aut solis beneficio moueatur. Tabani ex ligno nascuntur. Orfodagnæ, quas mordellas appellem, ex uermiculis immutatis, qui in brassicæ caule creantur. Cantharidæ ex erucis fici, piri, pini, atque etiam sentis caninæ oriuntur: fiunt enim in his omnibus uermes, petit genus id animalis fœtida, quoniam ex tali materia constitutum est. Vinarij culices ex uermiculis, qui fece uini acescente gignuntur, originem trahunt. Quinetiam in ijs quæ putredinem nullam posse recipere existimantur, nasci animalia nouimus: ut uermes in niue uetustiore, qui hirti sunt pilis, & rubidi, quoniam & ipsa nix uetustate rubescit. sed in niue mediæ terræ can-  
 20 didi, & grandiores inueniuntur. torpent omnes, ac difficulter mouentur. In Cypro insula, ararijs fornacibus, ubi chalcites lapis ingestus compluribus diebus crematur, bestiolæ in medio igne nascuntur pennatæ, paulò muscis grandibus maiores, quæ per ignem saliant, atque ambulent. Emoritur & hoc genus, & illud niuis alumnium, cum alterum ab igne, alterum à niue dimotum est. Nonnulla corpora esse animalium, quæ igne non absumentur, salamandra claro documento est: quæ, ut aiunt, ignem, inambulans per eum, exstinguit. Hypanis fluuius apud Cymerium Bosporum sub solstitio desert ueluti folliculos acinis maiores, quibus quadrupes uolucres erumpunt: quod genus animalis in postmeridianum usque diei tempus uiuit, & uolat: mox descendente sole macrescit, & lan-  
 30 guet: deinde occidite emoritur, uita non ultra unum diem peracta: unde ephemereum, id est, diarium appellatum est. Quæ ex erucis aut uermibus gignuntur aranea inuoluta, magna ex parte principio exeunt hæc ita.

De uersarum generatione, & eius tempore, quando etiam insectorum genera quamplurima pereant.

Caput XX



40 **V**espæ autem ichneumones nuncupatæ, quæ minores, quam cæteræ sunt, phalangia perimunt, occisq; ferunt in parietinas, aut aliquid tale foramine peruium: deinde illiunt luto, atque ex ijs incubando suum procreant genus. Nonnulla ex ijs, quorum pennis crusta superuenit, & ex minutis, quæ nomine carent, nidos sibi luto paruos aut ad sepulchra, aut ad parietinas confingunt, atque in ijs uermiculos pariunt. Tempus generationis à principio ad finem, maximæ ferè parti septenarijs ternis describitur, aut quaternis. Culicum, & uermiformis generis parti plurimæ ter septeni attribuitur. Oviparis quater septeni magna ex parte, septem ex ijs ab initu, concretio, & consummatio oui uendicat sibi: reliquis tribus septenis incubant, atque excludunt, ea scilicet quæ suo procreant fœtu, ut araneus, aut aliquid generis eiusdem. mutationes uero & transitus in figuras alias, trinis, aut quadrinis diebus, parti maximæ peraguntur: sicut in morbis quoque dies decretorius

euenit. Talis insectorum generatio est. Pereunt striatis, contortisq; membris, ut senectute genus maiorum animalium moritur. quæ pennata ex ijs sunt, pennis etiam conuulsis autumnno ferè moriuntur. Tabani quidem uel aqua intercute oculorum cæci intereunt.

*De coitu & generatione apum, uariæ opiniones.*

*Caput XXI*



E generatione apum uaria sententiæ est. Alij enim eas parere & coire negant, sed deportare foeturam existimant. nec unde portent, constat inter omnes: sed alij ex flore cerinthi, alij ex flore arundinis, alij ex flore oleæ aiunt, argumentumq; afferunt, quod cum oliuarum prouentus sit largior, tunc plura examina prodeant. Sunt qui fucorum quidem foeturam comportari ab aliquo ex ijs, quæ modo dixi, arbitrentur: sed apum generi ortum præstari à ducibus. Quorum duo sunt genera, alterum fuluum, quod præstantius est: alterum nigrum, magisq; uarium. magnitudo ijs duplo, quam cæteris frugi apibus, auctior est. pars à præcinctio inferior proportionē sesquialtera adeo longitudinis habetur. uocantur à nonnullis matres, utpote originis autores. argumento referunt, quod fucorum foetus aditur etiam sine duce, apum nunquam. Aliqui per coitum agi opinantur, maresq; esse fucos, foeminas uero apes esse contendunt. Cæteræ in concauis, imisq; fauorum proueniunt. Duces subter ad fauum pendentes oriuntur separatim sex, aut septem, contra quam cæteræ turmæ foetura adherentes. aculeum apes possident: fuci eo carerent. Reges, ducesq; habent, sed non utuntur: quocirca eos carere aculeo nonnulli existimant.

*De apum generibus, & earum ducibus, & ætate, deq; fauorum confectiōe, & scodionibus, id est apum sobole.*

*Caput XXII*



Enera apum plura. optimum, quæ breues, uariæ, & in rotunditatem compactiles sunt. secundum quæ longæ, & uespis similes. tertium qui fur nuncupatur: grandis hic, & aluo est ampliore. quartum siue præcipua magnitudine, sed nullo armatus aculeo, & ignauus. quamobrem alueis aliquid intexunt, quo apes subire possint: fuci autem ut grandiores, nequeant. Ducum duo sunt genera, ut dictum iam est. Nec unus in quoque examine dux tantum modo est, sed plures: peritq; ipsum examen, si duces uel non satis habeantur (quod non tam principis desiderio, quam ortus, ut aiunt, ad quem illi necessarij sunt, incidit) uel plures quam satis: distrahunt enim examen. Prouenit foetus apum parcius. Vere serotino, squalore, rubigine, augent porro mella siccitates, sobolem imbres. Vnde fit, ut simul oliuæ, & examinum copia sit. Fauos primum conficiunt, mox collocant foetum ore emittentes suo, ut ijs placet, qui censent aliunde prolis primordia conuehi. deinde cibi causa mellificæ, tam æstate, quam autumnno. sed melius mel autumnale est. Construunt fauos ex floribus, ceram ex lachryma arborum fingunt, mella ex rore aëris, syderum exortu potissimum: & arcus coelestis incubitu contrahunt. omnino ante uergiliarum exortum mel non fit. Fauos itaque, ut dictum est, floribus faciunt. mel autem non ipsas facere apes, sed rorem candentem deferre, argumento est, quod uno aut altero die cellas melle repletas inueniunt apiarij. Item autumnno mel, posteaquam detractum est, non reparatur, cum tamen illo etiam tempore flores proueniant. sublato itaque melle, & cibo aut nullo extante, aut exiguo, repererent certe apes munus mellis conficiendi, si ex floribus possent accipere. Crassescit autem mel con-

coctum

coctum iam tempore. Initio enim ut aqua dilutum est, & primis diebus sine crassitudine cernitur, quod si exemptum eo tempore sit, crassitudine caret: tum uicesimo maxime die spissatur. Indicium perfectionis in sapore potissimum est: dulcius enim, quod crassius. Colligunt apes ex omnibus, quæ florem caliculatum ferunt, atque etiam ex cæteris, in quibus dulcedo est, & lingua susceptum genus id saporis deportant, sine ullo fructuum detrimento. Vindemiantur initio caprifici aluei: tunc enim mellationis terminus est. Schadones autem (sobolem dico) optimæ fiunt, cum mellificatur, aggerunt suis cruribus ceram, atque erithacam. mel ore euomunt in cællas. foetu posito incubant autum more, exclusus inde uermiculus dum paruu est, iacet in fauo obliquus. post deinde sua ipse facultate se erigit, cibumq; capit: & fauo ita adhæret, ut retineri uideatur. Foetus apum & fucorum candidus est, ex quo uermiculi fiunt, qui in apes, fucosq; transeant. Primordium regum colore cernitur fuluo, corpulentia mellis crassioris, magnitudine ilico proxima suæ futuræ soboli. nec primum ex eo uermiculus gignitur, sed statim apis, ut aiunt. qua autem parte foetus constitutus sit, mel ibi è regione conficitur. Schadones, si foetus oppressus interceptiatur, truncatæ sine pennis, & cruribus prodeunt. Sed si libere ad finem generationis uenerunt, rupta qua cinguntur membrana, euolant. Stercus quandiu sit uermis, emittit: postmodum non, nisi perfecte (ut modo dixi) prodierint. si quis capita ips demat, priusquam pennas habeant, pro pabulo mirum apibus sunt. & si fucum adeptis pennis in alueum reijcias, ipsæ reliquorum pennas erodunt. Vita apum anni sex, nonnullæ etiam septem possunt complere. Quod si examen nouem, aut decem annos durauerit, prospere actum esse existimatur. Genus quoddam apum in Ponto est candidum ualde, quod bis mense mellificet. Apud Themiscyram circa Thermoodontem amnem, apes tam in terra, quam in alueis faciunt fauos, qui parum admodum ceræ contineant, & mel crassius reddant. Fauus ipse leuis atque aquabilis est, quem non semper, sed hybernis temporibus tantum construunt. copia enim in eo tractu est hederæ, quæ hyeme floreat, unde apes mel capiant, ad Amisum urbem conuehitur à locis superioribus mel candidum crassumq; maiorem in modum, quod apes faciunt arboribus sine fauo, quale etiam fieri in Ponto cognitum est. Sunt etiam apes, quæ fauos sub terra triplici ordine faciunt: in quibus mel est, uermis nullus, sed nec faui omnes eiusmodi sunt, nec apes ita omnes confingunt.

*Erithacæ, quæ  
& sandaracæ  
appellatur. &  
à Dioscoride  
ranthemus, ex  
arborum succo  
gumi modo ge  
nita, & uerno  
rore, unde uer  
nigini uulgo  
nomen.*

*De foetura crabronum, & uespærum.*

*Caput XXIII*



Rabrones & uespæ, si duce amisso aberrauerint, fauos suæ proli constituant, in sublimi & foraminibus. crabrones in sublimi, uespæ in foraminibus. sed si habeant ducem, sub terra nidificant. Cællis sexangulis fauos extruunt omnes, ut apes: sed ex materia corticea quadam, & araneosa. longe tamen lautior fauus crabronum, quam uespærum est. Foeturam modo apum instillant ad latus cællarum faui, & parietibus admouent. Verum non in omnibus cællis inest æqualis foetus, sed alijs iam grandiusculus, ut uel queat uolare: alijs in nympha est, alijs adhuc in uermiculo. Excrementum uermiculis tantum, ut & in apum genere est, manet foetus immobilis, cum in nympha est, & membrana uelatur. Paululum mellis quantum gutta, in cællis crabronum è regione proli paratur. Schadones huius generis non Vere, sed autumno fiunt, & crescunt maxime plenilunio, hæret & foetus & uermiculus non in imo cællæ, sed lateri.

De partu nonnullorum ex genere bombycum.

Caput XXIII

Plin. sic: Nidos  
luto fingūt salis  
specie applica-  
tos lapidi, &c.



Nonnulla ex bombycum genere, nidos in acutum exeūtes ē luto quasi-  
litos, utriusque specie affigunt lapidi, aut alicui tali, tam crassos, duosque, ut  
spiculo perforari uix possint. pariunt in ijs, & uermiculos producunt  
candidos, membrana obuolutos nigra, seorsumque à membrana ceram  
in luto faciunt, quæ multo pallidior sit, quàm cera apum.

De coitu &amp; partu formicarum.

Caput XXV



Oeunt & formicæ, & uermiculum pariunt nulli annexum: qui accres-  
cens ex minutulo & rotundo longiusculus fit, formamque accipit debitam. 10  
ortus eorum uerno tempore agitur.

De partu terrestrium scorpionum.

Caput XXVI



Vin & scorpiones terrestres uermiculos ouorum specie pariunt com-  
plices, & incubant, mox ut prolem perfecerunt, pelluntur ab ea ipsa,  
sicut & araneis accidit, & interimuntur à suis liberis magno numero: sæ-  
pius enim undenos pariunt.

De generibus arancorum, &amp; eorum partu.

Caput XXVII



Ranei uero coeunt modo quo dictū est. Pariunt uermiculos, qui non  
ex parte, sed toti in aranei formam immutantur: nam & rotundi iam 20  
inde à primo ortu proueniunt. Cum pepererint, incubant, & triduo  
peragunt, pariunt omnes in tela: sed alij in subtili & breui, alij in cras-  
siori, & alij omnino in sinu orbiculato, alij ita, ut aliquatenus tela ob-  
ducta proles muniatur. proles autē ipsa non uniuersa producit: ut tamen quisque  
exiuit, protinus salit, filumque mittit, humor similis in uermiculis infictu percipitur,  
atque in araneis ipsis recens natis, hoc est crassus, & candidus. Pratenfes aranei in tela  
pariunt, cuius dimidiū applicatur ipsis matribus est, reliquum foris recipit partum.  
& incubat eadē in tela, atque uiuificant. Phalangij in rete, quod crassum confecerint,  
pariūt, atque incubant, cæteris lauioribus illis partus minoris numeri est. at uero pha-  
langijs admodum numerosus. Cumque ipsa proles increuerit, matrē amplexa con- 30  
sumit, & eiicit, sæpe etiā patrem si ceperint: adiuvat enim foeminā incubitū. Pariun-  
tur interdum & trecenti eodem utero. consummātur aranei, & iusta sibi recipiunt  
incrementa diebus quater septenis, à paruo sui ortus initio ad finem.

De coitu &amp; partu locustarum, earumque ætate.

Caput XXVIII



Ocustæ eodem coeunt modo, quo cætera insecta, scilicet minore su-  
perueniente maius. sunt enim in eo genere mares minores quàm fœ-  
minæ. Pariunt in terra fixo cauliculo, quo mares uacant: ac uniuersæ,  
& loco eodem foetum deponunt, ita ut quasi fauus esse uideatur. hinc  
uermiculi speciem oui gerentes oriūtur, qui terra quadam prætenui, 40  
tanquam membranula ambiūtur: qua dissecta emergunt locustæ, ac euolant. Tam  
mollis foetura hæc est, ut ad tactum leuissimum dilabatur, & pereat. Non summæ  
telluri partus committitur, sed paulo altius. hic concoctione peracta exeunt ex illo  
terreno amiculo parue locustæ, & nigrantes: deinde cute obrupta, maiores statim  
efficiuntur. pariūt exitu Veris, & statim à partu moriūtur, uermiculis circa collum  
innascentibus tempore partus, qui eas strangulent. Mares quoque eodem tempore  
obeunt. Vere terra emergūt. Locis motantis aut tenuibus locustæ nō fiunt, sed pla-  
nis, rimosisque. pariunt enim in rimis sua oua, quæ durant hyeme, in terra ineunte  
æstate proueniunt ex foetu anni superioris locustæ.



**P**rimo modo, & quos brucos appellant, pariunt: & cum pepererint moriuntur, intereunt oua eorum aquis autumnalibus, cum nimis incefferint. At sicco autumnno largior prouetus brucorum est, quoniam minus oua intereant, in normis enim esse uidetur eorum quidem interitus, quin etiam ortus nulla certe agitur ratione.

**C**icadarum duo sunt genera: alia enim minores, quae prima prodeunt, & nouissime pereunt: alia maiores, quae canunt, eademque nouissimae prodeunt, & prima intereunt. Sunt quae canunt praecinctu diuiduae, siue minores, siue maiores sunt, quae autem non canunt, indiuiduae constant. uocant nonnulli grandiores illas & canentes argutas: minores mutas. Sed canere uel in secundo hoc genere possunt paululum, quae praecinctae prodierint. Nasci non possunt cicadae, ubi arbores defunt: quocirca apud Cyrenam nullae in campo sunt, cum circa oppidum ipsum multae prouentiant. Oleas maxime amant, ut minus umbrosas, loca enim frigidiora aspernantur: quam obrem in opacis nemoribus esse nequeunt. Coeunt tam maiores, quam minores supinae complexu muruo: masque inserit in foemina, sicut & caetera insecta agunt. Genitale foemina habet rescissum, quo recipit id quod a mare iniicitur. Pariunt in aruis celsantibus, excauantes asperitate praecuta, quam parte habent posteriore: quomodo bruci etiam solo eiusmodi pariunt: quapropter in Cyrenensi agro copia est. Quinae etiam in harundinibus, quo ad miniculo uites eriguntur, nidum foeturae excauant, & in caulibus squillae herbae interdum pariunt: sed hic foetus facile in terram dilabitur. Proueniunt large copia imbrum. Crescit primo in terra uermiculus: deinde fit ex eo quae tettigometra uocatur, parentis nomine: quo tempore gustu suauissimae sunt, antequam cortex rumpatur, postmodum circa solstitia noctu exeunt, statimque rupto cortice, prodeunt cicadae ex matrice illa cicada, quam modo tettigometram dixi, nigrae protinus, & duriusculae, & maiusculae: atque incipiunt canere, mares utroque in genere canunt: foeminae silent. & ante coitum mares suauiores sunt: a coitu foeminae, quippe quae oua candida, gustu habeant grata, excitatae cum subuolant, quendam reddunt humorem modo aquae, quo rustici eas mingere, & excremento non carere, roresque alii asseuerant. Si quis digitum contrahens, ac remittens subinde appropinquet, magis expectant, quam si silico extendat: & quidem transire in digitum alliciuntur: quod enim oculis hebetes sunt, quasi frons aliqua moueatur, digitum ita ad motum conscendunt.

**V**ae ex numero insectorum non carne uiuunt, sed carnis uiuae humore aluntur, ut pediculi, pulices, cimices, haec per coitum generant ea, quae lendes uocantur: ex quibus nihil praeterea nasci potest. illorum autem generatio talis est. Pulices minima quadam putredine gignuntur, sedemque sui ortus sordes obtinent aridas. Cimices ex humore, qui per summa corporis animalium consistit. Pediculi ex carne, quibus futuris emergunt, ceu pustulae quadam sine pure exiguae: quas si pungas, pediculi exeunt. Accidit morbus hic nonnullis hominibus praenimio corporis humore. & quidem aliquos foeditate obijisse proditum est, ut Almanem poetam, & Pherecydem Syrium. quibusdam item morborum generibus copia nascitur pediculorum, Genus pediculi

ferum uocatū, est durius, eo quod magna ex parte proueniat, & corpori detrahi difficilius. Pueris pediculi in capillo magis, uiris minus, omnino foeminae magis quam mares pediculū sentiunt, minus laborant eorum capita, quibus pediculus in capillo est. Quin & ex ceteris animalibus complura pediculo infestantur, ut aues; & phasianae quidem intereunt, nisi se puluerent. omnino quibus penna caule constat, ijs pediculus gignitur, nec ea quibus pilus est, carēt eodem, excepto asino, qui non pediculo tantū, uerum etiā rediuo immunis est. Boues utrunq; id habent, oues & caprae rediuos habent, pediculis uacant. Suis quoddam pediculi grande, ac durum familiare est. Canibus proprium ricinus, qui ab eodem animali nomen cynoraistae accepit. Genus autē unumquodq; pediculi ex corpore ipso sui animalis enascitur. 10 Proueniunt largius pediculi mutatione aquarum, quibus lauare se solent ea, quorum natura pediculum parit. In mari etiam pisces hoc malum infestat; uerum nō in piscibus ipsis, sed limo gignitur simile multipedibus asellis, nisi quod caudam hoc ampliusculam habeat. Genus pediculi marinum simplex unumq; est, ubiq; proueniens: sed maxime in foraminibus, & cauernis, insecta haec omnia sunt, & multipeda, & exanguia. Asilus thunnorum sub pinna oritur, specie scorpionis, aranei magnitudine. Maris, quod à Cyrena in Aegyptum panditur, piscis, pediculus nomine circa Delphinum est, qui omnium pinguisissimus sit, pabuli copia, quae delphini opera suppeditatur.

De genere tinearum, quod in lanis procreatur: deq; xilophthoro, quod in lignis: necnon de ficarijs culicibus, quos caprificus generat. Caput XXXII

20



Vinetiam aliae generantur bestiolae, ut dictum est, tum in lanis, & quibusuis lanitio confectis, ut tineae, quae lanis puluerulentis praecipue oriuntur: atque etiam magis si araneus una includatur, si quid enim humoris inest, hic absorbens ampliat siccitatem. nascitur & in tunicis hoc idem uermiculi genus. Tum uero in cera uetusta, ut in ligno, animal gignitur candidum, quod omnium animalium esse minimum existimatur, no mine acari, necnon alia in chartis, aut ijs proxima, quae in ueste, aut scorpioni, sed sine cauda generantur perquam exigua, omnibus propē dixerim, uel siccis humescentibus, uel humidis siccescentibus, creari animal prodest. Nascitur & uermiculus quidā, cui nomen à corrupēdis lignis, xilophthoro, ac si ligni perdi appelles, nullo minus absurdum: caput enim suo putamine exerit uarium, pedes in postremo habet, ut alij uermes. reliquum corpus tunica araneosa integitur, suoq; tegumento haerentes festucas gerit, ita ut forte eas, casuq; sibi contraxisse dum ambularet, uideretur. Verum ipsae nativae inhaerēt tunicae: & ut limacibus testa, sic totum id uermiculo huic adhaeret: nec decidit unquam, sed euellitur, ut narium. quod si hanc eius tunicam detrahas, expirat, pariq; modo, atque limax, testa detracta hebetescit, processu utique temporis id quoque in aureliam transit, ut eruca, atque immodice uiuit. Sed quidnam ex eo animalis pennati oriatur, compertum nō adhuc est. Ficarios culices caprificus generat suis pomis: sit primum uermiculus, mox rupta 40 cute euolat culex, mutataq; sede, petit ficus immaturas: quibus se insinuans, facit ne decidan. Quamobrem agricolae appendere ficis caprifici ficus, & iuxta easdem caprificos serere assolent.

De foetura quadrupedum ouiparorum.

Caput XXXIII



Vadripedis autē sanguinei ouipari generis ortus uerno tēpore quidē agitur, sed coitus nō tempore eodē, alia enim Vere, alia aestate, alia circa autumnū coeunt. ut cunq; singulis tempus sequens ad prolem commo-  
dius est. Testudo oua durioris testae, & bicolore aedit, quale ouū autum-  
est:

est: eaq; defossa, & cooperta terra, ac pauca, & complanata incubat, crebrius repe-  
rens: foetumq; sequente anno excludit. Mus aquatilis, siue testudo lutaria in terra  
scrobe effossa dolij amplitudine parit ova, quæ deserit terra obruta, dieq; tricesimo  
reperit, resossaq; aperit, foetumq; continuo ducit in aquam. Testudines etiã marinæ  
egressæ in terram, pariunt ova autum corticalium ouis similia: & defossa, coopertaq;  
incubant noctibus. ouorum numerus maximus est, nam ad centena pariunt ova.  
Quin & lacertæ & crocodili tam terrestres, quàm fluuiatiles, sua ova terræ gremio  
committunt. Lacertarum ova sponte in terra aperiuntur: uitæ enim earum annum  
non cõplere, sed semestrem finire aiunt. Crocodilus fluuiatilis ova sexaginta com-  
20 plurimū parit, uiuitq; diu, maximumq; animal, minima hac origine euadit. ouum  
enim nō maius quàm anseris, & foetus inde exclusus proportionem est. Attamen cre-  
scit ad quindecim cubita. Sunt qui eum tandiu augeri, quandiu uiuat, cõfirmant.

De uiperæ, cæterarumq; serpentium scatura.

Caput XXXIIII



Ipsera ē serpētib; una animal ædit, cum intra se ova primum pepere-  
rit. Ouum hoc unius coloris, & molle, ut piscium est. foetus superne  
constitit: nec cortice continetur, sicut nec pisciū quidem. parit catulos  
obuolutos membranis, quæ tertia die rumpantur. euenit interdum,  
ut qui in utero adhuc sunt, abrosis membranis prorumpāt. singulos,  
20 diebus singulis parit, plures quàm uiginti. Cæteræ serpentes ova pariunt foris con-  
texta, ad monilis, hoc est ornamentis mulierum, quod ambit collum, similitudinem.  
incubant quæ pepererint in terra, & foetum sequente excludunt anno.

Leonice. cõset  
reddēdū, uiginti  
fere numero.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEXTVS,  
INTERPRETE THEODORO.Aues omnes ova parere, diuersis tamen anni temporibus, nec in ouorum  
numero omnes conuenire.

Caput I



30 SERPENTIVM, & insectorum, atque etiam quadrupedum  
oua parientium generationes fieri ad hunc modū animadu-  
ertimus. Aues autē ova pariunt omnes: sed tempus coeundi, pa-  
riendiue nō idem omnibus est: quippe cum aliæ coeant & pa-  
riant omni fere tēpore, ut gallinæ, ut columbæ. Gallina enim  
toto anno, præterquam duobus mensibus brumalibus, parit.  
magna etiam generosarum nonnullis fecunditas, quando uel  
sexaginta ædunt ante incubitum: quanquam ipsæ minus fecundæ, quàm ignobiles  
sunt. Item hadrianæ paruo quidem sunt corpore, sed quotidie pariunt, ferociunt ta-  
40 men, & pullos sæpe interimunt. Color his uariis. Nonnullæ etiam ē corticalibus his  
die pariunt. Iam aliquæ in tantū copiæ prouenerunt, ut effoetæ breui morerentur.  
sed gallinæ, ut dictum est, perpetuò pariunt. Columbæ autem, palumbes, turtur,  
uinago, bina pariunt. sed columba uel decies anno: aliæ semel anno, & parcius ge-  
nerant. Agitur maximo autū numero partus uerno tempore. Sed alijs aliæ fecun-  
dus pariunt. quod bifariam fit, aut enim quia crebrius, ut columbæ, aut quia nume-  
rosius, ut gallinæ. Omnes, quibus unguis adunci, parcius generat, excepto tinun-  
culo, qui plurima in adunco genere parit. Iam enim quatuor eius reperiuntur pul-  
li, sed plures etiã posse procreari apertum est. pariunt cæteræ in nidis. Quæ autem  
minus uolant, ut perdices, ut coturnices, non nidis, sed condenso frutice prolem

muniunt. Sic & alauda, & tetrax, sed hæc suum nidum patere auræ cupiunt. Quem uero Bœotij meropen uocant, hic unus subiens terræ cauernas, facit cunabula. Turdi nidos ex luto, ut hirundines faciunt in excelsis arboribus, ita deinceps continuato opere, ut quasi catena quædam nidorum contexta uideatur. Vpupa una suo in genere non nidificat, sed stipites arborum subiens, parit sine ullo stramento in cauis. Cuculus saxa & domicilia petit, in quibus nidificet. Tetrax, quam Athenienses uragem uocant, nec terræ, nec arbori suum nidum committit, sed frutici.

De natura & diuersitate ouorum omnium auium, semineq; genitali,  
& incubandi officio. Caput II



Vum æque omnium uolucrum duro putamine constat, si modo non depraueatur, sed lege consummetur naturæ. Gallinæ enim nonnulla pariunt mollia uitio, & bicolor quoque ouum auium intus est, luteum interius, album exterius, sed differunt oua aquaticarum à terrestribus, quod multo plus lutei quam albi, ex proportionem contineant. Differunt & colore inter se oua auium. Sunt enim alia candida, ut columbarum & perdicum: alia pallida, ut palustrum: alia punctis distincta, ut meleagridum, & phasianarum. Rubrum tinunculi est modo minus. Quin & ipsum ouum in se suum habet discrimen, quippe quod parte sui acutum, parte latius sit: qua quidem parte latiore exit, cum gignitur. Quæ oblonga sunt oua, & fastigio cacuminata, foemina addunt: quæ autem rotundiora, & parte sui acutius obruta, orbiculum habent, marem gignunt. Incubitu auium, foetum excludi, naturæ ratio est, non tamen ita solum oua aperiantur, sed etiam sponte in terra, ut in Aegypto obruta fimo pulliciem procreant. Et Syracusis potator quidam, ouis sub florâ in terra positâ, tandiu potabat, donec oua æderent foetum, iam uero & cum in uasis quibusdam tepidis essent coniecta, sponte oua pullos prompserunt. Semen genitale uolucrum omnium album, ut cæterorum animalium est. Concipit foemina quæ coierit, ouum superius ad septum transversum: quod ouum primo minutum, & candidum cernitur: mox rubrum, cruentumque: deinde increscens, luteum & flauum efficitur totum, iam amplius autem discernitur, ita ut intus pars lutea sit, foris candida ambiat. ubi perfectum est, absoluitur, atque exit putamine. dum paritur, mollescit: sed protinus durefcere, quibus cumque emergit portionibus, nisi uitio uulue defecerit, iam quale certo tempore est, tale aliquando prodijt luteum totum, qualis postea pullus est. Gallina etiam discissa, talia sub septo, quo loco foeminis oua adherent, reperta sunt, colore luteo tota magnitudine oui perfecti: quod pro ostento augures capiunt. Nec audiendi sunt, qui oua hypenemia dicta, à uero quasi subuētanea dixeris, reliquias esse partus, quem coitus fecerit, arbitrantur. Iam enim aliquas gallinarum, & anserum iuuenas experies adhuc coitus parere hypenemia uisum sapius est. Sunt hæc sterilia & minora, ac minus iucundi saporis, & magis humida, quam ea quæ foecunda gignuntur, sed plura numero. humor eorum crassescere incubatione auis non potest: sed tam candida, quam lutea pars similis sibi perseverat. Parit genus id oui plures aues, ut gallinæ, perdices, columbæ, pauones, anseres, & quæ ab anseri, & uulpe composito nomine chenalopeces, id est, uulpanferes dictæ sunt. Excludunt celerius incubantes æstate, quam hyeme. Ideo æstate gallinæ duodeuigesimo die foetum excludunt: hyeme aliquando uigesimo quinto. Discrimen tamen & auium est, quod alia magis alijs fungi officio incubandi possunt. si incubante gallina tonuit, oua pereunt. Quæ autem canicularia, & urina à nonnullis uocantur, æstate magis consistunt. Sunt qui hypenemia, hoc est subuētaneos illos partus zephyria nominant, eo quod uerno tempore aues flatus illos foecundos ex fauonio recipere uideantur, sed idem faciunt

ciunt etiā si digito in genitale palpetur. Redditur certe ouum subuentaneum illud  
 fecundum: & quod iam conceptum per coitum est, transit in genus diuersum, si  
 prius coeat, quæ uel subuentaneum, uel semine maris diuersi conceptū fert, quam  
 ouum ipsum à lutea in candidā ambientem partem proficiat. Ita enim fit, ut subuen-  
 tanæ oua fecundā reddatur: & quæ inchoata à mare priore sunt, specie posterioris  
 proueniant. At si iam candidum acceperunt humorem, fieri non potest, ut uel sub-  
 uentanea in fecunda mutantur, uel quæ per coitum concepta gestantur, transeant  
 in genus maris, qui secundus coierit. Incepta quoq; si adhuc paruis deserit coitus,  
 non accrescunt: sed si continuetur, celeri incremento augentur, iustamq; magnitu-  
 10 dinem implent. Naturam uitellus oui, & albumen habent contrariam, non tantū  
 colore, uerum etiam uirtute. Vitellus enim spissatur frigore, albumen non, sed am-  
 plius humet. contrā albumen spissatur igne, uitellus non, sed mollis peristit, nisi  
 peruratur, magisq; in aqua seruete, quā ad ignem cogitur, atq; induratur. Mem-  
 brana hæc inter se discernuntur. Grandines autem dictæ, quæ initio uitelli adhæ-  
 rent, nil ad generationem cōferunt. quanquam aliqui ita non existimant, has duras  
 esse certum est, alteram parti superiori iunctam, alteram inferiori. Euenit etiam, ut  
 si quis rupto putamine oua plura in patinam coniecit excreta, & coquit igne molli,  
 & continente, uitelli omnes in medium coeant: albumina autem circudent, & se  
 in oras constituent. Gallinarum iuuentæ pariunt primæ, statim Vere ineunte: &  
 20 plura quā ueteres, sed minora. denique aues, nisi pariant, laborant morbo, atque  
 intereunt. Inhorrescūt à coitu, ac se excutiūt, sæpe etiam festuca aliqua sese lustrant,  
 quod idem & ædito ouo interdum faciunt. Columbæ caudam distendunt, anseres  
 sese aquis ingurgitant. Celeriter magna pars auium & impletur, & oua subuenta-  
 nea illa concipit. quod uel in perdice percipi potest, eo quod libidine incitatur, tem-  
 pore. nam si contra marem steterit fœmina, aura ab eo flante, fit prægnans: atque  
 extemplo inutilis aucupijs. Olfactum enim esse exquisitū perdicibus creditur. Oui  
 generatio ab initu, & pulli rursus ouo concocto prouentus, non pari temporis spa-  
 cio euenit omnibus: sed pro magnitudine generantis interest. Ouum gallinæ con-  
 sistit à coitu, & perficitur decem diebus magna ex parte, columbæ paucioribus. fa-  
 30 cultas columbis retinendi oui, etiam tempore parturiendi est. Nam si ab aliquo ue-  
 xetur, aut penna in nido euulsa, uel quauis alia simili re infestetur, aut etiam sponte  
 morosius habeat, ouum per tristitiam retinet, partumq; differt. Peculiare columbis  
 illud etiam est, ut in coitu, nisi antè mutuò osculentur, mas non ascendat. sed iunior  
 sit, an senior, interest: senior enim primum coitum osculo exorditur: sequentem &  
 sine osculo agit. At iunior quoties libet coire, toties osculatur. Igitur hic ritus colum-  
 barum proprius est, atq; etiam ille, ut fœminæ saliant, ac supergressu mutuo agant,  
 si mas non sit, & cum osculo, ut mares. & quamuis nihil altera emitat in alteram, ta-  
 men plura sic oua, quā ex maris coitu pariūt. Verum nullus his enascitur pullus,  
 sed sunt omnia irrita. Generatio uero ex ouo omnibus uolucris euenit, modo  
 40 quidem eodem, sed tempora differunt, ut dictum iam est.

Quot dierum spacio pullus in ouo generetur, deq; eius creatio-  
 nis ordine.

Caput III



Allinis porro tertia die, ac nocte postquam cœpere incubare, indicitū  
 præstare incipiunt. At maiorum auium generi plus prætereat tem-  
 poris, necesse est. minori autem minus sufficit. Effertur per id tempus  
 luteus humor ad cacumen, quæ principium oui est: atq; ouum dete-  
 gitur ea parte, & cor quasi punctum sanguineum in candido liquore  
 consistit: quod punctum salit iam, & mouetur, ut animal. Tendunt ex eo meatus

uenales fanguigeri duo tortuosi ad tunicam ambientem utranque, dum augetur.  
 Membrana etiam fibris distincta sanguineis, iam album liquorem per id tempus  
 circundat, à meatibus illis uenarum oriens. Paulò autem post, & corpus iam pulli  
 discernitur, exiguum admodum primum & candidum, conspicuum capite, & ma-  
 xime oculis inflatis, quibus ita permanet diu: serò enim decrescunt oculi, & se ad ra-  
 tam contrahunt proportionem. Pars autem inferior corporis, nullo membro à su-  
 periore distingui, inter initia cernitur. Meatum, quos ex corde tendere diximus,  
 alter ad ambiendū album liquorem fertur, alter ad luteum uelut umbilicus. Origo  
 itaque pulli in albumine est, cibus per umbilicum ex luteo petitur. Die iam decimo  
 pullus totus perspicuus est, & membra omnia patent. caput grandius toto corpo-  
 re est. oculi capite grandiores harent: quippe qui fabis maiores per id tempus emi-  
 neant nigri, nondum cum pupilla. quibus si cutem detrahas, nihil solidi uideris, sed  
 humorem candidum, rigidumq; admodum resurgentem ad lucem, nec quicquam  
 aliud, ita oculi & caput. Iam uero & uiscera eo tempore patent, & alui intestino-  
 rumq; natura perspicua est. Venæ etiam illæ à corde proficiscentes, iam sese iuxta  
 umbilicum constituunt. Ab ipso autem umbilico uena oritur duplex. altera ten-  
 dens ad membranam ambientem uitellum, qui eo tempore humer, & largior,  
 quam secundum naturam est: altera permeans ad membranam ambientem eam,  
 qua pullus operitur, & eam quæ uitellum, humoremq; interiectum continet. dum  
 enim pullus paulatim increfcit, uitellus seorsum in duas partes secatur. quarum al-  
 tera locum tenet superiorem, altera inferiorem, & medius humor candidus con-  
 tinetur. nec partem inferiorem à uitello liquor deserit albus, qualis antè habeba-  
 tur. Decimo die albumen exiguum iam, & lentum: crassum, pallidulum nouissimè  
 me inest. Sunt enim quæque locata hoc ordine. prima, postremaq; ad testam oui  
 membrana posita est, non testæ ipsius natua, sed altera illi subiecta. liquor in ea can-  
 didus est. deinde pullus continetur obuolutus membrana, ne in humore maneat.  
 mox pullo uitellus subiacet, in quem alteram ex uenis prorepere dictum est, cum  
 altera albumen ambiens perat. Cuncta autem ambit membrana cum humore,  
 specie faniei. Tum uero membrana alia circa ipsum foetum, ut dictum est, ducta-  
 tur, arcens humorem. sub qua uitellus alia obuolutus membrana, in quem um-  
 bilicus à corde, ac uena maiore oriens pertinet: atque ita efficitur, ne foetus alte-  
 rutro humore attingatur. Vicesimo die iam pullus si quis putamine secto sollicitet,  
 mouet intus sese, pipitq; aliquantulum: & iam ab eodem die plumescit, quoties ul-  
 tra uicesimum exclusio protelatur. ita positus est, ut caput super crus dextrum ad-  
 motum sibus, alam super caput positam habeat. quin etiam membrana, quæ pro  
 secundis habetur, post ultimam testæ membranam, ad quam alter umbilicus per-  
 tendit, euident per id tempus est, pullusq; in eadem iam totus locatur. & altera  
 quoque membrana, quæ & ipsa uicem secundarum præstat, uitellumq; ambit, ad  
 quem alter umbilicus procedit, latius patet. Oritur umbilicus uterque à corde, &  
 uena maiore, ut dictum est. Fit autem per id tempus, ut umbilicus alter, qui in se-  
 cundas exteriores fertur, compresso iam animante absoluitur: alter, qui adit ui-  
 tellum, ad pulli tenue intestinum annectatur. Iam & pullum ipsum multum hu-  
 moris lutei subit: atq; in eius aluo fecis aliquid subsidit luteum. excrementum etiam  
 album eodem tempore pullus emittit, & in aluo quiddam album cõsistit. Demum  
 uitellus paulatim absumitur totus membrorum haustu, ita ut si pullo decimo die  
 post excluso rescindas aluum, non nihil adhuc uitelli comperias. Umbilico uero ab-  
 soluitur pullus, nec quicquam præterea haurit. totus enim humor, qui in medio  
 continebatur, absumptus iam est. Tempore autem supradicto pullus dormit qui-  
 dem, sed non perpetuò, quippe qui excitetur interdum, & mouens sese respiciat,  
 atque

atque pipiat. Cor etiam eius cum umbilico, ut spirātis reflat, & palpitat. Sed auium  
 ortus ad hunc modum ex ovo agitur. Pariunt autem oua nonnulla infœcunda,  
 uel ex ijs ipsis, quæ conceperint coitu. nullus enim prouenit fœtus, quamuis incu-  
 bitu foueantur, quod maxime in columbis notatum est. Oua gemina binis con-  
 stant uitellis, qui ne inuicem confundantur, facit in nonnullis prætenue quoddam  
 septum albuminis medium. alijs uitelli contactu mutuo sine illo discrimine iun-  
 guntur. Sunt in genere gallinarū, quæ pariant gemina omnia, in quibus animad-  
 uersum est, quod de uitello exposui. quædam enim duodeuiginti peperit gemina,  
 exclusitq; præterquam, si qua essent (ut fit) irrita. Cæteris itaque fœtus prodijt, sed  
 10 ita gemini excluduntur, ut alter sit maior, alter minor; & tandem in monstrem de-  
 generet, qui minor nouissime prouenit.

*Genus columbaceum bina oua, uel terna ad summum parere, deq; eius  
 fœtificationis ordine.*

*Caput IIII*



Ariunt magna ex parte bina oua, quæ specie columbacea continen-  
 tur omnia, ut palumbes, ut turtur, sed complurimum terna, palum-  
 bes, & turtur. Columbæ omni tempore, ut dictum est, pariunt. Tur-  
 tur & palumbes Vere, nec plus quam bis: atq; ita, si prior fœtus cor-  
 ruptus est, frangunt enim oua mares auium complures, sed quamuis  
 20 tria interdū pepererint oua, nunquam plus duobus pullis educunt, nonnunquam  
 etiam unum tantum. reliquum ouum semper irritum est, quod urinum uocant.  
 Aues magna ex parte anniculæ nequeunt generare. Omnes uero cum parere in-  
 cepere, semper ferè oua continent: quanquam in nonnullis facile ob exilitatem  
 uideri nō possunt. Columbæ magna ex parte marem & fœminam generant: prio-  
 rem marem, posteriorem fœminā. & cum pepererint primum ouum, uno inter-  
 posito die, secundum pariunt. incubant ambo uicissim, interdum mas, noctu fœmi-  
 na, concoquunt, atque aperiunt citra diem uicesimum ouum, quod prius ædide-  
 rint, perforant ouum pridie eius diei, quo pullum excludunt; & fouent prolem am-  
 30 bo ad certum tempus, eodem modo quo oua. fœmina in opere sobolis acerbior  
 mare est, ut cæteris quoque à partu euenit animalibus. Pariunt decies anno: non-  
 nullæ etiam undecies. Aegyptiæ uero & duodecies. Coeunt intra annum colum-  
 bæ, quippe quæ semestres nosse incipiant uenerem. palumbes & turtures etiam  
 trimestres coire, fœtificareq; aliqui referunt, argumento quod larga eorum copia  
 est. Gerunt uterum decem & quatuor diebus, ac totidem alijs incubāt, & totidem  
 alijs fœtus ita uolucer fit, atq; perficitur, ut uix possit apprehēdi. Vita palumbium  
 uel ad quadraginta annos durare existimatur, perdicū amplius quam ad sexdecim,  
 columba citra dies triginta prole expedita superiore, parit.

*De nidificatione, & factura uulturis, & hirundinis.*

*Caput V*



Vltur nidificat in excelsissimis rupibus: unde fit, ut raro nidus & pulli  
 uulturis cernātur. Quocirca Herodorus Brysonis rhetoris pater, uul-  
 tures ex diuerso orbe nobis incognito aduolare putauit, argumen-  
 to, quod nemo nidum uidisset uulturis, & quod multi exercitum se-  
 quentes repente appareant. sed quanquam difficile nidum eius alijs  
 uideris, tamen uisus aliquādo est. Pariunt uultures oua bina, cætera quæ carne ue-  
 scuntur, non plus quam semel anno parere exploratum est. Hirundo una bis an-  
 40 no nidificat, pullorum hirundinis adhuc recētium oculi, si quis stimulo eos uexarit,  
 resanescunt; & cernendi uim postea planè recipiunt.

De aquilarū genere, & factu: deq; anseris, accipitris, milui, & corui pariu. Cap. VI



Quilæ oua pariunt terna: sed pullos binos excludunt, ut ex uersu, quem ad Musæū referūt autorem, cōstat. Excludit binos, ædit terna, educat unum. Sed quamuis magna ex parte sic fiat, tamen & tres uisi aliquando sunt pulli. Alterum in educando expellunt tædio nutriendi: nam & degenerare ac hebetescere aquila dicitur, eo tēpore, ut fœtus ferarum rapere nō queat: nomenq; hinc exaētī, hoc est degenerātis aquilæ accipit, unguis etiā eius inuertitur diebus paucis, & pennæ albescunt, ut meritō suos oderit partus. sed pullum eiectum ossifraga excipit, atq; educat. incubat aquila tricenis diebus. & cæteris quoq; magnis alitibus tempus incubādi tantundem à natura statutum est, ut anseri, ut tardæ. mediocribus uiceni perficiūt incubationem, ut accipitri, ut miluo. Pariunt milui bina magna ex parte: interdum tamen & terna, totidemq; excludunt pullos. sed qui ætoliū nūcupatur, uel quaternos aliquādo excludit. Coruus quoq; non modo bina, ut aliqui uolunt, parit, uerum etiam plura. Incubat autē uiginti diebus, & pullos nido expellit, quod idem & aliæ complures uolucres faciūt, quibus enim partus numerosior est, unum sæpe eijciunt. Genera aquilarum nō æque omnia prolem fastidiūt: sed difficilior in alendo una, cui nomen pygargo cauda albicans dederat, benignior, quæ tota nigricat colore, nam omnes ferè alites, quibus unguis adunci, pullos cum primū prouolādi facultas fuerit, nido expellunt, percutiētesq; cogūt discere. & cæteræ quoq; aues maxima ferè sui parte, 20 ut dictum est, idem hoc faciūt. cumq; enutrierint, nihil præterea adhibēt curæ, excepta cornice, quæ aliquādiu prouidet: quippe quæ uolantes iam suos pullos pascens ipsa comiteretur.

De cuculi natura, & eius partu.

Caput VII



Vculus ex accipitre fieri immutata figura à nōnullis putatur: quoniā quo tempore is apparet, accipiter ille, cui similis est, non aspicitur. sed ita ferè euenit, ut ne cæteri quidem accipitres item cernantur, cum primum uocē emisit cuculus, nisi perquam paucis diebus. Ipse autē breui tempore æstatis uisus, hyeme nō cernitur. est hic neq; aduncis unguibus, ut accipiter, neq; capite accipitri similis: sed ea utraq; parte columbum potius, quā accipitrem repræsentat. nec alio, quā colore imitatur accipitrem, nisi quod 30 accipiter maculis distinguitur, ceu lineis: cuculus uelut punctis. magnitudo atq; uolatus similis accipitri minime, qui magna ex parte per id tempus non cernitur, quo cuculus apparet. nam uel ambo una uisi aliquando sunt. Quinetiam ab accipitre interimi cuculus uisus est, quod nulla auis suo in genere solet facere. pullos cuculi nemo se ait uidisse. parit tamen, uerum nō in nido quem ipse fecerit, sed interdum in nidis minorū auis: & oua quæ aliena repperit, edit. maxime uero nidos palumbum petit, quorū & ipso oua esu absumens, sua relinquit. parit maiore ex parte singula oua, raro bina. Curuæ quoq; in nido parit. fouet illa, & excludit, & educat. quo quidē præcipue tempore & pinguis, & grati saporis pullus cuculi est. Pulli 40 etiam accipitrum suauis ualde, pinguesq; efficiuntur. Genus eorum quoddam nidos facere procul in petris excelsis, præruptisq; affolet.

De auium incubitu, quo uel tempore mas, quo item femina incubet.

Caput VIII



Incubat magna auium pars (ut de columbis retuli) fœminæ mare succedente. aliqui mares incubandi munus tantisper subeunt, dum fœminæ intermisso incubitu cibum quærunt. Anserum fœminæ tantū incubant, quæ ut coeperūt, nunquam intermitunt, sed perpetuo fouent incubitu. Aquaticæ omnes iuxta paludes, & locis herbā habentibus



tibus nidos faciunt: quo fit, ut uel occupata negotio incubandi, possint sumere cibum, nec omnino inedia laborent. Cornicum etiam foemina tantum incubant, assidueque in opere perseverant, mares his cibum suggerunt, pascuntque incubantes. Palumbium foemina incubat a pomeridiano incipiens, totaque nocte, & usque ad tempus ientaculi perseverans: reliquo tempore munus idem mas subit, Perdices bina ouorum receptacula faciunt: in altero foemina incubat, in altero mas: excluditque sua uterque, & educat. Pulli etiam ipsi subiguntur a mare statim cum procedunt.

*De pauone, & eius foetu, quotiesque in anno pariat, deque auium testibus, qui coitus tempore grandiores efficiantur.*

Caput IX

10 **P**AUO uiuit annos uiginti quinque, parit maxime a trimatu, & colores pennarum uarios recipit, excludit diebus tricenis, aut paulo tardius, semel tantummodo anno parit oua duodecim, aut paulo pauciora, nec continuatis diebus, sed binis ternis uel interpositis. primipara octona maxime adunt. Irrita & subuentanea illa pauones etiam pariunt. Coeunt Vere: & paratus breui a coitu agitur. Amittit pennas, cum primis arborum frondibus: recipit cum germine earundem. gallinis subiiciunt incubanda oua pauonia, quoniam mas dum foemina incubat, aduolans ea frangat, quam ob causam & syluestres nonnullae aues pariunt fugientes marem, & incubant. Subiiciuntur maxime bina, cum plura suo incubitu nequeant aperire, curaque adhibetur ut cibis assit, ne desiderio eius discens, gallina intermittat fouendi operam. Testes auium grandiores effici tempore coitus certum est, sed salaciorum conspectiores sunt, ut gallinae, & perdicum: temperantiorum minus. Aues ad hunc modum coeunt, gestant, & pariunt.

*De piscium foetu, eiusdemque inter eos diuersitate, & uuluae forma.*

Caput X

10 **P**ISCES haud omnes parere oua dictum iam est, genus enim cartilagineum animal generat: reliqua oua pariunt, sed nec cartilagineis quidem foetus sine ouo. Pariunt enim intra se oua, & augent, atque excludunt, praeterquam raia. Vuluae etiam pisces habent diuersas, ut dictum est, nam qui pariunt oua, bifurcatas habent, atque inferius positas, cartilaginea uero ea specie potius habent, qua aues, sed interest, quod oua non iuxta praecordia omnibus, sed infra nonnullis per spinam consistunt: unde aucta in alium transferuntur locum. Ouum piscium non bicolor, ut auium: sed unicolor omnium est, & plus albi trahens, quam lutei, tam ante, quam postea, cum foetus insidet. Differt piscium generatio ex ouo ab auium generatione, eo quod altero caret umbilico, qui ad membranam testem subditam tendat: alterum enim tantum, qui a uibus ad uitellum fertur, habet meatum. Caetera idem ortus ex ouo auium, & piscium est: quippe cum & foetus in extremo ouo nascantur, & uenae similes ex corde inter intra proficiantur: & caput, oculi, denique partes superiores principio fiant praegrandes, in crescente etiam foetu, humor pari modo subinde absumitur: demumque nihil superest, quod non foetum subierit, sicut de uitello auium expositum est. Quin etiam umbilicus paulo a ventre inferius haeret, qui recens natis longior sit, crescentibus paulatim breuior reddatur, demumque se totum intra foetum recondat, ut dictum de auibibus est. Membrana quoque eadem ouum, & foetum continet, cui membrana altera foetum per se continens subiacet. humor autem inter membranas positus est. Ad haec, cibus in aluo suggeritur, eodem modo pisciculis albus, quo auium pullis luteus. Figura uuluae ex dissectione petenda est. Discrimen autem inter se ipsi pisces ostendunt, ut mustelini, qui tum inter se, tum etiam a planis ratione uteri differunt. nonnullis enim medio uuluae circa spinam oua adherent, quemadmodum dictum est, ut caniculis, quae cum adcreuerint, absoluta fertur per uuluum bifurcatus, annexamque ad pra-

cordia, quomodo & cæteris generis eiusdem in utraq; partem transferuntur. habet tam eorum, quàm cæterorum mustelini generis uulua paulò à præcordiis inferius, ueluti mammas albidas, quæ non nisi grauidis habeantur. Caniculæ & raia, testacea quædam gerunt, in quibus humor ad oui similitudinem cõsistit, figura eius testæ similis tibiæ ligulis est: meatusq; fiunt capillamentorum specie in testis, sed caniculis, quas aliqui ab hinulo nebrios mustelios appellant, foetus rupta dilata p̄sa illa testa proueniunt. Raijs cum pepererint, rupta testa excluditur foetus. spinaces uero musteli, sic à spina, quam habent, nuncupati, oua ad præcordia continent super mammas: quibus ut descenderint, iam absolutis, foetus innascitur. Idem hic generandi modus & uulpeculis est. Musteli autem leues uocant, oua per uuluum 10 mediam, ut caniculæ gestant: quæ postea in utraq; uteri sinum descendant. mox animal gignitur umbilico hærente ad uuluum, ita ut ouo absumpto, partus non aliter, quàm in quadrupede cõtineri uideatur, adhæret umbilicus ille prolixus, capite altero ad partem uulua inferiorē, ueluti ex acetabulo annexus: altero ad medium foetum, qua in parte iecur est. Cibus si refecet, foetus ad oui similitudinem uideris, etiam si non præterea ouum habeat. Secundæ, membranæq; singulæ foetus singulos modo quadrupedum continent. Caput prolis in utero nouæ, adhuc partem spectat superiorem, auctioris iam & perfectioris inferiorem uersus transfertur, mares in laua, foeminae in dextra ingenerantur: atq; etiam parte eadem una foemina, & mares, ut cætera etiam foetus habet, ut iecur: perinde atq; in quadrupede magna, 20 cruentaq; refectio cernuntur. Omnia cartilaginea simul & oua parte superiore circa præcordia continent complura, alia maiora, alia minora, & inferiore animalia iam exclusa, unde fit, ut genus id piscium sapius mense & pariat, & coeat: quippe quod non uniuersa ædere soleat quæ conceperit, sed particulatim repetens sæpe, & diu peragens, ut dum superius oua contrahit, inferius coquat, atque perficiat. Cæteri musteli foetus suos & emittunt, & recipiunt intra seipsos, quod idem & squatinae, & torpedines faciunt. & quidem iam uisa torpedo est grandis, quæ foetus intra se circiter octoginta haberet. Sed spinax unus ex mustelis recipere prolem spinæ impedimento non potest. neque uero pastinaca & raia ex planis recipiunt propter caudæ asperitatem. Raia etiam suam non recipit sobolem, tum capitis magnitudine, tum aculeorum impedimento. nam ne animal quidem una hæc parit, ut dictum est. Discrimen, quo hæc inter seipsa discrepent, & generatio ex ouo ad hunc modum est.

De affluentia genitalis seminis in piscibus maribus foetus tempore, quomodoq; differant genitales meatus maris, & foeminae: deq; cartilagineorum partu. Caput XXI



Ares autem piscium tempore coitus, meatus plenos seminis genitalis ita habent, ut attritu facile semen ipsum effluat candidum. meatus hi à præcordiis, uenæq; maiore oriuntur bifurces. Patentq; eo tempore etiam imperitis, scilicet incremento seminis, & turgentis fastu libidinis, interdum enim, ac nonnullis admodum incerti redduntur, ut de restibus in auium genere expositum est. Differunt inter se meatus genitales maris & foeminae, tum alijs rebus, tum etiam quod maris lumbis inhaerent firmius: foeminae mobiles sunt, & membrana tenui continentur. sed hæc quemadmodum se habeant, ex descriptione dissectionum consideranda sunt. Superfoerant cartilaginea genera, & ferunt uterum mensibus complurimum senis: sed sæpissime qui ex mustelis stellares uocantur, quippe qui mense bis pariant. initium autem coitus mense Septembri est. Cæteri musteli bis anno pariunt, excepta canicula, quæ semel, omnia in Vere hæc pariunt. Squatina etiam autumnio, occasu uergilarum, qui

qui partus secundus est. primus enim uerno fit tempore: sed secundus felicius est. Torpedo circa autumnum. Repetunt cartilaginea littus & uada, pelago & alto relicto gurgite, cum tempus pariendi instat, ut neque tepore careant, & progeniem tutius collocent. Piscium caterorum diuersa genera coire uisum à nemine est. Squatinam solam & raïam hoc facere creditur, argumento piscis cuiusdam, qui nomen ex utroque compositum trahit rhinobati, quasi squatinoraïam appelles. est enim parte priore raïæ similis, posteriore squatinæ, tanquam ex eo utroque proueniens genere. Musteli igitur, genusq; omne mustelinum, ut uulpecula, ut canis: & plañi, ut torpedo, raïa, leuiraiā, pastinaca, modo quo diximus gignunt animal, cum  
10 intra se oua pepererint.

De partu, & pullorum numero piscium uiuiparorum, delphino, balena, uitulo marino,  
& reliquis, quæ cetæ appellantur. Caput XII



Elphini, balenæ, & reliqua cetæ, quæ non branchias, sed fistulam habent, animal generant. Additur ijs pristis, & bos, nullum ex ijs enim oua habere cernitur: sed statim fœtum, ex quo redactio in formam animal constat: quemadmodum homo & quadrupedes, quæ animal pariunt. Delphini singulos magna ex parte adunt: interdum tamen & binos. balenæ uel binos complurimum, magnaq; ex parte uel singulos procreant. idem & phocænæ, id est tursioni, partus, qui delphino similis est, nascens in Ponto, sed interest, quod minor tursio est, dorso ampliore, colore cæruleo. Complures eum genus esse delphini opinantur. Spirant quæ fistulam habent omnia, & recipiunt aërem: haud enim carent pulmone. & quidem uisus delphinus est dormire, rostro emerso, ac stertere. Iac & delphinus habet, & tursio, quo suos nutriunt fœtus, gestantq; eisdem infirmos infantia. adolescit celerius proles delphini, quippe quæ annis decem ad summam perueniat magnitudinem. gestatur utero decem mensibus, partus delphinis ætate, nec ullo tempore alio. Fit etiam ut delphini tricenis diebus occultentur, & lateant circa ortum canis syderis. adultos etiā fœtus diu comitantur. Magna erga gnatos charitas in hoc animali est. uiuit annis com-  
30 pluribus. Constat enim nonnullos uixisse annis uiginti quinque, alios etiam triginta, quod cognitum est, præcisa à piscatoribus cauda, ut quos ita reddidissent mari, captos item agnoscerent, & temporis spacium scirent. Vitulus marinus generis ambigui est: nam & mari degit, quanquam humorem non recipit, sed spirat, ac dormit, & egressus in terram parit in litore, ut terrestre. sed quoniam plus temporis mari, quam terra immoretur, cibumq; ex humore perat, ideo in aquaticis de eo narrandum est. Ergo hic animal & concipit statim intra se, & parit: lecundas quoque emittit, & lac reddit modo pecudum. parit singulos, aut geminos, & complurimum tres. mammis, quas geminas habet, educat fœtum ritu quadrupedum, parit ut homo omni tempore: sed maxime cum primis capris, prolem circa duodecimum diem à partu deducit in mare, subinde assuefaciens. illa declius  
40 fertur, nec ambulat, cum nondum inniti suis pedibus ualeat. colligere seipse uitulus & contrahere potest: carne enim abundat, mollisq; est, atque ossibus cartilaginosis constat. interficitur difficulter, nisi elisis temporibus capitis: corpus enim totū carnosum est. mugitus ei in somno, genitale fœminæ simile raïæ est. omnia uero id genus muliebris sexus similitudinem referunt.

Generatio, partusq; aquaticorum, quæ animal, uel intra se, uel foris pariant, ita agitur.

De partu piscium ouiparorum, deq; sexus foeminae, & maris discrimine. Caput XIII



**P**isces autem qui oua pariunt, uulua bifurcem, ac inferius positam habent, ut dictum est. Pariunt oua omnes, qui squamis teguntur, ut lupus, mugilis, etelis, & qui cādidi appellatur, & qui laues, praeterquam anguilla. ouum ipsum arenidum est, quod etsi utero cōtinetur, tamen detectum, & per seipsum constare uidetur, quia tota uulua ouis reposita est. itaq; sit, ut in paruis quidem pisciculis oua tantummodo gemina esse uideantur: nam ob tenuitatē exiguitatemq; uulua incerta in ijs est. De coitu piscium satis dictum iam est. Sexu autē eos quoq; distinguit apertū est. Pars enim piscium maxima consummatur mare & foemina. De rubelione & hiatula ambigit, omnes enim 10 grauidae capiuntur, consistunt itaq; oua per coitum, in ijs qui uenerem norunt: sed non coitu tantū, uerumetia sine coitu. quod argumento constat nonnullorum fluuiatilium: nam phoxini statim, propē dixerim, cum nati sunt, & admodū parui, adhuc oua habent. spargunt sua oua omnes, & magnā ouorum partem (ut narratur) mares deuorant: alia pereunt in humore. Quae autem locis opportunis adita sint, haec feruantur, nam si omnia feruarētur, nimia cuiusq; generis esset copia, nec uero haec omnia secunda locatur, sed ea certe, quibus aditus mas semen asperferit genitale. sub partu enim mas sequens, semen ouis aspergit: & quae uitale id uirus contigerit, ijs pisciculi enascuntur. ceteris prout fors tulit, euenit. hoc idem & in mollium genere fit, mas enim sepia, oua quae foemina adiderit, persequitur, suum semen aspergens. quod uel in reliquis eiusdē generis fieri ratio est. Verum non nisi in sepijs hoc uisum adhuc est. Pariunt iuxta littora gobiones, suaq; oua lapidū amplexibus mandant, latiuscula, & arenida. Idem & ceteri faciunt, quoniam littora & tepidiora sunt, & tutiora, ne foetus a maioribus absumentur. cibum etiam praebent uberius, unde fit, ut in Ponto circa Thermodontem annē plurimi pariant: est enim is locus tranquillus, tepidus, & aquarum dulcium copiosus. Pisces qui oua adunt, semel pariunt anno: praeter fucas pusillas, quae bis pariunt anno. Differt hoc in genere mas a foemina, quod nigrior, & squamis amplioribus est. Ceteri pisces oua eodem foramine uuluae adunt. Qui autem acus uocatur, unus tempore pariendi utero dehiscente oua emittit. habet enim hic rimam quandam sub uentre imo, ut caeciliae serpentes. a partu autē uiuit, & uulnus callescit. Generatio ex ouo simili agitur modo, siue intus, siue foris est ouum. summo namq; ouo innascitur foetus membrana obducta. oculi primum patent grandes, & in globi speciem afformati. quare constat non similiter gigni, atq; ex uermibus, ut quidam putarunt. contra enim in illis euenit, ut pars inferior maior inter initia sit, oculi & caput postea augeatur. ouo autem rupto, foetus uelut nucleus constat, qui primum nullum accipit cibum, sed ouis humore iam hausto incrementum. post nutriuntur aquis dulcibus fluuiorum usq; dum satis augeantur. Defertur ex Ponto in Hellepontum purgamentum quoddam illius maris, quod algae nomine phycos appellant, colore pallidum. florem algae id esse alij uolunt, atque ex eo fucariam algam provenire. fit hoc aestatis initio, eoq; 20 tum ostreae, tum etiam pisciculi eius loci aluntur. Purpuram quoque suam florem hinc trahere nonnulli existimant.

De partu & generatione piscium lacustrium, fluuiatiliumq;.

Caput XIII




**L**acustres & fluuiatiles pisces quinto suae aetatis mense uterum gestare magna ex parte incipiunt, pariunt omnes intra annum, nec semen generationis simul omne emittunt, sed modo marinarum. hic quoque semper intra se aliquid plus minus foeminae ouorum, mares liquoris prolifici retinent, pariunt temporibus aestatis. Cyprini quinquies, aut sexies

sexies anno, partumq; syderum ratione potissimum faciunt. erica ter, reliqui semel  
 ædunt oua, in stagnis fluuiorum, & arundinetis lacuum, ut phoxini, & perca. Si-  
 luri & perca continentem emittunt suū fœtum, ut rana. adeo enim fœtus ipse con-  
 tinuo filo sibi cohaeret, ut perca quidem, quoniam latior est, piscatores in lacu arun-  
 dine glomerent, pariunt siluri grandiores stagno altiore, quippe cum nonnulli uel  
 trium passuū altitudine pariant. minores breuiore contenti sunt gurgire, præcipue  
 ad radices salicis, aut cuiusuis arboris. atq; etiā inter arūdines, & algas, & muscosam  
 congeriem, non solum pares cum paribus, sed etiā admodum grandes cum paruis  
 ueniunt: ad motisq; meatibus, quos aliqui umbilicos uocant, fœmina ouum, mas li-  
 10 quorem uenereum depromit. & oua, quæ liquor ille uitalis contigerit, candidiora  
 extemplo cernuntur, maioraq; reddi eodem die propemodum dixerim. Paulo au-  
 tem post oculi fœtus exsunt cōspicui, qui in quouis piscium genere perinde ut in  
 cæteris animalibus statim patefcunt, prægrandesq; apparent. Quæ ex ouis non at-  
 tingerit liquor masculi ille uitalis, hæc sterilefcunt, & superuacua sunt: ut in marino  
 etiam genere incidit. fœcundis iam ouis pisciculo increscente, detrahitur uelut pu-  
 tamen, quod membrana est ouum ambiens, & pisciculum. oua tacta à fœtifico ma-  
 ris semine, admodum glutinosa reddūt, ad cespites coeuntia, aut ubi pepererint.  
 Mas oua quæ ædita sunt, custodit: fœmina ab it cum depererit. Tardissimum siluri  
 incrementum ex ouo est: quamobrem mas sæpe uel quadraginta & quinquaginta  
 20 diebus assidet, custodiens oua, ne à piscibus occurrētibus absumātur. Secundæ est  
 tarditatis generatio cyprinorum: pariq; modo oua ædita à mare seruantur. At mi-  
 norum nonnulla, uel tertio die speciem pisciculi capiunt. augētur oua, quæ semen  
 maris attigerit, ut dictum est: & eodem die, & post, fit ouum siluri, quantū eruum  
 cyprini & reliquorum generis eiusdem magnitudine milij. hæc ad hunc modum  
 pariunt atq; generant. Erica gregatim sua oua gurgiti altiori mandat congesta, con-  
 trā, quem fullonem appellant, is littora petit tranquilliora, sed is quoque gregalis  
 est. Cyprinus, balerus, & cæteri ferè omnes uadis intrudūt sese cum parturiūt. ac sæ-  
 penumero singulas fœminas mares tredecim, & quatuordecim persequunt. Mox  
 30 fœmina oua procedēdo emittit, mares sectantes semen suum, ouis respergunt: ue-  
 rum plurima pereunt. quod enim fœmina non stabilis, sed mutans continue parit,  
 dissipari oua necesse est, uidelicet ea, quæ non in materiem inciderint aliquam, sed  
 excepta ab unda ferantur. neque est enim qui sua oua custodiat, excepto siluro, &  
 cyprino. sed cyprinus tunc ea custodit, cum cōgesta repērerit. Habēt mares omnes  
 semen genitale, præter anguillam, quæ neutrum neq; ouum, neque semen sortita  
 est. Ascendūt de mari in lacus & fluuios mugiles, contrā, anguilla inde in mare ue-  
 niunt. pisces maxima quidem ex parte ouo gignuntur, ut dictum iam est.

De generibus piscium, quæ uel limo, uel arena, uel spuma maris ex imbre  
 excitata procreantur.

Caput XV

40  Ed sunt qui & limo, & arena proueniāt, etiam ex ijs generibus, quæ  
 per coitum, & oui primordio generentur. quod tum alijs locis palu-  
 stribus, tum uero apud Gnidū factū olim memoratur. Stagnis enim  
 sub canis ortu resiccatis, & limo iam arido, ubi primum imbribus re-  
 stagnare loca inciperent, pisciculi nascebātur generis mugilum, quod  
 per coitum procreatur, magnitudine haleculæ parua: nec in his aliquid uel oui, uel  
 feminis continebatur. Quinetiam in nonnullis Asiæ amnibus, quæ effluunt in  
 mare, pisciculi quidam magnitudine naricarum modo eodem proueniunt. Sunt  
 qui omne mugilū genus sponte oriri opinentur: sed non recte: nam & oua, eorum  
 50 *id est naricarū. epse-  
 ti à Plinio*

forminae, & semen genitale mares habere cernuntur. Verum genus quoddam eorum est, quod non coitu, sed ex limo, arena uel enascatur. Sed nonnulla uel sponte generare, ex ijs quae per coitum prodeant, satis ex ijs constat, quae autem nec ouum, nec animal pariant, ijs ortus uel ex limo, uel ex arena, & per summa facta putredine agitur: qualis etiam apuae origo spuma nuncupata ex terra arenosa consistit, quod quidem apuae genus nec incrementum capit, nec prolem affert, & temporis longioris spacio perit, sed denuo nascitur. unde fit, ut breui quodam tempore excepto, omnibus fere anni temporibus generetur: quippe cum spuma illa ab arcturo autumnali ad Ver usque eduret. efferri id pisciculi genus funditus de terra, argumentum est, quod nisi tempore tepido non capiatur, utpote quod de humo ad summa, teporis gratia ueniat. Quin & solo agitato, detractaque eius collusione, copiosior & melior exit, caetera apuae genera deteriora propterea sunt, quia cito augentur. Fiunt locis umbrosis, apricis uel, quoties temporis beneficio solum tepescit: ut in Attica terra apud Salaminem, & iuxta Themistoclaeum, & in Marathone. Locis enim huiusmodi spuma illa consistit, & tempore tali apparet: sed non nusquam uel cum aqua de caelo incessit, oritur pisciculus hic in spuma, quae imbre admissa caluerit, unde nomen spumae accepit, ferturque interdum per summa maris, cum coelum tepidum est, & in spuma fluitante, perinde ac in fimo uermiculus uoluitur. Quamobrem in loca complura genus id apuae adfertur ex alto, & copiose quoque generatur, & capitur anno quieto & humido. Reliqua apua fetura piscium est, quae enim gobionaria dicitur, gobiones paruos ignobiles, qui terram subeunt, creat, quam uero phalericam uocant, membradas gignit: ex quibus sardinae, ex sardinis sardae oriuntur. Genus apuae, quod in portu Atheniensium nascitur, encraulos dictos progenerat, quinetiam genus aliud apuae est, quod alecum, & mugilum sit fetura. Spuma autem altera illa sterilis humida est, breueque (ut dictum est) tempus edurat, mox capita & oculi restant, sed iam piscatores quemadmodum deportare possent, inuenerunt, sale enim aspersa, plus temporis asseruari potest.

Encrasicholos reddidit anti- quis interpres: & ita Hesichius habet.

## De procreatione anguillarum.

## Caput XVI



Anguilla nec per coitum procreantur, nec pariunt oua. nec uero capta unquam aliqua est, quae aut semen genitale, aut oua haberet. Meatus quoque uel semini, uel uuluae accommodatos, nulla rescissa ostendit. Sed hoc unum inter sanguinea genus totum sine coitu, sine ouo procreatur. quod ita esse argumento constat, quod in nonnullis feculentis stagnis aqua omni exhausta, & limo detracto, anguilla denuo generantur, ubi aqua accesserit pluuia: nam siccis temporibus gigni nequeunt, etiam in lacu perenni: quippe quae imbre & uiuant, & alantur. sed hoc genus non coitu, non ouo creari apertum est. Videntur tamen nonnullae habere facultatem gignendi, quod in aliquibus lumbriculi fiant: his enim generari anguillas creditur: quod error est, sed certe ex his prodeunt, quae terrae intestina uocantur, quae sponte in luto, humescenteque humo proueniunt. Iam aliae absolui ex his uisae sunt, aliae scalpis, dissepitisque intus apparuerunt, oriuntur haec intestina dicta, tum in mari, tum etiam in fluuijs, stagnisque, putredinis maxime ratione: sed in mari, quae algae sunt: in stagnis autem & fluuijs iuxta ripas. calor enim amplius eas subiens partes, facit, ut putreant. Talis generatio anguillarum est.

De utero, et tempore partus aquatiliū, quomodoq; alterum ab altero  
in foetibus emittendis differat.

Caput XVII



Artus autē piscium neq; eodem tempore, nec simili modo omnium  
fit: nec pari temporis spacio geritur uterus. greges ante coitum ma-  
rium, & foeminarum consistunt: sed sub coitu & partu cōiugia agun-  
tur. Vterū uero alij diebus amplius tricenis ferunt, alij minus, omnes  
tamen spaciū numeris distinguendū septenarijs sortiūtur. Plurimum  
temporis datur ijs, quos nōnulli appellāt marinos. Sargus coit mense Decēbri, fert  
uterū dies triginta. quinetiā in mugilū genere, qui labeo a nōnullis uocatur, & mu-  
co, eodem quo sargus tempore coeunt, & tantundē temporis ferūt. laborāt omnes  
per id tempus, quo gerūt uterū. Vnde fit, ut tunc potissimū ruant in terrā, atq; exci-  
dant. ferūtur porro graui stimulo agitati in terrā, atq; omnino id tēporis motu per-  
petuo incitātur, donec pariat. sed omniū maxime mugilem ita sollicitari certum est.  
requiescūt a partu continuō. exitus pariendi pisciū compluribus est, ubi uermiculū  
nati in uentre fuerint. innascuntur enim minuta quādā animalia uermiculi specie,  
quæ partū expellunt. Parit solitariorū genus in Vere. plurimis deniq; partus circa  
æquinoctiū uernū agitur. cæteris non eadem anni tempestas accommodata est: sed  
alijs æstas, alijs autumnale æquinoctiū attribuitur. parit prima hoc in genere anthe-  
rina, quam aristam appello, & iuxta terram. capito autē ultimus est. constat id cum  
foetus aristæ primum, capitonis nouissime appareat. Mugilis etiā inter primos par-  
tum accelerat, & salpa æstatis initio locis plurimis, nonnusquam enim autumnō.  
Quinetiam sacer æstate parit, mox aurata, lupus, mormur, molaris. deniq; omnes,  
qui cursiones uocantur ultimi gregalium, mullus & graculus pariunt autumnō.  
Mullus sua oua limo cōmittit, unde fit, ut serō pariat. Diutius enim frigus cōtinetur  
in limo. Graculus post mullum foetificat inter algas, utpote qui locis saxosis degat.  
fert uterum longo temporis spacio. Aleces bruma pariūt. cæteri qui pelagici sunt,  
fert uterum longo temporis spacio. Aleces bruma pariūt. cæteri qui pelagici sunt,  
æstate magna ex parte. cuius rei argumentum est, quod minime per id tempus ca-  
piantur. Foecundissima omnium piscium alec esse uidetur. Raia inter cartilaginea  
foetificat numerosius. uerū quod de facili pereunt, hinc efficitur, ut appareant pau-  
ca. ædit hæc oua diuersa, & iuxta terram. Omnino genus cartilagineū minus fo-  
tificat, quia animal gignit: seruari tamen sua potissimum magnitudine potest. acus  
etiā appellata, serō foetificat. Compluresq; eius generis disrupto, ac dehiscente ute-  
ro pariunt, non tam multitudine ouorum, quā magnitudine. & modo phalan-  
giorum proles parentē offusa circumdat: quippe quam discedere statim proles amor  
non sinat. & si tetigeris, fugiunt. Arista atterens aluum arenæ, parit. Thunni etiam  
præ nimia pinguedine dehiscunt, nec plus quā biennio possunt uiuere. cuius rei  
argumentū piscatores inde deducūt, quod cum aliquando limariæ anno superiore  
defecissent, thunni sequenti anno defecerint. Limarijs enim thunni prouectiores  
ætate anno esse putātur uno. coeunt thunni & scombri mēse Februario post idus.  
pariūt Iunio ante nonas. ædūt sua oua condita quasi utriculo. incrementū autē par-  
tus præcipua sumit celeritate. Cum enim thunni in Ponto pepererint, prodeūt ex  
ouo, quas alij scordulas uocāt, Byzantijs auxumas nomināt, quia diebus paucis ado-  
lescūt: quæ exeunt Ponto autumnō foetas comitātes: eodē autē redeunt uerno tem-  
pore iam adeptæ eam magnitudinē, qua limariæ nomen accipiant. Profecto omne  
pisciū genus celeriter adolescit, & præcipue in Ponto: quippe cum ibi incrementum  
singulis diebus planē intelligatur. sed amīæ longe cōspectius. omnino ita existiman-  
dum, ut eisdem piscibus, non eisdem locis degenibus, nec coeundi, ferendi ue tem-  
pus esse idem, nec foetificadi, aut proficiendi: nam & qui graculi appellantur, non-  
nusquam mēse tritici pariunt. Verum ita hæc nos exponimus, ut magna ex parte

Alj tuniæse

Theodor. pro  
pelamye &  
thymide, red-  
dit limariæ, &  
scit ex Plin.

res euenit. Congri etiā foeturam intra se continent: sed non omnibus locis æque id constat. nec ipsa foetura satis patet in utero pingui obeso: inest tamen serie quadam prolixiuscula, ut in serpentibus. quod certe ignis periculo innotescit. pingue enim absumitur, atq; euaporatur: oua autem crepant, & extrusa dissiliunt. Ad hæc si palpitēs, & atteras digitis pingue, leue utiq; senseris: ouum autem duriusculum. Congri itaq; alijs pingue habent, ouum nullum: alijs contrā, pingue nullū, ouum autem quale modo exposui possidēt. Sed de coitu, utero, & eiusmodi reliquis cæterorum animantium omnium, tum aquatiliū, tum uolucrum, atq; etiā terrestrium quæ oua pariunt, dictum iam est.

*De coitu, eiusq; tempore, & libidine quadrupedum quæ animal pariunt.*

10

Caput XVIII



Equitur ut pari modo de ijs, quæ in terrestriū genere animal pariunt, atq; etiā de homine differamus. coitū & priuatim & publice omnium diximus. Commune autem omnium animalium est, ut cupidine, uoluptateq; rei ueneræ maxime gestiant, atq; incitentur. Ferociunt fœminæ à partu, mares tempore coitus. Iam equi equos mordent, sterunt equitem, atque insequuntur. sues quoque feri acerrimè sæuiunt, quanquam per id tempus imbecilles ex coitu reddantur. dimicant inter se mirum in modum armantes sese, & cutem quamcrassissimam præparantes, indurantesq; attritu arborum. sæpe etiam luto obducto, ac resiccato, tergus inuictum contra ictus efficiunt. pugnant adeo acri certamine, grege relicto, ut sæpenumero mortem uterq; aduersarius obeat. Simili modo & tauri efferantur, & arietes, & hirci. Qui enim superiore tempore focij, iugi concordia pascerentur, coitus tempore dissidēt, & alter alterū libidinē rabie inuadit. Camelus etiam mas sæuit tempore coitus, siue homo, siue camelus accedat: nam equis quidē odio naturali aduersantur. Idem feris quoq; euenire apertum est. Nam ursi, lupi, leones, acrius per id tempus in eos qui accesserint sæuiunt. inter se tamen minus hæc dimicant, uidelicet ob eam rem, quia nullum ex ijs gregale est. Quinetiam ursæ à suis catulis uehementer ferociunt, ut canes à catellis. Et elephanti quoq; ad coitū efferari solent: quamobrem apud Indos ijs haudquam permitti inritum aiunt. libidinē enim rabie agitati, casus prosternunt male conditas, pluraq; alia incommoda faciunt, mitigari pabulī copia narratur. plagis etiam temperant, adductis alijs quibus ferire præcipiant. Quæ autem non uno tempore, sed sæpius anno coeunt, ut ea, quæ cum homine degunt, uerbigratia, canes, sues, ut minus efferentur, facit coitus copia. Incenduntur libidine ex fœminis equæ potissimum, mox uaccæ. Equæ itaq; equiunt: unde uocabulum id ab hoc uno animali trahitur, maledictio in mulieres libidinosas. Necnon euentari per id tempus equæ dicuntur: quapropter in Creta insula equos admittarios minime à fœminis semouendos censent. Cum uero ita affectæ fuerint, currunt relicta societate. simile hoc uerū est, ut quod subare in suis dicitur. currunt non orientem, aut occidentem uersus, sed ex aduerso aquilonis, aut austri: nec appropinquare quenquam patiuntur, donec uel defatigatæ desistat, uel ad marem deueniant. Tum aliquid emittunt, quod hippomanes appellatur, eodem, quo illud quod nascitur, nomine. Tale hoc sanè est, quale suis illud, quod apriam uocant: sed hoc præcipue ad amoris ueneficia petitur. Equæ tempore coitus colligunt sese, & societate magis quàm antea gaudent. faciunt caudam crebrius, uocem immutant, humorem emittunt suis genitalibus similem genituræ, sed multo tenuiorem, quàm mares, quem hippomanes nonnulli appellant, non quod pullis nascentibus adhæret. accipiem humorem difficile esse aiunt, quod paulatim admodum labitur. Mingunt etiam pluries, atq; inter se ludunt cum equiunt, hæc de equis. Vaccæ tauriunt, & libidine adeo incenduntur,



duntur, ut bubulcieas tenere, aut capere nequeant, indicium tum equarum, tum uacarum suarum libidinis praestant, genitalis specie prominentiore. Vaccae etiam mingunt crebrius more equarum. Ad haec, uaccae tauros superueniunt, & sequuntur sedulo, & assidue. Turgent ad coitum prius minores natu, quam maiores, tum in equorum genere, tum in bouum. Temporis etiam beneficio, & corporis ualitudine propensiora redduntur ad uenerem animalia. Equarum libido extinguitur magis iuba tonsa, & frons tristior redditur. mares in hoc genere foeminas sibi societate coniunctas dignoscunt olfactu, etsi paucis ante diebus una fuerint. quod si foeminae diuersae permisceantur, mares alienas mordendo expellunt, suasque singuli seorsum habentes pascuntur. Tricenae, aut paulo plures singulis dantur. quoties mas accesserit aliquis, confestim in eum maritus conuertitur, & currens gyro aggreditur pugna: & foeminam, si qua se mouerit, morfu reuocat. Taurus tempore coitus tantum cum foeminis pascitur, ceterosque oppugnat mares, temporibus ceteris mares inter se conuersantur: quod coarmentari dicitur. Iam Epiri prouinciae tauri saepius trimestri temporis spacio non apparent. Omnino fera omnia, aut certe plurima, non ante cum foeminis ad commune pascuum ueniunt, quam tempus sit coeundi. Sed cum iam per aetatem licuerit, segregantur mares a foeminis, seorsumque pascuntur. Sues foeminae, cum libidine excitatur, quod subare dicitur, uel homines aggrediuntur. Canes eodem illo modo affecta, canire dicuntur. Prominet genitale in foeminis, cum ad coitum stimulantur, & locus humescit, equabus humoris aliquid ibi defluit per id tempus. purgatio menstruorum fit quidem & ceteris, sed nullaeque ac mulierum. Oui & caprae tempore coeundi indicatur, quod idem post coitum etiam fit ad tempus, mox desistit, donec parturiant: tum denuo indicatur, quare pastores proximum esse partum intelligunt. A partu autem purgatio sequitur abunde: primum leuiter cruenta, postmodum ualde. uaccae, asinae, equae, modo quidem ampliore quam supradictis emittitur, utpote magnitudine excedentibus, sed multo ex portione minus. bos itaque foemina cum coitum affectat, leuiter purgatur, quantum hemina dimidium, aut paulo plus. Tempus autem coeundi tunc potissimum est, cum purgatur. equa facillime omnium quadrupedum parit, uaccae admodum purgamentis, minimumque emittit profluuium sanguinis, uidelicet pro corporis magnitudine. Conceptus indicium maxime in uaccis, equabusque, cum menses cessauerint, spacio temporis bimestri, trimestri, quadrimestri, semestri. sed id percipere difficile est, nisi quis tandudum secutus, assuetusque admodum sit. quamobrem non desunt, qui menses in his animalibus negent. Mulabunt menses nulli mouentur, sed earum urina crassior, quam marium est. Omnino excrementum uesticae quadrupedum crassius, quam hominum est. Inter eas tamen quadrupedes, oues foeminae, & caprae, crassior rem reddunt urinam quam mares. Asinae contra tenuiorem quam mares, & uaccae acriorum. A partu urina quadrupedum omnium crassior redditur, & magis eorum quam minus purgatur. Lac fieri incipit ad speciem puris initio coitus, sed utile postea est, cum pepererint. Pinguescunt tam oues quam caprae, cum gerunt partum, eduntque amplius, quod idem de bubus etiam, ac ceteris quadrupedibus affirmandum est. Sunt porro animalia propensiora ad coitum prope dixerim omnia uerno tempore. sed sunt tamen, quae non eo tempore coeant, uerum prout quaeque alere suos foetus commodius possunt, ita tempus sibi conueniens habeant. Sues cicures uterum ferunt menses quatuor. numerus partus plurimum ad uicenos. si tamen multos pepererint, educare omnes non queunt. senescentes etiam pariunt quidem simili modo, sed tardius coeunt, implentur uno coitu. saepius tamen superuentum patitur, ea de causa, quod post coitum humorem, quam apriam nonnulli appellant, emittunt: quod quidem commune omnibus incidit, sed aliqua una cum hoc semen etiam

admissum efficiunt. Fœtus, qui in utero læsus minutusq; fuerit, merachœrum dicitur, quasi posthumum uoces. quod in parte qualibet uulua accidere potest. Cum scrofa peperit, primam mammam porco, qui primus in lucem prodijt, præbet. cauendum ne prima subatione ante aures flaccidas coitus fiat, frustra etenim fuerit. At si plena iam auuiditate ac desiderio libidinis turgido admissura fiat, unus (ut modo dixi) initus satis sit, prodest apro coeunti hordeū apponere pabulo. quod idem & scrofae fœta commodū est, sed elixum. Sunt & scrofae alia statim prolis fœcundæ laudabilis, aliae incrementis melius generant. Suem altero oculo amisso breui extinguui magna ex parte nonnulli existimant, plurimis uita ad annos quindecim; aliis quibus etiam propè ad uicenos.

10

De coitu, satiatione ouium, &amp; caprarum.

Caput XIX



Ves, & caprae terno, aut quaterno coitu implentur, & si à coitu imber accessit, abortū infert. pariunt maxima ex parte singulos, sed aliquando & binos, & ternos, & quaternos. ferūt quinq; mēsis, tum oues, tum caprae. Vnde fit ut locis nonnullis, quibus coeli clementia, & pabuli copia est, bis pariāt. uita capris ad octonos complurimum annos, ouibus ad denos: sed magna ex parte ad pauciores. duces pecoris tamē uel ad quin denos protrahunt uitam. Singulis ouilibus singuli duces constituuntur, qui quoties suo nomine à pastore uocantur, antecedunt, quod ab ineunte ætate facere assuescunt. Oues æthiopicae uel ad duodecim, & tredecim annos uitam agunt. Caprae etiam ad decem, & undecim. Coeunt tam oues quā caprae, quandiu uiuunt. Pariunt geminos, tum pabuli beneficio, tum si pater aut mater, uim eam geminandi per naturam obtineat. Mares autem aut fœminae generantur ui, tum aquarum, tum admissariorum. Nam & aquae faciunt, ut fœminae mares uel concipiantur, ad hæc, aquilonis flatu mares potius concipiuntur, austris fœminae. Vis tanta est aquilonis, ut uel ea quæ non nisi fœminas pariant, immuter ad proles masculæ procreationem. Spectare ad aquilonem oportet cum coeunt fœminae, quæ mane iniri solent, marem, si serò diei admiseris, non pariuntur. Candidi, nigri uel efficiuntur fœtus, si sub lingua arietis uenæ nigrae aut candidæ habentur, cuius enim coloris sunt uenæ, eiusdem & uellus est. uarium etiam, si plures uenarum colores sunt. Quæ aquam salis uulam bibūt, maturius coeunt, nec solum ante coitum, sed etiā à coitu salendum est, atq; etiam uerno tempore. Capris nullum ducem pastores constituunt, quia earum natura non stabilis, sed lubrica atq; mobilis est. in grege ouium, si maiores natu tempestiue libidine incitātur, annum esse felicem gregi pastores confirmant, sed si minores, infelicem.

De coitu, &amp; satiatione canum, eorumq; uitæ longitudine.

Caput XX



Anum genera plura sunt. Coit laconicum mense suæ ætatis octauo, & crus iam circa id tempus attolentes nonnulli urinam reddunt. Impletur canis uno initu, quod in furticijs maxime constat initibus. implet enim qui semel inierint, gerunt laconicae uterum parte sexta anni, hoc est sexagenis diebus, aut uno, uel altero plus, minus uel. Catelli cæci gignuntur, nec ante duodecimum diem uisum accipiunt. Coeunt canes postea quā pepererunt, sexto mense, nec citius. Sunt quæ parte quinta anni uterum ferant, hoc est duobus & sexaginta diebus, quarum catelli duodecim diebus luce carent, nonnullæ quarta parte anni, hoc est tribus mensibus ferunt, quarum catelli diebus decem & septem luce carent, tantundem temporis canire etiam fœminæ putantur. Menstrua huius animalis diebus septem mouentur, simulq; euenit, ut genitale promineat. uerum nondum per id temporis coitum pauuntur, sed sequens

sequeñtibus septem diebus. tempus enim quo toto canis libidine tenetur, diebus  
 quatuordecim magna ex parte describitur. Verū nonnullæ etiā ad sextridecimum  
 pruriunt. Purgatio autē quæ cōiuncta partui est, unā cum carellis nascētibz proue  
 nit, crasso pituitosoq; humore, redduntur etiā tenuiores à partu, & lac ante diebus  
 quinq; quā pariant, habent magna ex parte. uerum nonnullis etiā septem aut  
 quatuor diebus anticipat. Vtile statim ut pepererint, est. Genus laconicum, post  
 coitum diebus triginta, habere lac incipit. Crassum inter initia omnium est; deinde  
 processu temporis tenuius redditur. Crassius canum, quā cæterorū animalium  
 lac est, excepto scrofæ ac leporis. Indicium in mammis etiā apparet, cum ætatem  
 10 coeundi iam habent. Fit enim perinde ac in hominibus, tumor in papillis mamma  
 rum, & cartilago quædam consistit, sed difficile id perceperis, nisi habeas usum rei:  
 carent enim hæc indicia magnitudine, hoc igitur fœminæ euenire certum est. mari  
 nihil eiusmodi accidit, crus mares tollentes, mingunt magna ex parte quidem sexto  
 mense ætatis, sed nonnulli uel serius, octauo scilicet mense id faciunt: atq; etiā ma  
 turius quā sexto, quod autem simpliciter dixerim, cum coire incipiūt, tollunt. fœ  
 minæ omnes confidentes mingunt. Verum in hoc etiā sexu nonnullæ crure elato  
 minxerunt. Parit canis duodecim complurimum, sed magna ex parte quinq; aut  
 sex, unum etiā aliquam peperisse certum est. Laconicæ magna ex parte octo pa  
 riunt, coeunt quandiu uiuunt, & mares & fœminæ. Peculiare generis laconici est,  
 20 ut cum laborarint, coire melius quā per ocium possint. uiuit in hoc eodē genere  
 mas ad annos decem, fœmina ad duodecim. Cæteri canes maxima quidē ex parte  
 ad annos quatuordecim, sed nonnulli uel ad uiginti protrahūt uitam. Quamobrem  
 recte apud Homerum canem Vlyssis uicesimo anno mori aliqui iudicant. Laconici  
 fanē generis fœminæ, quia minus laborant, quā mares, uiuaciores maribus sunt.  
 at uero in cæteris, etsi non late admodum constat, tamen mares uiuaciores sunt.  
 Dentes canes non mutāt, præterquam eos, quos uocant caninos, eosq; quarto æra  
 tis mense tam fœminæ, quā mares. Vnde fit, ut diuersa sit autorum sentētia. Alij  
 enim quod duos tantummodo mutāt, negant omnino ullos mutari, cum eos pau  
 30 cos reperire difficile sit. ali j cum hos uiderint, cæteros quoq; pari ratione mutari exi  
 stimant. Aetatis iudicium ex dentibus sumitur: quippe cum iuniores candidos ha  
 beant, & acutos: seniores nigros, & hebetes.

De coitu, &amp; partu boum, deq; maris &amp; fœminæ ætate.

Caput XXI



Os uno initu implet, agitq; uehementer, ita, ut fœmina uix tolerans  
 succumbat. Si forte conceptio pererrauerit, uicesimo post die marem  
 fœmina recipit. Seniores tauri nec sapius quidem fœminā eandem,  
 eodem superueniūt die, nisi ex interuallo. At iuniores, & eandem sæ  
 pius cogunt, & pluries petunt, ac superueniunt uigore suæ ætatis. Sa  
 lax minime inter mares bos est. coit qui uicerit. cumq; is uenere iam debilitatus lan  
 40 guerit, aggreditur uictus ille languentem, & plerunq; superat. Coire tum mares,  
 tum, fœminæ anno ætatis primo peracto incipiūt, quoad facultas sit procreandi, ue  
 rum quod magna ex parte fit, uel anniculi, uel naçi octauum mensem uenerem  
 adeunt. Sedenim quod maxime confessum habemus, bimatu generant. Ferunt  
 utrum menses nouem, decimo pariunt. Sunt qui decē rotos menses, exceptis pau  
 cis diebus, affirmant. Quod autē in lucem præcurrerit hæc tempora, id abortiuum  
 est, uitaleq; minime, etiā si paulo maturauerit partum: præmolli nanque, imper  
 fectaq; ungula prodit. Pariunt singulos, geminos raro. Quandiu uiuunt, & coire  
 solent, & parere. Viuit magna ex parte fœminæ annos quindecim, atque etiā  
 mares excisi, nonnullis ætas, uel ad uiginti annos, atque etiā plures, si corpore be

ne habito sint, nam excisos assuefaciunt, & duces cōstituunt boum, ut ouium, qui plus temporis quàm ceteri uiuunt usu exercitij, & copia pabuli, uigent quinquennes maxime, quocirca Homerum quidam recte dixisse aiunt, Quinquennem taurum, & bouis lustro florentis. Idem nanq; significari arbitratur. Dentes bimus emittit bos, nec uniuersos, ut equus, ungulas, cum dolore articulorum laborat, non amittit: sed pedes tantummodo intumescunt uehementer. Lac à partu utile est, antequam peperit, caret lacte. quantum lactis prouenerit primum concrefcens, perinde ut lapis durefcit, quod ita accidit, nisi aqua admisceatur. luuena recentior quàm annicula non patitur uenirem, nisi ostento. Iam enim uel quarto ætatis mense coisse perspectum est. Initium coitus, plurimis quidem mense Aprili & Maio: sed nonnulla etiam ad autumnum usque tempus coeundi deducunt. Cum plures grauidæ sunt, & facile initum patiuntur, nimirum pro signo hyemis & imbrum id accipitur, menses & uaccis fiunt, ut equabus, sed minus.

*De coitu, & partu equorum, de amissione dentium, deq; maris & foeminae ætate.*

*Caput XXII*



Quos coire incipit bimus, tam mas quàm foemina: sed hoc in paucis fit, pulliq; eorum ipsoꝝ minores imbecillioresq; sunt. Quod autem plurimum trimatu, tam mares quàm foeminae incipiunt, & proficiunt subinde ad prolis præstantiam, in uicesimum usque annum. Fert uerum equa menses undecim, parit duodecimo mense, equus non certo dierum numero implet, sed aliquando uno, aut duobus tribus uel, aliquando pluribus, serius certe quàm asinus, equam superueniens implet. Coitus non tam laboriosus equis, quàm bubus est. Salacissimum omnium, tum foeminarum, tum marium equus est, homine excepto. Iuniorum coitus præter ætatem contingit pabuli bonitate & copia, pariunt magna ex parte equæ singulos, sed gemellos quoq; aliquando complurimum procreant. mula etiã gemellos peperit, quæ quidem pro ostento accipiuntur. Coire itaq; incipit equus uel tricesimo mense: sed quoad digne procreare possit, tunc tempus est, cum dentibus mittendis cessauit. uerum iam nonnullos etiam cum mutant, implere potuisse aiunt, idq; fieri ita confirmant, nisi natura steriles sint. Equo dentes quadraginta numero sunt, quorum primores quatuor, mense tricesimo mutantur, bini utrinque, supra dico, & subter, tum ubi præterea annum compleuerit, quatuor item modo eodem mittuntur: duo superius, totidemq; inferius. rursusq; anno altero peracto, simili modo quatuor alij mutantur. quibus iam præteritis annis quatuor, & mēsis sex, nullus præterea mittitur, quanquam euenisse in aliquo certum est, ut cum primis omnes amitterentur: atq; etiam in alio, ut cum ultimis omnes. sed hæc raro. Fit itaq; ut equo ferè tempus idoneum maxime sit ad procreandum, cum annum quartum, & sex menses compleuerit. seniores equi perfectio fecundiores sunt, tam foeminae, quàm mares. Equi uel suas matres & filias superueniunt, atque tunc perfectum esse argumentum uidetur, cum parentes suam ineunt prolem. Scythæ equab; is grauib; equitant, cum primum se mouerit foetus, & nimirum eas proficere ad partus facilitatem arbitratur. Cæteræ quadrupedes iacentes parere solent, quo fit, ut foetus obliqui omnium exeant. At uero equa cum tempus iam adendi appropinquaret, erigit se, stansq; emittit partum. Vita equorum plurimis ad decimumoctauum, atq; etiam uicesimum annum. sed nonnulli etiam quinque & uiginti, atque triginta egerunt. & si cura diligenter adhibeatur, uel ad quinquaginta protrahitur ætas. longissima tamen uita in pluribus ad tricesimum annum, quod magna ex parte fieri norimus. Foemina magna quidem parte quinque & uiginti annos uiuere potest, sed iam nonnulla etiã quadraginta

draginta uiuere. Minus temporis mares uiuunt, quam foeminae, propter coitum, & qui domi aluntur, minus quam gregarij, foemina quinquennio finem, tum longitudo-  
 tudinis, tum etiam proceritatis sui corporis recipit, sed mas sexennio, post, annis se-  
 quentibus totidem crescit in corpulentiam, & ad uiginti usque annos pergit profici-  
 ciens, uerum celerius foeminae quam mares perficiuntur: quanquam in utero ma-  
 res, quam foeminae citius, quemadmodum etiam homines, quod idem, uel in cate-  
 ris animalibus quae pariant plura, fieri solet. Lactare mulum semestri temporis spa-  
 cium referunt, mox fugi non pati; uel nanque humorem trahi, & cum dolore, equo  
 10 autem plus temporis tribuunt. Viget & equus & mulus a dentium ortu: cumque  
 prodierint omnes, non facile aetatem dignoueris. Quamobrem dici solet, certa sub  
 ortu, incerta ab ortu. denique post dentium ortum, eo maxime declaratur aetas,  
 quem caninu uocamus, breuior enim hic septennibus est, propter freni attritum  
 quod ad eum inijcitur: non septennibus maior quidem, sed non uertice extans ad-  
 actiore. Iunioribus acutior & procerior est. mas omnibus temporibus inuit, nec cessat  
 quandiu uiuit. Foemina etiam quandiu uiuit inuit, nec tempus ullum certum libi  
 dinem auferre: sed ingenium hominis arcet, aut uinculo, aut aliquo huiusmodi im-  
 pedimento: non tamen quouis tempore facto inuit, facultas enutriendi quod pe-  
 pererint, datur. Equum apud Opunta gregariu fuisse accepimus, qui annos qua-  
 draginta natus posset coire: sed adiumentum quoad sui pedes priores attollerentur,  
 20 desiderabat. Coeundi inuitu equis in Vere. Non statim a partu equa impletur,  
 sed intermisso tempore: & melius quarto aut quinto anno interposito procreat.  
 Omnino, si nihil plus detur, unum tamen interponere annum, & quasi nouale  
 facere necesse est. Equa igitur interposito tempore, ut dictum est, parit: at asina  
 continue parere potest, fit etiam in equorum genere, ut aliae omnino steriles sint,  
 aliae concipiant quidem, sed addere nequeant, cuius rei indicium aiunt, quod fo-  
 30 tus circum renes alia quaedam, specie propemodum renum, ita continet, ut rescissus  
 quatuor renes habere uideatur. Cum equa peperit, statim secundas deuorat, atque  
 etiam quod pulli nascentis fronti adharet, hippomanes dictum, magnitudine mi-  
 nus carica parua, specie latiusculum, orbiculatum, nigrum: hoc si quis praerupto  
 30 odorem moueat, equa excitatur, furitque agnito eo odore, quapropter id a ueneficis  
 petitur, & percipitur mulierculis. Si cum equa ex equo praegnanter coierit asinus,  
 foetus iam conceptus corrumpitur. Equorum ducem, ut bouum, nullum constitu-  
 unt: quoniam equorum natura non stabilis, sed mobilis, procaxque est.

*Quod equinae  
 cupidini simile  
 mortalibus a  
 more accedat.  
 Columella.*

*De coitu asini, & asinae partu, marisque & foeminae aetate.*

*Caput XXIII*



40 Sinus tum mas, tum foemina trigesimo mense coire incipit, eodemque  
 tempore dentes mittit priores: secundos autem sexto mense, atque  
 etiam tertios quartosque eodem, gnomonas hos quartos a disjudican-  
 da aetate nuncupant. Sed iam uel annicula asina concepit, ut perfici  
 proles ac adolescere posset. reijcit semen a coitu nisi interpellatur.  
 quamobrem statim post coitum uerberat, insectanturque, parit duodecimo mense,  
 singulatim magna ex parte procreat prolem, ea namque natura est, ut unum pariat,  
 sed nonnunquam gemellos etiam addit. Asinus quidem equi genituram corrup-  
 40 pit, ut dictum est, sed equus asini minime, cum equa iam asini inuitu conceperit. Lac  
 grauida habet mense decimo. A partu die septimo mari iungitur, eoque die iuncta  
 maxime recipit inuitum, sed postmodum etiam patitur. solet haec, nisi priusquam gno-  
 monem amittat, peperit, nunquam postea inuitum recipere. parere uel in conspe-  
 ctu hominis, uel in luce nolit, sed in tenebras ducitur cum parturit. si priusquam

gnomonem dimississet, pepererit, parere tota sua ætate potest, uita asinis amplior annis triginta, & fœmina uisacior mare est. Cum uel equus cū asina, uel asinus cum equa inierit, multo magis abortus consequitur, quàm cum unigenæ inter se iungantur: uerbi gratia, equa cum equo, aut asina cum asino. Euenit etiam tempus gerendi uteri, cum equus cum asino coierit, maris norma: id est, ut quanto spacio temporis mas perficitur suo in genere, tanto etiam fœtus, quem ipse procreat, absoluitur. At magnitudine corporis, specie, & uiribus, magis fœminæ, quàm mari simile euadit quod nascitur, si frequenter coëant, neque ullo interposito tempore cessent, quæ ita iunguntur, breui fœmina sterilesceat, qua de causa non frequenter ita coniungunt, qui curam huic adhibent rei, sed tempus aliquod interponunt. Non asinum equa, ut asina equum recipit, nisi asinus sit, qui equam suxerit. Admittunt de industria quos hippothelas uocant, ac si equimulgos cognomines, qui in pascuis modo equorum uiribus bonis superantes coëant.

De mulo, & eius coitu, & etate.

Caput XXIIII



Mulus superuenire, coireque incipit missis dentibus primis: sed septennis implere potest, etiam cum equa coniunctus Innum procreauit, post deinde superuenire non solet. mula quoque iam facta grauida est, sed non quoad perficeret, atque æderet prolem. In terra Syria super Phœnicem mulæ & coeunt, & parit omnes: sed id genus diuersum est, quanquam simile, prodeunt quos ginnos uocant ex equa, cum in gerendo utero ægrotauit, more pumilionum in ordine hominū, aut porcorum deprauatorum in genere suum, quos posthumos nūcupauit, & quidem ut pumilio, sic ginnus modum suo gentili excedit. Vita mulis ad annos multos, iam quidam uel octogessimum annum potuit agere, ut Athenis cum templum edificaretur, qui quamuis dimissus iam munere per senectam, commeans tamen, ac obiens iumēta exhortabatur ad opus: quamobrem decreto à nemine eum arceri à frumentorū aceruis sanctum est. Serius fœmina senescit, quàm mas. Nonnulli fœminam profluuio urinæ purgari aiunt, marem olfactu urinæ prius senescere, ortus eorum animalū talis est.

Plin. sic: Connitendo comitandoci, accendebat iumenta ad opus.

Indicium ætatis quadrupedum.

Caput XXV



Ætatem dignosci quadrupedū confirmant, qui in earum cura sunt constituti, si cutis prætenta maxillis, detracta, mox relaxata, ilico in suum redeat locum. hoc enim indicium recentioris quadrupedis est, ueteris contrā, si diutius rugata maneat cutis.

De utero, & etate cameli.

Caput XXVI



Amelus fert uterum menses decem, parit semper unum tantummodo: unipara nanque est, separant prolem à parente anniculam. Viuit diu, plus enim quàm quinquaginta annos, parit in Vere, & lac suum usque eò seruat, quo iam conceperit, tum lac, tum caro cameli suauissima omnium est, bibitur eius lac ad unam mensuram duabus, aut tribus aquæ admixtis.

De elephantorū coitu, deq; tempore quo uterus fertur, & eorū pullis.

Cap. XXVII



Elephantus tam mas quàm fœmina incipit coire anno ætatis uigesimo, ferendi uteri alij annum & sex menses, alij triennium statuunt, causa quamobrem incertum hoc sit, quod non pateat coitus, parit enitens posterioribus cruris, & subsidens cum dolore, pullus æditus ore fugit, non promulciscit, & statim cum natus est, cernit, & ambulat.

De coitu

De coitu suum, &amp; eius tempore.

Caput XXVIII



Ves ferax principio hyemis coeunt, Vere pariunt, petentes maxime inuia, praeupta, angusta, & opaca. mas cum foeminis conuersari dies triginta magna ex parte solet. Numerus partus, & tempus ferendi idem, atq; in urbanis suis est. Vox etiā similis: sed foemina uocalior est, mas raro uocem emittit. Mares castrati, maiores ferocioresq; euadunt, ut scite Homerus fingit, cum dicat:

Nutrijt exectum syluis horrentibus aprum.

Instar nō bruti, sed dorsi montis opaci.

Castratur, quod recentibus adhuc morbus pruriēs incūbit in testes, quō atterētes eam partē ad arbores, testēs extinguit.

De ceruorum coitu, partu, &amp; natura.

Caput XXIX



Erua plurimum subsidens coit, ut dictum iam est, marem enim sustinere non potest, ob eius contentissimum impetum. Verum tamen alii quando etiā sustinent modo ouium, & socias declinant, cum turgente iam Venere coitum appetunt. Mas non in eadem immoratur, sed mutat: breuiq; interposito tempore, aliā atque aliam supergreditur.

Coitus ab arcturo mēse Augusto & Septēbri, implētur paucis diebus, & ab eodem multā. uterū ferunt octo mēses. pariunt magna ex parte unū, sed nōnullā etiā geminos peperisse perspectū est, parere iuxta uias maxime solēt metu belluarū. Incrementum hinnuli celere, purgatio ceteris tēporibus nulla euenit ceruā. Cum autē parit pituitoso quodā humore purgatur. ducere suū hinnulū ad stabula cōsueuit, quem locū sibi habet refugium, petra disrupa est uno aditu, unde defendere se, repugnareq; solet ijs, qui inuadūt. Vita esse perq; longa hoc animal fertur, sed nihil certi ex ijs quā narratur, uidemus: nec gestatio, aut incrementū hinnuli ita euenit, quasi uita esset praelōga. Monte Asiae Elapho noie apud Arginussam, quo loco Alcibiades mortem obiit, ceruā omnes scissā aure sunt, qua nota uel alibi, si loca mutarint, dignoscūt. Et quidē foetus iam inde a primo ortu in utero idem cōtrahit signum. Quaterna ubera foeminis, ut uaccis. Cum mares impleuerint foeminas, separantur per se ipsi, & propter libidinis graueolentiā quisq; solitarius scrobes fodit. foetēt ut hirci, facies quoq; eorū nigrescit aspergine, ut hircorū. degūt ita, quousq; imber accedat, tum pasqua repetūt. Hāc ideo ceruo accidūt, quia salax animal suapte natura est, atq; etiā quia pingui abundat. pinguescūt enim aestate supra modū, quam obrē nec currere quidē possunt: sed secundo aut tertio cursu capiūt ab ijs, qui pedibus infestāt. fugiunt etiā in aquas propter aestū atq; anhelitū. Caro eorū libidinis tempore uitā, & foetet, perinde quasi hircorū, hyeme itaq; extenuāt, debilitāturq;. Vere autē uigēt maxime ad cursum, cum fugiūt, requiem inter currendū aliquam faciūt, consistentesq; manent, dum qui insequitur, appropinquet, tum fugam item arripit. quod ideo facere uident, quia interiora laborāt. intestinū enim tam tenue, imbecilleq; habet, ut etiā si leuiter percusseris, possit rumpi, cute adhuc integra.

De ursi coitu, partu, &amp; pullis, deq; hystricis natura.

Caput XXX



Ursi coeunt, ut dictū est, non superueniētes, sed humi strati, fert uterū urfa dies triginta. Parit tum unū, tū etiā duos: sed cōplurimū quinq;. foetū minimū pro sui corporis magnitudine addit: quippe quē minorē catto, maiorē mure parere soleat. nudum item, & cæcū, & cruribus propemodū, membrisq; alijs plurimis inditretū, & rudē, coit mense Februario, parit eo tēpore quo later, pinguescit per id tēpus tam mas q; foemina uehemēt. cū prole enutrit, exit a mēse iam Veris tertio. Hystrix etiā later, toridēq; diebus fert uterū, & reliqua facit perinde ut urfa, grauidā capi ursam difficile est.



Leonem auersum coire, urinamq; retro reddere dictum iam est. coit & parit non omni tempore: singulis tamen annis. Vere parit, & magna ex parte geminos, sed cum plurimos sex catulos, nonnunquam etiam unum. Quod de leæna fertur, uulnam cum partu emitte, delira fabula est, facta ex ea causa, quod rarum genus hoc animalis est: nec rationem cur ita esset, comperire autor ille fabulæ poterat. rarum hoc enim est, nec multis nascitur locis: sed Europæ totius, ea parte solū, quæ inter Acheloum amnem, & Nessum est. parit leæna quoque adeo paruos, ut uix post secundum mensem incipiant ingredi. Leones terræ Syriæ quinquies uita pariunt: primum 10 quinque, post uno subinde pauciores, deinde steriles degunt. caret leæna iuba: maris hæc propria est, dentes eos tantummodo mutat leo, qui canini uocantur quatuor, duos superius, totidemq; inferius, idq; sexto mense ætatis fit.



Hyæna colore lupi propè est, sed hirsutior, & iuba per totum dorsum prædita est. Quod autem de ea fertur, genitale simul & maris, & feminae eandem habere, commentitium est: sed uirile similiter, atque in lupis, & canibus habetur. quod uero femineū esse uidetur, sub cauda positum est, figura simile genitali feminae, sed sine ullo meatu. sub hoc meatus excrementorum est. Quinetiam femina hyæna, præter suum illud, 20 etiam simile, ut mas habet sub cauda sine ullo meatu, à quo excrementorum meatus est, atque sub eo genitale uerum continetur. uulnam etiam hyæna femina, ut cætera huiusmodi feminae animantes habet. Sed raro hyæna femina capitur, iam inter undecim numero, unam tantū cepisse uenator retulit quidam.



Lepores auersi coeunt, ut expositum est, retro enim urinam reddunt. Coeunt & pariunt quoque tempore, dumq; utero ferunt superfoetant, & singulis mēsis generant, sed foetus ædūt nō uniuerfos. interpositis enim diebus quot res tulerit, peragunt partionē. habet femina lac priusq; pariat, & à partu cōtinuò repetit coitū, & lactans adhuc cōcipit foetū. 30 lac suillo simile sua crassitudine est. Partū non ut maior sed ipedū pars, cæcū ædit.

Vulpes superueniens coit. parit cæcos, ut ursa, atque etiam infirmiores. parturiens ita secedit, ut raro grauida capiatur. Cum partum ædiderit, lingua lambendo refouet & concoquit. parit cum plurimos quatuor.



Vpus fert & parit ut canis, tum tempore, tum etiam foetus numero. cæcos etiam generat canis modo. coit uno tempore tantum, parit in æstate. fertur de eius partu ad fabulam proxime, lupos omnes intra duodecim dies parere. cuius rei causam proferunt fabulose, quod Latonam oberrantem totidē diebus ex Hyperboreis Delum deduxerint sub specie lupæ, propter metum Iunonis. Sed an tempus hoc pariendi sit, nondum exploratum habemus. Fertur quidē sic uulgò, sed uerum minime esse uidetur. quale uel illud ferunt, lupos semel in uita parere. Feles & ichneumones tot numero pariunt, quot canes, uescunturq; eisdem. uiuunt circiter annos sex. Lupus item canarius, cæcos parit luporum ritu, numero complurimum quatuor. Quinetia lupus ceruarius coitu ut canes impletur, & cæcos generat, numero duos, aut tres, aut quatuor.



quatuor. corpore longior, & cauda porrectior est, sed proceritate breuior. celeritate, æque præstat, quamuis crura habeat breuiora. mollis enim & agilis est, prosilireq; longius ob eam rem potest.

*De mulis, quos terra Syria fert.*

*Caput XXXVI*



Vnt in Syria, quos mulos appellât, genus diuersum ab eo, quod coitu equæ, & asini procreatur, sed simile facie. quomodo asini syluestres, similitudine quadam nomen urbanorum accepere. & quidem ut asini illi fert, sic muli præstât celeritate. Procreant eiusmodi mulæ suo in genere, cuius rei argumêto illæ sunt, quæ tẽpore Pharnacæ patris Pharnabazi in terram Phrygiam uenerunt, quæ adhuc extant, tres tamẽ ex nouem, quot numero olim fuisse aiunt, seruantur hoc tempore.

*De natura, & uarijs generibus murium, &q; pullorum numerositate.*

*Caput XXXVII*



Vrium generatio mirabilis præter cætera animalia maiorem in modum est, tum numero, tum celeritate. Iam enim foemina prægnante in uase miliario aliquando occupata, paulo post referato uase, musculi numero uiginti & centũ reperti sunt. Mirum etiã percipimus ortum redundantis agrestis murium generis. locis enim compluribus agrĩ tam inaudito modo oriri solent, ut parum ex uniuerso frumenti relinquatur. tam cito absumitur, ut nonnulli mediocres agricolæ, cum pridie metendum statuerint, postridie mane cum messoribus accedentes ad segetem, absumptam inueniant totam. interitus autẽ minime euenit ratione. paucis enim diebus omnino abolentur, quanquam superiore tempore homines uincere uel suffiendo, uel fues, ut latibula effoderent, admittendo, nõ possent. Quinetiam uulpes eos uenantur, & cati syluestres in primis: sed tamen superare copiam, & celeritatem prouentus nequeunt: nec aliud quicquam omnium uincit, nisi imbres. ijs enim quamprimum intereunt. Terræ Persicæ parte quadam mure foemina rescissa, foetus foeminini prægnantes comperiuntur. Sunt qui uehementer confirmant mures, si salem lambant, impleri sine coitu. Aegyptijs muribus prædurus ferẽ, ut herinaceis, pilus est. Sunt etiã alij, qui erecti bipedes ambulant. habent enim crura posteriora longa, priora breuiã, ortus eorum quoq; numerosus est. Sunt uel alia genera muriũ plura. sed de ijs hæcenus.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIUM LIBER SEPTIMVS,  
INTERPRETE THEODORO.

*De signis, quæ puerorũ seminis emissionẽ, puellarumq; uiripotentia præueniunt.*

*Caput I*



DE HOMINIS generatione, tum prima in utero, tum postero. re in luce, & usq; in senectutem, quemadmodũ se habeãt, quæ suæ naturæ ratione eueniant, loco hoc dicimus. Quæ inter marem & foeminã differẽtia sit, & quibusnã partibus constet, antẽ expositũ est. Mas autẽ primum semen genitale magna ex parte incipit ferre, anno peracto bis septimo: simul etiã pubescere incipit eo tẽpore, ut stirpes semen laturas primũ florere Alcmeon Crotoniata ait, uox item per id tẽpus mutari in sonũ asperiorẽ, inæquabilioremq; incipit, quanq; nondũ grauem. neq; enim acuta præterea est, neq; tota æquabilis: sed similis fidibus incõtentis & asperis, quod caprire denominãt. idq; potissimũ incidit ijs, qui rem uenereã incipiũt agere. ijs enim uox trãsit in sonũ uirilem. Abstinent

tibus uero e contrario fit. et si curā adhibeant (quod aliqui faciunt ex ijs, qui choreis indulgēt) uel longo seruari tempore sine magna mutatione potest. Mammæ etiam extuberant. & genitale non solū magnitudine, sed etiā specie proficit. euenit portō id tēporis, qui iam fricari, cōtrectariq; per libidinē cōperint, ut cum semen emittūt, non modo uoluptate, uerū dolore quoq; afficiātur. Fœminis etiā per id tēpus exurgunt ubera, quod fratrare dicitur. & quæ mēstrua uocātur, erumpūt: quod sanguis quasi regens occisi animalis est. Quæ autē alba dicuntur, admodum etiā puellis eueniunt, & magis si cibo utuntur humidiori. Hæc incrementū impediunt corporis, & puellam extenuāt. sed menses tunc plurimis sunt, cum iam ubera ad duos digitos prominēt, & uox eodē tempore puellarū mutatur in grauiorē. Deniq; cum mulier uocis acutioris, quā uir sit, tum natu minores acutius, quā maiores sonāt, ut & pueri, quā uirj acutius. Sed uox fœminæ acutior est quā maris, & fistula puellarum acutior, quā puerorū est. Fit etiā, ut per id tēpus custodiri præcipue debeāt. maxime enim ad usum rei ueneræ incitatur, cum hæc incipiunt. Quod si iam inde nihil plus commouere temperēt, quā corpora ipsa nullo adhuc usu uenero, sed sponte mutentur, sequi seruariq; temperatā solet per ætates superiores. nam & quæ admodū puellæ concumbūt, libidinosiores euadunt. & mares siue altera parte, siue utraq; minus cauerint, propēsiores eodem efficiuntur. Meatus enim laxantur, redduntq; eo corpus lubricum, & simul uoluptatis, qua olim gestirent, memores, desiderio mouentur præteritæ contrectationis. Prodeunt nōnulli iam inde à primo ortu naturæ impubes, infœcūdiq; propterea quod parte sui genitali fuerint deprauati. Mulieres etiā simili modo impubes à natiuitate possunt creari. Habitus quoq; tum marium, tum fœminarum mutatur, ut sint uel sanitati, uel morbo habiliōres: & uel graciles uel pleni, beneq; uegeti, nam à pube ex macilentis crassescūt, euaduntq; saniores; alijs contrā. quod pari modo puellis etiā euenit. qui enim pueri, aut quæ puellæ excrementis antea corporis redundabant, cum ea ipsa excrementa unā cum semine, aut mensibus secernantur, sanjore ob eam rem corpore efficiuntur, atq; uegetiore. Iam enim ea, quæ sanitati alimentoq; obfient, exeunt. At uero quibus contrā antecesserit, ijs corpora graciliōra, & morbis opportuniōra redduntur. excernitur enim de ipsa natura & bene habitis, cum aut semen, aut menses prodeunt. In puellis item diuersitas uberum est: alijs enim admodum magna, alijs exigua sunt. euenit sanē, ut corpora immodice crescāt, cum puellæ excrementis redundāt. futuris enim adhuc & nondū profluentibus mēstruis, quo plus continetur humoris, eo magis efferri, sursumq; impelli necesse est, donec infra erumpat. Itaq; quod interim incrementum mammæ acceperint, seruant postea. maribus etiā mammæ cōspēctiores & fœminatiores, tum iunioribus, tum senioribus efficiūtur, qui humidiores, læuiōres, nec uenulenti sunt, eorumq; ipsorum, ijs magis qui fusci, quā qui cādidi sint. Semen profectō infœcundū usq; ad ter septimum annū est. mox prolificū quidem est, sed exigua imperfectaq; generāt iuniores, & mares, & fœminæ, ut in cæterorū quoq; animalū genere plurimis euenit. cōcipiunt quidē facilius natu minores, sed laborāt in puerperio uehemētius. corpore etiā minus magna ex parte perficiūtur. & senescunt celerius mares salaces, & mulieres quæ frequentius pariant: nam ne incrementū quidem post tertium partum effici posse uidetur. sedātur autē, temperantq; melius, quæ in rei ueneræ usum luxuriant, cum partum multoties exercuerint. Sed post annū ter septimum mulieribus quidē opportune iam procreatio est. Sed uiris item accedere aliquid potest ad prolem perfectiorem. Semina infœcunda sunt quæ tenuia, fœcunda, quæ grandinis speciem referūt: eademq; potius marem fecundificant, contrā tenuia, nec globulenta, fœminam gignūt. Mentum etiā maris ea ætate pilis integitur.



Rofluuium autē mensium decrefcēte luna contingit: quamobrem nonnulli cauillo sexum fœmineum lunæ tribuunt, quoniam fimul, ut illa decrefcāt, & mulier purgetur, moxq; repleantur ambæ, eueniat. paucis menſtrua ſingulis mēſibus mouentur: ſed uno intermiſſo plurimis. facilius agitur cum ijs, quibus breui tēpore, hoc eſt biduo aut triduo profluunt: ſed quibus longum protrahitur, difficilius: laborant enim id temporis. alijs nanque uniuerſim hæc purgatio fit, alijs paulatim. Attamen omnibus corpus grauat, quādiu effluat humor. Multis etiam cum mēſtrua citantur, & eruptioni propinqua ſunt, ſtrangulationes uuluarum ſequuntur, & crepitus, donec erumpāt. Conceptus mulieribus à profluuiō menſtruorum ſua natura contingit, & quæ ijs carent, ſteriles magna ex parte exiſtunt. uerum fieri poteſt, ut aliæ quæ etiam ſine eorum profluuiō concipiant, uidelicet quibus tantum humoris colligitur, quantum ijs, quæ purgāt, reſtare ſolet: quanquam non tanta copia, ut & foras poſſint profluere, nonnullæ etiam dum profluunt menſes, concipiūt, poſtea concipere nequeūt: quibus uulua ſtatim à purgatione comprimitur. Sunt quibus prægnantibus etiam menſtrua uſq; in poſtremum gerendi tempus eueniant, quibus accidit, ut parua pariant, & proles aut minus uitalis, aut infirma procreetur. Multis etiam deſiderio coitus, quo uel iuuenilis ætatis ratione, uel quia longo tempore abſtinuerint, tenentur, deſcendunt uteri. & menſtrua ſæpe ter in mēſe citantur, donec concipiant: quo factō aſcendunt, & ſuo ſitu conſtituuntur. nonnumquam eſi cætera bene ſe habet uterus, humidus tamen eſt. reſpuit ſemen genitale, ſi humidus ſit. Omnium autem animalium (ut antè dixi) mulieribus inter fœminas plurima hæc purgatio euenit. nam ijs quæ non pariunt animal, nihil tale mouetur, propterea quod hoc materiæ ſuperuacuum uertitur in corporis alimentum. Sunt enim nonnulla maribus ſuis maiora, atque etiam alijs in corticem, alijs in ſquamam, alijs in frequentiam pennarum abſumitur. Terreſtribus quoque animal parientibus, in pilos, & corpulentiam tranſit: homo enim læuior cæteris eſt: atque etiam in urinam diuertitur. plurima enim ex cæteris largius mingunt, & crassi. At mulieribus uice eorum, quæ dixi omnium, quantum ſuperuacuum ſit, in purgationem menſium uertitur, quod in maribus quoque ſimili fieri modo percipimus, ſeminis genitalis ratione. plurimum enim omnium animalium emittit, comparatione dico magnitudinis ſux: & uero inter ipſos mares, qui humidiores natura ſunt, nec ualde carnoſi, plus reddunt: atque etiam plus candidiores, quàm fuſci. nec ſecus in mulieribus ſit. corpulentis enim multum menſtrui excrementi in corporis alimentum tranſit. & in uſu quoque rei ueneræ candidiores ſua natura plus, quàm fuſcæ euaporant. præparatur hoc amplius uſu ciborum humidorum, & acrium.

De indicijs conceptionis, & quot dierum ſpacio mas, quot item fœmina in utero moueatur, deq; abortionibus.

Caput III



Indicium mulierem iam concepiffe, cum ſtatim à coitu locus ſicceſcit, ſit certe, ut ſi oris, quo concipitur, labra ſunt læuiora, inepta ſunt ad conceptum: labitur enim & effluit ſemen. nec uero ſi craſſa ſunt, commode uſum præſtāt: ſed ſi ad digiti tactum aſperiuſcula, & hærentia ſint, atq; etiam ſi tenuiora, ita commode ad conceptionem habēt. Talis igitur præparandus eſt uterus, qui concipiat, quod ſi facere ne concipiat, placet, contrā agendum eſt. nam ſi labra ſint læuiora, concipere nequeat. Quamobrem nonnullæ ut ſemen incidat, antè uulua ex oleo iuniperino, aut ex ceruſa, thure uel exci-

latio ad el-  
vo, oleo iunipe-  
rino, confundis  
Gaza cedrum  
cum iunipero.

piantes oleo, illinunt. sed si in septimum diem intus per manserit, conceptum iam esse certum est. nam quæ effluxiones uocantur, intra tot numero dies fieri solent, purgationes autem accedunt plurimis, cum conceperint, ad tempus quoddam, scilicet triginta dierum, maxime si concepta femina est, quadraginta si mas. A partu etiam purgationes eodem dierum numero consequi uolunt, quanquam non æque ita diligenter eueniunt. At uero post conceptum, & dies, quos modo dixi, non item secundum naturam inferius agitur, sed in ubera transitur, & lac efficitur. Cuius nota inter initia exiguo quodam, & araneæ propemodum specie apparet in mammis. cum iam conceperint, sentiunt præcipue suis ilibus, hæc enim nonnullis statim pleniora efficiuntur, quod ipsæ, quæ graciliores sunt, euidentius accidit. Inguina etiam sentiunt, & conceptui argumento esse possunt. Mares foetus magna ex parte circa quadagesimum diem, dextro potius latere mouetur, femina sinistro, circiter nonagesimum. Nihil tamen certi in his affirmari licet, multis enim ferentibus feminam, motus agitur in dextro, & contra in sinistro, gerentibus marem. Sedenim hæc, & reliqua huiusmodi, ut differunt, eo quo magna ex parte & magis minus uel accidit, sic accipimus. Finditur etiam foetus hoc eodem tempore, cum ante caruncula in formis constaret. Effluxiones uocantur, quæ intra septimum diem corruptiones incidunt. Abortiones autem, quæ intra quadagesimum. Et quidem plurimi foetus intra tot numero dies deprauantur. Mas qui quadagesimo die exierit, si in quoduis aliud mittatur, diffunditur, atque aboletur. Sed si in aquam frigidam, cogitur, consistitque, ueluti in membranula, qua rupta, foetus ipse apparet magnitudine formicæ mascululæ. & membra iam inde discretæ, tum cætera omnia, tum genitalia constant: & oculi quemadmodum in cæteris animantibus prægrædes. Sed femina, quæ intra tertium mensem eruperit, indistincta est: quæ autem quartum adepta est mensem, finditur, & reliquam distinctionis effigiem breui tempore accipit. Cum itaque foetus in utero formatur, femina tardius quam mas perfectionem quarumque partium recipit, & sæpius in decimum mensem, quam mas protrahitur. Sed cum in lucem prodierit, femina ocyus, quam mas & accrescit, & ætate floret, & senectute maceratur, & magis, quæ pluries parit, ut dictum iam est.

*Quæ ceræ, finditur, distinguitur*

*De ijs, quæ à conceptione ad partum usque mulieribus eueniunt, quo uel tempore pariant, quotque uno partu parere possint. Caput IIII*

30



Um semen conceperit uterus, statim se contrahit, donec ad septimum mensem uentum sit. octauo iam adaperitur, atque dehiscit. & partus si uiuit, descendit mense eodem, sed si mortuus est, neque ipse descendit, nec uterus per id tempus dehiscit: idque indicium facit, foetum haud quaquam esse uitalem. Euenit profectio, ut mulieres à conceptu corpus totum grauentur, & oculorum caligines, & dolores capitis moueantur, quæ alijs maturius, & ferè die decimo accidunt, alijs serius, prout magis minus uel ex materia superuacua tentantur. Nauseæ item, & uomitus plurimas capiunt, & præcipue quibus purgationes confiterint, necdum ad ubera transeant. Aliquæ igitur principio magis laborant, aliæ post, cum iam foetus plenius creuerit. Sæpe etiam multis destillatio urinæ ad postremum infestat. sed magna ex parte, quæ marem ferunt, facilius exigunt, minusque palliunt, contra, quæ feminam, sunt enim pallidiores, & grauius degunt. Multis etiam tumores, exuberationesque carnis in cruribus incidunt: sed tamen contra etiam nonnullis contingit. Solent appetitus uarij grauidis euenire, citoque commutari, quod picare quidam à pica uel denominant. & nimirum cum foetus sexus feminei ferunt, auidius appetunt, minusque re frui iam præsentem, quam cupierint, possunt, fastidiunt enim statim, quod modo uehementer appeterent. Pau-

cis

cis contigit, ut melius habeant, cum uterum gerunt. Sed præcipue tunc fastidiunt, tædioq; fatiscunt, cum foetui capillus oriri incipit. Pili congeniti grauidis defluunt, paucioresq; redduntur. contrā qua parte pilos minime habere solebant, ea magis accipiunt. plus etiam motus magna ex parte mas in utero infert, quā fœmina, & celerius prodit. fœminæ enim partus tardior est. Dolor etiā ex fœmina continuus, sed obtusior: ex mare acer, & longe molestior. Quæ paulò ante partum concumbunt, facilius pariunt. Parturire interdum mulieres uidentur, cum tamen tempus non sit, sed quoniam foetus inuertit suum caput, ideo initium hoc esse parturiendi uidetur. Sed cum cætera animalia omnia singulari, ac simplici modo partum suum

10 perficiant (Vnum enim pariendi tempus statutū omnibus est) homini uni multiplex datum est: nam & septimo mense, & octauo, & nono parere potest, & quod plurimum decimo, nonnullæ etiam undecimū tangunt. foetus qui maturius, quā septimo mense prodeat, nullo pacto uitalis est, qui septimo, uitalis quidem hic primus exit, sed magna ex parte infirmior: quamobrem cunabulis ex lana eum obuoluunt, & fascijs alligant. Meatus etiam nonnulli infissi, ut aurium, aut narium sæpenumero generantur: sed accrescenti articulantur infanti, & demum suam formam recipiunt. & pleriq; de his quoq; septimo natis uiuere atq; adolescere possunt. Qui autē mense octauo nascuntur, uiuere ac adolescere in terra Aegypto possunt, & quibusdam alijs in locis, ubi mulieres fertiliores sunt, multosq; simul facile, & fe-

20 runt & pariunt, etiā si monstrosi sint. sed locis Græciæ multi intereunt, nec nisi pauci seruantur, unde fit, ut si quis seruetur, non octauo mense natus existimetur, sed mulierem sui conceptus initium latuisse. infestantur maxime mulieres mense quarto, octauoq;. & si uel quarto, uel octauo foetus perierit, ipsæ quoq; magna ex parte intereunt. itaq; fit, ne solum mense octauo nati non uiuant, sed etiam ipsi ea mortuis periculum, quæ pariunt, subeant. Simili modo & qui diuturniores, quā undecimo mense nasci uidentur, latere putantur. latet enim mulieres conceptus initium, si cum antè inflatus fuerit uterus, ut sæpe accidit, post coierint, atq; conceperint. hoc enim principiu esse sui conceptus existimant, quod simile indicium attulit. Ita multiplex perficiendi tempus, pariendiq; diuersum homini datum est. Et cum

30 alia singulos pariant, alia plures, genus humanū in ancipiti est. Nam quod plurimū & locis plurimis agitur, mulieres singulos singulæ pariunt. Sed sæpe & locis pleriq; geminos etiam, ut in terra quoq; Aegypto fieri certum est, pariunt etiam tres, & quatuor. & quidem more nonnullis ualde ita fit, quod dictum iam est, sed quinque complurimū nascuntur. Iam enim hoc pluribus euenisse conspectum est, & quædam uiginti, partibus quatuor ædidiit: quinos enim singulis partibus enixa est, maiorq; eorū pars enutriti & adolescere potuit. Et cum in cæteris animalibus gemini nati, etiam si mas & fœmina sint, nihilo minus enutritur, seruenturq;, quā si mares ambo, aut fœminæ sint: in genere certe humano pauci gemini seruantur, si alter mas sit, alter fœmina. Mulier & equa omnium maxime animaliu grauidæ coitum

40 patiuntur, cætera ubi grauida fuerint, fugiunt mares, ea scilicet quorū natura superfoetare more leporis recusat. uerum equa nunquā superfoetata, sed magna ex parte unum tantūmodo generat. At uero in muliere raro quidem euenit, ut superfoetet, sed factum tamen aliquādo est. Qui itaq; longo post tempore sint concepti, nihilo perfici possunt: sed præmaturius dolorem, quo ipsi, & primus foetus intereat, mouent. Iam incidit, ut facta corruptioe duodecim superfoetata puerperia egererent. At uero si proxime à primo conceptu secundus sit factus, absolui ædiq; potest, quod superfoetaret, ut quasi gemini nasci uideantur: quomodo Hercule & Iphiclem procreatos esse fabulantur. Nam id etiam constitit adultera quadam, quæ alterum suo marito, alterū adultero similem peperit. Iam & cum geminos quædam ferret, ter-

tium superfœtauit: & cum tempus pariendi iustum iam esset, primos vitales peperit, secundū quinto mense elisit, qui statim mortuus est. Altera cum primum septimo peperisset, qui mortuus est, mox duos iusto mensium numero addidit, qui uiixerunt, quædam etiam sub abortu conceperat, atq; alterum abegerunt, alterum continuerūt, pertuleruntq; ad partum. plurimis si concubuerint mense octauo, infans mucore oppletus exit, esculentorū etiam, quæ mater comederit, sæpe gerulus uenit in lucem, & si sale immodice usa est, ipse sine unguibus nascitur.

De lactis bonitate, & malignitate, deq; menstruorū muliebrium sine. Cap. V



Ac quod ante septimum mensem contractū est, inutile est, sed simul infans natalis est, & lac esse utile incipit, prius autem salsum etiam est, ut pecoris. Vino præcipue cum uterum ferunt plurimæ infestantur, dissoluuntur enim si biberint, atq; debilitantur. Principium & finis mulieribus prolis recipiendæ, maribus præbendæ, seminis & menstruorū emissio est. Sed neq; cum incipiunt statim prolifica sunt, neq; cum desinunt, & iam pauciora sunt, & infirmiora. Quanam ætate incipiant menstrua & semen, dictum iam est. Sed desinunt plurimis menstrua circa quadragesimum annum: quod tempus quæ exceßerint, usq; ad quinquagesimū seruantur, etiam nonnullæ eo tempore pepererunt, sed ultra hoc tempus nulla potest protrahere.

Vsq; quo maribus sit generandi facultas, & de prolis similitudine cum parentibus, uel cum alijs. Caput VI



Ares plurimi ad sexagesimū generant: quem si exceßerint, ad septuagesimū usque procedunt. Et iam quidam annos septuaginta nati, genuerūt. Euenit sanè multis & mulieribus & uiris, ut qui coniuncti inter se nequeat procreare, ubi dissociati se iunxere cum alijs, queant, quod idem in maris quoq; aut foeminæ procreatione nimirum euenire certum est, plerumq; enim tum mulieres, tum uiri, quandiu cum eisdem iunguntur, foeminam tantum, marem uel procreant, seiuncti autem contrā. Aetatis etiam ratione immutantur, ut iuuenes inter se foeminas generent, seniores facti maris, aut contrā. Ratio quoq; generandi omnino discrimen hoc idem recipit, ut iuuenes nihil procreent, seniores iam incipiant generare. Aut contrā, ut qui antè possent, post nihil possint foetificare. Sunt etiam aliquæ mulieres, quæ uix concipiant: sed si conceperint, perficiant, atq; ædant. Aliæ contrā, facile quidem concipiunt, sed seruare non possunt. Sunt & uiri, qui non nisi foeminā procreant, & mulieres, quæ non nisi marem: & contrā, ut de Hercule fabulantur, qui inter duos & septuaginta liberos foeminā unam tantum modo genuit. Quæ concipere nequeant, si uel cura adhibita, aut aliquo casu conceperint, foeminam magna ex parte pariunt potius, quàm marem. Multis etiam uiris euenit, ut cum antea possent generare, post nequeant, deinde rursus facultatē recipiunt generandi, gignuntur læsi quoq; ex læsis, uerbi causa, claudi ex claudis, & cæci ex cæcis, deniq; similes sæpe numero in re, quæ præter naturam comiteretur, & signa habentes sibi cognata hæreditaria, ut uerucas, ut nauos, aut cicatrices, aut quid aliud generis eiusdem. Iam tale quid uel tertia prole post regeneratum est, ut cum quidam suo in brachio puncti notam haberet, filius non id retulit, sed nepos ea corporis parte nigritiem quandam habens confusam prodijt, sed raro hæc eueniunt. Integri autem ex mancis ne gignantur, nulla res obstat, & sæpissime ita agitur, similes etiam aliqui parētibus, aut auis, suisq; maioribus generantur. Aliqui similitudinis nihil referunt, redditur etiam uel post plures eiusdem profapia, ut in Sicilia eius, quæ adulterium cum Aethiope commiserat,

miserat, filia non colorem patris æthiopis retulit, sed qui natus ex hac est, is auum æthiopem regenerauit. Fœminæ magna ex parte matri, mares patri proueniunt similes, sed sit etiam è diuerso, ut fœminæ patri, mares matri similes procreentur. Particulatim etiam similes fiunt, ut alia corporis parte similes sint patri, alia matri. gemini uel dissimiles inter se nati iam sunt, sed plurimi magna ex parte similes prodeunt, nam & quædam cum septimo die à partu concubuiſſet, concepiſſetq; peperit similem superiori quasi geminū. Naturæ etiam ratione aliæ sibi, aliæ suo marito similes generant, ut equa pharſalia cognomine iusta.

Quomodo semen genitale informetur.

Cap. VII

10 **V**m semen genitale exit, spiritus antecedit, & quidem ipso exitu constat agi cum spiritu, nihil enim procul sine uiolentia spiritali proijci potest. Tum insinuatum in utero, diuq; contentum, membrana obducitur: quippe quod antequam discernatur, exeat uelut ouum in sua membranula contextum, detracto putamine, membrana autem ipsa uenis referta est, omnia uero tum natatilia, tum pedestria, tum etiam uolatilia, siue animalis, siue oui forma proueniunt, simili modo gignuntur, nisi quod alia umbilicum habeant uulua adhærentem, uidelicet quæ animalis forma enascuntur, alia ouo, alia utroq; modo, ut in quodam piscium genere: & alia quasi membranis continentur, alia secundis, primum intra ultimum inuolucrum animal gignitur, mox altera membrana obuelat, plurima quidem sui parte uulua adhærens, sed parte etiam seiuncta, & aquam continens, humor autē inter has cruentus aquosusq; est, quem mulieres proferum uocant.

De alimento animalis in utero existentis, deq; hominis statu in eodem.

Caput VIII

30 **V**gentur animalia omnia quibus est umbilicus, per ipsum umbilicum, hic acetabulis uulua adhæret, si sunt. Sed si læuis sit uulua, ipsi uulua adhæret uena subiecta, situs in utero quadrupedum omnium extensus est, expedium autem obliquus, ut piscium, bipedum uero inflexus contractusq; ut auium. homo etiam in semet conglobatus sic gestatur, ut nasum inter genua, oculos super genua, aures extra genua habeat, omnibus aequè animalibus caput primum superius est: sed cum creuerint, & iam exitum appetant, deorsum deducitur. Ita fit, ut omnibus partus secundum naturam in caput, contra naturam in pedes, aut inflexo circumactioq; corpore agatur. quadrupedes uelut excrementū iam inde habent, & alui, & uesticæ, alterum in postremo intestini, alterum in ipsa uestica. Quibus in uulua acetabula sunt, fœtu crescente, acetabula ipsa subinde minuuntur, postremo abolentur omnia. umbilicus autem uelut putamen est circa uenas, quarum origo ab utero est, aut acetabulis si habentur, aut uenæ cōmissa est. Sunt fœtui maiori, ut boui quatuor uenæ, minori duæ, minimo una, ut auibus. pertinent duæ ad fœtum periecur, quæ portas appellant, ortæ à uena maiori, reliquæ duæ ab aorta, qua finditur, & duæ de una efficiuntur. Vtrunq; uenarum par membranulæ ambiunt, & membranulas ipsas ambit uelut putamen umbilicus. Collabuntur subinde uenæ, & quo fœtus amplius creuerit, eo adductius ipsæ contrahuntur. Fœtus autē grande-  
scens caua uteri subit, ubi palpitans iam sentitur, & circa  
genitale parentis interdum uoluitur.



Vm mulieres parturiunt, dolores multas quidem in partes incubunt, sed plurimis ad alterutrum femur. Caterum quibus aluum tormina uehementer exercent, ocyssime pariunt. quæ lumbos dolent, uix pariunt. quæ inum uentrē, expeditius. Si mas nascitur, profluit sanies diluta pallidiuscula: sed si foemina, cruenta: uerum ea quoque præhumida est. sed fieri quoque potest nonnullis, ut eorum neutrum accidat. Cæteris animabus partus non laboriosi eueniunt. minus enim cum parturiunt, infestari uidentur. At mulieribus dolores uehementissimi incidunt, & præcipue stabilibus, & selularijs, & quibus non bona latera sunt, neque facultas retinendi spiritus suppetit. 10  
difficilius etiam adunt, si interea dum per uim retinent, coactæ eruperint respirationem. primum aqua illa subter cutem fusa, per foetus motionem, ruptis membranis effluit, deinde foetus inuerso utero, & secundis interna euoluentibus, foras uenit in lucem.

De obstetricis cura, & de infantis exitu, de tarditate durationis ossium,

& dentium amissione.

Caput X



Am uero & obstetricis officium pars ingenij, perspicacisq; intelligentiæ est: non solum enim difficultati partus opportune expediteq; succurrendum est, sed etiam contra ea quæ accidunt, protinus agendum ingeniose. & in secando deligandoq; umbilico infantis prudentia requiritur, & peritia. nam si simul secundæ quoque exciderint, uellere umbilicus cum secundis alligatur, superiusq; præciditur. quæ autem deligatum est, cohaerescit, & pars continua decidit. si copula, amentumq; dissoluatur, foetus sanguine effuso emoritur. Sed si secundæ non statim cum foetu exierint, dum intus ipsæ, foris autem infans est, deligato umbilico secantur. saepe uisus est puer emortuus nasci, cum ei infirmo, priusquam deligaretur umbilicus, sanguis in umbilicum, & circa efflueret. Sed iam aliquæ obstetrices factæ peritiores, reprimunt intro de umbilico sanguinem, quo facto statim infans, qui modo exanguis deficiebat, recreatur, uitæq; restituitur. Nascuntur, ut dictum est, secundum naturam cætera etiam animalia uersa in caput. sed pueri manus quoque ad costas porrectas, extensasq; habent. Qui 30 cum exierint, uocem statim emittunt, & manus in os admovent. excrementum etiam reddunt, alij statim, alij breui, sed omnes intra diem: quod excrementum pluris, quam pro infantis magnitudine est. papauerculum hoc mulieres uocant, colore cruentum, atq; admodum nigrum & piceum est, mox lacteum iam & albidum rededitur. fugit enim confestim ubera infans. uocem antequam egrediatur, nunquam emittit, etiam si cum difficulter egreditur, caput extet, corpus intus sit rotum. Quibus purgationes partum anticiparint, difficiliter liberantur. sed si à partu purgationes parcius sequantur, nec largius, quam primæ, neq; ad quadagesimum diem perseuerauerint, efficitur ut mulier ualidior sit, & celerius possit concipere. Infantes autem primis quadraginta diebus neq; rident cum uigilant, neq; lachrymantur: sed 40 noctu & per quietem utrunq; interdum faciunt. nec uero sentiunt magna ex parte cum scalpuntur. Plurimam huius temporis partem dormiunt. cæterum in dies quo subinde auctiores fuerint, eo magis ad uigilandum immutantur. Somniare etiam eos constat, sed serò meminisse possunt imaginum. Cæteris quidem animalibus discrimen ossium nullum est, sed omnia perfectæ iam inde à natiuitate proueniunt. at pueris sinciput molle est, seroq; duratur. & cum cætera animalia nascantur cum dentibus, pueri septimo mense dentire incipiunt. primum adunt primores,



res, alij superiores prius, alij inferiores, deniq; omnes maturius dentunt, quorum nutrices lac habent calidius.

De aduentu lactis in muliere, & malo pilari, deq; lactis duratione.

Cap. XI



10 **P**ost partum, purgationesq; lactis copia excitatur, & nonnullis effluit non solum de papillis, sed etiam passim per ubera. aliquibus etiā per alas, edurantq; in posterū globuli, quoties humor non coquatur, nec exeat, sed redundet. ubera enim tota fungosa ita sunt, ut si in poculo pilum fortē hauserit mulier, dolor moueatur in mammis, quod malū  
pilare appellant, nec sedatur donec pilus uel pressus exeat sponte, uel cum lacte exugatur. *πρὸς ἅμα pilare*  
20 *malum in mam*  
Sertuatur lac donec mulier concipiat, tum desinit atq; extinguitur, tam in homine, quā in quadrupedum uiuiparo genere. Quandiu lac emanat, purgationes magna ex parte non fiunt; magna inquam ex parte, quoniam iam quibusdam lactantibus facta purgatio est. Sedenim natura ita fert, ne humor locis pluribus simul erumpere soleat. nam & mariscas habenti, deteriores accedunt purgationes. & quod in nonnullis accidit, cum delapsus humor à lumbis per anum excernitur, antequā uterum subeat, idem euenit. Quibus dum etiā purgationes non fiunt, incidit uomitus, securius exigunt.

Pueros ut plurimum ante septimum diem conuulsione interire.

Cap. XII



20 **P**olent pueri plurimi conuulsione excipi, & præcipue corpulentiores, & lacte uescentes copiosiore, crassioreq; & nutricem lactentes succi plenam, & corpulentā. nocet etiam ad hoc morbi genus uinum, magisq; nigrum quā album, & quod minus dilutum est. atq; etiam ex cibis, qui insunt, plurimi obfunt. Et si alius substituerit, nocuū est. Plurimi ante septimum diem intereunt. unde fit, ut nomina septimo die imponantur, tanquam salutū iam pueri magis credamus. plenilunio etiam infestantur hoc malo periculosius. & si à scapulis conuulsio oriatur, in angustia spes est.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

HISTORIA ANIMALIVM LIB. OCTAVVS,  
INTERPRETE THEODORO.

De uarietate actionum, & uictus omnium animalium.

Caput I



40 **G**ENERATIO, & reliqua animalū natura ita se habet. Acti ones autem & uitæ, pro moribus uictuq; differunt. sunt enim uel in plurimis cæterorū animalium, uestigia morum animi humani: quanquā hæc apertius in homine discernantur. Inest urbanitas, feritas, clementia, acerbitas, fortitudo, ignauia, metus, fidentia, ira, malitia. atq; etiam prudentiæ imago inest in multis, quemadmodū cum de partibus docerem, exposui. alia enim eod quod magis, minus ue habeāt, comparatione hominis differunt: homoq; ipse cum multis alijs animalibus ita dissidet. quippe cum aliqua ex his magis in homine habeantur, aliqua in cæteris animalibus latius, alia uero differant proportionē. ut enim in homine ars, sapiētia, prudentia, sic in nōnullis brutis inest uis quædam eiusmodi altera naturalis. constat hoc ita esse planē argumēto puerilis ætatis, in qua futurorū habitum, quasi uestigia & semina uideris. & tamen nihil per id tempus animam hominis differre à belluarū anima propē dixerim. itaq; nihil remotum à ratione est, si

partim eadem, partim similia, partim ex proportionē in ceteris animalibus habentur, sed adeo de inanimatis paulatim, sensimq; ad animata natura transit, ut continuatione ipsa lateat eorum confinium, & medium, utrius nam sit extremi. Iam ab animantium genere primum genus plantarum est, earumq; alia ab alia differt, eo quod magis uitæ particeps esse uidetur, uniuersum autem genus respectu corporum ceterorū quæ anima uacant, ipsum quasi animal est: at respectu animalis, in anime esse uidetur. Sedenim digressus hinc ad animalia continuus (ut modo dixi) procedit, sunt enim maris nonnulla, quæ ambiges animal ne sint, an planta: hærent enim, & detracta complura id genus intereunt, uerbi gratia, pinnae adherent, ungues euulsi uiuere nequeunt, deniq; genus uniuersum eorum, quæ testa integuntur, plantæ simile respectu gradientium animalium est. Quin & uis sentiendi ita habetur, ut aliqua nullum eius indicium præbeant, alia leuiter & perobscure sentire uideantur. Nonnullorū natura corporis carnosā est, ut eorum quæ tubera appellātur, aut urticae. At uero spongia omnino similis plantis est. Ceterū paruo quodā discrimine subinde alia præ alijs iam adipisci uitā, motumq; uidentur. Quod idem in muneribus etiam uitæ percipere licet. plantarū enim nullum aliud munus esse uidetur, nisi quoad similem quæq; sibi faciant alteram, uidelicet quæ semine oriātur, sic animalium etiam quorundam nihil muneris præter generationē acceperis, unde fit, ut eiusmodi actiones sint omnium cōmunes, sed procedente sensu, iam uere ei coitus uoluptate uita eorum discrepat, atq; etiam partus, enutriendaq; proles ratione, itaq; alia simpliciter perinde ut plantæ, officio procreandi fungūtur suis temporibus: alia in enutrienda etiam prole laborant, sed cum perfecerint, desistunt, nec ullam insuper feruant societate. Alia quæ prudentiora sunt, & plus memoriæ fortiuntur, ciuilius agunt cum prole. Prima igitur pars uitæ animalium in officio procreandi consistit, altera in alendo. In his enim duobus studium omniū uitæq; uersatur. Cibi autem differunt potissimū ratione materiæ, ex qua ipsa quæ aluntur consistunt, incrementū enim quibusq; secundum naturam ex eadem qua constituerint, materia fit. Quod autem secundum naturam est, id suaue contingit: sequunturq; omnia eam uoluptatem, quæ secundum naturam est. Degunt igitur animalia locis distincta: alia namq; terrestria, alia aquatilia sunt, quam differentia trifariam intelligimus, aut enim recipiendi aëris, aut aquæ ratione, altera terrestria, altera aquatilia dicimus, aut quod apta natura sunt seruari temperamēto alterutri, quanq; aërem aquam ue non recipiant, aut etiam quod cibū perant, uersenturq; utrobique diutius, complura enim cum recipiant aërem, partusq; faciant in terra, cibum tamen à locis madidis petunt, uersanturq; in humore partem maximā temporis, quæ sola uitam ambiguā agere uidentur, quippe quæ eadem, & uelut pedestria, & uelut aquatica statui possint.

De uictu aquatiliū animantiū.

Cap. II



Teorum quæ humorem recipiunt, nullum uel pedestre, uel uolatile est, nec cibum sibi ex terra petit, quanquā multa spirabilis pedestrisq; generis humore gaudent, & ita nonnulla, ut ne uiuere quidem conclusa ab aque natura ualeant, ut quæ marinæ testudines appellantur, & crocodili, & fluuiatiles equi, & uituli marini, atq; etiam ex minori genere testudines lutariæ, siue mures aquatiles dicti, & ranæ, hæc enim omnia, nisi aliquandiu spirent, intereunt, & parere, educareq; solent in sicco. Natura omnium maxime animalū superflua, peculiarisq; delphino, & si quid aliud tale, uel in cetaceo genere, uel in reliquo aquatili sit, ut balæna, & quæcunq; fistulam gerunt, hoc enim genus nec terrestre tantum, neq; aquaticū facile dixerim. Siquidem terrestre, quod aërem recipit: aquatile, quod aquam secundum naturā, est, particeps namq; est

est utriusq; cum & mare accipiat, reddatq; per fistulam, & aërem per pulmonem. habent enim hoc membrū, & spirant. Quamobrem delphinus reibus apprehensus, breui tempore strangulatur, ut qui spirandi facultatem amiserit, foris uero diutius uiuere potest mutiens, & anhelans modo cæterorū spirantium, quinetiam dormiens rostrum exerit supra mare, ut spiret. Sed in utraq; diuisionis tam contrariorū parte collocari hoc genus absurdum est, quamobrem aquatile genus amplius distinguendū uidetur, ut alia accipiat, reddantq; aquā, ea causa qua spirantia aërem, quo refrigeretur, alia propter cibum. Cum enim in humore cibum accipiunt, fieri non potest, quin simul aliquid humoris admittatur: quod admissum, quo emittant, instrumentū habeant necesse est. Quæ igitur proportionē spirationis humore utuntur, branchias habent, quibus autem per cibum humor illabatur, ijs fistula in sanguineo genere data est. Mollibus etiam & crustaceis hoc idem adhibitum est: nam ea quoq; humorem propter cibum accipere coguntur. sed altero illo modo aquatilia sunt, temperationē corporis dico, & uictum, ut quæ accipiant quidem aërem, sed in humore ætatem degant, aut quæ accipiant quidem humorem, & branchias habeant, sed terram petant, unde cibum accipiant, quale unum adhuc tantummodo nouimus cordulum nomine. hic enim non pulmonem, sed branchias habet, egressusq; cibum petit in terra, & quadrupes idem est, ut ad ambulandum idoneus. Horum autem omnium natura quasi peruersa uidetur, sicut marium nonnullorum natura foeminam refert, foeminarum marem. exiguis enim quibusdam partibus suis natura animalium immutata, plurimum toto in corpore differre uidetur, quod latissime in excisis patet. particula enim quadam oblata, totum animal in foeminam uertitur. quapropter in prima etiam ortus constitutione minimæ magnitudinis quoquam immutato, dummodo sit principale, efficitur ut alterum mas, alterum foemina reddatur: atque si omnino tollatur, neutrum prodeat. Itaq; terrestres etiam & aquatiles esse modo utroq; prædicto, parte animalis exigua immutata potest, ut alia terrestria, alia aquatilia procreentur: & alia uitam simplicem agant, alia ambigam, propterea quod generatione suæ constitutionis materia tali participarint, qualem sibi in cibo assumunt. Charum enim cuiq; suauetq; est, quod per naturam habetur, ut superius diximus. Sed cum animalia trifariam in aquatiles, & terrestres diuidantur: aut enim recipiendi aëris, aquæ uel necessitudine, aut corporis temperatione, aut tertio uictus ratione, uitæ prorsus discrimen pro his diuisionum membris consequetur. alia enim temperandi corporis gratia, & uictus ratione, atque etiam recipiendi aëris, aut aquæ necessitate ita degent. alia temperamenti, uictusq; causa tantum. Igitur eorum, quæ testa operiuntur, nonnulla imota aluntur humore dulci, & potulento, qui per spissa transmittitur, cum tenuior ipse mari concocto eliciatur, quemadmodum & primo naturæ ortu instituuntur. Dulcem autem contineri humorem in mari, atque ita transmitti & percolari, constat eo experimēto, quo si ex cera uas tenui latere sinxeris, idq; annexa linea in mare demittas inane die ac nocte una, humoris copiam dulcis intra se colliget. Vrticæ pisciculis fortē incidentibus uescuntur. os in medio habent, quod in maioribus euidētius est. Meatū etiam ut ostrea, quo excrementū secedat, habent parte superiore. Vrtica enim ipsa quasi ostreorū caro esse uidetur inclusa saxo, perinde ut testa, patellæ etiam secedunt absoluentes sese, ut uescantur. Quæ autē mobilia, eademq; carne uescientia sunt, ijs uictus ex pisciculis est, ut purpuris. sunt enim carniuoræ, & quidem esca huiusmodi capiuntur: quanq; ijs etiam quæ mari pullulant, alliciuntur. Testudines marinæ conchulas petunt, habēt enim os omniū robustissimū. quicquid nanq; in os ceperint, siue lapidē siue quoduis aliud, perfringūt ac deuorāt. exeunt etiā in terrā, & pascunt herbā, laborant plerumq; & intereūt quoties innatantes sic.

cantur sole. deferri enim in gurgitem facile nequeunt, hic idem uescendi modus crustaceis est, nam ea quoque omniura sunt, quippe quae & lapillos, & limum, & algam deuorent, atque etiam sterces, ut cancri saxatiles, carnes etiam nimirum appetunt. Locustae uel pisces maiores conuincere possunt. euenit usu, ut locustis polypi superiores sint, & adeo, ut si eisdem in retibus senserit locusta polypum, praeter metu emoriatur. Congros locustae conuincunt; nam elabi non queunt propter crustae asperitatem. Congri polypos superant, sed edere non possunt: laeue enim & lapsum polypi corpus usum hostis effugit. Mollia uero carniura omnia sunt. Pascuntur locustae uenatu pisciculorum circa sua cubilia, quae in alto locis asperis, saxosis, cauer-  
 10 nois quoque faciunt, quicquid ceperint ori admouent suo forcipe, ut cancri, incedit locusta sua natura ante, cum nihil metuit, demissis in latera cornibus: at ubi metuit, fugit retro, longaque sua cornua porrigit. Dimicant inter se more arietum cornibus, quae extollescentes uiibrantesque ferunt aduersarium, sed uniuersae etiam plerumque tanquam gregis collegium uiuuntur. Talis uiuendi modus eorum est, quae crusta operiuntur. In mollium genere lolligines atque sepias pisces uel maiores euincunt. Polypi conchulis maxime extringentes carunculas uescuntur. unde fit, ut eorum cubilia cognoscant, qui uenantur congerie testarum. Quod autem nonnulli aiunt polypum se ipsum esse, falsum est, sed aliqui sua brachia corrosa habent a congris, pisces omnes feturam suo tempore deuorant. Reliqua uictus ratio non eadem omnibus est, alij enim carniuri tantum sunt, ut cartilaginei, ut conghi, hiarulae, thunni, murenae,  
 20 lupi, dentices, amiae, cernuae. Mulli uero & carne uescuntur, & alga, & concha, & coeno, capitoes coeno, dasquilli coeno & stercore, scarus, & oculata alga, salpa stercore & alga, porrum etiam petit, & cucurbita capitur: quod ei ex omnibus uni euenit, alter etiam alteri sui generis addit, excepto mugile, sed maxime conghi. Capito & mugilis soli carne omnino abstinent. cuius rei argumentum est, quod neque in uentre tale quid unquam habentes capiuntur, neque esca in eos ex carne urtimur, sed offa panis. Vescitur mugilis unusquisque alga, atque arena. Capito, quem aliqui labeonem uocant, littoribus gaudet, alter generis eiusdem translittoratus est, qui non nisi mucore uescitur suo, quamobrem semper ipse ieiunus est. Pascuntur limo omnes capitones, quo fit, ut graues & sordidi sint. piscem ipsi nullum omnino edunt. & quoniam  
 30 niam uersari in limo solent, efferunt se, urinaturque sepe, ut corporis sordes abluant. Oua foetusque eorum a nulla bellua uiolantur, quapropter copiose existunt, sed cum adoleuerint, tunc a ceteris piscibus corripuntur, maximeque ab archano. Gulosus omnium maxime mugilis est, atque insatiabilis, quocirca uentre distento grauescit, & nisi ieiunus sit, haeret iners. Cum hic metuerit, caput abscondit, quasi corpus totum occultet. dentex etiam (ut dictum est) carne uescitur, & mollia appetit. euenit plerumque & huic, & hiarulae, ut cum pisces minores insequatur, uenter procidat, propterea quod piscium uenter iuxta os positus est, nec gula subest. alia igitur (ut dixi) carniura tantum sunt, ut delphinus, dentex, aurata, ut cartilaginea, ut mollia. Alia magna ex parte luto uiuunt, & alga, & musco, & eo quod caulium uocant, & enascente materie, ut fuca, gobio, omnes saxatiles. Fuca quamque cetera abstinent carne,  
 40 tamen squillas saepe numero appetunt. sed alter etiam inuadit (ut dictum est) alterum, maiorumque minores sunt praeda. argumentum ut carne uescatur, est, quod esca huiusmodi capiant. Amia, thunnus & lupus magna ex parte carne aluntur, sed algam etiam tangunt. Sargus nulli reliquias sequitur: nam ubi ille luto excitato abiit (fodere enim potest) hic descendit & pascitur, imbecillioresque ne eodem adnarent, arcet. scarus unus inter pisces ruminare quadrupedum ritu uidetur. Ceteris piscibus captura minorum a fronte agitur ore, ut solent meare. at cartilaginei, & delphini, & omnes cetacei generis resupinati corripuntur, habent enim os subter: unde fit, ut periculum minores  
 facilius

facilius possint euadere. Alioquin pauci admodum seruariuntur. quippe cum delphini celeritas, atq; edendi facultas, mira esse uideatur. Anguillæ paucae quædam, certisq; locis uescuntur limo, atq; edulsijs, si quis apponat: sed plurimæ dulci humore uiuunt. idq; qui uiuarijs anguillarijs dant operam, seruant, ut quammaxime pura, synceraq; sit aqua, affluens semper, & effluens per ripas, ubi uiuaria extruunt, nam nisi aqua sit clara, breui astrangulata intereunt. branchias enim habent exiguas. hinc turbare aqua soliti sunt, qui eas piscantur. Et quidem in Strymone amne circa uergilias capiuntur. tunc enim aqua & lutum aduersis flatibus inturbatur, alioquin satius est quiescere. Anguillæ non superfluitant mortuæ, nec sursum, ut cæteri pisces, maxima parte efferuntur: sunt enim uentre exiguo, pingue in paucis inest. plurimæ eo carent. uiuere exemptæ aquis, uel ad diem quintum, sextumq; possunt. & aquilone plures diutius durant, austro minus. & si æstate de lacu in piscinam transferuntur, uiuere nequeunt: sed si hyeme, facile sedis mutationem patiuntur. nullam deniq; uehementem mutatione tolerant, & quidem æstate: etiam si in frigidam aqua transfers, omnes plerumq; intereunt. Quin & si exigua in aqua stabulentur, pereunt. quod idem & cæteris piscibus euenit. strangulantur enim si semper eadem in aqua exigua uersantur, quomodo spirantia animalia intereunt, si in aëre exiguo claudantur. Vita anguillis nonnullis uel ad septem, octoq; annos protrahitur. Victus fluuiatilibus etiam tum ex mutua sui generis præda, tum ex herba, radice, & si quid in cœno comperiant. nocte potius pascere, interdum secedere in altum soliti sunt. Talis piscium uictus est.

*De uictu auium, & quæ carniuoræ, quæ frugiuoræ, quæ uel omniuoræ sint, quæ item cibum è terra, quæ ex aquis petant.* Caput III



Natiuum genere, quibus unguis adunci, omnes carniuoræ sunt. fruges autem ipsæ, etiam si in os indideris, nequeunt deuorare, ut genera aquilarum omnia, milui, accipitres ambo, id est, palumbarius, & fringillarius, qui multum inter se magnitudine differunt, atq; etiam buteo, qui miluo æquiparatur magnitudine, semperq; ipse cernitur. ad hæc ossifraga, & uultur, & ossifragæ magnitudo maior quam aquilæ, color ex cinere albicans. Vulturum duo genera sunt, alterum paruum, & albicantius: alterum maius, ac multiformius. Nocturnarum etiam nonnullæ aduncis unguibus sunt, ut cicuma, noctua, bubo. species similis noctuæ bubo est, sed magnitudine non minor quam aquila. Itæ aluco, ulula, asio. Aluco maior gallinaceo est. ulula compar. picas utriq; uenantur. asio minor quam noctua est. hæc tria simili specie constant, & carne uiuunt. Sunt etiam in genere non adunco, quæ carne uescantur, ut hirundo. alia qua uermiculos petunt, ut fringilla, passer, rubetra, luteola, parus, cuius genera tria sunt: fringillago, quæ maior est, quippe quæ fringillam æquet. alter monticola cognomine est, quoniam in montibus degat, cui cauda longior. tertius magnitudine sui exigui corporis discrepat, quanquam cætera similis est. Item ficedula, atricapilla, rubicilla, rubecula, siluia, curuca, asilus, tyrannus, cui corpus non multo amplius quam locustæ, crista rutila ex pluma elatiuscula, & cætera elegans, cantuq; suauis hæc auicula est. Ad hæc florulus, cui magnitudo quantæ fringillæ, & montifringilla, quæ fringillæ similis, & magnitudine proxima est, sed collo cœruleo, & in motibus degit, unde nomen accepit. tum etiā regulus, & frugilega. hæc & reliqua id genus uermiculis partim ex toto, partim magna ex parte aluntur. Spinam appetit illa, spinus, siue ligurinus, carduelus, item quæ auriuitis appellatur: hæc enim omnia utantur in spinis. uermem autē, & quoduis aliud animal aspernantur. dormiunt hæc, & pascuntur eodem in loco. Alia culicibus gaudent, nec alio magis, quam uenatu

*μελαγκόρυφος, id est, atricapilla, quam eandem putant cum ficedula.*

culicum uiuunt, ut pipo, tum maior, tum minor. utrunq; picum martium uocant. similes inter se sunt, uocemq; similem emittunt: sed maiorem, qui maior est. Pascuntur ad maceriem aduolantes. Item galgulus, cui magnitudo quanta turturi ferè est, color luteus. lignipeta hic admodum est, magnaq; ex parte macerie pascitur, uocem emittit magnam. incola maxime Peloponnesi autis hæc est. tum uero enumerandus inter hæc est culicilega dictus, magnitudine parua quanta spinus, colore cinereus, distinctus maculis, uoce parua, qui & ipse lignipeta est. Alia frugibus uiuunt, ut palumbes, columbus, uinago, turtur. uiuuntur semper columbi, atque palumbes, sed turtur æstate tantum; hyeme se condit, latitat enim suo tempore. Vinago autumnopotissimum & conspicitur, & capitur, cui magnitudo maior columbo, minor quam palumbi est. Modus maxime capiendi eam dum se in aquam bibendo propendit. ueniunt ad nostra loca cum iam fecerint prolem, cætera uero omnia quæ æstate accedunt, nidulant apud nos, & carne magna ex parte suos enutriunt pullos, excepto columbaceo genere. Omnium ferè auium, alia uictum à terra petunt, alia à fluuio, alia à lacu, alia à mari, sed palmipedes in ipsa aqua partem maximam temporis uersantur, & aliquæ ingurgitantes se, quærunt quod comedant, fidipedes circa aquam, earumq; nonnullæ terra contentis ailibus uestuntur, quæ scilicet carnem non tantum. Petit lacus & fluuius ardeoia, & albardeoia, quæ magnitudine minor est, rostro lato, porrectoq;. Item ciconia, & gavia, cui color cinereus. Ad hæc iunco, cinchilus, albicula, tringa, quæ inter minora hæc maiuscula est, turdo enim æquiparatur: omnibus his cauda motitat. Quinetiam calidris, cui cinereus color distinctus uarie. præterea genus alcedonum aquas amat, quod duplex est: alterum uocale, harundinibus insidens: alterum mutum, quod ampliore corpore est. utriq; dorsum coeruleum. Trochilus etiam hoc loco ponendus est. Sed apud mare alcedo quoq; uersatur, & carulus, necnon cornices littora petunt, & quæ unda eiecerit animalia, tantum: nam & his natura omniuora est. tum etiam gavia alba, & fulica, mergus, & rupex uicitant apud mare. palmipedum grauioribus circa lacus, & amnes uersantur, ut anas, olor, phalaris, urinatrix. Ad hæc bosca similis anati, sed minor, et qui coruus appellatus est, cui magnitudo quanta ciconiæ, sed crura breuiora. palmipes, natusq; est, colore niger, insidet arboribus, & nidulat in ijs, hic unus ex hoc genere. Item anser maior, anser minor, qui gregatilis est, uulpanser, capella, penelops, aquila dicta marina, & mare adit, & lacum. Multæ etiam herbis uestuntur. Alites unæ tum cætera, quæ superare possunt animalia, tum aues aggrediuntur, sed non sui generis. carniuoræ sunt modo piscium, qui plerumq; sibi cognatos rapiunt. Genus auium cum omne potu exiguo contentum sit, tum ad uncis nullus omnino usus bibendi est, præterquam paucissimis quibusdam, quæ & ipsæ raro utuntur, qualis potissimum tinunculus est. miluus etiam uisus est bibere, quamquam raro.

De uictu serpentium, cæterorumq; animalium cortice intestorum.

Cap. IIII



Enus animalium cortice intestum, ut lacerti, & reliquæ huiusmodi quadrupedes, atq; etiam serpentes, omniuorum est: nam & carnem edunt & herbam. Serpentes omnium maxime animalium uel cupiditæ dediti sunt, sed desiderium ijs quoq; bibendi exiguum, & reliquis, quibus pulmo fungosus est, qualem omnia habent, quæ oua pariunt, & quibus parum sanguinis est. Serpentes uini incontinentes etiam sunt: proinde uiperas aliqui uino cum fictilibus ad sepes disposito uenantur, ebræ enim capiuntur. sed cum serpentes carniuoræ sint, quicquid ceperint succo exucto, reliquum totum per meatum sui secessus emittunt. quod idem omnia ferè id genus animalia faciunt, ut aranei: sed his fortis sugendo euaporare mos est, serpentibus intus in uentre, accipit

serpens

serpens undelibet quod datur, siue auis, siue bellua est. oua etiam deuorat, sed cum acceperit, reducit, & usq; eò retractat, quoad partē nactus postremā ē directo constituat, tum colligit se, in breueq; contrahit, ut quod inditū suprà tenetur, in unum extento corpore deducatur. quod propterea ita facit, quia gulam tenuem habet, & longā, diu & serpētes & phalangia uiuere possunt sine cibo: quod ex ijs, quæ phar-  
macopolæ, id est, pigmentarij alunt, perpendi potest.

De uictu lupi, ursi, leonis, corumq; quadrupedum, quæ ex lacubus, sumijsq;  
uictum petunt. Caput V

**Q**uadrupedū, quæ animal generant, syluestres, eademq; ferratæ den-  
tibus, carne omnes uescuntur: nisi quod lupos aiunt terram quandā  
cum esuriunt, edere. hoc igitur peculiare lupoū sit, herbas autem non  
alio tempore tangunt, nisi cum morbo laborant, quomodo & canes  
herba ingesta euomunt, atq; ita purgantur. Lupi hominem illi potius  
petunt, qui inertes & unipetæ quidam sunt, quàm qui uenatores. Quam autē alij  
glanum, alij hyānam appellant, corpore non minore, quàm lupus est, iuba qua  
equus, sed seta duriore, longioreq;, & per totū dorsum porrecta. molitur hæc insi-  
dias homini, canes etiam (uomitionem hominis imitando) capit, & sepulchra effo-  
dit humanæ auida carnis, ac eruit. Vrsus animal omniuorū est, quippe qui & fru-  
ctus arborū quas consēdit corpore lubrico edat, & legumina, & apes perfringens  
alueos, & caneros, & formicas. carne etiam uescitur, uiribus enim suis cōfidens, in-  
uadit nō solum ceruos, sed etiam fues feros, si clam repenteq; potuerit agere, taurū  
aperto Marte aggreditur, conferta iam pugna, sternit se reuipinū, dumq; taurus  
ferire conatur, ipse suis brachijs amplectitur cornua, ore morsum armis deligit, pro  
sternitq; aduersarium. Ingredi uel duobus innitens pedibus erectus aliquandiu po-  
test, carnes omnes præmaceratas, & propemodum putres comedit. Leo uescitur  
quidem carne ritu cæterorū syluestrium ferratorū, sed cibo incontinenter admodū  
uitur, multaq; deuorat solida, sine ullo dissecu, mox nihil triduo, aut certe biduo  
edit: ferre enim inediā potest, ut qui iam ad multam satietatē repletus est, parum  
bibit, excrementū raro emittit. tertio die uel utcunq; accidit, egerit, idq; durum, arti-  
dum, & simile ut canis. flatum etiam alui acerrimū emittit, & urinam grauiter olen-  
tem; unde fit, ut canes arbores odorentur. mingit enim crure elato, ut canes ad sit-  
pites. scædum quoq; odorē in cibo relinquit ex suo halitu, proscisso namq; leone in-  
teriora grauiter olent. Sunt inter quadrupedes, ferasq;, quæ uictum ex lacu, & flu-  
uijs petant. At uero à mari nullum, præterquā uitulus marinus. sunt etiam in hoc  
genere fiber, fatherium, saryrium, lutris, latax, quæ latior lutre est, dentesq; habet  
robustos, quippe quæ noctu plerunq; egrediens, uirgulta proxima suis dentibus  
ut ferro præcidat. lutris etiam hominē mordet, nec desistit (ut ferunt) nisi fracti ossis  
crepitum senserit. Lataxi pilus durus, specie inter pilum uituli marini & cerui.

Quæ animalia lambendo, quæ sorbendo, quæ ue moriendo bibant, quibusq; rebus cornigera  
omnia pascantur, necnon de uictu suis. Caput VI

**L**ibunt, quibus dentes ferrati, animalia lambendo: atq; etiam nonnulla  
ex non ferratis, ut mures. Quibus autem continui, sorbendo, ut equi,  
& boues. ursus neq; sorbendo neq; lambendo, sed morsu, auium cæ-  
teræ sorptu. Sed quibus collum est longum, intermittunt, caputq; re-  
supinat. Porphyrio unus, morsu. Cornigera animalia tam fera, quàm  
urbana, & quibus dentes ferrati non sunt, omnia fruge, herbaq; uescuntur, nisi ue-  
hementer esuriant, siue excepto, qui minime herbæ frugum ue appetens est, sed ra-  
dicum maxime ex omnibus animalibus, quoniam rictu aptissimo ad id negocij est.

facilime etiam omnium idem hoc animal ad quoduis pabulum assuescit, & celerrime quoque in pinguedine proficit pro sui corporis magnitudine. sexaginta enim diebus pinguescit, quantum autem profecerit, non cognoscunt, quibus ea res curae est, ubi ieiunium ad faginam constituerint, pinguescit fame praefatigatus triduo, & caetera quoque omnia ferè melius praefatigata fame pinguescunt. faginant à triduo iam qui sues obefant. Thraces per faginam, cum primo die porum praebuerint, post interposito uno die praebent, tum duobus, deinde triduo, atque ita subinde augendo numerum usque in septimum, curant, pinguescit hoc animal hordeo, milio, ficu, glande, piro, cucumere. Sed maxime tum hoc, tum caetera, quibus uenter calidus est, quiete, immotioneque pinguescunt, caeterum sues pinguiore redduntur, etiam cum in luto se uolutant. 10 pascere gregatim pro aetate uelle uidentur, lupo etiam suis obfistere, repugnareque potest. Sexta pars ponderis quantum ponderarit uiuus, absumitur occiso in pisces, sanguinem, & reliqua id genus. Tam sues, quam caetera animalia omnia solent, cum lactantur, extenuari. haec ita se habent.

Quibus rebus pascantur boues, & de eorum incremento.

Cap. VII



Oues & fruge & herba uescuntur, pinguescuntque his, quae statim dent, ut eruo, & faba fresa, atque etiam ipsa fabarum herba. Et seniores, si cute incisa spiritum adigas, deinde praebes pabulum, pingues facies. Ad haec hordeo uel integro, uel pinso, & à gluma separato pinguescunt, & 20 dulcibus, ut ficu, & passa: uino etiam & frondibus ulmi: sed praecipue sole, & lotionem calidae aquae. Cornua iuniorum tepesacta in cera flectuntur, ducunturque facile, quod uolueris, nec pedum dolores sentiunt, si eorum cornua illinantur cera, aut oleo, aut pice, laborant armenta uehementius pruina sollicitata, quam niue. Augentur iuuencae amplius, cum plus temporis expertes Veneris degunt. Quam obrem terrae Epiri incolae, quas pyrrhicas uocant, annis nouem intactas Veneri seruant, ut incrementum amplius capiant, & setauras nuncupant, has numero quadringentas esse, & proprias regis accipimus, nec posse uiuere locis alijs, quantquam tentatum ab aliquibus est.

De pastu, & potu equi, muli, & asini.

Cap. VIII



Qui, muli, & asini fruge herbaque uescuntur, sed maxime potu pinguescunt, lumenta enim pro aqua, quam bibant, usu, suo fruuntur pabulo: & quod minus potum aspernatur, id appetentius pabuli est, & plenius obefatur. Farrago pilum expolit, cum frugibus grauida est: sed duris iam horrens aristis inutilis est. Herbae medicae prima falx uitio datur, & cum foetida aqua rigatur, incommoda est. Boues claram bibere gestiunt, At equi, ut cameli, turbulentam & crassam suauius bibunt, quippe quae ne ex fluuio quidem prius hauriant, quam pede inturbent, possunt uel ad quatuor dies 30 terare sine potu, mox bibunt quod multum.

De pastu, & potione elephantis, de quo aetate eiusdem, & cameli.

Cap. IX

40



Elephantus eodem pastu modios Macedonicos nouem, quod plurimum edere potest. Sed tantum dare periculosum est, sex, aut septem dedisse modios, in usu frequenti satis est, sed farinae non plus, quam quinque, uini etiam quinque mares, quae mensura heminas continet sex, iam quidam amphoras aquae mensurae Macedonicae quatuordecim eodem hausit potu, & rursum à meridie eiusdem diei octo. Viuit magna pars camelorum annos triginta, sed multo plures nonnullae, nam uel ad centesimum annum facultatem uiuendi protrahunt. Elephantem alij annos ducentos uiuere aiunt, alij trecentos.

Quibus



Quibus herbis oves & caprae uescantur, & de causa impinguationis earundem.

## Caput X



Ves & caprae herba uescuntur. pascere oves sedulae, atque stabiles solent. Caprae loca crebro permutant, summaque tantum contingunt. Pinguescit potissimum ovis ex potu: quamobrem aestate salem dare die quinto soliti sunt, singulis centenis singulos modios. sic enim pecus incolume, atque pinguius redditur. Frequens igitur salis usus eo pertinet, quando & paleis copiam salis admiscunt, ut sitibunda plus aquae hauriant: & autumno cucurbitam sale contactam afferunt: quod lac etiam auget. & agitatae quoque meridie, plus postmeridianis bibunt, foetis distenta ubera pendent, quibus salis ab unde est. opimat pecus olea, oleaster, aphaca, palea, herba, quae omnia efficaciora sunt ex falsugine respersa. pinguescunt & haec plenius praefatigata inedia tri-  
duo. Aqua ouibus autumno commodior aquilonia, quam austrina est. & pascua ad solis occasum spectantia profunt. itinera & labores extenuant, indicant pastores ouem ualidiorem, cum hybernis temporibus pruina, quam susceperit, seruat, nam quibus uirium minus, parum praefua imbecillitate constantes, discutiunt suo motu quantum susceperint. Caro cuiusque quadrupedis deterior est, cum locis palustribus, quam editioribus pascit. Sunt porro frigoris patientiores, quibus cauda amplior, quam quibus porrectior, & glabrae exutiores, quam uestitiores. crispae etiam algoris impatientes sunt. Valent melius oves, quam caprae: sed robustiores caprae, quam oves sunt. ouium, quas lupus occiderit, pelles, ac uellera, & facta ex his uestis, longe quam caetera aptiora sunt ad pediculos procreandos.

De pastione, & potu insectorum.

## Caput XI



Insecta animalia quibus dentes, omniuora sunt. Quibus autem lingua, tantum humore undique eliquando sua lingua uescuntur. quorum alia omniuora. Sunt, quibus gustus omnium saporum est, ut muscae: alia sanguiuora, ut tabani, & asili: alia succis plantarum, & fructuum uiuunt. Apis una nullis putidis assidet, nec utitur alio cibo quam dulci. Aquam etiam libentissime inde hauriunt, quam synceri, clarissimique fontes scaturiunt. Talis animalium uictus est.

ἐκχυλίσματα, eliquando, exuendo.

De actionibus animalium, & rebus in quibus eadem uersantur.

## Caput XII



Actio autem, & omne eorum negocium in coitu, procreatione, atque uictus solertia uersatur: necnon ad frigora, aestus, mutationes denique temporum pertinet. inest enim omnibus sensus natius mutationis factae frigore, aut calore. Itaque ut homines alij domicilia hyeme repetunt, alij qui amplioris provinciae principes sunt, sedem pro tempore mutant, ut mora aestate locis frigidis, hyeme tepidis trahant: sic bruta, quae loca posunt permutare, faciunt. Atque alia subsidium in ipsis consuetis sibi locis comperiunt, alia peregre profiscuntur. Iam ab autumnali aequinoctio ex Ponto, locisque frigidis fugiunt hyemem futuram. A uerno autem ex tepida regione, ad frigidam sese conferunt, aestus metu futuri. & alia de locis uicinis discedunt, alia de ultimis propere discedunt, ut grues faciunt, quae ex Scythicis campis ad paludes Aegypti superiores, unde Nilus profluit, ueniunt, quo in loco pugnare cum Pygmaeis dicuntur: non enim id fabula est, sed certe, genus tum hominum, tum etiam equorum pusillum (ut dicitur) est, deguntque in cauernis, unde nomen Troglodytae à subeundis cauernis accipere. Plateae etiam migrant, & de Strymone amne ad Istrum aduolant, prolemque ibi faciunt, abeunt uniuersae, ac priores expectant posteriores, propterea quod ubi montem superarint, uideri priores à posterioribus nequeant. Quinetiam pisces

modo eodem, alij ex Ponto, aut in Pontum tranant, alij per hyemem ex alto in littora teporis gratia ueniunt, contrā æstate ex littore in altum uitantes æstum discedunt. Aues quoq; imbecilliores hyberno & gelido tempore discedunt in campos, ut tepore potiantur: æstiuo autem repetunt montes, ut æstu careant, semper quæ imbecilliora sunt, prius utrauis ratione discedunt. Iam scombri antequam thunni, coturnices antequam grues: altera enim Augusto, altera Septembri mense incipiunt, sunt profectò omnia pinguiora, quæ de locis discedunt frigidis, quàm quæ de calidis: ut coturnices autumno, quàm Vere sunt pinguiores. Fit enim ut simul de locis frigidis, & tempore calido discedatur. Sunt etiam Veneris appetentiora uero tempore, cumq; ex tepido discesserunt. Sed auium, grues, ut dictum est, ex ultimis in ultima abeunt, uolant flatu sequundo. quod de lapide narrant, falsum est. Iapidem enim eas tenere fulcimento, quem, ubi deciderit, accipi utilem ad auri probationem aiunt. Palumbes etiam discedunt, & liuiæ, nec hybernare apud nos patiuntur, atq; etiam turtures, & hirundines: sed columbæ manent. Coturnices quoque discedūt, nisi pauca locis apricis remanserint: quod & turtures faciunt, uolant gregatim, tum palumbes, tum turtures, cum accedūt, & cum suo tempore abeūt. Coturnices cum ceciderint, si serenum sit, aut aquilonium tempus, sociantur, & prospere degunt: sed si austrinum, moleste, propterea quod parum uolant: humidus enim grauiusq; aufer est. Quam ob rem qui aucupantur, austrum, non aquilonem obseruāt, omnino ægre propter sui corporis pondus uolant, sunt enim corpore grandiore, quàm suis pennis deferri possint, uociferantesq; ob eam rem uolant, laborant enim quasi oppressæ onere, cum hæc adeunt loca, sine ducibus pergunt, at cum hinc abeunt, ducibus lingulaca, oro, & matrice proficiuntur, atque etiam cynchramo, à quo etiam reuocatur noctu, cuius uocem cum senserint aucupes, intelligunt parari discessum, matrix forma perinde ac aues lacustres, est, atque etiam lingulaca, quæ linguam exerit prælongam, unde ei nomen. otus noctuæ similis est: pinnulis circiter aures eminentibus præditus, unde nomen accepit, quasi auritum dicas, nonnulli ululam eum appellant, alij alionem. biatero hic est, & halucinator, & planipes, saltantes enim imitatur, capitur intentus in altero aucupe, altero circumeunte, ut noctua. omnes denique aues unca breui sunt collo, & lingua lata, aptaq; ad imitandū. Nam & Indica auis, cui nomen psittacæ, quam loquaciū, talis est, & loquacior cum biberit uinum, redditur. Gregales ex auib; sunt, grus, olor, platea, anser minor.

De actionibus piscium, quorundamq; terrestrium in fugiendis aduersis.

Caput XIII



Iscium alij, ut dictum est, discedūt ab alto ad littus, & contrā de littore in altum, fugientes exuperantias caloris, & frigoris. Sed præstant pelagicis littorales, quippe qui cibo copiosiore, melioreq; potiantur, quoniam sol ingruit, plura exeūt, ut sit in hortis: nam & lituus niger propius terrā oritur, alter similis erraticis est. Tum etiā bene ex calido frigidisq; temperata sunt loca maris terrena, quo fit, ut & caro eorū pisciū magis conseret, cum pelagiorū humida, mollis, solutaq; sit. Littorales sunt dentex, scarabæus, cernua, aurata, mugilis, mullus, turdus, draco, pulcher, gobio, atque omne saxatile genus. Pelagij sunt pastinaca, genusq; omne cartilagineum, & congrorum albicantium genus, & hiatula, rubelio, glaucus, pagri autē, scorpiones, congridi nigrantes, murenæ, cuculi ambigunt. Sed discrimen horum, diuersitate etiam locorum ac temporum existere potest: ut apud Cretam insulam gobiones, omneq; saxatile genus satis pinguefit. Thunnus etiam post arcturum melior est: iam enim eo tempore ab insectis aili agitatione requiescit, quæ facit, ut sit in æstate deterior. Quin-

etiam

ἐπεὶ ποτὶ τοῖς  
λίτοις, ἀμβί-  
γουν, scilicet an  
littorales an pe-  
lagij.

etiam maritimis lacubus genera plura piscium marinorum gigni apertum est, ut  
 salpam, auratam, mullum, alios ferè plurimos. Amias etiam in Alopeconneso re-  
 peries, & in Bistonide lacu plurima genera habentur. Monedulæ magna ex parte  
 non subeunt Pontum, sed in Propontide trahunt æstatem, & pariunt: hyemem in  
 Aegeo. Sed thunnî, limariæ, amix subeunt Pontum Vere, æstatemq; ibi tradu-  
 cunt. & reliqui ferè plurimi fufanei, & gregatilis generis eodem transeunt. Est sanè  
 plurima piscium pars gregatilis, nec ullus grex caret duce. Petunt autem Pontum  
 pastus gratia, qui uberior & commodior ibi, propter aquarum dulcium admixtio-  
 nem suppeditatur. Belluæ quoque magnæ pauciores ibidem sunt, nam excepto  
 10 delphino, & phocæna, quam tirsionem interpretor, nihil in Ponto maleficum est.  
 nec delphinus hic magnus est, quanquam extrâ ubi aliquantum processeris, ma-  
 gni habeantur. Tum itaque uictus, tum etiâ partus gratia Pontum subeunt. Sunt  
 enim ibi loca ad partionem aptiora, & humor dulcior ac potulentior foetum meli-  
 us educat. Sed cum pepererint, & proles iam adoleuerit, exeunt post Vergiliâ sta-  
 tim: & si hyems austrina sit, tardius, si aquilonia, citius, propter sequundi flatus com-  
 moditatem: prolesq; adhuc parua apud Byzantium capitur, utpote cum longior  
 mora in Ponto non fuerit. Sed de cæteris & cum adeunt, & cum exeant, constat.  
 Sarda autem una, cum adit, uidetur, & capitur: sed exiens nusquam uisa adhuc est.  
 quod si qua apud Byzantium aliquândo capiatur, piscatores sua retia lustrant pro-  
 pter exitus insolentiam: cuius rei causa est, quod solæ ipsæ subeunt Istrum amnem,  
 20 unde fisso flumine per abditum terræ mearum defluunt in Adriam sinum. argu-  
 mento est, quod ibi contrâ euenit, quàm in Ponto: exeuntes enim semper capiun-  
 tur, subeuntes nunquam. Thunnî dextrorsum terram contingentes subeunt, sed  
 remeant contrâ: læuum enim in latus se admovent, quod propterea facere dicun-  
 tur, quia dextro oculo clarius uidet sua natura, læuo hebetius. Fufaneis, de quibus  
 loquor, interdiu meare, noctu quiescere in more est, pascuntur etiam nocte, nisi lus-  
 ceat luna, ita enim faciunt iter, nec uolunt quiescere. Quidam usuperiti rei marinæ  
 nihilo eos moueri, sed quiescere à bruma ad æquinoctium uernum, ubicunque id  
 temporis sint, asseuerant. Monedulæ subeuntes Pontum capiuntur, exeuntes au-  
 tem minus, optimæ in Propontide sunt, antequam pariant. At cæteri fufanei exe-  
 30 untes potius capiuntur, & optimi per id temporis sunt. Cum uero adeunt Pontum,  
 proxime Aegeum pinguisimi capiuntur. quo subinde ascenderint magis, eo maci-  
 lentiores fiunt. sæpe etiam flatu austrino uehementius occurrante fit, ut cum mo-  
 nedulis & scombris exeant, ac mari inferiore magis quàm circa Byzantium capian-  
 tur, discessum, sedisq; mutationem hoc modo faciunt. Hic idem affectus terrestri-  
 bus etiam euenit, cum se abdunt, & latent. hyeme enim latebras subeunt, tempore  
 iam tepidiore exeunt, ratio uero & latèdi & patendi communis animalium ea est,  
 ut sibi contra utriusque exuperantiam temporis opitulentur. latet aliquorum ge-  
 nus torum, aliquorum partim latet, partim non latet. Testa enim intacta omnia la-  
 tent, ut in mari purpura, buccinum, omneq; id genus. Sed absolutorum latibulum  
 40 euidentius est: conduntur enim secessu, ut pectines facere uisuntur, aliqua leuiore  
 quodam tegmine superimposito delitescunt, ut cochleæ terrestres, id est limaces.  
 & adherentiū mutatio incerta est. Non tamen eodem tempore omnia  
 latent, sed limaces hyeme. purpuræ & buccina canis exortu  
 dies circiter tricenos cōduntur. pectines etiam tem-  
 pore eodem. sed eorum plurima sanè la-  
 tent, & algore urgente, & astu.

ἐξω γὰρ πο-  
 ναίνους ὡς δὲ ἄλ-  
 γῖνους, ἀδύνα-  
 ὦν γὰρ τῶν  
 πόντου. Plini-  
 us sic: Sed in  
 Pontū nulla in-  
 trat bestia pisci-  
 bus malefica,  
 præter uita-  
 los, & paruos  
 delphinos.

*Quo tempore insectorum genera sese abscondant, aut æstus aut hyemis impetu.*

Caput XIII



Nescia penè omnia conduntur, præter ea, quæ uitam in domicilijs cum hominibus agant, quæq; prius intereant, quàm annuū tempus excedant. latet hæc hyeme alia diutius, alia quandiu aliorum uehemens est, ut apes: nam ipsæ etiam cessant, & latent. cuius rei argumentum, quod minime cibum sibi appositum gustare uidentur, & si qua creperit, ieiuna spectatur, uentre translucente, nulloq; penitus contento, quod manifestum sit. Quiescunt ab occasu uergiliarum usque ad uer. conduntur autem quæq; locis apricis abdita, & ubi sibi cubile constituere tutius solent.

*De genere serpentum, quod hyeme abditur, deq; nonnullis piscibus qui hyeme frigoris causa conduntur, quicq; æstate propter calorem.*

Caput XV



Anguinei quoq; generis multa se condunt, ut ea quæ interfecta cortice sunt, serpentes dico, lacertos, stelliones, crocodilos fluuiatiles. Mensibus quatuor frigidissimis hæc latent, nec per id tempus quicquam comedunt. Cæteræ quidem serpentes cauernas subeunt terræ, sed uiperæ sub saxis conduntur. Piscium etiam complures latere nouimus, sed aperuissime hippurum, quem equiselem nominaui, & coruulū siue graculum per hyemem. nam hi soli nunquam capiuntur, nisi certis quibusdam temporibus, eisdemq; semper, cum cæteri omnes ferè semper capiuntur. Murena etiam latet, & cernua, & conger. Saxatiles uero coniugatim mares cum fœminis conduntur, quomodo & fortificare solent, ut turdi, merulae, percae. Thunni etiam latet præaltis gurgitibus hyeme, pinguescuntq; à latibulo maiorem in modum. capi incipiunt uergiliarum ab oritu ad arcturi occasum ultimum, reliquo tempore quiescunt latentes, capiuntur nonnulli ex his, cæterisq; latentibus tempore sui secessus, cum se moueant locis tepidis, aut si temporis insolitæ quietes contingant. Prodeunt enim aliquantulo de suo cubili pastum, & præcipue plenilunio, sunt magna ex parte suauissimi, cum latent. Primadæ in cœno se abdunt, cuius rei argumentum est, quod neque eo tempore capiuntur, & dorso fœculento, pinnisq; adductis, oppressisq; spectantur. Verno autem tempore prodeunt, & appropinquant ad terram coeunt, res, parientesq; quo tempore fœtu grauidæ capiuntur, tempestiuæq; tantisper esse putantur. Autumno uero & hyeme deteriores sunt. Simul etiam mares pleni semine genitali, lacte appellato, per id tempus cernuntur: itaque præstant ad usum. prole adhuc parua difficile capiuntur: adultiore, iam larga captura propter infestum stimulus est, latent alia in arena, alia in luto, ore tantum detecto. plurima tempore conduntur solum hyberno, ut crustata, & pisces saxatiles, & raia, omneq; cartilagineum genus, diebus scilicet frigidissimis, quod ita esse eo argumento constat, quod minime cum aliorum est, capiuntur, sed piscium nonnulli æstate etiam latent, ut glaucus: hic enim per id tempus se abdit circiter dies sexaginta. Asellus etiam latet, & aurata plurimum temporis. asellum latere indicio esse uidetur, quod longo interposito tempore capiatur. Pisces uel æstate latere documento illo probatur, quod temporibus syderum fiant capturae, & præcipue caniculæ: mare enim per id tempus eueritur: quod latissime apud Bosphorum patet. limus enim in summa effertur, piscesq; innatant, aiunt etiā si gurgitum ima sæpius terantur, plures eadem sagena capi secundo iactu, quàm primo. Tum etiam magnis imbribus multa apparent animalium genera, quæ antè uel nunquam, uel raro uisa fuerint.

De quibus, quæ hyeme occultantur.

Caput XVI



Vium etiam complures cōduntur, non ut aliqui putant, pauca. nec omnes ad loca tepidiora abeūt, sed quibus loca eiusmodi sunt uicina, solita sedi, ijs eo secedere libet, ut & miluos & hirundines agere animaduersum est. Quæ autē procul locis eiusmodi morantur, non mutant sedem, sed se ibidem condunt. Iam enim uisæ sunt multæ hirundines in angustijs conuallium nudæ, atque omnino deplumes. milui etiam de eiusmodi locis euolasse, cum primū apparerent, uisi sunt. Latibulo genera distinguui uel adunca uel rectunguia non possunt. nam & ciconia latet, & merula, & turtur, & alauda, de turture quidem maxime omnium cōstat: nemo enim propē dixerim uidisse per hyemem uspiam turturem dicitur. latere autem incipit præpinguis, & quanquam pennas in latebra dimittit, tamen pinguedinem seruat. palumborū aliqui latent, aliqui non latent, sed cum hirundinibus abeunt. Turdus etiam latet, & sturnus, & ex genere unco miluus paucis quibuscū diebus, & noctua.

De quadrupedibus quæ hyeme lateant, de quibus ijs quæ senectutem exuunt.

Cap. XVII



Vadrupedum quæ animal generant, hystrices cōduntur, & ursi: sed utrum propter frigus, an alia de causa, ambigitur. pinguescūt ursi per id tempus, tum mares, tum foeminae uehementer, ut mouere sese facile nequeant. parit etiam foemina eo tempore, & tandiu latet quoad tempus sit, ut suos catulos in apertum producat, quod uerno tempore mense à bruma tertio facit. Sed quod minimum, dies circiter quadraginta latet: ex quibus bis septem ita sopitur, ut se nihilo moueat: reliquis postea pluribus latet quidem, sed mouetur, & surgit. foetu grauida ursā, uel à nemine, uel à paucissimis capta est. tempore sui latibuli hoc animal nihil edere certum est: quippe quod neque exeat, & captum uentre intestinoque inani uideatur. Narant eius intestinū per inediam ita conniuere, ut adductum propē cohæreat. Itaque ursum latebram egressum primum herbam arum dictam degustare, ut intestinum laxetur, & hiet. Glires etiā latent in ipsis arboribus, pinguescuntque per id tempus uehementer. itidem mures Pontici generis. Nonnulla ex ijs quæ conduntur, exuunt id, quod senectus uocatur, quod cutis ultima est, & primi ortus operculū. Sed in pedestri uiuiparo genere de urso, qua de causa lateat, ambigitur, ut dictum iam est. Cortice infecta maxima ferē sui parte secessus suo tempore latent. & exuunt senectutē ea, quibus cutis molliis, nec prædura, & testacea quidē est, qualis testudini (nam & testudo inter cortice infecta enumeranda est, & mus aquatilis) sed qualis stellioni, lacerto, & præcipue serpentibus est. exuunt enim hæc omnia, tum Vere cum egrediūtur, tum etiam autumno. Vipera etiā exiit tam Vere, quam autumno. Cum serpens exuere incipit, ab oculis primū detrahi aiunt, ita ut obcæcari uideantur ijs, qui rem non intelligūt. tum caput exiit: glabrum enim hoc omnium antequam reliquum corpus apparet, atque una ferē nocte & die senectus tota exiit à capite orsa & caudam, & cute altera intus subnascante ipsa remouetur. Vt enim foetus inuolucro secundarum quo cōtentus prodierit, exiit, sic ista senectute detracta renouātur. Infecta enim eodem modo exuunt senectutem, quibus hoc solitum est, ut silpha, & culex, & ea quorum pennæ uagina continentur, ut scarabæi. sed omnia factio iam quod gigni debuerit, exuunt. nam ut partui uiuiparo secundæ, sic uermiculariæ proli operculum circumrumpitur. æque & apibus, & locustis. cicadæ ubi eruperunt, oleis aut arundinibus insidunt, & cum rupto operculo exeūt, paruum quiddam in eo relinquant humoris, nec multo post uolant, & incipiunt canere. Locustæ inter marina,

ὅ μὲν δὲ πον-  
τικός ὁ λα-  
κός. Plin. Con-  
duntur hyeme  
ἐν Pontici μου-  
res, ἃ δὲ ταχέ-  
αλβι.

γινέται ὅ ἐκ-  
δινομενὴς τοῦ  
σπέρματος ἐκ-  
πλιν. Vt extra  
fuit membra  
næ, quod succi  
rat intus.

& gammari exuunt, aut Vere, aut autumnno post partum. Iam capræ aliquæ sunt locustæ, mollem habentes partem superiorē, quod crusta iam circumrupta detracta quæ esset: inferiore autē duram, quia nondū esset disrupa, non enim similis in his atque in anguibus exutio sit, latent locustæ menses circiter quinque. Cancrī etiā exuunt senectutem, molliores quidē perspicue, sed etiā duriore exuere aiunt, ut maïas. Cum uero exuunt, mollis admodū crusta subnascitur. & quidē cancri præ teneritate non satis ambulare possunt, exuunt hæc sæpius anno. Sed quænam lateant, & quomodo, & tempore, atque etiā quæ, & quo tempore exuant senectutem, iam dictū est.

*Non omnia animalia omni tempore prospere ualere, quod uel tempus auiibus conducatur.*

Caput XVIII

10



Iuuant autē animalia prospere non eisdem temporibus, nec omnibus æque exuperantibus. Valetudines etiā, & morbi per tempora pro generum diuersitate uarie accidunt, & in totum non eadem omnibus ualetudo existit, iam auiibus profunt squalores, tum ad ceteram sanitatem, tum etiā ad partum, & præcipue palumbis. At uero piscibus, exceptis quibusdā paucis, imbres conducunt. Incommodi contrā auiibus anni pluuij sunt, piscibus sicci. quippe cum auium talis natura sit, ut ne bibere quidem largius possint sine detrimento. Aduncæ igitur aues, ut dictum est, uiuunt propē dixerim sine ullo potu: quod Hesiodus nesciuit, facit enim in narratione obfessionis Nini, aquilam augurij præsidem bibentem. Ceteræ aues bibunt quidē, sed parum, nec aliud ullum potioni indulgeat, quod pulmonem fungosum habeat, aut pariat ouum. Cum aues ægrotant, plumæ indicium proferunt, turbantur enim, nec posituram eandem seruant quam habent, cum recte ualent.

*Quæ animantia pluuiæ gaudent, quibus uel noceat.*

Caput XIX



Iscium genus maxima ex parte annis pluuijs bene (ut dictum est) uiuit, ita enim nō modo plus cibi nanciscitur, uerum etiā omnino pluuio humore iuuatur, ut ea quæ terra gignuntur, olera enim quamuis rigentur, tamen non tantum proficiunt quantum imbre, quod inde arundinibus etiā lacu prognatis euenit, nihil enim fere accrescunt, nisi aquæ pluuiæ incendant. Indicium uel inde accipi potest, quod pisces plurimi pe-  
tant Pontum, ut in eo traducāt æstatem, facit enim copiam amnium loci illius, ut mare sit dulcius, & cibus largior habeatur, quem ijdem fluuij deferant. Subeunt etiā fluuios genera piscium complura, & præstant in fluentis & lacubus, ut amia, mugilis, gobiones etiā pinguescunt in fluuijs, denique loca prædita lacus commoditate pisces possident optimos. ex pluuijs autem ipsis æstiuu imbres commodiores sunt parti maximæ piscium, & præcipue cum uer, æstas, & autumnus imbribus abundarint, hyems contrā serenior fuerit, ad summam propē dixerim, cum bene hominibus annus cedit, tunc & piscibus feliciter degere cōtingit. locis autē frigidis parū igitur. Maxime infestantur algore, qui lapidem in capite habet, ut chromis, lupus, phager, umbra. facit enim lapidis rigor, ut per algorem gelentur, & excidant. Sed cum plurimis piscium generibus imbres conducant, mugili tamen, & capitoni, & ei qui a nonnullis murinus uocatur, nocent. fit enim ut pluuijs multi ex his de facili excæcentur, si modum aqua excefferit, solet enim per hyemem potius capito ita affici, nam oculi eius albescunt, & macilentus per id temporis capitur, atque ad postremum malo eodem interit, quod nō magis imbrīū copia, quam algore accidere uidetur. Iam enim cum alibi tum in Nauplio agro terræ Argiæ, in uadis multi capti sunt cæci, cum hyems fuisset asperrima, multi etiā albos habentes oculos capti sunt. Aurata quoque hyeme laborat, sed archanas æstate, eoque tempore extenuatur.

Prodest

Prodest coruulis ferme, præter cæteros pisces annus squalens, quod his quoque ob  
eam rem commodior est, quia per siccitatem potius tepor accidit. loca pro sua natura  
genera quæque sibi habent ad incolumitatem commodiora. quod enim natura lito-  
rale, aut pelagium est, huic suo loco pro naturæ desiderio uersari commodius est.  
quod autem ambigit, id cōmode utroque degere potest. Sed sunt etiā loca quædam  
singulis propria, in quibus rectius ualeat. Commodiora (quod simpliciter dixerim)  
loca sunt ea, quæ algarū copia scatent. pinguiore enim locis his capiuntur, qui mul-  
tis & uarijs locis solent pabulari. Nam & quibus alga in cibo est, abunde pascuntur:  
& quibus caro appetitur, plures pisces sibi reperiunt. Interest etiam aquilonia sint,  
an austrina. genus enim longum aquilonijs melius uiget: & quidē æstate, loco eo-  
dem, in aquilonijs plures longi quā lati capiuntur. Thunni & gladij agitur a filo  
canis exortu. habent enim utriusque per id tempus sub pinna, ceu uermiculiū, quem  
asilum uocant, effigie scorpionis, magnitudine aranei, infestat hoc tanto dolore, ut  
non minus interdum gladius, quā delphinus exiliat. unde fit, ut uel in nauigia  
sæpenumero incidat. Thunni omnium maxime piscium gaudet repore, & ob eam  
rem arenam & littora adeunt. per summa etiam maris innatant, quo teporis po-  
tiantur. Pisciculi autem seruari propterea possunt, quia spernuntur. maiora enim  
magni sequuntur. sed ouorum & prolis pars magna proinde absūmitur. Cum  
enim pisces desiderio teporis loca forturæ adeant, liguriunt quicquid attigerint. ca-  
piuntur maxime pisces non multo antē, quā sol oriatur, aut postquam occidit.  
denique circa solis ortum aut occasum. tempestiue enim iaci tantisper putatur,  
quamobrem eo tempore piscatores solent retia tollere. tunc enim maxime uisus pi-  
scium fallitur, quippe cum noctu quiescant, luce autem iam clariore melius uide-  
ant. Morbus pestilens nullus incidere piscibus uniuersis uidetur, qualis plerunque  
hominibus, & quadrupedum equis, & bubus, & reliqui generis nonnullis acci-  
dit, tum feris, tum urbanis. ægrotare tamen & ipsi putantur. & quidem piscatores  
pro morbi indicio capiūt, cum aliquot extenuatos languentibus similes, & colore  
immutatos, inter multos pingues ac ualidos eiusdem generis ceperint. Marinum  
genus ita se habet.

ἐπιποθελο-  
ς, ambigit,  
uitam degit am-  
biguam.

λυμαινόμεναι,  
liguriūt, uasit

Que fluuiatilibus, & lacustribus piscibus noceant, quo ue ingenio ijdem  
capiuntur. Caput XX



Luuatile & lacustre peste quidem & ipsum immune est, sed non-  
nullis morbi incidunt proprij. silurus enim canis exortu potissimum  
(quod sublimis innatet) sideratur, & tonitruo sopitur magno. quod  
& cyprino accidit, sed leuius. Silurus uel à dracone angue, gurgite pa-  
rum alto ictus interit. Ballero, & tilloni lumbricus canis exortu inna-  
scitur, qui debilitat, cogitque ad summa stagni efferri, quæ aestu intereunt. chalcis,  
quam æricam appello, uitio infestatur diro, ut pediculi sub branchijs innati quam-  
multi interimant. quod nulli ex cæteris accidit. moriuntur pisces uerbasco herba,  
quamobrem cæteri, fluuiatiles, & lacustres ea inficientes capiunt: sed phoenices  
marinos etiam ita piscantur. Sunt qui duobus quoque alijs capiendi generibus  
utantur. quod enim altos gurgites amnium pisces per hyemem uitare solent (Cum  
enim aliās dulcis aqua frigidior sit, tum uel maxime eius ima algent) idcirco fos-  
sam in fluuium ducunt, quam maceriæ iungentes operiunt, & sceno, atque lapi-  
dibus stipant, ut quasi cuniculum faciant, aditu patente ad fluuium, unde implea-  
tur: tum factio gelu nassa inde piscantur. Alterum genus capturæ tale est, cuius  
usus & hyeme est & æstate. medio amne fruticibus, & lapidibus circumspiciunt,  
uno aditu dato modo oris. Tum in eo ore posita nassa piscantur, motis lapidibus.

Testaceo generi anni pluuij profunt, præterquam purpuris: cuius rei indicium est, quod si amnis in mare fluentis aquam gustarint, moriuntur eodem die. uiuit purpura extra mare, quæ capta est, dies circiter quinquaginta. Alit altera alteram, eo quod sua testa gnatum, ueluti algam muscum ue gerit. quæ autem pro cibo ijs afferunt, pōderis causa adhiberi aiunt, ut in libra sint grauiore. Cæteris squalor incommodus est. nam & pauciora redduntur, & deteriora. & quidem peccines tunc magis trahunt ruffum colorem. Iam in Pyrrheo Euripo peccines aliquādo defuerūt, non modo propter ferramentū, quo piscatores abradendo ubertim caperēt, uerum etiam propter siccitates. Cæteris etiā testatis imbres conducūt, propterea quod mare dulcius redditur: sed frigus facit profectio ne uel in Ponto, uel in fluuijs gigni possint, exceptis biforibus paucis. genus nanque unifore potissimum rigore induratur, & interit. Aquatile animalium genus ita se habet.

De morbis suum, eorumque remedijs.

Caput XXI



Vadrupedum sues tribus morbi generibus laborant, quorū unum raucedo uocatur, quo maxime fauces, maxillæque inflammantur, sed idem malū, uel qualibet alia corporis parte contrahi potest. Iam enim plerumque in pedem, aliās in aurem decūbit. Putrescit protinus membrum, & ulcus serpit, donec ad pulmonē deueniat, quo tacto mors sequitur, crescit hoc uitij celeriter, nec potest sus quicquam edere cum ita ægrotat, etiā si quantumlibet sit morbi incrementum, curatur a porcarijs, cum malū incipere senserint, haud alio modo quam tota parte abscissa qua coeperit. Reliqua duo generum eodē uocabulo nominantur struma, quorū alterū dolor capitis & grauitas est, quo plurimi laborare solent: alterū alui profluuiū est, quod irremediabile incidit. alteri succurritur ex uino adhibito naribus, eoque ipso dilutis, sed difficulter eo quoque periculo subtrahitur, bīduo enim aut quadriduo interitus obuenit. Raucescunt potissimum eo anno, quo montes abunde tulerint, & pinguisissimi sint. luuat mora celsi dedisse in cibatu, & balneū multū & calidum, & uenæ sub lingua sitæ cultello adactō sanguinē detraxisse. Grandinosi autē fiunt sues, quorum crura & collum & armi carne constant humidior, quibus partibus uel grandines plurimæ innascuntur, caro dulcior est si grandines habet paucas: sed si multas, humida ualde, & insipida est. Facile qui grandent cognoscuntur: parte enim linguæ inferiore grandines habentur, & si setam dorso euellas, cruorē in radice pili euulsi uideris. Pedibus etiam posterioribus constare non possunt, qui grandent, carent grandine cum adhuc lactent, tolluntur grandines uipha, quæ uel in cibatu utilis est. Sed præcipue alunt, & opimant ficus, & cicer, cibus denique non simplex, sed uariis sagina optima est. gaudent enim sues pabuli mutatione, quemadmodum & cætera animalia, tum etiā fieri aiunt cibi uarietate, ut partim infletur, partim impleatur carne, partim opimetur. Glandes suauiter quidem a suis comeduntur, sed carnem humidam faciunt si solæ dantur, & si grauidæ glandem copiosius ederint, abortum faciūt, ut oues: quibus constitātus hoc glandibus esitatis accidit, unum ex omnibus quæ nouimus animalibus, sus grandinem concipit.

Quibus morbis infestentur canes.

Caput XXII



Anes tribus laborant uitij, rabie, angina, podagra. facit rabies furorem, & quæ momorderint, omnia rabiūt, excepto homine. Intereūt canes hoc morbo, & quæ morsā sunt, excepto homine. Angina etiā interimit, & podagra tēti pauci euadere possunt. Rabies camelum etiamprehendit. Elephantos cæteris malis immunes aiunt, inflatio ne autem alui acrius infestari,

Morbi

† πηλὸν αὐτῶν  
πρ. id est, ex-  
cepto homine.  
Leuiter Theo-  
dorum uisus est  
accusasse Leo-  
nicen. affirmās  
legendū fuisse,  
πρ. id est, pri-  
us homine.



*Morbi boum gregalium.*

Caput XXIII



Oues gregales morbis duobus tentantur, podagra, & struma. facit podagra ut pedibus intumescant: & quamuis non intereant, tamen ungulas amittant. ualent melius cornibus pice illitis calida. euenit struma, ut calidius frequentiusque spiretur. quod denique in homine febris, idem in boue struma est. indicium morbi, ut demissa aures flacceant, & ut comedere nequeant. breui moriuntur, ad apertisque pulmo inspicitur putris.

*Quibus morbis laborent equi gregales, domesticique, & de morborum indicijs & remedijs, necnon de hippomane, & potu equorum, & boum. Caput XXIII*



Quorum gregales morbo immunes sunt, excepta podagra: hoc enim uno laborant, & plerumque ob id ungues amittunt. Sed amissis alij sciatim enascuntur, fit enim ut altero subnascente ungue, alter amittatur. Indicium morbi, ut alter testium dexter palpet, uel ut paulo citra nares cauum quiddam rugosumque gignatur. At uero equi domestici morbis plurimis obnoxij sunt. laborant ileo dicto, id est tenuioris intestini morbo: cuius mali indicium, ut crura posteriora attrahant ad priora, & ita summoveant, ut promodum collidant. Si, ubi antea diebus aliquot sponte ieiunarint, mox in furorem uertantur, sanguine detracto iuuantur. Capiuntur etiam rigore neruorum: cuius indicium, uenae ut omnes neruique intendantur, & caput ceruicesque immobiliter rigent, rectisque cruribus gradiantur. Suppuratione etiam equi infestantur. Vitium quoque eorum est, quod hordeatio dicitur, cuius indicium, ut palatum molester, & feruentius ipiret equus, ex consuetudine. nullum huius mali remedium est, nisi sponte naturae emenderetur. Quod autem lymphari dicitur, tale est, ut equus ad tibiarum sonum quiescat, & demittat frontem. cum uero conscenderis, ceterum contentius donec retineas, demissus etiam semper tristisque est, si rabie tenetur: cuius indicium, ut auriculas demittat ad iubam, rursusque proterat, idque uicissim facit. Irremediabile etiam malum, si cordis dolore uexatur: cuius indicium, ut latera subsidant, & ilia praefringantur. & si uesica dimoueatur de suo situ: cuius indicium, ne urinam reddere possit, & ut ungulas, clunesque trahat. & si pastinacam deuorant, cuius magnitudo, quae uerticilli bestiolae est (nam morius muris araneae, uel ceteris iumentis molestissimus est) pustulae hoc excitantur, & periculosior quem defixerit grauida. pustulae enim rumpuntur, ex quo interitus sequitur. sed si non grauida est, non interimit. quinetiam ea quam alij chalcidam, alij dygnidam uocant, suo morfu aut interimit, aut uehementem dolorem mouet. similis haec paruis lacertis est: sed colore serpentis, quam caecilia nominant. denique homines usuperiti totidem ferre morbis equum, atque etiam ouem infestari, quod hominem referunt. interit ueneno sandaracae & equus, & quoduis iumentum, siue ueterinum, datur in aqua percolatum. abortum etiam facit equa odore sentiens fungi fumiganis lucernae extinctae, quod & mulierum nonnullis accidit. haecenus de equorum morbis. Quod hippomanes uocant, haeret quidem fronti nascentis pulli, ut narratur. Sed equae perambulantes abstergentesque, id abrodunt. quae autem de hoc fabulantur, figmenta muliercularum, & professorum carminis incantamentorum esse credendum potius est. Emitti etiam ab equa prius quam pullum, quod pulium dicitur, certum est. equi uocem quoque agnoscunt equorum quibus cum pugnarint. Gaudent pratis riguis, & paludibus. bibunt enim aquas libentius turbidas. quod si clara est, inturbant eam ungulis suis, & cum biberint, lauant se totos, lymphisque potiuntur. balneum enim omnino hoc animal adamat, & aquae deditum est. quamobrem natura etiam equi fluuiatilis ita constat, ut uiuere nisi in humore non possit. Bos contra quam equus, nisi aqua sit clara, frigida atque limpida, bibere nolit.

*Asinos uno morbo laborare, frigorisq; impatientes esse.*

*Caput XXV*



Sini uno maxime morbo laborant, quem malidam uocant, quod uitium in capite oritur, facitq; ut per nares pituita multa, ruffa q; effluat, quæ si ad pulmonem descenderit, moriuntur. sed si in capite est, non infert interitum. Impatiens frigoris maxime hoc animal est: quapropter Pontica & Scythica terra asinis caret.

*De elephantorum morbis, & eorum curatione.*

*Caput XXVI*



Lephani morbis inflatione contractis laborant: quo fit, ne possint excrementum uel uesicæ, uel alui reddere. Aegrotant etiam si comedant terram, nisi ea frequenter utantur: nam si frequenter, nihil sentiunt mali, lapides etiam interdum deuorant, nec non fluore tentantur, quo, cum uires languerint, curantur potione aquæ calidæ, & cibo foeni melle imbuti, utrunq; enim id sistit profluuium alui. si per insomniam fessi sunt, armis perfricatis ex sale, oleo, & aqua curantur, cum humeri dolent, carnibus suillis aslis appositis iuuantur. Oleum alij bibunt, alij non, & si spiculum in corpore inest, eijcitur eo quod biberit oleo, ut aiunt, qui autem oleum non bibunt, ijs radix tyrtami decocta in uino datur. Quadrupedum res ita se habet.

*De morbis insectorum, & præcipue apum.*

*Cap. XXVII*



Insectorum maxima pars eo tempore ualet, quo gignitur: uidelicet cum annus talis, quale uer, humidus & tepidus est. Apibus bestiolæ quædam in alueis innascuntur, quæ fauis officiant. Vermiculus item, specie aranei nocet fauis, quem alij clerum, alij pyraustam uocant. hic sibi similem forma aranei parit in fauo, & facit ut examen agrotet, obest etiam alia quædam bestiola similis hepiolo papilionis, qui lucernarum luminibus aduolat, hæc puluerem spirando in alueo parit, nec aculeo ab apibus stimulatur, sed tantum fumo abigitur. Erucae quoque nascuntur in alueis teredines dictæ, quas apes non insectantur, agrotat potissimum, cum sylua flores æruginosos tulerit, atque etiam temporibus siccis. Intereunt insecta omnia tacta ex oleo, sed ce terrime, si capite illito exponantur soli.

*Animalium differentia pro locorum uarietate.*

*Caput XXVIII*



lueritate etiam locorum differentia oritur, ut enim locis nonnullis gigni omnino aliqua nequeunt, sic alijs generantur quidem, sed pauciora, & uita breuiore, nec prospera, locis etiam uicinis discrimen huiusmodi existit: ut agri Millefij locis sibi propinquis cicadæ alteris gignantur, alteris non. Amnis in Caphallenia insula dirimit, cuius citra alterum latus cicadarum copia est, ultra alterum nullæ. In Pordoselena, uia interfacet, cuius ultra alterum latus gignitur catus, citra alterum gigni non potest. Terræ Boeotia in Orchomenio agro talpæ habentur multæ: at in Lebadico uicino nullæ sunt, neq; si aliunde portatæ eo fuerint, uolunt infodere. In Ithaca insula lepores si aliunde illati dimittantur, uiuere nequeunt: sed eodē reuersi, unde maris introierint insulam, moriuntur. In Sicilia formicæ, quæ equites appellatur, non sunt. In Cyrenensi agro ranæ uocales præterito tempore deerant. In Africa non aper, non ceruus, non capra syluestris est. India, teste Ctesia, quanquam non fide digno, suem nec ferum nec mansuetum habet. Quæ autem sanguine carent, & quæ secessu tempore conduntur, grandiora nimirum illa possidet. In Ponto neque mollia sunt, neque testata, nisi locis quibusdam pauca. In mari rubro testata omnia mira quadam magnitudine augentur. In Syria oues sunt cauda lata ad cubiti mensuram. Capræ auriculis mensura palmari, & dodrantali, ac nonnullæ demissis, ita ut spectent ad terram. Boues

nodos

*An tyrtami le-  
gi debeat, an di-  
ctami, an ex-  
pigi omnino,  
peritiores iudi-  
cent.*

nodos scapularum flectunt, ut cameli, in Cilicia caprae tondentur, ut alibi oves. In Africa arietes statim cornigeri generantur, nec solum mares, ut Homerus scribit, sed etiam foeminae. Contra in Ponto per provinciam Scythicam nullis cornua enascuntur. In Aegypto aliqua maiora, quam in Graecia, fiunt, ut boues, & oves, aliqua minora, ut canes, lupi, lepores, uulpes, corui, accipitres. aliqua magnitudine pari, ut cornices, & caprae. cuius rei causam attribuunt cibo, qui alijs large, alijs parce sit, ut lupis, & accipitribus. carniuoris enim parum cibi suppeditatur, propter raptus, quo uiuunt, penuriam. aues enim minores paucae ibi habentur. lepori uero, omniq; non carniuoro generi uictus ieiunior ob eam rem est, quod neque nuces, nec poma sunt diuturniora. Tum etiam multis locis, coeli & situs conditio causa est, ut in terra Illyrica, & Thracia, & in Epiro, asini parui habentur. In Scythica & Gallica nulli propter immodicum frigus, in Arabia lacerti magnitudine cubitum excedunt. Mures etiam multo foricibus auctiores, quibus crura priora uel palmi mensura, posteriora ad primum digiti nodum habetur. In Africa magnitudo anguium mira, sicut & fertur. Iam enim nonnulli ubi trirēmi applicuissent, ossa bouum multorum uidisse narrant, quos absumptos esse ab anguib; non dubitarent, cum trirēmes productas in altum, quamprimum angues infestarentur, & nonnulli aggressi trirēmem euerterent. Item leones in Europa potius sunt, & ea Europae parte, quae inter Acheloum amnem, & Nessum est. Pantherae in Asia, in Europa autem nullae. bestiae denique omnes ferē efferatiores in Asia sunt, fortiores in Europa, multiformiores in Africa. Vnde prouerbio quodā dicitur: Semper aliquid noui Africam afferre. facit enim illius situs aquarum penuria, ut ferā eodem concurrant bibendi causa, quo quidem loco etiam quae alienigenae sunt, coeunt & generant, quorum tempora eadem ferendi uteri sunt, & magnitudines non multo inter se discrepent. redduntur mitiores inter se desiderio fluuij, nam & contra quam cetera potum quaerunt. tempore enim hyberno magis, quam aestiuo, infuerum nanque his est bibere aestate, propterea quod imbres fieri per id tempus non soleant, & mures quidem cum biberint, moriuntur. Sed uel alibi coitu alienigenarum procreari apertū est, ut in Cyrenensi agro, lupi cum canibus coeunt, & laconici canes ex uulpe & cane generantur. Indicos etiam canes ex tigride & cane gigni confirmant: uerum non statim, sed tertio coitu. primo enim belluinos adhuc catulos procreari aiunt. alligantur canes locis desertis, & nisi bellua incensa libidine sit, saepe lacerantur.

Mores etiam animalium pro locorum qualitate differre, uenenatq; serpentum, uel mitiora, uel asperiora effici.

Caput XXIX



40 **M**orum etiam diuersitatem loca efficiunt, ut montana & aspera suas bestias reddunt & aspectu efferatiores, & uiribus robustiores, quam plana & molliora. Argumēto uel sues Athi montis acceperim, quorum ne foeminas quidem spectare mares situs inferioris audent. Morsus etiam belluarum ex locorum diuersitate plurimum differunt, ut in Pharo, locisq; alijs scorpiones non laedunt. At alijs, & praecipue in Scythia multi, & magni, & nocui sunt. & si uel hominem, uel quamuis bestiam percusserint, interimunt. nec sues euadere possunt, quanquam ceteros uiulentos ictus minime sentiunt. & nigri eorum potissimum interimuntur, quisq; tamen celerrime interit, si ictus adierit aquam. Anguium quoque ictus per loca plurimum differunt. Aspis enim anguis, ex quo medicamentum putrificum illud componunt, in Africa gignitur, cuius ictui nullum remedium est. nascitur eodem in agro, in quo laser, serpens quidam pusillus, cuius remedium lapis est, quem ex sepulchro cuiusdam regis an-

σπινθόρ  
 septicum ex  
 dens à cefso.

tiqui accipiunt, eoq; perfuso ex uino bibunt. Italæ locis quibusdam morsus etiam stellionum exitiales sunt. Sed omnium uenenatorum morsus grauiores sunt, si alterum ederit alterum, ut scorpium deuorari à uipera certum est. Plurimis uero eorum aduersatur salua hominis. Serpens quidam minutus est, quem aliqui sacrum appellant, quem angues præmagni fugiunt. magnitudo huic ad cubitum, species hirsuta, quicquid momorderit continuo circiter putrescit. Est præterea in Indica regione serpens paruus, cuius unius remedio carent incolæ.

*Quo tempore piscium genera præstantiora in cibum reddantur.*

Caput XXX



Discrimen animalium ut prospere, contra ue exigant, uel utero pleno existere nouimus. Testa enim intacta ut pectines, omneq; ostrearium, siue cōcharium genus, atque etiam crusta intacta, tunc optima sunt, cum grauida, ut late in locustis, & reliquis huiusmodi patet. sed quanquam testa intacta grauida dicimus, tamen nullum eorum uel coitum, uel partum uidemus. crusta intacta nimirum & coire, & parere percipiuntur. Mollia etiam præstant, cum grauida sunt, ut lolligines, sepiæ, polypi. pisces cum impleri incipiunt coitu, boni omnes ferè sunt. sed procedente uteri tempore alij præstant, alij non. Alec, siue mæna utero grauis melior est. forma rotundior fœminæ, porrectior mari, & latior. Euenit ut cum foetu impleri fœmina incipit, maris color in nigriorem, pluriq; uarietatis mutetur, & caro deterrima cibo efficiatur. uocantur à nonnullis per id tempus hirci, mutantur pisces, qui merulæ, & qui tur di appellantur, atque etiam squillæ: Vere enim nigrescunt, post uer albedinem suam recipiunt. Fuca etiam mutat colorem. cum enim cæteris temporibus candida sit, uerno uaria redditur. solam hanc ex marinis piscibus nidum sibi consterne re, atque in stragula parere aiunt. Alec etiam mutatur, ut dixi, & cerrus, ut ex albedine rursus ætate ad nigredinem redeant: quod maxime suis pinnis, & branchijs declarât. Coruulus etiam cum utero fert, optimus est, perinde ut alec. mugilis uero, & lupus, & reliqui ferè omnes squama intacti deteriores sunt, cum ferunt, similes sibi, ferentes & non ferentes pauci sunt, ut glaucus. Vitantur etiam senectute pisces, & quidem thunni uel ad rem salsamentariam senes improbi sunt: multum enim carnis absumentur, quod idem uel in cæteris piscibus euenit. declaratur eorum senectus duritiæ magnitudineq; squamarum. Iam captus est thunnus senex, cuius pondus erat ad talenta quindecim, & caudæ interuallum ad cubita duo & quinq; & palmum. Fluuiatiles & lacustres pisces optimi sunt post partum, & fœminis genitalis emissionem. Sed nonnulli etiam cum ferunt commendantur, ut sardis, alij damnantur, ut silurus. cum cæteri omnes mares suis fœminis sint præstantiores. Silurus fœmina præstat suo mari. & in genere anguillarum quoque meliores sunt, quas fœminas nominant, quæ nomen fœminæ temere acceperunt. Non sunt enim fœminæ, sed quia aspectu à cæteris discrepant, fœminæ appellantur.

40

# ARISTOTELIS STAGIRITAE DE 133

HISTORIA ANIMALIUM LIBER NONVS,  
INTERPRETE THEODORO.

*De affectibus animorum omnium animalium, deq; ijs, quæ perpetuas inter se  
inimicitias gerunt, & earum causis.* Caput I



ORE S animalium obscuriorum, parumq; uiuentium tempo-  
ris, minus sensu percipiuntur: uiuaciorum euidentiores sunt.  
Habere enim uim quandam naturalem animantes in quauis  
animi affectione uidentur, hoc est prudentia, stultitia, fortitu-  
dine, ignauia, clementia, acerbitate, & reliquis habitibus gene-  
ris eiusdem. In nonnullis etiam commune aliquid disciplinae,  
eruditionisq; habetur. Alia enim uicissim inter se, a ia ab homi-

ne (quæ scilicet auditu non carent) non modo strepenti, uerum etiam significandi  
differentias possunt dignoscere. In omnibus uero, quorum procreatio est, scemi-  
nam & marem simili ferè modo natura distinxit moribus, quibus mas differt à scemi-  
nâ: quod præcipue tum in homine, tum etiam in ijs, quæ magnitudine præstet,  
& quadrupedes uiuiparæ sint, percipitur. sunt enim scemina moribus molliori-  
bus, mitescent celerius, & manum facilius patiuntur. discunt etiam, imitanturq;  
ingeniosius, ut in genere canum laconico, sceminas esse sagaciores quàm mares,  
apertum est. Moliticum etiam genus uenaticum nihilo à cæteris discrepat. At pe-  
cuarium longe & magnitudine, & fortitudine cõtra belluas præstat. Insignes uero  
animo, & industria, qui ex utroque, moliticum dico & laconicum, prodierint. Sed  
scemina omnes minus, quàm mares sunt animosæ, excepta panthera, & ursa. scemi-  
nâ enim in his generibus esse uidentur animosiores, cum in cæteris sint procul  
dubio molliores: uerum malitiosiores, astutiores, insidiosiores scemina sunt, atque  
in enutrienda prole sollicitiores. Mares contrà animosiores, ferociiores, simplices,  
minusq; insidiosi. Quorum uestigia morum, cum in omnibus ferè insunt, tum uel  
maxime in perfectioribus, & præcipue in homine. Hic enim natura perfectissima  
est, & ob eam rem habitus isti conspectiores in eo ipso continentur. Itaque mulier  
misericors magis, & ad lachrymas propensior, quàm uir est. inuida item magis, &  
querula, & maledicentior, & mordacior. præterea anxia, & desperans magis, quàm  
mas, atq; impudentior, & mendacior. quinetiâ facilius decipi, meminisseq; aptior.  
ad hæc uigilantior, segnior, immobilior denique est, & minus cibi desiderans. Mas  
uero iuuantior, ut modo dixi, & fortior est. Nam & in mollium genere, cum sapia  
icta est tridente, mas sceminam adiuuat, scemina mare percusso, fugam arripit. Pug-  
nant inter se ipsa animalia, quæ loca eadem incolunt, atque eisdem uescuntur ci-  
bis. nam si uictus penuria sit, fit certe ob eam rem, ut uel eiusdem generis animâtes  
pugnam inter se conferant. Et quidem marinos uitulos situs eiusdem pugnare in-  
uicem aiunt, & marem cum mare, & sceminam cum scemina, donec alter ab altero  
uel occidatur, uel eiiciatur. Idemq; eorum catulos facere. Carniuora etiam & op-  
pugnâtur à cæteris omnibus, & ipsa cum cæteris pugnat: quoniam uictus his ab ani-  
malibus est, unde augures sua dissidia, & confidia colligunt. dissidio bella omnemq;  
discordiam statuunt, confidio pacem omnemq; concordiam. Quod si cibi copia sup-  
petat, haud scio an ea quæ nunc metuunt, & ferociunt, inter se eant, mansueteq;  
cum inter se eunt, cum homine etiam agant. cuius rei indicium facit cura, quam  
Aegyptij animantibus impendunt. quod enim apud illos cibo non carent, sed co-  
piose aluntur, ideo collegio uel ipsa efferatissima degunt. mansuescunt enim sui com-  
modi ratione. quale se genus crocodili exhibet sacerdoti locis quibusdam, propter  
cibi curam, quæ ibi infumitur. quod idem fieri cæteris etiam locis intelligi licet. Dissi-

det aquila cum dracone: uestitur enim aquila anguibus. Ichneumo cum phalange: uenatur enim phalanges ichneumo. Auim uariæ dictæ, cum alaudis, pipo cum lutea, oua enim inuicem exedunt. Cornix cum noctua, cornix enim meridie oua surripens noctuæ absumit, cum non clare interdiu noctua uideat, noctua contra oua cornicis noctu exedit, estq; altera interdiu, altera noctu potētiōr. Item noctua cum orchilo: nam is quoque oua exedit noctuæ. sed die uel ceteræ auiculæ omnes noctuam nimirum circumuolant, quod mirari uocatur, aduolantesq; percutiunt, quapropter aucupes ea cōstituta, auicularum genera multa & uaria capiūt. Quin etiam qui rex auim appellatur, priuatas contra eandem inimicitias gerit. mustela inimicus cornicis est, quippe qui eius oua, & pullos uiolet. Turtur cum ignaria pugnāt. locus enim pascendi, uictusq; idem eorum est. Gulgulus cum lybio, miluus cum coruo, eripit enim miluus a coruo quicquid tenet, ut qui & unguibus sit præstantior, & uolatu, ita fit, ut eos quoq; uictus ratio faciat inimicos. Ad hæc, inter ea quæ cibum sibi a mari petunt, anas, gavia, & harpa, inuicem dissidēt. Buteo in alio genere hostis ranæ, & rubetæ, & anguis est, rapit enim eos, atque exedit. Turtur & luteus pugnāt. occiditur a luteo turtur, & a cornice tympanus nomine. colarem ulula, ceteriq; adunci rapiūt, unde his oritur bellum. inter stellionem etiam & aranum bellum est. deuorantur enim aranei a stellione. pipo inimica ardeolæ est. oua enim & pulli ardeolæ uiolantur a pipone. salo prælium cum asino est, propterea quod asinus spinetis sua ulcera scabendi causa atterat: tum igitur ob eam rem, tum etiam quod si uocem rudentis audierit, oua abigat per abortum, pulli etiam metu labantur in terram. itaque ob eam iniuriam aduolans, ulcera eius rostro excauat. lupus asino, tauro, & uulpi est hostis. Cum enim carne ipse alatur, boues inuadit, & asinos, & uulpes. hæc eadem de causa & cum circo accipitre uulpi inimicitia sunt. circus enim, quia unguibus est aduncis, & carne uiuit, uulpem inuadit, ac uulnerat. coruus tauro & asino aduersarius est, quippe qui aduolans feriat, & eorū oculos laceret. Aquila etiam cum ardeola pugnat, unguibus etenim ualens aggreditur. hæc autem repugnando emoritur. æfalo cum uulture, crex cum gulgulo, & merula, & uireone, quem ex flagratione procreatum quidam fabulantur. nocet enim his, & eorum pullis, sitta & trochilus cum aquila. sitta enim oua aquilæ frangit. aquila tum ob eam rem, tum etiam quod carniuora est, aduersatur. Florus odio equum habet. pellitur enim ab equo pabulo herbæ, qua uestitur. nubeculans hic, nec ualens acie oculorum est, quippe qui uocem quidem equi imitetur, atq; aduolans equum fugat: sed interdū excipiat, occidaturq; ab equo. colit hic paludes, & ripas, coloris est pulchri, & uictus facilis. Colotæ hostis asinus est. dormit enim colota in præsepibus, & narem subiens asini ne comedat, impedit. Ardeolarum tria sunt genera, pella, alba, stellaris, piger cognomine. pellæ coitus difficilis est, uociferatur enim & sanguinē ex oculis, ut aiunt, emittit cum coit. parit etiam agre, summoq; cum dolore. prælium cum ijs init, a quibus læditur, hoc est cum aquila, a qua rapitur: cum uulpe, a qua noctu capitur: cum alauda, a qua oua eius diripiuntur, serpens mustelæ, suisq; aduersarius est. mustelæ, quod eadem in domo uersantur, uictus enim ex eisdem appetatur necesse est. suis uero, quia ab ea deuoratur. æfalo uulpi est inimicus, ferit enim pilosq; eius euellit, occiditq; catulos, uncis nanque unguibus est. Coruus uulpi amicus est, pugnat enim cū æfalone: unde fit, ut huic cum ab illo percutitur, auxilietur. Vultur etiam & æfalo inuicem inimici sunt, unguēs enim utriq; unci habentur. Aquilæ etiā pugnat uultur & olor, nutritq; eam sæpius olor. Oloribus uero ut alter alterū deuoret, in more est, maxime in uolucrum genere. sunt porro alia semper inter se infesta, alia hominum ritu, cum res ita tulerit. Asinus item & spinus inimici inter se sunt. uictus enim spino a uepribus, quas asinus tenellas

tenellas adhuc pascit. Florus, spinus, ægithus, quem salum uoco, odium inter se exercent. & nimirum sanguinem ægithi & flori misceri non posse dicitur. Amici cornix & ardeola, iunco & alauda, galgulus & lædus. Colit enim galgulus fruteta & nemora. lædus saxa & montes. suisque locis uterque contentus degit pacifice. amici etiā pisces, harpa, miluus. Vulpes etiam cum serpente amicē uiuit: ambo enim cauernis gaudet. & merula quoque turturem amat. Leo & lupo ceruarius inimici sunt: cum enim carne alantur, uictum ex eisdem petant necesse est. Elephanti etiam pugnant inter se uehementer, & dentibus alter alterum ferit. qui autem uictus fuerit, adeo animum amittit, ut ne uocem quidem uictoris toleret. differunt inter se elephantes mirum in modum robore, atque animo. Sunt apud Indos in usu rei bellicæ non solum mares, sed etiam foeminae: uerūtamen foeminae pauciores sunt, & longe timidiore. euerit ædificia elephantus, dentes admouens magnos. palmas uero sua fronte impellit, donec declinet, tum pedibus inculcans prosternit in terram. Venatio talis elephantorum est. conscendunt mites aliquos animosiores elephantos, qui uenantur, cursuque insequuntur feros. quos cum occuparint, ferire præcipiunt suis, dum fatigēt, uiresque dissoluant. Tum rector in defatigatum illum insilit, regitque falce: post breui tempore fera mitescit, atque obtemperat. Quandiu insidat rector, mitem se quisque exhibet: cum descenderit, alij mansuetudinem seruant, alij suam reperunt feritatem. itaque immittescentium crura priora præpediunt uinculis, ut quiescant. capiuntur & natu iam grandes, & pulli. Sed amicitia, atque inimicitia in his belluis, uictus uitæque ratione ita existunt.

De ijs piscibus, qui gregatim, amiceque uiuunt, qui uero non gregatim inimici uero sunt.

Caput II



Isium autem alij gregatim degunt, amiceque sunt: alij non gregatim, inimiceque uiuunt. Qui amici sunt, congregantur, partim cum utero ferunt, partim cum foetum ædiderint. Gregales denique sunt thunni, aleces, gobiones, uocæ, lacerti, coruuli siue graculi, dentes, muli, malleoli, elegini, sacri, aristulæ, fargiaci, lollij, papaueres, iulæ, limarie, scombri, monedulæ. horum nonnulli non modo gregales sunt, uerum etiam coniugales. Reliqui omnes coniugia agunt quidem, sed greges statim temporibus, ut modo dixi, constituant, scilicet aut cum uterum gerunt, aut post partum. Lupus & mugilis quamquam inimici sunt capitales, tamen statim tempore congregantur. coeunt enim in gregem sapius, non solum quæ eiusdem generis sunt, sed etiam quibus idem aut similis pastus appetitur, dummodo sit abunde cibarij. sæpe mugiles cauda abscessa uiuunt, atque etiam congrimeatu tenus excrementario. Abscinditur mugilis cauda à lupo, congrui à murena. Ineunt prælium maiores contra minores, maior enim quisque atque robustior, minorem infirmiorēque deuorat, sed de marinis generibus satis.

De genere ouili amente et stulto.

Caput III



Ores autem animalium, ut dictum iam est, differunt inter se fortitudine, ignauia, mansuetudine, ferocitate, mente, dementia. Iam enim genus ouile amens, & moribus, ut dici solet, stultissimum est, quippe quod omnium quadrupedum ineptissimum sit. reperit in deserta sine causa. hyeme obstitit ipsum sæpe egreditur stabulo, occupatum à niue, nisi pastor compulerit, abire non uult, sed perit desistsens, nisi mares à pastore ducantur. ita enim reliquus grex consequitur. Caprarum ex grege si quis unam uillo mento dependente, quem aruncum uocant, apprehenderit, ceteræ stant uelut stupidae, suos in unam illam oculos conijcientes. Cubant difficiliter oues, quam capræ: magis enim capræ quiescunt, acceduntque ad hominem familiarius, sed sunt frigoris impa-

rientiores, quàm oues. docent pastores suas oues gregari, factio strepitu. nam si cum tonuerit aliqua relinquatur, quæ non concurrerit, abortum, si est grauida, facit, unde fit, ut si quem domi strepitum moueris, omnes concurrant, propter consuetudinem. Cubant oues, capræq; uniuersæ per cognationem. Cum primū sol cōuersus destiterit, capras nō aduersis præterea inter se oculis, sed auersis cubare accepimus.

*De societate boum, equarumq; mutuo inter se amore.*

*Caput IIII*



Oues & pascunt per societates, atque consuetudines. & si unus aberrarit, reliqui sequuntur. quapropter boarij nisi prauenerint, totum armentum requirant, necesse est. Equæ societate coniunctæ, si altera fortè perierit, altera pullum parente orbatum enutrit. Equarum denique genus miro quodam amore prolis teneri putatur: cuius rei indicium est, quod sæpius steriles auferūt pullos à matribus, quos ipsæ amore prosequentes tueantur: sed quoniam lacte careant, deprauant eos quos diligunt.

*De ceruæ prudentia in pullis edendis, deq; maris cornuum amissione, & reparatione.*

*Caput V*



Erarum quadrupedum cerua maxime prudentia præstare uidetur, tum quia circa semitas pariat, quò scilicet belluæ propter homines minus accedūt: tum etiam quia cum peperit inuolucrum primum exedit, mox seselim herbā petit, quam cum ederit, redit ad prolem. Præterea hinnulum ducens in stabula, assuescit, quò refugere debeat. saxum hoc est abruptum, uno aditu, quo loco eam si quis inuadit, expectare, repugnareq; affirmant. Mas item cum pinguerit, quod ualde tempore fructuum fit, nusquam apparet, sed longe secedit, ut qui pondere suæ corpulentæ capi se posse facilius sentiat. Cornua etiam locis difficilibus amittit, & quā inueniri nequeant: unde illud prouerbium ortum, Quæ cerui amittunt cornua, Quasi enim sua amiserit arma, cauere ne inermis reperiat. Cornu sinistrum compertum esse à nemine adhuc fertur: oculis id enim tanquam quodam medicamento præditum. Anniculis nondum cornua nascuntur, nisi quoad indicij gratia sit initium quoddam præuberans, quod breue, hirtumq; est. Bimis cornua primum oriuntur simplicia, & recta, ad subularum similitudinem, quam ob rem subulones per id temporis eos uocant. Trimis bifida exeunt, quadrimis trifida, atq; deinceps ad hunc modum procedit numerus usque ad annum sextum. Ab hoc similia semper prodeunt, ita ne sit dignoscere ætatem ramorum numero, sed senes cognoscimus maxime indicio duplici illo: dentes enim aut nullos, aut paucos habent, atque adminiculis carent. uocantur adminicula rami, qui imis cornibus prominent ante frontem, quibus in pugna utuntur iuniores: senes autem carent, amittunt singulis annis cornua mense Aprilis, quæ cum amiserint, occultant sese interdum, ut superius dixi, idq; opacifaciunt locis, ut muscarum tædio uacent, pascuntur per id tempus noctu, donec recipiant cornua, quæ primum quasi cute uestita, & hirti uiscula emittunt: sed cum creuerint, soli exponunt, ut excoquantur, & sicceant, ubi iam nihil attritu arborum, cum ea scalpant, indolent, tunc ea relinquunt loca, consili habere iam quo repugnare possint cum res exigit. captus iam ceruus est, hederam suis enatis cornibus gerens uiridem, quæ cornu adhuc tenello fortè inserta, quasi ligno uiridi coaluerit. cerui morfi uel à phalangio, uel à quouis generis eiusdem, canculos edunt: quod idem homini etiam prodesse putatur, sed non caret fastidio. Ceruæ statim à partu exedunt inuolucrum, ut dictum est, nec fieri potest, ut id accipias. prius enim quàm in terram demittant, ipsæ arripiunt, uis in eo medica esse creditur. Cerui sibilo & cantu



cantu uenantium capiuntur. mulcentur enim, alliciunturq; ea uoluptate. itaque alter uenantium cantat palam aut sibilat, alter clam ferit à tergo, ubi socius tempus iam esse significarit. sed si ceruus erectas auriculas teneat, acerrime sentit, nec la tere insidiar possunt: sin demissas, facile interimitur.

De quibusdam animalibus, quæ prudentia quadam natura instituit.

## Caput VI



Rsa cum fugiunt, suos catulos propellunt, susceptos que portant, cum ab insectante iam occupantur, arbores scandunt. Solent ursi arum herbam comedere, cum è latibulo egrediuntur, ut dictum est: ligna etiam manducant, quasi dentiant. Sed ex cæteris quoque quadrupedibus multæ prudenter sibi opitulari uidentur. Nam & in Cre-  
 10 ra insula capras syluestres sagitta transfixas dictamnium herbam quærere aiunt: hoc enim spicula ex corpore eijci. Canes etiam ægrefcentes herba quadam comesta uomitant. Panthera cum uenenum, pardalianches dictum, ab angore ederit, quo leones etiam intereunt, sterqus hominis quærît: eo enim ipso iuuatur. quo-  
 20 circa uenatores sterqus ibi propinquum suspendunt ex arbore aliqua, ne procul bellua abeat, petens suum medicamentum. itaque insiliens ibidem, & spe capienti perseuerans, in se efferenda emoritur. Eandem sese abscondentem uenari fe-  
 runt, propterea quod suo odore belluas delectari intelligat. propius enim ita accedunt, quas corripit. Ichneumo Aegypti, ubi aspidem anguem suum hostem aspe-  
 30 xerit, non prius aggreditur, quam socios uocet, & limo obducto, contra ictus morusq; sese loricer. Modus armandi, ut primum madefaciat corpus, & in terra se uoluer. Crocodilis hiantibus trochilifauces inuolantes depurgant dentes, quo munere & ipsi aluntur. & crocodilus sentiens secum commode agi, nihil nocet, sed cum egrediauem uult, ceruices mouet, ne comprimat. Testudo cum uiperam ederit, mox cunilam edit. quod cum ita sapius factum animaduertisset quidam, ut gustata cunila uiperam testudo repeteret, herbam euulsit, quo facto testudo interiit.  
 40 mustela quoties dimicatura cum serpente est, rutam comedit: odor etenim eius herbæ infestus serpentibus est. draco cum per usum pomorum nausea infestatur, succum syluestris lactucae exorbet: quod ita facere uisus sapius est. Canes cum lumbricis infestantur, herbam tritici comedunt. Ciconiæ, cæteraq; aues cum uulnus per pugnam acceperint, cunilam plagæ apponunt. locustam etiam complures uiderunt, quoties cum serpente pugnat, collum eius prehendere. Quin & mustela prudenter capere aues uidetur. iugulat enim quas ceperit, ut lupo ouem. Serpentem quoque impugnat, eum præcipue qui mures uenatur, uidelicet ea causa, quia ipsa etiam mures persequitur. De herinaceorum sensu locis multis perpen-  
 sum est, ut qui in cauernis sunt, commutent sua cubilia, aquilonum & austrorum mutatione, qui autem intra tecta aluntur, ad parietes discedunt. quod ita fieri cum  
 40 Byzantijs quidem animaduertisset, consecutus existimationem est, ut tempus futurum posset præfagire. Ictis genus mustelæ rusticæ, quod uiuerram interpretor, magnitudine est, quam melitensis catellus minor, sed pilo, forma, albedine partis inferioris, & morum astutia mustelæ similis, mansuescit maiorem in modum. officit aluearibus: mellis enim auida est. aues etiam petit, ut felis. genitale eius offeum est, ut ante dixi, & medicamento urinæ stillationibus esse putatur. datur per ramenta ex uino.

Græce interse-  
 ritur, quæ ægy-  
 ptio, id est, in  
 uasculo. Et Pli-  
 nius habet, in  
 uase aliquo.

δελφινος, cun-  
 ila bubulæ uo-  
 cat Plin.

πικελιστος, id  
 est, syluestris la-  
 ctucae, in sybi  
 agrestis.

De ea intelligentie parte, qua animalia quaedam hominum rationem representant, ut hirundines, & omne columbaceum genus: deq; etate columbarum, perdicum, & passerum.

## Caput VII



Mnino ratio brutorum magnam refert uitae humanae similitudinem, magisq; in minore genere, quam in maiore uideris intelligentiae rationem. quod primum in auium genere hirundo in effigendo, constituendoq; nido ostendit. confingit implicito luto festucis ad normam luterariae paleationis: & si quando luti inopia est, seipsa madefaciens uolutat in puluere omnibus pennis. stragulum sibi etiam more hominum facit, duriora primum subiiciens, & modice totum conseruens pro sui corporis magnitudine, atque in enutrienda prole mira tam mas, quam foemina aequitate laborat. Impartit pullis singulis cibum, obseruans consuetudine quadam, ne qui acceperit, bis accipiat. excrementa etiam pullorum parentes eiciunt. Post adultiores iam natos circumagi, forasq; ipsos egerere edocent. Ad haec, columbi pleraq; contemplationis huiusmodi afferunt. neq; enim cum pluribus adulescere, aut coire patiuntur, neq; coniugium iam inde a primo ortu initum deferunt, nisi coelebs, aut uidua. Quineuam foeminae parturienti mas adest, & cultu, omniq; officio fungitur. saepe etiam foeminam pigrius euntem ad nidum propter partus laborem mas percutit, cogitq; intrare, exclusis iam pullis terram saluginosam potissimum praemanducatam in eorum os inferens, suum ingerit, atque ita praeparat ad cibum recipiendum. adultos iam, cum tempus prodeundi ex nido est, mas subigit. Ita magna ex parte columbae mutuo degunt amore: sed interdum nonnullae etiam ex maritatis cum alijs coeunt. pugnae hoc animal est. alter alterum infestat, nidumq; alter alterius subit, sed raro. nam etsi ex longinquo minus, tamen apud ipsum nidum summo certamine dimicatur. proprium columbarum & palumbium & turturum esse uidetur, ne collum cum bibunt, resupinent, nisi satis hauserint. mare uno contenta, & turtur, & palumbes uiuunt, nec aliterum recipit. Incubant ambo, & mas & foemina. dignosci mas ne, an foemina sit, haud facile est, nisi interiorum aspectu. uita palumbibus longa, nam ad uigessimum quintum, & ad trigessimum annum protrahitur. nonnullas quadraginta etiam annos compleuisse exploratum habetur, etate autem prouectis unguis accrescunt, quos recidere solent, qui alunt. nihil, quo laedantur aperte, aliud his senescentibus accidit. Turtures & columbae uel ad annum octauum uiuunt, scilicet quae excacatae allectrices aluntur. perdicibus uita ad quinq; & uiginti annos. Nidulantur & palumbes & turtures semper locis eisdem. & cum mares in totum diuturniores, quam foeminae sint, in his marem prius, quam foeminam mori nonnulli aiunt, uidelicet documento earum, quae domi allectrices aluntur. Sunt qui passerum etiam mares anno diutius durare non posse arbitrentur, argumento quod ueris initio nulli mentum habere nigrum specientur, sed postea, tanquam nullus anni superioris seruatur. foeminas uero hoc in genere esse uiuaciores uolunt. capi enim has cum nouellis, cognoscitq; laborum callo asseuerant. Degunt aestate turtures locis frigidis, hyeme tepidis, fringillae contra, aestate tepidis, hyeme frigidis.

De ijs auibus, quae nidum non aedificant, deq; perdicis astutia.

## Caput VIII



Ves grauiores nidos sibi non faciunt, ut coturnices, ut perdices, & reliquae generis eiusdem. quibus enim uolandi facultas deest, ijs nidus non prodest, sed facta in aprico area (alibi enim nusquam pariunt) atq; materia, ut uepribus quibusdam congestis, quoad accipitrum & aquilarum iniuriam deuotare possint, oua adunt, & incubant. Mox cum excluderint, protinus pullos educunt, propterea quod nequeunt suo uolatu ijs cibum

ex Ves, subigit

palumbes, allectrices, et sic dicuntur columbae aut aues quae in rebus seruatur ad alias allicientes.

bum administrare, refouent suos pullos sub se ipsa ducēdo more gallinarum, & co-  
turnices, & perdices, nec eodē loco & pariunt, & incubant, ne quis locum perci-  
piat longioris temporis mora, cum ad nidū quis uenando accefferit, prouoluit sese  
perdix ante pedes uenantis, quasi iam possit capi, atq; ita allicit ad se capiendā homi-  
nem, eousq; dum pulli effugiāt, tum ipsa auolat, & reuocat prolem. parit oua non  
pauciora quā decē, sed sēpius sedecim. Malitiosa astutaq; avis hæc est, ut dixi, se-  
cernuntur uerno tempore de grege per cantū & pugnam, coniugatim mares cum  
fœminis, quamcunq; sibi quisq; forte acceperit. oua mares quæ compererint, per-  
uoluunt, & frangunt præ sua salacitate, ne fœmina incubet, quod ne accidar fœmi-  
na emolens, clanculum diffugiens parit. sed fit sēpius, ut præ turgore parturiendi  
10 quolibet loco ædat, & mare præsentī. uerum ut oua seruētur, nunquam ex eo quo  
peperit loco discedit. & si ab homine uisa est, ita se ab ouis astute quemadmodum à  
pullis subtrahit, labans ante hominis pedes, dum dimoueat. Sed cum diffugerit fœ-  
mina ut incubet, mares tumultuant, clamitant, pugnamq; inter se conserunt, quos  
coelibes uocāt. qui autē uictus in pugna fuerit, sequitur uictoris uenerem patiens,  
nec ab alio, nisi à suo uictore subigitur. sed si à comite principis, aut quouis uulgari  
uincatur, clam à principe ac furto subigitur. Verū hoc nō ita fieri semper, sed certo  
tempore anni planū est. Hoc idem à coturnicibus quoq; agi animaduertimus. Gal-  
linacei etiā idem interdum faciunt. In templis enim ubi sine fœminis munerarij, di-  
20 catiq; uersantur, non temere eum qui nuper dicatus accefferit, omnes subigunt,  
nec non perdices mansueti iam & domestici subigunt feros, & spernunt, contume-  
liosq; tractant. perdicem uenatorem dux syluestrium primus inuadit, pugnamq;  
obuiam conserit, quo capto compage alter occurrit, tum alius, atq; ita singulis dimi-  
catur, si mas sit, qui uenatur. Sed si fœmina est, ubi dux ad eius uocem occurrerit,  
cæteræ uniuersæ eum inuadūt, feriunt, fugant ab ea fœmina, inuidēs quod non  
sibi, sed illi accefferit. hic tacitus ob eam rem sæpe accedit, ne uoce percepta oppu-  
gnetur. nonnunquam marem adeuntem efficere, ut fœmina obmutescat, ne re co-  
gnita pugnare cum cæteris maribus cogatur, peritū referunt. perdices nō modo ca-  
nunt, uerum etiam strident, & uoces alias quasdam emittunt. sæpe & fœmina incu-  
30 bans exurgit, cum marem fœminæ uenatrici attendere senserit, occurrensq; seipsa  
præbet libidini maris, ut satius negligat uenatricē. Vique adeo tum perdices, tum  
etiā coturnices copia libidinis gaudent, ut in aucupantes corruant, & sæpe numero  
capitibus eorum residant. Talis perdicum coitus, & morum astutia est, nidulantur  
humī, ut dixi, tum coturnices tum perdices, atq; etiā aliæ quædam eiusdem pa-  
rum uolantis generis. ex his item alauda, & gallinago, & coturnix, nunquam in ar-  
bore consistunt, sed humi.

De pico martio, &amp; tribus generibus eiusdem.

Caput IX

40 **Q**uoniam atq; martius picus, qui humi nunquā consistere patitur, tumdit  
hic quercus uermiū & culicum causa, quo exeant, recipit enim egres-  
sos lingua sua, quam maiusculam & latiusculā habet. scandit per arbo-  
rem omnibus modis, nam uel resupinus more stellionum ingreditur,  
ungues etiā habet commodiores quā monedula, ad tutiorem arbo-  
rum reptationem: his enim affixis ascēdit. Sunt pici martij cognomine tria genera,  
unum minus quā merula, cui rubidæ aliquid plumæ inest, alterum maius quā  
merula, tertium nō multo minus quā gallina, nidulatur (ut dictū est) in arboribus,  
cum alijs, tum oleis, pascitur formicis & coxis. cum coxis uenatur, tam uehementē  
excavare ut sternat arbores, dicitur. iam uero mitescens quidā amygdalum, quod  
rima inseruisset ligni, ut fixum constanter ictum reciperet, tertio ictu pertudit, &  
nucleum edit.

οὐδὲ λυγρὸς οἷ  
ἐκ τῆς διόφ-  
δωρ, ἰδὲ  
κοξί, quos ue-  
natur picus  
martius.



Rues etiam multa prudenter faciunt, loca enim longinqua petunt, sui commodi gratia, & uolant alte, ut procul prospicere possint, & si nubes tempestatemq; uiderint, conferunt se in terram, & humi quiescunt, ducem etiam habent, & eos, qui clament, dispositi in extremo agmine, ut uox percipi possit. Cum consistunt, ceteræ dormiunt, capite subter alam condito, alternis pedibus insistentes, dux directo capite prospicit, & quod senserit uoce significat. Platea fluuiatilis conchas maiusculas, læuesq; deuorat: quas ubi sua ingluuie coxerit, euomit, ut hiantibus iam legat testis exuens, atque edat.

10



Omicilia uero agrestes uolucres aptissime ad uictum, & prolis salutem moluntur. Sunt aliax parentes feliciores, & suorum gnatorum diligentiores, aliax minus, & alijs ingenium ad uictum acutius, alijs obtrusius est. Colunt aliax loca fragosa, & saxa, & cauernas: ut quem a præruptis torrentiũ alueis charadriũ appellamus, quasi hiaticolam dixeris, praua hæc auis, & colore, & uoce: & noctu apparet, die aufugit. Accipiter etiam locis saxosis & arduis nidulatur, auium quas ceperit, cor nunquam edit. Idq; nonnulli in coturnice, & turdo, alij in alijs obseruauerunt, quinetiam uenandi differentia adnotatur, ne simili modo æstate, ut hyeme rapiat. Vulturis uel pullum uel nidum a nemine uisum adhuc nonnulli aiunt, & nimirum ob eam rem Herodotus Brysonis rhetoris pater, aliunde situ eminentiore quodam uenire dixit: argumentumq; afferebat, quod breui tempore multi apparerent, & tamen unde, constaret nemini. Sed causa huius rei est, quod rupibus inaccessis pariat: neq; locorum plurium incola auis hæc est, edit non plus quam unum ouum, aut duo complurimum. Sunt quæ montes colant & syluas, ut upupa, & brenthus: cui & uictus probus, & uox sonora est. Trochilus & fruteta incolit, & foramina, capi difficile potest, fugax atq; infirmis moribus est, sed uictus probitate, & ingenij solertia præditus, uocatur idem & senator, & rex, quamobrem aquilam pugnare cum eo referunt.

20

30



Vnt aliax quæ uitam apud mare traducant, ut cinclus, qui astutus, & capi difficilis est, sed caprus omnium maxime mitescit, læsus hic est: incontinens enim parte sui posteriore, uiuunt apud mare, & fluuios, & lacus palmipedes omnes, natura enim ipsa quærit, quod sibi commodus sit. Sed multæ etiam fidipedes circa aquas, paludesq; degunt, ut florus apud omnes, cui color pulcher, & uita commoda. Cataracta mari uictuatur, & cum se alto ingurgitarit, manet non minus temporis, quam quo spacium transferis iugeri, minor quam accipiter auis hæc est. Olores etiam palmipedes sunt, & apud lacus, paludesq; uiuunt: nec probitate uictus, morum, prolis, senectutis uacant. Aquilam, si pugnam coeperit, repugnantes uincunt, ipsi autem nunquam nisi prouocati inferunt pugnam, canere soliti sunt, & præcipue iamiam morituri, uolant etiã in pelagus longius, & iam quidã cum in mari Africo nauigarent, multos canentes uoce flebili, & mori nonnullos conspexere, Chalcis raro apparet: montes etenim incolit, nigro colore est, magnitudine accipitris, quem palumbarium nominant, forma longa actenui, Iones cymindeam eam appellant, Cuius Homerus etiam

40

etiam

etiam meminit in Iliade, cum dicit:

Chalcida dii perhibent, homines dixere cymindem.

Sunt qui eandem hanc auem nō aliam esse, ac pringem uelint. interdiu minus aparet, quia non clare uidet, sed noctu uenatur more aquilæ: & pugnat uero cum aquila adeo acriter, ut sapius ambæ implexæ, deferatur in terram: & uiuæ à pastoribus capiuntur. Parit hæc oua duo, & saxi speluncisq; nidulatur. Grues etiam pugnant inter se tam uehementer, ut dimicantes capiuntur, hominem enim expectare potius, quàm pugna defistere patiuntur. pariunt oua non amplius quàm bina.

De partu & nidificatione picarum, meropis, luteæ, argathylis, & cinnamomi Arabici, deq; ciconiarum & meropum prudentia in alendis parentibus.

Caput XIII



Ica uoces plurimas cōmutat: singulis enim ferè diebus diuersam emit tit uocem. Parit oua circiter nouem numero. nidum in arboribus facit ex pilis, & lana. glandes cum deficiūt colligit, & in repositoio abditas referuat. Ciconias genitorum senectutem inuicem educare inuulgarum est. Sed sunt qui meropes quoque idem facere cōfirmant, uicemq; reddit, ut parentes nō modo senescentes, uerum etiam statim, cum iam datur facultas, alantur opera liberorum: nec matrem aut patrem exire, sed in cubili manentes pasci labore eorum, quos ipsi genuerunt, enutrierunt, educarunt. penæ huius auis inferiores pallidæ sunt, superiores cœruleæ, ut halcyonis: postremæ pinnulæ rubræ habentur. parit sex aut septem æstate in præcipitijs mollioribus, in trō uel ad quatuor cubita subiens. Lutea dicta à colore partis suæ inferioris pallido, magnitudine alaudæ est. parit quatuor aut quinque. nidum sibi ex alo herba euulso stirpitis facit, sed stragulum subijcit ex uillo, & lana. hoc idem & merula facit, & pica, interioraq; nidis ex eisdem confternunt. Solerti porro ingenio argathylis in ripiarum genere suum instruit nidum: filis enim intexit lineis specie pilæ, aditu arctio. In Arabia cinnamomus auis appellatur, quam furculos cinnamomi portare ac nidum ex his conficere aiunt. nidificat excelsis arboribus, & ramis: sed incolæ sagittis plumbatis nidum petunt, atq; ita discusso in terram cinnamomum legunt.

De specie, nidulatione, & partu alcedonum.

Caput XIII



Lcedo non multo amplior passere est, colore tum cœruleo, tum uiridi, tum etiam leuiter purpureo insignis, uidelicet non particulatim colore ita distincta, sed ex indiscreto uarie resurgens corpore toto, & alis, & collo, rostrum subuiride, longum & tenue. Talis species eius est. nidus marinæ similis pilæ, & ijs quæ à flore maris halosachnæ dicantur. Sed colore leuiter ruffo, figura proxima cucurbitis medicinalibus ijs, quibus collum porrectius est, magnitudo maximis amplior quàm spōgiæ. sunt enim alij maiores, alij minores. cōseptus, stipatusq; undiq; est, & crebro tum inani, tum solido constat. renititur ferramento acuto, ut uix possit discindi. Sed si una & ferro rundis, & manu collidis, facile perinde ut flos aridus maris (halosachnam dico) confrangitur. Os eius angustum, quoad sit exiguus aditus, ut etiam si uertatur mare, influere nequeat. habet sua inania proxima cauis spongiarum. Ambigitur ex quam materia componatur. Viderur tamen ē spinis potius acus piscis constitui. piscibus enim alcedo uiuit. sed amnes etiam subit, ascendens longius. paratus huic ouis maxime quinque consumitur. fortificat toto suæ ætatis tempore, parere nata mēses quatuor, incipit.

Cinnamulguæ à Plin. ab Arist. Cinnamomus: nisi forte legendum sit, cinnamulguæ.

De partu &amp; nidificatione upupe, pari, atricapillæ, salis, &amp; uireonis. Caput XV



Pupa nidum potissime ē stercore hominis facit. mutat faciē tempore æstatis, & hyemis, sicut cæterarum quoq; agrestium plurimæ. Parus oua plurima ædit, ut aiūt. Atricapillam etiā plurima ædere aliqui referunt, sed post Africam strutionem. Iam uel decem & septē oua atricapillæ reperta sunt. Sed, plura etiam quā uiginti parit, & numero impari semper, ut narrāt. nidificat ea quoq; in arboribus, & uermiculis alitur. proprium huius & lusciniæ præter cæteras aues, ut linguæ summæ acumine careāt. Salus uitæ commoditate, & partus numero commendatur, sed alterius pedis claudita te cedit. Vireo docilis, & ad uitæ munera ingeniosus notatur, sed male uolat, nec io grati coloris est.

De ueliæ aue, &amp; eius colore, &amp; statura.

Caput XVI



Elia cum primis uitæ commoditate nota est. consistit æstate in umbra & aura: hyeme in sole & apricis. inspectat paludes ab arūdinibus summis. paruo corpore est, sed uoce proba, colore etiam pulchro, necnon ingenio ualeat in uitæ officijs, & speciem præ se fert decorā, peregrina hæc auis esse uidetur, quippe quæ raro nostris locis appareat.

De moribus &amp; natura cregis, fittæ, ululæ, certhiæ, &amp; ligurini. Caput XVII



Rex moribus pugnacibus est, ingenio ualens ad uictum, sed cætera infelix. Sunt & ei, quæ sita dicitur, mores pugnaces, sed animus hilaris, concinnus, compos uitæ facilioris. rem maleficam ei tribuūt, quia rerum callet cognitione. prolem hæc numerosam, felicemq; progignit. uiuit macerē contrudens. Vlula nocte uagatur, ac pascitur: die raro apparet. Coit hæc etiam saxa & speluncas. uictus enim gemini est. pollet ingenio ac industria in uitæ muneribus. Nouimus auiculam quandam exiguam nomine certhiam, cui mores audaces, domicilium apud arbores, uictus ex collis, ingenium sagax in uitæ officijs, uox clara. Ligurini, & uita & colore ignobiles sunt, sed ualent uocis amoenitate.

De tribus ardeolarum generibus, &amp; earum uita, deq; phoicis natura. Cap. XVIII 30



Rdeolarum pella difficulter coit, ut dictum est, sed sagax & cœnæ gerula est, & operosa. Agere interdiu solet: colore tamen est prauo, & alio humida. Reliquarum duarum (tria enim sunt genera) candida, colore est pulchro, & coit, & nidulatur, & parit probe. pascitur paludibus, lacu, campis, & pratis. Sed stellaris piger cognominata (in fabula est, ut olim ē seruo in auem transierit) atq; ut cognomen sonat, iners, ociosaq; est. talis ardeolarum uita est. Phoici appellata, peculiare præ cæteris est, ut oculos potissimum appetat, inimica est harpæ, uictus enim earum similis est.

De duobus merularum generibus.

Caput XIX



Erularum duo sunt genera, alterum nigrum & uulgare, alterum candidum, magnitudine quidem compari, & uoce simili: sed circa Cylenam Arcadiæ familiare, nec usquam alibi nascens. Est enim ex hoc genere quæ similis nigræ sit, sed fusca colore, & magnitudine paulo minor, uersari hæc in faxis, & rectis solita est: nec rostrum rutilum, ut merula habet,

De tribus

De tribus turdorum generibus.

Caput XX



Turdorum tria sunt genera, unum uisciuorum, quod nisi uisco, atq; refina non uescitur, & magnitudine picæ est. Alterum pilare, quod sonat acute, & magnitudine merulæ est. tertium, quod iliacum quidam uocant, minimum inter hæc, minusq; maculis distinctum.

De aue cœruleo nomine, &amp; eius forma.

Caput XXI



Nouimus & saxatilem auiculam quandā, cui nomen cœruleo, quæ maxime in Scyro colit, saxa amans, magnitudine minor quā merula, maior paulo quā fringilla. pede magno est, scanditq; saxa: colore cœruleo, rostro tenui & longo, crure breui similiter ut pipo est.

De uireone, &amp; mollicipite auibus.

Caput XXII



Mireo totus uiridans ex obscuro est. hyeme hic non uidetur, sed æstiuo solstitio potissimū uenit in conspectum. discedit exortu arcturi syderis, magnitudine turturis est. Molliceps eodem in loco semper sibi statuit sedem, atq; ibidem capitur. grandi & cartilagineo capite est, magnitudine paulo minor quā turdus, ore firmo, paruo, rotundo, colore totus cinereo, depes & pennis inualens est. Capitur maxime noctu.

De pardalo, &amp; collurione, deq; auibus cæteris, quæ semper conspicuæ sunt.

Caput XXIII



Pardalus etiam auicula quædam perhibetur, quæ magna ex parte gregatim uolat, nec singularem hanc uideris. colore tota cinereo est, magnitudine proxima superiori: sed pennis ac pedibus bonis. uocē frequentem, nec grauem emittit. Collurio eisdem, quibus merula uescitur. magnitudo eius quoq; eadem quæ superioribus est. capitur hyberno potius tempore. Hæc omnia semper apparēt, atq; etiā ea quæ in urbibus solent præcipue uiuere, ut coruius, ut cornix: nam ea quoq; semper cōspicua sunt, nec loca mutāt, aut latent.

De tribus generibus monedularum.

Caput XXIII



Monedularum tria sunt genera, unum quod graculus uocatur, magnitudine quanta cornix, rostro rotundo, rutilo. Alterum lupus cognominatum paruū, & scurra. Tertium, quod familiare Lydiæ, ac Phrygiæ terræ, idemq; palmipes est.

De duobus alaudarum generibus.

Caput XXV



Alaudarum duo sunt genera, alterū terrenū, cristatum, galerita à crista appellatum, alterū gregale, nec singulare, more alterius: uerū colore simile, quanquam magnitudine minus, & galero carens: cibo uero idoneum.

De gallinagine, &amp; sturno, earumq; forma.

Caput XXVI



Gallinago dicta, per sepes hortorum capitur, magnitudine quanta gallina est, rostro longo, colore attagenæ, currit celeriter, & hominem mire diligit. Sturnus niger, albis distinctus maculis est, magnitudine merulæ.

De ibe, &amp; duobus earum generibus.

Caput XXVII



Ibes Aegypti duplici genere distinguuntur. sunt enim alia candida, alia nigra. candida apud Pelusiū tantū non sunt, cum in reliqua tota Aegypto habeantur, nigra contra apud Pelusiū tantū, in cætera Aegypto nulla.

De duobus asionum generibus.

Caput XXVIII



Siones aliqui omnibus anni temporibus patent, & ob eam rem perennes, & temperationes uocabulo cōposito appellātur. qui esui non sunt propter uitium carnis. Aliqui autumno interdum apparēt, nec plus uno aut altero die immorātur: qui & esui sunt, & ualde probantur. differunt hi nullo ferē alio à perennibus illis, nisi corpulentia pingui, & quod uox his deest, illis non deest. de generatione eorum, quānam sit, nihil adhuc exploratū habemus, nisi quod fauonijs flatibus apparēt. certū enim hoc est.

De cuculi ſætu, &amp; eius prudentia.

Caput XXIX



Vculus, ut antea dictum est, non nidificat, sed in nidis parit alienis, & præcipue in palumbium, & curucæ, & alaudæ, humi, atque etiam in nido luteolæ appellatæ super arborē. parit hic unum ouum, nec ipse incubat. Sed auis in cuius nido pepererit, ea incubat, excludit, atque enutrit. quæ cum ipse alienigena pullus accreuerit, suos eijcere dicitur, ita ut pereant. Alij eos à genitrice occidi, & dari in cibo cuculi pullo aiunt, uide licet improbatos propter speciem cuculi elegantiorē. sed quanquam plurima ex ijs uidisse nonnulli confirmant, tamen de pullorum interitu non conuenit inter omnes. Alij enim cuculum ipsum repetere nidum, cui suum ouum mandarit, pullosq; deuorare nutricis uolunt. alij pullū cuculi, quod magnitudine præstet, posse percipere cibum omnē oblatum, atq; ita cæteros fame perire autumant. alij ipsum ut fortiozem, cæteros pastus consortes occidere autores sunt. sed prudenter sanè prolis suæ procreationē moliri uidetur cuculus. Cum enim se ignauum, minimeq; opitulandi potentem nouerit, facit quasi supposititios suos pullos, quò seruari possint. timiditate enim hæc auis excedit, quippe quæ ab auiculis uellatur, & præ metu earum fugiat.

De apodum nidulatione, &amp; caprimulgi forma.

Caput XXX



Podes, quos aliqui cypsellos appellāt, similes esse hirundinū, dictū iam est. Haud enim discerni ab hirundine possunt, nisi quod tibijs sunt hirfuti, nidum specie cistellæ productæ longius, fictæ ex luto, uno aditu dato arctissimo, faciunt: idq; locis angustis intra saxa & specus, ut & belluas deuolare possint, & homines. Quem caprimulgum appellant, auis montana est, magnitudine paulo maior quā merula, minor quā cuculus, moribus mollior, parit oua duo, aut tria cum plurima, fugit caprarum ubera aduolans, unde nomen accepit. Cum fuxerit, uber extingui, capramq; excæcari aiunt. Parum clare interdū uidet, sed noctu perspicax est.

De coruorum nidificatione, &amp; ſætu.

Caput XXXI



Orui locis arctioribus, & ubi non satis cibi pluribus sit, duo tantum incolunt: & suos pullos, cum iam potestas uolandi est, primum nido eijciunt, deinde regione tota expellunt, parit coruus quatuor, & quinq;. Tempore quo apud Pharsala hospites Mediæ periire, corui locis Athenarum Peloponnesiq; defuerunt, quasi sensum haberent aliquem, quo inter se rerum euenta significarent, & mouerentur.

De sex aquilarum generibus, earumq; nidulatione, &amp; uenatione.

Caput XXXII



Quilarum plura sunt genera. unum quod pigargus ab albicante cauda dicitur, ac si albicillam nomines. gaudet hæc planis, & lucis, & opipidis. hinnularia à nonnullis uocata cognomine est. montes etiam syluamq; suis freta uiribus petit, reliqua genera raro plana, & lucos adueunt. Alterum genus magnitudine secundū, & uiribus, planga, aut clauga



clausa nomine, saltus & conualles, & lacus incolere solitum, cognomine anataria, & morphna à macula pennæ, quasi naviam dixeris. cuius Homerus etiam meminerat in exitu Priami. Tertiū genus colore nigricans, unde nomen accepit, ut pulla & fulua uocetur. magnitudine minima, sed uiribus omniū præstantissima hæc est. Colit montes ac syluas, & leporaria cognominatur. una hæc fetus suos alit atque educit. pernix, concinna, polita, apra, intrepida, strenua, liberalis, nō inuida est: modesta etiā, nec petulans, quippe quæ nō clangat, neq; lippiat, aut murmuret. Quartum genus percnopterus ab alarum notis appellatū, capite albicante, corpore maiore quā cæteræ adhuc dictæ hæc est: sed breuioribus alis, cauda longiore. uultu-  
 10 ris speciem hæc refert. subaquila, & montana ciconia cognominatur. incolit lucos degener, nec uitrijs cæterarum caret, & honorum quæ illæ obtinēt, expers est: quippe quæ à coruo cæterisq; id genus alitibus uerberetur, fugetur, capiatur. grauis est enim, uictu iners, exanimata fert corpora. famelica semper est, & querula, clamitat, & clangit. Quintum genus est quod haliaetus, hoc est marina uocatur, ceruice magna, & crassa, alis curuantibus, cauda lata. moratur hæc in littoribus & oris. accedit huic sapius, ut cum ferre quod ceperit nequeat, in gurgitē demergatur. Sextū genus gnesium, id est, uerum germanumq; appellant. unum hoc ex omni auium genere esse ueri, incorruptiq; ortus creditur. cætera enim genera, & aquilarum, & accipitrum, & minutarū etiam auium, promiscua adulterinaq; inuicem procreant.  
 20 Maxima aquilarū omnium hæc est, maior etiam quā ossifraga, sed cæteras aquilas, uel sesquialtera portione excedit. colore est ruffa, conspectu rara, more eius quā cymindem uocari diximus. Tempus aquilæ operandi uolandiq; à prandio ad meridianum. mane enim quiescit usquedum forum frequens, & prandendum iam sit. senescentibus aquilis rostrum superius accrescit, incuruaturq; subinde magis magisq; ut demū fame intereāt. cui rei data est fabula, ut hoc ita accadat aquilæ, quoniam cum olim homo esset, hospitii iniuriā intulerit. Condunt, referuantq; suo in nido quantum cibi pullis super sit. quod enim die quaq; facultas uenandi nō datur, sit interdum ne quod portent extrinsecus habeant. si quem deprehenderint uiolantem nidum, uerberant suis alis, & unguibus lacerant. Nidulantur locis non  
 30 planis, sed celsis, præcipue quidē arduis faxis & præcipitiis, sed arboribus etiam. Alunt suos pullos donec potestas uolandi fiat: tum nido eos expellunt: post regione quam ipsi genitores incolunt, tora exterminant. Tenent enim singula aquilarum paria longum tractum. unde sit, ne ullo pacto uicinos habere patiantur. Venantur locis non suo nido propinquis, sed longe distantibus. Rapta non protinus ferunt: sed cum corripuerint & sustulerint, deponunt, expertæq; iam pondus requiescunt. leporem etiam non statim rapiunt, sed expectant dum prodeat in plana, nec protinus de alto in terram ruunt, sed paulatim descendunt. quæ ideo faciūt, ut tutiores ab insidijs sint. confidunt etiam locis ædioribus, quia difficulter à terra tolluntur. uolāt sublimes, ut perquam maxime procul aspiciāt. quapropter homines  
 40 solam auium omnium aquilam esse diuinam perhibent. Omnes profectō quibus ungues adunci, minime in faxis consistūt, quoniam saxi durities impedimēto curuaturæ unguum est. Venatur aquila lepores, hinulos, uulpes, & reliqua quæ uinacere ualeat. Viuit tempore longo, quod diuturnitate nidi eiusdem declaratur.

De aue quadam scythica, &amp; eius nidificatione.

Caput XXXIII



Cythiæ terræ incola auis est, magnitudine otidis, hoc est auis tardæ, quæ duos procreat pullos. & quæ peperit oua non incubitu fouet, sed condita in leporina, aut uulpina pelle relinquit, atq; ita obuoluta in summa arbore collocat. cumq; à uenatione uacat, custodit, & si quis scandit, impugnat, & uerberat alis perinde ut aquilæ faciunt.



Ocua, cicunia, & reliqua, quæ interdum nequeunt cernere, noctu uenando cibū sibi acquirunt. Verū non tota nocte id faciūt, sed uespertino, & matutino. Venantur autem mures, lacertas, uerticillos, & eiusmodi alias quasdam bestiolas. Quæ ossifraga appellatur, probe & fortificat, & uiuit. cœnæ gerula, & benigna est. nutrit bene & suos pullos, & aquilæ. cum enim illa suos nido eiecerit, hæc recipit eos, ac educat. mittit namq̃ suos aquila, antequam tempus sit, adhuc parentis operam desiderantes, nec uolandi adeptos facultatem: quod per inuidiam ita facere creditur. natura enim inuida & famelica est, nec copiosa uenationis. magnum tamen quid nanciscitur, cum uenatur. inuidet igitur suis liberis iam maiusculis, atque edaciusculis, & ob eam rem unguibus fecat. Pulli etiam ipsi inter se pugnare incipiunt de sede, ac pastu. Itaque à parente eijciuntur, & pulsantur. deiectioni uociferantur, periclitanturq̃. Sed ossifraga recipit eos benigne, & tuetur, & alit, dum quantum satis sit adolescant. Parum hæc oculis ualeat, nubecula enim oculos habet laesos. At uero marina illa clarissima oculorū acie est, ac pullos adhuc implumes cogit aduersos intueri solem. percutit eum qui recuset, & uertit ad solem. Tum cuius oculi prius lachrymarint, hunc occidit, reliquum educat. Vagatur hæc per mare & littora, unde nomen accepit: uiuitq̃ auium marinarum uenatu, ut dictum est. Aggreditur singulas. cum emergentē obseruarit, refugit auis ut euolans uidit aquilam, & metu perculsa se rursus ingurgitat, ut in diuersa prolapsa emergat. Sed hæc acie oculorum ualens, sedulo aduolat donec uel strangulet in humore, uel per summa corripiat. Vniuersas nunquam inuadit. arcent enim frequentes, respergentesq̃ suis alis repellunt.



Vlicæ spuma capiuntur, appetūt enim eam auidius. quocirca spuma inspersa eas uenari in usu est. Caro earū probi odoris est, excepta parte posteriori uelima, quæ sola lituum olet. pinguescunt satis, & esui sunt.



Accipitrum genus præcipuum buteo est, triorcha à numero testium nuncupatus, secundū æsalo, tertium circus. Stellaris autem, palumbarius, & pernix differūt, appellantur subbuteones qui latiores sūt. alij perca, & fringillarij uocantur. alij leues & rubetarij, qui abunde uiuunt, atq̃ humiuolæ sunt. Genera non pauciora quàm decem esse accipitrum aliqui prodiderunt, quæ modo quoque uenandi inter se dissident. Alij enim columbam humi confidentem rapiunt, uolantem non appetunt. alij super arborem, aut tale quid conscendentem uenantur: sin humi est, aut uolat, non inuadunt. Alij neque humi, neque in sublimi manentem aggrediuntur, sed uolantem capere conantur. Ferrunt etiam à columbis quodq̃ accipitrum genus cognosci. itaque cum accipiter prouolat, si sublimipeta est, manent quo confiterint loco: sed si humipeta, qui prouolat, est, non manent, sed continuo aduolant. Thraciæ parte, quæ olim Cedropolis uocabatur, homines societate accipitrum per paludes aucupantur. Cum enim ipsi lignis, quæ tenent, arūdines & fruteta mouerūt, quo aues euolarent, accipitres desuper insectantur: quorum metu aues perculsæ terram reperiunt. mox homines percutiunt baculis, itaque capiunt. tum partem earum quas ceperint, auium accipitribus impartitūtur. Quinetiam apud Mæotidem paludem lupos esse piscatorū familiares aiunt, & nisi partem suam à piscatoribus acceperint, retia cum in terra expansa resicantur, lacerare. Ratio auium talis est.

De ingenio marinarum et fluuiatilium piscium pro ratione commodioris uitæ.

Caput XXXVII



Ed in marinis quoque animantibus permulta intelligi possunt, non sine solerti ingenio effici ratione uitæ cōmodioris. Nam & inuulgata illa de rana, quæ piscatrix cognominata est, & quæ de torpedine, uera omnino certaꝗ sunt. Rana enim ijs, quæ gemina ante oculos suos dependent, quorum fila capilli speciem referunt, sed postrema rotundis quibusdam præpilantur, quasi escæ causa additis: his inquam, ubi locis arenosis aut seculentis obturbato solo se abscondit, piscatur attollens illa sibi pendentia fila. dum enim pisciculi occurrunt, & capita machinamenti pensilis pulsant, ipsa subtrahens fila allicit, donec eos suum in os adducat. Torpedo pisces quos appetit, afficit ea ipsa, quam suo in corpore continet facultate torpendi: atque ita retardos præstipore capit, & uescitur. abdit se in arena & limo, tum pisces qui adnatantes obtorpuerint, corripit, quam rem plerique conspectam à se retulerunt. Pastinaca etiam seipsa occultat, sed non simili modo, argumentum sic uiuere hos pisces adduci potest, quod sæpius habentes in uentre mugilem capiuntur uelocissimū piscem, cum tardissimi ipsi sint. Tum etiam rana quæ caruerit præpilatis uillorum illis capitibus macilentior capitur. torpedinem autem uel hominibus inspirare torporem certum est. Obbruunt arena sese & aselli, & raia, & passeris, & squatina. cumꝗ nullam sui corporis partem intactam reliquerint, uerberant radiolis sui oris, quos piscatores uirgulas uocant, quas pisciculi cum aspexerint, adnatāt quasi ad algas, quibus uesci soliti sunt. Quo in loco anthias sit, nullam tibi belluam esse confessum est, quo iam indicio secure spongiatores urinantur, & sacrum hunc piscem ob eam rem nominant. sed id casu sic euenire dixerim, quomodo & ubi sit limax neque sus est, neꝗ perdidit. omnes enim limaces ab his eduntur. Serpēs marina colore & corpore congro proxima est, sed obscurior atque acrior. hæc si capta dimittatur foris, in arenam rostro quamprimum adacto terebrat, subitꝗ tota. est ore acutiore hæc quàm terrestris. Qui autem centipeda appellatur, ubi hamum deuorarit, euomit foras sua interiora, donec hamum eiiciat. tum recipit intrò, ac ualet eadem, qua antè, salubriter. appetitus his quoque nidorulentorum ut terrestribus est, mordent non ore, sed tactu totius corporis similiter, ut quæ urticæ uocantur. Pisces, qui uulpes nuncupantur, cum se deglutisse hamū senserint, sibi opitulantur, ut centipeda. longius nanꝗ sese efferentes hami lineam abrodunt. capiuntur enim locis nonnullis hamo multiplici, gurgite præalto, & fluctuoso. Quinetiam amia cum belluam uiderint aliquam, colligunt sese, & quæ magnitudine præstant, lustrantes gregem circumualant: & si qua uiolatur, defendunt. dentes his ualidi. & iam cum alia belluæ, tum lamia aggressa, uulnera accepisse acrius uisa est. Fluuiatilium silurus mas plurimum curæ proli impendit. femina ut peperit abit. sed mas quo in loco plurimus foetus constiterit, perseuerans oua custodit: nec alium præbet usum, nisi ut pisciculos ne diripiant foetum, arceat: idꝗ uel ad quadragesimum, & quinquagesimum diem facit, donec satis iam aucta soboles se tueri à cæteris piscibus ualeat. prehenditur sæpe à piscatoribus ubi oua custodit. dum enim arceat pisciculos, quatit, prosilit, & ictum, sonumꝗ mouet. manet apud oua tam ardente animo, ut cum sæpe à piscatoribus oua, si præaltis gurgitibus subsidit, educantur, quoad magis fieri potest, in uadum, ipse tamen eodem studio foetum sequatur, neꝗ deferere unquam patiatur. tunc si minor sit natu, minusꝗ usu exercitatus, facile hamo capitur: sed si peritus & hami fraga est, morfu dentis sui durissimi rumpit hamū, & foetū assidue custodit. Omnia uero tum nantia, tum stabilia, locis eisdem quibus orta sint, aut similibus degunt. suus enim quibuscꝗ cibis in ijs est. Vagantur maxime & oberrant, quæ carne alun-

tur, præter pauca, ut mugilem, salpam, mullum, æricam. Quæ autem pholis appellatur, mucorem quem ipsa emittit, sibi obducit, ita ut in eo quasi cubili quiescat. Generis testati & expedis pecten potissimum plurimumque se mouet uolatu. nam purpura & eius similia, parum admodum progrediuntur. De Euripo Pyrrhæo pices per hyemem omnes, excepto gobione, foras enatant propter frigus. locus hic enim frigidior est. sed ineunte uere eo lem redeunt. Vacat Euripus scaro, & alofa, & reliquis spinosioris generis omnibus. musteli etiam, & spinaces in eo mari nequaquam gignuntur: nec non locustæ, polypi, bolitenæ, atque alia quædam genera. gobionem album Euripi non esse pelagium certum est. Vigent pisces ouipari ueris tempore, donec pariant. uiuipari autumno, atque etiam mugiles, muli, & reliqui generis eiusdem. Apud Lesbum insulam omnia tam pelagia quam Euripica parere solent in Euripo. coeunt autumno. pariunt uere. cartilaginea etiam autumno. mares cum fœminis circa coitum congregantur. Sed uere subeunt Euripum disincta: neque coniugium reperitur ulli, donec pariant, cum coitus tempore complura ex his sibi adherentia capiantur. Mollium astutissima sepia est. sola hæc suo utitur atramento, non modo cum metuit, uerum etiam abscondendi causa. polypus atque loligo atramentum pro metu mittit, sed accrescit denuo postquam miserit, ut nunquam copia desit atramenti. cæterum sepia, ut dixi, sæpe uel sine pauore suo utitur atramento ad se occultandam. & cum progressa paululum se ostenderit, redit in atramentum. uenatur etiam suis illis prælongis prætenturis non solum pisciculos, sed mugiles etiam sapius. polypus satius quidem est, cum ad manum demissam hominis accedit. sed prudens rei familiaris, cum omnia colligat, & suo in domicilio recondat, cumque consumperit quantum utile sit, abigit testas, & cancrorum crustas, & putamina conchularum, & spinas pisciculorum. sui etiam mutatione coloris uenatur pisces. trahit enim sibi colorem similem ipsi, quibus appropinquare facit. quod idem etiam cum meruerit facit. Sunt qui sepiam quoque facere hoc idem autument. colorem nanque eam sibi contrahere similem loco, in quo uersatur, confirmant. Sed piscium sola squatina ita affici solet, mutat enim hæc more polypi sui colorem. Genus polyporum magna ex parte biennio uiuere non potest. sua enim natura tabi obnoxium est. cuius rei indicium, cum pressus polypus aliquid subinde humoris emittat, demumque absumatur totus. quod fœminis à partu potissimum incidit. stupent etiam fœminæ, ut neque undis iactatæ sentiant, & manu urinantis de facili capiuntur. fordescunt etiam, nec præterea assidendo uenari possunt. mares uero alueo tument, & in mucorem lentescunt. Indicium ne bimatum compleant esse uidetur, quod ab ortu eorum, qui æstate fit, ad autumnum non facile grandem polypum uideris, cum paulo ante id tempus prægrandes spectentur. à partu ita senescere debilitarique tam marem quam fœminam ferunt, ut uel à pisciculis deuorentur, & facile à suis detrahantur cubilibus, cum antea nihil tale ipsis usu eueniat. tum uero paruos, nouellosque quamuis recens natos, tamen nullo eiusmodi malo affici narrant. Quinimo ualidiores esse quam grandes confirmant. Sepias etiam bimatu non uiuere apertum est. Mollium unus polypus exit in siccum, graditur per asperiora, uolat læuia. ualidum cum cæteris suis partibus hoc animal sit, collo tamen imbecille cum premitur, est. mollia ita se habent. Conchas tenuiores scabrasque efficere circum se, uelut loricam duram, eamque eo ampliorem, quo ipsæ sunt ampliores, atque de ea quasi latibulo aut casula quadam prodire aiunt. Nauta quoque polypus natura, & uitæ muneribus singularis est. nauigat enim per maris summa elatus, de imo gurgite effert se concha inuersa, ut ascendere possit facilius, & inani scapha enauiget. Vbi uero emerit, concham reuertit. habet inter sua brachia membranulam quandam annexam similem ipsis, quæ digitis insertæ palmipedum auium continetur:

cur: uerum illæ crassiusculæ sunt, hæc prætenus est, & aranæ speciem imitatur. hac uelificat, cū aura inspirat. cirros pro gubernaculis utroq; demittit latere. si quid meruerit, concham protinus mari replet, atq; ita demergit. de generatione incrementoq; eius conchæ nihil adhuc exploratum habeo. uidetur tamen non ex coitu gigni, sed sponte, ut cæteræ conchæ prouenire. nec uero an concha solutus uiuere possit, certum adhuc est.

De ingenio insectorum, & formicæ studio.

Caput XXXVIII



Insectorum officiosissimum, & præ cæteris serè omnibus animalibus genus formicarum & apum est. crabrones item ac uespæ, & propèdixerim omnia huius cognata generis, aranei etiam lautiores & strigosiores, ingeniosiores in uitæ muneribus sunt. iam formicarum negotia omnibus in promptu habentur: utq; eadem semita semper ambulant, & cibaria recondunt, & cellas promptuarias faciunt, nec interdum solum, sed etiam noctibus plena luna laborem exercent, nemo est, qui non uideat.

De generibus araneorum, eorumq; industria in uenatione, & tela conficienda.

Caput XXXIX



Raneorum aut & phalangiorum plura sunt genera. mordax, quod in duo distinguitur, alterum simile ijs, quæ lupos appellantur, est, paruum, uarium, procax, falax, pulex nuncupatum, alterum maius, coloris nigri, cruribus prioribus nigris, tardum, & lente ambulans, nec uiribus ualens, neque saliens. Cætera, quæ medicamentarij proponunt, aut nullum, aut certe exilem inferunt morsum. Genus secundum, quod lupi nomen accepit, partim exiguum est, quod non texit: partim maius, quod asperam paruamq; telam apud terram, aut sepes orditur. buculis intexere solitum primordijs intus positis obseruatur. dum aliquid in tela offendens commouerit, mox accurrit, ut capiat, partim uarium est, quod paucam, uilemq; telam sub arboribus facit. Tertium genus, quod sapientissimum lautissimumq; omnium est, texit enim primum filis quoquo uersus distendens in orbem, tum stamina ducens, initio à medio accepto: nec incite mediū ipsum accipit: deinde subtegmina inferēs, atq; stipans, cubile & repositorium alibi sibi constituit: sed uenationem in medio sui operis obseruando exercet. Cum enim bestiola eò inciderit, motu medijs excitus occurrit, deuincitq; primū obuoluens araneis, dum defatiget, infirmamq; faciat, tum tollit ac defert: & si fortè fame tenetur, exugit. hæc enim fructus eius est, sin minus, recōdito, quod ceperit, in repositorio, repetit uenandi negotium: sed prius confarcinato, quod per uenatum laceratū est. si quid inter mediū & extrema inciderit, primum ipse in mediū currit, inde ad id quod inciderit, uelut à stato initio properat. Si quis telam lacerarit texere iterum incipit, uenatur oriente sole, aut occidente: quoniam bestiolæ temporibus his potissimum offendant. Fœmina & texit & uenatur, mas comes fruendi, non laborandi est. Araneorum lautiorum, & telam spissiore texentiū, duo sunt genera, alterum minus, alterum maius. quod igitur longioribus est cruribus pendens subtus obseruat, ne bestiolæ præ formidine sibi caueant, sed incautæ incidunt in partē superiorem. ineptius enim propter sui corporis magnitudinē est. At alterum quod moderatius est, superne obseruat, latens in quodā exiguo suæ telæ foramine. Aranei statim cum æditi sunt, fila mittunt, nō intrinsecus tanquam excrementū, ut Democritus ait, sed extrinsecus de suo corpore ueluti corticem, aut more eorū, quæ suos uillos iaculantur, ut histricis, maiora etiam animalia inuadit, irretitq; suis filis. nam & lacertos paruos aggressus circumdat os, & filis obducit, donec cohibeat: mox adhærens, morsum desigit, hæc ita se habent.

ἰσὺ ἢ πρὸς  
λεῖοι, procax,  
falax. Plin. acu  
minatum, assul  
tim ingrediens.

*De generibus apum, earumq; studio in edificandis suis, deq; his herbis, quibus apes aluntur.*

Caput XL



Enus est insectorum quoddam nomine adhuc uacans, quo uno comprehendatur: sed formam suarum partium cognatam omnium referens, uidelicet ea quæ fauos faciunt, ut apes, & reliqua similis formæ insecta, quorum genera nouem numero sunt. Sex illa ex his gregalia, apes, reges apum, fuci, qui inter apes degunt, uespæ annua, item Crabrones, & teredines. Solitaria uero reliqua tria, firenis minor, qui fuscus totus est, firenis maior, niger, uarius, tertium, quem bombycem uocant, qui maximus inter hæc est. Formicæ nihil uenantur, sed facta ab alijs colligunt. Aranei nihil faciunt neque recedunt, sed cibum solum uenatu sibi acquirunt. Ex nouem ijs, quæ modo enumeravi generibus, apes (nam de cæteris post) nihil uenantur, sed ipsæ sibi cibaria faciunt, atque recondunt. mel enim cibus earum est, cuius rei indicium faciunt, cum apiarj eximere incipiunt fauos, quamuis enim suffiantur, uehementerq; ex fumo laborēt, tamen plus mellis tunc addunt quàm prius. quod enim cibi causa sibi recediderint, parcius eo temporibus cæteris utuntur: sed habent etiam quo aliter cibo alantur, quod quidam ceraginen, alij cereum uocant, uerum hoc deterius est, & dulcedine propolis fucus. congerunt id quoque ut ceram suis cruribus. Perquam uaria in earum operatione & uita, ratio est. Cum enim alueum receperint mundum, construere incipiunt fauos deferentes ex floribus, atque etiam arborum lachrymis, salicis, & ulmi, & reliquarum, quæ glutinum pariunt. his pauimentum quoque illinunt, ne bestiolæ nocuæ subeant. uocant hoc opus apiarj tectorium imum. Aditus etiam si ampliores sunt, fabrica obstruentes coartant. Effingunt fauos primum in quibus ipsæ gignantur, deinde in quibus reges dicti, & fuci, suos certe semper componunt: sed regum, cum foetus largior est, fucorum autem cum copia mellis speratur, fauos regum minores faciunt iuxta suos, fucorum iuxta regum minores, quàm suos. Exordium operis à tecto aluei, textusq; ad pauimentum perpetuo stabilimento agitur. pluresq; ad pauimentum telæ deducuntur. cellæ autem & mellariæ & sobolariæ geminæ omnes sunt. Vno enim eodemq; intersepto, duæ sibi iunguntur cellæ, modo poculi gemini: altera intus, altera foris. compages, qua parietibus faui adhærent, arctiores & melle uacuæ relinquuntur, gemino aut triplici uersu, pleniores enim sunt faui, quibus plus ceræ obducitur. pars aditus aluei prior illita est ex commosse: sic enim uocant quod uelut excrementum purgamentumq; ceræ est, bene nigrum, acrisq; odoris. medentur hoc plagis, & huiusmodi suppuracionibus. proximū ab eo tectorium picatus cereus præbet. leuius id quàm commosis medicamentum est. Sunt qui fucos & per se fingere fauos eodem in alueo, & cum apibus negocium conficiendi faui partiri dicant: uerum mellificandi nullam habere facultatem, sed uesci tum eos, tum eorum pullos melle, quod apes fecerint, manent fuci magna temporis parte intus, cumq; exeunt, efferunt sese fusi in sublime, gyroq; uolitant, & quasi exercitum faciunt. quod ubi satis iam fecerint, redeunt domum, & epulis perfruuntur. Reges nunquam prodeunt foras, uel ut pascantur, uel alia causa, nisi uniuersa cum plebe, & si cum pergunt, rex ipse forte aberrarit, omnes inquirere, odoratuq; sagaci persequi, donec inueniant, accessimus, gestari etiam eum à plebe, cum uolare non potest. & si perierit, omnes discedere: uel si aliquandiu manserint, fauos quidem cōficere, sed mel nullum. nec fieri posse, quin breui omnes discedant. Ceram apes perreptando flores, capiunt prius acumine pedum, mox priores in medios abstergunt, & medios in blæsa posteriorum, atque ita onusta discedunt. & quidem grauari premiq; onere cernuntur, quoties redeunt. Mos apibus, ne florū plura genera petant uno eodemq; profectu,

At, sed singulis singula, uerbi gratia, à uiola ad uiolam aduolant, nec aliud attin-  
 gunt, quousq; suum in alueum redeant. hic se quatunt, & singulas, tres aut quatu-  
 or sequuntur. Sed quid accipiant, haud facile uideris: nec uero quemadmodum  
 operantur, uisum adhuc est. Ceræ congestio notari potuit in oleis, cum diutius in  
 eodem morentur, propter frondem eius arboris spissiore. Post hæc fortificare in-  
 ciunt: nec prohibet quicquam quo minus eadem in cella sint, & pulli, & mel, &  
 fuci. Gigni fucos seorsum dicitur, si dux uiuit: sed si obiit, in apum loculamētis oriri  
 ex ipsis apibus, atq; hos fieri animosiores, quocirca aculeatos uocari, quamuis acu-  
 leo careant. Animo nanque ferendi, non potestate, nomen hoc meruerunt. Sunt  
 10 loculi ipsi fucorum ampliores, & finguntur seorsum quoque per se faui fucorum,  
 sed magna ex parte fauis apum inferuntur, quapropter secandum est. Genera  
 apum plura, ut dixi, duo principū, alterum rufum, quod præstantius est, alterum  
 nigrum, magisq; uarium, duplo amplius ape utili. Tertium genus quod optimum,  
 breue hoc, in rotunditatem compactile, & uarium est. Quartum longum crabro-  
 nibus simile. Præterea quod fur appellatur, nigrū hoc, aluoq; ampliore est. Quin-  
 etiam fucus qui omnium maximus est, sed sine aculeo, & ignauus. Differunt inter  
 se apes parentibus natæ urbanis, & quæ rustico montanoq; uictu educatis prodie-  
 rint, sunt enim hæ syluestres horridiores aspectu, & iracundiores, & minores, sed  
 opere ac labore præstantiores. Genus frugi fauos suos æquabiles construit, super-  
 20 numq; totum operimentum politum apponit, & ad singulos usus fauum singula-  
 tim effingit, uidelicet partē aliam ad mella, aliam ad prolem, aliam ad fucos accom-  
 modatam, quod si acciderit, ut eodem in fauo omnia hæc recipiantur, locus alter  
 deinceps dispositus habetur inanis. At uero illæ porrectiores, fauos inæquales con-  
 ficiunt, & operimentū rerum idum perinde ut crabrones imponūt. foetum etiam,  
 & reliqua sine ordine statuunt, duces improbi ex his oriuntur, & copia rum fucos-  
 rum, tum etiam eorum, quos fures uocant. Sed mellis aut nihil, aut admodum pa-  
 rum opera earum conficitur. Incubant apes suis fauis, & concoquunt, quod nisi fe-  
 cerint, uicturi ex aranea fauos aiunt, quod si de cætero se continere potuerint, ut in-  
 cubitu perseverent, partis quasi abortus sit: sin minus, toti pereunt faui. Gignun-  
 30 tur in ijs quæ uitantur, uermiculi, qui mox pennis subnatis euolant. Curant etiam  
 apes, ut faui erecti stent, quod si qui corruerint, erigūt, & pilis fulciunt fornicatis, ut  
 subire possint. Cum enim uia qua accedant non datur, cessant incubitu. unde fit,  
 ut faui araneentur. Furis & fuci nullum est munus, sed cæteris quibus cum uiuūt,  
 iniuriā faciunt: non tamen impune semper, nam deprehenſi interdum à bonis  
 apibus occiduntur. Enecant nimirum ipsæ etiam duces, qui plures quàm satis sit,  
 habeantur: & potissimum improbos, ne principum multitudo seditiones in exami-  
 ne faciant, necant præcipue, cum non ampla sobolis copia exiitit: nec habent tan-  
 quam coloniā mittant, fauos etiam regum eo tempore si parati sunt, diruunt, ut-  
 pote cum desint, quibus mittendis duces ipsi præfiantur, nec non fauos tollunt fu-  
 40 corum, si mellis penuriā coniectantur, nec aluei annonæ superioris anni abun-  
 dant, & apiarium eximentem tunc præcipue de melle impugnant, ac præſentes fu-  
 cos expellunt. & quidem sæpe uiſuntur foris in alueo residentes exules, flagrant  
 odio, breues contra longas, easq; alueis pellere conātur: qua in pugna, si illæ uice-  
 rint, optimum ita fore examen putatur: sed si hæ solæ remanserint, ociosæ uiuūt, &  
 nihil boni integre faciunt. Pereunt etiam ipsæ antequam autumnus sit, student bo-  
 næ apes quoad fieri potest, ne quam intra alueum interīmant: & si qua interierit in-  
 tus, statim foras cadauer educunt. Qui autem fures uocantur, & suos inuicem fa-  
 uos offendunt, & alienos, si latuerint, subeunt, sed si capiuntur, capite puniuntur.

nec facile aut latere, aut aufugere possunt, sunt enim in quoque aditu custodes. & fur ipse, si quando surripere ingressum potuerit, adeo in satietatem repletur, ut nequeat euolare, sed ante alueum uoluetur, itaque fuga perquam difficilis est. Reges nunquam foris uisuntur, nisi cum migratur: & tunc ita, ut reliquæ omnes circa ipsum principem suum glomerentur. Cum uero migrandum est, uox solitaria & peculiaris quædam aliquot ante diebus intus mittitur: & biduo, aut triduo pauca circum alueum uolant, an rex etiam inter eas sit, nondum exploratum habemus, quoniam difficile cognitu est. Collectæ iam auolant, & per singulos reges diuiduntur, & si forte pauca prope multas consistunt, concedunt pauca ipsæ ad plures, ac regem, quem reliquerint, si sequatur, interimunt. discessus & migratio ita agitur, singulis autem muneribus se distribuunt, ut aliæ flores conuehant, aliæ extruant, aliæ poliant fauos, & dirigant. Aquam tunc portant, cum prolem nutriunt. Carnem nullius animalis tangunt, nec opsonium appetunt. Nullum his tempus certum consuetumque est, quo operari incipiant, sed si cibarijs non carent, beneque degunt, assiduo potissimum tempore opus aggrediuntur, & quandiu serenum sit, assidue operantur. Nouellæ etiam tertio quam prodierint die, statim negotium ineunt, si cibus non suppetit, cumque incubant, digrediuntur nonnullæ ad pastum, sed breui redeunt, proles felicitis examinis quadraginta diebus intermittitur, tantummodo à bruma, cum satis iam cōcreuisse pullitiem senserint, cibo appposito derelinquunt, ipsa uero cum datur facultas, rupto operculo exit. Bestiolas, quæ in alueis nascuntur, & fauis officiant, apes notæ melioris tollunt, & rem familiarem tuentur, sed alteræ pro suo uitio negligunt, & perire patiuntur. Cum autem fauos apiarj eximunt, cibi tantum relinquunt, quantum per hyemem sufficiat, quod si factis sit, seruatur examen. sin minus, uel moritur ibidem, si ne discedat hyems obstat, uel deserit sedem, si serenū nanciscitur. mel apibus tum æstate, tum hyeme in cibo est: sed recondunt alterum quoque cibarij genus, cui durities ceræ proxima, quod sandaracam nonnulli appellant. Inferunt iniuriam apibus maxime uespæ, & auiculæ, quas paros uocant, atque etiam hirundo, & merops, qui apiafter est. tum uero ranæ lurariæ, eas ubi ad aquam accesserint, rapiunt, quamobrem eas apiarj per paludum & stagna, unde apes aquantur, uenari solent. & uesparum latibula, & hirundinum, ac meropum nidos propinquos alueis tollunt. Nullum animal nisi sui generis apes fugiunt. præliantur enim inter se, & cum uespis: sed cum ruri sunt, nec sibi inuicem, neque ullis alijs iniuriuntur. At uero apud suos alueos pugnant acerrime, & hostes quos uicerint, enecant. Intereunt quæ percusserint: quoniam sine intestini eruptione aculeus eximi non potest, sæpius enim euadunt, si qui ictus est, curam adhibet, ut aculeus infixus ictus cum aluo extringatur, alioqui apis interit. Necant uel maxima animalia ictu sui aculei. iam equus occisus ab apibus est, sed principes minime irritantur, & feriunt, efferunt foras apes uita in alueo defunctas, & cætera. mundissimū omnium hoc animal est. Quamobrem sæpenumero cum alui necessitas est, auolant, & in secessu reddunt excrementum, quoniam male oleat, oderunt non solum foedos odores, sed etiam unguentorum delicias, ex quo fit, ut homines his delibutos percutiant, pereunt apes tum alijs casibus, tum uero cum multi principes orti, partem quisque secum quo libuit abducant. Rubeta etiam apes interimunt, subiens enim aditus aluei, afflat, & obseruans rapit euolantes. nullo hæc affici malo ab apibus potest, sed ab apiario facile interimitur. Genus aut apum quod improbum esse, ac fauos fingere asperos diximus, nouellis maxime tribuunt apiarj nonnulli: peccareque ita per imperitiā eas arbitrantur. nouellæ autem sunt anniculæ omnes, quarū examen quotannis auolare solitum est. Nec uero nouellæ ipse



ipsæ perinde ac ueteranæ pungunt, cum copia mellis non suppetit. Apiarij fucos depellunt, & ficus, ac reliqua id genus dulcia in cibo apponunt. Apum seniores in-  
tus operantur, hirtioresq; moræ domesticæ ratione sunt. Adolescentes foris nego-  
cium exercēt, & ea, quæ res exigit, portant, leuiioresq; sunt labore hirsutiæ detrita.  
fucos etiam ipsæ interimunt, quoties non satis loci operibus est. tenent enim aluei  
locum penitiorum. Cum morbo examen quoddam laboraret, agmen peregrinum  
inuasit, & pugna conferta, adeptaq; uictoria mella diripiebat. quod cum apiarius  
prosterneret, uictum examen statim egressum ulciscabatur, nec hominem ipsum  
ullo pacto impetebat. Morbo examina ualentiora potissimum infestantur ciero (sic  
enim uocant uermiculos, qui in pauimento nascuntur) è quibus crescentibus ue-  
lut aranea alueo toti obducitur, & faui carie pereunt. Alterum morbi genus quasi  
ocium quoddam & ueternitas apum incidit cum foedo aluei odore. Paltus gratissi-  
mus apibus thymum est: sed rubido albidum præfertur. locus æstate non feruidus,  
hyeme tepidus. agrotant eo potissimum tempore, cum per eruginosam materiem  
operantur. Quoties uero flatu uehementi iactantur, lapillum gestant, quo se quasi  
fulcro & fundamine quodam stabiliant contra flatum. bibunt si fluuius sit propin-  
quus, non aliunde quàm ex eo, posito onere. sin minus, aliunde humore hausto  
pergunt ire ad mel euomendum, cōfestimq; negocium repetunt. Mellis conficien-  
di tempora duo sunt, uer atq; autumnus. sed uernum suauius, candidius, omnino  
præstantius autumnali est. conficitur profectio melius ex noua cera, nouellisq; stir-  
pibus. rufum uero atque deformius faui uitio redditur, quippe quod perinde ut  
uinum à uase uitietur. quapropter coquendum id rescicandumq; est. Cum autem  
ex thymo florente faui replentur, fit ita, ut minus mei coëat & duretur. probatur  
cui ex aureolo color. quod autem albicat, non è syncero thymo confectū est, sed id  
oculis & ulceribus commodius applicatur. Mellis exilior pars fluitat, quæ eximēda  
est: pura uero & ualida subsidit. conficiunt ceram cum stirpes florent, quamobrem  
eximēda per id tempus cera de alueo est: continuo enim reparatur. Hæc sunt, un-  
de accipiunt, thymus, fusus agrestis, sertula campana, albucum, myrtus, phleus, ui-  
tex, genista. Cum ex thymo conficiunt, aquam admiscunt, antequam fauus occu-  
petur. Egerunt alui excrementa omnes, aut uolantes, ut dictū est, aut certa in parte  
fauis. minores officiosiores maioribus sunt, ut dixi. pennæ his detritæ, color niger,  
dorsum repandum. illæ nitidæ uenustæq; sunt more ociosarum mulierum. Gau-  
dere etiam plausu atque sonitu apes uidentur: quapropter tinnitu aeris aut fictilis  
conuocari eas in alueum aiunt: quanquam incertum est, an audiant, & uolupta-  
te ne, an formidine ita faciant. quin & socias ociosas, ac desides, aut minus parcas  
pellere in more apibus est. partiuntur inter se opera, ut antè dixi, & aliæ fauos con-  
ficiunt, aliæ mella, aliæ erythacam. & aliæ fauos expoliunt, aliæ aquam important  
ad cellas, & mella temperant, aliæ munus extrarium subeunt. Tempore matutino  
omnes silent, donec una gemino aut triplici bombo excitet omnes. tum uniuersæ  
ad opus prouolant. cumq; redierint, primum item tumultuant, paulatimq; mi-  
nus subinde strepunt, dum una circumuolitatio susurret, quasi dormiendum præ-  
cipiat. tum repente omnes conticescunt. Dignoscitur examen ualere susurri fre-  
quentia, & exeundi ingrediendiq; uertiginosa agitatione. tunc enim nouellæ ope-  
rantur. Esuriunt ab hyeme potissimum, cum opus incipiunt. Redduntur ociosio-  
res, si in eximendis fauis plus mellis relinquatur. itaque pro examinis numero res-  
linquendum est. Agunt etiam anxius, si plus demetatur, quàm ut residuum cibo  
sufficiat. atque etiam si alueus iusto amplior sit, desidiofiores redduntur. ægrius  
enim quasi desperent, operi incumbunt. Castrantur faui singulis sextarijs, aut ter-  
tis semisextarijs, sed si exuberant, binis sextarijs castrari, aut quinis semisextarijs

possunt. pauci ternis sextarijs. Impugnatur apes à uestpis, ut antè dixi, quamobrem apiarij eas uenantur cōstituta olla, & carne in ea posita. ubi enim multæ iam ad carnem accesserint, apposito operculo super ignem ollam ponunt. fuci autem si pauci adfunt iuuant. reddūt enim apes in opere sollicitiores. præfagiunt apes & hyemem & imbres. cuius rei indicium est, quod non auolant, sed fereno adhuc in alueo uoluntantur, quo apiarij hyemem expectāt. cum uero mutuo inter se annexu alia ex alia dependet in alueo, indicium deferendi cubilis est. quod ne eueniat, apiarij alueis afflant ex uino dulci. Expedit conseruisse apud aluearia puros, fabas, medicam herbam, suriam, eruillam, myrtum, papauer, terpyllum, amygdalam. Cognoscūt suas apiarij nonnulli, farina in prato resperfa. Minus apes foeticāt, si uer ferotinum sit, aut squalor, aut rubigo inciderit. Ratio apum ad hunc modum est.

De duobus uestparum generibus, & earum studio in fauis construendis. Caput XLI



Esparum duo sunt genera. alterum ferum, quod rarum est, nascens in montibus, & pariens nō sub terra, sed in quercu, specie grandius, porrectius, nigrius. uarium etiā aculeatumq; est, & robustius, ictuq; acerbius quā alterum est. aculeo enim maiori quā ex proportione sui corporis spiculatur. uiuit hoc toto anno, & quidē tempore hyberno. quercu caesa euolare spectatur. exigit hyemem in latebra, & semper in matrice diuersatur, sunt eius alia matricis, alia operaria, ut & in altero genere, quod placidius est. Quæ autem sit natura operaria, ac matricis, in eo ipso placidiore genere percipi facilius potest. sunt enim huius quoq; duo genera, alterum duces, quas matricis appellant, alterum operaria. maiores mitioresq; duces sunt. Aetas operariorum annum non compler, sed omnes hyeme inualefcente moriuntur. quod ea re constat, quia hyeme incipiente stupefiant: bruma autem nullæ omnino appareant. duces uero qui matricis uocantur, tota hyeme uiuant, atque sub terra latitant. pleriq; enim cum per hyemem ararent, aut foderent, matricis uiderunt; operarias nemo. ortus talis uestparum est. Duces ubi iam locum sibi opportunum delegerunt, fauos opere æstiuo confingunt, & uestpeta (cellulas dico) constituunt quaternis foriculis, aut propē, in quibus uestpæ non matricis nascuntur. quæ cum increuerint, rursus altera ampliora effingunt, quorum item proles cum creuerit, alia faciunt, ita, ut postremo autumno plurima amplissimaq; uestpeta condita habeantur. in quibus dux quæ matrix uocata est, nō insuper uestpas, sed matricis iam procreat. quæ quidē superne post summa uestperi uermiū specie multo grandiorum gignuntur, in cellulis continuatis quatuor numero, aut paulo pluribus. alioqui increndi ratio ducibus eadē quæ uestpis est. Sed cum uestpæ operariae fauis affuerint, non præterea duces operantur, sed operariae ipsæ cibū suis ducibus sumministrant. quod ea re constat, quia duces non item euolant, sed intra recta quiescūt. Cæterum utrum duces anni superioris nouellis iam procreatis ducibus interimantur à uestpis nouellis, idq; simili modo eueniat, an plus etiam temporis possint uiuere, nondum exploratum est. nec uero senectutē matricis, & uestparum generis ferī, aut aliquem huiuscemodi affectum annotare adhuc quisquam potuit. Est autem matrix latior, ponderosior, crassior, & maior quā uestpa: uolatuq; haud plurimum ualet, præ pondere enim sui corporis uolare longius nequit. quo fit, ut semper in uestparijs se deant effingentes fauos, & munere fungentes cellario, insunt porro matricis nuncupatæ in uestparijs plurimis: sed aculeatæ sint, nec ne, ambigitur. uidentur tamen & ipsæ ut apum duces, gerere quidem aculeum, sed nō extringere, aut ferire. Vespæ autem alia carēt aculeo, ut fuci. alia habent. minores imbecillioresq; sunt, quæ carent, neq; repugnant, contra quæ habent, maiores, robustæ, atq; pugnares, quas

quas nonnulli mares appellant. foeminas uero eas, quæ carent. Pleræq; ex his quæ aculeum gerunt, amittere eum putatur hyeme instante: sed hoc ex nemine qui uiderisset, accepimus. Vespæ temporibus siccis locisque asperis potius oriuntur. ortus sub terra agitur, fingunt suos fauos ex congerie, ac terra: & ab eodem primordio quasi stirpe unumquenque edificant. cibum uel ex floribus quibusdam, & fructibus perunt: sed quamplurimum ex carne. coire nonnullæ etiā ex cæteris uisæ sunt: sed an ambæ aculeo careant, aut habeant, uel altera habeat, altera careat, nondum exploratum est. Ferarum etiā nonnullæ coire uisæ sunt, & alteram gerere aculeum constitit, sed de altera incertum est. foetus non partu prouenire uidetur. statim enim au-  
 10 tior quam partus uespæ patitur, existit. Si uespæ ex pedibus ceperis, bombilare et si ueris, aduolant quæ aculeo carent, quod non faciunt, quæ aculeatæ sunt. itaque argumento quidam hoc utuntur, ut alteræ mares sint, alteræ foeminae. Capiuntur hyberno tempore in speluncis, & quæ aculeum habent, & quæ carent. condunt alia sua uespæ pauca, & exigua: alia plura & ampliora. Capitur magna matricum pars a solstitio apud ulmos. colligunt enim hinc lentam & gummosam materiam. prodiere locis quibusdam matricum ortu admodum numerofo, cum superiori anno uespæ atque imbrum copia præcessisset. capiuntur per præcipitia & terræ rimas, præruptaque directiora, omnesque uisuntur aculeum gerere. talis uespæ ratio est.

De crabronibus, uictuque eorum, & alucis.

Caput XLII

20 **C**rabrones non floribus, ut apes, sed carne magna ex parte uiuunt. unde fit, ut uersari uel in stercore sæpe soleant. uenantur etiā multis maiusculas, quas ubi ceperint, abscisso capite, reliquum corpus gestantes auolant. Sed pomum etiā dulce appetunt. cibis his talis est. Duces more apum, uespæque habent, qui proportionem ad crabrones maiores, quam uespæ ad uespas, & apum ad apes sunt. degunt hi quoque intus, ut uespæ duces. faciunt sibi alueum sub terra crabrones, terra egesta, & ut formicæ excavant. missio enim ut apum, nulla uel eorum uel uespæ fieri solet. sed qui subinde oriuntur nouelli ibidem manent, & alueum terra egesta faciunt ampliore: amplificant maiorem in modum, & iam ex ualentiore quodam examine quallitres, & quatuor fauorum pleni excepti sunt. nec uero cibum ritu apum sibi recondunt, sed ieiuni latent per hyemem, quo tempore plurimi moriuntur. an etiā omnes, nondum certum est. duces non plures uno singulis eorum  
 30 examinibus oriuntur, ut inter apes gignuntur plures, qui examina distrahunt. Sed si qui crabrones suo alueo aberrarint, colligunt se ad aliquam arborem, fauosque ibi conficiunt, qui uel sæpe conspicui apparent. in quibus unum procreant ducem, qui cum adoleuerit, agmen adducit, & secum in alueo collocat. De coitu crabronum nihil adhuc exploratum habeo, nec unde foetificent. Sed cum in genere apum careant aculeo, & fuci, & reges: atque etiā uespæ nonnullæ in aculeatæ sint, ut  
 40 antè dixi, crabrones omnes armari aculeo uidentur. Sed de eorum duce considerandum accuratius est, an aculeum habeat.

De genere bombycum, & teredinum, earumque foetibus.

Caput XLIII

**B**ombyces sub saxis apud ipsam terram foetificant, binis aut paulò pluribus cellulis. mellis etiā prauit cuiusdam inchoatio in his reperitur. Teredo non dissimilis crabronibus est, sed uaria, & latitudine proxima apibus. cupediosa hæc est, & ad culinā, & pisces, & huiusmodi delicias singularis aduolat. foetum sub terra ædit, ut uespæ. multiplex huius quoque teredinarii est, & longe amplius quam uespæ, atque porrectius. Muneris uitæque ratio apum, uespæque, & reliquorum generis eiusdem, ad hunc modum est.



Aeterum in moribus animantium (ut dictum iam est) percipi differē-  
tias licet, præcipue quidē ad fortitudinem, & timiditatem: sed ad man-  
suetudinem quoq; & feritatem etiam in ipso syluestrium genere. Leo  
enim quamuis in edendo ferocissimus sit, tamen pascit, & fame iam  
uacans, facilis mitisq; maiorē in modū est. nihil hic suspicatur, nullius  
suspiciosus est, festiuus, ludibundus, beneuolus admodum suis cum socijs, & fami-  
liaribus est. in uenatu dum cernitur nunquam fugit, aut metuit. sed etiam si uenan-  
tium multitudine cedere cogitur, sensim pedatimq; discedit, crebro subsistens atq; 10  
respectans. nactus uero opaca, fuga qua maxime potest ueloci, se subtrahit, donec  
in aperta deueniat, tum rursus lente incedit. Sed siquādo locis nudis atq; patētibus  
cogitur fugā aperte arripere, currit cōtentus, nec salit, cursusq; eius continēs, ut ca-  
num intēditur. cum tamen ipse insectat, ubi iam propinquat, insilit. Vera etiā illa  
de eo narratur, ignē præcipue formidare, ut Homerus quoq; testatur cum dicat:  
Ardentesq; faces quas quamuis sæuiat, horret. & percussorem agnoscere, atque  
ex obseruato inuadere. Si quis etiam non percusserit, sed infestet, hunc si ceperit,  
non unguibus lacerat, nec ulla iniuria afficit, sed quatit solum: atque ubi ita perter-  
ruit, dimittit. Adeunt urbes, & iniuriā hominibus inferūt, potissimum tempore  
suæ senectutis: tunc enim per corporis imbecillitatem, & dentium defectionem ue- 20  
nari nequeunt. Viuere annos multos putantur. & quidem qui captus est claudus,  
dentes complures fractos habebat. quo argumento quidam longam esse leonum  
æratem existimant. haud enim hoc accidere, nisi longo tempore potuisse. Leo-  
num duo sunt genera: quorum alterum breuius, crispiorēq; pilo, quod ignauius  
est: alterum longius, pilosq; probiore, quod generosius est. fugiunt interdum leo-  
nes demissa inter crura cauda, ut canes. iam uisus est leo, qui cum suem aggredere-  
tur, ut fetis horrentem aspexit, fugeret. Infirmitas paritium est contra ictus, sed  
reliquo corpore multas patitur plagas, & capite ualidissimo est. Quæcunque uel  
momorderit, uel unguibus lacerarit, sanies pallens admodum de his ulceribus ef- 30  
fluit, etiam per fascias, atque spongas, nec reprimi ullo pacto potest. curantur eo-  
dem modo, quo morsus canini, ulcera. Thoes etiā quos lupos ceruarios diximus,  
hominem diligunt, & neque offendunt, neque metuunt ualde, pugnant cum ca-  
nibus & leonibus. quo fit ne eodem in loco sint ceruarij & leones. optimi ceruarij  
qui minores sunt. genera huius alij duo, alij tria statuunt. plura ipsi esse non uiden-  
tur. Sed ut piscium, auium, quadrupedum genera aliqua, ita ceruarij quoque per  
tempora immutantur: & colorem diuersum hyeme æstate ue trahunt, atque æsta-  
te nudi, hyeme hirti redduntur.

De natura, specie, &amp; partu bonasi.

Caput XLV



Onasus gignitur in terra Pæonia, monte Messapo, qui Pæoniæ, & 40  
Mediæ terræ collimitū est, & monapios à Pæonibus appellatur, ma-  
gnitudine tauri, sed corpore quā bos latiore. breuior enim, & in la-  
tera auctior est. Tergus distentum eius locum septem accubantium  
occupat. Cætera forma bouis similis est, nisi quod ceruix iubata armo-  
rum tenuis, ut equi est, sed uillo molliore, quā iuba equina, & compositiore. co-  
lor pili totius corporis flauus. iuba prolixa, & ad oculos usque demissa, & fre-  
quens colore inter cinereum & rufum: non qualis equorum, quosartos uo-  
cant, est, sed uillo supra squallidior, subter lanario. nigri aut admodum rufi nulli  
sunt. uocem similem boui emittunt. cornua adunca in se flexa, & pugnae inutilia  
gerunt,

gerunt, magnitudine palmari, aut paulò maiora, amplitudine non multo arctiore, quam ut singula semisextariū capiant, nigræ probæ, antiæ ad oculos usq; demissæ, ita ut in latus potius quam antè pendeant. caret superiore dentium ordine, ut bos, & reliqua cornigera omnia. crura hirsuta, atque bifurcata habet, caudam minorem quam pro sui corporis magnitudine, similem bubulæ. excitat puluerem, & fodit, ut taurus, tergo contra ictus præualido est. Carnem habet gustu suauem: quam obrem in usu uenandi est. Cum percussus est fugit: nisi defatigatus nusquam consistit. repugnat calcitrans, & proluuiem alui uel ad quatuor passus proijciens: quo præsidio facile uititur, & plerunq; ita adurit, ut pili insectantiū canum absumantur.

10 sed tūc ea uis est in fimo, cum bellua excitatur, & metuit. nam si quiescit, nihil urere potest, talis natura & species huius animalis est. Tempore pariendi uniuersi in montibus enituntur. Sed priusquā foetum ædant, excremento alui circiter eum locum in quo pariant, se quasi uallo circundant & muniunt, largam enim quandam eius excrementi copiam hæc bellua egerit.

De ingenio &amp; sagacitate elephanti.

Cap. XLVI

**E**lephantus omnium ferarum mitissimus, & placidissimus est: quippe qui permulta officia, & erudiatur, & intelligat. quando etiam regem adorare discit. ualeat sensu, & reliqua sagacitate ingenij excellit. quam impleuerit coitu, eam rursus nō tangit. Viuere elephantos maiores alij annos ducentos, alij centum & uiginti aiunt. feminas etiam ferè totidem: sed florere ætate circa sexagesimum narrant. hyemis ac frigoris impatiens hoc animal esse dicitur. amat amnes, & quanq; non fluuiatile sit, tamen riparum dici potest. incedit etiam per aquam, & eatenus mergitur, quatenus eius promiscis superat. reflat enim per eam, & spiritum accipit, & reddit, sed natare satis pondere sui corporis non potest.

Camelus matrem nunquā superuenire, deq; prudentia equi regis Scytharū.

Caput XLVII

**A**meli matres nunquā superueniunt suas, sed etiam si quis cogat, ipsi non patiuntur. iam cum aliquando admissarius non haberetur, curator pullum matri operæ admisit. qui dum coiret, delapso operimēto agnouit matrem, & quamuis coitum absoluerit, memor tamen commissi sceleris, paulò post camelariū illum morsu defixo interemit. Ferunt etiam regi Scytharum fuisse equam egregiam, ex qua mares generosi omnes gignerentur. quorum unum, qui præstantior haberetur, cum ut ex matre procrearet, placeret, admissum omnino recusasse, operam deinde latuisse matrem, ut imprudens superueniret. uerum ubi à concubitu faciem matris detectam agnouerat, fugam properasse, atq; seipsum actum præcipitem interemisse.

De mansuetudine, amore, &amp; celeritate delphinarum.

Cap. XLVIII

**I**n marino etiam genere plurima de delphinis narrantur indicia morum placidorum ac mitium. amores quoq; in pueros, & affectus libidinis, cum circa Tarentum, & Cariam, tum etiam locis alijs referunt. fertur etiam delphino apud Cariam capto atq; saucio, ingentem reliquorum multitudinem conuenisse ad portum, immoraramq; donec piscator dimiserit eum, quem ceperat, tum omnes simul recepto captiuo rediisse. paruos item delphinos magnus aliquis semper comitatur custodiæ causa. iam conspectus est delphinorū grex, maiorum & minorum promiscuus, post quem, duo quidam paulò post uiderentur delphinulū defunctum labentem in unum subire,

& in summa pelagi dorso euehere, quasi miserantes, ne ab aliqua bellua deuoraretur. Quinetiā de uelocitate huius animalis mira & incredibilia quedam accepimus. omnium enim uelocissimū esse creditur animalium, tum aquatiliū, tum terrestriū. supersiliunt etiam malos nauigiorū maiorum, quod tunc potissimum euenit, cum aliquem insectantur piscem, quem deuorent. tunc enim si quem impetūt, longius fugit, ad ima gurgitum persequitur propter famis necessitatem. quod reditus longior sit, retinent sese, quasi spaciū cogitantes, conuersiſq; feruntur perinde ac sagitta pernicies, ut celeritate opportuna longo transmissio itinere ad locum spirandi deueniant. quo impetu sit, ut se eiaculentur in aërem, & supersiliant malos nauigiorū, quæ forte affuerint. hoc idem urinatores faciunt, cum se in profundum demiserunt. pro uiribus enim conuersi enixius efferuntur, ut spirent. degunt coniugatim mares cum foeminis. Quæritur quamobrem in terram erumpant. hoc enim interdum eos facere incerta de causa dicitur.

*De his animalibus quæ pro actionibus afficiuntur, moribusq; immutantur.*

*Caput XLIX*



Ed, ut quoq; animalia pro suis affectibus agere, sic pro suis quoq; actionibus affici immutariq; moribus solent. partes etiam corporis nonnullæ sapenūmero ratione agendi immutantur, ut in auium genere euenit. Gallinæ enim cum mares uicerint, cucuriunt, & exemplo marium tentant superuentu coire. crista etiam caudaq; erigitur, ita, ne facie præterea sit, an foeminæ sint cognoscere. nonnunquam etiam calcaria parua insensalcuntur. iam uero & mares uili nonnulli sunt, qui cum fortè foemina interisset, ipsi officio matris fungerentur, in pullos ductando, fouendo, educando, ita, ne de cætero uel cucurire, uel coire appeterent. quin & iam inde à primo ortu naturæ, ita nonnulli mares effoeminati proueniunt, ut neq; cucuriant, neq; per coitum agere uelint, & uenerem eorum qui tentent superuenire partiantur. Cuculus etiam immutatur colore, & uocem minus explanat, cum se abditurus est, quod facere exortu caniculæ solet. apparere autem incipit ab ineunte uere ad eius syderis ortum. Abditur & ea, quam cœnantham quidam appellant, ac si uitisfloram dixeris, exortu eiusdem syderis: occasu uero apparet. uitat enim interdum frigora, aliās æstum. Nec non upupa cum colore, tum uero specie immutatur, ut Aelchylus poeta satis carmine suo exposuit:

Quin fert sui spectantem, & epopem mali,  
Colore speciem multimodo pingens suam.  
Saxicolam, & improbum arma gestantem alitem.  
A duli infantis forma hic sese refert.  
Nam uere candicans ubi extitit nouo,  
Æstate tum deinde, ut recanduit seges,  
Alas repente uariis maculatas quatit.  
Vagatur hic semper fastidiens locos.  
Deserta quærit nemorum, & iniuias plagas.

Complures etiam aliæ aues immutantur per tempora, & colore, & uoce: ut merula, quæ ex nigra redditur rufa, & uocem mittit diuersam. strepitat enim per hyemem, cum per æstatem tumultuans canter. Mutat & turdus colorem, quippe qui collo æstate uariis, hyeme murino distinctus spectetur: uoce tamen eadem est. Luscina canere solet assidue diebus ac noctibus quindecim, cum sylua fronde incipit opacare. dein canit quidem, sed non assiduò. mox adulta æstate, uocem mittit diuersam, non insuper uariam, aut celerem, modulatamq; sed simplicem. colore etiam

etiam immutatur. & quidem in terra Italia per id tempus alio nomine appellatur. apparet non diu: abdit enim sese & latet. Rubecula, & quæ rutiliæ appellantur, inuicem transeunt. estq; rubecula hyberni temporis, rutililla æstiuæ. nec alio ferè inter se differunt, nisi pectoris colore & caudæ. sic & ficedulæ & atricapillæ uicibus cōmutantur. sit enim ineunte autumnō ficedula: ab autumnō protinus atricapilla. nec inter eas discrimen aliquod nisi coloris & uocis est. Auem autem esse eandem constat: quia dum immutaretur, hoc genus utrunq; conspectum est, nondum absolute mutatum: nec alterutrū adhuc proprium ullum habens appellationis. Nec mirum si hæc ita uoce aut colore mutantur, quando & palumbes hyeme non gemunt, nisi quod aliquādo ex asperrima hyeme placidum tempus successisset, gemuerit: quod apud peritos in admiratione habitum est. cæterum ineunte uere gemere incipit. Deniq; aues tunc maxime, plurimasq; emittunt uoces cum coeunt. Mos autem uium est, ut aliæ sese in puluere uoluent, aliæ sese lauent, aliæ nec puluere neque balneo utantur. Sunt pulueratrices, quæ nō altiuolæ, sed terræ propinquæ, ut galina, perdix, artagena, alauda, falsiana. Lotrices, nonnullæ rectungues, & quæ circa fluuios aut paludes, aut mare uersantur. Aliæ utrunq; tum lauare, tum puluerare solent, ut columbus, ut passer. Aduncarū pars maior neutrū facit, hæc ita se habent. Proprium nonnullis auium euenit crepitus alui, ut turturū. pars etiam nouissima alui earundem uehementer citatur, cum uocem reddunt.

20

De ijs animalibus quæ castratione immutantur, quæ ue ruminant.

Cap. I



Vtantur uero animantium aliqua forma & moribus, non modo per ætates & tempora, uerū etiam castratione. castrantur autem ea quibus sunt testes. Sunt autibus testes intus lumbis hærentes, & quadrupedū ijs quæ oua pariunt. At uero ijs quæ animal generat, eademq; terrestria sunt, plurima quidem parte foris, sed nonnullis etiam intus continentur. omnibus uero postrema aluo habentur. Castrantur gallinacei parte nouissima suæ alui, quæ cum coeunt, concidit. hanc enim si duobus aut tribus ferramentis adusseris, capos facies, quod si perfectus est qui castratur, crista pallefcit, & cucurire desinit, neq; coitum uenereum repetit. sed si adhuc pullus est, ne inchoari quidem ex ijs quicquā potest, cum accrescit. quod idem in homine quoq; accidere certū est. Nam si puer adhuc excidatur, neq; postgeniti pili innascuntur, neq; uox immutatur, sed suum seruat acumen. At si iam puber, postgeniti defluunt pili, præterquā pubis. hæc enim quamuis minuat, tamen manet, sed congeniti non defluunt. nemo enim spado caluescit. Quadrupedum etiam exeriorū uox omnium in foeminā immutatur. Sed cum cætera nisi nouella castrantur, intereant, aper unus qua arate castratur, non refert. omnia deniq; si dum crescunt, castrantur, maiora & elegantiora quam incastrata euadunt. sed si posteaquā adoleuerunt, & iam incremento confiterūt, castres, nihil præterea accedere ad magnitudinē potest. Cerui, si cum per ætatem nondum cornua gerunt, castrantur, non ædunt cornua: sed si cornigeri excidantur, non decidunt cornua, & magnitudine eadem seruantur. Vitulis tempus castrandi anniculis est, alioquin minores deformioresq; euadunt. Modus castrandi hic est. Tractus deorsum testes, atq; obrentos, pressosq; in imum scorti, cultello adacto, extrudunt. mox fibras sursum, quoad maxime fieri potest, reprimunt, & plagam infarciunt capillamentis, ut sanies effluere possit. & si inflammatur, ignem adhibent scorto, & respergunt. Si bos a recenti castratu ineat, procreare potest. Apria etiam scropharū castratur, ne præterea coitum appetat, sed breui tēpore obefetur. Castratur autē cum biduo ieiunarit, suspensa pernis prioribus, recisa cute inter foemina, quā maribus testes maxime continentur. hac enim parte adhæret uuluis apria

dicta, cuius exigua parte absclsa confarcināt. Cameli etiā fœminæ castrantur, cum  
eis uti in prælio liber, ne concipiant utero. nonnulli superioris Asiæ incolæ camelos  
uel ad tria millia possident. Currunt cameli celerius quā equi Nisiani, propter la-  
xiorē sui gradus glomerationē. & castrata deniq; auctiora quā incastrata eua-  
dunt. Animalia quibus ruminare in more est, proficiunt, delectanturq; non minus  
in ruminando, quā edendo. Rumināt quæ superiore dentium ordine carent, ut  
boues, oues, capræ. ex feris nullum adhuc ruminare constat, præterquā ea quæ ali-  
quando cum hominibus exigunt, ut ceruus. hunc etenim ruminare pianum est.  
Iacent potissimū cum ruminant omnia, & hybernīs præcipue mensibus solent ru-  
minare. septem ferē mensibus hoc faciunt, quæ intra recta aluntur. gregales leuius  
minusq; temporis ruminant, quoniā foris pascātur. Sunt etiā ex dentatis utrinq;  
nonnulla quæ ruminant, ut mures Pontici, & piscis, quem ab ea re ruminalem qui-  
dam appellarūt. Sunt item alui fluentioris ea, quibus longiora sunt crura, sed pro-  
pensiora ad uomitū, quibus latius pectus est. Idq; tum in quadrupedum genere,  
tum in auium, tum etiā in hominū ita esse magna ex parte perpensum est.

## HISTORIAE ANIMALIVM FINIS.



## ARISTOTELIS DE PAR

TIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS, LIBER  
PRIMVS, INTERP. THEODORO.

Duos esse & contemplandi & docendi præcipue habitus.

Caput I



N O M N I contemplandi genere, omniq; tum nobi-  
liori, tum ignobiliore docendi uia & ratione, duos esse  
habitus constat, quorum alterum scientiam rei appella-  
lasse, alterum quasi peritiam quandam, bene est. Homi-  
nis enim probe periti officium est iudicare perspicit̃er  
posse, quidnam recte, aut nō recte ab eo qui docet ex-  
ponitur. quippe cum & hominē omnino peritum ta-  
lem esse existimemus, & peritiam ipsam non nisi facul-  
tatem huius officij esse statuamus. Sed hunc omnibus  
ferē in rebus ualere iudicio arbitramur numero unum:  
illum uero certæ naturæ alicui delegamus, fieri enim potest, ut rem unam quispiā,  
ita ut alius omnes possit iudicare. Quamobrē naturalis quoq; historiæ siue contem-  
plationis limites huiusmodi alicui poni debent, ad quos iudex modum explicandi  
referre possit, & approbare semoto illo ueritatis examine, quonā modo res ita ne,  
an aliter se habeat. Verbi gratia, utrum substantias singulatim discutiendas cœpisse  
præstet, hoc est naturā hominis, aut leonis, aut bouis, aut alius cuiusquā generatim  
exponere aptius sit: an rebus subiectis, quæ cōmuniter omnibus accidunt, cōmuni  
usu quodam potius agendū. Sunt enim complura, quæ eadem in multis generibus  
diuersis inter se sunt, ut somnus, spiratio, auctio, diminutio, mors. Ad hæc, reliqui id  
genus



genus affectus, et dispositiones. Nihil enim adhuc certi explanatiq; habetur, quod de his dicere possimus: sed cum singularem agimus, eadem saepe de multis rebus necesse est. Nam & in equis, & in canibus, & in hominibus, ea quae modo dixi, omnia insunt. quapropter qui singularem agere per accidentia uelit, saepenumero uerba eisdem de rebus facere cogetur, quae scilicet eadem animantibus adiunctae sunt specie diuersis. Sunt etiam fortasse, quae cum eandem sortiatur appellationem, discrimine distent species, ut animalium incessus: quippe qui specie unus esse minus uideatur. discrepant enim inter se uolatio, natatio, ingressio, reptio. Quam ob rem quonam modo tractandum sit, latere non conuenit, utrum inquam communiter primum per  
10 generis complexionem, post uero res proprias considerare oporteat: an protinus quaeque persequi singularem rectius est. non enim de hac re adhuc praefinitum est. Nec illud confessum est, utrum, ut mathematici rem suam coelestem demonstrare consueuerunt, sic homo rerum naturalium studiosus, primum quae parent in animantium genere, partesque singulas explorare, deinde causam quam ob rem ita sint reddere debeat: an secus agendum sit. Ad haec, cum plures causas generationis naturalis esse uideamus, scilicet eam, cuius gratia res gignantur, atque eam, unde mouendi principium sit: definiendum de his etiam est, quatenam prima, quae secunda haberi debeat. Praefinitum sane illa obtinere uidetur, quae sub hoc uerbo, cuius gratia significamus, haec enim ratio est, ratio autem principium est pariter in rebus, tam arte, quam natura con  
20 stituendis. Vbi enim uel per intellectum, uel per sensum medicus sanitatem, opifex aedes definierit, rationes & causas rei, quam facit, reddere solet: & cur ita faciat, subiungit. quamquam illa, cuius gratia, causa, & ratio boni & pulchri, naturae operibus potius, quam artis coniuncta est. Necessitas uero non aequae in rebus naturae omnibus inest, ea uidelicet, ad quam omnes ferè autores rationes referre tentant prius, quam doceant, quorū modis accipi necessarium debeat. Inest id ipsum rebus quidem aeternis simplicibus, absolutisq; ratione: sed caducis etiam gignendisq; omnibus ex suppositione tribuitur: quomodo in artificiosis, ut aedibus, & quibusuis alijs generis eiusdem. Materiam enim talem adesse necesse est, si domus, aut quouis alius finis futurus sit: atque etiam fieri, moueri que illud primum oportet, deinde hoc, ac deinceps ad hunc modum  
30 itur ad finem, cuius gratia res quaeque & efficitur, & est, eodemque modo in rebus quoque natura gignendis agitur, quamquam demonstrandi modus, necessitatisque ratio, in naturali doctrina diuersa atque scientijs speculatiuis est, dixi de his alio loco. principium enim alteris quod est, alteris quod erit, accommodatur. Quod enim talis sanitas, aut homo, hoc uel esse, uel factum iri necesse est. non quia hoc uel est, uel fuit, illud necessario uel est, uel erit. neque huiusmodi demonstrationis necessitate ita perpetuitati annexere possumus, ut dicere liceat hoc esse, quoniam illud est. sed de his etiam alio loco disputatum a nobis est, & quibus in rebus id liceat, & quae possint reciprocari, & quam ob causam. Latere autem ne illud quidem oportet, an ita agendum, quemadmodum priores autores, qui, quomodo res quaeque fieret, quam quomodo esset, tractare maluerunt.  
40 non enim inter haec parum interest, sed enim exordium quod dictum iam est, ut primum res persequamur, quae quoque in genere conspectores, propriioresque habentur. deinde causas reddamus, et generationem. hoc enim in adficijs etiam potius euenit, quod enim forma aedium talis est, aut quod tales sunt aedes, idcirco fieri aedes hunc potius in modum censemus. generatio enim substantiae gratia est, non substantiae generationis gratia. Quam ob rem Empedocles plerumque in animalibus propterea ita contineri, quia ita, cum orirentur, acciderit, male ait: ut & spinam haberi talem, quod per contortionem diffrangi, frangi que accidit: nescius & quā semen genitale, quod confiterat, uim talem habere oportet, & quam res, quae effecerat, prior esset non modo ratione, uerum etiam tempore, Gignit etenim homo hominem, itaque ortus talis euenit

specie, quoniam talis qui gignit est. Quinetiam de ijs, quæ sponte fieri videntur, pariter atque de artificiosis animaduertere licet. Nonnulla enim uel sponte eadem quæ arte, fieri possunt, ut sanitas. His igitur causa efficiens similis antecedit, necesse est, ut ars condendarum statuarum prior statuis est, quando sponte fieri nequeunt. Artem autem oportet, esse ratione omni abiuncta materia certum est. Fortuitis quoque ratio similis est: ut enim ars se habet, ita existunt. Quam ob rem censendum ita potissimum, ut ob eam rem membris his homo constet, quia hoc homini esse est. Non enim fieri potest, ut sine his membris homo sit: si minus, proximum tamen aliud quicquam opinandum, & uel omnino fieri aliter non posse, uel bene ita fieri tantum posse statuendum. Cum itaque talis res sit, generationem in hunc modum, talemque euenire necesse est. Quapropter membra non sine ordine oriuntur: sed primum hoc, deinde illud, atque in hunc modum omnia, quæ natura consistunt, disponuntur. Veteres igitur illi & primi naturæ interpretes, materiale principium, atque eiusmodi causam, quænam, qualisque esset, indagauerunt: & quoniam pacto hinc tota oriretur, & quo mouente, ut discordia, & concordia, aut mente, aut casu, temeritateque spontanea docuerunt: cum subiecta materia talem quandam præ se ferre naturam uideretur, ut feruidam ignis, gelidam terra, & alter leuem, altera grauem, sic enim mundum etiam generant, hæc eadem de ortu plantarum & animalium quoque referunt. Ventrem enim, alium, omneque cibi & excrementi conceptaculum, ita constituisse, cum in corpore humor laberetur & rueret, nares ex rupto patuisse, cum spiritus siue flatus transmearet atque dispelleret. At uero aer & aqua non nisi corporum materia est, naturam enim omnes ex ijs corporibus componunt atque constituunt. Quod si homo, ceteraque animalia, membraque eorum natura constet, dicendum profectio de carne, de ossibus, de sanguine, denique de omnibus tam simili, quam dissimili siue compactis: ut de facie, de manu, de pede, quæ quodque eorum tale sit, & quæ ita consentiant facultate siue uirtute, non enim satis est eatenus tantum nosse, quibus ex rebus compositum sit, ut igne, terræ: sed perinde agendum, ut si de lectio, aut de quolibet alio generis eiusdem ageretur, formam enim potius, quam materiam eius declarare tentaremus: ut æs, aut lignum; uel si id minus, totius quidem ipsius speciem non omitteremus, lectus enim hoc in hoc est, aut hoc tale est. Quocirca uel ipsam si guram explanari, qualisque forma sit, indicari congruit, quippe cum formæ natura potior sit, quam materiæ. Igitur si animalium membrorumque unumquodque figura, coloreque est, recte Democritus disseuerit, qui ex ijs ipsis putasse animalia constare uidet, quippe qui perspicuum esse dicat, qualis forma sit homo, quasi sua ipse homo figura, coloreque pateat. Atqui mortuus homo, quantum figurae formam habet eandem, tamen homo non est. Ad hæc, fieri non potest, ut manus sit quocumque modo constans, ut aenea, aut lignea, nisi æqui uoca nominis communione, sicut quæ picta est, utpote quæ suo fungi officio nequeat, quomodo nec lapidea tibiæ suæ assequi munus possunt, neque medicus pictus artem medicinalem exercere potest, pari ratione membrorum quoque hominis uita functi nullum id esse insuper potest, quod erat, cum uiueret: ut oculus, manus, pes, reliqua. Ergo simpliciter admodum & pingui minerva dictum hoc est, ac perinde quasi faber de lignea manu loqueretur. Sic enim naturæ illi exploratores ortus & causas referunt figurarum, à quibus enim facultatibus condita fuerint, exponunt. Itaque faber securim fortasse, aut terebrum diceret: illi terram & aerem, sed melius faber, ut qui parum sufficere arbitretur, si usque eò dicat, quod instrumentum incidente, partim caua, partim plana extiterunt: sed adiciat, quoniam talem adegerit ictum: & causam, cur ita, exponat, uidelicet, ut talem aut talem formam opus acciperet. Constat igitur non recte illos disseuerisse, atque animal tale esse dicere oportere, & quid, qualeque tum id ipsum, tum etiam membrum unumquodque explicari oportere, quomodo de forma lecti docendum est. Ergo si animal, uel anima, uel pars anima,

ma, uel non sine anima est, quamprimū enim à corpore anima discessit, animal esse definit, neq; membrum ullum nisi figuræ suæ ratione idem relinquitur, modo eorum, quæ fabulæ transisse in lapidem narrant, si hæc, nquam, ita litari debent, hominis naturæ studiosi sanè interest de anima & differere & scire. & si non de omni anima, tamen de ea ipsa, quæ tale animal est, & quidnam anima, aut certe pars ista animæ sit: atq; etiam de ijs, quæ tali eius substantiæ accidunt, præsertim cum bifariā naturam intelligamus, ut altera pro materia sit, altera pro substantia, quæ quidem, & ut mouens, & ut finis est, talisq; animalium anima, uel omnis, uel pars aliqua eius sit. Nam ob eam etiam rem, quæ de natura agit, eo amplius docere de anima, quam de materia debet, quo materia natura potius per animam, quam e contrario est, lignum enim, & lectus, & tripes, propterea est, quia idem potentia illa est. Sed quæret quispiam, animaduertēs ad id, quod modo dixi: Vtrum de anima omni docere naturalis scientiæ intersit, an de aliqua una, at si de omni, nulla certe præter naturam philosophiam relinquatur scientia, intellectus enim, siue mens, rerum intelligibilium est, itaq; rerum omnium notiones naturalis una tenebit. Est enim eiusdem scientiæ, ut tam de intellectu, quam de re intelligibili doceat: siquidem eadem contemplatio omnium est inter se coniunctorum, sicut sensus etiam, & rei sensibilis. An non omnis anima principium motus est: neq; partibus animæ omnibus id tribui debet, sed augendi principium idem putandum, quod & in plantis, est, alterandi uim eandem, quam sentiendi: deferendi autem aliud quicquā, non uim intelligendi: delationem enim uel in ceteris esse animalibus nouimus, intellectum siue mentem in nullis. Constat igitur non de anima differere omni oportere: quandoquidē non anima omnis natura est, sed aliqua eius pars una, aut etiam plures. Ad hæc, rem à materia abstractam nullam potest scientia naturalis cōtemplari, cum natura rei alicuius gratia faciat omnia, rebus autem abstractis abiunctū, id est, quod sub hoc, cuius gratia, uerbo intelligimus, ut enim ars in artificiosis, ita in rebus ipsis aliquid esse principium aliud, & talis causa uidetur, quæ ex uniuerso perinde ut caloris, frigorisq; primordia habemus. Quamobrē uerisimilius dixerim cælum, & factum esse ab eiusmodi causa, si factū est, et magis esse ob eam causam, quam animalia caduca atq; mortalia, ordo enim, & ratus certusq; status, longe magis in rebus patet cœlestibus, quam in nobis, incerta autem, inconstans, & fortuita conditio in genere mortali potius est. At illi genus animalium quodq; natura constare, extitisseq; censent. Cælum autem forte sponteq; tale constituisse uolunt, in quo nihil fortunæ, nihil temeritatis deprehendi potest. Rem autem hanc esse illius gratia asserere ubiq; solemus, quoues finem intelligimus aliquem, in quem motus (si nulla res prohibet) terminetur, quocirca eiusmodi aliquid esse constat, quod naturā uocamus, non enim quodlibet, & utrunq; fors tulit, ex quouis semine oritur, sed hoc ex hoc, neq; ex corpore quolibet semen quodlibet prodit, principium namq; & efficiens rei, quæ gignitur, semen est, sunt hæc enim natura, & proinde ex hoc enascuntur. Atq; etiam priusquā hoc, illud est, unde semen expromitur. Semen enim ipsum generatio est, finis uero substantia, utrisque autem his prius illud est, à quo proficiscitur, semen enim bifariam accipitur, uidelicet ex quo, & cuius, nam & à quo decessit, eius semen est, ut equi: & eius quod ex illo futurum est, ut muli, uerum non eodem modo, sed ut dictum iam est. Ad hæc, semen non nisi potentia est. Potentia autem quemadmodum ad actum se habeat, nouimus, causæ igitur hæc sunt duæ numero: altera cuius gratia, altera ex necessitate, multa enim gignuntur, quia necesse est. Sed quæret fortasse quispiam, quam necessitatem intelligi uelint, qui res fieri necessario aiunt, neuter enim accipi potest eorum modorum, qui præfiniuntur in ijs, quæ per philosophiam tractata sunt. Tertius autem ijs, quæ habent generationē rebus est, alimentum enim

neutro illorum modorū esse dicimus necessarium: sed quia fieri non potest, ut res sine eo sit, ideo necessitatem ei adscribimus, quod quasi ex suppositione est, ut enim quia securi scindendum sit, durum aliquid esse necesse est: & si durum, uel æneum, uel ferreū: ita cum instrumentū sit corpus (est enim tum membrū unūquodq; rei alicuius gratia, tum uero totum ipsum) efficitur perfectio, ut esse tale atq; ex talibus constare necesse sit, si illud cuius gratia ipsum est, futurū sit. Constat igitur duos esse causæ modos, ac potissimū utrunq; assequi uerbis oportere, sed si minus id fieri potest, tamen pro uiribus eniti ad eius significationē, omnesq; nihil ferē de natura docere, qui hoc non dicunt, existimare. Principiū enim rerū natura potius, quā materia est. Empedocles etiam in eam interdum incidit, ductus ab ipsa ueritate: & substantiā atq; naturā esse rationē fateri cōpellitur: ueluti cū os quid sit, reddit, quippe qui non aliquod elementū unum esse id uelit, non duo, aut tria, non omnia, sed mixtionis elementorū rationē. Igitur & carnem & ceteras eiusmodi partes hūc eundem in modū esse apertū est. Causa uero quamobrē antiquiores illi autores non ad hunc uenerint modum, quod quid res esset, atq; substantiæ definitionē ipsam explicare haudquāq; solebant. Sed Democritus hanc tetigit primus, nō tamen quod ad rerum naturalium studium putauerat necessariā, sed quoad ab ipsa retraheretur. So-  
cratis uero tēporibus usus quidem definiendi increuit, sed indagatio rerū naturalium desijt. nam omne philosophandi studiū ad utilem uirtutē, ciuilemque usum translatū est. Licet quod modo dixi, ita demonstrare. Data animalibus spiratio est huius gratia  
rei, sed eam propter has effici res necesse est. necessitas uero aliās ita significat, ut si res cuius gratia futura sit, hæc haberi necesse sit. aliās ita, ut sic se habeant, aptaq; sua natura ita sint. egredi enim calorem, rursusq; ingredi, cum in re obuia offendantur, aëremq; interlabi necessariū est. Sed cum aer exterior refrigerando retorquet, ingressus atq; egressus caloris interioris rei alicuius gratia agitur. Hic modus tractandi est, hæc ad id genus doctrinæ uia & ratio attinet. hæc & eiusmodi sunt ea, quorū causas accepisse operæpretium esse ducimus.

Contra eos, qui genus singulare in duas diuidunt differentias.

Caput II



Vnt uero, qui genus in duas secando differentias accipiant singulare, quod quidem partim non facile, partim nullo pacto fieri potest, non enim desunt, quorū una tantū sit differentia. cetera autē superuacua sint. uerbi gratia: pedatū, bipes, fissipes, multifidū. hæc enim una potissima est, sin minus, sæpius idem dici necesse erit. Ad hæc, genus quoduis distrahi nō debet: ut, exempli gratia, aues alia in hoc, alia in illo diuisionis membro collocetur. quod æditæ illæ diuisiones faciunt, quippe cum ita fiat, ut auium alię cum aquatilibus constituatur, alia in alio ponantur genere. Sed ut nomen huic similitudini auis, illi piscis inditū est, sic alia sunt quæ nomine uacent, ut illa compos sanguinis, aut expers. utraq; enim nomine uno carent. Quod si nihil ex ijs quæ generis societate iunguntur, distrahi debet, frustra illa seorsum in duas partes distinctio agitur, cum seungi ac distrahi sit necesse, si ita diuidatur. Sunt enim ex multipedibus alia in terrestri, alia in aquatili genere.

Contra eos, qui differentias per priuationes diuidunt.

Caput III



Riuatione item diuidere ita necesse est. Et quidem id faciūt, qui seorsum in duo secant. At priuationis, qua priuatio est, nulla est differentia, non enim fieri potest, ut species eius sit, quod non est: uelut impedatū, aut impennatū, sicut pennatū & pedatū. Differentia autem uniuersalis species habeat, necesse est. nam nisi habeat, cur uniuersalibus potius adnumerari, quā singularibus debeat. Sed quantū sunt differentia quæ uniuersales

fales

ex quo quod  
retraheretur,  
impelleretur.

sales sint, & species habeant, ut pennatus, cum pennarū alia fissā, alia continua sit.  
 pedatus etiam partim multifidus est, partim bifidus, quod in bifidicis animalibus pa-  
 ter: partim continuus nulla fissura diductus, qualis eorum est, quæ solidam habent  
 ungulam. tamen difficile est, uel in eiusmodi differētiis, quarū species sunt, dispar-  
 tire, ut quoduis animal contineatur in ijs ipsis, nec idem in plures ueniat, ut penna-  
 rum & impennarū, ambo enim hæc in eadem specie possunt contineri, ut tormica,  
 ut nitedula siue cicindela. & alia quædam utrunq; recipiunt. omnium uero diffici-  
 limum, imò impossibile est, ut in ea quæ sanguine carent, ita diuidamus. differen-  
 tiam enim unamquancq; in aliquo singulari inesse, & proinde oppositā necesse est.  
 10 Quod si fieri non potest, ut ijs, quæ specie inter se differunt, species aliqua subita-  
 tiæ indiuidua, unaq; insit, sed differentiam intercedere necesse est, ut auis ab homi-  
 ne differt. bipedis enim ratio alia diuersaq; est. uel si sanguine constant, sanguis dis-  
 crepat ipse, nisi pro nulla essentia parte debeat haberi. sed si hoc ita est, differentia  
 una duobus inerit. Quod si ita sequetur, apertum iam est impossibile esse ut prius  
 ratio sit differentia. Quinetiam totidem differentia erunt, quot animalia indiuidua.  
 siquidem & ea ipsa indiuidua sunt, & differentia indiuidua. neque ulla differentia  
 cōmunis est. Quod si ita fieri potest, ut non cōmunis, sed indiuidua sit, constat quæ  
 diuersa sunt specie animalia in eodem, per illam quidem cōmunem contineri. Itaq;  
 necesse est, ut si propriae sint differentia, in quas omnia indiuidua cadant, nulla cō-  
 20 munis sit. sin minus, quæ diuersa sunt, uenient in eandem: cum neq; indiuiduum  
 idem, diuersas per distinctionē adire debeat differentias, neq; diuersa eandem, atq;  
 omnia in ijs ipsis oporteat contineri. species igitur indiuiduas colligi ita non posse,  
 ut diuidunt quæ animalia, aut quoduis aliud genus seorsum in duo secant, apertum  
 iam est. sit enim autoribus illis, ut ultimas differentias totidem esse, quot animalia  
 omnia indiuidua specie necesse sit. Cum enim genus aliquod sit, cuius differentia  
 prima album & nigrum habeantur, atq; eorum utrorunq; alia sint, indeq; ultra  
 rius usque ad indiuidua, efficitur profecto, ut ultima, aut quatuor, aut aliquo nu-  
 mero eliciantur, uidelicet qui ab uno multiplicari possunt. Totidem autē species quo-  
 que erunt, cum differētia species sit in materia. neq; enim sine materia pars ulla esse  
 30 potest animalis, neque sola materia. non enim quoquo modo habens quid, corpus  
 animal est, nec partium ulla, ut sæpius dictum est. Ad hæc, diuidendū ijs rebus est,  
 quæ sitæ in substantia sunt, non ijs quæ accidunt, ut si quis ita figuras diuidat, ut alia  
 angulos pares duobus rectis, alia pares pluribus habeant. accidit enim triangulae  
 figura, ut pares duobus rectis angulos habeat. Oppositis item diuidendum est, dis-  
 stant enim inter se opposita omnia, ut albedo & nigredo, ut rectitudo & curuitas,  
 quod si altera diuersa sunt, diuidendū per opposita est, & non ita, ut alterum narra-  
 tione, alterum colore distinguatur. Animata etiam cōmunibus corporis & an-  
 40 muneribus diuidenda sunt. quod in ijs etiam quæ modo diximus, patet. Alia enim  
 gressilia sunt, alia uolatilia. Sunt enim nonnulla genera, quibus datum utrunq; est,  
 ut partim uolucres, partim inuolucres sint, uelut formicarū genus. atq; etiam sylue-  
 stris urbanisq; ratione ita diuidetur, qd error est. sit enim, ut quæ specie sunt eadem,  
 hæc distinguere uideamur. Cum omnia quæ urbana sunt, eadem syluestria quoq;  
 reperiantur, ut homines, equi, boues, canes in terra Indica, sues, capræ, oues. quæ si  
 æqui uoca sunt, non seorsum distincta sunt. sed si eadem specie unūq; sunt, iam fieri  
 non potest, ut syluestre atq; urbanū pro differentiis recte capiatur. Omnino quan-  
 cunq; differentia diuidis, una tantum diuisione id accidere necesse est. Quapropter  
 generatim sumere animalia tentandū est, ut a uulgo iam autore distinctū est genus  
 auis, piscis, ceterorū quæ singula multis differentiis describuntur. nec bipartita illa se-  
 ctione agendum est. Sic enim aut omnino fieri nō potest, ut institutū assequamur,

cum idem in plures cadat diuisiones, & contraria ueniant in eandem, aut una tantū proueniet differentia, quæ uel simplex, uel per complexionē speciem ultimā referat, sed si non differentia differentia accipis, diuisionem effici continuam perinde ut orationem coniunctione unam necesse est, uerbi causa, occurrit ijs qui ita diuidere cōsueuerūt aliud pennatū, aliud impennatū, pennati aliud urbanū, aliud syluestre: aut aliud album, aliud nigrum, non enim differentia pennati urbanum, album uel est: sed hoc principium est alterius differentia, impennato autem per accidens est. Quamobrem pluribus diuidendum protinus differentiis quod unum est, ut nos censemus. Sic enim priuationes differentiam facient, quam in bipartita sectione facere nequeant. Apertum uel inde est, fieri non posse, ut ex singularibus speciebus quicquam accipiamus, bipartita generis sectione, & quidam fieri posse putarunt. Impossibile est enim unam differentiam esse eorum, quæ ut singula diuisionem recipiunt, siue simplicia, siue complexa accipiantur, simplicia dico, si non habeant differentiam, qualis filipedatio est, complexa autem, si habeant, ut multifidum ad filipes est, id enim illi sibi uult continuatio differentiarū, quæ de genere per diuisionem deducuntur, perinde quasi quid unum omnis hæc series referat, quanquam uocabulo euenit, ut ultima tantum differentia esse uideatur, uelut multifidum, aut bipes, pedatum autem & multipes superuacua sint. At uero plures huiusmodi differentias haberi non posse constat eo argumento, quod cum pergis subinde, deuenies quidem ad ultimā differentiam, sed non ad summam, & speciem: quæ quidem differentia, uel filipes tantum est, uel omnis complexio, uerbi gratia, si hominem diuidens pedatum, bipes, filipes componis. At si homo bipes tantummodo esset, hæc differentia una sufficeret. Sed quoniam hæc una non est, multas esse non sub una diuisione necesse est. Atqui fieri non potest, ut plures eiusdem sub bipartita una sint sectione, sed singulæ singulis finiant necesse est, itaque fieri quoque non potest, ut per bipartitam illam diuisionem, aliquod singulare animal accipiamus.

De genere &amp; specie.

Caput IIII




Ed quæret quispiam, cur principio homines non cōplectendo appellarent nomine uno generis, quod bestias tum aquatiles, tum uolucres contineret. Sunt enim nonnulli affectus, tum his, tum cæteris animalibus omnibus cōmunes. Verū tamen recte ad hunc modum definitū, distinctumque est, genera enim quæcunque excessu inter se differant, & plus, minus uel recipiant, hæc uni subiecta sunt generi, quæ autem proportionē recipiunt, hæc seorsum posita sunt, uerbi gratia: Auis differt ab aue, aut eo quod magis habeat quicquid, aut superantia ratione, aues enim alia penna sunt longiore, alia breuiore. Pisces uero proportionē ab auibz differunt, quod enim penna in auibz est, hoc idem squama in piscibus habetur, uerū id facere in omnibus non facile est, magna enim pars animalium eadem affecta est proportionē, sed cum ultimæ species substantia sint, quæ quidem species nullo speciei discrimine differant, ut Socrates, Coriscus, efficitur profectō, ut uel uniuersalia explicari prius, uel idem sepius dicere necesse sit, ut dictum iam est. Vniuersalia uero cōmunia sunt, quæ enim in pluribus insunt, hæc uniuersalia appellamus. Sed quæstio existit, utra tandem tractari debeant, qua enim substantia est id, quod specie indiuiduū est, potissimum dixerim fore, si quis de singulis indiuiduis specie seorsum considerare potuerit, atque ut de homine, ita de auibz esse agendum, habet enim hoc genus species, sed non de ijs, uerum de singulis indiuiduis auibz, ut de passere, de grue, de reliquis huiusmodi, sed si ita eueniet, ut sæpe de eodem dicatur affectu (quoniam cōmunis pluribus sit) efficietur sanē, ut seorsum referre de singulis, & sub absurdum sit, & prolixum. Cæterum

gerum scire fortasse agetur, si quæ ad genera attinent, ea cōmuni negotio explicemus: uidelicet quæ recte ab hominibus definita dicuntur, quæq; naturam fortium communem, & species non longe inter se differentes complectuntur, ut auis, ut piscis, & si quid aliud sit nomine quidem uacans, sed genere pari modo species continens. Quæ autem non eiusmodi sunt, hæc singillatim doceamus, ut de homine, & si quid aliud tale habeatur. Genera autē si quam similitudinē præ se ferant, figuris ferē partium, totiusq; corporis describuntur: quale genus auium, aut piscium est. mollia etiam atq; ostrea figurarū affinitate sua genera describunt. Partes enim eorum non proportionis similitudine discrepant, quomodo os hominis, & spina piscis, sed potius affectionibus corporis, id est magnitudine, paruitate, mollitie, durezza, lenitate, asperitate, & reliquis generis eiusdem: atq; omnino eo quod magis, minus ue quicquam habeant. Sed quemadmodū ratio tractandæ naturæ probari debeat, utq; de ijs rebus uia apta, facillimeq; contemplari docereq; possimus, atq; etiam de diuisione, quem in modum fieri possit, ut commode species sumantur, & quā bipartita sectio partim fieri nequeat, partim frustra fiat, dictum iam est. Quæ cum iam præfinita explicataq; sint, de ijs quæ deinceps sequantur agamus, indeq; ordiamur.

De substantijs naturalibus, partim mortalibus, partim immortalibus.

Cap. V

20  Vbstantiæ quæ natura constant, partim ingenitæ, immortalesq; seculis omnibus sunt: partim ortus participes, atq; interitus intelliguntur. sed partem illam æternam, & proinde nobilem ac diuinā minus contemplari propterea possumus, quod admodū pauca illius modo sensui patent. quorum beneficio, tum de ea ipsa parte diuina, tum de ijs quæ nosse cupimus, facultas nobis cogitandi indagandiq; suppeditetur. Res mortales atque caducas, ut stirpes, ut animantes, quod eas socias familiaresq; habemus, nosse uberius possumus: quippe cum multa inesse quoq; in genere percipere possit, quicunq; nō laborem recusat pleniorē, utrunq; tamen studium nos delectat. Res namq; illas superiores, tamet si leuiter attingere possumus, tamē ob eius cognitionē scēdi generis excellentiā amplius oblectamur, quā cum hæc nobis iuncta omnia tenemus: quemadmodū quamlibet partem, minimamq; corporis nostrarū puellæ deliciarū uidisse gratius ac iucundius est, quā cæterorū hominum membra tota perspexisse, & contrectasse. At hæc inferiora, quia & plura sunt, & cognosci plenius possunt, idcirco præstantiam sibi scientiæ uendicant. Quinetiā quod & nobis propiora, & naturæ familiariora sunt, hinc aliquid cum rerum diuinarū studio respondent, atq; compensant. Sed cum iam satis de illis egerimus, nostramq; explicarimus sententiā, restat ut de animante natura disseramus, nihil pro uiribus omitentes, uel uilius, uel nobilius. nam & in ijs, quæ hoc in genere minus grata nostro occurrunt sensui, natura parens & autor omniū miras excitat uoluptates hominibus, 30 qui intelligūt causas, atq; ingenue philosophantur. absurdum enim, nullaq; ratione probandum est, si imagines quidem rerum naturalium, non sine delectatione propterea inspectamus, quod ingenium unā contemplamur, quod illas condiderit, id est, artem pingendi, aut fingendi. Rerum autem ipsarum naturæ ingenio, miraq; solertia constitutarū contemplationē non magis persequamur atq; exosculemur, modo causas perspicere ualeamus. Quam ob rem uiliorum animalium disputatiōnem per pensionemq; fastidio puerili quodam spreuisse, molesteq; tulisse dignum nequaquā est, cum nulla res sit naturæ, in qua non mirandum aliquid inditū habeat. Et quod Heraclitū dixisse ferunt ad eos, qui cum alloqui eum uellent, quod forte in casa furnaria quadam caloris gratia sedentem uidissent, accedere temperarunt,

ingredi enim eos fidenter iussit, quoniam, inquit, ne huic quidem loco dii defuncti  
 immortales. Hoc idem in indaganda quoque natura animantium faciendum est. Ag-  
 gredi enim quæque sine ullo pudore debemus, cum in omnibus naturæ numen, &  
 honestū, pulchrumque insit ingenium. Quippe cum naturæ operibus iunctum illud  
 præcipue sit, ubi nihil temere, uicemque fortuita committatur, sed alicuius gratia omnia  
 agantur. finis autem, cuius gratia quicquid uel constat, uel conditum est, boni, hone-  
 sti, obinet rationem. At uero si quis cæterorum animalium contemplationē igno-  
 bilem, abiectamque putat, iam hic de se quoque idem arbitrari debet. Non enim fieri  
 potest, ut ea sine magna abominatione inspicimus, ex quibus corpus constat hu-  
 manum, ut sanguinem, carnem, ossa, uenas, reliqua generis eiusdem. Omnino ita cen-  
 sendum, ut qui de quauis corporis parte, aut de uase aliquo disputat, non de mate-  
 ria, aut eius materiæ gratia doceat, sed formæ totius ratione. sicut & cum de adibus  
 agitur, non de lateribus, non de luto, non de lignis, sed de forma ipsarum ædium do-  
 cemur. Pari ratione, qui de natura agit, de compositione, totaque substantia tractet,  
 non de ijs, quæ nunquam euenit ut à substantia separentur, sed primum ea distingui  
 singulis in generibus necesse est, quæ per se animalibus accidunt omnibus. post ue-  
 ro causas persequi eorum conandum est. Quod igitur ante diximus, multa in mul-  
 tis animalibus insunt communia, partim simplici ratione, ut pedes, pennæ, squamæ,  
 atque etiam affectus similiter: partim proportionē. proportionē inquam, quod alijs  
 pulmo datus est, alijs pulmo quidem negatus, sed uice pulmonis iunctum aliquid  
 est, quod pulmoni respondeat. alijs item sanguis inest, alijs sanguinis proportionale  
 est, quod eandem in genere ex angui obtinet uim, quæ sanguis in compote illo san-  
 guinis habet. Verum si seorsum de singulis disputetur, eueniet quod dictum iam est,  
 ut sæpe eadem iterentur, dum de omnibus quæ adiuncta sunt agitur, quippe cum  
 eadem compluribus iuncta habeantur. Hæc ita placeat præfiniri, & statui. Cum  
 autem instrumentum omne rei alicuius gratia sit, & partes corporis quasque gratia esse  
 alicuius uideamus, id autem ipsum esse alicuius gratia, non nisi pro aliqua actione  
 sit, patet iam totum etiam corpus constare alicuius gratia actionis plenioris. Non enim  
 sectionis gratia facta est, sed sectionis gratia, cum sectio quædam usus sit.  
 Quapropter corpus etiam totum animæ gratia conditum est, & membra officiorum  
 gratia constant, & munerum, ad quæ singula accommodantur, primum igitur actio-  
 nes, tum omnium communes, tum eas quæ suæ singulis generibus, speciebusque ha-  
 beantur, exponi oportebit. communes dico, quæ adiunctæ omnibus sunt animalibus.  
 suas autem propriasque appello, quarum differentias per excessum, siue superan-  
 tiam comparando accipimus. Verbi gratia: Auem pro genere pono, hominem pro  
 specie, & quodcumque ratione illa uniuersali, nullam differentiam recipit. nam alia pro-  
 portione, alia genere, alia specie rationem complent communis. Quorum itaque  
 actiones rerum aliarum gratia dispensatæ sunt, hæc etiam quorum sunt actiones, modo  
 eodem inter se differunt, quo actiones. Item si quæ priores sint actiones, & pro fine  
 aliarum capiantur, quo modo ipsæ se habent, eodem membra etiam habent, quorum  
 illæ sunt actiones. Addo tertium, quæ cum sint, aliquid inesse necesse est. affectus  
 & actiones intelligi uolo, ortum, incrementum, coitum uenerem, uigiliam, somnum,  
 incessum, & quæcumque huiusmodi alia possunt generi animalium tribui. membra  
 appello nasum, oculum, atque etiam totam faciem, quæ partes quoque uocamus.  
 pari modo de cæteris item intelligendum est. Sed de modo, utique tractandi  
 hæcenus, causas nunc explicare, tum communium, tum priorum  
 conemur, exorsum à primis, sicut statuimus.



# ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

PARTIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS,  
LIB. SECVNDVS, INTERP. THEODORO.

169

*Triplicem esse rerum omnium compositionem.*

*Caput I*



10 **A**x quibusnam, & quot numero membris singula animalia constarent, libris historiarum, qui de his scripti à nobis sunt, planius explicauimus. Nunc quas ob causas quæq; ad hunc modum ita se habent, consideremus, uidelicet ita, ut omnis ratio seiuncta ab ijs, quæ per historias exposuimus, tractetur. Cum itaque triplex sit compositio, prima statui potest ea, quæ ex primordijs conficitur ijs, quæ nonnulli elementa appellant, terram dico, aquam, ærem, ignem. sed melius fortasse dici potest ex uirtutibus confici elementorum, ijsq; non omnibus, sed ut antè expositum est, humiditas enim, & siccitas, & caliditas, & frigiditas, materia corporum sunt compositorum. Cæteræ autem differentiae eas sequuntur, ut grauitas, leuitas, densitas, raritas, asperitas, lenitas, & reliquæ id genus affectiones. Secunda constitutio ex primis illis natura similium partium in animalibus est, ut ossis, ut carnis, & reliquorum generis eiusdem. Tertia & ultima numero, partium dissimilium est, ut faciei, manus, & reliquorum eiusmodi membrorum. Sed cum contrà in generatione atque in essentia agatur, quæ enim posteriora sunt generatione, hæc natura priora sunt, & quod primum natura est, id ultimum est generatione. non enim ædes, laterum aut lapidum gratia sunt, sed hæc ædium gratia petuntur, quod idem de quauis alia materia intelligimus, nec inductione tantum id patet, uerum etiam ratione, omne enim quod gignitur ex aliquo, & ad aliquid suam generationem deducit, & à principio ad principium pergit, hoc est, ab eo quod primum mouet, & naturam iam aliquam obtinet ad formam aliquam, aut talem quempiam finem. homo enim hominem gignit, & stirps stirpem, ex materia, quæ subiecta singulis est. Cum igitur generatio & essentia ita se habeant, tempore materiam generationemq; esse priorem necesse est: ratione uero essentiam rei cuiusq; & formam. patet hoc definitione generationis: quippe cum ædificationis definitio contineat ædium definitionem, ædium definitio non contineat ædificationis definitionem, idemq; in cæteris euenit. Quam ob rem elementorum materiam esse similium partium gratia necesse est. Sunt enim hæc posteriores illis generatione, ijs autem ipsis dissimilares sunt posteriores, iam enim finem hæc tenent ac terminum, ternario constitutionem adeptæ numero, scilicet ut perfici generationem in multis natura fert. Constant igitur animalia ex utroq; membrorum hoc genere, uerum similia dissimilium gratia habentur, illorum enim officia sunt & actiones, ut oculi, ut narium, & faciei totius, item digiti, manus, & brachij totius, sed cum actiones, motionesque multiformes, tum animalibus totis, tum etiam membris eiusmodi tribuantur, diuersa uirtutibus esse ea, ex quibus constant necesse est, ad  
40 alia enim mollities, ad alia durities commodior est, & alia intendi, alia flecti debent, itaque partes similes obtinent sibi uires eiusmodi singulatim accommodatas, alia enim mollis, alia dura est, & alia humida, alia sicca, & alia lenta, alia rigida. At uero dissimilares plures, & compositas uires continent, uis enim alia ad premendum, alia ad mittendum commodam manui est. Quam ob rem partes organicae, quas officiales & instrumentarias licet appellare, ex ossibus, neruis, carne, cæterisque eiusmodi constant, non illa ex ijs. causa cuius gratia cur hæc ita se habent, hæc est, sed cum præterea quærat, quam ob causam hæc ita se habere necesse sit, ratio manifesta est, quod iam præfuit, ut ita se inuicem ex necessitate haberent, dissimilares enim constare ex similibus possunt, tum pluribus, tum etiam singulis, ut uiscera nonnulla. constant

enim ferè omnia multiformi figura, quæ ex corpore simili condita habentur. At fieri non potest, ut similes ex dissimilibus conficiantur. sic enim pars similis multæ essent dissimiles. his de causis membra animalium, alia situe simplici similitudine constât: alia composita, & dissimilia sunt. Cum autem partes aliarum instrumentarum, aliarum sensoriarum sint, instrumentarum omnes, ut dictum iam est, dissimiles sunt, sensus autem omnibus contingit per similes, scilicet propterea quod quivis sensus unius generis certi est, singulæque sensoriarum partes singulorum sensibilium generum capaces habentur, afficitur etiam quod potentia est, ab eo quod actu est, ita quod idem sunt genere, unumque illud, & hoc sunt. quam ob rem manum, aut faciem, aut aliam quamvis eiusmodi partem, nullus naturæ interpretis terram, aut aquam, aut ignem esse conatur exponere. partes vero sensorias singulas elementis singulis tribuunt, ut aliam aërem, aliam ignem esse confirmant. Sed cum sensus in partibus simplicibus positus sit, evenit ratione optima, ut tactus sedem similem quidem, sed minime simplicem fortiaur, quippe qui maxime vim recipiendi plura genera videatur habere, multasque præ se ferre contrarietates sui obiecti, verbi gratia, caliditatem, frigiditatem, siccitatem, humiditatem. alias etiam generis eiusdem. & quidem caro in quavis earum qualitarum sentiendarum posita est, aut quod carni proportionem respondet, copulentissimum omnium partium sensibus accommodatarum est. Quin etiam cum fieri non possit, ut animal sit carens sensu: eo quoque efficitur necessario, ut membra nonnulla similia in animalibus habeantur. vis enim sentiendi sita in his est. Actiones autem per dissimilia administrantur. Sed cum vis sentiendi, vis movendi, vis nutriendi, eodem in membro contineantur, quod alio loco explicatum à nobis est: sit necessario, ut membrum, quod primum principia eiusmodi teneat, id & simplex eo debeat esse, qua omnium capax sensibilem est. & dissimile eo, qua movetur & agens est. quamobrem in genere exanguis, hoc est, experte sanguinis animalium proportionale est. In sanguineo autem, id est composito sanguinis, cor tale habetur membrum. quippe cum cor, & in partes similes fecetur, quemadmodum quodvis ex alijs visceribus: & dissimile sit, propter suæ figuræ formam. Cætera etiam omnia viscera appellata, secuta hoc sunt, quippe quæ ex eadem materia consent. natura enim eorum omnium sanguinea est, quoniam posita sunt ad meatus venarum, atque intercapedines. igitur perinde quasi fex aquæ profluentis, cætera viscera veluti profusiones sanguinis per venas fluentis constituent. At vero cor, quia sanguinis initium est, & vim creandi sanguinis primam obtinet, idcirco ex tali materia constare, quale recipit alimentum, ratio est. Sed quam ob causam viscera forma sanguinea sint, & parum similia, partim dissimilia, dictum iam est.

Partium similiarum alias molles & humidæ, alias siccas & solidas esse: de quibus ordinis similiarum discrepantia: de quibus calidi & frigidi acceptionibus, eorumque excessu. Caput II



Artium autem similiarum aliarum molles & humidæ sunt: aliarum duræ & solidæ. humidæ vel omnino, vel quandiu in constitutione naturæ manent, sanguis, sanies, adeps, seuum, medulla, genitura, lac ubi haberi solet, caro, & quæ ijs proportionem respondent. non enim omnia animalia partes has obtinent. Sed sunt quæ ad proportionem nonnullarum ex ijs consent. Siccæ ac solidæ inter similes sunt, os, spina, nervus, vena. ordo enim similiarum discrepat. quippe qui nomen partim commune toti cum parte feruet, ut venæ pars vena recte appellatur: partim non feruet, ut in visceribus patet. figura enim diversa est. Primum igitur partibus his, tum humidis, tum siccis, multarum causarum modi tribuuntur. cum aliarum tanquam materiarum membrorum dissimiliarum sint.

ex ijs enim membra quæq; officialia siue instrumentaria constant, ossibus, neruis, carnibus, alijs generis eiusdem, quæ partim ad essentiam, partim ad actionem conducunt, aliæ nutrimento sint, ut humidæ siccis, etenim omnia ex humore sua capiunt alimenta, aliæ ut excrementa earum sint, accidit, ut sedimentum siccæ alimentæ, atq; etiam humidi in ijs, quibus uestica data est. Earum autem ipsarum partium discrimina, quibus inter se discrepent, notæ melioris gratia habentur: ut tum aliarum, tum sanguinis ad sanguinē, alius enim tenuior, alius crassior est: & alius syncerior, alius turbulentior. item alius frigidior, alius calidior, tam in eodem animali quàm in diuersis. quantum enim sanguinis parte corporis continetur superiori, his differentijs

10 discrepat cum inferiori. Omnino animalibus, alijs sanguinē dedit natura, alijs uice sanguinis partem eiusmodi aliam. est certe roboris efficacior sanguis, qui crassior & calidior est. Vim autem sentiēdi intelligendiq; obrinet plenior, qui tenuior atq; frigidior est, hoc idem discrimen in ijs quoque habetur, quæ sanguini proportionem respondent. quam ob rem apes, atque eiusmodi alia animalia ingeniosiora multis carentibus sanguine sunt, necnon inter ea quæ sanguinē habent, ingeniosiora suis contrarijs sunt, quæ sanguinem habent frigidiorē & tenuiorē. Sed optime constant quæ calidum, tenuem, & syncerum habent: quippe quæ unā & uiribus corporis, & animæ ingenio plurimum ualeāt. quapropter pars etiam superior corporis ea ipsa differētia dissidet cum inferiori, & femina cum mare, & dextra pars cum

20 sinistra eiusdem corporis. pari modo cæteris quoque tam eiusmodi partibus, quàm dissimilaribus statuere differentiam debemus, partim ad officia & essentiam cuius animalis, partim ad melius deterius uē. exempli gratia, inter ea quæ oculos habent, alia duris oculis sunt, alia humidis. & alia carent palpebris, alia habent, ut uisus sit exquisitior. Sanguinem uero haberi, aut quod eandem quàm sanguis naturam obtineat, quàm necesse sit, atque etiam quænam sanguinis sit natura, explicandum suis iam causis est, si prius calidi frigidiq; rationem distinxerimus. Natura enim rerum multarum ad ea ipsa principia refertur. compluresq; ambigunt, quænam animalia, membra uē, calida aut frigida sint. etenim nonnullis aquatilia terrarum compensetur. Sanguine etiam destituta, ijs quæ sanguinem obtinent esse calidiora, & feminas amplius quàm mares calere arbitrantur. Parmenides enim mulieres esse uiris calidiores autor est. quod idem quibusdam etiam alijs placuit, argumento copiar sanguinis, qua menstrua fiunt. Empedocles contra opinatur. Sanguinem etiam & bilem, alijs inter calida enumerat, alijs inter frigida. quod si calidum atq; frigidum tantam recipiunt ambiguitatem & controuersiā, quid de cæteris arbitrari debeamus? Hæc enim omnium quæ sensum patiuntur, apertissima sunt. sed quæstio hæc orta inde uidetur, quod calidū multifariam dicitur. quisq; enim quamuis contraria dicat, tamen aliquid dicere uidetur. Quam ob rem nosse oportet quæadmodum rerum naturalium constitutarum partim calidæ, partim frigidæ, & aliæ siccæ, aliæ

40 humidæ dici debeant. Nam uitæ quoq; & mortis causas hæc habere, atq; etiā somni & uigiliæ, iuuentutis & senectutis, & morbi & sanitatis: nō asperitatē aut lenitatem, non grauitatem aut leuitatem. nihil ferē tale apertū esse uidetur, & recte quidem. Sunt enim hæc, ut alio loco exposuimus, initia elementorum naturalium: calidum dico, frigidum, siccum, humidum. Vtrum igitur simplici ratione, an multiplici calidum dicatur? Sed quodnam officium rei calidioris sit, aut si plura sint, quot numero sint, declarandum est. Primo igitur modo calidius dicitur id, quod ampliorē inuenit sensum cum tangitur: nec sine dolore, quod quidem fallere interdum uidetur, nam fieri potest, ut corporis habitus causam dolendi afferat, cum sentitur. Ad hæc, calidius quod rei liquabilis liquantius, & rei cremabilis cremantius est. Item si alterū

plus, alterū minus sit, idem quod plus est, hoc altero quod minus, calidius est. Præ-  
 terea quod de duobus non citò, sed lente frigeat, id calidius est. & quod citius cale-  
 fit, eo quod lentius, natura esse calidiori centemus. perinde quasi alterum sit aduer-  
 sum, ut remotius; alterum simile, ut propinquius. Alterum igitur altero calidius  
 esse, et si nō pluribus, tamen tot modis dicitur. Qui modi omnes eidem inesse non  
 possunt. aqua enim feruens plenius calefacit quā flamma: sed flamma urit & li-  
 quat rem, uri aut liquari idoneū. quod aqua efficere nō potest. Item aqua feruens cali-  
 dior est, quā ignis exiguus, attamen citius magisq; refrigerat quā ignis, quam-  
 uis exiguus: quippe qui frigidus nunquam fiat, cum aqua omnis refrigerari possit.  
 Ad hæc, aqua feruens calidior sentitur, sed celerius reingescit & congelascit, quā  
 oleum. Sanguis præterea tactu calidior quā aqua, aut oleum est, sed celerius ge-  
 lascit. Lapis etiam, ferrū, & reliqua generis eiusdem lentius quidem calefiunt quā  
 aqua, sed ubi calefacta fuerint, urere uehementius possunt. Postremo ea, quæ cali-  
 da esse diximus, calidior aut externum continent, aut suum. plurimum autem re-  
 fert, hoc an illo modo calidum quicquam sit: alterum enim eorum propè est, ut ca-  
 lidum per accidens sit, non per se. perinde quasi, si febrienti musicum esse accidit, di-  
 xeris musicum esse calidior, quā eum qui calidus sanus est. Sed cum aliud per  
 se calidum, aliud per accidens sit, refrigerat quidem lentius quod per se calidum est,  
 sed sæpe fit, ut sensum uehementius calefaciat id quod per accidens calidum est.  
 item amplius urit quod per se calidum est, ut flamma, quā aqua feruens. sed ta-  
 ctu amplius calefacit aqua feruens, quæ per accidens calida est. Itaque iudicium  
 utrum nam ex duobus calidius sit, non esse simplex apertum est. quando fieri pos-  
 test, ut hac alterum, illa alterum ratione calidius sit. nonnulla ex his ne dici quidem  
 simpliciter calida, aut non calida possunt. subiecto enim quod tandem sint, non ca-  
 lida sunt, sed per affectionem calida sunt: uelut si ferro calido, aut aquæ nomen  
 impones. hoc enim modo sanguis calidus est. & quidē patet frigiditatem aliquam  
 esse naturam, nō priuationem in his, quorum subiectum calidum per affectionem  
 siue passionem est. natura etiam ignis tale quid fortasse est. subiectum enim for-  
 tan est, uel fumus, uel carbo: quorum alterum semper calidum est, quippe cum  
 fumus non nisi exhalatio sit. carbo autem extinctus frigidus est. Oleum & teda ef-  
 fici frigida possunt. A dusta etiam ferè omnia aliquid habēt caliditatis, ut calx, cinis,  
 sedimenta animalium, & inter excrementa fel, eo quod feruore nimio exaruerint,  
 relictumq; sibi contineant aliquid caliditatis. Teda, & quoduis pingue alio modo  
 calidum est, uidelicet quod celeriter in actum ignis mutari potest. calor autem uim  
 tum cogendi, tum liquandi habere uidetur. quæ igitur aquæ unius sunt, ea frigore  
 coguntur. quæ terræ, igne calida etiam indurantur. frigore celeratque irresolubili  
 concretu, quæ terram potius præ se ferunt. leuius autem, quæ aquam. Sed de his  
 planius alio loco definitum à nobis est, scilicet quænam concrefcere apta sint, &  
 quibus causis stringantur. Calidum uero calidius, cum multifariam dicatur, non  
 eodem modo rebus iungetur omnibus: sed addere debebis, aliud per se esse cali-  
 dum, aliud plerunque per accidens. item aliud potentia, aliud actu: & aliud hoc  
 modo, quod tactum amplius calefaciat: aliud, quod flammam excitet  
 atque igniat. Quod si calidum multiplici ratione dicatur, frigi-  
 dum quoq; pari ratione sequatur, necesse est. atq; de  
 calido, frigido, excessuq; eorum, ad hunc  
 modum definisse satis sit.

De sicco &amp; humido disputatio.

Caput III



Equitur ut de sicco, & humido, modo superiorum differamus, nam ea quoque multifariam dici solent, ut alia sicca, aut humida potentia sint, alia actu. Gelu enim, omnemque humorem concretum siccum dicimus actu, & per accidens, cum tamen potentia & per se humidus sit. contra terra, cinis, & reliqua generis eiusdem mixta humori, humida actu, & per accidens redduntur, quanquam per se, atque potentia sicca sunt. at ubi hæc separata fuerint, quod aqua refertum est, id & actu & potentia humidum est, quæ autem terræ propria sunt, hæc omnia sicca sunt. & quidem quod proprie ac simpliciter siccum est, hoc modo maxime intelligitur. altera etiam, humida dico, hæc eadem ratione, qua calida & frigida, proprij absolutique nomen recipiant. His ita præfinitis, apertum iam est sanguinem quodammodo calidum esse, uidelicet eo, quale est ei sanguini esse, perinde quasi aquam feruentem nomine uno significemus. At uero subiecto, & quod tandem cum sit, sanguis est, non calidus est, & quodammodo per se calidus, quodammodo non per se calidus est. Caliditas enim in eius ratione inest, quemadmodum albedo in albi hominis ratione. At eo, qua sanguis per affectionem siue passionem est, non per se calidus est. Pari modo de sicco & humido statuendum est, quapropter in eiusmodi rerum natura, partim calida & humida sunt: sed separata congelascunt, & frigida esse uidentur, qualis est sanguis, partim calida crassiora sunt, ut bilis: sed separata ab eorum, in quibus habetur natura, contra afficiuntur: quippe quæ refrigerentur, atque humescant, sanguis enim siccior redditur, bilis fluida humidior, magis autem, minus uel participari opposita, uelut rem insitam his statuere debemus, explicatum iam est, quonam modo sanguinis natura particeps sit caliditatis, humiditatis, aut contrariarum qualitarum. Sed cum omne quod augetur, capiat alimentum necesse sit: alimentum autem omnibus ex humido & sicco suppeditetur, quorum concoctio & mutatio, non nisi per caloris uim agitur, sit ut tam animalia omnia, quam stirpes, & si non alia de causa, tamen ob eam rem principium caloris naturale habeant necesse sit: idque ipsum partibus sit pluribus accommodatum, quemadmodum cibi conficiendi administrationes. Prima enim administratio perspicua est, cum per os, partesque ore contentas perficiatur animalibus, quorum cibi sectionem desideret, sed hæc nullius causa est concoctionis, sed facilitatem concoquendi potius præstat. cibi enim illa minutatim diuisio facit, ut calor facilius conficiendo expediat. At superior & inferior uenter iam cum calore naturali suo concoquendi officio funguntur. sed ut os animalis cibi inconfecti meatus est, atque etiam pars ei annexa, quam gulam appellant, cibum quibus data est animalibus usque ad uentriculum deducit: sic alia quoque adesse principia oportet, quorum opera membra omnia corporis ex uentre, naturaque intestinorum, quasi præsepi pabulum capiant. stirpes enim siue plantæ suis radicibus alimentum iam confectum ex terra hauriunt: quod circa ne excrementum quidem contrahi in stirpibus solet. terra enim caloreque eius, perinde ac uentre utuntur. At animalium genus omne ferè, sed aperte quæ incedunt, quasi terram intra se continent sinum uentris, ex quo ut ille radicibus, ita hæc aliquo intercedente cibum assumere debent, donec finem sequentis concoctionis faciant, cibum enim ab oris officio uentri mædatur. hinc membrum aliud capiat necesse est. & quidem ita natura constituit. Venæ enim per totas lacies ad uentrem tendunt usque, exoræ inferius, sed hæc ex animalium confectione, commutationeque naturali petenda sunt. Cum autem omnis alimenti, omnisque excrementi conceptaculum aliquod haberi necesse sit, uenæque quasi uasa sint sanguinis, patet sanguinem esse animalibus sanguineis ultimum alimentum: exanguibus uero id esse, quod uice sanguinis habeatur proportionale, quamobrem quoties cibum non inge-

ritur, sanguis deficit: quoties ingeritur, augetur. & si alimēta bona assumuntur, sanguis integer est, si praua, uitiosus. Igitur sanguinem alimenti gratia datum esse animalibus sanguine præditis apertum ex ijs, cæterisque eiusmodi rationibus est, nam ob eam rem sanguis ne tactus quidem sensum mouere potest, sicut nec cætera excrementorum genera, nec uero alimentum sensum mouet, ut caro, hæc enim sensum cum tangitur, mouet, non enim sanguis continuus carni, neque cognatus est, sed in corde ac uenis, quasi uasis continetur. Sed quonam modo membra ex sanguine sua capiant incrementa, atque etiam de alimenti omnino ratione differere, cum de generatione agemus, locisq; alijs, aptius est. nunc hætenus dictum sit, non enim plus hic locus desiderat, quam ut sanguinem esse alimenti gratia, & alimenti membrorum causa exploratum habeatur.

*De fibris, & quæ animalia ijs careant: deq; metus causa, & sanies natura.*

Caput IIII



Vas autem fibras uocant, nō omnis cōtinet sanguis, sed sunt qui non habeant, ut ceruarū sanguis, & damarum. quam ob rem id sanguinis genus nunquam spissatur. sanguis enim qui dilutior est, frigidior est: itaque durescere non potest. qui autē terrenus est, nimirum coit, cum humor euaporatur. fibræ autem illæ terræ sunt opificium. Quoniam etiam euenit, ut nonnulla ex ijs animalibus, quæ talem obtinēt sanguinem, sapientiora sint: uerum non sanguinis frigiditate, sed potius tenuitate atq; munditia, quorum neutrum in terreno est. habet enim sensum mobiliorem, quorum humor tenuior & sincerior est. hinc etiam nonnulla ex ijs quæ sanguine uacant animalibus, prudentiora nonnullis sanguinem habētibus sunt, ut dictum iam est, uerbi gratia, apes, formicæ, & si quid aliud tale est. timidiora, quibus sanguis dilutus nimis est, metus enim refrigerat. Itaq; ea quibus eiusmodi temperamentū in corde habetur, metuēdi affectioni sunt opportuniore: aqua enim frigore cōgelascit. quam ob rem cætera quæ exanguia, timidiora sanguineis sunt animalibus, quod simpliciter dixerim, ac mora cessant præ nimio metu, & excrementa emittunt. nonnulla etiam suos colores immutant. Quorum autem sanguis fibris admodum multis, crassisque repletus est, hæc terrena amplius constant natura: & animosa, iracunda, proindeq; furibunda sunt. Ira enim calorifica est. solida autem firmioraq; omnia concalescentia uehementius quam humida calefaciunt. fibræ uero solidæ terrenæq; sunt. itaq; quasi fomenta in sanguine efficiuntur, feruoremq; per iram accendunt. ex quo fit, ut tauri & apri animosi, iracundi, furibundiq; sint. sanguis enim eorum fibris repletior est. & quidem taurorum sanguis omnium celerrime coit & durescit. At si fibras detraxeris, sanguis nō cogetur, ut enim si ex luto terrenam portionem semoueris, aqua non concreset: ita sanguis fibris detractis in congelabilis manet. fibrarum enim natura terrena est. quod si nō eximantur, cogitur ut terra humida frigore. cum enim calor exprimitur, humor una trahitur, atq; euaporatur, ut dictum iam est. atque ita concrecit, non à calore siccescens, sed à frigore. At uero quandiu in corpore continetur, humidus est propter calorem animalibus inditum. profectio naturam sanguinis causam esse, cur permulta animalibus ueniant, tum per mores, tum etiam per sensum ratio est. materia enim totius corporis est. quippe cum alimentum materia sit, sanguis autē ultimum alimentum habeatur. facit igitur, ut plurimum differre existat, si calidus aut frigidus sit, si tenuis aut crassus, si turbulentus aut nitidus. Sanies pars diluta, siue aquosa sanguinis est, eo quod aut nondū concocta, aut corrupta est, itaq; id uel sanies necessario est, uel sanguinis gratia est.

De seuo,

De seuo, & adipe, eorumq; differentiâ, & quæ animalia seuum, quæ item adipem habeant.

Caput V



Euum & adeps inter se differunt, sanguinis ratione. est enim eorum utrunque sanguis cōcoctus per bonitatem enutriendi, consistitq; ex eo, quod in pulpam quidem animalis non absumatur, sed concoctionis alimētūq; bonitate præditum est, indicat id pinguedo eorum, cum pingue inter humida, cōmune ignis & aëris sit. quamobrem nullum ex ijs quæ sanguine carent, uel adipem habet, uel seuum: quandoquidem sanguis deest. Quorum autem sanguis corpulentior est, hæc seuum potius habent. seuum enim terrenum est, unde fit, ut modo fibrosi sanguinis cogatur, tam ipsum, quam eiusmodi ius, cum parum aquæ, multum terræ contineat. Quam ob rem quæ non utrinque dentata, sed cornigera sunt, hæc seuū habent, naturam eorū refertam esse huiusmodi elemento patet, eo quod cornua gerunt, talosq; obtinent, quæ quidem omnia natura sunt arida & terrena. At uero genus utrinq; dentatum, & cornuum expers, & multifidum, uice seui adipem habet, quæ nō cogitur, nec siccitate aliqua frangitur, quoniam eius natura minus terrena est. hæc si mediocriter in animalium membris habentur, profunt, nec enim sensum impediunt, & ad sanitatem uiresq; opitulantur: sed si modum excedunt, nocent atque interimunt. nam si corpus totum trāsierit in adipem, aut seuum, peribit, animal enim ea parte est, in qua sensus habetur. Caro autem, & quod carni proportionetur uim obtinet sentiendi. sanguis, ut dictum iam est, & sensu caret, & ob eam rem, nec adeps, nec seuum sentit: sunt enim sanguis concoctus, quod si totum corpus tale efficiatur, nullum præterea sensum habere poterit, hinc & celeriter ea senescunt, quæ ualde pinguerint: quippe quæ parum sanguinis habeant, utpote cum copia sit absumpta ad pinguedinem. Quæ autem parum sanguinis habent, hæc iam inde ad interitū sunt opportuniore. Interitus enim inopia quædam sanguinis est, quodq; partū est, afficitur a frigore quolibet, tum a calore facile potest. Quinetiā obesa omnia steriliore ea de causa sunt, quantum enim ex sanguine proficisci ad geniturā, & semen genitale debeat, hoc in adipem aut seuū sumptatur, sanguis enim cura cōcoquitur ad hæc transit, itaque aut nullū omnino excrementum in ijs ipsis consistit, aut parum. Atq; de sanguine, sanie, adipe, seuo, quid sint, & ob quas causas habeantur, dictū iam est.

Quid medulla, quibusq; animalibus data sit.

Caput VI



Ed medulla etiam natura quædam sanguinis est, non ut quidam uolunt, uis genituræ seminalis, patet hoc in ijs, quæ nuper in lucē prodierint, medulla enim in ossibus quoque eorum sanguinea conuenitur, utpote cum omnes corporis partes ex sanguine consistant, & partui alimentum præstetur a sanguine, sed per incrementum concoctionemq; efficitur, ut quemadmodū cætera membra, sic uiscera quoq; immutentur colore, per copiam enim sanguinis uiscera etiā cum recentia adhuc sunt, colorem sibi sanguineum trahunt, sic etiam medulla afficitur, & pinguis in pinguibus animalibus est, atq; axungia similis. At quibus sanguis nō pinguedini, sed seuo similis per concoctionē euadit, ijs medulla seuo similis est, quamobrem ut cornigeris animalibus, nec utrinq; dentatis, medulla speciem gerit seui: sic utrinq; dentatis atq; multifidis pinguedinem refert, uerū spinæ dorsi medulla minime talis est, quoniam continuam hanc esse oportet, porrectamq; per longitudinem spinæ totius, quæ ex multis uertebratis orbiculatim ossibus iungitur, nam si ex pinguedine aut seuo esset, nō æque perpetua esse posset, sed uel fragilis, uel humida esset. Sūt ex animalibus, quæ nullam commentatione dignam medullam habeant, uidelicet ea, quibus

ossa robusta, & solida sunt, ut leoni, eius enim ossa, quod exigua admodum, & perobscuram medullam continent, carere omnino medulla videntur. Sed cum ossium naturam inesse in animalibus necesse sit, aut quod ossibus proportionetur, ut in aquatilibus spinam, sit necessarium, ut nonnulla habeant etiam quod pro alimentum contineatur, ex quo ossa consistant. alimentum autem omnibus esse sanguinem dictum iam est, seu osas etiam & pingues esse medullas ratio est, tepor enim, quem ossium complexio facit, sanguinem concoquit, sanguinis autem per se concoctio, seu um & adeps est, quoniam etiam in ijs quæ ossa ipsa firmaque habent, non temere partim nulla, partim exigua inest medulla. alimentum enim in ossa absumitur. Quæ autem non ossa habent sed spinam, ijs dorsi tantum medulla est. parum enim continent sanguinis suapte natura, & dorsi spina tantummodo caua habetur, quam ob rem in ea medullæ aliquid creari potest. una enim ipsa capax est, solaque eger copula propter interceptiones, quam ob rem medulla etiam eius partis differt, ut dictum est, quod enim uice fibulæ fungitur, idcirco lenta nervosaque est, ut intendi possit. Causa quam ob rem medullam habent animalia, quibus data est, declaratum iam est. Quid etiam medulla sit, patet, scilicet alimenti sanguinei, quod in ossa, spinam uel distribuatur, contentumque concoctum excrementum.

συνθεσις  
copula.

De cerebro & eius natura: deque capitis fluxionibus, & somni causa.

Caput VII



Roximum ferè est, ut de cerebro doceamus, nam cerebrum quoque medullam esse atque originem medullæ, compluribus placuit autoribus: argumento, quod dorsi medullam iunctam cum cerebro cernerent. Sed res contrà se habet, omnino propè dixerim, cerebrum enim partium omnium corporis frigidissimum est, cum medulla calida suapte natura sit, quod eius pinguedine & axungia perspicuum est, idque facit ut cerebro iungi, continuarique possit ipsa dorsi medulla. solet enim natura semper emoliri contra cuiusvis exuperantiam auxilium per coniunctionem rei aduersæ, ut excessum alterius altero compenset & moderetur. Sed enim medullam calidam esse pluribus sanè rationibus constat, cerebri autem frigiditas, & tactu percipi potest, & ratione intelligitur, quod omnium maxime humorum corporis sanguine caret, quippe quod nihil sanguinis habeat, squaloreque obsitum sit, atque horridum, nec uero excrementum est, nec inter partes continuas enumerandum, sed sui generis est, & quidem ratione optima naturam eiusmodi sortitum est, nullam uero cum partibus, quæ uim obtinent sentiendi continuitatem habere, cum intuitu pateat, tum uel maxime inde constat, quod cum tangitur, nullum efficit sensum, quemadmodum nec sanguis, neque excrementum animalium ullum, datum autem hoc animalibus est ad naturæ totius salutem. Quod enim nonnulli statuunt importune animam esse ignem, aut aliquam eiusmodi uim, melius fortasse dixeris animam in quodam eiusmodi corpore consistere, cuius rei causa est, quod ad exequenda animæ officia, calor omnium maxime administrandi uim obtinet. Cum enim officium animæ sit alere & mouere, hæc ea ipsa facultate potissimum efficiuntur. Igitur animam esse ignem arbitrari simile est, atque si ferram, aut asciam, fabrum aut artem fabrilem esse ideo arbitreris, quia opus non nisi iunctis his efficiatur. Sed quàm genus omne animalium caloris particeps esse necesse sit, apertum hinc est. Cum autem omnia momentum requirant contrarium, quo mediocritatem ac medium assequantur: in hoc enim essentia ratioque consistit, non in alterutro extremo seorsum posito: idcirco aduersus cordis sedem & calorem, cerebrum natura molita est. Et ea de causa pars ista animalibus iuncta est, naturam obtinens aquæ & terræ communem, atque ob eam rem cerebrum omnia sanguine prædita habent, ex cæteris nullum ferè,

nisi



nisi per proportionem, ut polypus. parum enim caloris obtinet omne id genus, propter sanguinis priuationem. Cerebrum igitur calorem feruoremque cordis moderatur, & temperiem affert. Sed ut ea quoque pars modico potiatur calore, uenae ad membranam cerebri deueniunt ex utraque uena, maiorem dico, & eam quae aorta uocatur, & ne calor nimius offendat, non paucae amplae, sed frequentes ac tenues uenae ambiunt, nec sanguis copiosus & crassus, sed tenuis, syncerusque subit eodem. Fluxiones etiam ob eam rem ex capite oriuntur in ijs corporibus, quibus cerebrum frigidius est, quam temperamentum modicum postulet. cum enim alimen-  
 20 tum per uenas sursum respirat, ubi excrementum ob eius loci uim refrigeratum est, fluxiones pituitae sanieque mouet. quod simile generationi imbrum euenire intelligendum est, quoad magnum conferre cum paruo licet. Cum enim ex terra uapor exhalat, efferturque in sublimem a calore, ubi supernum aerem subierit frigidum, consistit: denuo in aquam propter refrigerationem, atque in terram defluit. Sed de his, cum de morborum causis agitur, differere congruum est: uidelicet quoad tractare de his naturalibus scientiae interest. Somnus etiam a cerebro proficiscitur ijs, quae eam obtinent partem animalibus, quae autem carent ijs, proportionale suppetit. cum enim sanguinis alentis effluencia refrigeretur a cerebro, aut etiam ob alias causas similes, caput aggrauatur. & quidem somno sopiti, ea corporis parte solent tentari: atque efficitur, ut calor ad ima cum sanguine subterfugiat,  
 30 collectaque copia caloris in loco inferiori somni facit, & facultatem erigendi corporis aufert ab ijs animalibus, quae erecta incedere natura uoluit. ceteris caput erigi prohibet, quibus de rebus seorsum docuimus, cum de sensu & somno ageremus. Cerebrum autem esse commune aquae & terrae constat, ex eo quod ei accidit. Cum enim coquitur, indurescit atque siccescit, ut humore exacto a calore, terrena portio relinquatur: quemadmodum in leguminum reliquorumque fructuum decoctione. quod enim ex terra magna ex parte constant, hinc exactio humore, quem exiguum sibi admistum continent, dura terrenaque admodum ea quoque relinquuntur. Homo inter omnia animalia plurimum cerebri habet, scilicet proportionem sui corporis. & inter homines, mares plus quam foeminae. cordis enim pulmonisque locum  
 50 cum calidissimum & sanguine refertissimum homo habet, unde animalium homo unus erectus est. caloris enim natura inualefcens, incrementum de medio agit pro suo impetu. Itaque contra multum caliditatis, multum humiditatis, frigiditatisque opponitur. quae quidem copia fit, ut capitis os, quod caluariam nonnulli appellant, sero admodum induretur, cum diu calor euaporetur. quod nulli ex ceteris animalibus sanguine praeditis euenit. iuncturas etiam plurimas in capite homo habet, & mas plures quam foemina, eadem de causa, ut locus spiratior sit, & amplius, in quo plus cerebri habetur. nam si cerebrum uel humet, uel siccet supra modum, suo iungi officio non potest: sed aut non refrigerabit, aut coagulabit. itaque morbos, deliria, mortes afferet. calor enim cordis atque principium consentientissimum est, sensumque  
 40 sumque celerrime facit, cum sanguis cerebri ullo pacto mutatur atque afficitur, sed de cognatis animalium humoribus omnibus dictum fere est. Postgeniti excrementa sunt cibi, id est, uesicae sedimen, atque alui. praeterea genitura, & lac, scilicet in ijs quorum natura haec obtinet. uerum cibi excrementa quibusnam animalibus iuncta sint, & quas ob causas, aptius in consideranda differenda quae alimenti ratione explicetur. de femine autem genitali, & lacte, tractandum est, cum de generatione. alterum enim eorum principium generationis est, alterum generationis gratia habetur.

Postgeniti, scilicet  
 cet humores.



Vnde de cæteris similaribus partibus docendum est, & primum de carne, in ijs quæ obtinent carnem, in cæteris autem de eo, quod uice carnis proportionem respondeat, hoc enim principium & corpus per se animalium est, quod ratione etiam patet, animal enim eo definimus quod sentium obtinet, primumque eum, qui primus est. Tactum autem primum esse certum est, tactus uero sensorium pars eiusmodi est aut prima, ut pupilla uisus: aut coniuncta, per quam agitur, perinde quasi pupillæ omne diaphanes, hoc est translucidum coniungas. Cæteris igitur sensibus nec tribui hoc poterat, neque operæ precium erat effici à natura. At uero tactui dari necesse fuit, sola enim, aut maxime omnium 10 sensoriorum sedes tangendi corpulenta est. Sensui autem patet cætera omnia eius unius gratia haberi: ossa dico, neruos, cutem, uenas, pilos etiam, & unguium genus, & quicquid eiusmodi iunctum est. natura enim ossium adhibita est, ut sua duritie rem mollem seruaret in ijs, quæ ossa habent, eademque de causa proportionale ossium habetur in ijs, quæ ossibus carent: ut in genere piscium alijs spina, alijs cartilago iuncta est, habent hoc præsidium alia intus, alia foris: ut in genere sanguinis experte, crustata omnia extra sic munita seruantur, uelut cancri, genusque omne locustarum, atque etiam testatorum, ut quæ ostrea appellatur: his enim omnibus caro intus, terrenum autem illud, quod contineat & cõseruet, foris est, nam præter ipsum continendi officium, quoniam eorum natura parum caloris obtinet, cum sanguine careant, idcirco testa ueluti furnulus quidam amplectens conseruat intestinum calorem, & tuetur. Quinetiam testudo & lutaria genus simili modo se habere uidetur, quamquam diuersum genus ab illis hoc est. At uero animalia insecta & mollia contra quam hæc, & modo inter se opposito constant, nihil enim ossis, nihil terreni habere discretum uidetur, quod dignum effatu sit: sed mollia ferè tota, carnosæ, & tactui cedentia sunt, ne tamen corpus eorum facile pereat, modo illorum quæ carne laesciunt, naturam inter carnem & neruum obtinent, mollis enim, ut caro est: sed intendi potest ut neruus, fissilis autem caro eorum non in directum, sed in anfractum, ita enim ad uires commodior esse potest. habent etiam quod piscium spinis proportionetur: ut sepia quod sepium uocant, loligines quod gladiolum, polypi ni 30 hil eiusmodi habent, quod eorum alueus, quem caput appellant, breuior est, illorum procerior, ideoque ut directus inflexusque maneret, natura his adminiculis faciendum censuit, quemadmodum in genere sanguineo, alijs os dedit, alijs spinam, insecta contra quam hæc, & sanguine prædita constant, ut modo diximus, quippe quæ nihil habeant duri aut mollis discretum: sed dura toto corpore sunt duritie tali, ut osse carnosiora, carne ossifiora terracioraque consent, ne facile corpus eorum diuidi possit.



Imilis natura est ossibus, & uenis, utraque enim ex uno orsa continua 40 est, & neque os ullum seorsum per se habetur, sed aut pars continui est, aut tangit, atque annectitur, ut natura & tanquam uno, cõtinuoque, & tanquam duobus distinctisque ad flexum utatur, neque uena ulla seorsum per se est, sed omnes pars sunt unius, nam si quod os separatū esset, accideret, ut nec officio fungi posset, cuius gratia natura ossium habetur, quippe quod nec flectendi, neque dirigendi causam ullā præberet, cum non continuum esset, sed interceptum: & lādere proculdubio posset, perinde quasi uel spina, uel spiculum carni infixum, uena etiam si qua separata, nec suæ origini continua tenderet, suum sanguinem seruare non posset. Calor enim profluens ab origine facit,

cit, ne sanguis gelet. putrescere etiam sanguis uidetur, qui à suo fonte remotus est. Principium uenarū cor est. ossium, quod spina dorsi uocatur, uidelicet in omnibus ijs, quæ ossa habent, hinc enim cætera ossa oriūtur, & continuantur. spina est enim, quod longitudinem ac rectitudinem contineat animalium. Sed cum corpus in se  
 10 cū per animalis motum necesse sit, ita constat, ut & una sit propter continuitatem, & multipartita propter uertebraarum distinctionem, hinc femorum brachiorumq; ossa dependent continua, eodemq; arcū adnectuntur, quæ flectendum est, neruis deligantur, extremaq; sibi cohærent. alterum cauum, alterum rotundum. aut utrunque cauum, mediō talo, quasi clauo complexo, ut flecti extendiq; possint.  
 aliter enim aut nullo pacto, aut non bene motus eiusmodi agi posset. nonnulla ex  
 tremis similibus coniungūtur neruis deligata. Cartilaginosa etiam partes inierunt flexuris, ueluti lectisternium, ne attritu mutuo lædatur. caro circa ossa consistit uinculis modo fibrarum tenuibus adhærens, cuius causa ossium genus habetur, ut enim qui ex limo aut alia massa humida animal effingunt, firmo aliquo subdito corpore obducunt, atque afformant: sic natura ex carnibus animal condidit. cæteris igitur partibus, scilicet carnosis, ossa omnibus subiacent, aut flectendi gratia, si mouentur: aut conseruandi causa, si immobilia sunt: ut costæ, quæ pectus salutis uiscerum gratia claudunt. Venter omnium ossibus uacat, ne tumori impedimento sint, qui per cibum ingestum exurgat necesse est, atque etiam ne in foeminis incremento partium obstant. Sed enim quæ animal uel intra se, uel foris pariunt, hæc similes robustasq; ossium obtinent uires. multo enim maiora hæc sunt ijs, quæ non pariunt animal: uidelicet proportionē solitæ magnitudinis, nam nonnusquam complura ex hoc animalium genere crescunt mirū in modum, ut in Africa, locisq; alijs calidis & ficcis. magnis autē adminiculo opus est maiori, ualidiori, & firmiori. atq; inter magna ijs potissimum tali opus est adiumento, quæ uiolentiora sunt. quam ob rem mares ossibus durioribus constant, quàm foeminæ. & quæ carniuora sunt, quàm quæ alio cibo uescuntur. ijs enim uictus per dimicationem acquiritur. uelut leonis quæ adeo dura sunt, ut ex ijs percussis, ignis quasi ex silice excutiat. delphinus etiam non spinas, sed ossa habet. uiuiparum enim est. Sanguineis autem non  
 30 uiuiparis natura aliquantum degenerat, ut uolucris. quamuis enim habeat ossa, tamen imbecilliora. Inter pisces, spinā, qui oua pariunt, habent. Serpentibus etiam natura ossium spinacea est, præterquam magnis, robur enim eorum ualidiora exigit firmamenta, eadem qua & uiuiparis ratione. At cartilaginea nomine spinam ex cartilagine habent. motum enim eorū esse molliorem necesse est, itaq; fulcimēti genus non rigidum, sed mollius esse oportuit. Adde quod terrenam omnem materiam ad eorum cutem conficiendam natura absumpserit, pluribus autem locis simul tantundem exuperantiæ dispensare natura non potest. quoniam etiam in uiuiparo genere ossa cartilaginosa complura habentur, scilicet in ijs quibus expedit molle mucosumq; esse, quod solidū habeatur ratione carnis obductæ: ut auribus,  
 40 ac naribus euenisse apertum est. prominentiora enim si rigida sunt, frangi celeriter possunt. Natura uero eadem ossis, & cartilaginis est. quanquam pluris minorisq; ratione interest, quapropter neutrum præciliū recrescere potest. Vacant medulla cartilaginea terrestrium animalium discreta, quod enim in os discretum continentur. Quæ enim  
 tota ex ijs constant, & nominis consortium habet cum suis. Quæ enim tota ex ijs constant, nominis consortium tantūmodo habent cum suis partibus, uerbigratia, ungula tota, & cornu

Aliqui sic rededunt: Quæ enim tota ex ijs constant, & nominis consortium habet cum suis. Quæ enim tota ex ijs constant, nominis consortium tantūmodo habent cum suis partibus, uerbigratia, ungula tota, & cornu

totum, ad salutem animalis excogitatum est. Dentes etiam in hoc eodem genere collocandi sunt, qui alijs rem unam tantum expediunt, id est cibi confectionem, alijs non solum ad hoc usui sunt, sed etiam ad pugnandum, ut ijs omnibus, quibus aut ~~sub~~ aut exerti sunt dentes. Terrenam & ualidam esse naturam eorum, quæ modo enumeravi, necesse est. uis enim armorum ea est, quam ob rem omnia eiusmodi adminicula quadrupedibus uiuiparis potius adiuncta sunt, quod terraciora, quam genus humanum, ea omnia constât. Sed de ijs atque similibus, cutem dico, uescicam, membranam, pilos, pennas, & quæ ijs proportionentur, & si qua huiusmodi alia sunt, postea unâ cum dissimilaribus partibus considerandum est, scilicet quænam eorum causa sit, & cuius gratia data sint animalibus, ex officijs enim ea quoque pariter atque illa dignosci necesse est, sed quod partes eorum idem cum totis nomen fortuitur, propterea inter similes in hoc loco enumerata sunt, principium autem & origo eorum omnium os est, & caro, rationem etiam genituræ & lactis prætermisimus, cum de humidis ac similibus ageremus. Sunt enim hæc loco de generatione coniunctiora, cum alterum eorum initium sit animalium generandorum, alterum alimentum, ubi in lucem prodierint.

*De duabus partibus in quibusq; animalibus necessarijs, quæ uiuunt, quæ cibum capiunt, & quæ excrementa emittant, deq; sensu ui, & eorum loco in corpore. Caput X*



Vnc quasi à primis iterum orsi differamus. In omnibus uita præditis & perfectis, partes maxime necessariae duæ sunt: altera qua cibum capiant, altera qua excrementum emittant, non enim fieri potest, ut sine cibo uel seruentur, uel augeantur. Stirpium itaque genus (nam id quoque uiuere scemur) locum superuacui excrementi nullum habet, cibum enim concitum ex terra haurit: sed uice excrementi semina & fructus effundit, tertia pars in omnibus est media inter eas, quas modo dixi, in qua uitæ principium continetur. Sed stirpium natura, quoniam stabilis est, non ex multis ac uarijs partibus dissimilaribus constat: quippe cum ad paucas actiones paucorum instrumentorum usus requiratur, quam ob rem de stirpium, siue plantarum forma seorsum agendum est. Quæ autem unâ cum uita sensu etiam prædita sunt, hæc speciem multiformiorem numerosioremq; uarietatem recipiunt, atque inter ea alijs alia magis, & eo amplius, quod non solum uiuendi, sed etiam bene uiuendi rationem natura eorum obtinuit, quale hominum genus est: quippe quod aut unum ex omnibus animalibus nobis cognitæ diuinitatis particeps sit, aut omnium maxime, itaq; tum ob eam rem, tum etiam quod exteriorum partium eius forma notissima est, primum de homine differendum censemus, iam enim partes etiam naturales hominis unius secundum naturam dispositæ sunt: quandoquidem partem superiorem ad uniuersi supremum erectam obtinet. Solus enim animalium homo erectus incedit. Caput hominis macilentum, carneq; propè omni exutum esse necessarium, ex ijs quæ de cerebro diximus, euenit, nec audiendi sunt, qui si carnosum esset, uiuacius hominum genus futurum censeant, sed ut melius sentiret, carnem ademptam existiment, uim enim sentiendi sitam in cerebro: sensum autem per partes nimium carnosas nequaquam admitti posse arbitrantur, neutra enim eorum ratio uera est, Sed si cerebrum à carnis copia circumdaretur, contrâ efficeret, quam institutum exigeret, cuius gratia adiunctum est animalibus, non enim refrigerare posset, cum ualde ipsum teperet. Nec sensus ullius causam cerebrum obtinet, quod quidem expers omnino sensus non aliter, quam quoduis excrementum est. Verum cum intelligere causam, quam ob rem sensus nonnulli in capite habentur, nequeant, quod eam partem cæteris esse peculiariorē animaduertent, ideo sensum cum cerebro coniungendum ratiocinantur.

Sed

Sed enim principium sensuum esse cordis locum definitum iam est, cum de sensu ageremus. & quam ob causam duo, id est tangendi & gustandi sensus, ex corde aperte dependent. unus ex reliquis tribus, id est olfaciendi medium tenet. duo, id est audiendi & uidendi maxime in capite positi sunt, propter sensoriorum naturam: uisusq; omnibus in capite est. nam auditus, olfactusq; piscium, & reliquorum generis eiusdem, declarant quod dicimus. audiunt enim atque olfaciunt, cum nullum sensorium eorum sensuum in capite habeant manifestum. Visum autem omnibus quibus est datus, apud cerebrum esse optima ratio est. cerebrum enim humidum ac frigidum est. uisus aquæ naturam obtinet. hæc enim omnium perlucidorum facillime conseruari potest. Sensus etiam exquisitiores per partes quæ sanguinem habeant synceriorē absolui necesse est. Sanguinis enim calidioris agitatio officium sentiendi intercipit, atque refringit. his de causis sedes eorum sensuum mandata sunt capiti. nec uero pars prior tantum capitis carne uacat, sed etiam posterior, quod omnibus capite præditis, partem hanc erectam maxime consistere oportet. nihil enim erigi potest pressum onere. Id autem accideret animali, si caput carne obiectum haberet. quo etiam patet non ideo carnem deesse capiti, ut cerebrum sentiat. pars enim posterior capitis cerebro caret, & tamen carnis expers nihilominus est. Auditum etiam nonnulla animalia situm in capite habent debita ratione. quod enim inane uocatur, plenum aëris est. sensorium autem audiendi aëris esse fatemur. ut igitur ab oculis meatus ad uenas circa cerebrum sparsas tendunt, sic ab auribus meatus in occiput penetrat. uis autem sentiendi nec ulli exanguis data est parti, neque sanguinis propria est, sed cuidam ex his, quæ sanguine proueniunt, delegata est. quocirca pars nulla exanguis eorum quæ sanguinem habent, sentire potest. nec ipsæ sanguis sensu præditus est. quippe qui nulla pars sit animalium. Cerebrum uero parte priori capitis continent omnia, quibus hoc datum est. quoniam id, quo sentiunt, in parte priori corporis situm est. sensus enim prouenit à corde, quod parte priori commissum est. Sentire etiam partes tantummodo possunt, quæ sanguinem obtinent. occiput autem uenis uacuum est. sedes autem sensoria probe ad hunc modum à natura dispositæ sunt. Aures orbem capitis æquis portionibus secant, tenentq; medium. auditur enim non modo per directum, uerum etiam undique. Visus parti priori mandatus est. cernitur enim per directum. Motus etiam antè fit. prospiciendum autem est eodem, quò motus agitur. Nares inter oculos ratione optima collocatæ sunt. Gemina enim sedes quæq; sensoria est propter duplicem corporis partem, scilicet dextram & sinistram. sed hoc in tactu incertum est, propterea quod primum sensorium non caro, non pars eiusmodi aliqua est, sed aliquid intimum. Lingua etsi obscurius, quàm oculi, tamen certius, quàm tactus geminum gustandi uestigium ostendit. est enim hic etiam sensus quasi tactus quidam: attamen res uel in eo satis constat. fissura enim linguam distinguere perspicuum est. At uero in cæteris sentiendi partibus sensum bipartitum esse latius patet. aures enim geminæ, & oculi gemini sunt. Vis etiam narium bipartita est, quæ si aliter sita distractaq; esset, ut aures, suo fungi officio non posset, nec pars in qua posita est ex instituto administraret. efficitur enim sensus olfaciendi per spirationem, in ijs quæ obtinent nares. pars autem spirandi medium tenet, & antè posita est. quapropter nares in medio trium sensuum natura constituit, quasi per lineam fabrilem directas, ad respirationis agitationem. cæteris etiam animalibus, hæc eadem sensuum domicilia bene pro sua cuiusque natura condita habentur.

De situ auricularum in quadrupedibus.

Caput XI



Quadrupedes enim auriculas habent suspensas, & supra oculos sitas habere videntur. ueruntamen nō ita est, sed conspectum ementiuntur. quoniam bestię non erectio, sed prono sunt corpore. Cum igitur plurimę ita incedāt, iuuat, ut & suspensiores sint auriculę, & crebro moueantur, sic enim melius undiq; strepitus circumactę excipient.

De meatibus auditorijs auium.

Caput XII



Aves meatus tantum auditorios habent. quod enim cutis earum durior sit, nec pilis sed pennis integantur, ideo materia carent ex qua auriculę creentur, quadrupedes etiā ouiparę & corticatę eodem modo se habent, eadem enim ratio uel illis conueniet. quinetiam uitululus marinus inter ea quę animal pariunt, nō auriculas sed cauernas tantum habet ad audiendum, utpote qui manca & læsa sit quadrupes.

Genus hominum, auium, & quadrupedum cōte flos palpebra oculos habere, quo uero modo ipsorum quodq; conuiueat.

Caput XIII



Genus hominum, auium, quadrupedum, tam uiuiparum quā ouiparum oculos uisus custodiendi gratia integunt: sed uarie. quę enim animal pariunt, geminam habent palpebram, & conuiuere utraq; solent. aues tam leuiiores quā grauiiores, & quadrupedes ouiparę palpebra inferiori conuiuent. niſtantur aues ab angulis membrana obeunte. cuius rei causa est, ut operimētum præsidio sit oculis eorum humidis, qui ideo humidi sunt, ut cernere acutius possint. nam si duri essent, tutius quidem constarent contra ea, quę extrinsecus occurrerent, atque inciderent, sed cernere acute non possent. itaque eius rei causa cutis prætennis pupillę obtenditur. At uero salutaris gratia palpebrę operiūt. Ideoq; omnia conuiuent, & omnium maxime homo. omnia inquam, ut quę incidunt, prohibere palpebris possint, idq; nō consulto, sed naturę instinctu agitur. homo uero frequentius, quoniam cutem tenuissimam habet. palpebra autem cute constat. unde fit, ne aut palpebra, aut præputium uulnerē re ductum coalescere possit. sunt enim cutes sine carne. Quę autem inter aues palpebra inferiori conuiuent, & quadrupedes ouiparę præ duritia cutis caput ambientis, ita conuiuent. uolucris enim grauioribus quod nequeant uolare, incrementum pennarum ad cutis crassamentum conuertitur: eademq; palpebra inferiori conuiuent. Columbę autem & similia utraq;. Quadrupedes ouiparę cortice integuntur, qui pilo durior est. itaque cutis quoque eorum ceteris curibus durior est. Cutis igitur capitis eorum prædura est, ideoq; palpebram inde habere nequeunt. inferior carnosā est, ut satis tenuitatis tensionisq; habeat. Niſtantur uolucres grauiiores nō palpebra, sed membrana. quod palpebrę motus lentior est, cum celeritate sit opus, quam mēbrana præstare potest. nec nisi ab angulo naribus proximo niſtatur, quod eorum naturam ex uno principio prouenire melius sit. Principium autem in ijs est pars naribus adherens. pars etiā prior principium potius quā latus est. at uero quadrupedes quę oua pariunt, non eodem niſtantur modo: quoniam non lubricum exquisitumq; uisum eas habere necesse est, cum terrestres sint. uolucris certe necessarium est. ijs enim usus cernēdi ex longinquo est. unde fit ut quę unguibus sunt aduncis, clarissime cernant. cibis enim de sublimi conspiciendus ijs est. & quidem uolare in excelsum omnium maxime auium genus id ob eam rem affolet. Terreſtres autem parumq; uolatiles aues, ut gallinacei

&amp; si

& similes, non acie oculorum ualent. nulla enim uictus necessitate coguntur. Pisces, insecta, & crustata, quamuis diuersos habeant oculos, tamen nullum ex ijs palpebram habet. quæ enim crusta integuntur, usu careant palpebræ necesse est, cum nisi celeri cutis officio præstari non possit, sed tamen uice eius tutelæ, duritiæ oculorum hæc omnia muniuntur, quasi per palpebram obductam quandam translucentam cernant, sed cum ob eam duritiam hebetius contueri necesse sit, moueri oculos insectorum natura uoluit, atque etiam magis crustatorum, ut nonnullorum quadrupedum auriculas, scilicet ea causâ, ut clarius cernerent, cum se ad lucem conuerterent, atque exciperent splendorem. Piscium oculi lubrici sunt, usus enim cernendi ex longinquo necessarius ijs est, quæ longius moueantur. terrestribus itaque aer transpici facile potest. at piscibus, quoniam aqua ut ad cernendum acutius aduersatur, sic ad interpellandum usum non multa offensaacula affert modo aeris, idcirco nec palpebram habent, nihil enim frustra natura agit. & oculis lubricis sunt propter circumfusi humoris crassamentum.

*Quæ animalia cilium habeant, quæ uero eodem careant: deq; cauda, & iubis quorundam animalium, & hominis capillo.*

Caput XIII



Illium habent palpebris adiunctum omnia, quæ obtinent pilos, aures, & quæ cortice integuntur, carent: ut quæ pilos non habeant, de struthione Africæ, causam quam ob rem cilium habeat, postea reddemus. & inter ea quæ pilos habent, homo unus cilium in utraque palpebra obtinet, quadrupedum enim generi pili non parte supina, sed prona potius habentur. homo contra, parte magis supina quam prona. pili enim operimenti gratia adiuncti sunt animalibus, itaque quadrupedibus prona potius egent tegumento, priora autem quamquam nobiliora sunt, tamen per corporis totius flexum fouentur ac tepent. At homini, quoniam prior pars compar posteriori est, propter corporis erectionem, idcirco natura parti nobiliori adiumentum censuit adhibendum, semper enim natura rei melioris autor est, quoad eius fieri potest, quam ob rem quadrupes nulla est, quæ pilos uel in palpebra inferiori habeat, quam nonnullæ habent pilos quosdam sub ea nascentes, uel in alis, uel in pube, ut homo. Sed uice eorum alijs prona totius corporis hirsuta habentur, ut canibus, alijs crista adiuncta est, ut equis, cæterisq; generis eiusdem, alijs iuba, ut leoni mari. Quinetiam caudas prolixiores pilis natura ornauit, alias longis, quibus tenor breuis, ut equis, alias breuib; quibus tenor longus, ut bubus, atque etiam pro reliqui corporis natura, ubique enim natura quod aliunde dempserit, reddere ad partem aliam solet. Iam quibus corpus admodum pilosum condiderat, caudam ijs dimittit: quod in urtis perspicuum est. Homo animalium maxime omnium piloso capite est, cuius rei causâ, tum ad necessitatem, tum ad præsidij rationem referenda est, necessarium enim propter cerebri humiditatem & commissuras caluæ, nam ubi plurimum humoris calorisq; est, ibidem ortum pilorum esse copiosum necesse est. Adiumenti autem ratio, ut frequentia pili caput operiens defendat à nimio frigore & calore. Cum enim cerebrum hominis proportionem maximum & humidissimum sit, maximam etiam tutelam desiderat, res namq; humidissima quæq; & referuescere & refrigerare maxime idonea est, quæ autem contra se habet, hæc minus affici potest, sed nos ut huc digrederemur, fecit rei cognatio, cum ratione ciliorum redderemus, itaque de reliquis mentionem suo loco & tempore faciemus.

Quas ob causas supercilia, & cilia in animalibus natura constituit. Caput XV



Vpercilia uero & cilia adiumenti gratia habentur. supercilia enim ut delabentes humores arceant, uelut imbricamentum, siue grunda humoribus, qui capite emanent paratum. cilia ut cōtra incidentia in oculos, quasi uallum quoddam promineāt. supercilia in compage ossium posita sunt, quamobrem compluribus senescentibus adeo crescunt, ut tondendum sit. Cilia uenularum clausulis summis innituntur. nam ubi cutis finitur, ibidem uenulae etiam desinunt. itaque propter uaporem qui inde crassiusculus prodeat, pilos ijs locis enasci necesse est, nisi quid naturalis opificij ad alium usum impediatur.

10

Quomodo in hominibus, ceterisque animantibus nares & labra sint collocata: de quibus labrorum & narium officio. Caput XVI



Ensorium uero olfaciendi non longe quodammodo euariat ceteris quadrupedibus uiuisque, quibus enim maxillae oblongae exeunt in acutum, ijs nares in rictu appellato continentur modo quo fieri potest. ceteris explanatius ad maxillas constant. At elephantus peculiarem hanc partem praeter ceteris sortitus est animalibus, nam & magnitudine & uiribus habet peculiarem. naris est enim, qua cibum tam siccum, quam humidum ille capiat, ori quoque perinde ac manu admoveat. arbores etiam eadem complectendo euellit. denique ea non alio utitur modo, nisi ut manu. Est enim hoc animal sua natura simul terrestre, & palustre. itaque cum cibum petere ex humore deberet, & tamen spirare necesse haberet, ut terrestre, & compos sanguinis, nec posset praeter nimiam magnitudine celeriter discedere ex humore ad aerem, modo non nullorum quae & animal pariunt, & sanguinem habent & spirant, idcirco ut pariter humore atque terra uti posset, necesse fuit. Quale igitur urinatorum nonnulli instrumentum sibi accipiunt, quo quandiu in profundo manent, aerem extrinsecus trahant, talem natura elephantum dedit narem illam praeterlongam, quam ob rem si quando iter per aquam facit, nare emersa respirat. nam, ut modo dixi, promuscis pro nare elephantibus est. & cum fieri non possit, ut naris ad eiusmodi usum accommodetur, nisi mollis sit, aptaque ad flectendum, impedimento enim praeter suam longitudinem esset, ad cibum capiendum. quomodo aiunt de cornibus bouum illorum, qui recessu pascere solent sua natura. nam illos quod progredi demisso in terram capite nequeant, recedendo in auersum pasci solitos aiunt. cum itaque naris eiusmodi adiuncta sit natura, quae membrum eisdem abuti ad plura officia solet, eandem in usum trahit pedum priorum. hos enim uice manuum habet genus quadrupedum digitatum, non solum ponderis causa sustinendi. Elephantibus autem non bisulcos, non solidos pedes habet, sed digitatos. sed quoniam corporis magnitudo uasta, pondusque ingens est, ideo sustinendi tantummodo gratia pedes habent priores, nec ad ullum alium usum utiles propter tarditatem flectendi, atque ineptiam. Narem igitur elephantus habet ut spiret, quomodo & cetera animalia quibus pulmo. eandemque praeterlongam, atque in anfractu flexibilem, propter moram in humore diuturnam, & retardum inde discessum. Cumque usus pedum priorum defuerit, ea, ut dictum est, parte abutitur natura ad supplendum ministerium, quod pedes praestarent. At ues & serpentes, & quaecunque ex quadrupedibus sanguinis compotes ouiparae sunt, foramina quidem narium ante os habent, sed non ita explanata, ut nares appellari possint, nisi spirandi officio. Iam autem quis nasum aut nares habere dicet? Quod propterea ita accidit, quia pro maxillis habet quod rostrum uocatur, huius autem

rei



rei causa est natura auium, quæ ad hunc modum constat, & bipes enim & uolucris est, itaque leue pondus tum capitis, tum etiam ceruicem sustinere necesse est, ut pe-  
 ctus etiam arcum habere debuit. Rostrum igitur osseum habent, ut commode &  
 cibum capiant, & ad pugnam armentur. Arcum hoc est propter capitis exiguita-  
 tem, cumq; meatus olfaciendi suo rostro contineant, nares habere nō possunt. De  
 cæteris animalibus quæ non spirant, dictum antea est, quam ob causam naribus ca-  
 rent, & alia branchijs, alia fistula, alia præcinctu, ut insecta, odores sentiunt, & omnia  
 natiuo spiritu sui corporis quasi mouentur, qui spiritus in omnibus ex natura insu-  
 tus est, non aduentitius de foris accedit. Naribus labrorum natura subiacer ijs, quæ  
 10 simul & dentes habent & sanguinem. Auiibus enim, ut dictum est, cibi armamen-  
 tiq; gratia rostrum osseum habetur. Coactum enim pro dentibus, & in idem per-  
 inde quasi detractis hominis labris superiores inferioresq; dentes seorsum confun-  
 dens, longitudinem utrinq; angustam produxeris, iam enim istud rostrum auium  
 fuerit, sed cæteris animalibus labrorum natura ad salutem, tutelamq; dentium ad-  
 iuncta est: quam ob rem ut quæq; exquisitè beneq; dentibus prædita sunt, sic eam  
 quoque obtinent partem, homini autem mollia, carnosæ, & quæ separari possent,  
 labra adiuncta sunt, tum dentium tuendorum gratia ut cæteris, tum etiam potiori  
 causa, ut bene esset, nam ad usum sermonis ea quoque proficiunt. Etenim ut lin-  
 guam non similem atq; alijs animalibus natura homini dedit, sed idoneam, qua ad  
 20 duplicem actionem uteretur (quod eam in multis facere diximus, nam & ad perci-  
 piendos sapores, & ad formandū sermonem) sic labra tam sermonis, quàm tutelæ  
 dentium gratia adhibuit. Sermo enim qui uoce promatur, ex literis constat, quod si  
 lingua talis, & labra humida atque agilia non essent, maxima literarum pars expri-  
 mi non posset, quippe cum literæ partim lingua producantur, partim labris com-  
 primantur. Sed quas & quot numero differentias hæc habeāt, ex eruditis metrica  
 ratione accipiendum est, has autem partes ilico necesse fuit accedere idoneas, &  
 natura eiusmodi prædita ad usum iam dictum, itaque carne institutæ sunt, eaq;  
 mollissima, qualis caro hominis est, scilicet quod maxime omnium animalium ua-  
 leat sensu tactus.

30 De lingua, eiusq; situ & uarietate in quibusq; animalibus.

Caput XVII



In lingua in ore palato subiacer, sed terrestribus ferè omnibus modo simi-  
 li, cæteris dissimili, tum eorundem ipsorum, tum terrestrium compa-  
 ratione. Homo igitur linguam absolutam, molliissimā & latam præci-  
 pue habet, ut commoda ad utrunque officium sit: hoc est, & ad sapo-  
 res percipiendos, & ad literas exprimendas, est enim homo omnium  
 maxime animalium sensu facilis, & lingua quæ mollis est, uim tangendi præcipue  
 obtinet, gustus autem tactus quidam est, ad literarum etiam explanationem, & ad  
 sermonis expressionem, lingua mollis, lata, & absoluta accommodatior est, quippe  
 40 quæ contrahere, producere, dilatare, denique uarie afformare maxime possit, pa-  
 tet hoc in ijs, quibus non satis absoluta est, blæsi enim, balbi, & torti sunt, quod uis-  
 tum literarum defectus est, discrimen in latitudine & angustia est, quippe cum am-  
 pla angustam contineat, angusta amplam nō capiat, paruum enim in magno con-  
 tinetur, magnum in paruo haberi non potest, quam ob rem aues quæ literas pro-  
 ferre maxime possunt, lingua sunt latiore, quàm cæteræ. Quadrupedes autē quæ  
 & sanguinem habent, & animal pariunt, uocem parū explanare possunt: ut quæ  
 linguam duram, crassam, & minime absolutam habeant, at pleræq; auium uocem  
 copiose emittunt, & quamuis latiore habeāt, quæ unguibus sunt adumcis, tamen

minores uocaliores sunt. ac omnes lingua utuntur etiam ad sui sensus mutuam interpretationem. sed alia alijs amplius, ut in nonnullis uel usus docendi mutuis esse uideatur. sed de ijs diximus satis, cum historias animalium scriberemus. Terrestrium autem ouiparorum sanguineorum pars maior linguam habet inutilem ad uocis officium, & adhaerentem & duram. quanquam ad saporum gustatum serpentes & laceri longam habent, & bifidam. atque ita longam serpentes, ut ex paruo longe protrahi possit. bifida & parte extrema capillamenti tenuitate est, propter suae naturae cupidiam. duplex enim uoluptas ijs capitur, quasi duplicem sensum gustandi habeant. Omnia tam sanguinea quam exanguia habent eam partem, quae saporis sentire potest. nam & quae multitudini uidentur carere ea parte, ut pisces nonnulli, ea quoque pariori quodam obtinent modo, & fere simili, ut fluuiatiles crocodili. Sed hoc latet in plurimis causa quadam iusta. locus enim oris omnium id genus spinosus est. & quoniam aquatile genus breui tempore sentit saporis, hinc fit, ut pro sui usus breuitate linguam parum discretam habeant. Raptim enim summaque celeritate cibus ad uentrem ingeritur, quod immorari saporibus perfruendis nequeant, humore interlabente. itaque nisi os inclinaueris, cerni pars haec discreta non poterit. horret hic locus spinis, quippe qui ex frequenti contactu constitutus sit branchiarum, quarum natura spinosa est. Crocodilis nonnihil causae ad eius partis utilitatem affert etiam immobilitas maxillae inferioris. lingua enim inferiori annexitur maxilla, quam illi quasi contra habent superiorem. ceteris enim superior immobilis est. Itaque ut ad superiorem non habent, quod cibi aditus tollitur, sic ad inferiorem carent: quod superior quasi translata in locum inferioris est. Accedit ad haec genus uitae, quam more piscium agit, cum tamen ipse terrestre sit. Itaque uel ob eam rem inexplanatam hanc partem habeat necesse est. Palatum piscium etiam complures carnosum habent, & quidem, inter fluuiatiles nonnulli admodum carnosum, & molle, ut cyprini nomine, adeo ut si parum diligenter aduertas, lingua id esse uideatur. Pisces igitur ob eam quam diximus causam, & si lingua non carent, tamen explanatam non habent. Sed cum cibi gratia sensus saporis adhibitus sit, eumque non quauis parte sua lingua obtineat, sed extrema potissimum, ideo piscibus particula haec tantummodo discreta habetur. cibum autem quanquam animalia omnia capiunt, ut quae uoluptate ex cibo sentiant (cupiditas enim rei suauis est) tamen membrum quod ad sentiendum accommodatum est, non omnibus simile datum est: sed alijs absolutum, alijs adhaerens, uidelicet ijs quibus uocis defuit usus, & alijs durum, alijs molle carnosumque. nam & crustatis, ut locustis marinis, & reliquis generis eiusdem tale quid in ore habetur: atque etiam mollibus, ut sepijs, ut polyjs. Insectorum alia membrum hoc intus continent, ut formicae. quemadmodum multa etiam ex testatis. alia foris gerunt uelut aculeum fungosum & cauum, ut eo simul & gustare, & cibum trahere possint. patet hoc in muscarum genere, & apum, & omnium generis eiusdem, atque etiam in nonnullis testatis. purpuri enim tantam obtinet uim hoc membrum, ut testas cochylorum transigere ualeat, uelut turbinum, quorum esca capiuntur. nec non asili, & tabani eodem spectant. quorum alteri lingua adacta ceterum hominum secant, alteri tergora etiam bestiarum elacerant. his igitur animalibus lingua talis natura tributa est, quasi respondens & obuersaria nari elephantorum. Naris enim illis adiumento est, & lingua his pro aculeo habetur. Ceteris animalibus omnibus lingua talis, qualem iam exposuimus data est.

ARISTOTELIS STAGIRITAE DE 187  
PARTIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS,  
LIB. TERTIVS, INTERP. THEODORO.

De ordine & constitutione dentium, oris, & faciei, eorundemq; in omnibus animan-  
tibus diuersitate. Caput I



10 **D**ROXIME ab ijs natura dentium est, & oris, quod serie den-  
tium continetur, & constat. Sed cum dentium natura commu-  
ni quidem officio ad cibum conficiendum adiuncta sit, tamen  
generatim seorsum alijs roboris gratia, tum ad inuadendum,  
tum etiam ad defendendum, alijs auxilij tantum causa data est.  
partim enim ea utraque causa dentes obtinent, ut nec ab alijs  
afficiatur, & ipsa afficiant alia, ut quæ ex feris natura carniuora  
sunt: partim ea causa tantum, ne male ab alijs afficiantur, ut complura tum syue-  
stris generis, tum etiam urbani. nonnullis cibi conficiendi causa tantum adhibita est  
dentium opera. homo uero ad usum communem probe factos obtinet dentes: ui-  
delicet primores acutos ut secent, maxillares latos ut molant, discriminat eos utros-  
que ij, qui canini appellantur, media inter eos natura conditi, nam & medium par-  
20 ticeps utriusque extremi est. Et canini ipsi partim acuti sunt, partim lati, quod idem  
in cæteris quoque animalibus est, quibus non omnes acuti habentur. sed potissi-  
mum locutionis gratia tales, totq; numero dentes homo sortitus est, ad literas enim  
exprimendas plurimum cõferunt primi dentes. Nonnulla animalia, quod dictum  
iam est, cibi tantum conficiendi gratia dentes obtinent. Quibus autem simul & au-  
xilio sunt, & robori dentes, hæc aut exertos habent, ut suis: aut acutos pecunatum  
sefe stipantes, unde ferratis ea dentibus esse diximus. Cum enim uires eorum acu-  
mini dentium commissæ sint, recte qui utiles sint, ad ferocitatem pecunatum coeunt,  
ne occursum contrario atterantur: sed nulli simul & ferrati, & exerti  
sunt dentes: quoniam natura nihil frustra, nihil superuacanei facere solet. auxi-  
30 lium alijs per ictum, alijs per morsum: nam sues feminae mordent, ut quæ careant  
dente exerto. cæterum aliquid accepisse in uniuersum conuenit, quod utile sit, tum  
ad hæc ipsa, tum etiam ad multa, quæ postea dicemus. partes enim quæ ad inuaden-  
dum, aut ad defendendum spectant, quæq; à natura ijs tribuuntur, quæ aut sola,  
aut præ cæteris uti possint, & quibus uis utendi præcipua, hæc præcipue armis do-  
tata sunt, ut aculeo, calcari, cornu, dente, & si quid eiusmodi aliud sit. cumq; mares  
robustiores, magisq; animosi sint, ideo aut solis ijs, aut melius ijs partes eiusmodi  
datae sunt, quas enim in feminis quoque haberi necesse est, ut quæ cibo accommo-  
dentur, eas habent quidem & feminae, sed minus quam mares. quæ autem ad rem  
40 nullam necessariam spectent, ijs carent. quapropter in ceruorum genere cum ma-  
ribus cornua sint, feminis desunt. Vaccarum etiã cornua & taurorum inter le di-  
stant, quod idem in pecore etiam cernimus. calcar etiam cum mares habeant, fe-  
minæ magna ex parte non habent, pari modo de reliquis quoque eiusmodi parti-  
bus intelligendum est. Pisces omnes ferratis dentibus sunt, uno excepto, qui scarus  
uocatur. complures etiam dentes in lingua habent, & in palato, cuius rei causa est,  
quod cum mersi in aqua degant, humorem cum cibo admittant, eumq; expuant  
quamprimum necesse est. non enim in molendo commorari possunt, quando hu-  
mor in uentrem interrumpit. idcirco omnes acuti, & frequentes undique sunt, ui-  
delicet ut præ multitudine in minuta secent, quæ attritu subigere nequeant. Ad-

unci præterea sunt, quoniam robur ferè totum piscium in dentibus situm est. Natura etiam oris, tum eorum quæ modo dixi, officiorum causa, tum etiam ad spirandum adiuncta animalibus est, scilicet ijs quæ spirant, atq; extrinsecus refrigerantur. natura enim ipsa per se, ut diximus, partibus omnium communibus ad pleraque officia propria abutitur. proinde oris quoque officium omnibus commune cibis conficiendus est. robur nonnullorum peculiare est: sermo aliorum. spirandi etiam usus non communis omnibus est. At uero natura hæc omnia eodem coniecit, adhibita differentia eius partis pro actionis discrimine. sunt enim alia ore compressiori, alia ampliori. quibus enim cibi conficiendi, & spirandi, & loquendi gratia os datum est, ijs compressius est. quibus auxiliij gratia, ijs si dentibus sunt ferratis, res-  
 scissum. Cum enim tota eorum uis in mordendo sit, hiatus oris ampliorem esse  
 necesse est. eo nanque pluribus, & plenius morsum infigent, quo amplius rescis-  
 sum os sit. Piscium etiam mordacibus & carniuoris tale os est. non carniuoris in  
 arctum se colligit. tale enim os utile ijs est, illud inutile. Auibus os, quod rostrum  
 uocatur. hoc enim pro labris & dentibus habent, sed uarie pro usu & auxilio. quæ  
 enim ad uncis unguibus sunt, quoniam carne uiuunt, & nullo fructu uescuntur,  
 rostrum omnia habent aduncum. Tale enim tum ad retinendū, tum uero ad uim  
 inferendam commodius atque aptius est. uis autem in hoc, & in unguibus sita est.  
 unde fit, ut ungues etiam habeant adunciores. Cæterarum autem rostrum utile  
 ad uictum cuiusque est. uerbi gratia, roboriseci generis & coruini, robustum atque  
 prædurum os est: minuti generis lautum ad terræ fructus colligendos, & ad be-  
 stiolas capiendas idoneum. Quæ autem herbis uiuunt, quæq; apud paludes uis-  
 citant, ut nantes, & palmipedes, partim alio quodammodo rostri commoditatem  
 obtinent, partim latitudine rostri sibi sufficiunt. quippe quæ rostro eiusmodi infor-  
 dere possint, quale inter quadrupes etiam suis est. nam is quoque radicum ap-  
 petens est. Quin etiam aues quæ lato sunt rostro, radicesq; edunt, & reliquarum  
 uictus similis, nonnullæ ferratum rostri extremum habent. ita enim herbarum car-  
 ptus quo uiuunt facilius agitur. Sed cæteras capitis partes omnes ferè exposuimus.  
 prosopum autem, id est facies, quod inter caput & collum hominis est,  
 nomen à re ipsa accepisse uidetur. quod enim unus anima-  
 lium homo erectus est, solus prospicit anteuersus,  
 uocemq; anteuersus mittit.

De cornuum constitutione, & quæ animalia habeant cornua, quæ item ijs  
 careant.

Caput II



E cornibus differendum est. hæc enim capiti innituntur, quocunque  
 in genere esse possunt. carent ijs omnia quæ non uiuipara sint. cor-  
 nua uel alijs quibusdā inesse dicimus, sed per similitudinem & trans-  
 lationem, cum nullum ex ijs cornu officio fungatur. gerūt enim quæ  
 animal pariunt cornua ad uim, aut inferendam, aut depellendam:  
 quod nulli ex cæteris quæ cornua habere dicuntur contingit. nullum enim utitur  
 cornibus, uel ad conuincendum, uel ad defendendum. quæ uirium sunt officia.  
 Quæ igitur pedes multifidos habent, cornu omnia carent. cuius rei causa est, quod  
 cornu auxiliij gratia habetur. multifidis autem non defunt alia auxilia. dedit enim  
 natura alijs ungues, alijs dentes pugnaces, alijs partem aliam, qua sese tueri atque  
 defendere possent. At uero bisulcorum pars maior cornua gerit. & solipedum  
 nonnulla ad uim inferendam: quædam etiam ad defendendum. quibus autem  
 cornua natura non dedit, eorum saluti præsidij consuluit alijs, ut pernicite cor-  
 poris

poris equis opitulata est, magnitudine camelis. magnitudinis enim exuperantia, sufficit ad necem arcendam, quod camelis contingit: atque etiam melius elephantis. Quædam etiam dente exerto armantur in genere bisulco, ut fues. Quibus autem cornua præ nimio excessu superuacua sunt, ijs alterum auxilium natura adhibuit, ut ceruis uelocitatem. grandis enim illa & multifida cornuum magnitudo potius obest quam prodest. bubalis etiam capreisq; interdum cornua inutilia sunt, nam et si contra nonnulla resistunt, & cornibus se defendunt, tamen feroces pugnaesq; belluas fugiunt. Bonasis (nam ijs quoque pari aduncitate cornua reflexa inter se orbem colligunt) excrementi profusionem natura pro auxilio dedit.

10 hoc enim, cum metuunt, se tuentur. hac eadem profusione alia quoque seruari certum est. plura autem auxilia simul, quorum singula satis essent, nulli natura tribuit. cornigerorum pars maxima bisulca est. sed solipes etiam traditur in eo genere, quem alinum Indicum uocant. maxima animalium pars, ut corpus dextro sinistroq; quibus se mouent, distinguitur: sic etiam cornua bina eadem illa de causa gerit naturæ ingenio. Sed sunt etiam quæ cornu singulari armantur, ut oryx, & quem alinum Indicum appellari diximus. oryx bisulcum, alinus ille solipes est. gerunt sane medio sui capitis cornu fixum ea quæ unum habent. sic enim maxime pars utraq; cornu obtinebit, cum medium commune pariter utrique extremo sit. solipes potius quam bisulcū esse unicornem recte uideri potest. ungula enim tam solida quam

20 bisulca eandem naturam habet, quam cornu. itaque eidem simul & ungulam fin di, & cornu congruum est. fissio etiam ungulæ, & cornu ex defectu naturæ euenit. Itaque cum exuperantiam ungulæ solipedum natura dedisset, recte dempsit superne, fecitq; unicornem. Recte etiam capiti cornua mādauit. nec, ut Aesopi Mous uitio dat, quod taurus non in armis cornua gerat, unde ferire uehementius possit, sed capite parte corporis imbecillima. non enim ingenio perspicaci ille Mous hæc deprehendit. ut enim si in alia quauis parte cornua haberentur, frustra ponderi essent, nulla in re utilia, multa etiam officia impedirent. sic armis quoque infixæ sedem omnino ineptam tenerent. non solum enim unde ictus fiant uehementiores considerandum est, sed etiam unde remotiores. itaque cum careant manibus, & nec

30 pedibus imis affixa gerere possint, neque genibus (flexus enim impediretur) capite gerant necesse est, quemadmodum à natura constitutum est. quin etiam ad cæteras corporis motiones, ita maxime geri sine ullo impedimento possunt. Ceruus dumtaxat cornua tota solida, & decidua, tum utilitatis causa, ut onere leuentur, tum ex necessitate præ pondere. cæteris aliquatenus caua, & mucrone demum concreta sunt, quoniam ad ictus hoc sit commodius. sed ne pars caua debilis sit, quæ cuti annectitur, solidum quiddam ossibus exortum ingreditur eam, impletq; rotam. Sic enim sita compactaq; & ad uim inferendam commodissima, & ad reliquæ uitæ munera inoffensibilissima habentur. Sed cuiusnam gratia natura cornuum sit, & quam ob causam alijs data, alijs negata sit, expositum est. Nunc quemadmodum natura

40 se habente necessaria rebus subiectis necessarii natura ratiocinaria alicuius gratia abutatur, differendū est. Primo igitur plus corpulentis terreniq; in animalibus grandioribus inest, cornigerum autem nullum admodū paruū esse nouimus. omne enim, quæ explorata habemus, minimum caprea est. natura uero contemplanda respectu plurimum est. aut enim omni ex parte, aut magna ex parte cōstat, quod secundū naturam sit. Os autem omne, & quicquid speciem gerit ossis, terrenum est. quam ob rem plurimum id esse propè dixerim in maximis, partis maioris contemplatione. Corporis igitur eiusmodi excrementi exuperantia in maioribus habitata animalibus, natura ad auxilium, & rem abutitur commodam. itaq; quantum excrementi eius ad locum superiorem efferatur, alijs in dentes, uel continuos uel

exertos distribuit, alijs in cornua. quam ob rem cornigerorum nullum utrinque dentatum est. superne enim primores dentes non habent. quippe cum natura hinc adimendo addiderit cornibus, & alimentum quod in eos dentes digeratur, in cornuum incrementum absumitur. cur ceruæ cornibus careant, cum dentes similiter habeant, atque mares, causa est, quod eadem sexus utriusque natura, & cornigera est, sed foeminis adempta sunt cornua, quoniam ne maribus quidem utilia sint: sed uirium meliorum beneficio, mares minus offenduntur. Cæteris animalibus, quibus hæc materia non in cornua secedit, aut dentium ipsorum magnitudinem communi omnium incrementum natura auxit, aut dentes exertos ueluti cornua è maxillis produxit. Sed de partibus capitis hæc tenus.

De collo, gula, & arteria, & earum officio in corpore animantium. Caput III



Collum capiti subiacet ijs, quæ id habent animalibus. non enim omnia habent, sed ea tantum, quibus sunt partes illæ, quarum gratia collum conditum est, hoc est guttur, & quæ gula uocatur. Guttur spiritus causa datum est, hoc enim spiritum animalia trahunt, & reddunt, respirando & expirando. quam ob rem quæ carent pulmone, collo etiam carent, ut genus piscium. Gula est qua cibus & potus deuoratur. itaque ea quæ carent collo, gulam hæc manifestam non habent, nec gulam haberi cibi causa necesse est: nihil enim ad cibum parat. & quidem à situ oris continuo uenter esse potest, pulmo non potest. aliquem enim quasi tractum conuallis adesse communem oportet, quo spiritum ad fistulas per arterias digerat bipartitus, atque ita efficere spiritus reciprocationem maxime potest. Cum igitur instrumentum spirationi accommodatum, longitudinem habeat necesse sit, gulam inter os & uentrem haberi necesse est. Constat gula ex neruo & carne, ex neruo, ut extendi possit, cum cibus ingeritur: ex carne, ut mollis sit & cedat, nec lædatur asperitate cibi descendens. Guttur autem, quod & arteria uocatur, corpore constat cartilaginoso. non solum enim spirandi causa est, sed etiam uocis. quod autem sonet, leue ac solidum esse oportet. Ante gulam arteria posita est, quanquam impedimento sit, cum cibus ingeritur. Nam si quid uel cibi, uel potus in arteriam dilabitur, strangulationes, tormina, & tussis grauissimæ incitantur. quam ob rem non audiendi sunt, qui hac potum meare dicant. Accidunt enim aperte quæ modo dixi, omnibus, quoties aliquid cibi dilapsum est. Profecto opinionem eorum qui potum hæc admitti existimant, irridendam esse plura ostendunt. meatus enim nullus de pulmone ad uentrem pertinet, sicut ex ore gulam tendere cernimus, quin etiam per uomitum, & nauseam, unde nam humor remeet, incertum non est, ad hæc humorem non continuo colligi in uesicam, sed prius in uentrem certum est. excrementa enim alui tingi uidentur fece uini atri, uulnere etiam uentris sæpe hoc idem patefactum est. Sed enim stultas opiniones admodum scrutari stultum fortasse est. Arteria uero, quod exterior, ut diximus, posita est, à cibo infestatur. attamen natura ad hoc molita est minorem linguam, siue lingulam, quæ arteriam operiret. non omnia uiuipara eam obtinent, sed ea tantum, quibus pulmo & cutis pilo intacta, non cortex, non penna operimento est. Corticatis enim pennatisque, guttur uice lingulæ operientis ipsum contrahitur & diducitur: quemadmodum illis operitur aliunde & aperitur, uidelicet spiritui trahendo reddendo uel aperitur, cibo ingerendo operitur, ne quid ilabatur. quod si quid erroris in eo motu committitur, uel deerrante cibo in alium tramitem, uel respiratione præueniente, tussis, strangulationesque excitantur ut dictum est. tam uero solerti ingenio motus, & lingulæ & linguæ adhibitus à natura est, ut cibus neque in ore cum molitur cadat sub dentes, neque cum per fauces

meat, in arteriam labatur. Carēt animalia quæ modo diximus, lingula, quoniam & carne sicca, & cute cōstant prædura. non enim facile moueri membrum id posset, si ex tali genere carnis cutisq; constaret. sed extrema ipsius arteriæ citius comprimerentur, quàm lingula, quam animalia pilo prædita habēt ex sua carne. hæc dixisse satis est, quam ob causam animalium alia lingulam habeant, alia careant: & quemadmodum natura uitio situs arteriæ remedium lingulam emolita adhibuerit. Guttur autem ante gulam necessariò positū est. Cor enim in parte priori, atq; in medio situm est: in quo principium uitæ, omnisq; motus & sensus esse censemus. etenim partem uersus, quam priorem appellamus, tum sensus, tum etiam motus agitur, hac enim ipsa ratione pars prior, & posterior statuenda est. Pulmo eandem quam cor obtinet sedē, idq; amplectitur. Spiratio tum propter pulmonem, tum propter originem cordi inditam agitur. attrahitur & redditur aër per arteriam. itaque cum in parte priori cor primum collocari necesse sit, arteriam quoq; & guttur constitui ante gulam necesse est. hæc enim ad pulmonem & cor tendunt, gula ad uentrem. deniq; quod melius & nobilius est, id semper (nisi quid maius impedit) superioris, inferiorisq; ratione superius collocatur. prioris, posteriorisq; prius. dextrī, sinistrīq; dextrum. sed de collo, gula, & de arteria dictum iam est.

De corde, & eius qualitate, quamq; ob causam animalibus iunctū sit. Caput IIII

Equitur ut de uisceribus doceamus. quæ eorū sanè propria sunt, quæ sanguinem habent. nulli enim exanguium animali uiscus ullum est, cum sanguineis omnia sint. Itaque Democritus non recte de his tractasse uidetur, siquidem incerta hæc esse putauit præ exiguitate exanguium animalium. statim enim cum consistunt, quæ sanguinem habent, exiguaq; admodum sunt, deprehēdi cor & iecur sine dubio possunt. quippe cum in ouis triduo cubatis, pūcti iam magnitudine appareāt. necnon in partibus abortitijs perquam exigua cernuntur. ad hæc, ut exteriorum partium non idem usus omnibus est, sed quæq; pro uita motuq; uario sibi peculiarem receperunt: sic interiorum alia alijs accommodantur. uiscera autem eorum peculiaria sunt, quæ sanguinem habent, quam ob rem unumquodq; eorum ex materia sanguinea constat. quod in nuper æditis patet. Sunt enim cruentiora, maioraq; ex ratione, quoniam in prima cōcretionē species, copiaq; materiæ euidentior est. Cor igitur omnibus sanguine præditis inest, & quam ob causam, dictum & antehac est, & nunc dicemus. Sanguis enim necessariò inest in ijs quæ sanguinea sunt. qui cum humidus sit, conceptaculū sibi habeat necesse est. ideoq; uenas natura emolita uidetur. quarum unum esse principium necesse est. ubicunque enim fieri potest, unum esse, quàm plura melius est. cor autem uenarum principium est. ex hoc enim uenæ, & per hoc esse uidentur. natura etiam eius uenosa est, utpote generis societate iunctū cum uenis, quoniā & situs eius sedem obtinet principalem. in medio enim positum est, sed magis superius, quàm inferius. & parti priori ammotius quàm posteriori. natura enim rem nobiliorem constituere in locis nobilioribus solet, nisi quid maius impediatur. Cordis hunc esse locum latissime in homine patet. sed in cæteris quoque animalibus pari ratione tenere sibi uult medium corporis necessarij. cuius sanè exitus est, quæ excrementa emittuntur. crura autem alijs aliter adiuncta sunt, nec ad uitam necessaria habentur. quam ob rem ijs demptis uita non tollitur, additis etiam nullum sequi interitum certum est. Qui capiti uenarum originem tribuunt, non recte opinantur. plura enim dispersaq; principia faciunt, idq; in loco frigido, argumentum, quod frigus hic locus uehementius sentiat: contra cordis locus calore abundat, cumq; per cætera uiscera uenæ transigāt, nulla per cor tendit, ut dictum est. itaque



partem & principium uenarum cor esse apertum est, idque optima ratione. medium enim cordis spissum cauumque corpus est. plenum etiam sanguinis est, quasi hinc uenae oriantur. cauum est, ut contineat sanguinem: spissum, ut principium caloris seruare possit. in hoc enim uiscerum & partium omnium corporis sanguis sine uenis complectitur. ceterae partes sanguinem uenis habent contentum, idque recta ratione: sanguis enim ex corde ad uenas quoque deriuatur. at uero ad cor non aliunde deuenit. id enim origo prima, & fons sanguinis est, aut conceptaculum primum. haec ex confectione animalium perspicui possunt, atque etiam ex generatione. Cor enim statim omnium partium primum consistens, sanguinolentum est. motus etiam laetitiae ac tristitiae, denique omnium sensuum hinc oriri, eodemque desinere uidentur. Ratione quoque ita esse probatur. principium enim unum esse oportet, ubi-  
cunque fieri potest. apertissimum autem omnium locorum medium est. medium enim unum est & tale, ut undique attingi, uel aequae uel proxime possit. ad haec, cum nec pars alia sanguinea ulla, neque sanguis ipse uim habeat sentiendi, quod primum sanguinem habet, id esse quod sentiat certum est. habeat autem perinde ac uas quod principium est, necesse est. nec ratione tantum ita esse probatur, uerum etiam sensu percipitur. nam in partuum prima generatione, statim cor palpitare cernitur, quasi animal sit, ut quod principium sit naturae eorum quae sanguinem habent. argumentum uel inde deduci potest, quod nullum animal sanguinis compos careat corde. principium enim sanguinis habeant, necesse est. lecur etiam omnibus sanguine praeditis inest: sed nemo id censuerit esse principium uel corporis totius, uel sanguinis. situm enim nequaquam obtinet principalem. Lienem uero sibi habet aduersum in ijs, quae exquisitius consent. nec uero sanguinis conceptaculum modo cordis intra se continet: sed ut reliquae partes sanguinem uenis inclusum habet. ad haec, uena per iecur tendit, nec ulla ex eo prouenit. uenae enim omnes ex corde sua initia trahunt. itaque cum alterutrum istorum principium esse necesse sit, iecur autem non sit, cor sanguinis quoque principium esse necesse est. animal enim sensu definitur. uis autem sentiendi primo illi tribuitur, quod primum sanguine praeditum est. Tale autem cor est, quippe quod & origo sanguinis sit, & primum sanguinem habeat. Extremum eius turbinatur in mucronem firmissimum. situm in pectore est, & omnino parti priori corporis commissum, ne refrigeretur. omnibus enim pectus minus carnosum, quam tergum est. quam ob rem a tergo perquam tute calor apertus est. Cor ceteris animalibus in medio pectore est. homini tantum paulo uergit ad laeuam, ut eius partis refrigeratione moderetur, & compenset. Omnium enim animalium maxime homo refrigeratam habet partem sinistram. in piscibus etiam cor similem situm tenere, & cur dissimilis uideatur, dictum iam est. solis his cordis mucro ad caput spectat, cum ea pars prior sit. eodem enim agitur motus. Copia quoque neruorum in corde est, idque recta ratione. hinc enim motus oriuntur, qui intendendo remittendoque efficiuntur. itaque ministerio tali & robore opus est. Cor autem, ut supra diximus, ueluti alterum animal inest ijs, quae corde uitalem originem continent. Cor sine ossibus est omnium quae nos nouerimus, praeterquam equi, & generis bouum cuiusdam, quibus praeter magnitudine quasi adminiculum subditum est. quo modo totum etiam corpus ossibus sustentatur & continetur. Ventriculum triplicem cor magnorum animalium habet, duplicem minorum, unum ad postremum. nullumque est quod sine ullo uentriculo consistat. & quam ob causam, dictum est. locum enim & conceptaculum quoddam sanguinis primum in corde haberi conuenit. Sanguinem autem primo effici in corde, saepe iam diximus. Sed cum duae uenae sint principales, altera maior, altera minor, aortaque appellata, quae sparsa ramorum serie ceteras minores uenas producat, atque inter se differant, ut posthac exponemus: melius sane est initia quoque



quoq; earū esse distincta. quod fieri potest, si sanguis diuersus distinctusq; sit. quam ob rem ubi fieri potest sanguinis conceptacula duo habentur. fieri autē id potest in magnis: sunt enim corda eorum ampliora. sed melius tres esse uentriculos, ut unus cōmune principiū sit, medium autem & impar principiū est. itaq; magnitudo amplior subinde desideratur. Vtile fit, ut quæ maxima sint, triplicem uentriculum habeant. dexter plurimū sanguinis, & calidissimū continet: quam ob rem pars corporis dextera calidior, sinister parum, idq; frigidissimū, medius mediocrem, tum copia tum calore, sed puriorem, principiū enim quāmaxime quiescere debet. Tale autem erit, si sanguis purus & mediocris, tum copia, tum calore sit. Quinetiā articulationē

10 quandam rimis, futuris uē capitis similem habere uisuntur, quanquā non ita constant, ut quod ex pluribus sit compactum: sed (ut modo dixi) articulationē potius ostendunt. Sunt articulatoria corda eorum, quæ sensu melius ualent, inarticulatoria eorū, quæ sensu hebetiori sunt, ut suum. discrimina cordis, quæ amplitudine, exiguitate, duritia, mollitia existant, uel ad mores pertineant aliquatenus. Quæ enim sensu hebeti sunt, cor habent durum & spissum, quæ autem sensu ualent, mollius. pauca etiam sunt, quibus cor grandius, audentiora, fidentioraq; quibus minus aut mediocre. affectus enim qui accidit ex metu, iam in ijs præest, quoniam calorem proportionē cordis non habeāt, sed parum caloris in magno conceptaculo exoleat: itaq; sanguis frigidior sit. Cor magnum proportionē, lepori, ceruo, mūrī,

20 hyenæ, asino, pantheræ, mustelæ, & reliquis ferē omnibus quæ aperte timida sunt, aut propter metum malefica. Simile in uenis atq; in uentriculis cordis euenit. Sunt enim frigidiores, & uenæ ampliores, & uentriculi ampliores. nam ut in paruo & in magno domicilio tantundem ignis non æque calefacit, sed minus in magno: sic in his calor non pariter agit, uas enim tam uena, quā uentriculus est. Item motus alieni calidum quodq; refrigerant. plus autem spiritus in amplioribus est, magisq; ualet. quā ob rem nullum ex ijs, quæ uenis aut uentriculis sunt amplioribus, obestum per carnem, optimūq; est. sed quæ ita pinguescant, aut omnia, aut maxima parte uenis incertis, paruoq; uentriculo esse cernuntur. Cor solum uiscerum, atq; omnino partium corporis nullum uitium patitur graue: idq; recta ratione. cum

30 nim principiū corrumpitur, nihil est quod ceteris quæ inde pendeant, præbere auxilium possit, indicium, ut nullum affectū cor patiatur, quod in nulla hostia cor ita affectum uisum adhuc est, ut in ceteris uisceribus cernitur. Renes enim sæpenu-mero calculus, & panis, & papulis referti uidentur: atq; etiam iecur & pulmo, ac potissimū lien, multa etiam alia uitiorū genera euenire in ijs uidemus: sed tamen circa arteriam pulmonis, & qua iecur annectitur uenæ maiori, perexigue ita accidit: idq; ratione recta, hac enim maxime cordi associatur. At uero quæ morbo, uitijsq; eiusmodi pereunt animalia, ijs dissectis affectus morborum in corde conspiciuntur. Sed de corde quale nam sit, & cuius gratia, & quam ob causam iunctum animalibus sit, hæc dixisse satis est.

40 De uenis, & earum loco in corporibus eorum animalium, quæ sanguine præditæ sunt.

Caput V



Equitur ut de uenis differamus, uidelicet de maiori, & de aorta. hæ nanq; ex corde primæ recipiunt sanguinem: reliquæ earum soboles sunt. igitur sanguinis gratia eas esse dictum iam est. humor enim conceptaculum quisq; desiderat. Venarū autem genus conceptaculū & uas est. itaq; sanguis in ijs, quasi in uase est. sed quā ob rem duæ sunt, & de eadem origine in omnes corporis partes discurrant, explicandum nunc est. causa, ut principiū unum, & ab uno esse melius sit, quod animā sentientem unam

R

actū habeant omnia. hinc enim pars etiam quæ eam animam primo contineat una  
 est, tum potentia, tum actū, in ijs quæ sanguinem habent. At in nonnullis eorum  
 quæ sanguine carent, actū duntaxat. quam ob rem caloris quoque originē in eodem  
 tantisper esse necesse est. hæc eadem causa est etiam, ut sanguis humidus sit & cali-  
 dus. cum igitur una in parte sit principium sensus & caloris, sanguis etiam ex uno  
 suam originem ducit. unitate autem sanguinis sit, ut uenarum etiam capita ex uno  
 eodemque oriantur. duæ autem numero sunt, quoniam corpora animalium quæ san-  
 guinem habent, & gradiuntur, bipartita sint. hæc enim omnia parte priori & pos-  
 teriori, dextra & sinistra, superiori & inferiori distinguuntur. quanto autē nobilior  
 ac principalior pars prior, quam posterior est, tanto uena maior præstantior est al-  
 tera, quam aortam uocari diximus. altera enim in priora, altera in posteriora discur-  
 rit. & altera in omnibus sanguine præditis habetur aperte, altera in nonnullis aut ob-  
 scure, aut incerte. Causa uero ut uenæ in omnes corporis partes digerantur, quod  
 sanguis, aut quod uicem sanguinis tenet, totius corporis materia est, quæ in uena,  
 aut in uicario uenæ continetur. sed quonam modo, & ex quo animalia nutrian-  
 tur, & quomodo ex uentre capiant alimentum, cum de generatione agitur, aptius  
 & inspectari, & explicari potest. Cum autem partes ex sanguine omnes consistant,  
 ut diximus, uenarum riuus in omnes corporis partes ratione recta expanduntur.  
 Sanguinē enim fundi per omnia, adesseque omnibus oportet, siquidem partes quæque  
 ex eo consistunt. & ut in hortis rigandis de una origine, fonteque uno aqua riuus per-  
 multis diducitur, alijque ab alijs ductus subinde excipiunt quousque humor in omnes  
 partes deueniat: atque etiam ut in fabricis per totam fundamentorum descriptionem  
 lapides apponuntur, uidelicet ea ratione, quod fata hortorum humoris beneficio na-  
 fcantur, fundamenta ex lapidibus condantur: sic natura sanguinē per totum cor-  
 pus censuit deriuandum, cum is omnium materia sit. pater hoc in ijs, quæ maxime  
 extenuentur, nihil enim nisi uenæ apparent, ut in uitineis, & ficulnis, & reliquis ge-  
 neris eiusdem frondibus. ijs enim arescentibus, uenæ tantummodo relinquuntur.  
 Cuius rei causa est, quod sanguis, & quod sanguini proportionet, potentia sit cor-  
 pus & caro, aut quod ijs proportionem respondeat. Igitur ut in adaquatione sulci al-  
 tiores amplioresque durant, minimi autem primi, ac celeriter limo obductio abole-  
 scunt, rursusque deductio apparent, sic uenæ amplissimæ durant, minimæ autem pri-  
 mæ actū carnes efficiuntur, quanquam potentia nihilominus uenæ sint. quam ob rem  
 etsi caro extat, sanguis tamen inducto uulnere undique effluit. Atqui sine uena san-  
 guis esse non potest. uena autem nulla manifesta est, quo modo neque riuorum fo-  
 ueolæ pateant, priusquam limus eximatur. Procedunt uenæ in minores subinde ex  
 amplioribus quousque arctiores reddantur, quam ut sanguinē transmittere possint.  
 quam ob rem exitus sanguini nullus patet, quanquam excremento uaporis humidi,  
 quem sudorem uocamus, satis pateat. sed ne illi quidem nisi corpore calefacto, &  
 uenularum clausulis patefactis. iam nonnullis accidit, ut cruentum quoddam excre-  
 mentum sudarent propter uitiatum corporis habitum, scilicet cum corpus laxum  
 fluxusque esset, sanguisque præ cruditate humesceret imbecillitate caloris, qui exiguus  
 uenulis inclusus concoquere non posset, omne enim quod aquæ & terræ comune  
 est, crassescere cum concoquitur, dictum iam est. alimentum autem & sanguis mi-  
 xtum ex ijs est, calor uero concoquere non potest, non modo quia exiguus est, ue-  
 rum etiam præ nimia cibi assumpti copia, sit enim exiguus cōparatione tanti cibarii.  
 duplex autē exuperantia cibi est, aut enim quantitate, aut qualitate, id est, modo &  
 genere. quippe cum cibus non æque concoctus facilis quisque sit, profluit autē sanguis  
 potissimum per ampliora uenarum foramina. quæ ob rem e naribus, gingiuis, & sede,  
 interdum etiam ex ore profluit sanguinis sit sine ullo dolore; non per uim, ut ex  
 arteria.

arteria, distat spacio inter se superne uena maior, & aorta, infra mutatis uicibus tendunt, atq; ita continetur corpus. progrediētes enim scinduntur iuxta bifidam crurū partitionē, atq; altera ex parte priori in posteriorē se porrigit, altera ex posteriori in priorem, eodemq; concurrūt, ut enim ea quæ implexa sunt, continētiora constant, sic uicibus uenarū mutatis, partes priores corporis cum posterioribus copulantur. Simile etiam à corde locis superioribus fit. sed qui diligentius nosse uelit, quemadmodum uenæ inter se habeant, spectare id tum per dissectionē, tum etiam per commentationē, hoc est, historiam animalium debet, atq; de uenis, & corde hactenus, de reliquis etiam uisceribus hac eadem uia & ratione considerandum est.

De pulmone & eius forma, quibus item inferitur, quibus non. Caput VI



Vlmo ideo habetur, quia genus animalium quoddam pedestre est. Calorem enim refrigerari necesse est, quod extrinsecus ea, quæ habēt sanguinem desiderant, sunt enim calidiora. At quæ sanguine carent, uel suo natiuo spiritu satis refrigerari possunt: extrinsecus autem uel aëre, uel aqua refrigerare necesse est, quam ob rem piscium nullus habet pulmonē, sed pro eo branchias obtinent, ut cum de spiratione ageremus, retulimus, aqua enim refrigerantur, ut aëre quæ spirant, quam ob rem omnia quæ spirant, habent pulmonē, spirant pedestria omnia, & aquatiliū nonnulla, ut balena & delphinus, atque etiam cete omnia quæ resant, complura enim natura ancipiti sunt, tum ex terrestriū, tum ex aquatiliū numero. nam & eorum quæ terra sustentantur, aëremq; arripiunt, quædam in humore maximā temporis partem consumunt propter sui corporis temperamentū. & eorum quæ in humore degunt, nonnulla tantum terrestris naturæ sibi mutuuntur, ut nisi interdum spirent, uiuere nequeant. Pulmo igitur spirandi officio delegatus est, qui originē quidem sui motus accipit ex corde: sed sua tum amplitudine, tum inanitate aditum spiritui patefacit, cum enim attollitur influit spiritus, cum contrahitur effluit. Ad cordis palpitacionem pulmonem spectare male opinatum est, cor enim homini (propē dixerim) animalū uni palpitat, quia homo solus spe rei futuræ, expectationeq; moueatur, in pluribus etiam cor laxo interuallo distat à pulmone, situmq; superius tenet, ut nihil ad cordis palpitacionem conferat pulmo. Differentia pulmonis uaria est, alijs enim sanguineus, magnusq; alijs minor, fungosus, exanguis. Quæ uiuipara sunt, maior, & copia refertum sanguinis habent propter calorem suæ naturæ ampliorem, Quæ contrā ouipara sunt, exiguum & siccum, sed aptum ampliari, ac extrumescere cum inflatur: qualis eorum est, quæ ex terrestribus quadrupedes ouiparæ sunt, ut lacertorū, & testudinū, & cæterorū generis eiusdem. Volucrū etiam natura, quas aues appellamus, eodem pertinet, omniū enim earum pulmo fungosus, & spumæ similis est, spuma enim facta diffusaq; ex amplo tumore in exiguū residet, & pulmo earum exiguus, membranæq; similis est. quam ob rem hæc omnia parum sitiunt, & parum bibunt. diu etiam aquam demersa tolerant, satis enim ab ipso pulmonis motu spiritali inanē refrigerantur diutius, ut quæ parum caloris habeant. Accedit ad hæc, ut magnitudo corporis eorū propē omniū minor uiuiparis sit. Calor enim est, quod uim obtineat augendi, sanguinis autē copia caloris indicium est. Corpora etiam melius erigit, quam ob rem homo cæteris erectior omnibus est. & uiuipara reliquis quadrupedibus erectiora incedunt, nullum enim uiuiparū uel expes, uel ambulans æque latibula petit. Pulmo igitur spirandi gratia datus omnino est, sed exanguis, talisq; cuiusdam animalium generis causa est, uerum cōmune eorum nomine uacat, nec ut auium genus nomen obtinuit, itaq; ut auem esse ex aliquo est, sic in essentia illorum inest, ut habeant pulmonem.



Uiscerum quædam simplicia esse uidentur, ut cor, ut pulmo, quædam  
 bipartita, ut renes, quædam utro nam modo se habeant, dubitatur. Ie-  
 cur enim & lienem ancipiti inter hæc esse specie dixeris. nam & quasi  
 simplex, & tanquã pro simplici duo, simili prædita natura esse utrun-  
 que uidetur. Sunt tamen omnia bipartita, cuius rei causa est corporis  
 dispositio, quæ bipartita quidem sit, sed in unum initium coëat, consumereturque, aut  
 enim superiore & inferiore, aut priore & posteriore, aut dextra & sinistra parte di-  
 stinguitur, quam ob rem cerebrum quoque omnium bipartitum esse sibi uult, atque  
 etiam sensorium unumquodque, eademque ratione cor uentriculis suis distinguitur.  
 pulmo uero in ouiparis adeo dirimitur, ut ea binos habere pulmones uideantur.  
 Renes bipartitos esse nulli dubium est, de iecore & liene iure ambiges, cuius rei cau-  
 sa est, quod in ijs quæ lienem habere necesse est, lien ipse quasi iecur adulteratum  
 esse uidetur, in ijs autem quæ lienem habere non necesse est, ut exiguus admodum  
 lien ueluti notæ gratia habetur, sic epar bipartitum aperte est, & pars altera ad de-  
 xtram, altera quæ minor est, ad sinistram situm tenere expetit. Quinetiam in ouis-  
 paris quamuis minus, quam in uiuiparis apertum sit, tamen in nonnullis æque diui-  
 sum patet, ut locis quibusdam lepores bina iecinora habere uidentur, quemadmo-  
 dum in genere piscium, tum alij quidam, tum cartilaginei iecur duplicatū habere  
 uidentur. Sed quoniam iecur parte dextra potius situm est, ideo natura lienis ad-  
 hibita est. Itaque quanquam necessario quodammodo est, tamen non admodum o-  
 mnibus animalibus. causa igitur ut uiscerum natura bipartita sit, quemadmodum  
 diximus, dextrum sinistrumque est. utrunque enim sibi simile exposcit, quomodo ea  
 quoque similem, geminamque habere naturam expetunt, ut enim illa quamuis gemi-  
 na eodem coëunt, sic uiscerum singula, quamuis gemina, nexu eodem continen-  
 tur. Sunt uiscerum quædam supra septum, quædam infra, sed omnium usus com-  
 munis uenarum gratia est, uidelicet quo uenæ, utpote peniles sustineri, & copula  
 uiscerum stabiliiri ad corpus possint, quasi enim anchoræ per partes deductas iaci-  
 untur ad corpus, uerbi gratia, de uena maiore ad iecur & lienem deuenitur, etenim  
 uiscerum eorum natura, quasi clauus corpori eam affigit, scilicet iecur & lien, in la-  
 tera corporis uenam maiorem affirmant. ad hæc enim sola rami ab illa mittuntur.  
 Renes autem in partem posteriorem eandem continent, quanquam ad renem ut-  
 runque non modo de uena maiori, sed etiam de aorta pertendit uena, hæc uiscerum  
 beneficio institutioni animalium præstantur, atque etiam iecur & lien iuuant ad cibi  
 concoctionē, quod enim sanguinea sunt, calidam habent naturam. Renes ad ex-  
 crementum quod in uescicam secedit, opitulantur. Sed enim cor & iecur omnibus  
 animalibus necessaria sunt. alterum propter caloris originem (locum enim adesse  
 aliquem quasi lares, focumque oportet, quo naturæ fomites, & primordia ignis na-  
 tui contineantur & seruentur, eundemque tutum esse ueluti arcem corporis totius  
 necesse est) alterū iecur dico, cibi concoquendi gratia adesse, & quidem nullum san-  
 guine præditū ijs duobus carere potest. quam ob rem omnia quibus sanguis, duo  
 hæc uiscera habent. Quæ autem spirant, tertium etiam habent, pulmonem. Lien  
 per accidens necessarius est, quomodo excrementa tum alui, tum uescicæ, ex quo  
 fit, ut in nonnullis deficiat magnitudine, ut uolucrum quibusdam, quæ uentricu-  
 lum habent feruentiorem, uelut columbo, accipitri, miluo. Quinetiam in ouiparis  
 quadrupedibus pari modo hoc percipi potest. habent enim perquam exiguum.  
 multis etiam squamaris exiguis, quæ uescica etiam carent, quoniam excrementum  
 per carnem laxiorem in pinna & squamas transeat, lien enim uapores uacantes  
 diuertit, & attrahit ex uentriculo, & concoquere eos potest, ut qui sanguineus sit.

quod

quod si plus excrementi sit, parumq; calor habet lien, corpus præ alimento immodico languescit. & propter confluuiū huc humoris sæpe accidit, ut lienosis uentres præduri efficiantur. quo modo ijs, qui supra modum mingunt ex diuerticulo humoris. At quibus parum excrementi consistit, ut auib; atq; piscibus, ijs aut non magnus, aut notæ gratia duntaxat habetur. Quadrupedibus etiam ouiparis lien exiguus, rigidus, & reni similis est, scilicet ob eam rem, quod pulmo eorum fungosus est, parumq; potus desiderant, & quantum excrementi consisterit, in corpus & corticem uertitur, ut auib; in pennas. Sed in ijs quæ uesicam habent, & pulmonē sanguineū, humidus est, tum ob eam quam modo diximus causam, tum quia partitis sinistra natura humidior & frigidior est. contrarium enim quodq; ad sibi cognatum ordinem dispositū est. uerbi gratia, dextrum sinistro cōtrarium est, & calidum contrarium frigidum. itaq; modo quem diximus, sociantur. Renes nulla necessitate habentur, sed ut melius & locupletius sit, humoris enim excrementi gratia, qui confluit in uesicam, adiuncti sunt ex sua natura, in quibus plus huiusmodi sedimenti fieri solet, ut uesica melius suo munere fungeretur. Sed cum usus eiusdem causa renes atq; uesica habeantur, differendum nunc de uesica est, prætermittā sequente partium enumeratione, de præcordijs enim nondum docuimus, quæ pars uiscerum rationi coniuncta est.

Quibus animalibus data sit uesica, deq; eius officio, & situ in corpore animantiū. Cap. VIII



Uesica non omnibus animalibus data est, sed ijs tantū tribuere uoluisse natura uidetur, quæ pulmonem haberent sanguineū, idq; recta ratione, calor enim excessu, qui in eo ipso membro cōtinetur, subunda hac omnium præcipue animalū sunt, cibiq; indigent, non modo sicci, uerumetiam humidi copiosiores, itaq; excrementū etiam copiosius contrahi necesse est: nec solum tantum, quantum à uentre concoqui excerniq; cum eius excremento possit, ergo huius quoq; excrementi conceptaculū quoddam haberi necesse est. quam ob rem omnia quæ talem habent pulmonē, uesicam obtinent, quæ autem tali carent pulmone, & uel parum bibunt, quoniam fungosum pulmonem habeant, uel omnino potum assument, non potus, sed cibi gratia ut insecta, & pisces, uel etiam quæ penna, aut squama, aut cortice integuntur, hæc rum propter humoris assumpti exiguitatem, tum quia quantum excrementi contrahitur in ea ipsa absumatur, uesica omnia carēt, excepta testudine inter corticata: in hac enim tantūmodo natura castrata est. Cuius rei causa est, quod marinæ testudines pulmonē habent carnosum, sanguineū, & similem bubulo, terrestres autem proportionē maiorem. superficies etiam, quia obdensa præduraq; modo silicis est, facit ne humor diffari euaporariq; possit per carnem laxiorem: ut auib;, serpentibus, ceterisq; operitis cortice euenit, atque ita excrementi copia tanta subsider, ut eorum natura conceptaculum & uas quoddam capax humoris desideret. uesicam igitur testudo sola inter hæc habet, ea de causa, scilicet marina amplam, terrestres exiguam admodum.

De renibus, & eorum officio, quibusq; animalibus dati sint. Caput IX



Enum etiam ratio similis est, nullum enim pennatum, nullum squamarum, nullum corticatum, excepta testudine, renes habet. quancq; in nonnullis auib; carunculæ quædam sint latiusculæ, speciem renum ostendentes, quasi ea caro quæ renibus delegata est, locum non habeat, sed in plura dispersa sit, genus tamen testudinis quæ lutariam uocant, & uesica & renibus caret. sit enim propter eius mollitudinem tegminis, ut humor facile diffusetur, lutaria igitur ob eam causam neutram earum partium habet.

## ARISTOT. DE PART. ANIMALIVM

cæteris animalibus quæ sanguineum (ut dictum est) habent pulmonem, renes omnibus natura tribuerat. quippe quæ simul & ad uenas continendas ijs uteretur, & ad humorem superuacuum excernendum abuteretur. meatus enim de uena maiore ad renes usque perfertur. Cauum in omnibus inest renibus, aut amplius, aut arctius, præterquam in uitulo marino, eius enim renes bubulis similes, omnium firmissimi ac solidissimi sunt. hominum etiam renes bubulis similes sunt. quippe qui tanquam compositi ex multis renibus exiguis constent. neque æquabiles sunt, quomodo renes ouium, cæterarumque quadrupedum habentur. quo fit, ut morbus eorum difficile curari hominibus possit, etiam si nuper ægrotare inceperint. accidit enim ut quasi multis renibus laborent, difficilius remedium adhibeatur, quam si uno infectarentur. Meatus qui ex uena pertendit, non cauum subit renem, sed in eorum corpus absumitur. quam ob rem in cauis eorum nihil sanguinis continetur, neque concreuit mortuis. Meatus uero de cauis renum exangues duo insignes ad uescicam feruntur, singuli ex singulis. atque etiam alij ex uena aorta ualidi frequentesque eodem deueniunt. quæ ita natura instituit, ut ex uena humoris excrementum ad renes ueniret. in renibus autem sedimen humoribus per corpus renum colatis, in medium conflueret, ubi plurimum cauum continent. quo fit, ut renes omnium maxime uiscerum fœdum reddant odorem. tum deinde ex medio per eos meatus in uescicam iam magis magisque tanquam excrementum secernitur atque reijcitur. uescica ipsa ex renibus dependet. tendunt enim in eam, ut dictum est, ualidi meatus. Renes his de causis habentur, & uirtutes, quas diximus, obtrinent. Omnibus autem quæ renes habent, dexter superior sinistro est. quod enim motus ex parte dextra proueniat, naturaque dextræ proinde ualidior sit, ideo partes omnes mouendi causa uergant ad situm potius superiorem oportet. nam & supercilium dextrum magis attollitur, & arcuatū magis, quam sinistrum habetur. Tangitur in omnibus à iecore dexter, quod elatior est. secur enim parte dextra positum est. pingue plenius renes ambit, quam reliqua uiscera. quod & necessarium fit, cum excrementum per renes transmissum coletur. quantum enim relinquitur sanguinis puri, facile concoqui potest. finis autem probæ concoctionis sanguineæ, adeps & seuum est. Ut enim in combustis siccis uelut cinere aliquid ignis relinquitur, sic in concoctis humidis non nihil caloris, qui effecerit, relinquitur. quo fit, ut pingue leue sit, & humoribus resideat, atque fluat. fit non intra ipsos renes, quoniam densum hoc uiscus sit, sed circum renes est, uidelicet aut adeps in ijs, quæ pinguescere adipe solent, aut seuum in ijs, quæ seuo opimantur. quorum differentia alio loco explicata est. necessarium igitur ea de causa pinguescunt, scilicet ex ijs quæ necessarium eueniunt animalibus, quæ renes habere debuerunt. Salutis autem causa, ut renem natura calida sit. Cum enim positi loco ultimo sint, teporem desiderant ampliorem. tergum enim carnosum est, ut cor, & re qua partis superioris uiscera protegat. At lumbi carne uacant, ut flexi possint. omnium enim flexus ex carne sunt. itaque uice carnis adipe renes obsepti muniuntur. Quinetiam humorem melius discernunt, & concoquunt sua pinguedine. pingue enim omne calidum est. calor autem concoquit. renes his de causis pingui operiuntur. dexter omnibus minus pinguis, cuius rei causa est, quod natura dextræ partis siccior est & mobilior. motus autem contrarius est: liquat enim pinguedinem & consumit. sed cum cæteris animalibus renes habere pingues proficiat, & plerumque rotos obesos habeant, ouibus hoc letale est. quo fit, ut quanquam pingues admodum sint, tamen aliquid desit, & si non utrique, dextro quidem, causa cur hoc solis, aut maxime ouibus accidat, quod ijs quæ adipe pinguescere solent, pingue humidum est. itaque non æque flatu interclusi dolorem faciunt, quod causa syderationis est. quam ob rem hominibus etiam qui uitio renum laborant, quamquam

quam pinguescere iuuat, tamen si pingues admodum efficiantur, dolores profecto accidunt letales. Carteris autem etsi seuo pinguescunt, tamen seuum minus densum quam ouibus fit. Copia etiam seui genus ouium longe excedit. omnium enim animalium oues celeri renum obesitate opulentur. itaque humore flatuque intercluso celeriter praesyderatione intereunt. namque per uenam aortam & maiorem, statim uirtum ad cordis sedem transuehitur. meatus enim ex istis uenis ad renes continui pertendunt. sed de pulmone, de corde, de iecore, de liene, & de renibus dictum iam est.

De septo transuerso, siue praecordij, & eius officio.

Caput X



Eparantur haec inter se septo transuerso, quod nonnulli praecordia appellant. determinat hoc a reliquis pulmonem & cor. id autem septum transuersum praecordia in sanguine praeditis, ut modo dixi, uocatur. habent hoc omnia quae sanguinem obtinent aequae ut cor, & iecur. cuius rei causa est, quod ideo habetur, ut sedem cordis a uentre dirimat, uidelicet ut animae sentientis origo inoffensa seruetur, nec facile occupetur exhalatione cibi, & caloris aduentitij copia. hac enim causa natura interceptis praecordiorum, quasi parietis sepiusque interuentu, distinxitque partem nobiliorem ab ignobiliori. in quibus superioris, inferiorisque ratio posset haberi. superius est enim cuius gratia res liqua sint, quodque melius sit. inferius autem quod eius gratia sit, & conceptaculum cibi necessarium. Annectitur hoc septum siue cinctus costis parte sui carnosiore, ualidioreque. media autem constat membrana exiliori. ita enim & ad robur, & ad praerentum commodius est. contra calorem se efferentem hoc ueluti sobolem esse, argumentum ex istis quae plerumque accidunt, ducitur. ubi enim propter uiciniam attraxerint humorem calidum atque excrementum, continuo mentem sensumque plane perturbant. quam ob rem phrenes appellantur, quasi participes prudentiae sint. atqui nullatenus participes sunt, sed quia propinqua sunt istis quae uim obtinent illam, (cordi enim praetenduntur) hinc mentis mutationem aperiunt. quam ob rem renues parte sui media sunt, non modo de necessitate, quod cum carnosae sint parte sui costis admota, carnosiores esse necesse sit: uerum etiam ut minus uaporis excipiant. nam si carne pleniore constarent, copiam uaporis & haberent, & traherent. partem hanc calefactam celeriter sensum aperire indicat, uel id quod titillatur euenit. ridet enim celeriter qui titillatur, quia motus celeriter ad eum locum perueniat. qui quanquam leuiter calefaciat, tamen aperit, & mentem mouet praeter uoluntatem. causae autem cur homo animalium unus titilletur, & cutis tenuitas est, & quod solus omnium animalium rideat. est enim titillatio risus per eiusmodi motum partis, quae alam complet. ictu etiam traiecta praecordia in praestis risum attulisse proditum est, scilicet calore, quem moueat uulnus. hoc enim uerisimilius credi potest, quam quod de capite referunt, ut abscissum loqui poterit. Sunt enim qui hoc dicant, Homerumque testem adhibeant, quasi ob eam rem illud dixerit. Ipseque dum loquitur, miscetur puluere uertex. non enim dum ipse homo, sed dum ipse uertex intelligi uolunt. In terra Caria, res adeo pro uera habita est, ut reum quendam ex incolis egerint. Cum enim Iouis Hoplosimij sacerdos esset occisus, & a quo non constaret, nonnulli sese audiuisset retulerunt, capite praeciso dicente sapientius, uirum super uiro Cercidas occidit. itaque hominem cui nomen Cercidas in provincia quaesierunt, compertumque in iudicium duxerunt. sed fieri non potest, ut caput praecisa arteria, & sine motu pulmonis loquatur. nec apud Barbaros qui capita summa cum celeritate abscindunt, tale quid unquam euenisse accepimus. Ad haec, in car-

*Septum praecordij  
de uulnere  
segor, id est  
media autem  
constat membra  
branosiore.*

ARISTOT. DE PART. ANIMALIVM

ris animalibus cur id non aliquando fiat? risum enim ijs nunquam præcordijs traiectis moueri consentaneum est, cum ridendi ui careant. At capite absciso ne suam uocem aliquando emittant, quidnam prohibeat? Corpus tamen detractio capite progredi quoquã non temere credi potest. nam ea quidem quæ sanguine carent, uel uiuere diutius possunt truncata capite. cuius rei causam alio loco docuimus. Sed cuiusnam gratia singula uiscerum habeantur, explicatum iam est. Extremis autem uenarum interioribus hæc necessariò adiunguntur. uaporem enim prodire, eumque sanguineum necesse est, ex quo consistente conrescenteque uiscerum corpus contrahatur & coagmentetur. quapropter sanguinea hæc sunt omnia, & naturam sibi consimilem, cæteris dissimilem habent.

10

De membranis, & earum officio.

Caput XI



Membris omnia uiscera includuntur, pro tegmine enim opus est, quo illæsa seruantur, eoque leuiori. membrana autem talis suapte natura est, quippe quæ & densa sit, ut arcere possit, & carne uacet, ut uaporem nec trahat nec habeat, & tenuis prætendatur, ut leuis sit, & nihil ponderis afferat. Maxime inter membranas & robustissimæ sunt, quæ cor aut cerebrum ambiunt, idque optima ratione. hæc enim præcipuam tutelam desiderant. tutela enim partibus adhibenda principalibus est. hæc autem principatum maxime uitæ obtinent.

20

Non omnia uiscera omnibus animalibus inesse.

Caput XII



Abest animalium quædam omnem uiscerum numerum, quædam non omnem, quæ sint hæc, & quam ob causam, dictum iam est. & uarie uero hæc habentur, neque enim cor simile habent ea quæ corde prædita sunt, neque aliud prope dixerim ullum. Iam enim iecur alijs multum est, alijs simplicius in eorum genere quæ sanguinem habent, & uiuipara sunt, sed longe magis piscium iecinora, & quadrupedum, & ouiparorum, tum inter seipsa, tum ab ijs quæ modo diximus, dissident. Auium iecur maxime simile est iecori uiuiparorum. puro enim & sanguineo colore exhilaratur, ut illud. cuius rei causa est, quod auium corpora dissilari, euaporarique optime possint, nec multum habeant excrementi uitiosi, quo etiam sit, ut nonnulla ex uiuiparis felle careant. Iecur enim ad temperiem, sanitatemque corporis multum confert, finis namque eorum in sanguine potissimum situs est. Iecur autem omnium uiscerum, excepto corde, sanguine refertissimum est. At uero quadrupedum ouiparorum, & piscium iecinora maxima parte pallidiuscula sunt. nonnullorum etiam uitata omnino, ut corpora quoque eorumdem prauum temperamentum fortuantur, uelut rubetæ, testudinibus, & similibus. Lienem bisulca inter cornigera habent rotundum, ut capra, ouis, & reliqua omnia, nisi aliqua pro sua magnitudine auctiorem in longitudinem habeant, ut boues. At multiformis prolixus omnibus est, ut homini, cani. Solipedibus autem medium tenet, & promiscuus est. partem enim alteram habet latam, alteram angustam, ut equo, mulo, asino.

30

40

Differentia uiscerum à carne.

Caput XIII



Differunt uiscera à carne non modo sua corpulentia, uerum etiam eo quod caro foris posita est, uiscera intus continentur, cuius rei causa est, quod naturam communem cum uenis habeant, & partim uenarum gratia sint, partim non sine uenis esse possint. Subest præcordijs uenter, quæ gula definit, si habetur; si minus, ori adiungitur.

De intestino



De intestino, &amp; uentre, eorumq; officio, &amp; locis concoctionis. Caput XIII



Entri intestinū annexum est, sed quam ob causam partes has anima-  
 lia habeant omnia, nulli dubium est. Cibus enim & ingestum reci-  
 pere, & euapora:ū eiſcere, neq; eundem locum esse cibi concocti, &  
 excrementi necesse est. conceptaculū etiam adesse in quo cibus mu-  
 tetur oportet. pars enim alia cibum ingestum complecti, alia excre-  
 mentum, materiamq; superuacua capere debet. quarum actionum ut tempus di-  
 uersum est, sic loca etiā diuersa haberi necesse est. Sed de ijs aptius differemus, cum  
 de generatione & alimento agetur. nunc de differentia uentris & partium eodem  
 10 pertinentiū considerandū est. Ventres enim nec magnitudine neq; specie similes  
 inter se sunt, sed quā in sanguineo genere utrinq; dentata & uiuipara sunt, hec sim-  
 plicem habent uentrem, ut homo, canis, leo, & reliqua quorum pedes in plures di-  
 gitos finduntur, & quā aut solipeda sunt, ut equus, mulus, asinus: aut bisulca qui-  
 dem, sed utraq; parte dentata, ut sus. nisi aliqua præ sui corporis magnitudine aut  
 difficultate, cibi non ad concoctionē idonei, sed spinosi, & lignei, multiplicem ha-  
 beant, ut camelus: quemadmodū cornigera habent: quippe quā non utraq; parte  
 dentata sint, & camelus quidem (quāq; cornibus caret) ideo non superne dentata  
 est, quod ei magis necessariū est uentrem talem habere, quā dentes priores. cum  
 itaq; uentrem similem non utrinq; dentatis habeat, dentes etiam simili modo sorti-  
 20 rur, utpote parum necessarios. quin etiam cum cibus durus spinosusq; sit, & tamen  
 linguā esse carnosam necesse sit, natura dentium portione terrena ad palati callum  
 atq; duritiā abusa est. Ruminat etiam camelus more cornigerorū, quoniam uen-  
 tres similes cornigeris habeat. Habēt hæc singula plures uentres, ut ouis, capra, cer-  
 uus, & similia, ut cum officium oris non satis in molendo cibo adhibetur propter  
 inopiam dentiū, munus uentrium expleat, dum alius ab alio cibum recipit, scilicet  
 primus inconfectum, secundus aliquantulum confectum, tertius plenius, quartus  
 perquam plene confectum. ita sit, ut genus hoc animalium receptacula cibi habeat  
 plura, quibus nomina hæc aut indita sunt, aut indere licet, uenter, ar sineū siue reti-  
 culum, omasum, abomasum. Quonam modo hæc se habeant, tum situ, tum etiam  
 30 specie, ex historia dissectioneq; animalium petendum est. Hæc eadem causa est, ut  
 autum quoq; genus partem, qua cibum recipit, uarie habeat. cum enim id oris of-  
 ficio, quod cibo conficiendo tribuitur omnino careat, ut quod nullos habeat den-  
 tes, & neq; quo dirimat, neq; quo molat cibum obtineat, idcirco aut ante uentrem  
 sinum habent, qui ingluuiēs appellatur, pro oris officio, aut gulam patentiorē, aut  
 ante uentrem partem aliquam gulæ ipsius sinuosam, in qua cibum recentem & in-  
 confectum recondant, aut uentris ipsius partem aliquam prominentem, aut etiam  
 uentrem ipsum ualidum & carnosum, ut cibum immoliturū diu continere, & con-  
 coquere possint. bonis enim uiribus uentris, & calore natura defectum oris repen-  
 dit, & compensat. Sunt quæ nihil ex ijs habeant, sed ingluuie prolixa utantur, sci-  
 40 licet ea quibus crura prælonga & laxa sunt, propter cibi humiditatem. causa igitur  
 est, quod cibus ijs omnibus moli & confici facile possit, ut eorū uentres per facilem  
 cibi concoctionē humescant. Piscium generi dati sunt dentes, sed serrati propē dix-  
 rim omnes. genus enim quoddam exiguum est, quod non serratos habeat dentes,  
 ut qui scarus uocatur, qui unus & ruminare merito ob eam rem credit. quæ enim  
 non utrinq; dentata cornigera sunt, ruminant. habent omnes acutos, quibus & si  
 cibum secare possunt, tamen male secant, quod diutius immorari nequeant. quam  
 ob rem nec planos habēt dentes. non enim fieri potest, ut deterant cibum. itaq; fru-  
 stra haberent. Item stomachum alij nullum omnino habent, alij breuem, sed enim  
 ad concoctionem iuuandam alij modo autum uentriculos habent, & carnosos, ut  
 mugilis. Maior autē numerus appendices iuxta uentrem frequentes obtinet, ut in

ijs quasi lacunis cibum conditū macerent, atq; concoquant, sed pisces contrā quā  
 aues eas appendices sitas habent, quippe qui superne habeant ad uentrē: cum aues  
 quibus datū hoc est, infrā parte intestini extrema diffument, uiuiparorū etiam nō  
 nullis appendices intestinales infrā eadem de causa habentur, genus piscium omne,  
 quoniam cibum minus conficere possit, crudaq; egerat, & uorax & gulosum est,  
 cætera etiam omnia quibus intestina sunt recta, ciborū auida sunt, cum enim cibis  
 celeriter egeratur, proindeq; brevis usus fruendi sit, breui repetāt cibum auida ne-  
 cesse est, Quæ utrinq; dentata sunt, paruum habere uentrem dictum iam est, diffe-  
 rentiam autem duplicem ferē omnia recipiunt, alia enim canino similem habent,  
 alia suillo, amplior uenter suillus est, flexuosusq; ut diutius cōcoquat, caninus par-  
 uus est, nec multo amplior intestino, laxiusq; intus, A uentre natura intestinorū po-  
 sita est in omnibus animalibus, habet & ea differentiam, ut uenter numerosiorem,  
 alijs enim simplex intestinū, sibiq; simile resoluitur, alijs dissimile, quibusdam enim  
 parte qua uentri iungitur, laxius est: qua desinit, arctius, Quam ob rem canes uehe-  
 menti nixu, nec sine cruciatu eam partem leuant excremento, sed tamen maiori ani-  
 malium numero arctius parte superiori est, latius inferiori, maiora multiplicabiliora  
 raq; sunt intestina cornigerorū, uentris etiam sinus eorum amplior, quod auctiora  
 sint, cornigerorū enim propē dixerim omnia ampliora sunt pabuli ratione, ut confi-  
 ciant, quod sibi ingerunt in confectum, Quibus autem intestinū non directum, ijs  
 omnibus amplius tendit, quā & quod colum uocatur, habent, & cæcum, ac tumi-  
 dum quiddam mox arctatur, & complicatur, ab hoc rectum ad exitum usq; excre-  
 menti pertendit, quæ quidem pars, quam podicem uocant, alijs pinguis, alijs sine  
 pingui est, Quæ omnia natura solers molita est ad congruam cibi confectionē, &  
 excrementi usum, & transmissionē, procedenti enim descendentiq; excremento,  
 aut subsistenti, ut immutet in animalibus, quæ præ magnitudine aut locorū calore  
 uegetiora, cibiq; plenioris indigentiora sint, uia ampliatur, tum, ut uentrem inte-  
 stinum angustius excipit, sic à colo, quod laxum intestinū uocatur, & alui amplitu-  
 dine rursus semitam angustiorē, clauiculam à flexuosis orbibus dictam, subit excre-  
 mentum iam penitus euaporatū, ut natura seruetur, nec uniuersim exitus fiat ex-  
 crementi, Quæ igitur animalia continētiora esse ad cibi desiderium conuenit, hæc sua  
 in aluo laxiores sinus non habent, sed anfractus, orbesq; plures continēt, nec recto  
 intestino utuntur, laxitas enim intestini auiditatē augeat cibi: rectitudo accelerat autē  
 ditatem, quam ob rem animalia, quæ uel simplex habent intestinū, uel cōceptacula  
 ampla, cibum aut copiosum capiunt, aut celerius repetunt, Sed cum in uentre su-  
 periore cibum ingestū recentem esse necesse sit, in imum autē delapsū feculentū,  
 euaporatūq; locum etiam aliquem interpositū esse, in quo immutet, & nec recens  
 adhuc, neq; iam exactus in sterqus sit, necesse est, itaq; genus id animalium omne ha-  
 bet eam partem, quæ ieiuniū uocatur, positā in eo, quod à uentre tenue tendit, in-  
 testino, hoc enim mediū est inter uentrem superiorē, in quo cibis crudis adhuc sit,  
 & inferiorem, in quo iam superuacuum excrementū contineatur, hoc cum in omni-  
 bus ita sit, tum in ijs patet, quæ & maiora sint & ieiunarint, ita enim interstitium loci  
 utriusq; conspicitur, nam si æderint, mutationi parum temporis suppetit, Sed for-  
 minis pars nulla certa superioris intestini ieiuna est, alia enim alijs, ut fors tulerit,  
 Maribus autem proxime ante cæcum aluumq; omnibus est.

*Quæ coagulum habeant, quæ non, & de eius loco.*

Caput XV



Abent, quod coagulum uocatur, omnia quæ plures continent uentres,  
 carent quæ unum habent, excepto lepore, habent quibus hoc datum  
 est, non in magno uentre, nec in reticulo, neq; in ultimo, quod aboma-  
 sum appellauimus, sed in eo qui inter ultimum & duos primos positus  
 est,

est, quod omasum uocatur. habent hæc omnia coagulū propter lactis crassamentū. carent quibus singuli uentres, quod eorū lac tenuē sit. quam ob rem cornigerorū lac spissatur, mutilorū nequaquā. lepori coagulū sit, quoniam herbam succi lactei pascatur. talis enim humor lac in uentriculo infantū stringit, facitque colostrum. Cur coagulū in omaso multiuentriū consistat, explicatum in problematibus est.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

PARTIBVS ANIMALIVM ET EARVM CAVSIS,

LIBER QVARTVS, INTERPRETE

THEODORO.

*Viscera & uentrem, ceteraque superius exposita in quadrupedibus ouiparis, & ijs quæ pedibus carent, eodem modo haberi, at in nonnullis alijs differri. Caput I*



IS CERA, uenter, & reliquæ quas exposuimus partes, modo eodem in quadrupedibus ouiparis, & in ijs quæ pedibus carent, ut serpentibus, habentur. natura enim serpentū cognata ijs est: quippe quæ similis sit lacertæ prælongæ, ac expedi. his uero & piscibus omnia similia sunt, nisi quod pulmo serpentibus datus est, quoniam terra utantur. pisces eo carent, & branchias uice pulmonis sortiuntur. Vesica nec piscibus, neque eorū ulli quæ modo dixi, adiuncta est, nisi testudini. humor enim ijs in corticem regentē, ut auibus in pennas absumitur, cum exiguo potu cōtenta sint, propter exanguem pulmonis naturam, & quidem excrementū alui ijs quoque omnibus albicat, quem admodum auibus. itaque ijs quæ uescicam habent, exempla urina, fæugo quædam terrena in uasis subsidet. quantum enim dulce & potulentū sit, in carnem præ sua leuitate absumitur. uiperæ inter serpentes eadem à cæteris sui generis differentia discrepant, qua inter pisces cartilaginea à cæteris sui generis. Nam & cartilaginea, & uiperæ animal ædunt in lucem, ubi primum intra se oua pepererint. uentres singulos hæc quoque omnia habent, ut cætera quæ utrinque dentata sunt. lienem etiam admodum parū, ut cætera quæ carent uescica. serpentes propter corporis formam, quæ longa est & angusta, speciem quoque uiscerum habent prolixam, & cæteris animalibus dissimilem, ut quam ad sui corporis opificium, quasi formulam effigiarum fortiantur. Omentū, lactes, & intestinorū naturā, atque etiam seprum, & cor, omnia animalia sanguine prædita obtinent. Pulmonē atque arteriam omnia præter pisces. situm etiam arteriæ, gulæque, omnia quibus hæc data sunt, similem tenent propter causas supradictas.

*Quam ob causam animalium alia fel habeant, alia non. Caput II*



El etiam habet maior pars animalū, quibus sanguis: idque aut in iecore, aut intestinis sepositum, ut quod suam naturā non minus aluo familiarē habeat. hoc ita esse maxime in piscibus constat. Cum enim pisces fel habeant omnes, tum magna ex parte suis intestinis annexum continent. nonnulli etiam toto intestino prætextum, ut amia. Necnon serpentum pars maxima eodem modo habere cernitur. quā ob rem qui fellis naturā sensus alicuius gratia esse opinatur, non recte sentiunt. uolunt enim ideo fel adesse, ut partē animæ sitam in iecore mordendo excitet, laxando exhilaret. Quædā felle omnino carent, ut equus, mulus, asinus, ceruus, dama, camelus non discretum, sed uenulis quibusdā confusum habet. uirulus etiam marinus caret, & inter pisces ma-

rinos delphinus. Sunt & quæ partim habeant, partim non habeant eodem in genere, ut mures, quod idem homini etiam accidit. aliqui enim fel in iecore habere uidentur, aliqui carent. itaq; de toto genere ambigitur. qui enim alterutrū compereant, idem omnibus tribuunt, quasi omnes eodem habeant modo, quo aliqui. hoc idem ouibus etiam caprisq; euenit. pars enim earum maxima habet fel: & quidem terris quibusdam adeo large, ut exuperantia prodigij loco habeatur, ut in Naxo. sed alijs quibusdam locis omnino careat, ut apud Calchidem Euboicam parte quadam agri. Ad hæc, piscium fel (ut dictum est) longe remotū à iecore est. Anaxagoras errore opinari uidetur fel esse morborū causam acutorū. cum enim abundat, aspergi in pulmonem, & uenas, & costas asseuerat. ipsi namq; ferè accidunt ea uitia animalibus, quæ felle carent. diffectis etiam id pateret, si ita esset. Ad hæc, copia humoris, quæ per abscessus decumbit, conferri non potest cum eo, quod ex fellis cor. ceptaculo aspergatur. Sed enim ut bilis, quæ qualibet alia corporis parte gignitur, excrementum quoddam liquamentūq; est, sic fel iecori adiunctum non rei cuiquam delegatum, sed excrementum esse uidetur, quomodo & alui, intestinorūq; sedimen. Atamen natura cōmode uel excrementis suis interdum abutitur. sed non propterea querere omnia alicuius causa debemus. cum enim aliqua eiusmodi sint, sit, ut alia complura necessariò causa eorum proueniāt. Quibus igitur iecoris constitutio salubris est, & sanguinis natura quæ iecur subeat dulcis accedit, hæc aut nullum fel suo in iecore habent, aut uenulis quibusdā inclusum continent, aut partim habent, partim non habent. quam ob rem iecinora eorū quæ felle uacant, dulcia sunt, probeq; colorata propè dixerim omnium. particula etiam iecoris quæ felli subdita est dulcissima est. at uero quæ sanguine minus puro consistunt, hæc excrementū id quod fel appellamus, semouent, excrementū enim contrarium alimento esse uult, & amarum dulci. & sanguis integer dulcis est. fel igitur non alicuius gratia, sed purgamentum atq; inutilem esse materiam constat. quam ob rem pulchre à ueteribus dicitur illis, qui causam, cur diutius uiuatur, fellis uacuitatem esse aiunt: argumento ex solipedum, ceruorumq; genere deducto, hæc enim & felle uacant, & diu uiuūt. Quinetiam ea quæ illi non uiderint felle carere, ut delphinus, ut camelus, longæ uia sunt. iecoris enim naturā ut opportunā ac necessariā omnibus sanguineis animalibus causam pro sua qualitate asferre, uiuendi plus minus ue temporis ratio est. excrementū etiam tale huius uisceris esse, cæterorū autem nullum, ratio exigit. Cordi enim nullus eiusmodi humor appropinquare potest: quoniam illud affectum nullum patitur uolentium. cæterorū autem uiscerū nullum necessariū animalibus est, nisi iecur. absurdum autē sit, nisi ubicunq; pituitam, aut alui sedimen uideris, excrementū id esse putes. pariq; modo de bile fellēue censeas. sed locis discrimen elicere uelis. At de felle quam ob causam alia habeant, alia non habeant, satis dictum est.

De omento, &amp; eius ortu, &amp; officio.

Caput III



Estat ut de lactibus, & omento disseramus. hæc enim hoc in loco, & cum intestinis continentur. Omentum membrana est aut seuosa, aut adiposa, scilicet utro modo pinguescere animal solet. Quænam differentia inter hæc sit, dictum iam est, oritur id de medio uentre, tam uni uentri, quam multiuentri generi, qua ueluti futura describitur. inest enim & in uentre, ut in corde futuræ uestigium quoddam, unde omentum exorsum reliquā uentris partem, cunctaq; intestina complectitur in omnibus sanguine præditis, tum terrestribus, tum aquaticis animalibus. ortus omenti talis necessariò euenit. cum enim sicca aut humida miscella calefcit, ultimū semper cutis membrana ue speciem recipit. hic autem locus plenus alimenti eiusmodi est. Item propter membranæ

membranæ densitatem quod sanguinei alimēti transmissum, colatumq; est, id pingue esse necesse est, tenuissimum enim hoc est, & calore loci istius concoctum pro carnosâ & sanguinea coagmentatione in seum aut adipem euadere necesse est. Omentum ratione hac gignitur, sed natura eo abutitur ad cibi meliorē concoctionem, ut facilius celeriusq; cibus concoquatur. calor enim uim habet concoquendi, pingue autem calidum est, & omentum pingue est. itaq; de medio uentre oritur, quoniam reliquam uentriculi partem iecur insidens fouet, hæc de omento.

*De lactibus, & eorum ortu, & quam ob causam animalibus sanguine præditis data sint.*

Caput IIIF

10 **Q**UOD autem lactes uocant, membrana & ipsum est, pertendens continua de intestinorum tenore ad uenam usque maiorem, & aortam, plena uenarum multarum atque frequentium, quæ ab intestinis ad uenam maiorem, aortamq; permeant. Ortum eius similiter atque cæterarum partium necessario esse comperimus. Sed quam ob causam data sit animalibus sanguine præditis, considerandum est, cum enim necesse sit, ut animalia cibum extrinsecus capiant, rursusq; ex hoc alimentū fiat, quod in omnes corporis partes digeratur. quod in exanguibus nomine uacat, in sanguineis sanguis appellatur. ideo aliquid adesse oportet, quo tanquam radice cibus de uentre ad uenas deferatur. Itaque ut stirpes radicibus terræ innixæ cibum inde hauriunt, sic animalibus uenter & intestinorum uires pro terra sint, à quibus capiant alimentum. quam ob rem lactes sunt, uenas sibi inditas habētes quasi radices. Sed cuius rei gratia lactes habeantur, dictum iam est. Quemadmodum autem capiant alimentum, & quonam pacto per uenas ex alimento ingesto subeat eas partes, quod in uenas digeritur, explicabitur, cum de generatione alimētoq; animalium agemus. Sed enim ut animalia sanguine prædita constant partibus, quæ declarata adhuc sunt, & quas ob causas, dictum iam est: sequitur quod & reliquum est, ut quæ ad generationē pertinent, quibus scēmina differat à mare, exponamus. Sed quoniam de generatione tractandum est, de ijs quoq; tunc differere, cum de illis tractamus congruum est.

*μεσὸν τῶν ὀστέων, lactes.*

30 *Mollia, crustacea, testata, & insectorum genus omnibus supradictis membris carere: deq; ijs, quæ uice eorum fungantur.*

Caput V

40 **Q**UÆ autem mollia, quæq; crustata uocantur, plurimum ab ijs quæ explicauimus differunt. iam enim omnem uiscerum naturam ea nō habent, nec ulla ex reliquis quæ sanguine carent, quæ duo genera sunt, alterum quod testa contegitur: alterum quod insectum uocatur. sanguinem enim ex quo uiscerum natura cōstat, nullum ex ijs obtinet. quoniam affectus eiusmodi quidam eorū essentia proprius est. etenim sanguinem alia habere, alia non habere in ratione recipitur, quæ essentiam eorum definit. nihil etiam ex ijs, quorum gratia uiscera habent animalia sanguine prædita, datum eiusmodi animalibus est. non enim uenas hæc habent, non uescam, non usum spirandi, sed unum quod cordi proportionetur, id habeant necesse est. uis enim animæ sentiendi, uitæq; causa, parte aliqua corporis principium animalibus omnibus est. At uero partes ad uictum pertinentes ea quoq; omnia necessario habent, quamquam uarie, propter loca quibus cibū recipiant. habet mollium genus parte, quod os uocatur, binos dentes: atque in ore pro lingua carnosum quiddam, quo uoluptatem esculentorum discernat. Crustata etiā pari modo binos dentes habent primores, & carnosum illud quod lingua proportionetur. necnon testata omnia partem eiusmodi habēt eadem causa, qua sanguinea, uidelicet ad cibum sentiendum.

Quoniam etiam insecta simili ratione, aut promuscidem habent ore prodeuntem, ut apum, muscarumque genus, ut dictum iam est: aut in ore conditam partem eiusmodi possident, ut formicæ, & si qua alia sint generis eiusdem. Dentes quædam ex ijs habent, quanquam diuersos, ut apum, muscarumque genus: quædā non habent, quæ cibo utantur humido. insectorum enim complura non uicius, sed armorum gratia dentes obtinent. Testatorum autē quædam, ut principio diximus, linguam appellatam habēt robustam. Conchæ dentibus etiam binis fulciuntur, ut cruiata. Stomachus siue gula ab ore prælonga mollibus est, quam ingluuius excipit, quomodo auibus. tum uenter cōiungitur, & intestinum uentri annexum, simplex usque ad exitum tēdit. sepijs igitur & polypis uenter similis tum figura, tum tactu est. At ijs quas lolligines appellamus, bina quidem conceptacula uentris speciem gerunt: sed alterum minus ingluuiem imitatur, & tactu discrepat. quoniam corpus etiam totum carne molliore constat. habēt hæc ita eas partes eadem causa, qua aues. neque enim eorum ullum potest commolere cibum. itaque ingluuius uentri præiacet. Hæbent etiam præsidij salutisque gratia quod atramentum uocatur, tunica contentum membranæ, exitum finemque habens, quæ alui excrementa emittunt, parte quæ fistula uocatur, quæ in supinis posita est. sed cum atramentum hoc mollia habeant omnia, tum præcipue, plurimumque sepia continet. quoties enim metu perterrentur, hoc effuso humore aquam infuscant, sibi que nigrorem septum proponunt, & turbulentiam quasi quo se abscondant. habent hoc atramentum lolligines, & polypii supra apud mutim potius positum: sepia infra ad aluum. copiosius enim habēt, quoniam magis utantur. quod ijs propterea euenit, quia uitam littoralem traducunt, & tamen nihil quo sibi auxiliētur aliud habent, quomodo polypii & brachijs sibi sufficiunt, & coloris mutatione, quæ & ipsa accidit ei per metū, ut effusio atramenti. lolligo sola ex ijs gaudet alto, uitamque pelagicam agit. sepia igitur plus continet atramenti, & infra, quoniam copiosius. facilius enim & longius profunderē maiori ex copia poterit. sit in hoc genere atramentū, ut in auibus, quod per excrementum album terrenum subsidat. nam id quoque caret uesica, quantumque terrenum maxime sit, in atramentū secernitur. & plurimum sepia cōsistit, quoniam plurimum terrenæ materiæ habeat. argumento sepium est, quod tale tantumque sit, hoc enim polypus caret. lolligo cartilaginofum ac tenue gerit. Quam ob causam hoc alia habeant, alia careant, qualeque in utroque habeatur genere, dictum iam est. Sed cum exanguia sint, & ob eam rem refrigerata & pauida, hinc, ut hominum nonnullis per metum funditur aluus, aut excrementum uesicæ profluit, sic ijs accidit quidem necessario, ut metu perculsa effundantur. Sed natura hoc excremento ad præsidium & tutelam eorum abutitur. Crustata etiam tum locustacea, tum cancri, bimos dentes habent primores, & inter dentes carunculā linguæ effigie illam, ut dictum iam est: tum stomachum ori continuo iunctum, exiguum proportionē suorum corporum magnitudinis. hunc excipit uenter, in quo locustæ & cancrorum nonnulli dentes alios habent, quoniam superiores illi secare non satis queant. hinc intestinum simplex usque ad exitum excrementi dirigitur. Quinetiam singula testatorum genera has easdem obtinent partes, sed alia explanatius, alia obscurius: quanquam maiora conspectum earum præbeant euidentiore. Cochleæ igitur & dentes præduros acutosque habent, ut dictum iam est, & quod interiacet dentibus, carnosum similiter, ut mollia & crustata. promuscidem etiam, ut dictum est, inter aculeum & linguam. Ori autem iungitur quasi ingluuius auium, à qua stomachus est, quem excipit uenter, in quo situm est quod papauer uocatur, mox intestinū continuum tendit simplex, originem à papauere illo ducens. in omnibus enim testaceis inest hoc excrementum, quod uel esculentū esse præcipue sentitur. Cætera etiā turbinata,

ut

ut purpuræ, buccina, similiter ut cochleæ constant. Sunt testatorum genera plura. alia enim turbinata sunt. ut ea quæ modo dixi. alia biualuia. alia uniualuia. sed turbinata quoque biualuibz quodammodo assimilantur. quippe quæ omnia operculo quodam cōgenito, carni parulæ appposito claudantur, ut purpuræ, buccina, natices, & reliqua generis eiusdem. idque præsidij causa. quæ enim testa non protegit, facile offendi posset ab ijs quæ extrinsecus inciderent. Caterum uniualue genus, quod faxis testa in dorsum data adheret, seruari potest. fitque alieno sepro quodammodo biualue, ut quæ patellæ uocantur. Biualue se concludendo tuetur, ut pectines, ut mituli. turbinatū crusta illa prætenui, quæ à fronte integitur, quasi biualue ex uniualui efficitur. Echinus omnium maxime à natura munitus est: quippe qui testa undique spinis frequentibus circumuallata celetur. quam rem peculiarem hunc in genere testato fortiri diximus. Natura autem crustatorum contrā, quàm mollium constat. Altera enim carnis mollitiā extrā habet: altera intrā, hinc foris terrenam duritiā obtinet, quanquam echinus nihil habeat carnis. Igitur cætera quoque testata omnia, ut dictum est, habent & os, & linguæ effigiem, & uentrem, & ostium excremētī. sed interest situ & magnitudine. quæ singula quemadmodū se habeant, ex commentatione, dissectioneque animalū petendum est. quædam enim ratione, quædam cōspectu ipsorū potius declaranda sunt. Echini, & eorum quæ uertibula siue tubera appellauī, genus, peculiari modo præ cæteris constant testatis. Habent echini dentes quinos, & carunculā interpositam dentibus illam, quæ in omnibus supradictis est, cui stomachus iungitur. ab hoc uenter in plura diductus, perinde ac si plures numero uentres hoc animal habeat. Sūt enim omnes distincti, pleni que uacantis materiæ. ex stomacho uno dependēt, in unumque ostium excremētī finiunt. caro, ut dictum est, nulla est circa uentrem: sed quæ oua appellantur numerosiora testæ adherent, membranulis singula obuoluta, & paribus distincta interuallis. nigra etiam quædam circum ab ore fusim sparguntur, nomine adhuc nullo appellata. sed cum non unum, sed plura genera echinorum sūt, omnium partes quidem eas omnes fortiuntur. sed oua appellata, nec omnes cibo idonea, & parua admodū continent, exceptis ijs qui uada incolunt. omnino id ipsum cæteris quoque testatis euenit. caro enim non æque omnium esculenta est, & excrementū, quod papauer 30 uocatur, quibusdam cibo idoneum, quibusdam non idoneum est. continent hoc turbinata omnia sua clauicula: uniualuia suo fundo, ut patellæ: biualuia quā nodo ligantur. quod autem ouum uocatur, latere dextro biualuia habent, altero latere ostium excrementi continent. Sed errore ouum id uocatur, quippe quod tale sit, quale est pingue in sanguineo genere, cū uiget, quam ob rem fieri solet per id tempus anni quo uigent, scilicet uere & autumnō. laborant enim testata omnia per frigus & æstus, atque exuperantiā temporis pati nequeunt. argumento est, quod echinis euenit. habēt enim id iam inde ab ortu naturæ, & plenilunijs uberius: non quia per id tempus copiosius pascuntur, ut quidam putant, sed quod noctes tepidiores sint propter lucem pleniorē. Calorem enim desiderant, quoniam frigori 40 patent, utpote quæ sanguine careant. ex quo fit, ut æstate potius ubique uigeant, præterquam in Pyrensi Euripo. nam ibi non minus tempore hyberno probantur. Cuius rei causa est, quod tunc uberius pabulentur, cum pisces per id tempus ea loca relinquunt. Habēt echini omnes oua eodem numero, atque impari omnes. quina enim, dentes etiam, uentresque totidem. Ratio, quod non ouum est, quod ouum uocatur, ut modo dixi, sed quod bona animalis enutritioe alimoniaque proueniat. Fit ostreis quidem in altero tantūmodo latere, id quod oui nomine appellatur: idemque est, quod echinos habere dicimus. sed cum testa echini non modo cæterorū ostreorum orbem colligat unum, sed in globum circumagatur, ut nō partim talis, partim

non talis formetur, sed usquequaq; similis sit (undiq; enim in se nutibus suis congloratur) idcirco ouum quoq; simili modo habeat necesse est. nō enim ambitu, ut cætera, dissimili constat echinus. nanq; ijs omnibus caput in medio situm est. quam quidem corporis partem situm tenere superiorem certum est. Nec uero ouum habere continuum potest, quando neq; cætera generis eiusdem sic habent, sed altero latere tantum sui orbis. Ergo cum id commune omnium sit, proprium autē illius, ut globi speciem gerat, oua numero impari sint, necesse est. nam si par essent, per diametrum disposita haberentur, cum similem hinc atq; inde seruari rationem interualli conueniat. Sic autem dispositis utroq; latere orbis ouum haberetur, quod in cæteris ostreis non est. altero enim latere suæ oræ id habēt, & ostrea & pecūnes. itaq; terna, aut quina, aut quolibet alio numero impari esse necesse est. At si terna essent, diducta inter se laxo admodum interuallo haberētur. si plura quā quina, continuum propē ouum redderetur. quorum alterum nō melius est, alterum fieri non potest. Quina igitur oua echinos habere necesse est. quam ob causam uenter quoq; quinquepartitus est, & dentes totidē habētur. singula enim oua, cum quasi corpora quadam animalis sint, modum quoq; uiuendi similem habeāt necesse est. hinc enim capitur incrementum, nam si uenter unus tantummodo esset, oua aut longe distarent, aut totum alueum occuparent, ut echinus, & difficile moueretur, & cibi minus impleretur. Cum autem quinque numero interualla sint, uentrē singulis adiunctum quinquepartitum esse necesse est. eademq; de causa dētes etiam totidem habētur. ita enim natura similem rationem prædictis membris reddiderit. Sed quam ob causam oua numero impari, totq; numero echinus habeat, dictū est. Cur autem alij parua admodum, alij magna, causa est, quod natura constant alij alijs calidiorē, calor enim cibum concoquere plenius potest, quam ob rem qui cibo inutiles sunt, in ijs excrementi plus est. mobiliiores etiam facit natura caloris ut pascantur, nec stabiles maneāt. cuius rei indicium est, quod eorum spinis aliquid semper adhæreat, tanquam crebro moueantur. spinis enim ut pedibus utuntur. Veritibula autem parum sua natura à plantis differunt, sunt tamen spongijs uiuaciora: quippe cum spongiæ uires habeāt plantæ. natura enim continue ab inanimatis ad animalia transit per ea quæ uiuant quidem, sed non sint animalia, ita ut parum admodum differre alterum ab altero uideatur, propter suam propinquitatem. spongia igitur, ut dictum est, cum adhærendo tantum uiuere possit, absoluta autem nequeat uiuere, similis plantis omnino est. Quæ autem tubera uocant & pulmones, atque etiam plura eiusmodi alia in mari, parum ab ijs differūt sua ipsa absolute. uiuunt enim sine ullo sensu, perinde ac plātæ absolute. nam & in terrestribus plantis sunt nonnulla eiusmodi, quæ & uiuant & gignantur, aut in alijs plantis, aut absolute, quale etiam est quod modo Parnasus fert, uocatum à quibusdā epipetrum. hoc enim diu uiuere potest suspensum. Et uertibulum igitur, & quicquid generis eiusdem simile plantæ est, quia adhærendo tantummodo uiuit, sed cum aliquid habeat carnis, sensum aliquem habere uideri potest. itaque utro nam modo statuendum sit, incertum est. habet hoc animalis genus duo foramina, rimamq; unam, qua recipiat humorem cibo accommodatum, & qua rursus emittat quantum humoris remaneat. nihil enim excrementi ut cætera crustata hoc se habere ostendit. ex quo fit potissimum, ut & hoc, & quicquid simile in animalium genere est, planta in re appellari possit. Nec enim planta ulla habet excrementum. præcingi uero per medium tenui quadam membrana in qua uita principatus sit, ratio cōgrua est. Quas autem utricas appellant, non testa operiuntur, sed exclusæ omnino sunt ijs, quæ in genera diuisimus. ancipiti natura hoc genus est, ambigens & plantæ, & animalis. absolui enim, & escam petere nonnullas, & sentire occurrentia posse, atque etiam asperitate



asperitate corporis uti, ad se tuendū animalis est. At uero quod imperfectum sit, & faxis celeriter adhæreat, nec aliquid excrementi emittat manifeste, quanquam os habeat, plantarum generi simile est. Stellarum etiam genus simile est. quippe quod concharum complures aggrediens exugat. Ratio eorum, quæ inter exanguia absoluta uiuant, ut mollium crustatorumq; eadem atque testatorum est, partes igitur ad cibum accommodatas, quas omnibus inesse necesse est, eo quo explicauimus modo sese habent. Sed habeant certe illud quoque oportet, quod ei parti proportionetur, cui sentiendi principatus in sanguineo genere mandatus est. hoc enim in omnibus animalibus inesse necesse est. Ergo mollibus, id membrana cōtinetur humi-  
 10 midum, per quod gula in uentrem pertēdit, admota potius tergo. mutis id à nonnullis uocatur. Crustatis etiam tale quid alterum adiunctum est, quod & ipsum mutis nomine appellatur. humida, corpulētaq; ea pars est. tendit per eam mediam, ut modo diximus, stomachus siue gula. Nam si inter eam & tergum positus esset, distendi æque nō posset cibo ingrediente, propter dorsi duritiem. intestinum à mutē natura semouit, extraq; posuit, & atramentum intestino annexuit, ut quamplurimum distaret ab aditu, & pars sordida à nobili, & principe procul haberetur. partem hanc cordi proportionari & situs ipse ostendit, cum idem sit & dulcedo humoris, tanquam concocta, & sanguinea quædam. In crustatis etiam eodem modo sentiendi principatus habetur, sed minus patet. attamen in medio semper quarendum hoc principium est, aut scilicet inter partes, quæ cibum recipiunt, & quæ excrementum emittūt, si fixa degunt: aut inter dextram partem & sinistram, si incessilia  
 20 sunt. Insectis principij eiusmodi pars, ut antè diximus, inter caput & alueum est, quæ etsi magna ex parte simplex est, tamen nonnullis multiplex est, ut iulis, & similibus prælongis, quo fit, ut præcisa uiuere possint. natura enim partem hanc simplicem, unamq; tantum facere in omnibus uult, itaque ubi potest simplicem facit: ubi non potest, multiplicem. idq; in alijs minus, in alijs magis apertum est. partes autē quæ cibum administrant, non pari ratione datæ omnibus sunt, sed plurimum differunt. quibusdam enim in ore est, quod aculeus appellatur, quasi compositum, & unā linguæ ac labiorum obtinens potestatem. quibus autem aculeus non parte  
 30 priore habetur, ijs intra dentes tale sensorium continetur, idq; excipit intestinum rectum, simplex ad ostium usque excrementi porrectum. quibusdam hoc rerortum in anfractum est. Sunt etiā quæ uentrem ori adiunctum, intestinumq; à ventre reuolutum habeant, ut quæ edaciora maioraq; sunt, conceptaculum cibi obtineant copiosioris. Genus cicadarum peculiarem maxime omnium istorum naturam sortitum est. quippe quod partem eandem in usum tum oris, tum linguæ constitutam aptissime habeat, qua ueluti radice cibum ex humoribus trahat. nempe omne insectorum genus minimo alimento contentum est, & propè sibi ipsa sufficiunt, non tam corporis exiguitate, quàm frigiditate, quod enim calidum est, cibum & desiderat, & concoquit citò. contrā quod frigidum est, cibo carere facile  
 40 patitur. sed omnium maxime cicadarum genus ieiunum est. satis enim ijs alimentum est humor, qui in corpore remanet: sicut animalibus Ponticis, quæ non diutius quàm diem unum uiuere queunt, quanquam illis uita die uno perquam breui temporis spacio describitur. ijs plus temporis datur, tamen id quoque breue est. Sed cum de partibus animalium interioribus dictum iam sit, ad reliquas exteriores redeundum est, incipiendumq; non unde digressi sumus, sed ab ijs ipsis, quæ modo exposui, ut ijs expeditis quæ moram exigunt breuiorem, amplius in genere animalium perfectio, & sanguine prædito immoremur.



Rgo insecta animalia quanquam non partibus numerosis constant, tamen ipsa inter se dissident. quippe quæ cum omnia multos habeant pedes, quoniam contra tarditatem irigiditatemque naturæ eorum numerus exauctus pedum motionē efficiat faciliorem, tamen uarie numerum hunc fortiantur. quæ enim plurimum pro sui corporis longitudine frigent, numero præcipue superant, ut iulorum genus. Quinetiam quod principia plura habeant, hinc & infectiones sunt, & numerus pedum proinde augeretur. quibus autē pedes pauciores, hæc uolucres sunt, ut pedum inopia adiuu-  
 10 to pennarum compensetur. Ipsarum autem uolucrum quæ pascuis uiuant, & pabuli causa necesse habeant euagari, hæc quadripennes sunt, & corpulentiam habent leuiorem, ut apes, & reliqua generis eiusdem. binas utroque sui corporis latere pennas gerunt. At uero quæ corpore exiguo sunt, bipennes constant, ut genus muscarum. Quæ autem parua sunt, & uitam stabilem agunt, multis succiuntur pen-  
 nis, ut apes: & crusta pennas obiectas gerunt, uelut galleruæ & cætera id genus insecta, scilicet ut pennarum uires integras tueantur. Cum enim stabilia sint, cor-  
 20 rumpi facilius possunt, quam quæ motu citantur agiliori. itaque septo proposito muniantur. Quinetiam penna eorum caret & fissura, & caule. non enim penna, sed membrana cutis æmula est, quæ præ siccitate necessario absoluitur corpore eorum, cum carnis portio frigeat, insecta autem sunt, tum ob causas prædictas, tum etiam  
 ut sese tuto inflexu seruare possint. conglomerantur enim quæcunque ex ijs prolixo corpore sunt, quod effici nisi insectis non posset. Quæ autem glomerari nequeant, contrahunt se in incisuras. quod patet, cum tanguntur, uelut ea quæ canthari uocantur, ubi enim metuerint, motu cessant, totoque corpore indurescunt. insecta uero hæc esse necessarium propterea est, quod in eorum essentia inest, ut multa principia habeant. eaque ratione sanè plantis assimilantur. ut enim plantæ ipsa quoque  
 præcisa uiuere possunt, sed hæc aliquandiu, illæ uel perfici possunt, ac duæ ex una atque etiam plures numero procreantur. aculeis etiam armantur nonnulla insecta  
 30 contra animalia noxia. geritur aculeus alijs parte priore, alijs posteriore. aut enim ore, aut aluo extrema. nam ut elephantis pars delegata odoribus commoda etiam tum ad pugnandum, tum ad cibi usum habetur, sic insectorum quibusdam lingua pluribus officijs fungitur. quippe quæ & cibum sentiat, suscipiat, admoueatque, & defendat contra aliorum iniurias. Quibus autem non in ore aculeus, hæc dentes habent, cibi scilicet aut conficiendi, aut capiendi, admouendi que gratia, ut formicæ, ut apes. At uero quæ aculeo in aluo armata sunt, hæc ut animosa aculeum pro ar-  
 40 mis obtinere, qui intra aluum conditus est, ut in apibus, & uespis, quoniam uolucres sunt. nam si prætenuis fragilisque aculeus extrâ pateret, facile corrumpetur. Sed si ut in scorpione distaret, onus ita afferret. scorpio profectò quod non uolatur, sed gressu se moueat, caudamque sortitus sit, aculeum caudæ adiunctum gerat, uel  
 inutilem ad pugnā habeat, necesse est. Nulli aculeus in aluo cui pennæ binæ. quod enim imbecilla paruaque sunt, ideo binas habent. quippe cum uel à paucioribus esse ferri possint quæ parua sunt, quod idem causæ est etiam cur aculeus parte priore geratur. cum enim imbecilla sint, uix parte priore ferire possunt. At uero quæ pluribus pennis prædita sunt, quia auctiora sunt, meritò pennis plures obtinere, partemque posteriore ualent. instrumentum autem non idem ad usus dissimiles haberi si fieri potest, sed ad defendendū acutissimum, ad gustandum fungosum, & cibi attrahens melius est. Vbi enim licet duobus uti ad duo opera, nec aliud impeditur, nihil  
 tale natura facere solet, quale per inopiam ars excusoria obelisco lychnium ex ueru  
 lucernæque

Lucernarū cōponit, attamen id si fieri nō potest, eodem ad plura opera abutitur. Pedes priores nonnulli ex ijs longiores ideo habēt, ut quoniā propter oculorum duritiā non exquisitē cernant, cruribus ijs longioribus abstergant incidentem molestiā, atque arceant. quod & facere muscas uidemus, & apes, & reliqua generis eiusdem. semper enim prioribus cruribus uallant & protegunt. posteriora medijs longiora sunt, ut ambulēt melius, & atollantur facilius de terra, cum auolare libet. quod planius ea ostendūt quā saliant, ut locustæ, ut culices. cum enim inflexa rursus connixa extendunt, attolli de terra necesse est. Locustæ nō parte priore, sed posteriore habent crura illa ad gubernaculorum effigiem condita. suffraginem enim  
 10 intus flecti necesse est. quod nulli crurum priorum datum est. omnibus his feni pedes, ijs etiam, quorum enixu saliant, connum eratis.

De partibus testatorum exterioribus.

Caput VII



Estatorum corpus non multiplex est. cuius rei causa est, quod eorum natura stabilis est. Quæ enim mobilia sunt, hæc plures habeant partes necesse est. quoniā actiones eorū sint, & officia. plura enim desiderant instrumēta ea, quæ plures motiones exercēt. Ad hæc, aut omnia nō immobilia sunt, aut parum motus adipiscuntur. uerum natura consiliens eorum salutē, duritiā testæ obduxit. Sunt alia uniuersalia, alia biuersalia, alia turbinata, ut dictum iam est. turbinati etiā generis, alia in anfractum intorta sunt,  
 20 ut buccina. alia in globum tantum circumacta, ut echinorum genus, necnon bituuium. alia referatilia sunt, ut pectines, & mituli. ab altero enim latere nodo ligantur. quædam utroque latere connexa sunt, ut unguium genus. Habent omnia testata capitula infra, plantarum modo, cuius rei causa est, quod cibum de imo capiant, ut plantæ radicibus suis hauriunt. itaque ijs usu euenit, ut inferiora habeant supra, superiora infra. membrana obducit, quæ portio potulenta humoris transmissa liquataque cibo assumitur. nullum ex ijs est quod capite careat. Cæteræ corporis partes nomine uocantur, præter eam quæ cibum recipit.

De exterioribus partibus crustæ insectorum.

Caput VIII



Rustata omnia ingredi possunt: itaque pedes complures obtinuerunt. Summa eorū genera quatuor numero sunt, locustæ, gāmari, iquitillæ, cancri. quæ singula in plures species distinguuntur. quæ nō modo formæ, uerū magnitudine etiā multū inter se differant. alia enim magna, alia parua admodū sunt. Genus igitur cancrariū & locustariū similia inter se sunt, eo quod utrunque brachia forcipibus denticulatis habeat. sed hæc non ingrediendi causa habetur, sed ut ijs quasi manibus capiāt & retineāt. quam ob rem contra quā pedes ea flectere solent, hos enim in cauum, illa in orbem flectunt & circumagunt. sic enim ad cibum capiendum ad mouendumque cōmodius agitur. Sed interest, quod locustæ caudam habent, cancri nō habent. locustis enim ut nantibus  
 40 cauda utilis est. natāt enim cauda, quasi remo innitēdo. At cancris inutilis est, quoniā uitā agere terrenam, cauernasque subire soleant. qui tamen ex ijs pelagij sunt, ijs pedes habent longe retardiores ad ambulandum. sunt enim cæteris ipsi nantiores, ut maia, & qui heracleotici appellantur. crura ijs breuiora, quia parum mouentur. sed salus eorum benefici crustæ firmiter contingit. itaque maius crura tenuiora, heracleoticis breuiora. Cancelli autē, qui perquam exigui in pisciculis reperiuntur, pedes nouissimos latiusculos habent, ut ad nandum utiles sint, quasi pro pinnulis, aut remis pedes habent. Squillæ à cancrario genere differunt, eo quod caudā habeant. à crustario uero, quod forcipe careant. idque, quoniā plures habeant pedes, eo namque redundantia illa absumitur. pedes obtinēt plures, quod nō magis ad nandū, quā

ad ingrediendū sint suapte natura propēiores. partes supinas & capitis ita habent, ut altera ad accipiendā reddendamq; aquam branchiarū specie cōditæ sint: altera planiores tabellatioreq; in fœminis crustati generis omnibus, quā in maribus confiet. & interiora uero operculi applicati hirtiora, amplioraq; fœminæ cancri habent, quā mares, quoniam oua in ea ædunt nō procul ut pisces, & cætera quæ parere solent, quo enim ampliora sint, eo locum ovis præstare poterunt capaciorem. Locustæ cancriq; omnes forcipem dextrū grandiorē, ualentioremq; habent. Parte enim dextra efficaciora suapte natura sunt animalia omnia. reddit autē semper à natura cuiq; uel soli, uel præcipue, id quo uti potest: ut dentes, eosq; aut exertos, aut ferratos, aut cōtinuos, & cornua & calcaria, & reliquas eiusmodi partes, quarū usus ad defendendū aut dimicandum. Gammaris soli non certū, sed alterutrum æque, ut fors tulerit, forcipē habent grandiorē, tam mares quā fœminæ, causa autē cur forcipem habeāt, quod ex eo genere sint, quod forcipem habet, cur alterum grandiorē incerte, quod nō integram sui generis naturā tenet, sed ita degenerat, ut quod ad aliud destinatū est, eo nō eodem, sed ad gressum utatur. Quisnam situs partium singulari sit, & qua differentia inter se discrepent, & quo mares cum fœminis differant, ex commentatione dissectioneq; animalium petendum est.

De partibus exterioribus mollium animalium, & sanguine carentium.

Caput IX



Ollium partes interiores antē, cum cæterorū exposui, nunc exteriorum ordinem persequemur. habent hæc foris alueū corporis indiscrētum, & pedes parti priori iunctos circum caput, infra oculos circa os & dentes. sed cum cætera animalia quibus pedes, aut parte priore posteriorēq; eos habeant, aut latere, ut ea quæ multis pedibus innituntur, & sanguine carent, hoc unum genus pedes parte, quam priorē in eo capimus, omnes continet. cuius rei causa est, quod pars eius posterior ad priorē adducta est, extremaq; cōeunt & confunduntur: quomodo turbinatis inter testata accidit. Genus enim testatum omnino partim crustatis, partim mollibus simile est. quā enim foris terrenam portionem, intus carneam habet, crustatis assimulantur. quā autem forma eiusmodi corporis constat, cum mollibus cōuenit omne quodammodo, sed præcipue quæ ex turbinatis cuniculo in anfractum contorquentur, natura enim eorum utrorunq; perinde se habet, quasi quis directā lineā (ut in quadrupedum & hominū genere est) primū extrema lineæ parte superiore os situm intelligat, quā, a: mox stomachū, quā, b: rum uentrem, quā, c. deinde intestinū usq; in ostium excrementi quā, d. hæc ita in sanguineo genere disposita sunt. & caput, pectusq; locum obtinent primum, reliqua eorum ipsorum gratia, aut motus causa à natura adiecta sunt, ut priora posterioraq; crura. In crustatis etiam insectisq; ordo interiorum eodem modo constare uult, sed officijs exteriorum motionum differt à sanguineo genere. At uero mollia & turbinata inter se quidem proxime constant, sed ijs econuerso, finis enim ad principium flectitur, quasi quis lineam efflectendo adducat, ad a. Cum enim ita partes interiores ijs collocentur, ambit alueus, qui in polypis tantum caput uocatur, qualis in testato genere turbo est, nec aliud interest, nisi quod alteris molle quod ambit, est: alteris duro tegmine carnem natura complexa est, ut seruentur, cum difficulter moueantur. hinc fit, ut excrementum tam mollibus quā turbinatis meatu ori uicino emittatur: quanquam mollibus infra, turbinatis à latere, hæc de causa pedes mollium ita positi sunt, & contrā quā cæterorum. Sepiæ atque lolligines non simili, ut polypi, modo constant: quoniam uim nandi tantummodo habent, cum polypi uel ingredi possint. habent enim sepiæ & lolligines pedes supra dentes senos exiguos, eorumq; nouissimos duos maiores reliquos

reliquos autem octonorum duos infra omnium maximos. ut enim **quadrupedi-**  
bus crura posteriora firmiora ualidioraq; sunt, ita ijs quoque maximis qui infra ha-  
bentur. his enim onus sustinetur, motusq; potissimum agitur. duo etiam illi nouis-  
simi maiores suis medijs sunt, quia illis ministrent. polypus medios quatuor habet  
maximos. Omnibus igitur his pedes octoni. sed sepijs & lolliginibus breues, poly-  
pis magni. alueum enim corporis sepiæ & lolligines habent magnū, polypi paruum.  
itaq; quod natura polypis ex corpore dempserat, id in pedum longitudinem addi-  
dit. quod sepijs & lolliginibus de pedibus abstulerat, eo corporis magnitudinem  
auxit. quam ob rem polypis pedes non solum ad nandum utiles sunt, sed etiam ad  
10 ambulandum. sepijs autem & lolliginibus inutiles sunt. parui sunt enim, cum al-  
ueum habeant magnum. cum itaque pedes habeant breues atque inutiles, ne aestu  
maris tempestateq; exturbentur saxis, utq; de longinquo admoveant, ideo promu-  
scides binas prælongas habet, quibus ueluti anchoris innitantur, seq; stabiliant mo-  
do nauigij tempestate urgente. uenientur etiam procul, oriq; e longinquo admo-  
ueant. Polypi promuscide carent, quoniā pedes ad usum eundem commodos ha-  
beant. Quorū autē pedibus acetabula circumtētaq; adsunt, hæc uim contextumq;  
ralem habent, qualem implicamenta illa quibus digitos antiqui medici indere sole-  
bant. ita enim fibris implexa sunt, quibus carunculas, ceteraq; cedentia trahant.  
quippe quæ lapsaprehendant, intenta premant & retineant, cum pars interior to-  
20 ra contingat atq; amplectatur. itaq; cum aliud non habeant, quo capere admove-  
req; possint, nisi aut pedes aut promuscides, hæc pro manibus obtinēt ad uim tum  
inferendam, tum propulsandam, atq; etiam ad cetera uitæ munera necessaria. sed  
cum cetera omnia geminis acetabulis seriem à capite in extremos usque cirros ha-  
beant ordinatam, genus unum polypi quoddam simplici inspergitur acetabulo,  
cuius rei causa ad longitudinem tenuitatemq; brachij referenda est. cum enim an-  
gustum sit, simplicis acetabuli ordinem tantū capiat necesse est. non igitur ita con-  
stant, quia id optimū, sed quia necesse sit propria substantiæ ratione. Pinnulam hæc  
omnia habet circumdantem alueum, quæ cum in ceteris, tum in grandium lolligi-  
num genere iuncta, perpetuaq; gestatur. minores uero quas lolligines uocant, ia-  
30 tiorem hanc habent, nec angustam ut polypi & sepiæ, neque circumactam per to-  
tum alueū, sed de medio orsam. causa cur eam habeant est, ut natent, & se dirigant;  
ut uolucres cauda pennis condita, pisces penē cartilaginata reguntur. polypis hoc  
minimum est, minimeq; conspicuum, quoniā paruum habeant alueum, quem fas-  
tis suis pedibus dirigere possint. atq; de infectis, de testatis, de mollibus, dictum iam  
est, tam de interioribus quā de exterioribus partibus.

De exterioribus animantium uiuiparorum, sanguineq; prædatorum partibus, & eorum  
cum homine in ijs differentia. Caput X



40 E genere sanguineo uiuiparo denuò differendum est, initio repetito  
à reliquis partium earum quæ antè expositæ sunt. quas ubi definierim-  
us, cōtinuò de sanguineis ouiparis pari modo dicemus. partes quib-  
us caput animalium cōstat, & ceruix, & collum explicatæ iam sunt.  
habet autem caput animalia omnia sanguine prædita, exanguium  
nonnullis indiscrētū hoc est, ut cancris. collum omnibus uiuiparis est. ouiparorum  
alijs est, alijs deest. Quæ enim pulmonem habent, collum etiam obtinent. Quæ au-  
tem spiritum extrinsecus non accipiunt, carent hac parte. Caput cerebri gratia po-  
tissimum est. hanc enim partem genus omne sanguineum habeat necesse est, &  
quidē loco obiecto cordi, ob eas quas exposuimus causas. sed natura sensuū etiam  
nonnullos in eo collocauit, quoniam sanguis eius membri temperatus modice sit.

& idoneus tum ad cerebrum tepesciendum, tum ad sensuum tranquillitatem atque integritatem. Tertiā item partē subiecit eam quæ aditum cibo præberet. hic enim commodè collocaretur. quippe cum neque supra cor & vitale principium, uenter constitui posset, neque si inferius, quā nunc est, poneretur, fieri posset, ut æque aditus cibo patēret. corporis enim proluxior longitudo faceret, ut longe à principio mouendi & concoquendi distaret. Sed enim caput ea causā conditum est. collum autem arteriæ gratia habetur. quippe quod eam atque etiā gulam protegat, amplexuque suo tueatur. hoc cæteris animalibus flexibile, & uertebriis compactum est. at lupo & leoni osse perpetuo riget. commodius enim ad robur, quā ad cæteros usus collum ijs esse natura uoluit. A collo & capite crura priora, pectusque habetur. 10  
 sed homo uice pedum priorū brachia, & quas manus dicimus, habet. Solus enim animalium omnium erectus est, quoniam eius natura atque substantia diuina est. officium autem diuini est intelligere atque sapere, quod nō facile esset, si uasta corporis moles affligeret. pondus enim tardiores reddit & mentem & sensum communem. quam ob rem concretionē & pondere grauiore opprimente, corpora uergerē in terram necesse est. itaque natura rite consulens, pro brachijs & manibus crura priora quadrupedibus subdidit. nam posteriora bina omnibus gressilibus esse necesse est. Quorum igitur anima pondus sustinere non posset, hæc quadrupeda facta sunt. animalia namque omnia, excepto homine, formam gerunt pomilionis. est enim pomilio cuius pars superior magna est, inferior quæ sustinet pondus motumque exercet, parua, minimeque respondēs superiori. superiorē intelligi eam uolo, 20  
 quæ à capite usque ad excrementi ostium pertendit, quā pectus etiā continetur. hominibus igitur hæc pars modice ad inferiorem condita est, multoque minor adultis iam perfectisque euadit. infantibus enim ē diuerso est: superior magna, inferior minor est. quam ob rem serpūt infantes, nec ambulare possunt. iam principio, ne serpere quidē possunt, sed immobiles iacent. omnes enim infantes pomiliones sunt. tum profectu ætatis, hominibus pars inferior augetur: quadrupedibus contrā, inferior primū maxima est, tum processu temporis superior crescit, quæ scilicet ea est, quæ ab ano ad caput porrecta est. unde fit ut pulli equini paulo suis parētibus sint summissiores, atque adulti crure posteriore caput attingere nequeunt, quod nouelli 30  
 facile attingunt. Solipeda & bisulca ita se habent, digitata autem cornuque uacua forma quidem & ipsa pomilionis sunt, sed minus. quam ob rem pars eorum inferior ad superiorem defectus ratione incrementum capessit. Auium etiā & piscium genus, omneque sanguine præditum forma pomilionis est, ut dixi. Quam ob rem bruta hominibus sunt dementiora. etenim inter homines pueri uiris, & inter uiros pomiliones mente deficiūt, quanquam alijs uiribus forte ualeāt. cuius rei causa, quam diximus, est, quod principium animi admodum difficile motu, corpulentumque in ijs est. addo etiā quod cum minus remaneat caloris, qui efferat, plus autem terrenæ portionis supersit, efficitur ut corpus animalis tum minus, tum etiā multis 40  
 pes formetur, demumque expes, prostratumque in terram præ inopia caloris proueniat, sensumque procedendo ita degeneret, ut principium uitale caputque infra habeat. ad postremum immobile fit, & sensu uacuum, plantaque est uice mutata, ut superiora infra, inferiora supra habeat. radix enim plantarum uim obtinet oris, & capitis. semen contrā, supra, extremisque ramis consistit. Sed quam ob causam animalium aliud bipes, aliud multipes, aliud omnino expes, & cur alia plantæ, alia animantes constituerint, explicatum iam est. atque etiā qua de causā homo animalium unus erectus est, utque erectus suapte natura, non desiderat crura priora, sed pro ijs brachia & manus à natura recepit. Anaxagoras igitur hominem prudentissimum omnium animalium esse ait, quoniam unus omnium manus obtinet. 50  
 sed

sed recta ratio exigit, ut quoniam prudentissimus omnium est, ideo manus receperit. manus enim instrumentum sunt. natura autem, ut homo prudens, ita tribuere solet cuique rem qua uti possit. rectius enim tibia dabitur perito tibiae, quam tibiam habenti peritiae tibiae addetur. rem enim minorem maiori potiori quae natura addidit, non maiorem nobilioremque minori. quod si ita melius est, natura autem ex his quae fieri possunt, facere solet quod melius sit, homo non propter manus prudentissimus est: sed quia prudentissimus omnium animalium est, ideo manus obtinet. qui enim prudentissimus est, recte plurimis uti instrumentis potest. manus autem esse uideretur non unum instrumentum, sed multa. est enim, ut ita loquar, instrumentum ante instrumenta. natura igitur ei qui artes plurimas recipere potest, manum reddidit, quae ad plura instrumenta utilis est. Qui autem hominem non bene sed deterrime omnium animalium constare aiunt, nudum enim atque inermem creatum referunt, non recte ita sentiunt. cetera enim animalia unum auxilium habent, idque nullo pacto possunt permutare, sed quasi calceata semper dormire, ac omnia agere, nec uestitum unquam deponere plenior, neque arma mutare quae semel acceperint, necesse est. At homini multa habere auxilia licet, eaque subinde mutare. arma etiam quae uelit, & ubi uelit, capere potest, manus enim & unguis est, & ungula, & cornu, & hasta, & ensis, & quoduis aliud genus armorum, aut instrumentorum. quippe quae omnia haec sunt, quoniam omnia & sumere potest, & tenere. cui manus naturae forma etiam adhibita est congrua, diuisa enim & multifida est: nam in eius diuisione, componendi facultas est, in compositione uis diuidendi esse non possit. uti etiam eadem modo simplici, modo duplici, & omnino multifariam licet. Quin & flexus digitorum ad capiendum, premendumque commodissime habent, unus à latere adiunctus est digitus, isque brevis & crassus, sed non longus. ut enim si manus omnino deesset, potestas capiendi non fieret: sic nisi digitus hic à latere adesset, non eadem illa facultas probe daretur. hic enim à parte inferiori sursum premit, ut ceteri à superiore deorsum. quod fieri ita oportet, si ualide quasi copula forti colligandum sit. pollet hic plurimum, ut unus multos aequiparet. brevis etiam est, ut robustus sit, & quoniam nullam praestaret commoditatem si longus esset. recte etiam nouissimus digitus paruus est, & medius longus, tanquam remus nauigij medius. quod enim officio capitur, circum per medium digitum complecti potissimum necesse est. Sed enim pollex & magnus, qui à latere iunctus est, ideo appellatur, quamuis paruus sit, quia ceteri sine eo inutiles ferè sunt. Ungues etiam recte natura molita est. quippe quae ceteris animalibus eos uel ad usum alium dederit, homini autem operimenti tantum gratia excogitarit, digitos enim extremos integunt & tuerentur. flexus brachiorum homini tum ad cibum admouendum, tum ad ceteros usus, contra quam quadrupedum generi aguntur. illis nanque introrsus poplites flecti necesse est, ut ad gressum utiles sint. usum enim pedum praestant artus priores, quamquam illius etiam generis ea quae digitata sunt, non modo ad gressum utuntur prioribus cruribus, uerum etiam ad manus officia uti nituntur. quippe quae & capiant

40 prioribus cruribus & repugnent. quod solipedes posterioribus faciunt. non enim crura eorum priora cubitis manibusque proportionem respondent, ut nonnullorum ex his, quorum pedes in digitos finduntur. ob id pedes priores quinque distinctos digitis habent, posteriores quaternis, ut leones, & canes, atque etiam lupi, & pantherae. quintus enim eorum quinto, magnoque manus respondet. Sed quae parua inter digitata sunt, posteriores etiam quinque digitos obtinent, quoniam serpere solent, scilicet ut unguibus numerosioribus apprehendendo facilius obrepant ad sublimiora. Pectus inter lacertos homini constitutum est, ceteris inter crura priora. latum id esse in homine ratione permittitur, cum nihil lacerti adiuncti lateribus impediunt.

At quadrupedibus quod ante se crura cum ambulant, locumq; mutant, protendunt, pars hæc coartata est. unde fit, ne quadrupedes eo loco habeant mamas. nam homini, quod & spacij laxitas permittit, & carnosa ea pars est, cum operiri sedem cordis conueniat, mammae pectori afformatae sunt carnulentae, maribus quidem ob eam quam diximus causam: sed foeminis ad alterum quoq; opus natura maminis abutitur, quod eam saepe facere dicimus. cibum enim in ijs recondit suis paruulis, binæ homini mammae, quoniam binæ sunt partes, dextra & sinistra, duriusculae, spacio interposito determinantur: quod & costae eodem loco sibi coeant, sine ulla molestia, cæteris animalibus mammae in pectore haberi inter crura non possunt: ita enim gressum impedirent, pluribus autem locis alijs habentur sine ullo impedimen-  
to, quibus enim solida ungula, aut cornua, & partus numero parciore, hæc mammae inter femora habent, easq; binas. Quae autem numeroso partu, & pede multifido sunt, hæc aut plures per uentrem duplici ordine utroq; de latere gerunt, ut fues, ut canes: aut binas tantum medio uentre, ut leo, cuius rei causa est, non quia parcissime generat, nam plures quam duos interdum ædit, sed quod minus lacte abundat, cibum enim quem raro assumit, quoniam carniuorum est, in corpus absumit. Elephas duas tantum habet, easq; sub armis, causa cur duas habeat, quod uniprolis est, cur non inter femora, quod multifidum est, nullum enim inter femora habet, cui pedes discreti in digitos sunt, cur supra sub armis, quod in ijs quae plures obtinent mammae & primae sunt, & plurimum lactis hauriunt, quae ea parte continentur, argumeto est, quod scrofae facere assolent, porcis enim æditis primis, mammae praebent primas, ergo cui unum est quod primum in lucem prodit, id primas habeat mammae necesse est, primae autem quae sub armis habentur, elephas hac de causa duas, eoq; loco mammae habet, quae autem multiprola sunt, hæc toto uentre exuberant, cuius rei causa est, quod ea quae prolem numerosiore educatura sint, mammae desiderant numerosiores, quas cum per latitudinem non nisi duas habere possint, uidelicet ratione bipartiti corporis, in dextrum sinistrumq; per longitudinem habeant, necesse est. Locus autem unus qui inter priora & posteriora crura interiacet, porrectus per longitudinem est. Quae autem non multifida, sed deprola sunt, aut cornuta, hæc inter femora mammae habent, ut equa, asina, camelus, hæc enim singulos pariunt, & pes equo & asino solidus, camelo bifidus, cerua etiam, capra, uacca, & reliqua generis eiusdem mammae parte eadem gerunt, cuius rei causa est, quod hæc sursum uersus capiant sui corporis incrementa, itaque ubi confluuium & copia excrementi sanguinis, qui locus sanè infra est, & circa effluentis materiae ostia, ibi mammae à natura posita sunt, qua enim parte motus agit alimēti, inde etiam capi alimentum potest, sed enim homo & foemina & mas habet mammae, in cæteris mares nonnulli carent, ut equi, non enim omnes, sed tantum qui matri similes prodire habent, de mammis dictum iam est. A pectore uenter subiaceret, coctis non cluflis, ob eam quam ante reddidimus causam, scilicet ne aut cibi tumorem, qui per calorem necessario euenit, aut uteros plenos impediatur, finem autem thoracis appellati faciunt partes, quae ostium excrementi, tum siccum, tum humidi continent, natura uero parte eadem, tum ad humidi excrementi exitum, tum ad rem ueneream utitur in sexu tum foeminino, tum etiam masculino omni sanguineo, exceptis paucis: in omniq; uiuiparo genere, nullo excepto, cuius rei causa est, quod genitura humor quidam excrementitius est, sed hoc ita esse nunc subiiciatur, post demonstrabitur, foeminae etiam pari modo menstrua parte eadem emittunt: sed de ijs quoque postea definiemus, nunc illud subiaceat, menstrua etiam foeminarum excrementum esse, & uacantem materiam, humida autem suapte natura sunt menstrua & genitura, itaque eorum profusionem similibus, eisdemq; tribui partibus ratio est. intus  
autem



autem quemadmodum se habeant, & qua differant ratione, semen genitale & gestatio uteri, ex animalium historia commentationeque apertum est: & cum de generatione agemus, dicitur, formas etiam harum partium tales necessario ad officium propositum esse debere, quales iam sunt, obscurum non est, sed maris instrumentum alterum ab altero differt, pro discrimine corporum. non enim æque nervosa natura omnia constant, augetur etiam & minuitur hoc unum membrum, sine ulla morbi mutatione. horum enim alterum utile ad coitum, alterum ad ceteros corporis usus commodum est, nam si semper simili modo se haberet, impedimento nimium esse constaret hoc membrum ex eiusmodi partibus, ut eorum, quæ modo dixi, utrumque possit evenire.

10 partim enim neruum, partim cartilaginem habet, itaque & contrahi potest & extendi: atque etiam flatus capax est. Sed quadrupedes feminae omnes in auersum minigunt, quippe quæ genitale non alibi commodius habere possint ad coitum. Mares uero perpauci in auersum mingunt, ut lynx, leo, camelus, lepus. Solipes nullum sic mingit. Hominis partes posteriores, & crura, peculiari modo præ quadrupedibus habentur. Caudam omnia ferè non solum uiuipara, sed etiam ouipara habent. nam etsi plerisque magnitudine membrum id caret, tamen aliquid prominet, quod caudam describere possit. homo unus cauda uacat. nates habet. quod nulli quadrupedum datum est, crura etiam homini femore furatque carnulenta sunt, cum cætera animalia omnia non modo uiuipara, uerum etiam quacunque cruribus constent, uacua carne hæc habeant. nervosa enim, ossiculenta, spinosa, rigida. quorum causa una est prope

20 dixerim omnium, quod homo solus animalium erectus est, ut igitur facile sustinere superiora posset, natura corpulentiam parti superiori dempsit, inferiori addidit, itaque nates carnosas fecit, & femora, & furas: sed nates uel ad corporis requiem utiles reddidit, quadrupedes enim stare diu infatigatis uiribus possunt, utque quasi iaceant, cum quaternis fulis innituntur. At uero homines non facile erecto corpore stando durant, sed requiem sedileque desiderant. homo igitur nates & crura carnosam habet, ob eam quam diximus causam. & cauda ob eam rem uacat, alimentum enim quod caudam adit, in hac ipsa absuntur, ususque caudæ necessarius defuit, quoniam nates sua corpulentia satis operiunt. At quadrupedes & reliqua animalia e contrario, cum enim forma pomilionis degenerent, parte sui superiore pondus, omnemque corpulentiam

30 sustinent, scilicet demptam parti inferiori. itaque crura habent rigidiora, & natibus uacua. sed ut pars quæ exitum excremento ministrat protegeretur & custodiretur, caudam ipsa natura reddidit, sublato quod ad crura deferretur alimento. Simia quod forma ambigua sit, ut & in neutro, & in utroque genere sit constituta, ideo nec caudam habet, neque nates, uidelicet ut bipes cauda uacat, ut quadrupes natibus. Caudarum autem plures differentia sunt, & natura ipsa quoque abutitur, cum non modo ad integendam sedem utatur, uerum etiam ad reliqui corporis usum atque utilitatem. Pedes quadrupedum inter se differunt, alijs enim solidi, alijs bifidi, alijs multifidi. solidi sunt eorum quibus præ corporis magnitudine, copiaque terrenæ portionis, pro cornu aut

40 dente, materia ad unguis naturam secesserit, sed enim ex ea copia pro pluribus unguibus unus unguis, scilicet ungula coalescit. Talo etiam ob eam rem carent (quod magna ex parte dixerim) atque etiam quod si talus adesset, crura posteriora difficilius flecterentur, celerius enim & aperiuntur & clauduntur quæ singulis angulis consistent, quam quæ pluribus. Talus autem, ut qui clauus est, tanquam alienus artus duobus hisce inseritur, pondus quidem afferens, sed gradum efficiens tutiorem. hinc enim & ea quæ talum habent, non in prioribus, sed posterioribus tantum cruribus eum continent, quoniam leuiora, flexibiliaque esse debent, quæ præcedant, firmiora autem contentioraque esse posteriora congruit: ad repugnandum etiam, inferendumque ictum uehementiorem commodius ita constant. genus autem hoc animalium cruribus ita uti

posterioribus solet. bifulca talum habere certū est: ijs enim posteriora sunt planiora. & quoniam talum habeant, solipeda esse nō possunt, quasi os quod pedi deest, maneat in suffragine. digitatis talus nō est. nam si esset, digitata non essent, sed tantum latitudinis funderetur, quantū talus occuparet. quam ob rem ea quæ talum habent, magna ex parte bifulca sunt. Homini pedes omnium maximi proportionē magnitudinis merito. solus enim erectus est. ita qui duo pondus corporis totum susceperunt, longitudinem latitudinemque obtinere debuerunt. digitorum etiā manus magnitudo contrā quā pedis est, ratione. manus enim officium est capere atque premere. itaque longos habeat digitos oportet. manus enim parte qua se flectit, comprehendit. pedis autē officium est tute consistere. quod ea parte pedis effici putandū est, quæ infissa est. extremum autē fissum, quā infissum esse melius est. nam si pes totus infissus esset, totus consentiret parte aliqua laborare: quod fissio in digitos æque accidere nō potest. breues etiā minus offendi ledique possunt. quam ob rem hominum pedes multifidi & breuidigiti sunt. Vnguiū genus eadem causa pedes, qua manus obtinent. extrema enim operienda muniendaque potissimum sunt propter imbecillitatē. de animalibus sanguineis, uiuiparis, terrestribus ferē omnibus dictū iam est.

*De partibus animalium ouiparorum, tum quadrupedum, tum expedum: & quam ob causam sic à natura digestæ sint.*

*Caput XI*



Anguinea uero ouipara partim quadrupeda sunt, partim expeda, quale unum tantūmodo genus serpentū est. causam quam ob rem id pedibus uacet, reddidimus, cum de gressu animalium ageremus. cetera eius forma simili quadrupedibus ouiparis sunt. habent hæc animalia caput, partesque capitis eisdem de causis, quibus cetera sanguinea genera. Linguam etiā in ore continent omnia, excepto uno crocodilo fluuiatili. hunc enim nō nisi locum tantūmodo linguæ habere putaueris, cuius rei causa est, quod idem & terrestris, & aquatilis quodāmodo est. ergo ut terrestris locum obtinet linguæ, ut aquaticus elinguis est. pisces enim, ut dictū est, aut nullam habere linguam uidentur, nisi ualde resupinentur: aut inexplanatam habent. causa est, quod ijs linguæ usus perquam exiguus est: quoniam mandere prægustareque non possint, sed in deuorandō sensum uoluptatemque cibi capiāt. lingua enim sensum mouet saporum. esculentorum autē omnium uoluptas in descendendo contingit. dum enim deglutimus, pinguis sentimus, & falsa, & dulcia, & reliqua generis eiusdem, sensum igitur hunc animalia etiā ouipara habent. & omnium ferē condimentorum, esculentorumque in deuorandō gulæ tactione suauitas existit, & gratia, quam ob rem non qui potionum, saporumque incontinentes sunt, iidem etiam condimentis ac cibo luxuriant. Sed cum ceteris animalibus sensus quoque gustandi adiunctus sit, illis quidem alter quasi unus tributus est. Lacertis ex quadrupedibus ouiparis lingua bifida, ut serpentibus: partemque extrema pilosa admodum, ut dictū iam est. quin etiam ut tulus marinis lingua bifulca est. quam ob rem hæc animalia omnia tenuia sunt. Serpentes etiā dentibus quadrupedes ouiparæ sunt modo piscium. Sensoria autē omnia simili modo, atque cetera animalia habent. uerbi gratia, nares olfaciendi, oculos uidendi, aures audiendi sensorium. non tamen hæc eminent, quomodo ne auiibus quidem, sed foramina tantū habent. causæ utriusque duritia cutis est. altera enim penna, altera cortice integuntur. cortex loco squamæ & simile est, sed sua natura rigidior atque durior. quod in testudine atque serpentibus magnis, & crocodilo fluuiatili palam fit. firmiter enim osse euadit, ut qui talem naturā sortiatur. Palpebram superiorem hæc animalia non mouent, ut ne aues quidem: sed inferiore coniuuent. ea de causa, quam cum de illis ageremus, reddidimus, sed cum auiū nonnullæ ab angulis membrana

brana obeunte nictentur, hæc non nictantur. Sunt enim oculis durioribus, quam aues. causa est, quod illis urpote uolucris acumen cernēdi cōmodius ad uitæ mu-  
 nera sit. hæc autē quoniā cauernas subire omnia solent, minus cernēdi usum exqui-  
 situm requirūt. Sed cum caput in partes duas diuidatur, scilicet superiorē & inferio-  
 rem maxillam, homo & uiuiparæ quadrupes maxillam sursum, deorsum, atq; in  
 latera agitāt: pisces uero & aues, & ouiparæ quadrupes sursum, deorsumq; tan-  
 tum mouent. causa est, quod eiusmodi motus utilis ad mordendū, secandumq; est.  
 qui autē in latus agitur, ad cibum molendū conficiendumq; accommodatur. Quæ  
 igitur dentes habet maxillares, ijs motus cōmode agitur in latus. Quæ autē maxil-  
 10 laribus carēt, ijs nullo pacto utilis motus hic est. quam ob rem sublatus ijs omnibus  
 est, nihil enim natura superuacūū facit. Cætera omnia maxillā mouent inferiorem:  
 crocodilus fluuiatilis unus superiorē, cuius rei causa est, quod pedes ad capiendum  
 retinendumq; inutiles habet. parui enim admodū sunt. itaq; ad hunc usum natura  
 os ei pro pedibus utile cōdidit. Ad retinendum uero, unde ictus inferri uehementi-  
 tius potest, inde motus commodius agitur. infertur autem uehementius desuper,  
 quam de parte inferiore. ergo cum utriusq; tum capiendi, tum mordendi usus ore  
 administratur, magis autē necessariū retinēdi officiū sit, cui nec manus sint, neq; pe-  
 des idonei, cōmodius huic est mouere superiorē maxillam, quam inferiorē. Quod  
 idem causa est, cur etiā cancri superiorē sui forcipis partē moueant, nō inferiorem.  
 habent enim pro manu forcipem. illū itaq; utilem ad capiendū, non ad mordendū  
 20 forcipem esse oportet. mordendi autē secandiq; officiū dentis est. cancri igitur, cæ-  
 terisq; quibus licet ociosius cibum capere, quoniā in humore nō sint, oris usus par-  
 titus est, ut manibus aut pedibus capiant, ore secent & mordeat. at crocodilis os in  
 utrunq; usum utile factum est à natura, cum ita maxillæ moueātur. Collum etiam  
 omnia huiusmodi animalia obtinēt propter pulmonem. quippe quæ aërem per  
 arteriæ fistulam productiorē & accipiant & reddant. collum enim id appellamus,  
 quod inter caput & artus, humeros ue interiacet. Serpens inter hæc collum minia-  
 me, sed proportionale colli habere uideri potest. siquidē extremis, quæ modo dixi,  
 pars hæc describenda est. proprium serpentibus præ cæteris eiusdē generis anima-  
 libus est, ut caput uertere in auersum, reliquo quiescente corpore ualeant. cuius rei  
 30 causa est, quod modo insectorum structura uolubili constant, ut uertebrae cartila-  
 ginosas & flexibiles habeant. euenit igitur id serpētibz necessariū hac de causa. ad  
 melius uero, ut ita uitare possint, quæ ab auerso noceant. cum enim prælongo sint  
 corpore & pedibus careant, inepti sunt ad se conuertendū, tuendumq; contra ea,  
 quæ à tergo incurrāt, nihil enim utilitatis esset, si caput erigere quidem possent, sed  
 circumagere nequirēt. Habent hæc & eam quæ pectori proportionetur, partem.  
 mammas nec ea parte, nec uspiam sui corporis continent. Aues etiam mammis ca-  
 rent. cuius rei causa est, quod nullū ex ijs habeat lac. mamma enim cōceptaculum,  
 & tanquam uas lactis est. nec solū hæc, sed etiā quæcūq; nō uiuipara intra se sunt,  
 40 lacte uacant, quoniā oua pariunt. in ouo autē lacteus ille cibus ingenitus ouiparis  
 continetur. sed de ijs planius dicitur, cum de generatione agemus. De inflexu cur-  
 uarum partium consideratū iam est, cum de communi animalū gressu ageremus.  
 Caudam etiā genus id animalū habet, partim prolixiorē, partim breuiorē. cuius rei  
 causam antē in uniuersum reddidimus. Omnī uero ouiparorū pedestriū tenuissi-  
 mus chamaeleo est. quippe qui omnium maxime inopia sanguinis rigeat. causa ad  
 mores animæ eius referēda est. præ nimio nanq; metu multiformis efficitur. metus  
 enim refrigeratio per inopiam sanguinis calorisq; est. De partibus animalium san-  
 guinei generis, tum expedum, tum quadrupedū, aut bipedū, quænam sint extra,  
 & qua de causa, dictum ferē est.



Ves autē discriminē inter se discerpāt, eo quod in excessu defectuue partium, & in pluri minorisq; ratione uersari percipimus. Sūt enim earum aliæ longo crure, aliæ breui, linguam etiā aliæ latiusculam habent, aliæ angustam, eodemq; modo reliquis partibus differūt. At priuatim inter se paulō ratione partium differunt, quanquam à cæteris forma etiam partium discrepent. pennatum enim genus omnium auium est, idq; proprium habet ad cætera animalia. cum enim alia pilo, aut squama, aut cortice tegantur, aues penna opertæ sunt, pennamq; habent fissam, nec simili specie, atq; ea, 10 quæ totipenna à pennæ cōtinuitate appello. his enim fissā, illis infissā est penna. & altera excaulis, altera caulata est. quinetiam capite rostri naturā singularem ac propriam præ cæteris gerunt. elephantis enim naris pro manibus est. insectis quibusdā lingua oris officio fungitur: at his uice dentium manusq; rostrum osseum datum est. de sensuum locis dictū iam est. Collum auibus quoq; porrectū, eademq; de causa qua cæteris est. hoc alijs breue, alijs longum, & ferē pro crurum modo, magna ex parte descriptū est. Quibus enim longa sunt crura, ijs collum longum. contrā, quibus breuia crura, ijs collum breue, præterquam palmipedibus. Collum enim nec breue, cum cruribus longis, nec longū cum breuibus, passum administrare ex terra potest. carniuoris etiā uolucris longitudo colli incommoda est. imbecille enim, 20 quod prolixum est. ijs autē uictus beneficio uirium cōparatur. quam ob rem nulli collum longum, cui ungues adunci. palmipedes, & quæ diuisis quidem, sed parum diductis digitis sunt, ut quæ eodē genere cum palmipedibus contineantur, collum longius habent. tale enim ad cibum ex humore petendū commodius est. sed crura ijs breuia, ut melius natare possint. Rostra etiā inter se differūt uictus ratione. alijs enim rectum, alijs unicum rostrum est. rectum ijs, quæ cibi capiendi gratia tantum id habēt, unicum carniuoris. Tale enim utile est ad retinendū ijs, quæ raptu uiuant, & cibum ex animalibus petere necesse habeant. quibus autē uictus ratio placida, herbisq; comparanda est, ijs rostrum latum. hoc enim & ad effodiendū pabulum, & ad euellendum, & ad tondendum commodius est. nonnullis longum, ut & col- 30 lum, quoniam cibum ex alto capere soleāt. & quidem bona pars tum earum, tum etiam palmipedum, aut simpliciter, aut parte eadem captura bestiarum quarundam aquatiliū uiuit. Itaque fit, ut collo quasi harundine piscatoria, rostro autem ueluti linea & hamo utantur. partes uero pronæ supinæq; & thorax appellatus quadrupedum, cōfusus in genere auium habētur. alæ enim pro branchijs, & prioribus pedibus dependunt, membrum peculiare auium: quam ob rem pro scapulis extrema alarum dorso adherent. Crura ut in homine bina, sed intrò flectenda, ut quadrupedum suffragines, non ut hominis poplites foras. alas autem quas uicem crurum priorum complere modo diximus, in orbem agunt. bipes necessariò est genus auium, inter ea quæ sanguinem habent, atq; etiā aligerum. Cum enim sangui- 40 nea quæq; nō pluribus quam quaternis notis moueātur, membra pendentia quæterna auibus quoq; sunt, ut cæteris gressilibus, & pedestribus, quanquam illis brachia aut crura quaterna. Auibus uice crurum priorū brachiorum uel ala commune datum est membrum: hac enim uolatiles sunt. quæ quidē uolandi uis in auis essentia continetur. itaq; necessariò restat, ut bipedes sint. ita enim notis siue signis quæternis, alis scilicet additis moueātur. Pectus acutum carnosumq; omnibus est. acutum ut melius uolent. lara enim, quia multū aëris propellunt, difficilius mouentur. carnosum, quia quod acutū est, nisi plene opertum sit, imbecillum est. Pectori uenter subiaceret ad ostium usq; excrementi, & suffraginem trudens non aliter, quàm in quadrup-

quadrupedum atque hominum genere, igitur inter alas & crura, partes hæ positæ sunt. Umbilicum omnia habent, quæ uel utero uiuiparis adûtur, uel ouo ouiparis excludûtur. sed auiibus iam adultis hic delitescit incertusq; est: ut patet per generationem eorum. intestini namq; coalitu umbilicus auium consistit, & nō uenarū pars ulla est, ut in uiuiparo genere. Item auium alia uolaces, alisq; gradibus atq; ualidis sunt: ut quæ ungues habēt aduncos, & carne uescûtur. uolaces enim tota uita esse necesse est. itaq; pennis abundant, & alarum magnitudine præstant, sed nō modo quæ uncis sunt unguibus, uerum alia quoq; genera uolucrum uolatu superāt: ui-  
 10 delicet ea, quæ uel pernecitate uolandi sese tueantur, uel loca mutare soleant. Sunt quæ non uolaces, sed graues sint, quibus uita terrena, & aut fruge uiuunt, aut na-  
 rant, & apud aquas immorātur. Corpora uncunguium exigua sunt, exceptis alis. quoniam alimenti copia in alas & arma, præsidiumq; absumitur. contrā quæ uolaces non sunt, ijs corpora in molem euadunt grandiore, atq; ita efficitur, ut sint grauiore. Sed grauiū nonnullis præsidio calcar est, quod uice alarum suis cruribus gerunt. eadem uero quæ & calcar habeat, & ungues aduncos, nulla est, causa est, quod natura nihil superuacuum facit. uolaci autē uncungui generi calcar usui esse non potest. utile enim tantū in pedestri certamine est. quam ob rem grauium non-  
 nullis adiunctū est, quibus ungues adunci nō solum inutiles, sed etiā nocui essent, cum ad solum hærent, & contra ingressum infixi reniterentur. quam ob rem uncungues omnes difficulter ambulant, nec in saxis consistūt. natura enim eiusmodi  
 20 unguium contraria in utrunq; est. euenit id per generationē necessariō, cum quod terrenum & procax in corpore est, formam paruum commodarū ad pugnam recipiat. itaq; ubi sursum prouerit, rostri duritiā aut magnitudinē facit. ubi deorsum lapsum est, calcaria cruribus ualida effingit, aut pedibus unguium magnitudinem & robur. Simul autē hæc singula locis diuersis efficere non potest. distracta enim excrementi eius natura inualida redditur. Item alijs crurum longitudinem condidit, alijs pedum interualla complet, digitosq; in palmæ effigiem cōtexit. quo fit necessariō, ut aues aptæ ad nandū, aut omnino palmipedes sint, aut discretos quidem habeant digitos, sed singulis annexa latitudine cutis, ueluti spadiculas ductu perpetuo gerant. hæc necessariō his de causis ueniunt. Quod autem ad notā melioris ra-  
 30 tionem attinet, pedes eiusmodi habēt uitā quam degunt gratia, ut cum in humore uiuant, nec pennis utātur, pedes ad nandum utiles habeant. ijs enim perinde utuntur, ut remis nautæ, & pinnulis suis pisces. quam ob rem si uel piscium pinnula, uel auium pedibus interiecta cutis destruetur, nare nō poterūt. Sunt in genere auium, quæ longis cruribus innitātur. cuius rei causa est, quod uita earum palustris est. natura enim instrumenta ad officium, nō officium ad instrumenta accommodat. quoniam igitur nantes non sint, ideo nō palmipedes sunt, quod in solo præmolli & lubrico degant: hinc longa ijs crura, & digiti productiores, flexus etiā plures in digitis magna ex parte, sed cum uolaces non sint, & tamen ex eadem materia omnes con-  
 40 stent, efficitur ut alimentum quod cæteris ad caudam transmittatur, ijs in crura id absumptū reddat eam partē auctiorem. quapropter in uolatu pro cauda ijs utuntur. porrectis enim cruribus in auersum uolant. ita enim fit, ut inter uolandum non impediatur pedū prolixitas, sed iuuat. At quibus crura breuia sunt, hæc ad uentrem contractis cruribus uolant. cum enim nullis earum impedimento sint pedes ita positi, uncungibus uel ad raptum habentur expeditiores. Quæ longo sunt collo, si id crassius habent, uolant collo porrecto, si tenue, curuato feruntur. cum enim tenue præ longitudine quatitur, facile frangi potest. Clunis auiibus omnibus est, quamquam non clunem, sed femora bina habere propter longitudinem clunis uideantur. quippe cum ad medium usq; uentrem porrigatur. Causa est, quod genus hoc

animalium bipes est, non erectum, nam si modo hominum aut quadrupedum clunem breuem à sede, crurisque deinde directæ strue subditum haberet, omnino stare non posset, homo enim quia erectus est, stare potest. Quadrupedibus crura priora ad corporis pondus sustinendum subdita sunt. At aves nec erectæ sunt, quoniam sua natura in pomilionem degenerat; neque crura habent priora, quoniam alas uice eorum sortiuntur. itaque natura pro his clunem longiorem emolita duxit ad medium, corpusque pronum fulciuit: & crura subdidit ea parte, qua pondere æquilibrare, & ambulare æquilibrio possent, & consistere. Sed quam ob causam genus auium bipes non erectum sit, explicatum iam est, cur autem crura carnosæ non habeat, eadem causa est, quam de quadrupedum cruribus reddidimus. Sunt autem digiti quaterni 10 æque omnibus, tam multifido, quam palmipedi generi, nam de struthione terræ Africæ incola postea definiemus, ut bifidus est, unâ cum reliquis quæ ad auium genus habet contrarijs. Sed cum omnibus quaterni digiti sint, tres parte priore habentur, unus posteriore pro calce, ut tute sit, qui minutus inest in his quæ longa habent crura, ut in crece euenit, nec est quod plures habeat digitos, sed cum talis digitorum positio in cæteris sit, in iynge una, quam turbinem appellatam dixi, utrinque bini, causa est, quod eius corpus minus quam cæterarum propensum est in aduersum. Testes omnibus auibus esse certum est, sed intus lumbis adherent, cuius rei causam in generationis ratione animalium explicabimus, partes auium ita se habent.

*De partibus exterioribus piscium, & causis quare sic à natura institutæ sint.*

20

## Caput XIII



**P**iscium genus mutilatius item ac imperfectius, quam auium, partibus exterioribus est. Non enim crura, non manus, non alas hoc habet, cur ita, causa iam exposita est, sed continuo simplici corpore à capite in caudam usque porrigitur. Cauda uero ipsa non omnibus similis est, sed cum cæteris non euariet, planorum nonnullis spina consistat, & longa est, incrementum enim eius partis ad piscis latitudinem transit, ut in torpedine, pastinaca, & si quid aliud eiusmodi cartilagineum est, horum igitur cauda spinosa & longa est, quorundam carnosæ quidem, sed breuis, eadem causa qua & torpedini, nihil enim refert, brevis carnosaque sit, an longa atque rigidior, contra accidit ranis, 30 quod enim latitudo earum parte priore minus carnosæ est, ideo natura quantum corporis prioris ademerat, tantum posteriori & caudæ addidit, piscibus nulla membra dependent, quoniam eorum natura natilis est, ratione suæ substantiæ, nihil enim superuacaneum, nihil frustra natura agit. Sed cum sua substantia sanguinem habeant, & tamen natiles non gressiles sint, pinnulas habent ut nantes, pedibus carent ut non pedestres, sed aquatiles, pedum enim additio utilis ad motum qui in pedo, hoc est solo, agatur: unde & nomen inditum pedibus est. Ad hæc, fieri non potest, ut simul & quaternas habeant pinnulas, & pedes, aut aliud eiusmodi membrum, cum sanguinem habeant. Corduli quamuis brachijs præditi, pedes habent, quoniam penna carent, caudam etiam habent laxam & latam, pisces qui non lati 40 sunt modo raia aut pastinaca, quaternas pinnulas habent, binas parte prona, & binas supina, neque est qui habeat plures, sanguine enim careret, binas, quæ parte prona lateribus geruntur, omnes ferè habent, reliquis quæ subditæ sunt, carent nonnulli ex longis & corpulentis, ut anguilla, ut conger, & mugilum genus, quod in lacu Sipharum nascitur, nullæ omnino pinnæ prælongis, & serpentis speciem referentibus, ut murenæ: sed flexuoso impulsu corporum ita humore utuntur, ut terra serpentes, modo nanque eodem serpentes natant, quo in sicco repunt. Causa cur id genus piscium pinnis careat, eadem est, qua serpentes pedibus uacent, cuius rei causam explicauimus, cum de incessu & motu animalium ageremus, aut enim

male

male mouerentur, aut nullo pacto moueri possent, si quaternas mouendi notas haberent. uix enim moueretur, siue propinquas inter se haberent, siue remotas propter longius interuallum. sed si plures mouendi notas, sanguinis uacua essent, hæc eadem causa bipennibus quoque piscibus reddenda est. serpentis enim ea quoque faciem referunt, & sui corporis flexu pro duabus pinnis utuntur. unde fit, ut in sicco & repere possint, & diutius uiuere. itaq; alteri non protinus, alteri cum pedestrīs naturæ familiares sint, minus exanimantur. Qui autem binis tantummodo pinnis natant, eas habent quæ parti pronæ adhærent, nisi latitudo prohibeat, easq; iuxta caput positas gerunt qui habent, quoniam eo loco longitudine careant, qua uice pennarum moueantur. corpus enim eius generis piscium exporrectum in caudam est. Raia & similes pro pinnis extrema sui corporis latitudine natant. Squatina & ranæ pinnae lateribus accommodatas infra gerunt, propter amplitudinem partis superioris. quæ autem parti supinæ commissæ sunt, eas iuxta caput adiunctas habent. nihil enim latitudo impedit, quo minus moueantur. sed pro superis illis has gerunt minores ijs, quæ ad latera applicantur. Torpedo duas iuxta caudam pinnae habet, pro reliquis latitudine utitur, & utroq; sui corporis semicirculo, quasi geminis pinnis natat. de partibus capitis & sensorijs antea dictum est. Piscium autem genus præ cæteris quæ sanguinem habent animalibus propriam sibi branchiarum naturam sortitum est. cur ita, causam cum de spiratione ageremus, reddidimus. Quæ autem branchias habent, aut intactas gerunt, aut detectas, ut genus omne cartilagineum. causa est, quod cartilagineum tum branchiæ, tum earum tegmenta constant. Genus autem hoc omne cartilagineum habet spinam. motus etiam cartilaginei generis lentus, pigerq; est, quoniam non spina aut neruo corroboratur. contra genus spinatum celeriter fertur. tegmentum autem quod branchias operiat, celeriter moueri oportet, cum branchiarum natura quasi ad spirandi usum piscibus data sit, quam ob rem in spinatis non modo tegmentum, uerumetiam ipsi branchiarum meatus contrahuntur, ut celerius agatur. habent branchias alij multas, alij paucas; & alij duplices, alij simplices. sed nouissimam simplicem magna ex parte. uerum cognitio diligentior ex confectionibus commutationeq; animalium petenda est. caviæ copiæ & inopiæ branchiarum, caloris cordi insiti copia, aut inopia est. in quibus enim plus inest caloris, hæc celerius moueri oportet & uehementius. geminæ autem branchiæ atq; duplices, talem naturam potius quam simplices paucioresq; obtinent, unde fit, ut nonnulli ex ijs qui branchias habent pauciores, minusq; continentes, diu extra aquam uiuere possint, ut anguilla, & quicunq; serpentis speciem referunt. non enim multum refrigerationis desiderant. Sunt & oris discrimina. alij enim os ante & promptum est. alij infra parte supina, ut delphinis, & cartilagineo generi. quam ob rem hæc nisi conuersa resupinantur, cibum corripere nequeunt. quod natura non modo salutis gratia cæterorum piscium fecisse uidetur. dum enim sese ista conuertunt, mora intercedit, qua piscis quem insectantur, euadere possit. nam omnia id genus rapina piscium uiuunt. uerumetiam ne nimis suam deuorandi auaritatem explerent. cum enim facilius caperent, breui per immodicam satietatem perirent. quoniam etiam cum rostrum eorum structura tereti, ac tenui sit, facile scinditur in oris habitum non potest. Ad hæc differentia existit, quod alij os rescissum, alij subinde in acutius compressum. carne uescantibus rescissum, ut ijs quibus sepectinatim stipat dentium series. ijs enim uires ore continentur. compressum, & ut modo dixi, coarctatum ijs quæ non carne uescantur. Cutis alij squamata (etenim squama præ rigiditate tenuitateq; desiliens summa corporis occupat) alij aspera, ut squatinæ, raia, & reliquis generis eiusdem. alij lenis, sed paucissimis. cartilaginea squamis carent, sed aspera cute muniuntur, quoniam spina cartilaginea con-

stant, terrenam enim portionem natura inde ad cutem transtulit, inq̃ eius asperita-  
tem absumpsit. Testes piscium nullus, nec intus nec foris habet, nec serpentes, aut  
ex ijs aliquid quæ pedibus carent, partem eam habere compertum est: sed eius  
uice mearum excremento, & generationis usui accommodatum habent eundem,  
quem cætera quoque ouipara, eademq̃ quadrupeda omnia continent, quoniam  
nec uesicam habent, neque excrementum humidum secernunt. piscium genus his  
à cæteris animalibus differētijs discrepat. Delphini, balenæ, & reliquum cetarium  
genus branchijs carent: sed fistulam sui pulmonis causa continent, qua humorem  
quem in ore acceperint, respuāt. nam & humorem admitti necesse est, cum cibum  
in aqua submersum capiāt, & admissum emitti necesse est. branchiæ igitur ijs quæ  
spirant, incommode habentur. causam uero cum de spiratione ageremus, reddi-  
dimus. haud enim fieri potest, ut idem & branchias habeat, & spiret. sed enim ijs ad  
respuendam aquam fistula data est, quæ ante cerebrum sita est, ne postposita id in-  
terciperet à spina. causa uero cur pulmonem hæc habeant, & spirent, quod maio-  
ra animalia plus caloris sibi requirunt, ut possint moueri, quapropter pulmo ijs in-  
ditus est, plenus caloris sanguinei. sunt hæc quodammodo & terrestria & aquati-  
lia. ut enim aërem terrestrium more trahunt, sic pedibus uacant, & cibum in hu-  
more modo aquatiliū capiunt. Vituli etiam marini & uespertiones, quoniam  
ambigant, alteri cum aquatilibus & terrestribus, alteri cum uolucris & pedestri-  
bus, ideo participes & utrorunq̃ & neutrorum sunt. uituli nanque marini, si ut  
aquatiles inspectantur, pedes habent: si ut pedestres, pinnas. quippe qui pedes po-  
steriores pisceos admodum habeant, atque etiam dentes omnes ferratos acutosq̃.  
uespertiones etiam pedes ut uolucres habent: sed ut quadrupedes non habent.  
cauda etiam tam quadrupedis quàm uolucris carent. nam quia uolucres sunt, cau-  
da quadrupedis uacat. quia pedestres, uolucris. quod ijs necessariò accidit. habent  
enim cuteas pennas. nullum autem uolatile caudam habet, nisi penna scissa uola-  
tile sit. Genus enim id caudæ ex penna eiusmodi constat. cauda uero quadrupedis,  
generi uolatili adiuncta, uel impedimento eius pennis proculdubio esset.

De struthione Africo, & eius natura, & forma.

Caput XIII

30



Truthio etiam Africus eodem modo partim auem, partim quadru-  
pedem refert. quippe qui non ut quadrupes pennas habeat, ut non  
auis sublimis non uolet. nec pennas ad uolandum commodas gerit,  
sed pilis similes. Item quasi quadrupes sit, pilos habet palpebræ supe-  
rioris, & glaber capite, & parte colli superiore est. itaque cilia habet pi-  
losiora, sed quasi auis sit, infra pennis integitur. Bipes etiam tanquam auis, bisulcus  
tanquam quadrupes est. nō enim digitos habet, sed ungulam bipartitam, quarum  
rerum causa est, quod magnitudine non auis, sed quadrupedis est. magnitudinem  
enim auium minimam esse propè dixerim, necesse est. corpus enim molem subli-  
mem moueri nequaquam facile est. Sed de partibus animalium quam ob causam  
quæq̃ sint, dictum iam est per omnia animalium genera. Quæ cum explicata sint,  
sequitur ut de generationibus animalium differamus.





# ARISTOTELIS DE GE

NERATIONE ANIMALIVM LIBER PRIMVS,  
INTERPRETE THEODORO.

Vniuersalis generationis partitiō.

Caput I



10 **M** V M DE cæteris animalium partibus, tum summatim,  
tum singulatim seorsum de proprijs generis cuiusq; di-  
ctum iam sit, quemadmodum, & qua de causa unum  
quodq; esset, eam causam dico, cuius gratia quippiam  
sit. ponimus enim causarum genera quatuor numero:  
primum cuius gratia, ut finem, secundum, substantiæ  
rationem, quæ quasi unum quoddam ferè existiman-  
da sunt, tertium uero, quartumq; materiam, & id un-  
de principium motus, sed cum de cæteris dictum iam sit:  
ratio enim, & id, cuius gratia, ut finis, idem est: materia

20 uero animalibus partes sunt totis dissimilares, dissimilaribus similes, ipsq; ea quæ  
elementa corporum appellantur: restat ut de partibus quæ ad generationem perti-  
nent disseramus, de quibus nihil adhuc definitum est. atq; etiam de causa mouente  
quænam sit, sed de ea ipsa causa considerare idem quodammodo est, atque de ge-  
neratione cuiusq; agere. Quam ob rem nostra hæc disputatio in idem ea coniecit,  
cum & partes, quæ ad generationem accommodantur, ultimas disposuisset, & ge-  
nerationis principium ab ijs proximum collocasset. Animalium alia per coitum fœ-  
minæ & maris gignuntur, scilicet in quibus generibus sexus uterq; est, non enim  
30 in omnibus, sed in præditis sanguine, paucis quibusdam exceptis, alterum mas, al-  
terum fœmina perfectum euadit, exanguium uero quædam marem & fœminam  
habent, ut sobolem eiusdem generis procreant, alia procreant quidem, sed non sui  
generis prolem, scilicet quæ non ex coitu animalium prodeunt, sed ex terra putri,  
aut excrementis, quod autem in uniuersum dixerim, eorum quæ locum mutare  
solent, aut nando, aut uolando, aut gradiendo, uidelicet prout quodq; actum suo  
corpore est, nonnulla toto genere suo sexum utrumque obtinent, non modo san-  
guine prædita, uerumetiam exanguia quædam, nam eorum quoque alijs toto ge-  
nere sexus uterque est, ut mollibus, ut crustatis: alijs maxima parte, ut generi inse-  
ctorum, eorum autem ipsorum quæ ex coitu cognatorum animalium gignuntur,  
40 ipsa quoque sibi cognata progenerant. At uero quæ non ex coitu, sed putri mate-  
ria oriuntur, ea generant quidem, sed genus diuersum quodq; prodijt, nec mas est,  
neque fœmina. Talia sunt nonnulla in genere insectorum, quod iusta euenit ra-  
tione, nam si ex coitu eorum, quæ nō ex animalibus orta sunt, animalia orirentur,  
hæc si eiusdem generis essent, primum quoque ortum parentum talem esse opor-  
teret, quod recte ita censemus, quando sic euenire in cæteris animalibus patet, sed  
si dissimilia quidem, sed quæ coire inter se possent, gignerentur, rursus ex ijs alia  
quædam natura procrearetur, & alia ex ea, idq; in infinitum procederet. At natu-  
ra infinitum uitare solet, infinitum enim sine caret, natura autē semper finem quæ-  
rit, Quæ autem non gressilia sunt, ut testatum animalium genus, & quæ saxis ad-

hærentia uiuunt, quoniam natura simili plantis constât. hinc ut in illis, sic in ijs mas deest, & fœmina: sed similitudine proportioneq; nomen sexus accipiunt. habent enim parum eiusmodi differētiæ. quodam etenim in stirpium genere, sunt eodem in genere arbores, quæ fructum ferant, & quæ ipsæ quidem non ferant, sed ferentes adiuuant illas ad maturandum, ut inter ficum & caprificum euenit. generationis etiā ratio eadem in stirpibus quoque est, cum aliæ semine prodeant, aliæ sponte naturæ, oriuntur enim à putrescente uel humo, uel parte aliqua plantæ. Sunt enim quæ ipsa per se nunquam seorsum consistant, sed in alijs arboribus dico, soleant generari, ut uiscum, sed de stirpibus siue plantis seorsum opere per seipsis dicato agendum est.

*Principium generationis esse mare, & fœminam.*

*Caput II*



Vnc de animalium generatione differendū est, prout cuiq; ratio competit, deducenda ex ijs, quæ dicta iam sunt. Generationis enim principia, ut retulimus, illa potissimum quis statuerit, mare & fœminam, mare, ut quod motus & generationis originem teneat: fœminam, ut quod materia, quam rem ita esse potissimum credes, si quemadmodum, undeq; semen genitale fiat, intellexeris. Ex hoc enim quæ natura oriuntur, cōsistunt. id autem quemadmodū ex mare ac fœmina prodeat, nequaquam latere oportet. quod enim ea pars de fœmina mareq; secernitur, & in ijs atq; ex ijs hæc secretio fit, ideo mas & fœmina principium conferunt generationis. Mare nanque id animal dicimus, quod in alio gignit. fœminā, quod in seipso. quam ob rem in uniuerso quæque naturam terræ, quasi fœminam matremq; statuunt, cœlum autem & solem & reliqua generis eiusdem, nomine genitoris patrisq; appellant. Mas autem & fœmina inter se differunt ratione, quod facultas utriusq; diuersa est. sensu autem partibus corporis quibusdam discrepant. rationis discrimen ita exultat, ut mas sit quod in altero generare potest, ut dictum est, fœmina quod in seipso, & ex quo fit quod generatur, contentum in eo quod generat. Sed quā facultate & munere quodam hæc distinguantur, ad omnem autem officij functionem instrumento opus sit, instrumentaq; facultatibus partes corporis accommodentur, ad procreationem quæque, & coitum partes aliquas esse accommodatas necesse est, easq; inter se diuersas, quibus mas à fœmina differat. nam etsi de toto animali mas aut fœmina dicitur, tamen non quauis sui parte potētiāq; idem mas, aut fœmina est, sed certa quadam uirtute siue potentia, & parte. sicut & uim cernendi gradiendiq; obtinet, ut sensu patet. partes uero eiusmodi sunt fœminæ, uteri, & uulue: maris testes, & coles, in omnibus sanguine præditis. corū enim alijs testes, alijs meatus eiusmodi quidam sunt, in genere etiā exangui discrimen maris & fœminæ est, quibus hæc sexus contrarietas data est. differunt forma inter se partes ad coitum delegatæ in sanguineo genere, sed intelligendū sic est, ut principio uel exiguo immutato, multa ex ijs quæ a principio sunt, immutari soleant. patet hoc in exectis, quibus parte genitali tantū corrupta, tota fere forma usque eō commutatur, ut aut fœmina esse uideantur, aut parum absint, tanquam non qualibet sui corporis parte, aut potentia, animal sit fœmina aut mas. cōstat igitur principium quoddam esse mare ac fœminam. itaque merito fit, ut multa commutentur, cum animal, qua fœmina aut mas est, immutatur, quasi principium dimoueat.

*Genitalia*

Genitalia membra non eadem omnibus esse animalibus.

Caput III



Estes, & uteri, aut uulvæ, nō pariratione in omnibus sanguine præditis animalibus sunt. iam enim ut primum de testibus dicam, alia omnino testibus carent in eo genere, ut pisces, ut serpētes: meatusq̃ tantū geminos semini genitali præscriptos obtinent. alia habent quidem testes, sed intus lumbis adhærētes, quā renes continentur: meatusq̃ ab eorum utroq̃ foras tendunt, ut in ijs quæ testibus carent, qui in idem coniungantur, quomodo in illis constitutum est. ita aues omnes habent & quadrupedes, quæ ova pariunt, inter eas quæ aërem accipiunt, pulmonemq̃ obtinent, his enim omnibus testes lumbis intus adhærēt, meatusq̃ gemini ab his similiter atque serpentibus tendunt, ut lacerto, testudini, atque omnibus cortice inrectis. Quæ autem animal gignunt, omnia testes in aduerso habēt. sed nonnulla intus uluma conditos aluo, ut delphinus. nec meatus, sed penem pertendentem habet, ut boues. alia foris gerunt, quorum alia pendentes, ut homines: alia annexos ad sedem sessiles, ut fues. sed de his diligentius distinctum est in libris, quos de historia animalium scripsimus. Vteri omnium bipartiti sunt, ut testes gemini omnibus maribus habentur. sed alijs iuxta genitale, ut mulieribus, & omnibus quæ animal non solum foras, sed etiam intra se generant, & piscibus qui ova ædunt: alijs iuxta septum transversum siue cinctum, ut auis omnibus, & piscibus qui animal pariunt. Crustatis etiam uulvæ bifidæ sunt, atque etiam mollibus. quæ enim ova eorum uocātur pro uulua habent membranas, quibus continentur. Sed hoc maxime indiscretum est in polypis, ut simplex esse uideatur. cuius rei causa est forma corporis, quæ similis undique est. insectis etiam quibus aliquid magnitudinis, bifidæ sunt, minoribus incertæ propter corporis exiguitatem. partes quas explicādas proposui, ita se habēt.

Quam ob causam natura testiculos animalibus indidit, quæ item animalia citius, & quæ tardius coëant: & quod taurus cum statim à castratione iniisset, impleuerit.

Caput IIII



E differentia instrumentorum genitalium quæ in maribus sunt, qui, quas ob causas sint, consideret, accipiat primum necesse est, cuiusnam rei gratia testium constitutio habeatur. ergo si natura rem quamcunq̃ facit, aut quia necessaria est, aut quia melius ita est, hoc etiā membrum ob eorum alterutrum esse debet. sed non necessarium id esse ad generationem patet. omnibus enim quæ generant adiunctum esset, si necessitatis ratio haberetur. nunc uero nec serpentibus testes sunt, neque piscibus. uisi sunt enim coire, plenosq̃ seminis genitalis habere suos meatus. restat igitur ut melioris cuiuspiam notæ gratia testes habeantur. Sed enim maximæ animalium parti munus nullum ferè aliud est, nisi quod plantarum semen & fructus. utq̃ in ratione cibi uoraciora audioraq̃ sunt, quibus intestinū rectum, sic ea quæ testibus carent, meatusq̃ tantum habent, aut non carent, sed intus habent, omnia propensiora celerioraq̃ ad uenerem sunt. At uero quæ castiora esse conuenit, ijs ut in cibi usu intestino opus est non recto, sic meatus illi reuolutionem anfractusq̃ habēt, ne libido uehemens, crebraq̃ citetur. testes autem ad hanc rem emolita natura est. motum enim excrementi genitalis stabiliorem faciunt in uiuiparis, ut equis, cæterisq̃ eiusmodi, atque etiam hominibus, cum replicationem seruent. Sed quemadmodum se habeant, pendendum ex animalium historijs est. nullam enim partem meatuum testes complēt, sed adiecti pendunt, eo modo quo pondera textrices telis annectunt. his enim detractis meatus intro se retrahūt. quo fit, ne execta possint generare. nam nisi ita retraherētur, possent generare. & iam taurus quidā, cum statim à castratione iniisset,

impleuit. quoniā nondum retracti essent meatus. Auium uero & quadrupedum ouiparorum testes excrementū recipiunt genitale. itaque tardius ijs, quā piscibus semen prodit. pater hoc in auium genere, cum tempore coitus testes multo habeant grandiores, quā certo tempore coeant. At ubi id tempus praterierit, adeo exigui os habent, ut incertum ferē an habeant sit. cum tamen eo tempore quo coeunt, gerant prægrandes. celerius itaque ea coeunt, quā testes intra se continēt. quā enim extrā habent, non prius semen emittunt, quā retrahant testes.

*Quæ animalia membrum ad coitum accommodatum obtineant, & quæ non.*

Caput V



Instrumentum etiam accommodatum ad coitum quadrupedes obtinent. habere enim id possunt. Aues, & quæ pedibus uacant, habere nequeunt. quoniam alteris crura sub mediā aluo posita sunt, alteris nulla sunt crura, natura autem penis hinc pendet, & situm hunc tenet. & quidem ob eam rem euenit, ut in coeundo crura contendantur. nam & instrumentum hoc neruo constat, & crurum natura neruosa est. itaque cum habere id nequeant, testes quoque aut non habere, aut non eo loco habere necesse est. Idem enim situs penis & testium est in ijs, quæ habent utrumque. quin etiam ea quorum testes sunt extrā, cum penis per motū calefcit, semen genitale proinde collectum emittunt. non parato iam semine contrectant, ut pisces. Omnibus quæ animal generant, testes antē habentur, uel intus, uel extrā, præterquam herinaceo. hic enim unus lumbis adhaerentes continet: ob eandem, quā aues causam. coitum enim herinaceorum celeriter fieri necesse est, cum non more quadrupedū superueniant tergis, sed erecti coniungantur propter aculeos, causā quam ob rem testas habent quæ membrum hoc obtinent, & cur alia intus, alia extrā, declaratū iam est.

*Quam ob causam nonnulla animalia membro genitali careant.*

Caput VI



Væ autem carent eo membro, nō quia melius sit carere, ideo carent; sed tantum quia necessarium, ut dictum est, quoniam celeriter peragatur eorum coitus necesse est. qualis natura piscium & serpentum est. pisces enim incurrentes attingunt, absoluunturque ocyllime, nam ut in hominum, & eiusmodi omnium genere semen genitale spiritu retento emitti necesse est, sic in piscibus, mari non in branchijs accepto emittitur. facile autem pereunt, nisi id assidue faciant. itaque nō ijs semen tantisper concoquendum est, cum coeunt, ut pedestribus & uiuiparis, sed tempestatis tempore iam concoctum continent uniuersum, ita, ut ne dum contingunt, conficiant, sed concoctum paratumque emitant. quam ob rem testibus carēt, meatusque simplices rectosque habent. qualis particula quædam circa testes quadrupedum est. replicationis enim meatus pars altera sanguinea est, qua recipitur materia seminis: altera exanguis, qua factum iam semen transit. itaque cum genitura eo deuenit, celeriter ea quoque absoluuntur. At piscibus talis totus meatus est, qualis in homine. cæterisque eiusmodi animalibus pars replicationis altera est. Serpentes complexu mutuo coeunt, carent testibus & pene, ut dictum iam est. pene, quia cruribus carent, testibus, propter sui corporis longitudinem. meatus modo piscium habent. quod enim eorum natura porrecta in longū est, si præterea in testes protraherentur, refrigeraretur genitura propter moram longioris itineris, quod ijs quoque accidit, quibus penis immo dicus est. sunt enim infœcundiores ijs quibus mediocri, propterea quod semen frigidum infœcundum est, refrigeratur autē quod longe admodū fertur. sed quam ob causam animalium alia habent testes, alia non habent, declaratū iam est.

Quomodo



Oeunt serpentes complexu mutuo, propter ineptam sui corporis formam ad applicandum. cum enim exigua quadam sui parte coniungantur, nequeunt prae nimia prolixitate adaptari. cumque membris quibus amplectantur careant, pro ijs agilitate corporis utuntur, complexturque mutuo sese obuoluētes expediunt uenerem. unde fit, ut lentius absolui quam pisces uideantur, non solum meatuum prolixitate, sed etiam ea ipsa, qua utuntur solertia.



E uteris aut uuluis quemadmodū se habeāt, ambiges. magna est enim eius partis diuersitas. nam neque uiuipara omnia habent simili situ, sed cum homines, omneque genus terrestre infra ad genitale habeant, cartilaginea supra continent iuxta septum, neque ouipara sibi conueniunt, sed pisces infra ut homines, & quadrupedes uiuiparae habent, aues & quadrupedes ouiparae supra. attamen ipsi quoque situs contrarij non sunt a ratione remoti. iam enim quae oua pariunt, diuerse pariunt. etenim alia imperfecta emittunt oua, ut pisces, foris enim piscium oua perficiuntur & augentur, cuius rei causa est, quod magna fecunditas est. idque munus eorum, ut stirpium est, quod si intra se foetū perficerent, pauciora necessario aderent. nunc uero & tot continēt, ut uulua unū esse ouū in paruis quidem pisciculis uideatur. Sunt enim hi fecundissimi, ut in caeteris quoque tum plantis, tum animalibus euenit, quorum natura his proportionetur. in ijs enim magnitudinis incrementū uertitur in seminis copiam. Aues & quadrupedes ouiparae oua aedunt perfecta, quae ut seruari possint, duro iam consistent putamine oportet. sunt enim quandiu crescunt molliora, testa autem efficitur calore externo euaporante humorem. itaque calidum esse locum, in quo id fiat, necesse est. talis autē locus septi transuersi est, quippe qui cibum concoquēdo perficiat. Quod si oua contineri in uulua necesse est, uulua eorum quae oua aedunt perfecta, sitam esse ad septum necesse est. eorum autem quae imperfecta, infra, ita enim in promptu erit, & sua uero natura uulua propensior ad situm inferiorem, quam ad superiorem est, nisi quid aliud opus naturae impedit. infra est enim exitus eius officium.



uiuipara etiam inter se differunt. alia enim non modo foras, uerumetiam intra se animal generant, ut homines, ut equi, ut canes, denique omnia quae pilis teguntur, & inter aquatilia delphini, balenae, & reliqua cetarum generis.



Artilaginea uero, & uiperarum, cum intra se oua generant, mox animal foras pariunt, perfectum generant ouum, ita enim ex ouo animal gignitur, ex imperfecto nullum. non extra, haec pariunt oua, quia natura frigida sunt, non quia calida, ut quidam uolunt.



Ve molli intacta generant oua. quod enim caloris exigui sunt, ultimum siccare natura eorum non potest. Quia igitur frigida sunt, molle generant; quia molle, non extra, periret enim propter suam molliem. Cum autē ex ouo animal gignitur, eodem quo in auius modo parte plurima generatur, descendunt oua in imum, efficiunturque animalia infra ad genitale, quomodo in ijs fit, quae iam inde a primo ortu animal generant.

quam ob rem uulua quoq; eorū dissimilis tum uiuiparis, tum ouiparis est, quoniam utriusq; consortiū generis habent. nam & suprà ad septum, & infrā porrectā genus omne cartilagineū habet. sed tam de ea, quā de ceteris uulue aut uteri generibus, quemadmodū se habeant, per historias, dissectionesq; animalū indagandum percipiendumq; est. itaq; hoc genus & suprà continet uuluam, quia ouiparū perfectiorū ouorū est: & infrā, quia uiuiparū est, atq; particeps utriusq; euadit. At uero ea quæ protinus animal generāt, omnia infrā habent, nullo enim naturæ opere impediuntur, nec partū geminant. Ad hæc, fieri non potest ut animalia iuxta septum gignantur. foetus enim pondus & motum habere necesse est. is autē locus cum uitalis sit, hæc pati non potest. difficultatē etiā pariendi ita accidere necesse est propter delationem longiorem, nam & nunc mulieres, si in partu uel oscitando, uel aliqua eiusmodi causa retrahunt, difficilius pariunt. Inanes etiā uteri, aut uulue sursum ad iunctā strangulant. necnon ualidiores esse eas quæ animal contineant, necesse est, quam ob rem omnes eæ carnosæ sunt. Quæ autē ad septum iunguntur, membraena constant, tum etiā in ijs ipsis animalibus quæ geminant partum, planum hoc idem fit, oia enim suprà, atq; ad latus continent. animalia uero parte infera uulue gerunt. sed quam ob causam situ contrario uuluas nonnulla animalia habent, & omnino quam ob rem alijs infrā, alijs suprà ad septum continetur, dictum iam est.

Quam ob causam uteros intus animalia habeant, testes uero alia intus, alia extra. Cap. XII 20



Uter autem uteros aut uuluas omnia intus habeant, testes alia extra, alia intus, causa est, quod cum utero contineatur quod gignitur, idq; custodiam operimentū & concoctionem desideret, hinc uteri aut uulue omniū intus sunt. locus enim exterior corporis & frigidus est, & offensionis expositus. Testes alijs intus, alijs extra, propterea quod ijs quoq; operimento & uelamine opus est, tum ut seruentur, tum ut semen genitale persicere possint. haud enim fieri potest ut frigentes & gelidi possint retrahi, atq; emitere geniturā. quam ob rem quibus testes in propatulo sunt, habent operimentū cuteum, quod scortum uocatur. Sed quibus natura cutis præ sua duritia obstat, ne mollis, cutea, & ad cōplectendum habilis sit, ut ijs quæ aut piscea cute, aut cortice teguntur, ijs intus habeantur, necesse est. quapropter delphini, & quæcunq; cetarij generis habent testes, intus continēt: atq; etiā ouiparæ quadrupedes corticati generis. cutis etiā auium dura est, ut magnitudini debitæ inhabilis sit ad comprehendendū. causam his omnibus designari necesse est, unā cum ijs, quas antea diximus, ex ijs quæ per initum & rem uenerē accidunt. hæc eadem causa est, & ut elephantus ac herinaceus testes habeant intus. cutis enim ijs quoq; inepta ad habendā paritculam quæ operiat. Situs etiā uterorū contrarius in ijs quæ animal intra se generant, ad ea quæ oia addunt. atq; etiā eius ouipari generis in ijs quæ uterum infrā habent, ad ea quæ suprà ad septum. uerbi gratia, piscibus ad aues, quadrupedesq; ouiparas, atq; etiā ijs, quæ modo utroq; generant, ut oia intra se pariant, animal adant in lucem. quæ enim intra se & foris animal generāt, uterum habent in aluo, ut homo, bos, canis, & reliqua generis eiusdē. nam ad foetus tum salutē, tum incrementum, expedit nihil ponderis insidere uteris.

Meatus excrementi siccī & humidī, in omnibus animalibus esse diuersos.

Cap. XIII



Eatus etiā diuersus ijs omnibus est, quo excrementū siccū, & quo humidū exit. quam ob rem omnia id genus, tam foemina, quā mascula, genitalia habent, quo excrementū siccū, & quo humidū secerantur, quoq; maribus genitura, foeminis partus emittatur. parte priore superiori meatus is continetur. Quæ autē pariunt quidem oia, sed

sed imperfecta, ut pisces ouipari, ijs non sub aluo, sed lumbis adhærens uulua continetur, nec enim incrementū oui impedimento est: quoniam inchoatum prodians ouum foris perficitur. & meatus idem excrementarius alimenti sicci, & intus est omnibus quæ genitali carent. ouiparis etiam ijs quæ habēt uesicam, ut testudinibus. Generationis enim causa non excremēti emittendi duplex meatus est: sed quia feminis natura humida est, ideo meatus idem cōmunis cum excremento humidī alimenti habetur. constat hoc ita esse eo, quod cum genitale semen omnia animalia ferant, excrementū tamen humidum illud non omnia reddunt: sed cum & maris feminæ meatus, & foeminæ uterum firmari nec oberrare oporteat, idcirco aut in parte priore corporis, aut in posteriore ad prona effici necesse sit, idcirco uiuiparis propter foetum uterus in parte priore positus est, ouiparis ad lumbos & prona. Quæ autem animal ædunt in lucem, cum intra se oua generarint, ijs situs uterq; quoniā utrumq; referunt genus: & eadem tum uiuipara, tum ouipara sunt. partem enim uulua superiorē in qua oua gignuntur, sub septo ad lumbos & prona habent: in ferriorem ad aluum, hac enim iam procreant animal. Meatus idem ijs quoq; sicci alimenti, & coitus est. nulli enim ex ijs genitale pendet, ut antea dictum est. meatus etiam genitales marium, tum eorum quorum proprij sunt, tum uero eorum qui testes habēt, simili modo atq; uulua ouiparorū habentur. omnibus enim ad prona & spinæ locum adhærent. non enim uagari, sed stabiles esse oportet, talis autē locus posterior est. is enim est qui continentia præbeat & stabilitatē. Quibus itaq; testes intus continentur, ijs protinus cum meatibus firmanantur. nec secus ijs est, quibus extra tum eodem deueniūt, scilicet in locum genitalis, cōmuniq; excipiuntur meatu. similis & delphino meatuum modus est, sed testes sub aluo occulti. sed quemnam situm partes ad generationem accommodatæ, & quas ob causas tenuerint in his generibus, dictum iam est.

*Crustacea, mollia, testacea, & insecta animalia, tum inter se, tum cum sanguineis in generatione differre.* Caput XIII

**C**eteris quæ sanguine uacant animalibus, non idem membrorū ad generationem pertinentiū modus: sed tum inter seipsa, tum etiam cum sanguineis dissident. Sunt hæc reliqua genera quatuor numero, unū crustatum, secundum molle, tertium insectum, quartum testatū. An quarti generis ulla coeant, incertū est. plurima tamen non coire aptum est, quemadmodum consistant, postea dicemus. crustata coeunt modo eorum quæ in auresum mingunt. cum alterū supinum, alterū pronū applicauerint caudas. etenim ne parte supina superueniāt, pronam impediunt caudæ præ suarū pinnarū proluxa appendice. habent in hoc genere mares tenues genitales meatus, foeminæ uuluas membraneas ad intestinū fissas, hinc atq; inde, in quibus gignitur ouum.

*De coitu & generatione mollium animalium.*

Caput XV

**M**ollia ore coeunt, renixu complexuq; mutuo brachiorū. sic enim coniungi necesse est, quoniā natura exitum excremēti in os inflectendo adduxerit, ut ante dictum est, cum de partibus ageremus. habere foeminas omnes in hoc genere membrū uuluale apertum est. Continēt enim ouum primo indiscretū, mox discretū in plura, & pariūt omnia imperfecta modo ouiparorū piscium. meatus ille interior idem excremēti & uulua est, tum in ijs, tum etiam in crustatis. est enim quā semen genitale per meatū emittant, idcirco parte corporis supina, qua putamen distat, & mare illabitur, faciūt. quam ob rem ea parte mas cum foemina copulatur. nam si mas, siue semen, siue membrū, aut aliquā uirtutē, siue uim aliam mittat, admoueri ad meatū uulualet necesse est.

crinis uero insertio maris polypī per fistulam, qua piscatores crine coire polypos a-  
iunt, cōplexus gratia fit, non quasi instrumentū id sit utile ad generationē. etenim  
extra meatum corpusq; est, interdum tergis quoq; mollia copulantur: sed genera-  
tionis ne gratia, an alia causa, nondum exploratum habetur.

De coitu & generatione insectorum.

Caput XVI



Insectorū aliqua coeunt, atq; ex animalibus eiusdem generis oriūtur  
modo eorū quibus est sanguis, ut locustæ, cicadæ, phalangia, uespæ,  
formicæ. aliqua coeunt quidem & generant, sed non sui generis ani-  
mal, sed uermiculos tantum, neq; ex animalibus procreantur, sed ex  
putrescente humido aut sicco, ut pulices, muscæ, scarabæi, quādā nec  
ex animalibus nascūtur, neq; coeunt, ut culices, & uermiculi, & plura eiufmodi ge-  
nera. inter ea uero quæ coeunt, fœminæ maxima ex parte maiores maribus sunt:  
nec meatus ulli feminales in maribus esse uidetur. nullum, parte plurima dixerim,  
membrum fœminæ à mare inferitur, sed mari à fœmina sursum de parte inferiore.  
quod conspectū in pluribus est. nec de superuētū ambigitur: sed contrā, ut mas fœ-  
minæ inserat, uisum in paucis est, neq; adhuc ita exploratū habetur, ut genere pos-  
simus distinguere. Hoc idem ferè in piscibus quoq; ouiparis maxima ex parte, & in  
quadrupedibus ouiparis est, ut fœminæ maiores sint maribus, quoniam id cōmo-  
dum est ad uterum magna ouorū copia extumescētē. fœminis in eo genere mem-  
brum, quod pro uulua habetur, fissum iuxta intestinū, ut cæteris, positū est, in quo  
foetus generatur. patet hoc in locustis, & reliquis, quorum magnitudo aliqua fit, &  
natura coitum recipiat. maxima enim pars generis insecti perexigua est, instru-  
menta generationi accommodata, de quibus non antea differuimus, ita se habēt. Si-  
miliarium partium semen genitale, & lac reliquimus: de quibus nunc opportune  
dicemus. & primum de semine, pōst in sequentibus de lacte.

Quæ animalia semen emittant, quæ non: & quorundam opinio, qui semen ex unaquaq;  
corporis parte prouenire affirmant.

Caput XVII



Emen alia aperte emittūt, ut ea quæ sunt natura sanguinea, alia, id est  
insecta & mollia, emittant nec ne, incertum est. itaq; considerandum  
hoc est, utrum mares omnes semen emittant, an non omnes. & si nō  
omnes, cur alij emittant, alij non. Tum etiam utrum fœminæ semen  
aliquod conferant ad procreationē, an non. & si non semen, utrum  
nec aliud quicquam adhibeant. an quamuis non semen, tamen aliquid conferant.  
Ad hæc, quidnam conducant ea quæ semen emittunt suo semine ad generationē,  
quærendum est, atq; omnino quæ natura sit seminis, & eorum quæ mensura uo-  
cantur: scilicet in ijs animalibus, quæ id humoris genus emittūt. Omnia ex semine  
gigni, semen autē ipsum proficisci à generantibus uidetur. Quam ob rem eiusdem  
studij est quæstio, utrum ambo, mas & fœmina emittant: an alter tantū, & utrum  
ex toto corpore secernit, an non ex toto. nam si non ex toto, nec ex ambobus qui-  
dem parentibus prodire probabile est. quapropter primum de hoc, quemadmodū  
se habeat inquirendū est. Sunt enim qui dicant id ex toto corpore prouenire. Qui-  
bus autem argumentis probent, ut semen ex unaquaq; corporis parte secernatur,  
quatuor ferè numero sunt. Primum uehementia uoluptatis, magis enim suaue est,  
quod idem amplioris sit affectus. amplius autē est, quod omnibus membris, quā  
quod paucis accidat. Secundum quod ex mancis manca procreentur, semen enim  
ab ea, quæ deest parte, proficisci negant, unde autē non accefferit, id ne procreetur,  
accidit. Tertium similitudo parentū. similes enim gignuntur, ut toto corpore toti,  
sic particulatim singulis partibus, quod si causa est, ut totum simile sit, quod ex tali  
toto



toto semen genitale prodierit, partibus quoque causa similitudinis erit, quod ex unaquaque parte aliquid uenerit. Quartum, quod ratio esse uidetur, ut quemadmodum totius aliquid est, ex quo primum generetur: sic partis quoque, cuiusque sit, semen ali- quod proprium, fide etiam illa faciunt huic opinioni uerisimilem. non solum enim rebus naturæ in suis, & natiuis, liberi similes parentibus prodeunt, sed etiam aduen- titas atque externas præsentant. iam enim cum parentes cicatrices haberent, filij qui- dam parte eadem sui corporis idem habuerunt. & Chalcedone, cum pater brachio esset compuncto, filius idem retulit: confusa tamen nota, minusque explanata. his fe- re rationibus quidam potissimum crediderunt, semen à toto corpore proficisci.

19 *Improbatio in eos, qui dicunt semen ex omnibus corporis partibus provenire, semenque esse excrementum. Caput XVIII*



Ed cum scrutamur, & diligentius rem discutimus, contra potius esse uidetur, nec supradicta quatuor illa soluere difficile est. & quædã alia sequuntur impossibilia ex ea ipsa opinione. Primum igitur, similitudo nullum indicium affert, ut semē genitale ex toto corpore secedat, quandoquidem & uoce, & unguibus, & pilis, & motu similes procreantur, ex quibus nihil proveniat, nonnulla etiam nondum habent cum generant, ut canos, aut barbam, maioribus item suis plerumque similes sunt, ex quibus nãhil secessit. redditur enim post plura genera similitudo: ut in Helide, quæ cum Aethiope concubuerat, non filiam forma Aethiopis peperit, sed natus ex filia erat Aethiops. In stirpibus etiam eadē ratio est, nam si hoc ita esset, in ijs quoque ab omnibus partibus semen proculdubio proficisceretur. at pleraque partes, aut illæ non habent, aut quisque abscondere potest, aut postgenitas habent, quinetiam ex fructibus nihil secedit: & tamen ij quoque forma eadem proveniunt, ad hæc, utrum ex unaquaque similari parte tantum prodit, uerbi gratia, carne, osse, neruo, an etiam ex dissimilibus, ut facie, & manu, nam si ex illis tantum, similes autem parentibus sunt, partium potius dissimilium forma, ut faciei, manuum, pedum, quidnam obster, ne illæ quoque similes sint secessu ex toto? Sed alia causa, quando nec in ipsis quidem  
30 similitudo propterea sit, quia ex toto corpore semen genitale secesserit. Sed si ex dissimilibus tantum, ergo non ex toto & partibus omnibus. at ex similibus magis conueniat, sunt enim priores, & dissimiles ex similibus constant. & ut facie ac manibus similes procreantur, sic & carne & unguibus. At uero si ex utrisque, quisnam modus sit generationis? constant enim partes dissimiles ex similibus, itaque quod ex ijs secedit, ex illis quoque secesserit, atque ex ipsa compositione, perinde quasi à nomine scripto quippiam proficiscatur, si à toto, uel à quauis syllaba proficiscitur, quod si à syllabis, ab elementis compositioneque prodierit, itaque si ex igne, & reliquis eiusmodi, carnes ossa ue constant, ex elementis potius fuerint, nam ex compositione quonam pacto possint? Atqui sine ea simile esse nihil poterit, quod  
40 si quid eam postea creat, id causa similitudinis fuerit, non secessio ex toto. Item si partes distractæ in semine sint, quonam pacto uiuat? sed si coniunctæ, paruum quoddam animal fuerit, genitales etiam partes quonam pacto consistant? non enim simile est quod à mare, & foemina secedit. Item si utriusque semen æque ex toto uenit, duo animalia generabuntur, utrumque enim omnia habebit, quamobrem Empedocles maxime (si ita dicendum est) consentanea huic rationi scripsisse uidetur hoc quidem loco, nam si alibi diuersa, non bene, dicit enim maris ac foeminae quasi symboli esse, totū uero à neutro proficisci, sed discerpta gerunt mas ipse & foemina membra, cur enim foemina non ex seipsa generet, siquidē semē ex toto secedit, & conceptaculum obtinet? Sed ut uidetur, aut non ex toto secedit, aut ita, ut ille ait, nō ex

utroq; eadem secedunt, quapropter alterum alterius coitum desiderat, sed impossibile illud quoq; occurrit, nec enim maiora possunt distracta seruari, animataq; esse, quomodo Empedocles generat amore, cum dicit: Multaq; ponuntur capita absq; sua ceruice, mox enim coalescere coagmentariq; ait, quod fieri non posse apertum est, quando nec anima uitaq; omni uacua seruari possent, neq; ueluti plura animalia coalescere in unum, & ijs qui ex toto secedere aiunt, accidit, ut eodem modo quo ille, dicant, nam ut tum amore in terra, sic ijs in corpore agitur, nō enim fieri potest, ut partes coniungantur, commeandoq; eodem deueniāt. Tum etiam quonam pacto dirimantur superiora, inferiora, dextra, sinistra, priora, posteriora: hæc enim omnia carent ratione, item cum partium alia facultate, alia affectibus distinguantur, uidelicet dissimilares, eo quod efficere aliquid possint, ut lingua, ut manus: similes duritia, mollitia, & reliquis eiusmodi affectionibus (non enim utcunq; se habet, sanguis est aut caro) cōstat ob eam rem fieri non posse, ut quod secesserit, uniuocum sit cum partibus corporis, uerbi gratia, ut sanguis à sanguine, caro à carne proveniat. At si ex diuerso quodam sanguis fiat, non ea causa similitudinis fuerit, quod ex omnibus partibus decesserit: ut aiunt, qui ita opinantur. Satis est enim ex una tantum secedere, quandoquidem non sanguis ex sanguine gignitur, cur enim non omnia uel ex uno gignantur: hæc enim sententia eadem esse uidetur, atq; illa Anaxagoræ, ut nullum simile gignatur: nisi quod ille commune id de omnibus asserit, hi uero generationi tantum animalium tribuunt. Ad hæc, quonam pacto ista augeantur, cum ex toto secesserint? Anaxagoras enim probe ait, carnes ex alimentis accedere, sed ijs qui eadem non dicunt, & tamen secedere ex toto pronunciant, quonam pacto alio accedente maius quicquam efficietur, si quod accesserit, maneat? At si mutari quod accesserit potest, cur non tam inde ab initio semen sit tale, ut gigni ex eo possit sanguis & caro, non ipsum sit sanguis & caro: nec uero dici potest temperatione post augeri, perinde ut uinum aqua adiecta, ita enim principio maxime syncerum meracumq; esset unumquodq;. nūc uero & caro, & os, & quæuis alia pars, quod dicitur, id postmodum magis est. Seminis autem partem aliquam dici neruum esse, aut os, longe plus est, quam ut noster sensus assequi possit, ad hæc si femina & mas differunt inter se uteri ratione, ut Empedocles ait, funditur in puris mas, femina frigore mixto, mutari uidemus tam uiros quam mulieres, ut quemadmodum ex infœcundis fœcundi, sic ex habilibus feminae procreandæ, ad maris procreationem propensi euadant, quasi non sit causa in secedendo ex toto, nec ne, sed in moderatione, immoderatione uel eius quod ex muliere uiroq; secedat, aut ob aliquam eiusmodi causam, si hoc inquam ita esse ponamus, constat non propterea esse feminam, quia ex quodam secesserit, itaq; nec partem quidē quam propriam habet mas aut femina, secessu consistere, siquidē semen idem & mas effici potest & femina, tanquam non alterutra pars in semine sit. Quid igitur referat, de hac parte ita dicatur, an de cæteris? nam si semen ab utero non provenit, eadem cæteris quoq; partibus ratio seruanda est. Item nonnulla animalia oriuntur ex nullis, uel eiusdem, uel diuersi generis animalibus: ut muscæ, & genera papilionum, ex quibus gignuntur quædam animalia, sed non similis naturæ, sed genus quoddam uermiculū, patet igitur nō semine quod ex cunctis partibus secesserit, generari quæcunque diuersi generis sunt, nam similia essent, siquidem similitudo indicio esset, quod ex cunctis secesserit, quædam etiam animalia uno coitu plura generant, plantas uero omnino motu eodem, omnem annum fructum asferre certum est, quod fieri non posset, si ex cunctis partibus semen secerneretur, singulas enim & singulis uel coitibus, uel secessibus, fieri secretiones necesse est, nec uero fieri potest, ut in utero diuidatur, iam enim tanquam à planta nouella, aut animali nuper ædito,

non femine separaretur. Item quæ auulsione serūtur, semen afferunt, ergo & prius  
quàm auulsa sererentur, ex eadem sui magnitudine fructificassent, non ex tota plan-  
ta destructum semen tulisse certum est. Omnium uero maximum argumentum in  
genere insectorum animaduertimus satis, quod etsi non omnium, tamen plurimo-  
rum foemina per coitum particulam quandam suam inserit in marem. & quidem  
coitum ita agunt: quod antea dictum est. Subiecta enim in supera indere uisuntur,  
quāquam non omnia, sed plurima ex ijs quæ explorata habemus. itaq; in ijs etiam  
maribus, qui semē emittunt, non causa generationis est, quod ex tota secesserit, sed  
alio quodam modo, de quo postea uidebimus. nam si causa esset secessus, ut putat,  
10 non ex cunctis secedere partibus censendum esset: sed ab agēte, creatriceq; tantum  
uirtute, uelut à fabro, non à materia, sed hi simile aiunt, ut si uel à calceis protioici di-  
cant, filius enim qui patri similis est, simili ferē cultu corporis utitur. Causa autem ut  
uoluptas rei ueneræ uehementior sit, non quod ex toto secesserit, est, sed quia pru-  
rigo uehemens accidit, quam ob rem si quis frequenter ea re utitur, minus afficitur  
uoluptate. Item uoluptas Veneris in fine coitus potissimum est. At si ex toto sece-  
reretur, non simul, sed singulis partibus, alijs prius, alijs post exultaret. Causa uero  
quam ob rem ex mancis manca proueniunt, eadem est, & cur filij similes parenti-  
bus prodeunt, sed non manca etiam ex mancis gignuntur, ut & dissimiles suis pa-  
rentibus: quorum causam postea considerabimus, eadem enim questio est. Item si  
20 semen non à foemina emittitur, eadem ratione profectò, nec ex toto secedere pro-  
bari potest. & si non ex toto secedit, nihil rationi repugnat, si à foemina quoque non  
secedere, sed alio quodam modo causam generationis præstari à foemina statue-  
mus, qua de re ut differamus, proximum est, cum semen non ex cunctis secerni  
partibus apertum iam sit. Initium uero tum eius ipsius propositi, tum etiam se-  
quentis totius disputationis, ut primum de femine quidnam sit, accipiamus, ita  
enim & officia ipsa, & quæ officijs accidunt, facilius considerare poterimus. Tale  
autem sua natura semen esse requirit, ut ex eo primo oriantur ea quæ secundum  
naturam constituuntur, non quod ex illo (uerbi gratia) homine aliquid sit, quod  
agat, sit enim aliquid ex hoc, quia semen eius est. Sed cum multifariam aliud ex  
30 alio fiat. alio enim modo, cum ex die noctem fieri dicimus, aut ex puero uirum,  
quoniam hoc post hoc, alio cum ex ære statuam, aut ex ligno lectum, & quacuncq;  
ex materia fieri dicimus, ut ex aliquo, quod in sit, & formetur, totum sit, alio cum  
ex musico immusicum, aut ex sano ægrum, & omnino contrarium ex contrario,  
præterea, ut Epicharmus facit suam exaggerationē, ex calumnijs maledicta, ex ma-  
ledictis pugna, quæ omnia eò referuntur, unde principium motus, quale id quoq;  
quod modo diximus, est, pars enim quædam totius discordiæ calumnia est: sed alia  
quorum extra, quod mouerit, est, ut ars extra suum opus est, & lucerna extra do-  
mus incendium. Cum itaque tot modis aliud ex alio fiat, semen in altero de duobus  
40 est quod gignitur, non enim ut hoc post hoc, quomodo ex Panatheneis nauigatio:  
neque ut ex contrario contrarium, gignitur enim contrarium ex contrario, quod  
corruptipitur: & aliud quippiam subijci oportet, ex quo primo in manēte sit. Igitur  
in utronam de duobus illis constituendum sit semen, considerandum est, utrum ut  
materia & patiens: an ut forma & agens: an etiam ut utrunq; unā enim cum ijs for-  
tasse declarabitur, & quonam pacto ex contrarijs generatio sit omnibus ijs, quæ ex  
femine oriuntur. nam ea quoque generatio quæ ex contrarijs sit, naturalis est, alia  
enim ex contrarijs oriuntur, mare dico & foemina, alia ex uno tantum, ut plantæ  
omnes, & animalium nonnulla, in quibus non distinctus, seorsumq; constitutus  
est sexus maris & foeminæ. Genitura igitur id uocatur, quod à generante proue-

niens causa est, quæ prima obtineat principium generationis: uidelicet in ijs, quæ coire natura uoluit. Semen autem est, quod ex amobus coeuntibus illis originem trahit, quale semen plantarum omnium est, & animalium nonnullorum, in quibus sexus distinctus non est, uelut id quod ex mare ac foemina primum miscetur, quasi conceptus promiscuus quidam, aut animal. hæc enim iam habent quod ex amobus requiritur. Semen & fructus inter se differunt, prioris posteriorisq; ratione. fructus enim quod ex alio est: semen ex quo aliud, nam aliàs ambo idem sunt. Natura autem prima eius, quod semen uocatur, quænam sit, exponenda latius est. Quodcunque in corpore accipimus, aut partem esse secundum naturam, uel dissimilem uel similem necesse est: aut præter naturam, ut uel papulam, uel excrementum, uel colliquamentum, uel alimentum. excrementum appello reliquias alimenti. colliquamentum, quod ex incremēto secernitur resolutione præter naturam. sed nullam id esse partem uel similem uel dissimilem apertum est, nihil enim ex eo, quæuis similari cōstituitur, ut ex nervo, aut carne. Quoniam etiam cum cæteræ omnes partes separatae sint, ipsum separatū non est. nec uero præter naturam est, neq; naturæ oblatæ uitium, cum in omnibus insit, & natura ex eo ipso oriatur. alimentum planè res aduēticia est. Itaq; aut colliquamentū, aut excrementū esse necesse est. ueteres quidē autores opinari uidentur id esse colliquamentū. quod enim ex toto secedere propter motus calorē dicūt, uim habet colliquamēti. colliquamēta autē præter naturā sunt. nec quicquam secundā naturā oriri potest ex ijs quæ præter naturam sunt. excrementū igitur esse necesse est. At omne excrementū, aut alimēti inutile est, aut utile. Inutile dico, à quo nihil præterea naturæ suppediretur: sed quo plus absumitur, eo magis natura uititur, utile contrā. sed enim nō tale excrementum id esse cōstat, eo quod ijs qui uel ætate, uel morbo pessime se habent, genus hoc excrementū plurimū inest, semē minime. aut enim nullū omnino, aut non prolificum, propter inutile ac morbidū excrementū permissionē. ergo utilis excrementū pars aliqua semen est. utilissimū autē quod ultimū est, & ex quo iam unūquodq; gignitur membrum. est enim tum prius, tum posterius. primi igitur alimēti excrementū pituita est, & si quid aliud eiusmodi est. pituita enim alimēti utilis excrementū est. cuius rei indicium, quod permixtū cum cibo puro alere potest, & labore absumitur. ultimum autem paruum admodū ex plurimo relinquitur alimēto. sed intelligendū perexiguo augeri quotidie animalia & plantas. nam nisi ita esset, additione pluris eadē uel minima modum excederent magnitudinis. igitur contrā quā ueteres putarunt, dicendum est. Cum enim illi quod ex toto secedat, semen esse fateantur, nos quod ad totum suapte natura faciat, semen esse fatebimur. Cumq; illi colliquamentū dicāt, nos excrementū potius esse statuimus. quod enim ultimum accedat, & excrementum ultimū sit, id simile esse probabilius est. perinde ut picioribus sæpenumero aliquid andriceli, id est purpurissi remanet, simile eius quod cōsumperint. Tabescēs autem quodq; & colliquefcens corrumpitur & degenerat. argumentum non colliquamentum, sed excrementū potius esse illud est, quod animalia magni incremēti minus fecunda, parua fecundissima sunt, plus enim colliquamēti esse in magnis necesse est, sed minus excrementi. quippe cum in corpus magnum copia absumitur alimenti. itaque parum sit excrementi. Item locus secundum naturam nullus colliquamento datus est, sed fluit quocunque facilius ferri potest. At naturalibus excrementis omnibus locus præscriptus est. uerbi gratia, alimenti sicci excrementis alius, humidis uelica, utilis uentriculus, seminalis uterus, genitale, mamma. in ea enim loca se colligunt atque confluunt. Testimonium etiam faciunt ea quæ eueniunt, ut semen, quod diximus, id sit. quæ ideo accidunt, quia talis excrementi natura est. dissolutio enim & imbecillitas manifesta consequitur, ubi uel

minimū id secesserit, ut quasi corpus eo sine priuetur, qui demum ab alimento affe-  
ratur. pauci uero quidam & breui tempore per ætatem leuātur, cum id secedit: ui-  
delicet ubi copia superarit. quomodo alimentū primum, si, ubi modum excesserit  
emittitur, melius corpori cedit. leuar etiam cum secum alia trahit excrementa. non  
enim solum semen est quod exit, sed etiā aliæ permixtæ facultates cum eo secedunt,  
quæ insalubres sunt. quam ob rem nonnullis improle aliquādo est, quod emittitur,  
quia parum seminis habet. sed enim plurimis & magna ex parte ita accidit, ut ue-  
nere exoluatur, debilitenturq; ob eam quam diximus causam. Ad hæc, semen nec  
in prima ætate, neq; in senectute, neq; in morbis est. carent hoc ægri propter imbe-  
cillitatē. senes, quia non satis eorum natura potest concoquere. pueri propter incre-  
mentū. absumitur enim totum alimentū in corporis desiderium, priusquā aliquid  
excrementi remaneat. quinquennio nanq; ferē corpus in homine quidem dimidiū  
capere uidetur omnis magnitudinis, quæ reliquo toto tempore comparetur. mul-  
tis autem & animalibus & plantis euenit differentia in ijs ipsis, tum generi cum ge-  
nere, tum etiam in eodem genere confortibus speciei inter se, ut homini cum homi-  
ne, & uiti cum uite. alia enim multū seminis adunt, alia parum, alia nihil omnino.  
idq; non præ imbecillitate. sed contrā nonnullis euenit. absumitur enim in corpus,  
ut hominū nonnullis, qui ubi per habitū corporis bonum carnulenti, aut pingui-  
res euaserint, minus semen emittunt, minusq; rem ueneream expetunt. similis &  
uitibus affectio incidit, quæ nimia alimenti copia luxuriant, & hircire tantisper dis-  
cuntur. nam & hirci pinguescentes minus seminis habent, quam ob rem eos solent  
antē extenuare. & uites hircire ab ea ipsa hircorū affectione dixerūt. uiri etiam mu-  
lieresq; pingues minus fecundæ esse, quā non pingues uidentur. quoniā in ue-  
getioribus excrementū concoctum transit in pingue. nam & pinguedo excremen-  
tum est bonitatis substantiæ salubre. sunt quæ nullum afferant semen, ut salix, ut  
populus. Itaq; aliæ quoq; eius affectionis causæ reddi possunt. nam & per imbecil-  
litatem non concoquunt, & per uirium bonitatem absumunt, ut dictum est. Simili  
modo fecundissima quoq; & fertilissima sunt, alia propter uires, alia propter im-  
becillitatē. multum enim atq; inutile excrementū permiscetur, ut uel morbi non-  
nullis contrahātur, cum non bene purgatio cessit, & alij euadunt, alij obeunt mor-  
tem. tabescunt enim eo modo quo per urinæ profluuiū. nam id quoq; uitium iam  
aliquibus accidisse certum est. Item meatus idem excrementi & seminis est. quibusq;  
excrementū amborū tam siccū, quā humidū alimentū, ijs quo humidū eodem semi-  
nis quoq; secretio agitur. humidū enim excrementū est. nanq; omnium alimentum  
humidum potius est. At uero quibus hoc deest, ijs ea parte, qua cibi siccū sedimentū  
rendit, semen quoq; secernitur, addo etiam quod colliquatio & tabes semper mor-  
bosa est. excrementi emissio semper utilis est. seminis secessio in ancipiti uersatur,  
quoniā aliquid alimentū inutiles assumit. At si colliquatio esset, semper noceret. quod  
nō facit. Semen igitur excrementū esse alimentū utilis atq; ultimi, siue omnia semen  
emittunt, siue non: in ijs tamen quæ emittunt, ita esse apertum iam est.

*Menstrua esse excrementa, omniaq; sanguinea ea ipsa emittere.*

*Caput XIX*



Ost hæc cuiusnam alimenti sit excrementū, & de mensuris differen-  
dum est. sunt enim in nonnullis uiuiparis menstrua. nam his declara-  
tis apertū erit, & utrum foemina semen emittat, ut mas, fiatq; unum  
ex ambobus feminibus mistum, an nullum semen a foemina secer-  
natur. & si nullū, utrum aliud quippiam non conferat foemina ad gene-  
rationem, sed locum tantūmodo præbeat, an aliquid conferat. idq; quonam pacto,  
& quomodo. Sed enim sanguinem esse ultimum alimentū in sanguinario genere

animaliū: proportionale autem in exanguī, dictum antea est. Verum cum semen quoque excrementū sit alimenti, eiusque ultimi, aut sanguis, proportionalē est, aut ex ijs aliquid, sed cum ex sanguine concocto digestoque modo quodam pars quæque gignatur, semen autem concoctum diuersum à sanguine secernatur (nam in concoctum aut per uim emissum, uidelicet cum ultra modum quis re uenerea utitur, cruentū iam aliquibus prodijis) constat semen esse excrementū alimenti sanguinei, quod ultimū in membra digeritur. & quidem uim magnam ob eam rem obtinet. Sanguinis enim synceri salubrisque secessio resolvere potest, utque filij similes parentibus sint, ratio exigit, simile est enim quod ad partes accesserit, ei quod remanet, itaque semen manus aut faciei, aut totius animalis est manus indefinita, aut facies, aut animal totum indefinitū. & quale quodcunque illorum est actu tale, semen potentia est, aut corporientia sua, aut facultate siue uirtute, quā in seipso contineat. Id enim nondum ex ijs quæ exposuimus, patet, utrum feminis corpus causa sit generationis, an habitū aliquem & principium motus genitale obtineat, neque enim manus, neque aliud quoduis membrū, sine anima, aut alia facultate est manus, aut quodlibet membrū, sed æquiuoce tantū. Constat etiam colliuationē quoque feminariā ubi accidit, excrementū esse. quod uitium euenit, cum resoluitur in quod accesserit: quomodo cum protinus decidit quod rectorij operis modo illitum fuerit. Idem enim ultimū excrementum cum primo excremento est. atque de his ad hunc modum differuisse satis sit. Sed cum infirmioris plus excrementi, minusque concoctū fieri, idque copiam cruenti humoris esse necesse sit, infirmius autem secundum naturā est, quod minus caloris adipiscitur, taleque foemina sit, ut antea dictum est, hinc secretionē quoque illam sanguineam foeminæ excrementū esse necesse est. Talis autem eiectione est eorum quæ menstrua appellantur, menstrua igitur excrementū esse, & proportionē, ut maribus geniturā, sic foeminis menstrua prouenire, apertum est. Recte autē ita dici indicant ea quæ in ijs ipsis eueniūt. eadem enim ætate maribus genitura fieri incipit, & secernt: foeminis autem menstrua erumpunt, uox etiam mutatur, & mammae intumescunt, necnon desinente ætate aboletur maribus generandi facultas: foeminis menstruorū confluuiū. Ad hæc, indicium illa faciunt, ut excrementū sit hæc secretio foeminarū, quod non mariscæ, non profluuiū naribus sanguinis, non uarices, non tale quid mulieribus magna ex parte accidere solet, quādiu menstrua profluūt. & si quid tale accidit, deteriores fiunt purgationes, quasi hæc materia menstrua consumpta in ea fuerit, minus etiam uenosa sunt foeminæ, quā maris: & lautiores leuioresque sunt, quoniam excrementū quod eò tendat, confluere in menstrua solet. hanc eadem causam esse putandū, & ut corpora minora sint foeminarū, quā marium in uiuiparo genere, in hoc enim uno menstrua profluūt, & omnium apertissime in muliere, plurimū namque menstrui excrementi mulier emittit, ex quo fit, ut euidentissime palleat, & obscuriores habeat uenas, & corpore planē ad marem deficiat. Sed cum menstrua sint quod foeminis fiat perinde ut maribus genitura, nec fieri possit ut duæ simul secretionē seminales agantur, ideo semen à foemina non conferri ad generationē apertū est. nam si semen esset, menstrua non essent, nunc ideo illud deest, quia hæc sunt. Sed menstrua esse excrementū, ut semē, explicatū iam est. Testimonio autē eodem accipi possunt aliqua ex ijs, quæ animalibus accidunt, pinguis enim minus feminis habent, quā macilentæ, ut antea dictū est, cuius rei causa est, quod & pinguedo excrementū, ut semen, & sanguis cōcoctus est, quantū non eodem modo, quo semen, itaque ratione optima fit, ut cum materia superuacua consumpta in pinguedinē sit, deficiat genitura, generis etiā exanguis mollia, & crustata optima sunt, cum utero gerunt, quod enim sanguine carēt, nec pinguedo in ijs consistit, hinc proportionale pinguedinis secernt in feminale excrementū. Indicium autē est non

est non tale semen à foemina emitti, quale à mare, nec amborum mistura generari, ut aliqui uolunt, quod sæpenumero foemina concipiatur sine ea, quæ per coitum fit, uoluptate. rursumq; cum ea ipsa uoluptate, pariq; concursu profusionis utriusq; nihilo magis concipitur, nisi menstruorū humor sit modice temperatus. quam ob rem nec nullis omnino uicibus menstruorū foemina generat, neq; cum effluit magna ex parte: sed à purgatione, uis enim quæ in maris genitura continetur, aut caret alimento et materia, ex qua instituat animal: aut nimia copia semen cum humore eluitur, sed ubi effluerint satis, quod remanet, consistit. Quæ autem nullis menstruorū uicibus concipiunt, aut interea dum agitantur, & effluunt, non possunt, earum alteris

10 causa est, quod tantū humoris continent, quantū prolificis remanet à purgatione, quanq; non ita superat, ut effluere possit: alteris, quod à purgatione os uteri comprimitur. Cum igitur multum quidem effluxit, sed adhuc effluit, tamen non tantū ut semen elaboratur, tunc concipiunt, nec uero absurdum quicq; si à conceptu item effluunt menstrua, nam uel post aliquādiu prodeunt, quanq; parce: nec semper, sed id morbidū est, quā ob rem paucis, & raro accidit. Quæ autē magna ex parte fiunt, ea maxime secundū naturā sunt. à foemina igitur conferri ad generationē materiā, quæ in menstruorū constitutione sit: menstrua autē ipsa esse excrementū, apertum iam est.

*Contra eos qui credunt foeminas, ut mares semen genitale emittere, argumento quod pari ferē uoluptate afficiantur. Caput XX*

20 **Q**UOD autem semen conferri à foemina per coitum nonnulli existimant, propterea quod interdum simili uoluptate afficiatur, ut mas, simulq; aliquid humoris secernat, id nō humor seminalis est, sed loci proprius, uteri enim excretio est, quæ alijs euenit, alijs non. euenit (quod plurimum dixerim) ijs quæ nitidæ foeminaresq; sunt, non euenit ijs, quæ fuscæ atq; uiragines, copia uero quibus euenit non pro seminis emissionē interdū est, sed multo excedit, tum etiam ciborum diuersa ratio plurimum facit, ut plus minus ue eius humoris excernat, ut quædam acris saporis augent planē excernendi modum. uoluptas autem quæ per coitum sentitur, non solum semine exeunte accidit, sed etiam spiritu, ex quo consistente semen emittitur, quod patet tum in adolescentulis, qui nondum emittere queunt, propeq; ætate sunt: tum in uiris genitura expertibus. uoluptas enim ijs omnibus scalpēdo excitatur, & quorū deprauata est generatio, alius interdum soluitur, propterea quod excrementū eò secedit, quod cōcoqui atq; effici semen non possit. forma etiam similis mulieris & adolescentuli est. & mulier quasi mas in seminis est, impotentia enim quadam foemina est, eo quod semen ex ultimo alimento concoquere nequeat. quod alimentū aut sanguis est, aut sanguinis proportionale in ijs quæ sanguine carent propter naturæ frigiditatem, ut igitur in aluo profluuium accidit cruditate, sic in uenis, tum cætera profluuiā sanguinis, tum menstrua ueniunt, nam ea quoq; sanguinis profluuiū sunt, sed

40 illa morbo citantur, hoc naturale est. itaq; generationem ex eo ratione optima fieri, apertum est. Sunt enim menstrua semen non purū, sed indigens cōfectionis, quomodo in fructuum generatione adhuc imperfecta, inest quidem alimentū, sed cōfectionē ad puritatē desiderat, quamobrē ut menstrua genitura admitta generant, sic alimentū in fructibus gignendis mistum alimento sincero alit. Indicium etiam est semen non emitti à foemina, quod cum per coitum seminis uoluptas cōrectatione loci eiusdē atq; maribus ueniat, tamen humor ille non hāc emittit. Item non omnibus foeminis id excernitur, sed sanguineis tantum, ijsq; non omnibus, sed quibus uterus non ad septum transuersum est, nec partus ex ovo. Ad hæc, ijs quæ non sanguinem, sed proportionale sanguinis habent, non emittitur ille humor, ut enim

in alijs sanguis, sic in his alia inest miscella, causa autem ne aut his, aut supradictis sanguineis fiat purgatio, siccitas corporis est, quæ parum excrementi relinquit, quantumque satis duntaxat ad generationem sit, non ut etiam aliquid foras mittatur. At vero quæ uiuipara sunt sine oui partione, ut homo, & quadrupedum, quæ suffragines intus flectunt (hæc enim omnia animal procreant sine ouo) ijs omnibus ea purgatio fit, nisi quid lesum per generationem sit, ut mula. tamen nullis tam purgationes redundant, quam homini. sed quemadmodum cuique animali hæc eueniant, in libris de historijs animalium scriptum est, plurima ex omnibus animalibus purgatio mulieribus fit, maribus etiam plurimum emittitur seminis, magnitudinis ratione. cuius rei causa est constitutio corporis, quæ humida & calida est, plurimum enim excrementi fieri in eiusmodi corpore necesse est. carent etiam partibus ijs, in quas uertitur excrementum in cæteris animalibus, non enim pilorum copiam gerunt per corpus, non ossium, aut cornuum, aut dentium excretiones, indicium semen esse in mensuruis, quod simul, ut antè dixi, maribus semen fieri incipit, & foeminis menstrua innotescunt eadem ætate, tanquam simul ea loca distendantur, quæ utrunque recipiant excrementum. Cumque tempus distendendi instat, loca intumescunt à spiritu, quod marium testes apertius ostendunt, quantumque & mammae. sed foeminarum mammae potius indicant, cum enim bino digito extolluntur, tunc plurimis incipiunt menstrua. igitur in quibus uita præditi sexus maris ac foeminae distinctus non est, in ijs semen ueluti conceptus iam est, conceptum appello primam ex mare ac foemina mixturam, quam ob rem ex uno semine unum gignitur corpus. uerbi gratia, ex uno tritici grano unus fundus, ut ex uno ouo unum animal, geminum enim ouum, duo est oua. At in quibus generibus mas & foemina distinguitur, in ijs plura animalia ex eodem semine gigni possunt, quasi natura differat, semen in plantarum & animalium genere indicium est, quod uno intuitu plura gignuntur in ijs quæ plura quam unum possunt generare, quo argumento constat etiam non omni ex parte corporis genituram provenire, neque enim distincta statim inde ex eadem parte secernerentur, neque postquam simul ad uterum deuenissent, ibi distinguerentur, sed euenit porro quod ex recta ratione est, ut cum mas formam & principium motus præbeat, foemina corpus atque materiam (quemadmodum in lactis coëctione corpus lac ipsum est, succus aut coagulatum principium spissandi cogendi que obtinet) sic quod à mare in foemina distinguitur intelligi debeat, cur in plura pauciorum partiatur, aut singulare instituat, alia ratio est, sed quia non differat forma quod diuiditur, si modo se habeat modice ad materiam, ut neque minus sit, ut concoquere densareque nequeat, neque amplius ut exiccare possit, sit ob eam rem ut plura generentur. Cæterum ex eo quod primum constitit, ex uno iam unum tantum procreatur, sed genituram à foemina non conferri ad generandum, tamen aliquid conferri, idque esse menstruorum constitutionem, aut proportionale in genere exanguis, tum ex supradictis, tum etiam ratione uniuersalique indagatione constat, esse enim quod generet, & ex quo generet, necesse est, idque quauis unum, forma quidem differre, & rationis diuersitate oportet. At uero in ijs, quæ distinctas eas potentias obtinent, corpus etiam & naturam diuersam esse agentis & patientis. Quod si mas est ut mouens & agens, foemina qua foemina, ut patiens, sequitur ut ad maris genituram foemina non genituram, sed materiam conferat, quod & fieri ita uidetur, natura enim menstruorum pro prima materia est. Atque de his ita docuisse satis sit. A partum unam cum ijs est, de quo differendum deinceps sit, quemadmodum scilicet ad generationem mas conferat, & quonam pacto semen maris causa eius quod gignitur sit, utrum ut insitum, & protinus inde pars corporis gignendi mixtum cum materia foeminae, an semen nihil commune cum corpore habeat, sed motus, uisque in eo contenta sit quæ comunicet, hæc est enim quæ agat, quod autem consistat & formam recipiat,



recipiat, reliquum excrementi foeminae est, atque ut ratione, sic effectis quoque proba-  
 ri uidetur, nam cum in uniuersum animo cōplectimur, non ita effici unum ex pa-  
 tientie agenteque uideat, ut quod agit, in eo quod efficit insit; nec omnino ex eo quod  
 mouet, & quod mouetur quicquā constitui. At foemina quidem qua foemina, pa-  
 tiens est; mas, qua mas, agens, & unde mouendi principium est. itaque si extrema u-  
 triusque sumantur, qua alterum agens & mouens, alterum patiens & quod mouea-  
 tur sit, non ex ijs unū quod gignitur est, sed ita ut ex fabro et ligno lectus, aut ex cera  
 & forma globus est. Paret igitur nihil secerni à maris semine esse necesse. neque si-  
 quid accedit, idcirco ex eo, ut insito esse, quod gignit, sed ut ex eo quod mouerit, &  
 10 forma, utque à medicina qui sanatus est, facta etiam rationi cōsentiunt. hinc enim ma-  
 res nonnulli per coitum nec membrū quidem ullum in foeminam indere uisuntur,  
 sed contra foemina in marem, ut in quibusdam insectis fit. quod enim in ijs, quae in-  
 dunt, efficitur semine in foemina, idem in mare ipso uapor uirtusque efficit, foemina  
 admouente suam particulā quae seminis capax est. unde fit ut genus id animalium  
 diu coeat, absolutumque breui generet. coniuncta igitur manent quousque consti-  
 tuantur perinde ut genitura constituit, sed abiuncta cito adunt conceptum, quoniam  
 & imperfectum quod pariunt est. quippe quae uermiculum omnia id genus pro-  
 generent. maximo sane indicio est, quod a uibus & piscibus ouiparis euenit, semen,  
 nec omni ex parte corporis uenire, neque tale quid emitti à mare, quod insit in eo,  
 20 quod genitum est: sed uirtute tantum cōtenta in genitura uiuificari, ut modo dixi-  
 mus de insectis, quorum foemina transigit in marem. Nam siue accidit ut auis hype-  
 nemia, idest subuentanea, oua ferat, si postea coit nondum mutato ouo ex luteo in  
 album, foecunda ex subuentitijs redduntur, siue concepta ex coitu. si adhuc luteis,  
 cum alio mare coiuuit, simile eius, quo cum postea coiuuit, prouenit omne genus pul-  
 lorum. quapropter nonnulli ex ijs, qui ut gallinae generosae procreantur, operam  
 dant, ita mutatis admissarijs faciunt, tanquam non misceatur, constitutioneque subbeat  
 semen, neque omni ex parte uenerit. ex ambobus enim uenisset. itaque bis partes eas-  
 dem haberet, sed sua facultate semen maris materiā contentā in foemina, & cibum  
 30 qualitate quadam afficiat. id enim efficere potest, ubi secundum praeuenerit tepefa-  
 ciendo, & cōcoquendo. cibus enim ab ouo absumitur, quandiu crescit. Hoc idem  
 in generatione quoque ouiparorum piscium euenit, ubi enim foemina oua adiderit,  
 mas semen aspergit, & quaecumque attigit, foecunda efficiuntur. quae non attigit, re-  
 manent infaecunda, quasi non ad quantitatem mas conferat, sed ad qualitatem. patet  
 igitur ex ijs, nec omni ex parte semen secedere, neque foeminā ita ut marem cōferre  
 ad generationē, sed marem principium motus, foeminam materiā praestare, hac enim  
 causa, nec per se ipsa foemina generat. principium enim & id quod moueat discernatque,  
 desiderat. Sed nonnullis, ut a uibus aliquatenus natura gignere potest. Aues enim  
 constituit quidem oua, sed imperfecta, quae subuentanea uocantur, & ortus eius  
 quod generatur, in foemina agitur. nec in marem semen emittit aut mas, aut foemi-  
 40 na, sed ambo in foeminā conferunt, quod suum utrique sit. quoniam in foemina ma-  
 teria est, ex qua constat quod creatur, ac protinus partim haberi paratā materiā  
 necesse est, ex qua primus cōceptus consistat; partim subinde accedere, qua nutria-  
 tur & crescat. itaque partū in foemina cōtineri necesse est. nam & faber adest ligno &  
 sigulus limo. denique omnis actio & motio ultima iuxta materiā est, ut aedificatio in  
 ijs quae aedificantur. hinc etiam quemadmodum mas conferat ad generationē accepe-  
 ris. nec enim mas omnis semen emittit, & quibus emittitur maribus nulla pars sce-  
 tus hoc est. sicut nec à fabro quicquā secedit ad lignorum materiā, neque pars ulla ara-  
 tis fabrilis in eo quod efficitur, est: sed forma & species ab illo per motum in materia  
 existit, atque anima in qua forma & scientia est, mouet manus, aut aliud membrum

motu certæ qualitatis uel diuerso, à quibus efficitur diuersum, uel eodem à quibus idem, manus autē instrumenta quæ materiam mouent. Ita natura etiam maris semen emittentis uitur eo semine quali instrumēto, & actū habente motum: ut in operibus artium instrumenta mouentur, in illis enim quodammodo motio artis est. Quæ igitur semen emittunt, hoc modo ad generationē conferunt. Quæ autem non emittunt, sed fœmina particulam sui quandam inserit in mare, hæc simile facere uidentur, quasi quis materiam ad opificem afferat. nam ob imbecillitatē eorum marium nihil per aliud natura efficere potest: sed uix assidente ipsa motus ualent, & similis fingenti, non fabricanti est, quippe quæ non per aliud attingens, sed ipsa suis membris rem condat instituendam. Sexus igitur maris ac fœminæ distinctus in genere omnium animalium gressilium est. & quantū diuersa sunt animalia mas & fœmina, tamen specie idem sunt, uerbi gratia, homo utrunque. At in plantis facultates istæ miscentur, nec mas à fœmina separatur, quam ob rem ex se ipsa progenerant, nec genituram emittunt, sed conceptū, quod semen uocatur, afferunt, idque Empedocles

*Empedoclis  
uersus: οὐλο  
ν δὲ ὡς ποτὲς μὲν  
καὶ δὲ νδδδδδ  
πρῶτον ἐλά  
ας. Antiquus  
interpret sic:  
Sic autem ouis  
ficant arbores  
parue primū  
pluuias.*

bene retulit suo carmine: Deinde etiam ouiparo genus arboreū tulit ortu. Ouum enim conceptus est, & animal ex parte eius creatur, reliquū alimentū est, animalis seminis etiam aliqua ex parte consistit quod oritur, reliquū alimentum germini radicique primæ est, hoc idem quodammodo in ijs quoque euenit animalibus, quæ sexu distinguuntur, cum enim uniuntur & generant, inseparata redduntur ut plantæ, idque natura eorum nititur, ut unum fiat, quod cum coeunt, & coniunguntur, conspiciuntur unum effici animal ex ambobus, atque ea quæ semen non emittunt, diu complexa funguntur Venere, dum conceptum constituunt: ut insecta, quæ solent coire, alia tandiu exigunt, donec partem aduentitiam quandam mittant, quæ conceptū constituat spacio temporis longiore, quàm in sanguineo genere agatur. hæc enim parte quadam diei coheret, genitura intra plures dies constituit, mox ubi eam emisserunt partem, absoluntur, profecto animalia tanquā plantæ diuisa esse uidentur, perinde quasi illas quoque postquam semen attulere dissoluas, & separes in sexum insitum maris ac fœminæ. Atque hæc omnia recte ita à natura condita sunt, plantarum enim substantiæ nō aliud munus, nulla actio nisi generatio seminis est. quod cum maris ac fœminæ coitu efficiatur, miscuit ea natura, indifferenterque sexum maris & fœminæ plantarum generi tribuit. Sed de his alibi disputatū à nobis est. At animalis munus non solum generare, quod cōmune omnium uiuentium est, sed etiam cognitionis alicuius particeps unūquodque est, aliud maioris, aliud minoris, aliud minimæ, sensum etenim habent, sensus autē cognitio quædā est, cuius siue nobilis, siue ignobilis nota plurimū referet ad hominis ne prudentiā, an ad genus inanimū consideretur, nam ad prudentiam nihil esse uidebitur, tactum gustumque tantum adipisci. At ad sensus uacuitatem summū id esse putabitur. Charum enim censueris compositionem eius esse cognitionis, nec emortuū expertemque essentia omnis iacere. sensu autem animalia differunt ab ijs quæ tantum uiuunt, sed cum uiuat etiam quod animal est, necesse sit, cum fungi uiuentis munere opus est, tunc coeunt & miscentur, & quasi plantæ efficiuntur ut dictum est. Cæterum genus animalium testa instructum, quoniam inter animalia & plantas ambiguū est, ut in ambobus constitutū generibus, munere neutrius fungitur, nam ut planta sexu maris & fœminæ caret, nec in altero generat, ut autē animal, nullum ex se fructū affert modo plantæ: sed consistunt & generantur ex terrena & humida quadam concretionē, sed de eorum generatione postea differemus.

# ARISTOTELIS STAGIRITAE DE 241

GENERATIONE ANIMALIUM LIBER SECVN-

DVS, INTERP. THEODORO.

*Quid sit causa, ut principium generationis cuiusq; mouens primum,  
& procreans. Caput I*



10 **M**AREM ac foeminam esse principia generationis, & quanam  
eorum essentiae uis atque ratio esset, dictum iam est. Sed quam  
ob rem gignatur, & sit alterum mas, alterum foemina, ut necessa-  
rio, & quonam primo mouente, & quali materia id efficiatur,  
procedendo explicare conabimur. At uero quod ad melioris  
rationem & causam, cuius gratia pertinet, coelitus principium  
ducitur. Cum enim rerum aliae sint sempiternae, summeq; di-  
uinae, aliae quae possint & esse, & non esse: pulchrum autem diuinumq; illud causa  
semper sua natura melioris conditionis in rebus contingebus: sit quod uero sem-  
pitemum non est, id & esse, & particeps tum deterioris conditionis, tum melioris esse  
possit: cumq; anima sit corpore melior, animatumq; inanimato praestet propter ani-  
mam: & esse, quam non esse, & uiuere, quam non uiuere melius sit: efficitur his de  
causis, ut generatio sit animalium. Cum enim natura eius generis sempiterna esse  
non possit, quo modo fieri potest, eo sempitemum quod gignitur, est. numero igitur  
20 non potest. substantia enim rerum in singularibus est. quae si talia essent, sempiter-  
na essent. specie uero potest. itaq; genus hominum semper, & bestiarum, & plantarum  
est. Sed cum principium sit eorum mas atq; foemina, sit ut generationis gratia sit mas  
& foemina in rerum natura. Cumq; sua natura melior, magisque diuina causa sit ea,  
quae prima mouet, cui ratio inest, & forma, quam materia: cumq; melius etiam sit  
separari a deteriori quod melius est, ideo in quibuscumq; fieri potest, & quoad eius  
fieri potest, mas a foemina separatur. melius enim, magisque diuinum est principium  
motus quod per generationem mas obtinet. foemina enim materia est, sed coit, & iun-  
gitur ad generationis officium mas cum foemina, id enim commune ambobus est. Qua  
igitur ratione sexus maris ac foeminae participant, uiuunt. quae ob rem plantae quoq;  
30 uitae participes sunt. quae autem sensus adest, genus animalium est. Quorum incessantibus  
feret omnibus mas a foemina separatur, ob eas quas modo reddidimus causas. eorumq;  
alia, ut dictum est, semen emittunt: alia non emittunt cum coeunt, cuius rei causa est, quod  
quae nobiliora sunt, eadem sua natura magnitudinem sibi postulant, quod non nisi ca-  
lore animali fieri potest. Quod enim maius est, id a facultate ampliore moueri ne-  
cesse est. mouere autem calor potest. quam ob rem in uniuersum prope dixerim, ma-  
iora quae sanguinem habent, quam ea quae non habent: & incedentia, quam sta-  
bilia, maiora, quae semen genitale propter calorem ac magnitudinem emittunt. de  
mare & foemina quam ob causam sint, dictum iam est. Animalium uero alia perfi-  
ciunt partem, forasq; mittunt sibi simile: ut ea quae animal adunt in lucem, alia non-  
40 dum explanatum, suamq; formam adeptum pariunt. quorum sanguinea ouum pa-  
riunt, exanguia uermem. Inter ouum & uermem hoc interest. ouum est cuius ex  
parte animal gignitur, reliquum cibis ei quod gignitur, est. uermis ex quo toto ani-  
mal gignitur. Eorum autem quae perfectum sibi simile adunt in lucem, atq; uiuipara  
sunt, alia statim intra se animal gignunt, ut homo, equus, bos, & ex marinis delphi-  
nus, & reliqua generis eiusdem. alia ubi primum intra se ouum genuerint, mox ani-  
mal adunt foras: ut quae cartilaginea appellantur. Ouiparorum alia ouum adunt per-  
fectum, ut aues, & quae quadrupedes ouum pariunt, ut lacertae, & testudines: aut  
quae pedibus carent, ut serpentum pars plurima. oua enim eorum postquam pro-  
dierunt, nullum insuper capiunt incrementum, alia imperfectum adunt, ut pisces,

& crustata, & mollia nomine. namque eorum oua ædita augentur. Omnia quæ aut animal pariunt, aut ouum, sanguinem habent. & quæ sanguinē habent, aut animal pariunt, aut ouum; nisi omnino improla sint. Exanguium insecta uermiculum pariunt, quæ aut ex coitu generantur, aut ipsa coeunt. Sunt enim nonnulla insecta, quæ sponte naturæ gignantur: sed sexum maris ac foeminæ habeant, coniunctaque procreent aliquid. quod tamen generant, imperfectum est. causam antea reddidi. Magna permutatio generibus euenit, nec enim bipedes omnes uel animal pariunt uel ouum. aues enim ouum, homo animal parit, neque quadrupedes omnes, aut ouū pariunt, aut animal. equus enim & bos, & aliæ plurimæ animal pariunt: lacertæ, crocodili, & aliæ complures ouum, nec uero in habendis pedibus, nec ne, ratio partus 10 continetur. nam expedum aliæ animal pariunt, ut uiperæ & cartilaginea. aliæ ouū, ut piscium genus, ac ceteræ serpentes. pedes habentium multæ & ouum, & animal pariunt, ut quadrupedes, quas modo enumerauimus. nec non intra se pariūt, tum pedata, ut homotum expeda, ut balenæ, delphini, sic igitur diuidi non potest, nec discriminis eius causam habet instrumentū ullum incessui delegatum. Sed enim ea pariunt animal, quæ natura perfectiore sunt, & principium syncerius obtinent. nullum enim intra se gignit animal, nisi quod aërem recipit & spirat, perfectiora autem sunt, quæ natura calidiora & humidiora, nec terrena constant. Caloris uero naturalis ratio, pulmone describitur sanguinis compote. quæ enim pulmonem habent, omnino calidiora sunt ipsæ quæ non habent. & inter ea superant, quæ non fungosum, 20 aut retorridum, & parum sanguinis continentē habent pulmonem, sed sanguinolentum & mollem. utque animal res perfecta, uermis autē & ouum imperfecta est, sic perfectum nasci solet à perfectiore. Quæ autem calidiora quidem sunt propter pulmonem, sed natura constant sicciora, aut quæ frigidiora quidem, sed humidiora sunt, eorum altera ouum ædunt perfectum: altera intra se, & ouum & animal pariunt. Nam & aues, & cortice insecta calore suo perficiunt, sed præ siccitate ouum pariunt. cartilaginea cum minus ipsæ calida, magis humida sint, utroque participant, quippe quæ & ouum & animal intra se pariunt: ouum, quia frigida sunt: animal, quia humida. humor enim uiuificus est, siccitas longe à uita remota est, sed cum non penna, non cortice, non squama tegantur, quæ indicia sunt naturæ siccae atque terre- 30 næ, idcirco molle generant ouum. ut enim ipsis, sic eorum ouis nulla satis insidet siccitas, atque ob eam rem intra se pariūt oua. nam si ouum foras prodiret, facile periret, carens putamine quod protegat, duriora, frigida siccioraque pariunt quidem ouum, sed imperfectum, crusta etiam duriuscula opertum, propter naturam terrenam sui generis, utque imperfectū exiens possit seruari tutela operimenti testacei. Pisces itaque cum squamati sint, & genus crustatū, ut terrena constitutū natura, oua putamine duriora generant. Sed mollium genus, ut ipsum natura corporis lenta est, sic oua, quæ imperfecta ædere solet, tuetur & seruat, plurimum enim lentoris sua cum foetura emittunt. Insecta omnia uermiculum pariunt, eademque omnia sanguine carent. unde fit, ut quæ extra uermiculū pariunt, sanguine uacent, quantū exanguia non 40 omnia uermem pariant. commutant enim inter se uices insecta, & quæ ouum pariūt imperfectū: ut pisces squamati, & crustata, & mollia, horum enim oua uermem imitantur: quippe quæ foris incrementū recipiant. illorum uermiculī tempore procedente in speciem oui transeunt. quod quemadmodum fiat, postea explicabimus. Nunc prius intelligendū quam bene, miroque deinceps ordine natura reddit generationem. perfectiora enim calidioraque animalia prolem reddunt perfectam qualitate. nam quantitate nullum omnino animal perfecte progenerat. omnia enim posteaquam nata sunt incrementū recipiunt, & generant quoque ea ipsa animalia intra se statim, cetera ab ipsis proxima loco secundo constituta, non statim perfecta intra se generant.

generant. cum enim prius intra se ouum pepererint, mox animal adunt in lucem. Alia non perfectū animal generant, sed ouum, idē perfectum. quæ autem hīs frigidiora constant natura, generāt quiddē ouum, sed non perfectum, uerum quod foris perficiatur, ut genus pūcium, squamata, & crustata, & mollia. Quintū genus quod frigidissimū est, ne ouum quidem ex sese parere potest, sed hæc affectio toris euenit ei, ut dictum est. Insecta enim primo uermiculum pariunt, qui addito tempore speciem accipit oui. Aurelia enim appellata oui obtinet facultatē, tum ex eo animal nascitur, tertia mutatione finem recipiens generationis. Sunt igitur quæ non semine genituali procreentur, ut antea dictum est. Sanguinea tamen omnia semine procreantur, uidelicet ea quæ per coitum oriuntur, emissā à mare in foeminā genitura: quæ ingesta animalia constituuntur, suamq; formam recipiūt, aut intra ipsa animalia quæ solent animal generare, aut in ouo, aut in semine, & eiusmodi alia secretionē, de quibus quæstio longe dubia oritur, quonā pacto ex semine generetur aut planta, aut animal, quod enim gignitur, & ex aliquo, & ab aliquo, & aliquid gigni necesse est. ex quo gignitur materia est, quam nonnulla secum habent primam acceptam ex foemina: uerbi gratia ea, quæ non forma animalis nascuntur, sed uermiculi, aut oui. quædam diu ex foemina capiunt, quoniam lactent: ut ea quæ non modo foras, uerum etiam intus forma animalis gignantur. Talis, id ex quo oriuntur, materia est, sed hoc loco non ex quo oriuntur quærimus, sed à quo partes corporis generentur. aut enim extrinsecus aliquid, aut in genitura & semine insitū agit. idē aut pars aliqua animæ, aut anima, aut habens animam est, sed ab aliquo extrinsecus agente effici quæq; aut uiscera, aut alia membra, remotū à ratione uidetur. fieri enim non potest, ut moueat quod non tãgit, & quicquā ab eo quod nō moueat, afficiatur. igitur in ipso conceptu aliquid iam inest, quod aut pars eius sit, aut seorsum contineatur. Sed aliud quicquā esse abiunctum, irrationabile est. etenim generato iam animali, corrumpatur ne illud, an maneat? At nihil inesse uidetur, quod non totius pars sit, aut plantæ, aut animalis. Quinetiā corrumpi, postquā uel omnes, uel aliquot partes efficit, absurdum est. Quid enim efficiat reliquas? nam si illud posteaquā effecerat, cor interijt, cor autem ipsum partem aliam efficit, eiusdem rationis est, ut uel omnia intereant, uel omnia seruentur. ergo seruari necesse est. pars igitur eius est id, quod protinus in semine inest. sed si nihil anime est, quod non aliqua in parte sit corporis, ut animata quoq; pars aliqua protinus sit, cōsequitur. sed cætera quonam pacto efficiantur? Aut enim simul omnes partes generantur: uerbi gratia, cor, pulmo, iecur, oculus, & reliqua omnia, aut ordine deinceps, ut in his carminibus, quæ ad Orpheū autorem referuntur. Similiter enim, ut retis implexum, constitui animal ibi scribitur. Sed enim nō simul omnia effici, uel sensu percipi potest, cum partes aliæ iam inesse, aliæ nondum adesse cernantur. nec dici potest eas præ sua exiguitate latere. pulmo enim qui amplioris, quàm cor magnitudinis est, posterior corde in primo ortu conspicitur. Sed cum aliud prius, aliud posterius fiat, utrum alterum efficiat alterum, & sit propter proximū, an potius hoc post hoc fiat? uerbi causa, nō cor iam ortū efficit iecur, idē aliud quippiā, sed hoc post hoc, ut postquam puer factus est, uir efficitur, non à puero agente uir efficitur. Cuius rei ratio illa est, quod ab eo quod actū est, id quod potentia est, efficiatur, tum in naturæ, tum in artis operibus. itaq; speciem & formam esse in illo oportebit: uerbi gratia, in corde formam iecinoris: quanquā aliàs quoq; illa opinio absurda & cōmentitia est. Quinetiā ut in semine protinus pars aliqua animalis, aut plantæ facta contineatur, siue quæ cæteras efficere possit, siue quæ non possit, impossibile est, quando ex semine & genitura omnia generantur. ab eo enim qui semen fecerit, creatum id proculdubio est, siquidem protinus inest. At uero semen prius fiat oportet, idē officium generantis est. nulla igitur pars con-

dita inesse potest, ergo quod agit, nullam in se habet partem. at ne extra quidem,  
 alterutrum autem sit, necesse est. Hæc igitur soluere conandum est, fortasse enim ali-  
 quid ex ijs quæ diximus, non simplex est, ut ab extero nihil effici posse, nam & est  
 ut possit, & est ut non possit, sed semē, an id, à quo semen, dicamus, nihilo refert: scilicet  
 licet qua motum, quem illud mouebat, semen in seipsum continet, fieri autem po-  
 test, ut hoc ab hoc moueatur, & hoc ab hoc, sitq; perinde quasi admirabilia illa spon-  
 tina, partes enim habent uim modo quodam, etiam cum quiescunt, quarū primam  
 ubi extrinsecus aliquid mouerit, statim proxima actu efficitur, ut igitur in spontinis  
 illis quodammodo illud mouet, quod nihil nunc tangit, sed antè tetigit: sic id à quo  
 semen, aut quod semen effecit, mouet, cum aliquid tetigerit, quāquam non adhuc  
 tangit. & motus qui inest, quodam efficit modo, ut ædificatio, ædes, igitur aliquid  
 esse quod efficiat, sed non ita, ut hoc quicquam, nec perfectum inesse primū agens,  
 apertum iam est, quemadmodum autem unumquodq; fiat, accipiendum hinc est  
 hoc initio: Omnia quæcunque aut natura aut arte efficiuntur, ab eo quod actu est,  
 fiunt, ex eo quod potentia tale est. Semen igitur tale est, motumq; habet, & princi-  
 pium tale, ut motu peracto pars existat quæque, eademq; sit animata, non est enim  
 facies, nisi animam habeat, neque caro, sed corrupta æqui uoce dicitur facies, aut ca-  
 ro, perinde quasi lapidea, aut lignea facta sit, simul autem partes similes, & instru-  
 mentales, siue officiales efficiuntur. & quemadmodum non securim, non aliud in-  
 strumentum dixerimus factum esse ab igne solo, sic non pedem, non manum, eo-  
 demq; modo ne carnem quidem, nam eius quoque aliquod officium est, dura igitur  
 tur, mollia, lenta, rigida, & quicunque alij affectus partibus insunt animatis, à cali-  
 ditate, frigidityte ue effici possunt. At ratio, quæ iam caro, aut os est, non potest sed  
 à motu proficiente efficitur ab eo, quod genuit, quodq; actu est id, quod poten-  
 tia est id, ex quo gignitur, quomodo in ijs quoque agitur, quæ arte efficiuntur, fer-  
 rum enim durum aut molle efficitur calore uel frigore, at uero ens à motu instru-  
 mentorum, quæ artis obtinet rationem, Ars enim principium, formaq; eius, quod  
 efficitur est, sed in alio. Motus autem naturæ in ipso est, ab altera proiectus natu-  
 ra, quæ actu obtinet formam. Sed habeat ne semen animam, nec ne, ratio eadem  
 atque de partibus reddenda est, nec enim anima ulla esse potest in alio, nisi in eo  
 cuius est, neque pars ulla esse potest, quod particeps animæ non est, nisi æqui uo-  
 ce, ut mortui oculus, semen igitur & habere animam, & esse potentia palam est,  
 Propius autem & remotius idem à seipso potentia esse potest: ut Geometra dor-  
 miens remotius quàm uigilans est, is que remotius, quàm qui iam contempletur.  
 Sed enim huius nulla pars causa est generationis, sed quod primum extrinsecus  
 mouit, id causa est, nihil enim seipsum generat, sed postquam generatum est, se-  
 ipsum iam auget, quam ob rem non simul omnes partes generantur, sed una pri-  
 mum, eamque primum oriri necesse est, quæ principium augendi contineat, siue  
 enim planta siue animal est, æque omnibus inest, quod uim habeat uegetandi, siue  
 nutriendi, id autem est quod tale alterum generet quale ipsum est, hoc enim cu-  
 iusque perfecti, tum animalis, tum stirpis secundum naturam officium est, necessi-  
 tatis autem ratio est, quod cum aliquid ortum est, augeri idem necesse est. Generat  
 igitur quod est uniuocū, ut homo hominem: sed per seipsum augetur, ergo ipsum,  
 cum aliquid sit, auget, quod si unum quid, idq; primum sit, id primum generari ne-  
 cesse est, itaque si cor primum in nonnullis oritur animalibus, aut cordis propor-  
 tionale in ijs quæ corde carent, ex corde principium illud est, in ijs quæ cor habent,  
 cæteris ex proportionali, exposui iam ad ea quæ antè quærebantur, quid causa sit,  
 ut principium generationis cuiusque mouens primum, & procreans,

De seminis natura, &amp; quid sit, &amp; quam ob causam non congelascit.

Caput I I



E seminis natura dubitauerit quispiam, semen enim prodit de anima  
 li crassum & album, mox refrigeratum, humidum ad aquæ speciem  
 redditur, colorem etiam accipit aquæ. Absurdum igitur id putaueris,  
 aqua enim non crassescit calore. id autem intrinsecus e loco calido pro  
 ficiscitur crassum, refrigeratumque humescit. Atqui omnia aquosa con  
 crescunt frigore, semen uero positum in gelu sub diuo non cōcrescit, sed humescit,  
 quasi à contrario crassum constiterit. Sed neque à calore crassari ratio probabilis est,  
 quæ enim plus terræ continent, ea consistunt, crassanturque per coctionem, ut lac,  
 10 igitur refrigeratum solidescere debuit, at nihilo solidius fit, sed totum modo aquæ li  
 quescit, hoc igitur dubium est, nam si aqua est, cum aqua non uideatur posse à calo  
 re crassari, hoc tamen ex corpore calido crassum & calidum exit. Sed si ex terra con  
 stat, aut si mistum terræ & aquæ est, non totum resolui in humorem & aquam de  
 buit. An non omnia, quæ accidunt, diximus: non solum enim quod ex aqua & ter  
 ra humidum constat crassatur, sed etiam quod ex aqua & spiritu, ut spuma, crassior  
 albaque existit, & quo ampullæ pauciores incertioresque sunt, eo & albior & rigidior  
 fastus conspicitur, quod idem in oleo quoque fit, crassescit enim mistum cum spiritu  
 20 tu. Quam ob rem crassius redditur quod albescit, cum humor in eo cōtentus discer  
 natur à calore, efficiaturque spiritus. Galena etiam aquæ mista aut oleo, amplum ex  
 paruo erigit fastum, & spissum ex liquido, & album ex nigro. causa est, quod spiri  
 tus immiscetur, qui fastum efficit, & albedinem dilucide aperit, ut in spuma, & ni  
 ue. nam & nix spuma est, aqua etiam ipsa permista cum oleo crassa albaque redditur,  
 per concussum enim attritumque includitur spiritus, & ipsum oleum quoque mul  
 tum spiritus continet. pingue enim nec terræ est neque aquæ, sed spiritus, ex quo  
 fit, ut per summa aquæ fluitet, aer enim contentus in eo ueluti in uase effert, per  
 summaque sustinet, & causam leuitatis præbet, quinetiam frigore & gelu crassescit  
 oleum, non congelascit, calor enim facit ne gelu cogatur, aer nanque calidus & in  
 30 congelabilis est, sed quoniam à frigore is quoque consistit & densatur, hinc oleum  
 crassius redditur. His de causis semen quoque exit quidem intrinsecus spissum, &  
 album calore interiore, multum spiritus calidi cōtinens: sed egressum ubi calor eua  
 nuit, & aer refrigeratur, humidum nigrumque euadit, remanet enim aqua, & si quid  
 paruum terrenæ portionis continetur, ut in pituita, sic in semine cum siccescit, Se  
 men igitur commune est spiritus & aquæ, spiritus autem aer calidus est, quam ob  
 rem natura humidum est, quoniam ex aqua constat. Crescias Cnidius planè menti  
 tur ea quæ de semine elephantii scribit, air enim usque adeo durari siccescens, ut ele  
 ctro, id est succino simile efficiatur: quod nunquam fit, magis enim alterum altero  
 semen esse terrenum necesse est, & præcipue tale eorum est, quorum in corpore  
 multum materia terrenæ habetur. Crassum autem, albumque est spiritus mistione.  
 40 Semen enim omnium album est. Herodotus uera non scribit, cum nigram esse  
 Aethiopum genituram dicat, quasi necesse sit omnia nigra esse eorum, quibus ni  
 gra est cutis, atqui dentes eorum albos esse cernere potuit, causa ut album sit semen  
 quod genitura spuma est, spuma autem alba est, & maxime quæ ex paucissimis par  
 tibus constet, & tam paruis, ut cerni ampullæ nequeant, quod in oleo quoque, &  
 aqua euenit, cum miscentur, & concutiuntur, ut antè diximus. Nec uero homines  
 antiquos laruisse uidetur naturam seminis esse spumofam, deam enim, quæ rei ue  
 neta præest, ab ea ipsa facultate nominarunt. Causa propositæ quæstionis expli  
 cata iam est, Congelascere autem semen non posse ob eam rem apertum iam est,  
 aer enim incongelabilis est.

οἶνος, fastus,  
 humor.

μολεδρανα,  
 Galena, id est  
 uena plūbi, sic  
 ut plumbago.

ἀρροδία,  
 Venus unde  
 dicta.

*Vtrū in his animātibz, quæ semē in fœminā mittūt, insit aliqua cōstituēdi cōceptus pars.* Cap. III



Equitur, ut & dubitemus & dicamus, si in ijs quæ semē emittūt in fœminā, nulla pars cōstituēdi cōceptus sit, quod subierit, quonā uertatur corpulētia eius, quādo ipsū facultate quā in se cōtinet, agit. definien-  
dum igitur prius est, utrū quod in fœminā cōstituitur, accipiat aliquid  
ab eo quod subierit, an nihil accipiat. Atq; etiā de anima, qua animal  
dicitur. (est aut animal parte animæ sensuali) utrū in semine & cōceptu inest, an nō,  
& unde. cōceptū enim inanimatū esse nemo statuerit uita omnibus modis priuatū:  
quippe cum nihilominus semina, & cōceptus animalīū uiuant, quā stirpes, & ali  
quādiu prolifica sunt. ergo animā in ijs haberi uegetalē palā est, sed quā ob rem eam  
primū haberi necesse sit, ex ijs quæ alibi de anima disseruimus, apertū est. Sensualē  
etiā qua animal est, tēpore procedēte recipi, & rationalē qua homo, certū est. non  
enim simul & animal sit & homo: nec animal & equus, eademq; in cæteris animalī  
bus ratio est. finis enim postea contingit. propriū autē est finis cuiusq; generationis,  
quam ob rem de mēte etiā quonā tēpore, & quomodo, & unde eam recipiāt, quæ  
principiū id participant, plurimū dubitatur. Sed enitēdū pro uiribus, & quoad fieri  
potest, accepisse operapreciū est. Animam igitur uegetalem in seminibus, cōcepti-  
bus scilicet nōdum separatis, haberi potentia statuendū est, non actū, priusquam eo  
modo, quo cōceptus, qui iam separātur, cibum trahāt, & officio eius animæ fungan-  
tur. principio enim hæc omnia uitā stirpis uiuere uidentur. de anima quoq; sensuali  
pari modo dicendū est, atq; etiā de intellectuāli. omnes enim potētia prius haberi  
quā actū, necesse est. sed aut omnes cōtingere, cum antē non fuerint, necesse est,  
aut omnes cum antē fuerint, aut partim cum antē nō fuerint, partim cum antē fue-  
rint: & cōtingere aut in materia non subeuntēs semen maris, aut eo quidē inde ue-  
niētes, sed in mare aut omnes extrinsecus cōtingere, aut nullam, aut partim extrin-  
secus, partim non extrinsecus. cæterum omnes antē esse impossibile rationibus his  
esse ostēditur. Quorum enim principiorū actio est corporalis, hæc sine corpore in-  
esse non posse certū est. uerbigratia, ambulare sine pedibus. itaq; extrinsecus ea ue-  
nire impossibile est. nec enim ipsa per se accedere possunt, cum inseparabilia sint:  
neq; cum corpore. semē enim excrementū alimēti mutati est. Restat igitur ut mens  
sola extrinsecus accedat, eaq; sola diuina sit. nihil enim cum eius actione cōmunicat  
actio corporalis. Sed enim omnis animā, siue uirtus, siue potētia corpus aliud par-  
ticipare uidetur, idq; magis diuinū, quā ea quæ elemēta appellātur. uerum prout  
nobilitate ignobilitate ue animā inter se differūt, ita & natura eius corporis differt.  
Inest enim in semine omnium, quod facit, ut fœcūda sint semina, uidelicet quod ca-  
lor uocatur. idq; non ignis, nō talis facultas aliqua est, sed spiritus, qui in semine spu-  
mosoq; corpore cōtinetur, & natura quæ in eo spiritu est proportionē respondens  
elemēto stellarum. quam ob rem ignis nullum animal generat, neq; cōstitui quic-  
quam densis, uel humidis, uel siccis uidetur. at uero solis calor & animalīū, non mo-  
do qui semine cōtinetur, uerum etiā si quid excrementū sit, quanquam diuersum  
à natura, tamen id quoq; principium habet uitale. cæterum calorem in animalibus  
contentum, nec ignem esse, neq; ab igne originem ducere apertum ex his est. cor-  
pus autē geniturā in quo semen animalis principij contentū unā prouenit, partim  
separabile à corpore, in quibus diuina pars comprehenditur, qualis est, quæ mens  
appellatur: partim inseparabile, hoc in quā geniturā semen dissoluitur, uersumq; in  
spiritum euāescit. cum naturā humidā aquosāq; habeat. quam ob rem an sem-  
per id foras exeat quærendū non est. neq; an pars ulla sit formæ cōstitutæ, quomo-  
do nec de succo, à quo lac cogitur, quæri tale quid conuenit. nam is quoq; mutat, &  
nulla pars cōstitutæ magnitudinis est. De anima quæadmodū conceptus & geniturā  
habeant



ra habeant eam, & quemadmodū non habeant, definitum iam est. potētia enim habent, actū non habēt. Semen autē cum excrementum sit, eodemq; moueatur motu, quo augetur corpus digestionē ultimā alimentī, ubi uterum subiit, constituit & mouet excrementū fœminā eodē motu quo ipsum mouetur. nam illud quoq; excrementū est, habetq; omnes partes potētia, actū nullam. habet enim eas partes potentia, quibus differt fœmina à mare. nam ut ex lœsis interdū lœsa, interdū non lœsa gignuntur, sic ex fœmina partim fœmina, aliās non fœmina, sed mas generatur. fœmina enim quasi mas lœsus est. & menstrua semen sunt, quanquam non purum. Vnū enim illud nō habēt, originē & principiū animā. quam ob rem quibus anima  
 10 libus oua subuētitia gignūtur, partes quidē utrorūq; obtinet ouū institutū: sed principio caret, quapropter animatū nō est. id enim à maris semine affertur, quod principū ubi fœminā excrementū receperit, cōceptus sit, humidis uero corpulētijs cum incalescūt, obducitur, ut in pulte refrigerata crustula. Corpora autē omnia cohærēt & continentur lentore, quē in dies iamq; adauctis corporibus natura accipit neruī, quā partes animalū cōtinet. in alijs neruo, in alijs eo, quod neruo proportionetur. cutis etiā formā eiufdē est, & uena, & mēbrana, & omne eiufmodi genus. differunt hæc enim inter se maioris minorisq; ratione, & omnino excessu defectu ue.

*Quenam sint generationis causæ, & quemadmodum partes quæq; constituantur in animalibus.*

Caput IIII

20



Nimalia uero quorum natura imperfectior est, conceptū, cum perfectus iam est, sed nōdum animal perfectum, foras mittunt, quod quas ob causas ita fiat, antē diximus. perfectum autē est animal, cum conceptus iam aut mas, aut fœmina est, scilicet in quibus sexus hæc differentia habetur. Sunt enim quæ nec marem neq; fœminā generant, uidelicet quæ & ipsa non ex fœmina mareq; & coitu animalū procreantur. sed de eorū generatione postea dicemus. Quæ autem animal intra se generant, scilicet naturæ perfectæ animalia quouq; animal pariant, forasq; emittant, gerunt intra se innexū quod gignitur. At uero quæ foras animal pariunt, cum intra se prius ouum genuerint, eorū nonnullis ouum iam perfectum absoluitur, ut eorum quæ foras pariūt, ouum. atq; ita animal ex ouo intra fœminā nascitur. alijs cum alimentū in ouo contentum absumptū iam est, repletur ab utero & perficitur: atq; ob eam rem ouū utero non abiungitur, hæc cartilagineorū piscium differentia est, de quibus post seorsum per se differemus. Nunc à primis incipiendū est. prima autem sunt quæ perfectæ, eiufmodi autem sunt quæ animal generant. eorumq; primum homo est. decessio igitur seminis omnīū non aliter quam cæterorum excrementorū fieri solet. fertur enim unumquodq; suum in locum, non uim spiritu inferente, non alia eiufmodi causā cogente, ut quidam à testibus trahi modo cucurbitarum medicinalium per uim spiritus opinantur, quasi fieri possit, ut nisi uis inferatur, aliō tendat excrementum alimentī, aut humidī, aut sicci, quoniā retento spiritu ita uniuerso excernatur.  
 40 At id commune omnīū est, quæ mouere uoluimus. uires enim retento spiritu augetur. nam & sine ea ui excrementa per somnum exeunt, si meatus laxi pleniq; excrementi sunt. simile ab ijs dicitur, ut si quis plantarum semina dixerit quotannis à spiritu secerni, eō ubi fructum afferre solent. Sed enim causā eius rei, ut diximus, est, quod excrementis partes capaces descriptæ à natura habentur omnibus, tum in uisibilibus illis sicco & humido, tum sanguini quæ uenæ uocantur. fœminæ itaque uenis duabus, maiore, atque aorta fistis superne uenarum multitudo tenuium in uterum desinit, quibus alimento expletis, natura que præ sua frigidityte facultatis concoquendi indigā transfunditur in uterum, propter uenarum tenuitatem,

cum præ sua angustia nequeant exuperantiam continere. Itaque affectus hic ueluti maritica, aut alia profusio sanguinis euenit. Caterum menstrua nullo circuitu certo describuntur, tendunt tamen moueri decrescente mense, idque ratione recta, sunt enim corpora animalium frigidiora, cum euenit, ut continens aer talis efficiatur. mensium autem coitus frigidi sunt propter lunæ defectum. itaque fit, ut fines mensium quam media, sint frigidiores. igitur postquam excrementum mutatum in sanguinem est, menstrua moueri tendunt eo, quem modo dixi, circuitu, at si concoctum non est, paulatim aliquid subinde secernitur, quam ob rem quæ alba uocantur, paruis adhuc & puellis proueniunt. Seruat corpora integra uterque excrementorum hic secessus, cum modice fit, utpote cum ab excrementis uindicentur. quæ causæ corporibus sunt, ut ægrotent. Sed si uel non fit, uel immodice fit, damnum euenit, aut enim morbi oriuntur, aut corpus emarcescit & extenuatur, quam ob rem & ea alba cum frequenter mouentur, & superant, incrementum auferunt puellarum. Fit igitur necessarium excrementum hoc ob eas quas diximus causas. Cum enim natura concoquere nequeat, excrementum fiat necesse est, non solum alimentum inutiles, sed etiam in uenis, & per tenuissimas uenas exundando superet. sed melioris notæ, finisque gratia natura eo abutitur in hunc locum, scilicet generationis causa, ut quale erat futurum, tale alterum oriatur. iam enim tale potentia est, quale est corpus, cuius secretio est, foemina igitur omnibus excrementum fiat, necesse est. sed sanguineis amplius, eorumque mulieribus plurimum. uerum cæteris quoque aliquid colligi in uuluarum locum necesse est, causam quam ob rem sanguineis amplius, eorumque hominibus plurimum, ante exposui. sed cur in foeminis omnibus excrementum hoc inest, in maribus non omnibus inest? quædam enim non emittunt genituram, sed ut quæ emittunt motu suæ genituræ creât, quod instituitur ex materia contenta in foemina: sic ea motu suo interno in ea parte contento, unde semine secernitur, idem faciunt, & constituent. pars ea locus septi transversus est in omnibus id habentibus. principium enim naturæ cor, proportionale uel est. Causa in qua cur omnibus maribus non sit excrementum genitale, cum omnibus foeminis sit, quod animal corpus est animatum, ad quod institutum foemina semper materiam præbet, mas uim creandi. hæc enim eorum utriusque facultatem tribuimus: idque est, quo alterum mas, alterum foemina sit, itaque corpus & magnitudinem præberi a foemina necesse est. a mari nihil tale necessario desideratur, nec enim instrumenta in his, quæ efficiuntur, inesse: neque ipsum efficiens necesse est. corpus igitur ex foemina est, anima ex mare. substantia enim corporis alicuius anima est, & ideo quæ non unigena coeunt (quod ea faciunt, quorum tempus par, & uteri gestatio proxima, & corporis magnitudo non multo discrepans) hæc primos partus similes sibi addunt communi generis utriusque specie. quales ex uulpe & cane generantur, aut ex perdice & gallinaceo. sed tempore procedente diuersi ex diuersis proueniunt, demum forma foeminæ instituti euadunt, quomodo semina peregrina ad postremum pro terræ natura reddunt. hæc enim materiam corpusque seminibus præstat. quæ ob rem pars foeminarum ea quæ semine recipit, non meatus, traiectusque quidam est, sed uterus amplior. mares qui semine emittunt, meatus ad id emittendum habent exangues. excrementum autem quod uis simul & suo in loco est, & excrementum efficitur: nec prius ullum, nisi uis magna cogit, & contra naturam diuertitur, sed quæ ob causam excrementa animalium genitalia secernuntur, declaratum iam est. cum autem semine de mare accessit in foeminæ uterum, partem purissimam excrementi constituit. Plurimum enim in mensruis quoque humoris inutilis continetur, ut in maris genitura, quod humidissimum est, tum eadem emissionem, tum in diuersis, prior enim emissio minus fecunda quam posterior est. minus enim caloris animalis continet propter cruditatem. At uero quod concoctum est, crassum & corpulentius est. Quibus autem uel mulieribus, uel cæterorum animalium foeminis nihil foras

foras emittitur, quoniam non multū excrementi inutilis continetur, ijs tantūdem, quod colligitur, in utero est, quantum ijs quæ foras emittunt, remanet, quod maris facultas constituit, aut in femine decedente contenta, aut marem subeunte particula foemina, quæ proportionē respondeat uuluis. ut in quibusdam insectis fieri cernitur. humorem autem qui à foeminis cum uoluptate emittitur, nihil ad cōceptum conferre dictum est ante. sed potissimum inde uideri potest, quod ut maribus, sic & foeminis accadat noctu per quietem, quod pollutionem appellant. uerum hoc nullum indicium est. nam & adulescentibus idem euenit, qui etsi emissuri aliquando sunt, tamen nondum emittunt, & ijs qui uel emittunt, uel emissuri sunt, infœcundum. Res ita se habet, ut sine maris emissionē concipi impossibile sit, atque etiam sine menstruorum excremento, quod aut redundans effluat foras, aut intus satis sit. At sine ea uoluptate, quæ foeminis per coitum euenire solet, concipitur, si locus turget, & uulua descendit propius. ueruntamen magna ex parte sic accidit, ut cum profusione foemina agatur, quoniam os uteri se comprimat, cum profunditur. in qua quidem profusione uoluptas & mari & foemina cōtingere solet. semen etiam maris melius ita dirigitur & iuuatur. profusio autem non intus fit, ut quidam uolunt. os enim uteri angustum est: sed antè, quò foemina mittit uaporem illum non nullarum recremētum. eodem enim mas etiam mittit quod fuderit. & aut ibidem manet semen emissum, aut intrò ab utero trahitur, si calidus est, & modice temperatus. Cuius rei indicium, quod locus qui modo madebat, resiccatus mox sentiatur. Animalibus etiam quorum præcordijs uulua iungitur, ut auib, & piscibus, qui animal pariunt, ne semen illuc trahatur, sed profusum deueniat ipsum, impossibile est. Trahit genituram hic locus suo calore. menstruorum etiam decessio, & confluuium fomitem in ea parte caloris parat. itaque ut uasa non illita, calido diluta humore, aquam in se trahunt ore inuerso, ita attrahitur. nec audiendi sunt qui partibus accommodatis ad coitum officialibus id fieri opinantur. nullo enim pacto sic fieri potest. contrà etiam euenit ijs, qui semen à muliere quoque emitti aiunt. Accidit enim ut postquam foras emiserunt, retrahant intrò. uiquidem quod emissum est, misceri debet cum maris genitura. quod ita fieri superuacaneum est. At uero natura nullam rem superuacaneam facit. cum autem excrementum foemina in utero constiterit à maris genitura, quæ simile facit, ut lactis coagulum. coagulum enim lac est continens calorem uitalem, qui partes similes ducit eodem, & unit, atque constituit. & genitura ita se habet ad menstruorum naturam. eadem enim natura lactis & menstruorum est. itaque coactis iam partibus corpulentus humor excernitur, obducunturque circum parte resiccescente terrena membranæ, tum necessario, tum etiam alicuius gratia. nam & calefcentis frigefcentis ue rei extrema siccescere necesse est, & animal non in humido, sed seorsum contineri oportet. uocantur ea quibus obuolutus est foetus partim membranæ, aliæ secundæ, quæ maioris miris habentur. sed enim cum conceptus institutus est, facit simile ijs, quæ seruntur. principium enim primum semina quoque intra se continent. quod potentia primo contentum, ubi secretū mox est, germen mittit & radicē, qua alimentū assumitur. incrementū enim desideratur. sic in cōceptu quodammodo cū partes corporis omnes potentia insint, principium maxime pròptum habetur. quam ob rem cor primū actū secernitur. quod non modo sensu ita fieri constat, uerum etiam ratione. Cum enim quod gignitur de ambobus abiunctū iam est, seipsum gerere, gubernare, & dispensare debet, perinde quasi filius à patre emancipatus, seorsumque collocatus. itaque principium haberi oportet, à quo etiā post ordo membrorum describatur, & quæcunque ad absoluedum animal pertinent, disponantur, nam si extrinsecus aliquādo aderit,

*uulues, membra. xēpia, secunde.*

& pōst inesse incipiet, non solum dubitaueris, & quonam tempore accedat quæ  
 fieris, sed etiam cum pars quæuis distinguitur, id primū substare necesse est, ex quo  
 & incrementū & motus cæteris partibus cōtingat. quam ob rem qui ita, ut Demo-  
 critus, aiunt exteriora primum animalis discerni, tum interiora, quasi lapideum aut  
 ligneum animal condant, non recte dicunt. res enim talis nullum principiū habet,  
 at animalia omnia habent, atq; intra se continēt. quapropter cor primum distinctū  
 in omnibus inspicitur animalibus quæ sanguinem habent. id enim principium est  
 & similariū & dissimilariū partium. iam enim principium id accepisse animalis,  
 constitutiq; fœtus decet, cum alimentū desiderat. quod enim iam animal est, auge-  
 tur. alimentū autem ultimum animalis sanguis est, aut quod sanguini proportio-  
 netur, quorū uasa & conceptacula uenæ sunt. quam ob rem uenarum quoq; prin-  
 cipium cor est, patet hoc ex historijs & dissectionibus animalium. sed cum potentia  
 quidem animal sit, sed imperfectū, aliunde accipiat alimentū necesse est. quam ob  
 rem utero, & parente, ut terra planta utitur ad cibum hauriendum, donec perficia-  
 tur, & iam sit animal potentia gressile. quocirca ex corde primum uenas illas duas  
 natura descripsit, de quibus uenulæ dependent in uterū, ex quibus, qui umbilicus  
 uocatur, constat. Umbilicus enim uena in alijs simplex, in alijs multiplex est. quam  
 uenam putamen cuticulare ambit, quod umbilicus uocatur, quoniam uenarū im-  
 becillitas tutelam operimentūq; desideret. uenæ autem quasi radices contingunt  
 ad uterum, per quas alimentū haurit fœtus. eius enim rei gratia animal in utero ma-  
 net, non, ut Democritus ait, ut membra formentur secundum membra parentis.  
 apertū hoc in ouiparis est. Nam illa in ouis distinguuntur separata à uulua parentis.  
 Sed dubitaueris, cum primum cor oriatur sanguine præditū, sanguis autem sit ali-  
 mentū quod extrinsecus uenit, undenam primum alimentū subierit? an id uerum  
 non dicitur, alimentum omne esse extrinsecus? sed protinus ut in plantarū semini-  
 bus inest aliquid tale primum, quod lacteum uocatur: sic in animalī materia excre-  
 mentum constitutionis alimentū est. Incrementū igitur fœtui per umbilicum con-  
 tingit, eodem quo plantis modo per radices. atq; etiā animalibus ipsīs, ubi absoluta  
 iam sunt, ex eo quod continetur alimento idem accedit. de quibus pōst suo loco di-  
 cendum est. Distinctio autem partium non, ut quidam opinantur, propterea fit,  
 quia simile suapte natura ad simile feratur. nam præter alias multas, quas ratio ista  
 habet, difficultates, accidet, ut quæuis pars similis seorsum creetur. uerbi gratia,  
 ossa per se, & nerui, & carnes, si quis eam causam approbet. Sed quoniā excremen-  
 tum fœminæ potentia tale est, quale natura animal est, partesq; potentia insunt,  
 actu nulla inest, ideo pars quæq; existit. Quoniam etiam agens & patiens, cum se  
 inuicem tetigerunt, quendam in modum alterum agens, alterum patiens est, mo-  
 dum hunc ita intelligi uolo ut conditionibus, sic, ubi, quando describatur, ita enim  
 continuo alterum agit, alterum patitur, materiā igitur fœmina præbet, principium  
 motionis mas, & quemadmodum quæ ab arte efficiuntur, per instrumenta efficiun-  
 tur, sed uerius dixerim per motum eorum qui artis operatio est: ars autem forma  
 eorum, quæ efficiuntur, est in alio: sic à facultate siue uirtute animæ uegetalis agitur,  
 ut quæ in animalibus ipsīs & plantis postea ex alimento uis eadem efficit incremen-  
 tum, utendo caliditate & frigiditate, quasi instrumentis (motus enim in ijs consistit,  
 & ratione aliqua unumquodq; efficitur) sic etiam principio constituit id, quod natu-  
 ra efficitur. eadem enim materia est ex qua augetur, & ex qua cōstituitur primum.  
 Itaq; facultas quoq; agens eadem quæ principio est, sed maior. quod si hæc uegeta-  
 lis anima est, eadem quæ generet quoq; est, idq; natura cuiusq; est insita, & in plan-  
 tis & in animalibus omnibus. cæteræ animæ partes alijs insunt, alijs desunt anima-  
 libus, sed cum in plantarum genere nullo discerniculo sexus mas distinguatur à fœ-  
 mina,

mina, in animalibus, quāquam non omnibus, distinguitur. & mas ob eam rem desiderat foeminam. Atqui quaesierit quispiā, qua de causa foemina desideret marem, nec ex seipsa generet: quandoquidem animam habet eandem, & materia excrementum foeminæ est, sed causæ illud est, quod animal sensu differat à planta. nec fieri potest ut uel facies, uel manus, uel caro, uel alia pars sit, nisi anima sensualis insit, aut actu, aut potentia: & aut aliquatenus, aut simpliciter. erit enim ut mortuus, aut pars mortui. quod si mas est efficiens talis animæ, impossibile est ut foemina ex se ipsa animal generet, ubi mas à foemina separatur. eo enim, quod diximus, mas definitur, qua mas est ratione. Quaestionem uero propositam ratione non carere, patet in ijs aubus, quæ ova subuentanea pariunt, cum foemina aliquatenus possit generare, quod & ipsum recipit quaestionem. Quonam modo ova eorum dicuntur uiuere: nec enim ita ut ova foecunda possunt. sic enim actu animatum ex ijs efficeretur, neq; ita se habent ista ut lignum, aut lapis, quippe quæ corruptione aliqua pereant, ut quæ uitam quodammodo antè participarent. Constat igitur hæc aliquam habere potētia animam, sed quam? istam ultimam prorsus habeant animam necesse est, quæ uegetabilis est, hæc enim æque in omnibus tam animalibus quàm plantis inest. Sed cur partes & animal non efficiant? Quia sensualem animam habere ea oportet, non enim animalium partes ita sunt, ut plantarum. quam ob rem maris societate opus est, mas enim à foemina separatus in ijs est, & quidem sic usu euenit. Subuentanea enim illa foecunda redduntur, si mas coiuuit tempore quodam, sed de eorum causa post. Si quod autem genus est quod foemina sit, & marem distinctum non habeat, id ex seipso animal generare potest. Quod etiam nondum fide digna exploratum habemus, tamen facit ut in genere piscium dubitetur, eorum enim quos rubros siue rubelliones uocant, mas nullus adhuc uisus est, sed foeminæ omnes fortu plenæ reperiuntur. Verum de his nondum compertum habemus, quod fidem faciat satis. quod autem nec mas, neq; foemina sit, in genere quoque piscium est, ut anguilla, & genus mugilum quoddam in fluuijs lutulentis. At uero in quibus sexus maris & foeminæ distinctus habetur, fieri non potest ut foemina ipsa per se generet perfecte, ita enim mas frustra esset, quam ob rem in ijs mas semper perficit generationem. hic enim sensualem dat animam, aut per se, aut per genituram, sed cum partes omnes potentia in materia insint, cum principium motionis affuit, perinde ut in spōtinis illis miraculis, quod subinde sequitur, excitatur, & quod nonnulli naturales autores exponere uolunt, cum dicant simile ferri ad simile: dicendum partes moueri non mutantes locum, sed manentes, & alterascentes mollietie, duritie, colore, & reliquis partium simularium differentijs factæ iam actu, quæ antè erant potentia, sit autem primo principium, quod in sanguineo genere cor est: in cæteris proportionale, ut sæpius dictum est, idq; effici primū non modo sensu percipitur, sed etiam quod per obitum uitæ hic ultimo deficit, euenit namque in omnibus, ut quod ultimum sit, id primū deficiat. & quod primum, id ultimum, quasi natura decursionem reducem agat, & à calce ad carceres, unde proruit, redeat. Est enim generatio ex non ente in ens, corruptio contrā ex ente in non ens. Gignuntur post principium, ut dictum est, interiora, prius quàm exteriora, sed prius maiora quàm minora uisuntur, quāuis nonnulla prius non oriuntur, primum superiora præcordijs formantur, eademq; magnitudine præstant, nam inferiora & minora sunt & minus discretæ, idq; in omnibus quæ parte superiore inferioreq; distinguuntur, exceptis insectis. Quæ enim ex ijs uermiculi nascuntur, parte inferiore amplius crescunt, superiore iam inde à primo ortu minora sunt. Gressilium mollibus folis nullum discrimen est superioris & inferioris, quod autem de parte superiore diximus priusquam inferiore constitui, idem in plantarum etiam genere euenit.

semina enim prius mittunt radicem quàm ramos. Distinguuntur animalium partes spiritus, sed non aut parētis, aut suo, ut quidam naturæ interpretes uoluerunt, hoc enim in genere auium & piscium, & insectorum palam fit, quæ partim seiuncta à parente nascuntur ex ovo, in quo formantur, & explanantur: partim non spirant omnino, & tamen aut ovo aut uermiculo enascuntur. alia quanquam spirant, & in utero capiunt explanationē, tamen non prius spirare incipiunt, quàm pulmo perficiatur. Articulatur & hic, & omnes priores partes antequam animal spiret. Item quadrupedum quæ multifida sunt, ut canis, leo, lupus, uulpes, lupus ceruarius, omnia cæcos generant: post palpebræ dehiscunt. Itaque constat in cæteris quoque omnibus, ut quantitatem, sic qualitatem potentia ante substantem effici, actum post ab eisdem causis, à quibus distinguitur quantitas, & duo ex uno effici. spiritum uero inesse, quoniam humidus & calidus est, cum alterum agat, alterum patiatur. Iam antiquorum nonnulli naturæ interpretum, quæ postquam efficeretur pars, tentarunt quidem exponere, sed parum usuperiti earum quæ accidunt rerum, partium enim aliæ priores alijs sunt: quod in cæteris etiam rebus. Prius autem multiplex iam est, id enim cuius causa, & quod eius causa, differunt. & alterum generatione, alterum essentia prius est, quin & quod eius causa duplicem recipit differentiam, aut enim est unde motus: aut quo utatur id, cuius causa, uerbi gratia, genitale & instrumentale rei generatae, horum enim alterum, id est generans & agens præesse oportet, ut quod doceat priusquam quod discat, sed tibijs post eum qui tibijs discat. frustra enim aderunt tibijs ijs, qui uti nesciant tibijs. Cum itaque tria hæc sint, primum finis, quem esse id dicimus, cuius causa, secundum quod eius causa, scilicet principium generans & mouens, efficiens enim & generans quæ talia sunt, ad id pertinet quod efficitur, & generatur. Tertium utile & quo finis utatur, primum eam partem habere necesse est, in qua principium motus continetur, hæc enim protinus pars finis prima & potissima est, tum post eam totum & finem, tertium uero & ultimum partes ijs accommodatas instrumentales ad usus nonnullos. Itaque si quid tale est, quod in animalibus inesse necesse sit, quod totius naturæ principium & finem contineat, id effici primum necesse est, quia enim mouens primum oriri, quia pars finis est, cum toto oriri debet. itaque instrumentalium partium, quæ sua natura genitales sunt, eas semper esse priores oportebit, alterius enim causa sunt tanquam principia. At uero quæ tales ex ijs, quæ alterius gratia constant, non sunt, eas esse posteriores congruit, quam ob rem utramque partes priores sint, quæ alterius causa, an cuius causa ipsæ sint, distinguere non facile potest, incidit enim ut partes mouentes priores sint generatione quam finis, mouentes autem ab instrumentalibus distinguere non facile est. Atque ea ipsa uia rationeque, quid post quod fiat, querendum est, finis enim quorundam posterior est, quorundam prior, quam ob rem ea pars, quæ principium continet, prima existit: mox tota superior moles, quapropter caput & oculi foetus maxime inter initia apparent, inferiora ab umbilico, crura dico, exigua cernuntur. Partis enim superioris gratia inferior est. Et neque pars finis, neque genitilis est eius, necessitatem etiam cur ita sit, non bene reddunt, qui quod semper ita fit, dicunt, idque principium in his existimant, ut Democritus Abderitanus opinatur, quod sempiterni & infiniti principium nullum est, causa autem cur ita, principium est, & infinitum, quod sempiternum est. Itaque interrogare de eiusmodi rebus cur ita est, querere, inquit, principium infiniti. Atque ea ipsa ratione, qua censeant non esse querendum, nullius rei sempiternæ demonstratio esse poterit. & tamen esse complurium uidetur, quarum aliæ semper fiunt, aliæ semper sunt, nam & triangula figura duobus rectis æquales semper habet, & diametrum incommensurabilem esse cum costa sempiternum est, at tamen causa eorum aliqua & demonstratio est, igitur non omnium

omnium rerum principium quærendum esse recte dicitur: at rerum quæ semper  
 aut sunt, aut fiunt, nullum principium esse quærendum non bene assentitur. sed ea  
 duntaxat principia non recipiunt examen eiusmodi, quæ rerum sempiternorum  
 sunt. principij enim alia cognitio, non demonstratio est. principium uero in rebus  
 immobilibus quidditas est. In rebus autem quæ fiunt, iam plura habentur principia,  
 sed modo diuerso, nec omnia modo eodem, quorum principiorum unum nume-  
 ro est, unde motus. quam ob rem omnia quæ sanguinem habent animalia cor pri-  
 mum possident, ut inter initia nostræ disputationis dictum est. in cæteris primum  
 gignitur, quod proportionale sit cordis. uenæ ex corde tendunt diductæ modo ri-  
 uorum, qui in parietibus proficiscētes ab eodem fonte pinguntur. partes enim con-  
 iunctæ ijs sunt, utpote quæ ex ijs coagmententur atq; consistant. Ortus similium  
 frigore, calore ue agitur: consistunt, coquunturq; alia frigido, alia calido. quarum re-  
 rum differētijs alibi exposuimus, antè scilicet, quæ humore, igneq; resoluibiles, quæ  
 humore irresolubiles, igneq; illiquabiles sint. per uenas igitur & meatulos quoique  
 alimentum refudans, quemadmodum aqua per crudiusculam fute[m], in carnem,  
 aut carnis proportionale conuertitur frigore consistens. ex quo fit, ut caro ab igne  
 resoluatur. Sed quæ terrena admodum oriūtur, parum humoris calorisq; adepta,  
 hæc dum refrigescunt, humore cum calore euaporāte duram terrenamq; formam  
 capiunt, ut ungues, cornua, ungulæ, rostra. quam ob rem igne hæc molliūtur. Sed  
 humore nonnulla liquefcunt, ut ouorum putamina. Nerui & ossa calore interiore  
 conficiuntur siccescente humore. quam ob rem ossa resolu ab igne non possunt:  
 quomodo testa indissolubilis est. quasi enim in fornace excocta à calore generatio-  
 nis ita cōstat. hic autem calor nec ex quolibet carnem, aut os facit, neq; quolibet mo-  
 do aut tempore, sed ex materia apta, & ut apte, & cum apte effici potest. neq; enim  
 quod effici potest, efficitur à mouente quod actū careat. neque quod actum obti-  
 net, efficere ex quolibet poterit. sicut nec faber arcā, nisi ex ligno facere potest, neq;  
 arca effici ex lignis potest sine suo artifice. Inest hic calor in excremento seminali, tan-  
 tam talemq; habens motionem & actionem, quanta modice ad quamuis corporis  
 partem accomodetur. Quod si uel deficit, uel excedit, rem quæ fit, aut deteriorem  
 efficit, aut læsam, & mancā, similiter ut in ijs agitur, quæ foris igne coquuntur ad  
 cibum, aut ad alium usum. sed in ijs motum caloris nos moderamur, in illis natura  
 gignentis accommodat. In ijs autem quæ sponte oriuntur causā est, motus tempo-  
 ris, & calor. frigus priuatio caloris est, utitur his ambobus natura uim habentibus  
 necessariò, ut alterum hoc, alterum illud faciat. sed in ijs quæ alicuius gratia gignun-  
 tur accidit, ut alterum frigefaciat, alterum calefaciat, atq; ita pars quæq; qualitate cer-  
 ta efficitur, ut caro mollis partim necessariò talis exinde facta, partim alicuius gra-  
 tia. neruus siccus & ductilis, os siccū & fragile, cutis carne siccescente efficitur: quo-  
 modo in polentis crustula, quam uetulam uocant. nec solum propter extremum  
 generatio eius euenit, sed etiam quod lentitudo relideat, cum euaporari nō possit.  
 uerum in cæteris lentum id squalidum est. itaq; fit ut extrema exanguium anima-  
 lium testa crusta ue consent. at in sanguineo genere lentum hoc pinguius est. &  
 quidem quæ natura non terrena admodum sunt, eorum pingue sub cutis operi-  
 mento colligitur, quasi cutis ex eiusmodi lentitate consistat. pingue enim habet ali-  
 quid lentitatis, sed hæc omnia, ut diximus, partim necessariò, partim non necessa-  
 riò, sed alicuius gratia effici asserendum est. primum igitur moles superior per ge-  
 nationem distinguitur: inferior tempore procedente recipit incrementum in san-  
 guineo genere. omnia uero lineamenta primum describuntur, deinde colores reci-  
 piunt, & molliem, & duritiem, quasi pictoris officio fungatur natura cum condit  
 & creat. pictor enim ubi lineis primum descripserit animantem, mox uario illinit cō-

*νεφελιστον, sua  
 tis, uas fictile.*

συνενιθίσουσι  
 ροῖς, ὡς  
 κοῖται.

lore, ac perficit. cum itaq; principium sensuum totiusq; animalis in corde contineatur, hoc ob eam rem primum gignitur, mox ob eius calorem frigiditas supra, ubi desinunt uenæ, respondens cordis calori constituit cerebrum, itaque caput a corde continuo generatur, & magnitudine cæteris præstat. Principio enim cerebrum multum & humidum est, sed recipit dubitationem quod oculis animalium euenit. principio enim maximi uisuntur, & in pedestri, & in natanti, & in uolati genere. ultimi uero omnium partium perficiuntur, interim enim confidunt, causa autem est, quod oculorum sensorium positum quidem est, ut cætera sensoria apud meatum, sed cum sensorium tangendi gustandiq; protinus sit aut corpus, aut aliquid proprium corporis animalium, olfaciendi uero audiendiq; meatus contingant aërem externum pleni spiritus natiui, ortiq; a corde tendant, ac desinant ad uenulas cerebro adiunctas, oculus solus proprium corpus præ cæteris habet sensorijs, quod humidum & frigidum est: nec ante contentum eo in loco potentia ut cætera partes, tum deinde actu existens, sed a cerebri humore secernitur pars purissima per meatus, qui ab oculis ipsis tendere ad membranam cerebri uisuntur, cuius rei argumentum, quod nec alia pars humida & frigida est in capite præter cerebrum, & oculus frigidus atque humidus est, itaque necessario locus hic magnitudinem primum capit, post consolidat. nam & in cerebro eodem euenit modo, ut primum præhumidum, multumq; sit, mox humore efflato concoctq; corporatur magis, subidetq; & cerebrum & magnitudo oculorum. principio igitur caput prægrande propter cerebrum, oculi grandes propter humorem in ipsis contentum apparent, ultimi uero perficiuntur, quoniam cerebrum quoque uix consistat, serò enim a frigiditate humiditateq; uendicatur in omnibus quidem, sed præcipue in homine, nam & sinciput inter ossa ultimum confirmatur. iam enim cum partus in lucem uenit, molle hoc infantis os est, causa ut hoc maxime hominibus accidat, quoniam cerebrum humidissimum & maximum omnium animalium homines habeant, cuius rei causa est, quod calorem etiam cordis purissimum obtinet, quod temperamentum intellectus plane significat. homo enim omnium animalium prudentissimus est. Pueri etiam longo tempore nequeunt continere caput, præ pondere cerebri, nec secus partes, quas mouere oportet, principium enim mouendi serò superioribus dominatur, & ad postremum ijs, quorum motus non iungitur cum principio, ut cruribus. Palpebra etiam talis pars est, sed cum natura nihil superuacaneum, nihil frustra facere soleat, constat nec prius, neque posterius, quam usus exigit, ab ea effici quicquam, sic enim quod factum est, frustra aut superuacaneum fuerit. itaq; palpebras simul & distinguui, & posse moueri necesse est. Serò igitur oculi animalium perficiuntur propter copiam humoris concoquendi in cerebro. Ultimi autem, quod mouendi facultas, nisi increuerit, nequeat mouere eas partes, quæ tam remotæ a principio refrigeratæ sunt, declarant hoc idem palpebræ sua natura. cum enim uel quantalibet grauitate caput tentatur, aut ex somno, aut temulentia, aut alia eiusmodi causa, palpebras attollere non possumus, quamquam leui pondere aggrauentur, sed de oculis iam dictum est, quemadmodum oriantur, & quam ob causam ultimi articulentur, & absoluantur. Caterarum partium unaquæq; ex alimento gignitur, nobilissima quæq; & potissimi principij particeps ex concocto sincerissimo, primoq; alimento, reliquæ necessariae, ac illarum gratia instituendæ, ex deteriore, & reliquijs excrementisq;. Perinde enim natura atque paterfamilias prudens nihil amittere solet, ex quo facere aliquid commodi possit, dispensatur autem in cura rei familiaris ita, ut cibus optimus detur liberis, deterior seruis, uilissimus socijs animalibus. ut igitur incremento iam addito mens aduena facit hæc, sic in ortu ipso natura ex materia sincerissima carnem cæterorum sensoriorum corpora conficit,

ex recre



mentis ossa, neruos, pilos, ungues, ungulas, & reliqua generis eiusdem constituit. Quam ob rem hæc ultima efficiuntur, cum iam suppetit excrementum naturæ, ossa igitur in prima partium cōstitutione gignuntur ex seminali excremento. cumq; animal augetur, hæc incrementum ex alimento capiunt naturali, quo partes principales augentur. eius tamen ipsius alimenti sunt, & reliquæ, & excrementa. fit enim in quouis primum & secundum. alimentiq; ratio duplex est, altera nutriendi, altera augendi. nutriens est, quod esse præbeat & toti & partibus. augens, quod accessionem ad magnitudinem faciat. de quibus postea differendum latius est. Nerui etiam eo modo, quo ossa instituuntur, & ex eodem, uidelicet ex seminali excremento, & nutritiuo. sed ungues, pili, cornua, rostra auium, & calcaria, & si quid eiusmodi aliud est, ex cibo gignuntur aduentitio & auctiuo, quem tum à foemina, tum de foris sibi acquirunt. quam ob rem ossa quodam tenus capiunt incrementum. omnibus enim animalibus exitus magnitudinis est, itaque ossa quoq; certo augendi termino describuntur. nam si hæc semper augerentur, animalia quoque in quibus os, aut ossis proportionale est, augerentur, quādiu uiuerent, magnitudinis animalium meta & terminus his describitur. sed quam ob causam non semper capiant incrementum, postea declarandum est. pili autem, & eorum cognata omnia, quādiu insunt, tandiu augentur: & magis cum corpora aut ægrotant, aut senescunt, atq; decrescunt, quoniam plus excrementi tantisper remanet, cum minus in partes præcipuas consumatur propter senium aut morbum. nam ubi id quoq; ob ætatem defecerit, pili quoque deficiunt. at ossa contrā. decrescunt enim cum corpore & membris. defunctis etiam pili augentur, sed nasci nequeunt. De dentibus dubitaueris, sunt enim eiusdem naturæ, cuius ossa: gignunturq; ex ossibus, ut ungues, pili, cornua, & similia ex cute. quo fit ut ipsa colorem pariter cum cute immutent. alba enim & nigra, & uario modo diuersa pro colore cutis redduntur. At dentes nihil tale recipiunt. ossibus enim annumerantur in ijs animalibus, quæ ossa habent, & dentes. accrescunt soli omnium ossium tota uita, quod patet in ijs dentibus, qui mutuum tractum declinant. causa incrementi est, quoad pertinet ad id cuius gratia, ut fungi officio possint. breui enim tempore attritu consumerentur, nisi subinde repararentur, quando uel nunc senescentibus nonnullis edacibus dente non magno præditis admodum perteruntur. plus enim in dies adimitur quā additur. quam ob rem bene id quoque ad rem quæ accidit emolita natura est. quippe quæ in senectutem uitæq; exitum defectum dentium proferat, & pro uitæ spacio præscripserit modum. Sed si decies, millies, aut deciescentis annis uita seruaretur, & prægrandes primos oriri oporteret, & sæpius renasci. Quamuis enim assidue reciperent incrementum, tamen detracti plusquam accrescerent, inutiles demum ad cibum conficiendum euaderent. Sed cuiusnam gratia capiant incrementum, dictum iam est. Accidit autem, ut neque eandem naturam, quā cætera ossa dentes habeant. cætera enim in prima cōstitutione omnia gignuntur, neque est quod post oriatur: at dentes post enascuntur. quam ob rem cum deciderint, denuo possunt oriri. tangunt enim ossa, non 40 continuantur. ex eo tamen gignuntur alimento, quod in ossa administratur, quæ propter eandem, quā ossa habent naturam, & tunc, cum illa iam suum numerum receperunt. sed cum cætera animalia dentibus, aut dentium proportionali prædita enascantur, nisi quid præter naturam accidit (perfectiora enim, quā homo generatione absoluantur) homo dentibus carens uenit in lucem, nisi quid præter naturam intercesserit. sed quam ob causam dentes alij decidant, alij non, post explicabimus. Quod autem eiusmodi partes excremento constituuntur, ea causa homo inobsepto, & nudissimo omnium animalium corpore est, & ungues minimos pro magnitudine habet, minimum nanque in eo est excrementum terrenum. cum enim

excrementum quoddam sit, quod inconcoctum remaneat, tum quod terrenum in corporibus est, omnium maxime est inconcoctum, quemadmodum partes quæque constituantur, & quam causam generationis sit, declaratum iam est.

*Quomodo foetus in utero animantium augeantur.*

Caput V



Vgentur foetus, qui forma animalis nascuntur, per umbilici annexum, ut ante diximus. Cum enim vis quoque nutriendi in animalibus insit, umbilicū statim quasi radicem agunt in utero. umbilicum uenæ contentæ in putamine complent, plures in maioribus animalibus, ut boue, cæterisque generis eiusdem, binæ in mediocribus, singulæ in minimis, hoc sanguineum hauriunt alimentum, uterus enim exitus est uenarum multarum. Animalia igitur non utrinque dentata omnia, & dentatorū utrinque, quorum uterus uenam non singularem habet pertinentem grandem, sed pro una plures frequentes continet, hæc in utero habent quæ acetabula appellantur, in quæ umbilicus deuenit atque adheret. Tenduntur enim uenæ umbilicales undique laterum, fissæque sparguntur usquequaque per uterum, & qua desinunt, hæc illa acetabula existunt curuamine suo coniuncta cum utero, cauo autem ad foetum conuersa. Secundæ uero & membranæ inter foetum & uterum posita sunt. Acetabula foetu accrescente proficiscentisque ad exitum minora subinde redduntur, dumque obliterantur, cum perfectus iam est, in ea enim ueluti mammas reponitur à natura foetus alimentum sanguineum, quod dum colligitur, & paulatim ex multis conficitur, quasi pustula & inflammatio corpus acetabulorum existit, itaque quandiu foetus sit minor, nec multum cibi assumere possit, conspicua maioraque sunt: sed aucto iam foetu confidunt & exolescunt. Minuta & utrinque dentata animalia magna ex parte acetabulis uteri carent, tendit umbilicus in ipsas in uenam singularem, quæ per uterum maiuscula fertur. Cumque eiusmodi animalia alia unum, alia plura pariant, quo modo unum, eodem plura habentur. Sed hæc, & dissectionum exemplis, & historiarum commentariis inspicenda explorandaque sunt, hærent enim & continentur animalia ex umbilico, qui ex uena dependet per æquilibrium directum ad uenam quasi aqueductum fluentem. foetus membranis & secundis obuolutus continetur. Qui infantes alii in utero aiunt sugentes carunculam quandam, non recte dicunt. Idem enim & cæteris animalibus eueniret, quod tamen nusquam uidemus, atqui facile per dissectiones uideretur, si esset. Omnes etiam foetus, tum uolucres, tum aquatiles, & pedestres pari modo membranæ tenues ambiunt, separantes ab utero & humoribus admissis, sed nec in ipsis tale quicquam inesse uidemus, neque fieri potest, ut per eorum aliquod alimentum hauriant. Iam quæ ouo nascuntur, omnia incrementum foris recipere abiuncta ab utero apertum est, itaque non recte aiunt, qui ita dicunt, ut Democritus. Coeunt animalia generis eiusdem secundum naturam, sed ea etiam quorum genus diuersum quidem, sed natura non multum distat, si modo par magnitudo sit, & tempora æquent grauiditatis, raro id fit, sed tamen fieri & in canibus, & in uulpibus, & in lupis certum est, canes etiam Indici ex bellua quadam simili, & cane generantur, necnon in auibus salacioribus idem fieri uisum est, ut perdicibus, & gallinis. Quinetiam aduicorum accipitres specie diuersi coire inter se putantur. idemque in nonnullis alijs auibus euenire animaduersum est. In marinis nihil adhuc exploratum habemus dignum memoratu, qui tamen rhinobati appellantur, maxime gigni creduntur ex squatina & raia. Ad hæc, quod de Africa in proverbio est, semper aliquid noui Africam afferre, propterea dicitur, quod diuersa etiam genera coeant, nam ob aquæ penuriam terra illius,

κεταβυλας  
acetabula.

litus, uel alienigena libidine copulantur, cum in loca paucissima rigua cōgregentur, sed cum cætera sic orta, rursus ipsa inter se cōeant, generareq; possint, genus unum mulorum sterile est: quippe quod neque secum, neque cum alijs iunctum generet. Quæstio igitur in uniuersum, quam ob causam steriles, aut mas aut femina sūt: sunt enim steriles & mulieres & uiri. atque etiam in cæterorum animalium genere, ut equorum, ut ouium, sunt quæ nullam faciunt prolem. sed multorum genus totum sterile est. Causa uero sterilitatis in cæteris animalibus plures sunt. nam & à primo ortu naturæ locis ad coitum cōmodis, oblaesis, steriles & mulieres & uiri redduntur, ut alteræ non pubescant, alteri non barbescant, sed spadones quidam sūt. alijs in processu ætatis idem accidit affectus, ut propter corporis nutritionē pleniorē, mulieribus enim pinguioribus factis, uiris corpore melius habito excrementa ieiū minale in corpus absorbuntur. itaque fit ut illis menstrua desint, his genitura. aut ex morbo, uiris humidum frigidumq; emittitur semen: mulieribus purgationes uiuantur, plenæq; excrementorum morbosiorum redduntur. Multis etiam tum uiris, tum mulieribus, hoc idem accidit malum, oblaesis partibus, & locis accommodatis ad Venerem, quæ uitia partim curabilia sunt, partim incurabilia. sed maxime steriles tunc perseverant, cum primo naturæ ortu tales constituerunt. gignuntur enim & mulieres uiragines, & uiri foeminares: alteris menstrua desunt, alteris semen exilis frigidumq; est. Quam ob rem ratione recta experimento in aqua probatur fecunditas seminis. quod enim tenue ac frigidum est, citò diffusum per summa innatat, quod fecundum est, in imum descendit. calidum enim quod concoctum est, concoctum autem est, quod ipsissimum crassumq; est. mulierum probatio sufficit, ut odores subeuntes uterum efferantur ad locum spirandi, & afficiant halitum. atque etiam illitus, ut colores oculis impositi saluam perficiant oris. nam nisi hæc ita fiant, meatus corporis per quos excrementum decedit, confusus, obseptos, & obcæcatus esse significatur. sedes enim oculorum maxime omnium locorum capitis seminalis est. quod patet cum sola ipsa per coitum uenereum manifeste immutetur, & usu immo dico rei uenereæ oculi aperte langueant & subfideant. causa est, quod natura genituræ similis cerebro est, aquosa enim materia eius est, calorq; aduentitius, purgationes autem seminales à septo ueniunt. principium enim naturæ hinc est. itaque fit, ut motus à genitali ad pectus deueniant. hinc odores per spirationem sensum efficiunt, hominibus igitur cæterisq; generibus, ut antè retulimus, partum latum hæc læsio obuenit.

Contra Empedoclis & Democriti sententiam, qui non recte senserunt quam ob causam  
multi sint steriles. Caput VI



T genus mulorum totum sterile est. cuius rei causa non bene ab Empedocle & Democrito redditur. obscure Empedocles, planius Democritus scribit. sed neuter bene, afferunt enim demonstrationem aque de omnibus, quæ præter suam cognationem cōeant. Democritus meatus mulorum corruptos in uteris dicit, quoniam non ex coeptione eorum consistit. sed id cum alijs etiam animalibus accidat, tamen possunt generare. atqui si id causæ esset sterilitatis, cætera quoque deberent, quæ ita cōeunt. Empedocles misturam feminum coaptatur, ex molli utraque genitura consistat. causa enim & densa coaptari uideatur ex ijs, durum ex mollibus, ut si æs stanno miscetur. sed nec in re causam recte assignat, dixi de his in problematis. neque principia alio modo cognitis accipit. causa enim & solida coaptata uicissim, quo faciant missionem, aut uini & aquæ, aut alius cuiuspiam: hoc enim sensum capium dicitur, nam quemadmodum causa uini & aquæ debeat

accipi, præter sensum omnino est. Item cum ita sit, ut & equi ex equis gignantur, & asini ex asinis, & mulus ex equo & asino, alterutro mare, aut foemina, cur ex his tam densum consistat, ut sterile sit, quod prodierit: ex equo autem foemina & mare, aut asino foemina & mare sterile non proveniat. Atqui molle & maris equi & foemina semen est, coit autem equus cum asino, tum mare, tum foemina pro differentia sui sexus, ideoque gigni ex ijs sterile ait, quia unum ex ambobus seminibus molibus conficiatur. ergo & quod ex equo mare ac foemina gignitur, sterile esse debet. nam si alterum misceretur solum, liceret dicere alterum causam esse sterilitatis, ut dissimile geniturae asini. Nunc uero quali illius semini, tali & cognati miscetur. ad hæc demonstratio æque de ambobus, tam mare quam foemina recte affertur. 10  
Sed interest, quod mas septenis duntaxat generat, ut aiunt, foemina improlis omnino est, idque propterea, quia perducere ad finem quod cõceperit, nequeat. nam concepisse quidẽ iam mulam constat, sed fortasse uerisimilior ijs demonstratio logica illa uidebitur. logicam appello, quia quo uniuersalior, eo remotior à proprijs principijs est, si ex mare ac foemina speciei eiusdẽ, prolis speciei eiusdẽ gigni solet, aut mas aut foemina, ut ex cane mare & foemina canis, aut mas aut foemina: ex diuersis etiã speciebus diuersum specie proveniat, necesse est. uerbi gratia, si canis diuersum est à leone, ex cane mare, & leone foemina diuersum proveniet, & ex leone mare & cane foemina diuersum. Cum itaque mulus mas & foemina sine speciei differentia gignatur, ex equo & asino, quæ diuersa specie sunt, impossibile est, ut aliquid ex mulis gignatur, nec enim diuersum specie provenire potest, quãdo ex mare ac foemina speciei eiusdẽ, idem specie generatur, neque idem, hoc est mulus. gignitur enim mulus ex equo & asino, quæ diuersa specie sunt, ex diuersis autem specie diuersum animal gigni positum est, sed enim hæc ratio admodum uniuersalis inanis est, rationes enim quæ non ex proprijs ducuntur principijs, inanes sunt, & rerum esse uidentur, cum longe aberrant, sunt profecto geometricæ rationes, quæ ex principijs geometricis afferuntur, idemque in cæteris est intelligendũ, uidentur tamen eiusmodi rationes, quãuis inanes, aliquid esse, nam & inane siue uacuum illud aliquid esse uidetur, cum tamẽ nihil omnino sit, nec uerum est, quod cõcluditur, multa enim ex ijs, quæ non eadem specie progeniuntur, foetifera prodeunt, ut antè exposui, hoc igitur modo, 30  
nec de cæteris rebus, neque de naturalibus indagandũ est. Sed ex ijs quæ in genere, tum equorum, tum asinorum insunt, considerando potius acceperis causam, primum enim utrunque eorum singularẽ parit inter cognata animalia plura numero, tum foemina non semper concipere possunt. & quidem equi interposito tempore admittuntur, quoniam ferre continue nequeant, sed equa menstruosa non est: imò minimum inter quadrupedes emittere solet, asina conceptus incontinens est, genituram utique iniectam emingit, quam ob rem uerberibus eam sectantes cogunt ne id faciat. Ad hæc frigidum animal asinus est, quam ob rem locis frigidis gigni non potest, utpote sua natura impatiens frigoris, uelut apud Scythas, & eorum finitimos, nec uero apud Gallos qui supra Hispaniam colunt, genus id animalis est, nam 40  
ea quoque prouincia frigida est, hinc admissarios etiam non ut equæ, sic asinæ æquinoctio admouent: sed æstiuo solstitio, ut tempore calido pulli nascantur, eodem enim tempore parit, quo coierit. Annum uterum fert & asina, & equa. Cum igitur natura sit frigidum animal, ut dictum est, semen quoque genitale eius frigidum esse necesse est. Cuius rei indicium, quod si equus superuenerit asinam, quam inierit asinus, non peruerteret asini initum: sed si asinus superuenerit equam, quam equus inierit, peruerteret, propter feminis sui frigiditatem. Cum igitur inter se ipsa iungitur, seruatur semen propter alterius calorem, calidius est enim quod ab equo secernitur, nam asini & materia & genitura frigida est, equi calidior est, cum  
autem

Logica demon-  
stratio.

autem mistum uel calidum cum frigido, uel frigidum cum calido est, euenit ut conceptus ex ijs seruetur, eaq; uicissim ex seipsa foecunda sint. At uero quod ex ijs prodijt, non insuper foecundum, sed infocundum ad perfectam foetificationem est. Omnino cum utrunque aptum, propensumq; sit ad sterilitatem (sunt enim in aliis non tum ea quae diximus, tum etiam, ut nisi à prima dētium mutatione generare incipiat, nunquam post generet, sed sterilis omnino perduret) ita in exiguo continetur generandi uis corporis asinini, facillimeq; labitur ad sterilitatem. Equus etiam simili modo idoneus est ad sterilitatem, tātoq; deest ut sterilis sit, quanto, ut quod ex ipsis prodierit semen frigidius reddatur. quod tunc efficitur, cum asini excremento miscetur. asinus quoq; parum deest quin sui generis initu sterile generet. Itaque cum accesserit quod praeter naturam est, si ante uix unum partu naturae legitimum posuerat generare, iam quod peregrinum ex ijs prodijt sterilius, nihil deerit, ut sterile sit, sed necessario sterile erit. euenit etiam ut corpora mulorum magna efficiantur, quoniam menstruorum decessus ad corporis incrementum uertatur. Cumq; parus eorum annuus sit, non modo concipiat, sed etiam enutriat mula opus est. quod fieri non potest sine mensuris. mulis autem menstrua defunt, sed quantum inutile est, cum excremento uesicae abigitur. Vnde fit, ne muli genitale foeminarum, sed ipsum excrementum olfaciant. reliquum in corporis incrementum & magnitudinem uertitur. Itaque concipere quidē aliquando mula potest, quod iam factum est, sed enutrire atque in finem perducere non potest. mas generare interdum potest, quoniam & calidioris naturae quam foemina mas est, & nihil corporis per coitum confert ad generationem. quod autem facit, ginnus est. quod mulus oblaesus est. nam ex equo & asino, ginni proueniunt, cum conceptus in utero aegrotauit. est enim ginnus idem quod metachœrum in porcis: quod enim ibi laesum deprauatumq; in utero est metachœrū uocatur, quasi aporcellum dixeris. idq; cuilibet porco accidere potest. pygmaeorum etiam, id est nanorum, pomilionū, & pusillorum generatio similis est: nam eorum quoq; membra & magnitudines uitiantur in utero, & sunt ueluti aporcella, & ginni, haecenus de mulorum sterilitate.

### ARISTOTELIS STAGIRITAE DE GENERATIONE ANIMALIVM LIBER TERTIVS, INTERP. THEODORO.

De generatione animalium sanguineorum, & ouiparorum, deq; ovis subuentaneis & ceterorum ouorum natura, & quam ob causam alia unicolora sunt, alia bicolora. Caput I



DE MULORVM sterilitate dictum iam est, atque etiam de ijs, quae animal & foras & intra se pariunt. In sanguineo autem ouiparo genere partim similis generatio ut in pedestribus est, idemq; de omnibus aliquid accipi potest: partim differentia, tum inter ipsa, tum ad pedestria existit. Oriuntur omnia coitu mare in foeminam emittente semen genitale. sed aues ouum aedunt perfectum, crusta intestum dura, nisi morbo laedatur. atque omnia autum oua bicolora sunt. pisciū cartilaginei, ut saepius dixi, cum intra se oua pepererint, animal excludūt, ouo in alium uteri locum ex alio translato, molle hoc ouum est, & unicolor. unus ex ijs animal non parit, qui rana uocatur, cuius causam post exponam. ceteri pisces qui oua pariunt, ouum unicolor aedunt, quod imperfectum est, quippe quod extra capiat incrementum eadem causa, qua & quod

intus perficitur. De uteris qua inter se differentia discrepent, & quas ob causas ita sit, declaratum est ante. Viuiparorum enim alia supra, iuxta cinctum uerum continent: alia infra iuxta genitale, supra cartilaginea habent: infra quæ animal & intra se, & foras generant, ut homo, equus, & reliqua generis eiusdem, ouiparorū etiam alia infra, ut pisces, qui oua pariunt; alia supra, ut aues, consistunt uel sponte conceptus in autum genere, quos subuentaneos, & Zephirios à Fauonio quidam appellant, qui profectio in ijs sunt aubus quæ non uolaces sunt, ut uncæ, sed multiparæ, quoniam excremento ipsæ abundant, uncis in alas & pennas id uertitur, corpusq; exiguum siccum & calidum habetur, decessus autem menstruorū, & genitura excrementum sunt, cum igitur & pennarum natura, & seminis, excremento gignatur, nequit natura large utroq; uersus profundere, hæc eadem causa est, & ut aues uncæ nec salaces sint nec multiparæ, sed graues uolacesq; quarū corpus grādiusculum, ut columba & similes: aut graues non uolaces, quarum corpus grande, ut gallina, coitu superent & partu, grauibus enim non uolacibus, ut gallinis, perdicibus, & reliquis id genus multum eius excrementi fit, quapropter mares eorum salaces sunt, & fœminæ multum materiæ suggerunt, & quidem pariunt, ex his aliæ complura, aliæ sæpe, complura gallina, perdix, struthio Libycus, sæpe autem columbarium genus, sed non multa, quippe quod medium sit inter aduncum genus, & graue, uolax enim ut aduncum est, corpulētum ut graue, itaq; quoniam uolax est, excrementumq; eo transit, pauca parit, sed sæpe corporis magnitudine, & uentris calore, & facultate concoquendi maxima, atq; etiam quod cibum facile sibi acquirat, adunca enim difficulter id faciunt. Paruæ etiam aues salaces, præfecundæq; sunt, quomodo interdum plantæ minores sunt fertiliores, quod enim incrementum corporis deest, in excrementum seminale exundat, quam ob rem gallinæ hadrianæ multa admodū pariunt, sit enim propter corporis exiguitatem, ut alimentum ad partionem sumptetur, uulgares etiā gallinæ fœcundiores sunt generosis, corpora enim alteris humidiora, alteris grādiora & sicciora, animus generosus in eiusmodi corporibus potius cōsistit, quin & tenuitas ac imbecillitas crurium facit, ut eorum natura & salacior sit, & fœcundior: quomodo & hominibus euenit, alimentum enim quod crura subiret, in seminale excrementum transfertur, quodquod enim inde natura adimit, hic adiicit, nam uncungues aues pede sunt firmiore, & crure crassiore, causa uicissus, itaq; omnibus his de causis, neq; salaces sunt, neq; præfecundæ, Tinnunculus potissimū in eo genere fœcundissimus est, qui solus ferè aduncarum & bibit, humor autem & natiuus & aduentitiuus seminalis cum calore indito est, sed ne ipse quidem multa admodum parit, uerum cum plurimum quatuor, Cuculus parum generat, quamquam aduncus non est, quia naturæ frigida est, quod ipsius pauore iudicatur, Seminale autem animal calidum esse & humidū oportet, pauidam esse hanc auiem apertum est, cum ab omnibus aubus fugetur, & in alienis pariat nidis, Columbarium genus bina magna ex parte parere solet, nec enim uniparum est, cum nulla auis pariat unum, excepto cuculo, qui & ipse duo interdum parit, nec multa parit, sed sæpe bina aut terna cum plurimum, sed bina magna ex parte, sunt enim hi numeri inter unum & multa, cibum in semen conuertit in ijs quæ abunde fœtificant, pluribus declaratur euentis, arborum enim multæ cum admodum copiose tulerint, exarescunt fructificatione, nisi corpori alimentum remanserit, Annus etiam idem euenit, ut leguminibus, ut frumentis, & reliquis huiuscemodi, cibum enim omnem in semen consumunt, quippe cum genus id fertile admodum sit, necnon gallinarum nonnullæ cum adeo ualde peperissent, ut etiam his die pepererint, mox à tanto partu interiire, Hyperinæ enim, id est effœtæ, & aues & plantæ fiunt, quod uitium nimia excrementi secessio est, ut exhaustæ effice

stæ effoetæq; dicantur, quæ ita afficiuntur, hæc eadem affectio causæ leænæ etiam est, ut sterilecat. primum enim quinq; aut sex parit catulos, tum anno secūdo quatuor, mox tres. deinde pari modo per annos singulos minus uno, postremo nullum, cum & excrementum omne consumptum iam sit, & ætate desinente semen unā defecerit. Quibusnam auib; subuentanei partus consistant, & quæ præfœcundæ, parum ue fœcundæ, quasq; ob causas, dictum iam est, fiunt subuentaneæ oua, ut antè retulimus, quoniam materia seminalis in fœmina est, nec menstruorum decessio fit auib;, ut uiuiparis sanguine præditis, in ijs enim omnibus fit, alijs magis, alijs minus, alijs quantum rem indicet. Piscibus etiam ut auib; menstrua nulla prodeunt, quam ob rem ijs quoq; cōceptus consistit sine coitu, ut auib;, sed minus aperte, frigidior enim natura piscium est, decessio igitur menstruorum quæ uiuiparis fit, eadem consistit in auib; per debita excrementi tempora, & quia locus septo propinquus calidus est, magnitudine iuxta perficiuntur, sed ad generationem imperfecta, tum hæc, tum illa piscium sunt, nisi semen maris accedat, cuius rei causam antè exposui. Volacibus subuētaneæ non gignuntur, scilicet eadem causa, qua multa nec ab ijs ipsis generantur, unguibus enim parum excrementi inest, & marem desiderant ad excrementi commotionem, gignuntur subuētaneæ oua plura numero, quam quæ fœcunda sunt, sed minora, ob unam eandemq; causam, quod enim imperfecta sunt, minus augentur: quod minus augetur, plura numero existunt, minus etiam suaui sunt, quoniam minus concocta, concoctū enim in quouis genere dulcius est, sed oua auium aut piscium non perfici ad generationem sine mare, satis exploratum habemus. An in piscibus quoq; fiat conceptus sine mare, non æque apertum est, sed potissimum in fluuiatili genere, rubellionibus id accidere uisum est, etenim nonnulli statim habere oua uidentur, ut de his in historijs scripsimus. Omnino in auium genere, ne ea quidē oua quæ per coitum oriuntur, possunt magna ex parte augeri, nisi coitus auis continuetur, cuius rei causa est, quod ut in mulieribus coitu maris detrahitur mensium excrementum (trahit enim humorem uterus tepefactus, & meatus aperiuntur) sic in auib; euenit, dum paulatim menstruum excrementum accedit, quod foras decedere non potest, quoniam parum est, & superne ad cinctum continetur, sed in uterum ipsum collabitur. Hoc enim ouum augetur sicut fœtus uiuiparorum, eo quod per umbilicū affluit, nam cum semel aues coierūt, omnia ferè oua semper habere perseverant, sed parua admodū, quam ob rem de subuētaneis dicere non solent oriri sponte, sed reliquias esse prægressi coitus: quod falsum est, satis enim conspectū est in nouella, tum gallina, tum anser, gigni sine coitu, tum etiam perdices fœminæ, & quæ nondum coierint, & quæ coierint, quarum usus in aucupijs, cum olfaciunt marem, uocemq; eius audiunt, alteræ implentur, alteræ statim pariunt, cuius affectionis causa est eadem quæ in homine & quadrupede, nam si fortè eorū corpora accensa libidine turgent ad coitum, alia cum primū uiderunt, alia cum leuiter tetigerūt, semen emittūt.

40 est hoc auium genus sua natura libidinosum, ut leui egeat motu cum turget, citoq; fecernat, ut in ijs quæ non coierint, subuentaneæ consistant: in ijs quæ coierint, oua breui augeantur, & perficiantur. Aues ex ijs quæ ouum pariunt foras, perfectū hoc ædunt, pisces imperfectum, quod extra recipit incrementum, ut antè diximus, causa est, quod genus piscium fœcundum admodū est. Itaq; fieri non potest, ut multa in utero recipiant: quapropter foras deponunt, idq; agitur citò, quod uterus eorū piscium, qui ouum pariunt, foras iuxta genitale positus est. Sunt auium oua bicolora, piscium unicolora omnium, coloris causam uideris ex facultate partis candidæ atque luteæ, fecernitur enim à sanguine quod eo uenit, nullum enim exanguæ animal ouum generat, sanguinem autem materiam esse corporum, dictum

iam sapius est. pars igitur eius quæ calida est, propius ad formam in membris instituta accedit. quæ autem terrosior est, corporis institutionem præbet, & remotior est. quam ob rem in bicoloribus ovis animal initium suæ generationis à candido sumit. Initium enim animale in candido est, cibum à luteo capit. calidioribus itaq; animalibus seorsum ista habentur distincta, ex quo principium ortus, & ex quo alimentum, atq; alterum candidum, alterum luteum est: & plus cædidi synceriq; semper est, quàm lutei & terreni. At minus calidis & humidioribus contra, plus lutei, idq; humidius est. quod in palustribus accidit aubus. Cum enim illæ sua natura humidiores sint, tum frigidiores terrenis aubus constant. Itaq; ova earum multū eius, quod vitellum vocatur, habent, minusq; luteum. quoniam cædidum minus ab eo separetur. Quæ iam sua natura frigida inter ouipara sunt, ea longe humidiora constant. quale genus piscium est. nec cædidum habent distinctum, quia exiguum hoc est, & frigida terrenaq; qualitatis copia impedit. quam ob rem omnia piscium ova unicolora sunt, atq; ad lutea candida, ad candida lutea esse dixeris. autum uel subuentanea ova colorem eum duplicem obtinent. habent enim ex quo utrunque sit, & unde principium, & unde cibus. sed hæc imperfecta sunt, & maris indiga. fiunt enim fecunda, si quo tempore ineuntur à mare. nec uero sexus causæ coloris duplicis est, ut candidum à mare, luteum à femina sit, sed ambo à femina proficiscuntur. uerum alterum frigidum, alterum calidum est. in quibus multum caloris est, distinguuntur: in quibus parum, distinguere non possunt. & ob eam rem cōceptus eorum sunt unicolores, ut dictum est. semen autem maris constituit tantum: ideo primum exiguum, albusq; conceptus autum cernitur: mox tempore procedente luteus totus, cum iam plus sanguinis admiscetur: postremo secedente calore pars candida circum insitit, quasi humore æque feruente quoquoersus. candida enim pars oui sua natura humida est, caloremq; animalem intra se cōtinet. quam ob rem circum ipsa discernitur lutea, & terrena intus manet. & si plura ova coniecta in patinam, aut tale aliquod uas coquis igne, ita, ne motus caloris citatior sit, quàm ouorum distinctio, idem in uniuersis ovis, quod in singulis euenit, ut lutea cuncta in medio constituantur, candida circiter ambiant. sed quam ob causam alia unicolora, alia bicolora sunt ova, dictum iam est.

*De ortu eorum, quæ perfectis ovis foras generantur, tum quium, tum quadrupedum ouum  
crusta intestum parientium.*

Caput II



Ecernitur in ouo principium genitale maris ea parte, qua ouum utero adheret, sitq; proinde dissimile, quod bicolor est: nec planè rotundum, sed altera parte acutius, quoniam partem eam differre oportet, in qua principium illud continetur. quam ob rem durius ea ipsa parte est ouum, quàm inferiore. principium enim operiendum custodiendum est. exit etiam pars oui acuta post. quod enim adheret, id exire postea conuenit. adheret autem ea parte, qua principium continetur. & principium ipsum in parte acuta est. Idem in plantarum etiam seminibus modus est. principium enim seminis adheret, aut ramo, aut putamini, aut pulpæ: ut in legumine patet, quæ enim bis ualuis fabarum strues, & cæterorum id genus coniungitur, hæc principium seminis adheret. Sed quæres de incremento ouorum, quonam modo ex utero ueniat. animalia enim per umbilicum capiunt cibum: ova autem quorū cum non modo uermium, ipsa per se recipiant incrementum. At si quid est, quo adherent, id quonam trāseat perfectio iam ouo: nihil enim tale exit cum ouo, ut umbilicus cum animali, quod enim circiter ambit, testa perfectio iam ouo efficitur. recte igitur hoc ita quæritur. Sed latet primo membranam mollem id esse, quod postremo testa efficitur. perfectio



perfecto enim ovo, durum ac rigidum euadit ita modice, ut exeat adhuc molle. do-  
lorem enim moueret, nisi ita exiret. egressum statim refrigeratū duratur, euapora-  
to humore quamprimum, qui exiguus inest, relictaq; portione terrena. Huius ita-  
que membranæ particula quædam umbilicaris parte acuta principio continetur,  
tenditq; paruis adhuc ueluti fistula. quod in eiectionis inchoatis ouis patet. nam si  
auis madefacta, aut alia causa inalgescens eiecit, cruentus adhuc cernitur cōceptus,  
habensq; sibi annexam appendiculam umbilicarem, quæ ouo amplius crescente  
obtenditur latius, atque minuitur, perfectoq; mucro exitum complet. membrana  
interior sub hoc umbilico est, quæ uitellum albumenq; ab eo differt. ubi iam  
10 ad consummationē uentum est, ouum absoluitur totum, & umbilicus ratione non  
insuper apparet. extremum enim ultimum eius est. Partus ouorum contrā atque  
animalium euenit. animal enim uersum in caput, suumq; principium nascitur. at  
ouum quasi in pedes cōuersum exit. cuius rei causa quod diximus est, quod ouum  
ea parte qua principium continetur adhæret. Generatio auium ex ouo ita euenit,  
ut incubante, & concoquente aue, animal ex parte oui fecernatur: augeatur ex re-  
liqua parte & conficiatur. natura enim simul & materiam animalis in ouo reponit,  
& satis cibi ad incrementum. Cum enim auis intra se perficere nequeat, cibum unā  
parit in ouo. nam ipsæ quæ forma animalis nascuntur, cibus in alia corporis parte pa-  
ratur, quod lac uocatur, uidelicet in mammis. At auibus hoc idem in ouo natura  
20 constituit, sed contrā, quā homines putant, & Alcmaeon Crotoniates ait. non  
enim albumen oui lac est, sed uitellum. hoc enim pullis pro cibo est. illi albumē pro  
cibo esse existimant, propter coloris affinitatem. Oritur pullus incubante aue, ut di-  
ctum est. sed si aut tempus sit bene temperatum, aut locus, in quo oua manent, tepi-  
dus, concoquuntur & auium oua, & quadrupedum ouiparorum sine parentis in-  
cubitu. hæc enim omnia in terra pariunt, concoquunturq; oua tepore terræ. nam  
si quæ quadrupedes ouiparæ frequentantes fouent quæ addiderint oua, custodiæ  
gratia potius id faciunt. gignuntur uero eodem modo oua quadrupedū, quo auium.  
crusta enim dura infecta, & bicolora sunt, & iuxta cinctum consistunt, ut auium: &  
reliqua eadem tum intus, tum extra eueniunt. Itaque omnium causæ eadem consi-  
30 deratione continentur. sed quadrupedum oua ut ualidiora tempore concoquun-  
tur, auium imbecilliora sunt. atque ob eam rem parentem desiderant. Tum etiam  
natura attendere uidetur, ut sensum prouidum, curamq; diligentem erga prolem  
parentes habeant. sed in genere deteriore hoc facit quousque pariant: in alijs qui-  
busdam etiam donec perficiant. Prudentioribus uero plus curæ mādatur, ut etiam  
enutriant. postremo ipsæ quæ prudentia iam maxime prædita sunt, cōsuetudo, amor,  
& charitas in prolem etiam adultam seruat, ut homini, & quadrupedum nōnul-  
lis, auibus cura donec pariant, & enutriant. quam ob rem & ab incubitu laborant  
in prole enutrienda. à partu uero deterius afficiuntur, quasi priuata aliquo sibi na-  
tuo gestamine. Perficitur animal in ouo celerius diebus tepidis. tepore enim iuuas  
40 tur. nam concoctio est calor quidam. terra enim suo calore concoquit. & quæ incu-  
bant, hoc idem faciunt. adhibent enim suum calorem. deprauantur etiam oua, &  
fiunt, quæ urina appellantur, tempore potius calido, idq; ratione. ut enim uina tem-  
poribus calidis coacescunt fece subuersa, hoc enim causæ est, ut deprauentur, sic oua  
pereunt uitello corrupto, id enim in utrisq; terrena portio est. quam ob rem & ui-  
num obturbatur fece permixta, & ouum uitello diffuso. multiparis igitur hoc acci-  
dit merito, cum non facile omnibus calor conueniens reddi possit, sed alijs deficiat,  
alijs superet, & quasi putrefaciendo obturbet. Vncunguib; etiam quāuis parum  
foecundis, nihilominus tamen idem euenit. sæpe enim uel alterum ex duobus uri-  
num sit, sed tertium semper ferè. Cum enim calida sua natura sunt, faciunt, ut quasi

*Antiquus in-  
terpres habet:  
Quam ob rem  
fœmina quæ  
non incubant,  
à partu dete-  
rius afficiuntur.*

ferueat supra modum humor ouorum. Iam enim naturam quoque contrariam luteum & candidum habent. luteum namque gelu duratur & coit, calore contra humescit, quapropter cum uel in terra, uel per incubitum concoquitur, humescit, atque ita pro cibo animalibus nascentibus est. Nec uero cum igitur affaturque, durefcit, quoniam naturæ terrenæ est ut cera. Ideoque cum plus iusto calefcunt, nisi ex recreamento humido sint, saniescunt, reddunturque urina. At candidum gelu non cōcrefcit, sed magis humescit, causam antè reddidi. ignitum solidescit, quam ob rem cum ad generationem animalium concoquitur, crassefcit, ex hoc enim consistit animal. luteum autem pro cibo est, & membris subinde instituendis incrementum hinc admistratur. quocirca luteum & candidum membranis inter se distinguuntur, quasi natura 10 habeam diuersam. Sed quemadmodum hæc inter se habeant, tum initio generationis, tum consistentibus animalibus, atque etiam de membranis & umbilicis diligentius ex ijs quæ per historiam scripsimus, considerandum annotandumque est. Ad id autem quod impræsentiarum tractamus, tantum aperuisse satis est. Principio corde constituto, & uena maiore ab eo distincta, umbilici duo de uena eadem per tendunt, alter ad membranam, quæ luteum continet, alter ad membranam, cui secundarum species est, qua animal obuolutum continetur, quæ circa testæ membranam est. Altero igitur umbilico cibum ex luteo assumit, efficitur luteum copiosius, quippe quod calefcens reddatur humidius, cibum enim quoniam corpulentus est, humidum esse oportet, qualis plantæ suppeditatur. uiuunt autem principio, & quæ 20 in ouis, & quæ in animalibus gignuntur uita plantæ, adhærendo enim capiunt primum & incrementum & alimentum, alter umbilicus ad secundas tendit, ita enim in ijs quæ ouo nascuntur animalibus, pullum uti luteo existimandum, ut foetus uiuiparus sua parente uiuitur, quadiu intra parentem continetur. Cum enim non intra parentem nutrantur, quæ ouo proueniunt, partem eius accipiunt aliquam, habentque secum in cibo. Membrana uero exteriore nouissima sanguinolenta hæc perinde, ut illa utero, utuntur, simul autem & luteum & secundas testæ oui complectitur uteri proportionem, perinde quasi quid unum obductum amplectatur foetum, parentemque totam, quod ita est, quoniam foetum esse in utero, & cum parere necesse est. Itaque in uiuiparis uterus in parente est, in ouiparis è diuerso fit, quasi dixeris parentem 30 esse in utero, luteum est enim cibus, qui à parente præstatur, causa est, quod foetus nutritio non intra parentem est. Crescentibus umbilicus primum confidet, qui secundis adiungitur, hac enim pullum excludi cōuenit, reliquum lutei, & umbilicus ad luteum pertinens post collabitur, cibum enim habeat statim oportet, quod exclusum est, nec enim à parente nutritur, & per seipsum statim capere cibum non potest, quapropter luteum subit cum umbilico, & caro adnascitur. Talis ortus eorum est, quæ ex ouis perfectis foris generantur, tum in auibus, tum in quadrupedibus, quæ ouum crusta intectum dura pariunt. Sed hæc euidentiora in auctioribus sunt animalibus, nam in minoribus obscura præ sua exiguitate habentur.

*De ijs animantibus quæ perfectum ouum intra se pariunt, foras autem animal. quamque ob causam piscium oua mollia sint contra, quam auium.*

Caput III

40



Enus etiam piscium ouiparum est, cuius ea, quæ infra continent uterum, imperfectum pariunt ouum, causa quam antè reddidimus. Quæ autem cartilaginea nuncupantur, perfectum intra se ouum pariunt, mox animal foras ædunt, uno excepto, quam ranam uocant. hæc enim una foras ouum perfectum parit, causa natura corporis est, caput enim longe grandius reliquo corpore habet, idque aculeatum, ualdeque asperum, quam ob rem nec postea suos catulos intra se recipit, neque principio animal parit. Capitis enim

enim magnitudo & asperitas, ut aditum, sic exitum impedit. Et cum cartilagineorū ouum cute molli operiatur, quod enim frigidiora quā aues sint, nequeūt partem circūdantem indurare, ideo ouum unum inanarū solidum, durumq; est, ut foris seruetur. ceterorum humida sunt natura, & molli, operiūtur enim intus corpore suæ parentis. ortus ex ouo idem ranis, quæ extra perficiūtur, & ijs quæ intus. sed eorū, atq; auum ortus partim similis, partim diuersus est. primū enim altero carent umbilico, qui ad secundas pertinet, quæ sub testa ambiente politæ sunt, cuius rei causa est, quod testā illam circūdantem non habēt, cum nihilo his utilis esse possit. parens enim ipsa integrit & seruat. Testa in ouis adēdis tutela est cōtra detrimēta, quæ deforis ueniat. Tum generatio ijs quoq; ex oui parte extrema est, sed nō qua utero adherent, aues enim ex cacumine oriūtur, qua ouum adheret. causa est, quod auum ouum separatur ab utero. At eorū quanquā non omniū, tamen plurimorū ouum perfectum utero adheret. Cumq; animal extremo innascitur, ouum cōsumitur totum, quomodo in auib; ceterisq; quorū omniū absoluitur, demūq; utero umbilicus iam perfectorū adheret. similis modus eorū etiā est, quorū oua utero absoluitur, nōnullis enim eorū ouū perabsoluitur cum perfectū est. Quæres igitur, cur ita differāt auū & pisciū generatiōes. causa est, quod auū oua luteā à cādido separati cōtinēt, pisciū unicolora sunt, miscēturq; in ijs ista usquequaq; & cōfundūtur. itaq; nihil prohibet, quo minus ecōtrario principiū habeant genitale. non solū enim parte sui adherēte tale est, sed etiā altera obiecta. Alimentū uero ex utero meatibus trahere quibuscūq; eo ipso principio facile est. apertū hoc est in ijs ouis, quæ nō absoluitur, nam in nōnullis cartilagineis ouum non absoluitur utero, sed inherēs descēdit ad animalis generationē, in quibus animal perfectum habet suum umbilicū ex utero, cōsumpto iam ouo. cōstat igitur uel antē meatus oui eodē tendere. fit hoc in mustelorū genere læui cognomine, ut dictum est. Ortus pisciū his rebus, & his de causis differt ab auū. cetera eodem ueniunt modo. alterum enim umbilicum habēt similiter, ut aues ad luteum, sic pisces ad rotum ouum. non est enim huius pars altera lutea, altera candida, sed totum est unicolor, atq; ex eo aluntur, consumptoque parimodo subsidet, & caro circūm adnascitur. Talis eorum generatio est, quæ intra se ouum perfectum, foras animal pariunt.

*Quam ob causam piscium oua foras suscipiunt incrementum.*

Caput IIII



Aeteri pisces maxime in parte foras pariūt oua, omnesq; imperfecta, præterquā rana, cuius causam iam reddidimus. eorum etiā qui imperfectū pariunt ouum, causa declarata est. Ortus uero eorum quoq; ouo proueniēs, eodem agitur modo, quo cartilagineorū, quæ intra se pariunt, sed incrementū celere, atq; ex paruis: & ultimum ouū durius est. incrementū oui simile uermibus est. animalia enim quæ uermem pariūt, primo exigūū adunt, quod per se augetur sine ullo annexu. causa similis, ut in farina subacta humore, fit enim massa ex parua magna, parte solidiore humescēte, humida spirascēte, quod in animalibus natura caloris animalis facit, in massa calor permitti humoris. Augētur igitur oua necessariō ea causa: habēt enim excrementū massale, sed rei melioris gratia. quoniā fieri nō potest, ut totū suū incrementū recipiāt, propter summā eorū animalū fecunditatē. hinc enim & parua admodū excernūtur, & celeriter augētur: parua, quod uterus angustior sit, quā ut tantā ouorū copiā possit capere celeriter, ne dum per generationē mora in augendo protrahitur, genus pereat, quando uel nunc magna pars æditi partus interiit. quam ob rem genus pisciū præfecundum est. rependitur enim, & cōpensatur à natura interitus multitudine. sunt quorum uterus dehiscat, & distrumpatur, ut quæ acus uocatur, præ magnitudi-

dine ouorum. hæc enim pro multis maiusculos habet conceptus. quod enim natura numero ademerat, id magnitudini addidit. oua piscium foris augeri, & quam ob causam, dictum iam est.

De ortu cartilagineorum piscium, eosque qui pisces omnes esse feminas putant,

non recte sentire.

Caput V



Ed ouum eos etiam pisces parere indicium est, quod uiuipari quoque pisces ut cartilaginei, primum oua inter se pariunt. Totum enim piscium genus ouiparum esse certum est. finem tamen nullum recipit ouum eorum piscium, qui sexu maris & feminae distinguuntur, & per coitum generant, nisi mas suum semen aspergat. Sunt qui omnes pisces feminas esse opinentur, exceptis cartilagineis: sed non recte. putant enim eos qui mares habiti sunt, differre a suis feminis modo plantarum, in quibus altera fructificet, altera non, ut olea & oleaster, ficus & caprificus, sic pisces differre inter se uolunt, praeter cartilagineos. de his enim non ambigunt, quanquam similis ratio partium seminalium in maribus omnibus, tum cartilaginei, tum ouipari generis est, & semine genitale utriusque suo tempore emitit uidetur, uulvas etiam feminae habet. At qui non modo ouiparos, sed etiam ceteros uulvas habere oporteret, quamuis diuersas, ut mulae habent in genere ueterinorum, si genus totum sexu foeminino esset, nec nisi sterilitate nonnullorum dissideret. nunc uero partim conceptacula habet feminis genitalis, partim uulvas. atque in omnibus, excepto rubro & hiatula, hoc discrimen est, ut aut conceptacula feminis prolifici habeant, aut uulvas. difficultas autem, qua ita opinari mouetur, solui facile potest, cum rem, quae accidit, audis, nullum enim ex his quae coeunt tam multa parere posse aut, idque recte. quae enim ex se generant perfectum, uel animal, uel ouum, haec non ita pariunt multa, ut pisces qui oua pariunt. nam innumera quaedam eorum multitudo ouorum est. sed illud non uidetur, quam diuersa piscium oua, ab aliis sint. aues enim, & quadrupedum ouiparae, & si qua cartilaginea enumeranda sunt in hoc genere, perfectum generant ouum, & quod additum non recipiat incrementum. at pisces imperfecta pariunt oua, quae foris incrementum iustum recipiant. eodemque modo mollia & crustata, quae quidem & coire plane cernuntur, quoniam eorum coitus diuturnior est. alterum etiam eorum mare esse, alterum uulua habere certum est. absurdum praeterea est, nisi in omnibus generibus uis haec habeatur, quomodo in uiuiparis est, alterum mas, alterum femina. causa uero ignorantiae eorum qui ita censent, quod differentiae, quae multae ac uariae in animalium coitu generationeque sunt, non omnes pateant, sed paucarum quarundam intuitu, idem in omnibus esse oportere arbitrentur. quam ob rem & qui conceptus fieri aiunt captu seminis genitalis, quod a feminis piscibus deuoretur, rem, de qua uerba faciunt, non tenent. Tempore enim eodem mares semine genitale, feminae oua habent, & quo femina propius ad partum accedit, eo copiosius & humidius redditur semine genitale in mare. & ut incrementum feminis in mare, ouis in femina eodem tempore euenit, sic emissio. nec enim feminae uniuersum, sed paulatim pariunt: neque mares semine suum uniuersum emittunt. Atque haec omnia ratione, ita usu eueniunt. ut enim in aliis genere sunt, quae sine coitu oua concipiunt, quanquam pauca & raro, sed per coitum magna ex parte implentur: sic in piscibus uenit, sed minus. Aequae tamen utroque in genere infocunda sunt, quae sponte consterunt, nisi mas suum asperferit semine, uidelicet in quibus mas quoque est. Auiibus igitur quoniam oua perfecta exeunt, id fiat, cum intus adhuc sunt, necesse est. at piscibus quoniam imperfecta omnia oua adduntur, quanquam non intus per coitum constitit ouum, tamen si extra aspersum est, seruari potest: atque in hunc usum consumitur semine marium genitale. quapropter una cum ouis foeminarum subsidet, atque minuitur. aspergunt enim mares sequendo in his, quae subinde adduntur, ouis, ergo in piscibus quoque sexus discrimen maris ac feminae est, omnesque coeunt, nisi sexus alicui generi sit indistinctus. &

tus. & sine maris genitura nihil ex ijs potest generari. facit enim celeritas coitus piscium, ut eius opinionis autores decipiatur. Tanta enim celeritate rem uenerem peragunt, ut etiam piscatores complures lateant. nemo enim eorum aliquid tale cognitionis gratia obseruat, ueruntamen coitus uisus est. eodem enim modo quo delphini, pisces etiam coeunt, ammouendo supina per lapsum, quibus impedimento cauda est. sed delphinorum abiectio diuturnior est: piscium uero huiusmodi celerrima est. Itaque cum eam non cernant, capti siue uoratu seminis, & ouorum, quem exploratum habent, mouentur uel piscatores, ut stultam illam & uulgarem rationem de conceptione piscium afferant, quam & fabulator Herodorus scribit, quasi seminis deuoratu pisces impieantur. nec uident id fieri non posse. meatus enim qui per os intro tendit, in uentriculum fertur, non in uulua. quodque uentriculum subierit, alimentum id effici necesse est. concoquitur enim. Vuluæ autem plenæ ouorum cernuntur, quæ unde quæso subierint.

*Contra eos, qui coruos & ibim ore coire, mustelam autem ore parere, hyænam duplex genitale habere, trochum uero seipsum inire opinati sunt.* Caput VI

**S**imilis error in generatione quoque auium euenit. Sunt enim qui coruos & ibim ore coire opinentur: inter quadrupedes etiam mustelam ore parere. Hæc enim & Anaxagoras, & alij quidam naturales autores scribunt simpliciter ualde, & inconsiderate, qui in auium genere rationatione illa falluntur, quod raro coruorum coitus cernatur, rostrorum coniunctio sæpenumero, quæ omnibus id genus auibus solita est. quod in monedulis, quas manfues alimus, planum est. genus etiam columbinum hoc idem facit. Verum hæc, quoniam coire quoque uisuntur, ea fama caruerunt. coruinum genus libidinosum non est, quippe quod parum fecundum sit. coire tamē id quoque uisum est. sed enim non cogitasse, quæ admodum semen ad uulua deueniat per uentriculum, qui semper quod ingestum est, concoquat, ut pater in cibo perficiendo, absurdum omnino est. uuluas autem id quoque auium genus, & oua habere cernitur iuxta scriptum. Mustelam etiam modo ceterarum quadrupedum uuluam habere certum est. ex qua quoniam pacto foetus ad os deueniat: sed quia mustela paruos admodum parit, ut & ceteræ fidiæ pedes, de quibus postea dicemus, & sæpe catulos suos ore susceptos trāsfert, fecit, ut ita opinarentur. Quinetiam de trocho, & hyæna stulte, magnoque errore narratur. hyænam enim complures aiunt, trochum Herodorus Heracleota scribit duplex genitale habere, maris ac foeminae, & trochum seipsum inire. hyænam inire & iniri annis alternis. sed uisa est hyæna mas, & altera foemina sui discrimine genitalis. locis enim nonnullis penuria huius conspectus non est. uerum hyæna tam mares quam foeminae habent sub cauda lineam quamdam similem genitali foeminino. quæ quidem nota quamuis communis sit, tamen in maribus potius cernitur, quia mares quam foeminae magis capiuntur. Itaque qui rem parum diligenter considerant, in hanc aberrant opinionem, sed de his satis.

*Quare cartilaginei pisces mares semen spargere non uisuntur, nec foeminae suos conceptus.* Caput VII

**E**piscium generatione quæres, quam ob causam cartilagineorum, nec foeminae suos conceptus, neque mares suum semē spargere uisuntur, cum generis non uiuipari, & foeminae oua, & mares semē spargere soleant. causa uero est, quod genus cartilagineum semine minime abundat. uuluas etiam foeminae ad septum positas continent. æque enim mares a mari bus, & foeminae a foeminis differunt. sunt enim cartilaginei minus copiosi genitura. At uero mas ouipari generis, ut foemina oua præ multitudine reponit, sic ipse spargit. plus enim feminis habet, quam fati ad coitum sit. tendit enim natura potius abscondere semē id ad augenda oua reposita, quam ad primam constitutionem. nam ut & ante,

& modo diximus, ova auium intus perficiuntur, piscium extra. similis enim quodammodo generatio atq; in uermiparis est, quanquā imperfectiorem ædunt cōceptum, quæ uermem pariunt, sed utriusq; tam auium quā piscium ouis perfectionē mas adhibet. uerū auium intus, cum intus perficiantur: piscium extra, cum hæc imperfecta ædatur. nam aliās idem utriusq; cōtingit. Auium igitur subuētanea fœcūda redduntur, & quæ cōcepta maris diuersi coitu sunt, naturā, in eum qui pōst coierit, mutant. propria etiā quæ incrementō carent, cum coitus intermissus est, celeriter accrescunt, cum repetitur coitus: non tamē quouis tēpore, sed si prius, quā albumē fecerni incipiat. At pisciū ouis nihil tale præscriptū est. sed ut seruētur, quamprimū mares aspergūt. cuius rei causa est, quod hæc bicolora non sunt. hinc enim tempus 10 his tale statū non est. At in auiū genere ratione sic euenit. cum enim luteū & candidum distincta inter se sunt, principiū iam habetur, quod proficiscitur à mare. Istuc enim mas cōfert. Subuētanea igitur recipiunt generationē quoad fieri potest. perfici nanq; ad animalis usq; fœcunditatem, impossibile est. sensibus enim opus est. At uegetalem animā uirtutē obtinēt & fœmina, & omnia quæ uiuūt, ut sapius dictū est. quā ob rem hoc ouū ut plantæ cōceptus perfectus est, ut animalis imperfectus. Quod si mas in eorum genere deesset, idem sanē fieret, quod in pisciū genere, si tale genus in ijs est, quod sine mare progeneret. Dixi de his antè nondū exploratum haberi satis, nunc uero in omni auium genere, alterum mas, alterum fœmina est, itaq; fit, ut qua planta est, perficiat quod non mutetur à coitu. qua non planta, non per- 20 ficiat, nec aliud quicquam proueniat ex eo quod genuit. neq; enim ut plantæ simpliciter, neq; ut animalis per coitum prouentus est. Quæ autem ova coitu concepta, discreta iam sunt in albuminis portionem, hæc pro eo qui primum coierit, mare euadunt. iam enim utrunq; principium obtinent.

De partu mollium animantium, & ortu locustarum.

Caput VIII



Ollium etiam partus similis est, ut sepia, cæterorumq; id genus, atq; etiam crustatorum, ut locustæ, & reliquorū generis eiusdem, pariunt enim ea quoq; per coitum. & quidem sæpe mas coniunctus cum fœmina uisus est. Quam ob rem hinc etiam historice nequaquam dicere illi uidentur, qui pisces omnes fœminas esse autumant, nec per coitum parere. hæc enim oriri per coitum arbitrari, illa non, mirum est. aut si hæc ita parere illos latuit, indicium imperitiæ est. diutius hæc, quā cætera cōeunt more insectorum, ratione, sunt enim exanguia, & ob eam rem frigida natura. sepis & loliginibus ova gemina apparent, quoniam uulua earum ita articulata est, ut bifida ceratur. At polyporum ouum simplex est. causa est forma eorū uteri, quæ specie rotunda conglobataq; est. fissio enim eius iam repleti incerta est. Locustarum etiam uulua bifurca est. conceptum hæc quoque omnia imperfectum eadem de causa ædunt, locustacei generis fœminæ apud se partum exponunt. quam ob rem ampliores ipsæ, quā mares habent tabellas, ut ova seruentur, mollia foris reponunt. 40 fœminis huius generis mares aspergunt, quo modo ouis mares in genere piscium redduntur que ova eorum glutino coherentia ad speciem uua. At locustaceis tale quid fieri nec uisum est, neque ratione exigitur. conceptus enim eorum sub fœmina continetur, & crusta intectus est. Incrementum tam eorum quā mollium ova foris recipiunt, sicut piscium. adhæret ouo sapia nascens, parte sui priore, hac enim tantum potest adherere, cum hæc una partem posteriorem & priorem eodem habeat. Quænam situs dispositio sit eius cum oritur, petendum ex historiis est. de ortu cæterorum animalium, tum pedesrium, tum uolatilium, tum etiam natatiliū diximus.

De tripli

De triplici insectorum generatione.

Caput I X



E insectis atq; crustatis hoc loco dicendum est, uia & ratione qua coe-  
 primus, at primum de insectis, hæc partim coitu, partim sponte oriri di-  
 ctum iam est, item uermiculum ea parere, & quam ob causam ita pa-  
 riunt, genus hoc enim omne ferè uermiculum quodammodo parere  
 uidetur, conceptus enim qui imperfectior est, talis est. In omnibus au-  
 tem uel ijs, quæ perfectum pariunt ouum, cōceptus primus indiscretus adhuc re-  
 cipit incrementum: qualis natura etiā uermis est. mox alia conceptum suum ouo  
 perfecto ædunt, alia imperfecto, quod extra perficiatur, ut sæpe de piscibus dictum  
 est. Quæ uero intra se pariunt animal, ijs quodāmodo post primum conceptū ouis  
 forme quiddam efficitur, humor enim in mēbrana tenui continetur, perinde quasi  
 10 ouī testam detraxeris, quam ob rem deprauationes conceptuū, quæ per id tēporis  
 accidūt, fluxus uocāt. Sed insecta & uermes generant, quæ uim obtinēt generandi,  
 & quæ non per coitū, sed spōte naturæ oriūtur, ex tali origine cōsistunt. nam & eru-  
 cas genus esse uermis censendū est, & foetū araneorū, quanquā propter figuræ or-  
 biculatā speciem similia ouo, tum eorū nonnulla, tum alia cōplura primordia esse ui-  
 deātur. uerū non figura, nec mollitie, aut duritie ouum definiēdum est. Sunt enim  
 cōceptus nonnullorū duri, quāuis ouo diuersi, sed quod totum mutetur, nec ex par-  
 te eius animal gignatur, id uermis est, omne autē hoc uermiculi genus, ubi suæ ma-  
 20 gnitudinis finē receperit, quasi ouum efficitur. indurefcit enim putamen eorum, &  
 tantisper immota reddūtur, quod in uermiculis apum & uesparū, atq; etiā in erucis  
 apertū est. Cuius rei causa est, quod natura præ sua imperfectione quasi maturans  
 antē, quā tempestiuū sit ouum, pariat, tanquā hic uermis ad incrementū ouī mol-  
 lis adhuc pergat. hoc eodē modo in cæteris quoq; euenit omnibus, quæ non coitu  
 oriuntur, uel in lanis, uel alijs huiuscemodi, atq; etiā in aquis. Omnia enim post uer-  
 mis naturam motu cessant, & putamine obarescūt. mox rupto putamine exit, uel u-  
 ti ex ouo animal, tertia perfectum generatione, idq; pēnatum magna ex parte. Ra-  
 tione illud etiā euenit, quod iure multi admirentur. Erucæ enim cum primo ca-  
 30 piant cibum, mox non capiūt, sed motu cessant, quæ per id tempus aureliæ à non-  
 nullis uocātur. uesparum etiā uermiculis & apum idem accidit. pōst deinde quæ  
 nymphae appellantur, proueniūt, quæ nihil huiuscemodi habeant. Quorum enim  
 natura adepta suum finem, non insuper accrescit, sed antē augetur & alitur donec  
 distinguatur, & fiat ouum perfectum. uermium autem alijs hoc intra se habent un-  
 de excrementum ipsis nutriendis accedat, ut uermes apum, & uesparum: alijs defo-  
 ris capiunt, ut erucæ, & cæterorum nonnulli uermium. Sed quam ob rem triplicem  
 generationem hæc fortiantur, & qua de causa ex motis immota reddantur, expli-  
 catum iam est. Oriuntur eorum alia per coitum more auium & uiuiparorum, & pi-  
 scium partis plurimæ: alia sponte modo nonnullarum plantarum.

De generatione, &amp; ortu apum.

Caput X

40



Pum generatio magnā recipit ambiguitatē & quæstionē. cum enim  
 in genere pisciū talis quædā sit generatio nonnullorū, ut sine coitu ge-  
 nerent, hoc idem in apibus etiā euenire uidetur, quoad sensus ratioq;  
 apparet admoneat. aut enim aliunde portare foetum eas necesse est,  
 ut quidam uolunt, eumq; uel sponte nascentē, uel ab aliquo animali  
 æditum: aut ipsas generare: aut partim portare, partim generare. nam id quoq; ali-  
 qui dicūt, fucorumq; foetū tantum portari opinātur. Item generare eas aut per coi-  
 tum, aut sine coitu, & per coitum generare, aut singula genera per se, aut quodli-  
 40 bet unū cætera, aut aliud cum alio iunctū. uerbi gratia, apes ex apibus coeuntibus  
 inter se gigni, fucos ex fucis, reges ex regibus, aut cætera omnia ex uno, ut ex ijs, qui

reges ac duces uocantur, aut ex fucis & apibus, sunt enim qui fucos mares esse, apes foeminas arbitrentur, alij contrā, apes mares esse, fucos foeminas opinantur. Quæ omnia impossibilia sunt ratiocināti, partim ex ijs quæ apibus priuatum eueniāt, partim ex ijs quæ cū cæteris sint animalibus cōmuniora. Nā si non ipsæ pariūt, sed aliū de portant focturā, oriri apes oportet etiā sine ulla opera apū, scilicet eo loco de quo semē portetur, cur enim trās lato semine oriātur? manēte suo loco nō oriātur: prorsus oriri nihilominus cōuenit, siue spōte in floribus semen id nascitur, siue ab aliquo æditur animali, quanq̃ non apes, sed illud animal gigni oportebit, quod semē generet, ad hæc, mel portari ab apibus rationis est: cibus est enim, at foctū alienigenā deferre absurde credideris, nam, cuius rei gratia quæso? quādo omnis labor qui prolis causa suscipitur, in ea, quæ propria esse uidetur, prole uerfatur, nec uero apes foeminas esse, fucos mares ratio patitur, arma enim ad pugnā uiresq̃ exercēdas nulli foeminae à natura tribuūtur, Sunt autē fuci inermes, carent enim aculeo, Apes omnes aculeo armātur, nec cōtrā dici ratione probabili potest apes esse mares, fucos foeminas, mas enim nullus solet in prole elaborare, quod apes faciūt omnino, cum foetus fucorū gigni uideatur, etiā cum nullus est fucus, apū autē nō gigni sine regibus, & quidē ob eam rem foctū fucorū tantū portari aliqui putāt, Cōstat nō per coitū gigni uel ex alterutro genere secū coēunte, uel ex apibus & fucis, portari etiā foctū fucorum tantū cum impossibile sit, ob ea quæ modo diximus, tum ratio aspernat, ut in genere toto earū talis affectio nō eueniat, Quin etiā fieri nō potest, ut ipsæ apes partim mares, partim foeminae sint, In omnibus enim generibus mas à foemina differt, generaret etiā se ipse, At nullus earū cernitur foetus, nisi duces assint, ut aiūt, Cōmune aut argumentū tam ad agēdā uicissim generationē, q̃ ad eam quā fuci efficiāt, & siue seorsum, siue promiscue agi dicitur, quod nullū eorū coire unquā uisum est, At sæpenumero eueniret, ut coitus cerneretur, si alterū mas, alterū foemina in ijs esset, Reliquū est, ut si per coitū oriātur, reges coēuntes inter se generēt, at fuci oriri uisuntur, etiā cū nulli sunt duces, quorū foctū nec portare, neq̃ parere apes suo coitu possunt, Relinquitur itaq̃, ut quod in piscibus euenire uidemus, apes sine coitu fucos generēt, & foeminae sint, qua generāt ratione: sed habeāt in tra se ut plantæ sexū maris & foeminae, quā ob rem ijs datū est instrumētū ad pugnā, nec foemina appellādū est, in quo mas distinctus nō est, quod si in fucis id euenire uidetur, ortusq̃ eorū existit sine coitu, iam & apibus & regibus eādē seruari rationē necesse est, ut sine coitu procreetur, Cæterū si sine regibus gigni foetus apū uideretur, apes etiā sine coitu ex se generari necesse esset, sed cū hoc negēt, qui in eorū animalū cura uersantur, relinquitur, ut reges & se generēt & apes, itaq̃ cū singulari quadā peculiariq̃ natura genus sit apū, ortus quoq̃ earū peculiaris meritō esse percipitur, nā ut apes sine coitu generēt, minus propriū est, cū idē uel in alijs eueniat animalibus, ne idē procreēt genus, propriū est, rubri enim generāt rubros, & hiatule hiatulas, causa est, quod ipsæ generātur, nō ut muscæ, & reliqua id genus animalia, sed ex diuerso, tamē cognato genere prodeūt, ex ducibus enim oriūtur, quam ob rem proportio quodāmodo in eorū generatiōe seruatur, duces enim magnitudie fucis, aculeo apibus similes sunt, Apes igitur aculeo regibus assimilātur: fuci magnitudine, aliquid enim discriminis inesse necesse est, nisi semp genus ex quouis idē gigni necesse sit, qđ impossibile est, ita enim genus totū duces essent, Apes itaq̃ uiribus, & pariēdi facultate similes ducibus sunt: fuci magnitudine æmulantur, quod si aculeū quoq̃ haberēt, duces utiq̃ essent, sed nunc id ipsum ex proposita quaestione restat, & solutū iam est, quæ enim superius dicta sunt, totā hanc solūt quaestionē, duces enim nōdē similes sunt generi utriq̃, qua enim aculeū gerūt, apibus: qua magnitudine præstāt, fucis assimulantur, Sed duces etiā ipsos ex aliquo gigni necesse est, Itaq̃ cū nec ex apibus, neq̃ ex fucis creentur,



creentur, ipsos se etiam generare necesse est. Cellulæ eorū nouissimæ cōstruuntur, nec multæ numero, itaq; euenit ut duces generent & seipsos, & aliud genus, quod apum est. Apes aliud generēt, id est fucos, ipsi uero fuci nō insuper generēt, sed hoc ipsi priuētur. Cum enim semper quod secundū naturā est, ordinem habeat, ideo fucos ea quoq; facultate priuari ut aliud generēt, necesse est. & quidē ita hoc euenire uidemus, ipsi enim generātur, nihil uero aliud generāt, sed in ternario numero finē generatio recipit, atq; adeo bene institutū est à natura, ut semper hæc genera seruētur, & nullū deficiat, quanquā non omnia generēt. Ratione illud etiā euenit, ut annis prosperis copia mellis proueniat, & fucorū: imbris uero crebris foetus omnis  
 10 no superet, humor enim facit plus excrementi in corporibus ducū. Anni uero tēperies facit hoc idē in apibus, cum enim corpore sint minore, tēperie magis desiderāt. Recte etiam reges intus manēt immunes omni negotio necessario, quasi nati ad solis procreationē, magnitudine item præstāt, quasi ad prole generandā corpus eorum sit institutū, cōuenit & fucos ociosos inertesq; esse, cū nulla habeāt arma, quibus de cibo possint dimicare, cūq; pigritia tarditateq; corporis degenerēt, apes mediū inter reges & fucos tenēt, ita enim utiles ad negocia, officiosæq; operariæ esse possunt, utq; & filios alāt, & parētes, quin & sequi suos reges, ut faciūt, cōsentaneū est rationi, qua generationē apū à regibus proficisci statuimus, nā si tale quid esset, ratione carerēt ea quæ agūtur in earum imperio, atq; etiā regibus cōcedere nihil la-  
 20 boris suscipere, ut parētibus: fucos uero castigare ut filios, iustius enim filij castigantur, & quorū negotiū nullum est. Apes autē multas à ducibus ipsis paucis generant, simile uidetur leonū generationi: qui cum primū quinque numero genuerint, mox pauciores generāt, postremoq; unum, tum deinde nullum, nam & apū duces primum multitudinē generāt, mox sese paucos, atq; illarū foetum minorē, suum uero auctiorē, quod enim eorū numero natura ademerat, id magnitudini addidit. Generatio apum ita se habere uidetur, tum ratione, tum etiā ijs, quæ in earū genere euenire uisuntur, nō tamē satis adhuc explorata quæ eueniāt, habemus, quod si quādo satis cognita habebūtur, tūc sensui magis erit, quā rationi credēdum. Rationi etiā fides adhibēda est, si quæ demonstrātur, cōueniunt cum ijs quæ sensu percipiūtur, re-  
 30 bus. Apes sine coitu generare argumēto illud etiā est, quod foetus exiguus admodū in cellulis faui cernitur, cum insecta quæ per coitum oriūtur, coeant diu, pariāt breui, magnitudine ad speciem uermis. Quod ad generationē cognatorum ijs animalium pertinet, ut crabronū, uesparumq;, similis quodāmodo ratio est: sed defuit his locuples naturæ donatio meritō, nihil enim, ut apum genus, habēt diuinitatis. generant quippe matricēs uocata, primosq; fauos cōfingunt, generatione uero coeundo inter se fungūtur, uisus est enim sæpe eorum coitus, sed quomam differētis hæc genera aut inter se dissideāt, aut cum apibus, petendum est ex ijs quæ per historias explicauimus. Atq; de generatione insectorum omnium dictum iam est.

De generatione & ortu testatorum animalium, quomodoq; nonnulla plantarum generationi contigua sint: deq; testatorum incremento. Caput XI

40



Equitur ut de testatis differamus. Generatio eorū quoq; partim similis, partim dissimilis cæteris est, idq; euenit ratione, quippe cum animalium cōparatione plantis, plantarum animalibus assimilentur, ita, ut semine gigni quodāmodo uelut animalia uideātur: at alio modo non semine, & tum sponte, tum ex se: aut alia sponte, alia ex se oriri. Sed quoniā naturā proportionē plantis respōdentem hoc genus habeat, hinc testis inectum, aut nullum in terra gignitur, aut paruum: quale genus limacum est, & si quid eiusmodi aliud sit, sed rarum, at in mari, similisq; humore multa & uaria gignūtur. Genus plantarū contrā, mari locisq; huiuscemodi parū, & nullum ferē in terra

autem hæc omnia oriuntur. habēt enim naturam proportionalē atq; diffunctā. sed quāto uitalius humidū quā siccū, & aqua quā terra est, tanto natura testatorū, quā plantarū uiuacior est. nam aliās eō quidē spectāt, ut sicut plātæ ad terrā, sic testata ad humorem se habeāt, quasi plātæ ostrea terrena, ostrea plantæ aquatiles sint. hinc etiā fit, ut multiformiora sint, quæ in humore gignūtur, quā quæ in terra. humor enim naturā habet ad effingendum afformādumq; habiliore, quā terra: nec multo minus corpulentā eam, quæ potissimum in mari habētur. humor enim potulentus dulcis quidē, alumnusq; est. Sed tum minus corpulentus, tum frigidus est. quam ob rem quæ sanguine carēt, nec natura calida sunt, ea nasci in lacu non possunt: minus etiā in salis aquis, quæ sint potulētiore, gignūtur, ut testata, ut mollia, ut crustata. hæc enim omnia sanguine uacāt, & natura frigida sunt. sed stagnis marinis & iuxta amniū ostia gigni solent. quarūt enim unā teporē & alimentū. mare autem humidū multoq; corpulentius aqua potulenta est, atq; etiā sua natura calidum est, ut particeps omniū partium sit, uidelicet humoris, aeris, terræ. itaq; omnia adipiscuntur, quæ singulis his locis gignuntur. plantas enim terræ incolæ quispiā esse statuerit, aquæ aquatile animalium genus, aeris pedestre. sed quod magis, minus uē, & remotius, aut propius res constet, magna miraq; differentia existit. Quantum genus non his locis quærēdum est, quanquam aliquid esse exigit ordine ignis, id enim quartū corpus enumeratur. uerum ignis semper formā non propriam habere uidetur, sed in alio corpore. aut enim aer, aut fumus, aut terra esse uidetur quod ignis est. sed enim genus hoc apud lunam quærēdum est. hæc enim quartam illam distantiam adipisci uidetur. sed de his aliās. Natura testati generis consistit, partim sponte, partim aliqua ab ipsis emissa facultate: quanquam sapenū numero ea quoque spontanea oriuntur constitutione. Sed generationes plantarū accepisse hoc loco congruit. oriuntur enim earum aliæ semine, aliæ auulsione. nonnullæ etiā sobole, ut cape. hoc igitur tertio modo mituli gignuntur. quippe qui minores subinde iuxta principium adnascuntur. buccina & purpuræ, & quæ fauare dicuntur, quasi à feminali natura humores quosdam mucosos emittunt. semen uero nullum esse eorum putandū est, sed quo diximus modo, plantis assimilantur. quam ob rem larga eorū copia provenit, cum primū constiterit aliquid. hæc enim omnia uel sponte ut oriantur, euenit. itaq; ratione tunc magis, cum origo præcesserit, consistunt. aliquid enim excrementi singulis proficisci credendum meritō est ab eo principio, cui soboles quæq; adnascitur. Sed cum similem habeant facultatē cibis, excrementūq; cibi, fauantū substantiā similem esse cōstitutioni primæ cōsentaneū est. quapropter excremento hoc gigni probabile est. Quæ autem uel sobolem nullam procreāt, uel non fauant, eorū omniū ortus spōtūsus est. omnia uero quæ hoc modo consistunt, aut in terra, aut in aqua cum putredine gigni uisuntur, & imbre admisso. cum enim dulce in principium constituendū secernitur, quod superest, talem accipit formam. nihil autem gignitur putrescens, sed concoctū. putredo uero & putridū excrementum rei concoctæ est. nihil enim ex toto efficitur, quomodo neq; in ijs, quæ ab arte cōducuntur. Nam nisi ita esset, facere non requireretur. sed quātum inutile est, id aut à natura, aut ab arte detrahitur. Generantur autem in terra humoreq; animalia & plantæ, quoniam humor in terra, spiritus in humore, calor animalis in uniuerso inest, ita ut quodāmodo plena sint animæ omnia. Quam ob rem consistunt celeriter, cum calor ille cōprehensus siue exceptus est. cōprehenditur autē, & humoribus corporis incallescētibz efficitur uelut bulla spumosa. sed differentia nobilioris ignobilioris uē generis constituendi in comprehensione principij animalis est. huius autem rei causam, & loca habent, & corpus quod comprehenditur. In mari uero multum portionis terrenæ est. quocirca ex tali cōcretionē natura testati generis oritur, ita ut

ita ut pars terrena circiter dure scat, cogaturq; eodē modo quo ossa, & cornua (sunt enim hæc illiquabilia igne) corpus intus cōtineatur, quod uitam obtinet. unum ex his genus cochlearum coire perspectum est. sed an ortus earum per coitum sit, nec ne, nōdum exploratum satis habetur. Sed enim quæret quispiam recte, quidnam in his sit, quod secundū materiale principium consistat. nam in foeminis excrementum quoddam animalis hoc est, quod principii genitale à mare profectum mouēs potentia tale, quale id est, de quo uenit, animal efficit. At in his, quidnam hoc esse dicendum sit, & unde, & quod principii genitale secundū mare. Ponēdum igitur in animalibus generantibus calorem in animali contentū, secernendo ex cibo inge-  
10 sto, & concoquendo facere excrementum, quod conceptus principii sit. nec secus in plantis, nisi quod in ijs & quibusdā animalibus, nihilo maris principium desideratur. habēt enim hoc intra se mistum, at plurimorū animalium excrementū illo principio eget. alimentū autem alijs aqua, alijs terra, alijs quod ex ijs constet. Itaq; quod calor in animalibus cōtentus ex alimento efficit, hoc repositi calor in aëre ambiente contentus, ex mari aut terra cōcernit concoquens, atq; constituit. Quod autē comprehenditur exceptum in spiritu animali, id conceptū facit, motumq; imponit. Constitutio igitur plantarū quæ sponte oriūtur, similis est, quadā enim ex parte contrahitur, & alterū eius partis principii genitale, alterum alimentū sit primum ijs, quæ  
20 oriuntur. At uero animalia quædam uerme nascūtur, tum exanguia, quæ non ab animalibus gignuntur, tum etiam sanguinea, ut mugilum genus quoddā, & aliorū fluuiatilium piscium, ad hæc, anguillarū genus. hæc enim omnia quauis naturā parum sanguineā habeant, tamen sanguinea sunt, & cor obtinēt. quod principii sanguinariū corporis est. Quæ autē intestina terræ uocātur, uermis habēt naturam, in quibus corpus anguillarū consistit, quam ob rem de prima hominū atq; quadrupedum generatione, si quando primū terrigenæ oriebātur, ut aliqui dicunt, non temere exultima ueris altero de duobus his modo oriri, aut enim ex uerme constituto primum, aut ex ovo. quippe cum aut intra se habeāt cibum ad incrementum necesse sit, qui quidem conceptus uermis est: aut aliunde accipere, idq; aut ex parente, aut ex parte cōceptus. itaq; si alterum fieri non potest, ut affluat ex terra, quomodo cæ-  
30 teris animalibus ex parente, relinquitur necessariō, ut ex parte conceptus accipiantur. talem autem generationē esse ex ovo aut uerme fatemur. ergo si initium ullum generationis omnium animalium fuit, alterutrū de his fuisse probabile esse apertum est. sed minus rationis est, ut ex ovo prodierint. nullius enim generationem animalem uidemus, sed alterā tum sanguineorū quæ diximus: tum exanguium, quælia sunt inferiorū nonnulla, & ea quæ testa operiūtur, de quibus agitur. non enim ex parte aliqua oriūtur, ut ea, quæ ovo nascūtur. Incrementū etiam similiter, ut uermes, capeffunt. uermes enim augētur in partem superiōrē, & qua principium cōtinetur, alimentū enim superius ab inferioribus ministratur. atq; id quidem cōmune cum ijs, quæ ex ovo proueniūt, habetur: sed illa totā materiā absumunt. In ijs uero  
40 quæ ex uerme gignūtur, cum ex cōstitutione in parte inferiore contenta pars superior creuerit, mox ex reliquo alimento inferior articulatur. cuius rei causa est, quod cibus postea quoq; in parte septo subiecta cōfiscitur omnibus. incrementū autē hoc modo fieri uermium apertum in apibus, cæterisq; similibus est. principio enim partem inferiorē magnam, superiorē habent minorem. Idem augescēdi modus in testis etiam est. Quod & ipsum cōstat in genere turbinato, scilicet anfractibus eius, qui subinde accrescentes plures efficiuntur in partem priorem, quod caput uocatur, dixi ferē quemadmodū generatio, tum eorum, tum cæterorum sponte orientium agitur. omne autem genus testatū sponte institui apertū hinc est, quod nauigijs putrescente fece spumosa adnascuntur, & locis multis, ubi nihil tale aderat antē, post per

inopiam humoris facto coeno ostreae prouenerunt, ut apud Rhodum insulam, cum classis applicuisset, & fictilia proiecta essent in mare, tempore post coeno obducto testis ostreae in ijs reperiebantur. nihil autem partis genitalis emitti ab ijs argumentum est, quod cum Chij quidem ex Pyrrha Lesbi insulae ostreas uiuas portassent, & in loca quaedam maris reciproci aestus & luto similia dimisissent, plures nihilo fuere temporis spacio, quanquam incremento corporis plurimum profecerunt. Quae autem oua appellantur, nihil ad generationem conferunt, sed indicio sunt nutritionis melioris, quale in sanguineis pingue est, quam ob rem sapore per id tempus praestant, ciboque laudantur: argumento, quod & pinnae & buccina, & purpurae continent quidem semper ouum illud uocatum, sed alias maius, alias minus. sunt etiam quae non semper, sed uere id habeant, mox enim tempore procedente minuitur, demumque totum aboletur, ut peccines, mituli, ostreae. Tempus hoc enim prodest eorum corporibus. alijs nihil tale aperte uenit, ut callis. Sed singula eorum, & quibusnam oriantur locis, petere ex historia debes.

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

GENERATIONE ANIMALIVM LIBER QVARTVS, INTERP. THEODORO.

*Democritum, Empedoclem, & nonnullos alios non recte de maris & foeminae generatione sensisse.*

Caput I

20



DE GENERATIONE animalium omnium, tum uniuersum, tum singulatim dictum iam est. Sed cum in eorum perfectissimis mas & foemina distincte habeantur, easque facultates omnium animalium & plantarum esse principia fateamur, quamquam in alijs discretas, in alijs indiscretas, differendum hic est primo de eorum ipsorum generatione, imperfectis enim adhuc suo in genere distinguitur sexus maris & foeminae. Sed utrum prius etiam, quam haec differentia sensu nostro percipi possit, alterum mas, alterum foemina sit, discrimine facto in utero, an post, ambigitur. Alij enim protinus in seminibus hanc esse contrarietatem aiunt, ut Anaxagoras, & alij naturales auctores. etenim semen gigni ex mare, foeminam autem locum praebere, mare a parte dextra, foeminam sinistra proficisci: & uteri latere dextro marem contineri, foeminam sinistro. Alij uero id ascribunt, ut Empedocles. Quae enim uterum subierint calidum, haec effici mares arbitratur: quae frigidum, foeminas. caliditatis uero frigiditatis uel causam esse confluuium menstruorum, quod frigidius uel calidius sit, & aut antiquius, aut recentius. Democritus Abderites differentiam maris ac foeminae fieri quidem in matre ait, sed non caliditate frigiditate uel, alterum effici marem, alterum foeminam: sed utrius tandem semen euicerit, quod ab ea prodisset parte, qua mas & foemina inter se differunt, hoc enim Empedocles profectio negligenter opinatus est, ut caliditate frigiditateque tantum differre haec inter se existimaret, cum partes ipsas genitales, & uterum magnam habere differentiam cerneret, nam si postea, quam formata sunt animalia, alterum partibus foeminae omnibus, alterum maris constitutum, mox in utero tanquam fornace ponantur, quod uterum habet, in calido, quod non habet, in frigido: erit foemina quod utero caret, mas quod uterum habet. quae res impossibilis est. itaque eatenus quidem melius a Democrito dicitur. Quae res enim ille differentiam huius generationis, & reddere conatur: sed an bene, nec ne, id aliud pertinet, tum etiam si caliditas & frigiditas causae sint, ut partes haec disse-

hæ differant, hoc explicare debuerunt, qui ita uolunt, hoc enim ferè est docere de generatione maris ac foemina. his enim partibus planè differunt. nec parum negotij est, causam generationis earum partium ab illo principio ducere, cum necesse sit ita sequi, ut si animal refrigeratur, pars efficiatur ea, quam uterum appellamus: si calefcit, non hæc efficiatur, eodemq; modo de ijs partibus quæ ad coitum accommodantur, nam eæ differunt inter se, ut antè expositum est. Ad hæc, sæpenumero euenit, ut eadem in parte uteri gemini mas & foemina generètur, idq; satis inspeximus in dissectionibus animalium uiuiparorum, tum pedestrium, tum etiam piscium. Quæ si non ille conspexerat, meritò errabat, cum eam afferret causam. sed si cum hæc explorata habuisset, ita sensit, absurdum sanè est quod insuper putarit causam uteri esse caliditatem aut frigiditatē, ambo enim semper aut mares aut foeminae efficerètur, quod non ita euenire uidemus. Item cum partes eius quod gignitur, discerpas esse fateatur (partim enim in mare, partim in foemina esse putat, ideoq; alterū coire cum altero concupiscere) magnitudinem earum quoque partium esse diuisam, uelleq; coniungi necesse est, non refrigeratione calefactione uel ita institui, sed feminis huiusmodi causæ complura fortasse obijci possunt, modus enim hic causæ figmento similis est omnino, cæterum si ratio feminis ita se habet, ut explicatum à nobis est, & neque ex omni corporis parte decedit, neque materiam ullam ijs, quæ gignitur, præbet, quod proficiscitur à mare, tam & ei, & Democrito, & si quis alius ita censet, occurrèdum simili modo est, nec enim discerptum esse potest feminis corpus, ut partim in foemina sit, partim in mare, ut Empedocles censet, cum dicat: Sed discerpta gerunt, mas ipse, & foemina membra: neque totum ipsum ex utroq; decedens, quia pars aliqua partem aliam uicerit, ideo efficitur mas aut foemina, quam omnino melius partis exuperantia foeminam aut marem effici dixerit, quam per incuriam calori aut frigori tantum causam tribuat, sed cur formam etiam genitalis diuersam esse unà eueniat, causa reddenda est, ut hæc semper uicissim consequantur, nam si quoniam iuxta sunt, ita sit, reliquæ etiam quæque partes consequi debuerunt, sunt enim inter eas quæ superant, aliæ alijs propinquæ, itaque simul & foemina esset & matri simile, aut mas & simile patri, absurdū etiam tantum eas effici partes oportere, nec totum corpus mutari existimare, & præcipue, primoq; uenas, quibus ueluti descriptione deductis, corpus adiacet carniū, quas suam recipere qualitatem propter uterum, nulla probabili ratione dici potest: sed potius uterum propter eas suam recipere qualitatem ratio est, quanquam enim utrunque sanguinis conceptaculum est, tamen uenæ sunt prius, principiu autem mouens prius esse semper, & causam generationis aliqua sui qualitate necesse est. Accidit igitur differentia earum partium inter se foemina & mari, nec id esse principium, neque causam esse hanc arbitrandum, sed aliam, etiam si nullum semen uel à mare, uel à foemina decedit, sed quolibet modo consistit, quod gignitur. Quin etiam contra eos, qui marem à dextra, foeminā à læua parte proficisci aiunt, eadem ratio sufficit, quæ contra Empedoclem & Democritum, siue enim nulla materia à mare affertur, siue aliqua affertur, ut uolunt, nihil dicunt qui ita censent, necnon Empedoclis sententiæ pari ratione occurrèdum est, qui marem à foemina distinguit caliditate uteri, & frigiditate, quod illi etiam faciunt, qui dextris sinistrisq; rationem describunt, quam uideant marem & foeminam inter se differre, & parte & toto, sed cur sinistris corpus uteri adiungatur, dextris nequaquam? nam si foetus eo uenerit, nec eam ipsam habuerit partem, foemina erit sine utero, & mas erit cum utero, si ita fors tulerit. Item, ut antè retulimus, & foemina parte uteri dextra contineri uisa est, & mas læua, & ambo eadem in parte, idq; non semel sed sæpius, quam aut mas in dextra, aut foemina in læua, nec minus ambo in dextra gignuntur, atq; etiam cum gemini,

mas & foemina gestarentur, marem in laeva, foeminam in dextra contineri perspectum est. Proxime quia aliqui persuasi dicunt teste praeligato dextro aut sinistro euenire per coitum, ut mas aut foemina generetur. sic enim & Leophanes dicebat. tum etiam ex ceteris alterum testem hoc idem accidere quidam aiunt non uere: sed rem coniectantur futuram ex consentaneis, atque anticipant, quasi ita sit, priusquam ita fieri uideant. ignorant etiam nihil ad generationem maris aut foeminae conferri ab ijs partibus, cuius rei indicium, quod multa animalia & ipsa mares ac foeminae sunt, & generant partim foeminas, partim mares, cum tamen testes non habeant: uelut ea quae pedibus carent. uerbi gratia, genus piscium, & serpentum. causam uero maris & foeminae caliditatem frigiditatemue arbitrari, secernique de dextris aut de sinistris, non sine ulla ratione dici potest. Sunt enim partes corporis dextrae calidiores sinistris, & semen concoctum calidius est, quale id, quod spissum est, foecundius autem quod spissius est. sed ualde a longe tangitur causa, cum ita assertur. Accedendum autem semper ad rei causas primas, quoad maxime fieri potest, propius. de corpore igitur toto, & de paribus, quid quaque sit, & qua de causa, iam ante explicatum alibi est. Sed cum mas & foemina potentia quadam & impotentia definiantur (quod enim potest concoquere, & constituere, & secernere semen, atque principium obtinet formae, id mas est. Principium autem non hoc dico, ex quo, ut materia, tale gignitur, quale quod generat, est: sed id quod primum moueat, siue in seipso, siue in altero possit hoc facere. quod autem recipit, nec potest constituere & secernere, id foemina est. Item si omnis concoctio calore efficitur, mares quam foeminas esse calidiores necesse est. ob frigiditatem enim & impotentiam foemina sanguine abundat quibusdam sui corporis locis. idque indicium facit contra quam aliqui afferunt causam, cum foeminam esse mare calidiorum opinentur, ob menstruorum emissionem. sanguis enim calidus est, & quod plus sanguinis habet, hoc calidius est. putant autem hunc affectum moueri abundantia sanguinis & caloris, quasi aequae quoduis sanguis esse possit, modo humidum sit, & colore cruentum: nec ita eueniat, ut minus sanguinis, & syncerius fiat in corpore alimentum melioris & habitus. sed illi perinde ac excrementum alui, quod plurius sit, hoc indicium esse naturae calidioris magis, quam quod minus, existimant. Atqui contra omnino est. ut enim in fructibus conficiendis ex copia primi alimentum parum secernitur, quod utile sit, demumque nulla pars remanet respectu copiae primae: sic in corpore animalis, postquam partes per successionem alimentum conficiendum receperunt, ad postremum parum admodum remanet ex toto alimentum, quod in alijs sanguis, in alijs proportionale sanguinis est. Sed cum alterum potest, alterum non potest secernere excrementum syncerum, omnisque facultas instrumentum aliquod sibi accommodatum habet, & quae melius, & quae deterius idem efficiat: foemina autem & mas, cum multifaria uerba haec, posse, & non posse, dicantur, modo praedicto sibi opponantur, instrumentum ob eam rem tum foeminae, tum mari tribui necesse est. itaque alteri uterus, alteri coles datus est. Natura autem simul & facultate cuius dat, & instrumentum. sic enim melius est. quam ob rem singula loca una cum singulis excrementis & facultatibus sibi accommodatis instituuntur. atque ut nec uisus sine oculis, neque oculus sine uisu perficitur, sic & alius & uesica simul atque excrementa fieri possunt, conditur. Sed cum idem sit ex quo generentur, & augeantur, idque sit alimentum, pars corporis quaque ex tali materia, talique excremento qualis est capax conficitur, & fiet. Gignitur item ex contrario quodammodo unumquodque, ut nos censeamus. Ad haec, tertium illud sumendum est, ut quoniam omnis delatio in contrarium est, quod non ab eo superatur, a quo conditur, siue creatur, id in contrarium mutari necesse sit. his ita subiectis apertius fortasse iam fuerit, qua de causa alterum mas, alterum foemina fiat. Cum enim principium non superat, neque concoquere potest propter

uterus,  
coles.

quod, delatio.  
quod, corruptio.

propter caloris inopiam, neq; ducit in suam formam, sed tantisper superatur, mutari in contrarium necesse est. contrariū autem maris foemina est, uidelicet qua alterum mas, alterū foemina est. Et cum facultatis siue uirtutis differentiā habeat, instrumentum quoq; habet auersum. itaq; in tale mutatur. parte autē aliqua opportuna mutata, cōstitutio tota animalis multo discrepat forma. licet hoc perspicere in spadonibus, qui una parte truncati tam à pristina forma discedūt, parumq; à foemina specie distant. cuius rei causa est, quod partes nonnullae principia sunt. principio autem mutato, multa ex his quae sequuntur, commutari & dimoueri necesse est. quod si mas principium quoddam & causa est, masq; est qua aliquid potest, foemina uero qua non potest, potentiae autē & impotentiae ratio sic describenda est, ut facultas aut assit aut desit concoquendi ultimi alimenti, quod in sanguineis sanguis appellatur, in exanguibus proportionale, eiusq; causa in principio & parte quae originē naturalis caloris continet, sita est, cor profectio in sanguineis cōstitui, & aut marem aut foeminam fieri quod gignitur necesse est. in ceteris uero generibus mas & foemina est, quod proportionale cordis habeat. origo & causa foeminae & maris haec, & in hoc est. Foemina autem & mas iam est, cum partes etiā habent quibus foemina differat à mare, non enim quauis parte mas aut foemina est, quomodo nec uidens nec audiens. sed repetendo dicimus. Item semen excrementū esse ultimum alimenti positum est. ultimum autē id intelligi uolo, quod in unamquamq; partem feratur, quam ob rem quod generatū est, simile ei quod generauit, est. Nihil enim refert ab unaquamq; parte proficiscatur, an ad unamquamq; accedat, sed rectius ita. Maris autē semen differt, quod principium in se continet tale, quo moueat, & alimentum in animali ultimum concoquat; foeminae semen materiam tantū praeber, quoties igitur semen superat maris, ad se ducit. cum superatum est, in contrarium demutatur, hoc est, in corruptionem. contrarium autē maris foemina est. foemina cruditate frigiditateq; sanguinei alimenti describitur. natura uero excremento cuiq; dat conceptaculum. semen autē excrementū est, quod in calidioribus atq; maribus sanguinei generis contractus est. quapropter membra capientia eius excrementi meatus in maribus sunt. at foeminis praecruditate copia redūdat sanguinea. inconceptus enim in coctusq; sanguis est. itaq; conceptaculum eius haberi necesse est, idq; dissimile esse, & amplius. quocirca natura uteri talis est, qua parte foemina differt à mare. Expofui causam quam ob rem alterū mas, alterū foemina generetur.

*Indicia, quibus maris à foemina generatione generatio discernatur.*

*Caput II*



Indicia uero faciunt res, quae accidunt. nouella enim, & senescēs aetas magis, quam florens foeminas generat. in altera enim calor nondum perfectus est, in altera deficit. humidiora etiam, effoeminatioraq; corpora foeminam potius gignūt. & semina humida magis, quam spissa hoc idem faciunt. haec enim omnia eueniunt caloris inopia naturalis. Flatribus item aquilonijs magis, quam austrinis mares gignuntur. fit etiam ut excrementis eiusmodi corpora abundent. plus autē excrementi concoctū difficilius est. quam ob rem maribus semen, mulieribus menstrua decedūt humidiora. Tum etiā ut menstrua secundū naturam mēsis decrescētibus potius fiant, eadem de causa accidit. tempus enim hoc mēsis frigidius est, & humidius, propter lunae decrementum, defectionemq;. Sol enim per totū annum hyemem, atq; aestatem facit: at luna per mensem id agit, quod ita fit, non accessu discessuq; lunae, sed alterū in crescente luce, alterum decrescēte. Necnon pastores aiunt interesse ad maris ac foeminae peroris foeturam, nō solum si ita accidit, ut inritus aquilonijs, austrinis ue flatribus fiat, sed etiam si, cum pecus coit, spectat ad aquilonem aut austrū. Ita minimo interdum

momento causa datur caliditatis aut frigiditatis. hæc uero causam complent generationis. Dissident omnino inter se mas & foemina, ob eas quas diximus causas, ad maris aut foeminæ generationem. sed moderatione, quæ intercedat, opus est. nam omnia quæ uel natura uel arte efficiuntur, ratione aliqua sunt. Calor autem si ualde superat, exiccat humorem: si multum deficit, non cõcernit. sed medijs ratione ad rem condendam seruari requiritur. alioquin, ut in ijs quæ igne coquuntur, plus ignis deurit, minus non coquit, ac euenit utrinque, ne quod agitur perficiatur: sic in coitu maris & foeminæ moderatione opus est. hinc multis tum maribus, tum foeminis euenit, ut cõiuncti inter se nequeant generare, disiuncti queant: & aut minoribus natu, aut maioribus hæc contrarietates existant, æque in generatione, sterilitateque, 10 & maris foeminæque procreatione. Quin & inter terras & aquas interest eisdem de causis. qualitatē enim quandā potissimum recipit & alimentum, & dispositio corporis ex temperamento aëris cõtinētis, & cibi ingreditis: sed præcipue ex alimonia aquæ. huius enim usus plurimus est, atque in omnibus aqua alimento est, etiā siccis. Quam ob rem aquæ crudæ & frigidæ, aut sterilitatem, aut partum foemineum faciunt.

*Cause ob quas nati, uel parentibus, uel alijs sint aut similes, aut dissimiles. Caput III*



Aedem causæ sunt, & ut alij parentibus similes generentur, alij dissimiles, & alij patri, alij matri, tum corpore toto, tum uero partibus singulis, & parentibus magis, quàm maioribus suis, & ijs potius, quàm 20 quibuslibet, ac mares potius patri, foeminæ matri, alij nulli consanguineo similes, sed tamen homini similes, alij ne homini quidem, sed iam monstro. Qui enim suis parētibz similis nō est, monstrum quodammodo est. discessit enim in eo quodammodo natura ex proprio genere, cœpitque degenerare. sed initium primū degenerandi est foeminam generari, non marem. uerum hoc necessarium est naturæ. Genus enim seruari oportet eorum, quæ foemina & mare distinguuntur. Sed cum fieri possit, ne aliquando semen superet maris, aut ob ætatem iuuenilem, senilem uel, aut ob aliam eiusmodi causam, foeminā ob eam rem gigni necesse est. at monstrum gigni non necesse est, scilicet ad causam cuius gratia, & finem, quanquam per accidens necesse est. nam principium hinc sumatur oportet: 30 quoties enim excrementum seminale bene concoctum in menstruis est, motus maris agit pro sua forma. nihil enim refert genitura dicatur, an motus, id quod partem corporis unamquancque augeat. nec interest augentem motum, an principio instituentem placeat appellare. eadem namque ratio motus est. itaque si superat, faciet marem non foeminam, & similem ei qui generat, non matri. sed si non superat, pro ea qua non superarit facultate, defectum faciet. facultatem autē hoc modo intelligi uolo. quod generat non solum mas est, sed etiā talis mas, ut Coriscus, aut Socrates. nec modo Coriscus est, uerum etiā homo, ad hunc modum, alia propius, alia remotius insunt in eo quod generat, uidelicet, qua genitale est, non per accidens. uerbi gratia, si grammaticus aut uicinus cuiusquam, qui generat, est. Valet autē semper in ge- 40 nerando magis, quod proprium & particulare est. Coriscus enim & homo, & animal est: sed propius à proprio distat homo, quàm animal, generat autem & quod particulare est, & quod genus est: sed magis quod particulare. hoc enim substantia est. Quod enim gignitur, & si quale quid est, tamen hoc quicquam est, idque substantia est. quam ob rem ex facultatibus insunt in feminibus eiusmodi omnium motus. maiorum etiā propria in nepotum semine insunt potentia: sed propinquius semper quod particulare est. particulare Coriscum dico, & Socratem. sed cum omne quod mutatur nō in quodlibet, uerum in sibi oppositum transeat, ideo & quod in generatione nō superatur, transeat in oppositum necesse est, pro ea facultate qua non



non superarit, quod generat, moueatq̃. quod si qua est mas, nō potuit, fœmina gignitur, sed si qua est Coriscus aut Socrates, non patri, sed matri simile gignitur. ut enim omnino patri, mater opponitur, sic singulis generantibus singulæ generantes opponuntur: similiq̃ modo in sequentibus facultatibus agitur. semper enim in sequentem & proximum maiorum potius transitur, tam in patre, quàm in matre. Insunt autem motus alij actu, alij potentia. actu insunt motus eius qui generat, & uniuersalium, ut hominis, ut animalis. potētia insunt motus fœminæ, & maiorum tam in patre, quàm in matre. mutatur igitur transfigens in opposita. motus autem qui creant, soluantur in propinquos. uerbi gratia, motus eius qui generat si soluitur, primum differentia minima in motū patris transibit, mox in aui, atq̃ deinceps ad hunc modum in cæteros similes. In fœminis quoq̃ trāsitus fit, motus enim concipientis in motum soluitur matris: si non in eum, in auiæ: eodemq̃ modo in superiores. sed potissimum ita natura fert, ut qua mas, & qua parer est, simul & superet, & superetur. parum enim discriminis est, itaque ut simul utrunq̃ eueniat, nequaquam difficile est. Socrates enim uir talis quis est, quam ob rem mares magna ex parte similes patri existunt, fœminæ matri, simul enim in utrunq̃ disceditur. opponitur autem fœmina mari, mater patri: discessusq̃ in opposita fit. sed si motus qui à mare est, superarit, qui uero à Socrate est, non superarit: aut hic superarit, ille nō, ita euenit, ut mares similes matri, fœminæ similes patri generentur. Item si motus soluantur, & qua mas est seruetur, Socratis autem soluantur in patris, mas erit auo similis, aut alicui cæterorum superiorum maiorum, prout solutio tetenderit. Sed si qua est mas superetur, fœmina erit similis potissimum matri, si autē & hic soluantur motus, matri assimilabitur matris, aut alicui superiorum pari ratione. Idem modus partū quoq̃ est. sæpe enim aliæ patri similes, aliæ matri, aliæ maiorū alicui similes constituuntur. insunt enim & partium motus, alij actu, alij potentia, ut sæpius diximus. omnino subiiciēda sunt tria illa, unum quod modo dixi, motus inesse, alios potētia, alios actu. alterum, degenerare in oppositum, quod superatur. tertium, transire in motum proximū id, quod soluitur. & si minus soluitur, in propinquum: si magis, in remotiorem discedere. demumq̃ ita confundi, ut nemini suorum similes prodeat, sed cōmune tantū relinquatur, ut homo sit. cuius rei causa est, quod commune particularia consequitur omnia. homo enim uniuersale est: Socrates parer, & quæcunq̃ est mater, particulare est. causa ut motus soluantur est, quod omne agens patitur etiam à patiente. ut quod secat, hebetatur ab eo quod secatur: quod calefacit, refrigeratur à calefcente. deniq̃ quodcunq̃ mouet, excepto primo, mutuo mouetur aliquo motu. uerbi gratia, quod pellit, pellitur quodammodo: quod premit, reprimitur. Interdum etiam ita fit, ut quod agit magis patiatur, quàm agat, & refrigeret quod calefacit, calefaciat quod frigefacit, cum aut nihil fecerit, aut minus quàm ipsum affectum est. dixi de ijs, cum de ratione agendi patiendiq̃ docerem: uidelicet quibus in rebus inesset agere & pati. Degenerat autem quod patitur nec superatur, aut defectu facultatis eius quod coquit & mouet, aut copia frigiditatisq̃ eius, quod concoquitur & distinguitur. Cum enim partim superet, partim non superet, facit multiforme quod constituitur: ut athletarum nonnullis per usum cibi nimium accidit. Cum enim per copiam pastus natura nequeat superare, ut proportionem augeat, formamq̃ seruet eandem, diuersæ efficiuntur partes, & adeo interdū, ut nihilo fere similes primis euadant. proximum huic est morbus quem satyrnā appellamus. etenim in eo præabundantia fluxionis, aut status crudi in partes faciei decumbentis, facies animalis diuersi & satyri apparet. Sed quam ob causam mares & fœminæ generentur, & alij parētibz similes, fœminæ fœminis, mares maribus, alij è diuerso, fœminæ patri, mares matri, deniq̃ alij maioribus suis similes, alij suo-

rum nemini similes existāt, idēq; tum corpore toto, tum partibus singulis, de ijs in-  
 quam omnibus dictum iam est. Sentētiā autē aliorum etiam naturā interpretum  
 sunt de ijs rebus, scilicet quam ob rem similes parentibus generētur. Afferunt illi  
 duplicem modum rationis. nonnulli enim ita cēsent, ut ab utrovis plus feminis ue-  
 nerit, ei similis magis generetur, æque toti totum, & parti pars, quasi ex unaquaq;  
 parte semen decedat: sed si par de utroq; uenerit, similis neutri procreetur, quod iī  
 falsum est, nec omni ex parte decedit, cōstat nec similitudinis & dissimilitudinis cau-  
 sam id esse, quod referūt. Tum etiā quemadmodū simul & fœmina sit & patri simi-  
 lis, aut mas & similis matri, non facile explanare possunt. Qui enim, ut Empedo-  
 cles aut Democritus, causam de mare & fœmina reddunt, impossibilia modo alio  
 dicūt, sed qui quod plus minus ue ā mare, aut ā fœmina secesserit, alterum marem,  
 alterum fœminam gigni causantur, ij nequeunt explicare quemadmodū fœmina  
 patri similis, mas similis matri reddat, simul enim plus de utroq; uenire impossibile  
 est. Ad hæc, cur similes maioribus suis magna ex parte, remotisq; generētur, cum  
 nihil feminis ab illis secesserit, nihil profectio isti quod bene tueantur habēt, sed qui  
 reliquum similitudinis modum afferunt, ij tum cætera, tum uero hoc melius dicūt.  
 Sunt enim qui semen genitale dicant quamuis unum, tamen ueluti omnifariam  
 quandam esse multorum seminum missionem. Itaq; ut si quis multa saporum ge-  
 nera in eodem humore miscuerit, moxq; inde sumat, possitq; sumere semper non  
 tantundem ex unoquoq;, sed modo huius, modo illius plus, aliās etiam ex hoc su-  
 mat, ex illo nihil sumat: sic in semine genitali esse, cum ex multis ac uarijs missum  
 sit, ā quocunq; enim gignente accesserit plurimum, ei similem forma generari, sed  
 hæc ratio nec plana est, & passim fictitia est. uult hæc non actū, sed potentia inesse,  
 quam omnifariam seminis commissionem appellat. & quidem ita dici melius est,  
 illo enim modo impossibile est, hoc possibile est. Verum qui ita causam reddunt,  
 nullo modo rationem afferre de omnibus facile poterunt, cur fœmina, cur mas gi-  
 gnatur, quam ob rem sæpenumero fœmina patri similis, mas matri proueniat, at-  
 que etiā de maiorum similitudine, ad hæc, qua de causa interdum homo quidem,  
 sed nulli suorum similis generetur, aliās usque adeo procedendo degeneret, ut de-  
 mum ne homo quidem, sed animal tantū aliquod existat, quæ monstra dicuntur.  
 Proximū enim ab ijs, quæ iam explicauimus, est, ut causas de monstris reddamus.  
 ad extremū enim, cum motus soluantur, & materia non superetur, remanet quod  
 maxime est uniuersale, id est animal. Iam puerum ortum capite arietis, aut bouis  
 referunt, idemq; in cæteris membrum nominant animalis diuersi, uitulū capite  
 pueri, & ouem capite bouis natam asseuerant. Quæ omnia accidunt quidem cau-  
 sis supradictis, sed nihil ex ijs quæ nominant, est, quamuis similitudo quædam ge-  
 neratur, quod euenit etiam non in monstrum peruersis, quam ob rem sæpenume-  
 ro per conuiuium nonnulli deformes assimilantur, aut capræ ignem efflanti, aut  
 arietī peculeo. physiognomon quidam omnes ad duorum aut trium animalium  
 formas redigebat, & dicendo plerunq; persuadebat. Sed enim impossibile esse, ut  
 tale monstrum gignatur, id est alterum in altero animal, tempora ipsa grauiditatis  
 declarant, quæ plurimum discrepant in homine & cane, & in oue & boue, nasci  
 autem nullum nisi suo tempore potest, partim igitur hoc modo dicuntur monstra,  
 partim quod forma prodeant multimembri, scilicet multis pedibus, aut multis ca-  
 pitibus. sed profectio rationes monstrorum, & oblætorum animalium propinquæ,  
 & similes inter se quodammodo sunt, monstrum enim oblætio quædam est.

*Alij petulco,  
 sed antiquus in  
 terpres habet  
 porco præco-  
 nizanti.*

*Quas ob causas monstrosa animalia generentur, & quare alijs unifer, alijs paucifer,  
 alijs multiplex sit partus.*

Caput IIII

Demo



Emocritus uero mōstra fieri ea causa scribit, quod duo subeūt femina, alterum antē, alterū postea: quā cum in utero cōfundantur, euenit, ut membra coalescāt atq; dissideāt. Auibus uero quoniā coitus agitur crebro, idcirco semper & oua, & colorē euariare autumat. Sed si ita sit, ut ex uno semine, eodemq; coitu plura generentur, quod patet, prāstat non circūire uia omīssa breui & facili. ijs enim tum maxime id accidere necesse est, cum semina nō distinguūtur, sed simul subeūt. quod si femini maris causa tribuēda est, hoc modo dicendū sit. Sed enim ex toto potius causam in materia, cōstituēdisq; conceptibus esse censendū est. quam ob rem mōstra eiūsmodi raro admodū fiunt  
 10 in ijs, quā singulos pariūt. sed crebrius in ijs, quorū partus est numerosus, & prāci-  
 pue in auīū genere, earumq; potissimū in gallinis. ijs enim partus numerosus, non modo quod saepe pariant, ut columbā, uerumetia quod multos simul conceptus intra se continent, & temporibus omnibus cōeunt. hinc gemina etiā pariūt plura. cohāret enim cōceptus, quoniā in propinquo alter alteri est, quomodo interdū fructus arborū complures. quod si uitella distinguūtur mēbrana, gemini pulli discreti sine ulla superuacua parte generātur. sed si uitella continuātur, nec ulla interiecta membrana determinant, pulli ex ijs mōstrifici prodeūt, corpore & capite uno, crucibus quaternis, alis totidē, quoniā superiora ex albumine generētur, & prius (ut  
 20 tellū enim cibo ijs est) pars autē inferior postea instituitur, quanq; cibus idem, indi-  
 scretusq; suppeditat. iam serpens etiā biceps uisus est, uidelicet eadē de causa. nā id quocq; genus oua parit, & multa numero. sed rarius in eo mōstri institutio euenit, propter uteri formā. porrecta enim in uersum copia ouorū cōtinetur pro uteri longitudine. nec uero in genere apum aut uespārū, tale quid accidit. Cellulis enim discretis partus earum cōtinetur. At in gallinis ecōtrario fit. Vnde apertū est causam euentorū huiūsmodi in materia esse putare oportere. ut enim in ijs, quā plura pa-  
 30 riunt, magis sic in ijs quā pauciora, minus id accidit. quocirca homīni minus. singu-  
 larem enim perfectūq; parit. nā & homīni locis, quibus mulieres perfectundae sunt, magis id euenit, ut in terra Aegypto. capris uero & ouibus magis, ut fecundioribus accidit. atq; etiā magis multitudine. multipara enim id genus animalia sunt, nec  
 40 partum perficiūt, ut canis. cācos enim magna eorū pars solet parere. quod quam ob causam accidit, & quam ob rem pariant multos, postea explicabimus. sed enim hāc propēsiō iam sunt suapte natura ad monstrificā partionē, quando nō similes sibi generāt, sed imperfectos. nam & monstrum quid dissimile est. quam ob rem ijs quorū talis natura est, facilius casus hic obuenit. in ijs enim potissimū, & quā metachocra appellātur, cōsistunt. quā aliquatenus labe monstrifica sunt affecta. nam deesse, aut superesse quicq;, monstruosum est. monstruosum est enim res prāter naturā. sed prāter eā, quā magna ex parte sit. nā prāter eam quā semper & necessa-  
 riū est, nihil sit. uerū in rebus ijs quā magna quidē ex parte ita fiunt, sed aliter etiā possunt fieri, euenit, quod prāter naturā consistat. nā & inter eas ipsas, quibus acci-  
 40 dit quidē prāter hunc ordinē, sed nunq; quolibet modo, minus monstrum esse ui-  
 detur. quoniā quod prāter naturā sit, idem etiā secundū naturā quodāmodo est. cum naturā materiā, natura formā nō superat. quā ob rem nec ea mōstri nomine appellātur, neq; ubi fieri aliquid solet, ut in fructibus. Vitis enim quādā est, quam aliqui capneum uocāt, quā cum uuā albā soleat ferre, si nigrā tulit, monstrū id esse non putant, quoniā sapissime id facere ea soleat. causa est, quod sua natura inter albam & nigrā est. itaq; nō longe disceditur, nec prāter naturā ferē. non enim in aliā naturam transitur. At in ijs quā pariūt plura, tum ea ipsa eueniūt, tum uero copia partus impedit alter alterius perfectionē, & causam genitālē, de partu numeroso, paucifero, & singulāri, atq; etiā de ijs paribus, quā aut super sunt aut defunt, quā

ῥῆσιν αὖτις  
caprae hircinae

stio existere potest. Gignuntur enim interdum alia pluribus, quam iustum sit digitis: alia uno tantum. eodemque modo in ceteris partibus, aut excedunt, aut deficiunt. nonnulla etiam duplici genitali, altero maris, altero foeminae nascuntur. & in genere quidem hominum, sed maxime in caprarum, gignuntur enim quas uocant hircinas, propterea quod simul genitale habent & maris, & foeminae. Iam & cornu gerens in crure capra conspecta est. Partibus etiam internis mutationes detrimenta quoque accidunt, ut uel careant aliis quibus, uel habeant minuta, & laesa, uel plura numero, uel non suis posita locis. Sed corde carere nullum unquam animal ortum est: quandoque liene carere, & duplicem habere lienem, & altero uacans rene, uisum est. Iecore etiam carere toto nullum notatum est: quandoque quod non totum haberet, iam paruit. haec autem in perfectis uiuisque reperiuntur. felle item priuata prodierunt, cum sua natura habere deberent. alia contra plura habuerunt. Iam locis etiam permutatis iecur latere sinistro, lien dextro contineri uisum est. haec, ut modo dixi, in animalibus iam perfectis explorata sunt, in nascentibus autem uarie perturbantur. Quae si parum de sua natura discedunt, uiuere solent: si plus, uiuere nequeunt, uidelicet cum quod praeter naturam est, partibus uiuendi principalibus accidit. modus uero considerandi de his est, utrum eandem causam putare oporteat partus singularis, & partium defectus: itemque partus numerosi, & partium excessus, an non eandem. Primum igitur quod alia pariatur multa, alia unum, merito quispiam miretur. Quae enim maxima inter animalia sunt, ea singulos pariunt: ut elephas, camelus, equus, & reliquae solipedes. quae partium maiora ceteris sunt, partium longe magnitudine superant. Canis uero & lupus & reliqua multifida omnia ferere pariunt multa: atque etiam parua eiusdem generis, ut mures, bisulca pauca generant, praeterque suos. haec enim inter multipara est enumeranda. Ratio enim probabilis est, ut maiora animalia plura generare, plusque afferre seminis possint. Sed certe id ipsum quod admirari facit, causa est, ne admiremur. facit enim eorum magnitudo, ne multa pariatur. tibus enim in istis absumitur in corporis incrementum. minoribus uero natura demendo de magnitudine, auget in excremento seminali exuperantiam. Item plus seminis genitalis esse, quod maioris est animalis, minus autem quod minoris, necesse est. At multa effici parua in eodem possunt, multa magna effici diffi- cile est. mediocribus uero magnitudinis medium a natura datum est. Sed quam ob rem animalium alia maiora sunt, alia minora, alia mediocria, causam ante reddidimus. Sunt autem alia unipara, alia paucipara, alia multipara. & magna ex parte unipara sunt quae solipeda, paucipara quae bisulca, multipara quae multifida. cuius rei causa est, quod magna ex parte magnitudines corporis istis differentijs distinguuntur. tamen non ita in omnibus est. magnitudo enim & paruitudo corporis causam habent partus amplioris, & parioris, non solipedis aut multifidi, aut bisulci generis ratio. cuius rei testimonium est, quod elephas animalium maximus, idemque multifidus est. camelus bisulcus est, quod maximus inter reliqua est, nec solus in pedestri genere, sed etiam in uolatilium, & narium magna parum foecunda sunt, parua uero perquam foecunda eadem de causa. plantae etiam non quae maximae sunt plurimum afferunt fructus. diximus quae ob rem alia parere multa, alia pauca sua natura assolent. Sed huius quaestio- nis illud maxime quis miretur in istis quae pariunt multa, quod plerumque uno initu animalia id genus impleri cernit. Semen autem maris, siue ad materiam confert, se adhibens partem conceptus, & miscens cum semine foeminae, siue non eo modo, sed ut nos censemus, cogit, conditque materiam contentam in utero, foeminaeque foeminae excrementum, ut succus lactis humoris spissat, cur tandem non unum efficit animal incrementi maioris? ut succus in lacte non certa quantitate ad cogendum describitur, sed quo plus lactis plus succi subierit, eo plus colostri concreuit. semen igitur trahi a locis uteri, atque ob eam rem multa generari pro numero locorum & acetabulorum, quae unum non sunt, opinari nihil rationis est. saepe enim eodem in loco uteri gemini consistunt, in genere etiam multiparo, cum plenus foetus uterus fuerit, deinceps alius ab alio iacere cernuntur. quod

quod ex dissectionibus pater, sed ut perficiendi cuiusq; animalis certa est magnitudo, tum ad maius, tū uero ad minus, quē terminū nō supragrediūtur, ut uel maiora, uel minora euadant, sed in medio magnitudinis spacio excessum defectum ue inter se capiūt, atq; ita homo alius alio auctior est, & ceterorū quoduis animalū: sic materia seminalis, ex qua consistunt, nō indefinita est, nec in plus, nec in minus, ut ex quālibet possint generari. Quæ igitur animalia ea, quam diximus, causa plus excrementi secernūt, q̄ satis sit ad unius animalis originē, ijs fieri nō potest, ut ex eo toto unū gignat animal. sed tot numero gigni necesse est, quot magnitudinib. debitis præscripta sunt, nec uero maris semē, aut facultas cōtenta in maris semine plus quicq; aut minus cōstituit, quā a natura sancitū est. eodēq; modo, si plus seminis mas emiserit, aut facultates plures in semine diuidendo cōtentas, nihilo maius efficiet, quāuis plurimū accefferit: imō contrariū ager. exiccādo enim corrumpet. neq; enim ignis quo plus fuerit, eo magis calefaciet aquā: sed certus calor terminus est, ultra quē si ignē augeas, nihilo reddes aquā calidiorē, sed facies ut magis euaporet, demumq; deleat & exiccetur. Cū igitur hæc moderationē certā inter se requirant, scilicet excrementū foeminæ & maris, qui semē emittāt, multipara animalia statim emittūt quod sibi cōueniat, uidelicet mas quod diuisum possit cōstituere plura: foemina tantū ut plura cōstitui possint. lactis autē illud exemplū simile nō est. seminis enim calor non modo efficit quantum, sed etiā quale quid, at succi & coaguli calor

10 quantum duntaxat cōstituit. Causa igitur ut plures cōceptus cōtrahātur, nec unum continuū ex cūctis cōsumetur in multiparis animalibus, hæc est, quod nō ex quantolibet cōceptus inchoetur, sed si aut parum, aut multū admodū sit, gigni non poterit. præscripta enim certa q̄ est uirtus, & patiētis, & agentis. simili modo in uniparis magnisq; animalibus, nō multa ex multo excremento consistūt, cum in ijs etiam ex certo quanto certū quantū, quod cōfiscitur, sit, plus igitur materiæ talis nō mittit ea, quam prædiximus, causa. quam autē mittit, talis per naturā est, ex qua unus tantū conceptus generet. quod si aliquādo plus accefferit, tunc gemini nascētur. ex quo fit, ut hæc portēta potius iudicentur, quoniā præter solitū, & quod magna ex parte agatur proueniūt. Homo cū omnibus generibus ambigit, nam & uniparū, & pau-

30 ciparū, & multiparū interdū est. sed maxime sua natura uniparū est. humore profecto caloreq; corporis multiparū est. seminis enim natura humida & calida est. sed suæ magnitudinis ratione pauciparū, atq; uniparū est. hinc tempus etiā uteri seren di enorme unū hoc animal sortitū est. cæteris enim unū est tēpus, homini uero plura sunt. quippe cum & septimo mēse, & decimo nascatur: atq; etiā inter septimū & decimū positis, qui enim mēse octauo nascūtur, etsi minus, tamen uiuere possunt, cuius rei causa accipi ex ijs, quæ modo explicauimus, potest. dixi de his in problematibus, atq; de his rebus ita disseruisse, statuisseq; satis sit. Partū autē superuacuarū præter naturā eadem causa est, quæ geminorū generationis. iam enim in cōceptu causa accidit, uidelicet si plus materiæ consistit, quā pro ipsius natura partis sit. sic

40 enim accidit, ut uel pars maior, quā iustū sit efficiatur. uerbi gratia, digitus, aut manus, aut pes, aut aliud ex cæteris postremis aut mēbris: uel fīllo cōceptu plures red dantur, quomodo in fluuijs uertigenes geminātur. sit enim ibi, ut humor qui fertur, & proflus mouetur, si in aliquid offenderit, secetur, & ex una in duas euadat cōstitutiones, quæ eundē habeāt motū. hoc eodē modo in cōceptibus euenit. adnascunt partes illæ uacantes maxime quidē propinquæ, sed aliquādo etiā remotæ propter conceptus motionē, quāq; præcipue, quod materiæ exuperantia ibi redditur, quō tandem decubuit, formā uero unde superfuit, inde recipit. Quibus autē gemina habere genitalia accidit, alterū maris, alterū foeminæ, ijs semper alterū ratū, alterum irritū redditur, cum per alimentū subinde delitescat, quoniā præter naturā est.

quædam  
abscessus.

agnatum est enim modo abscessus, nam & abscessus assumunt aliquid nutrimenti, quamuis post geniti sint, & præter naturā. Sed si quod creat, omnino aut superat, aut superatur, similia oriuntur duo, ac si partim superauit, partim superatum est, alterum scēmina, alterum mas generatur, nihil enim interest de partibus, an de toto dicamus, uidelicet quam ob causam alterū mas, alterum scēmina gignatur, ubi autem partes eiusmodi defunt, ut postrema aliqua, aut alia quæuis membra, eandem causam esse putandum, quam, si omnino quod gignitur, abortū patiatur, abortus autē conceptuum euenire complures certū est, differunt agnationes à partu multiplici quomodo exposui, monstra uero cum ijs dissident, eo quod pluribus coalescant, sed nonnulla hoc etiā modo ueniūt, si in parte maiore, & præcipua quadam peruersum est, ut si qua gemino liene, aut pluribus renibus oriuntur, tum etiā locis partium commutatus, monstrū dicimus, quod diuersione motuū, translationeque materiæ accidit, Vnum ne an plura sit per coagmērationem, quod monstrificum prodit animal, iudicandū est principij ratione, uerbi gratia, si cor pars eiusmodi est, quod unum cor habet, unum animal est: quod duo, id duo est animalia, quæ sibi coalescunt propter conceptuū coniunctionē, partes uero superuacuas agnationes esse declaratum iam est, accidit etiā sæpe, ut pluribus ex ijs, quæ ante oblata non uiderentur, animalibus iam perfectis meatus aut adducti concorporarentur, aut diuenterentur, iam fœminis nonnullis os uteri compressum, concorporatumque ab ineunte ætate ad tempus usque menstruorum perseverauit, mox urgentibus menstruis, doloreque infestāte, alijs sponte disruptum est, alijs dissectum à medicis, nonnullæ interierunt, cum aut per uim disrumperetur, aut disrumpi nō posset, pueris etiam quibusdam genitalis postremum, & meatus qua excrementum uesciæ transsit, non eodem tetenderunt, sed infra meatus ille transegit, quam ob rem demissis clunibus mingunt, qui testibus paulo in partem superiorem retractis, uidentur à longe simul, & maris habere genitale, & fœminæ, meatus etiā alimēti sicci coaleuit aliquibus bestijs, scilicet ouibus, & quibusdam alijs, nam & uaccam fuisse Pirinthi accepimus, cui cibi excrementum extenuatum per uescicam transmittebatur, diffususque anus denuò propere coalescebat, nec resecando euincere uitium poterant, de partu multiplici & paucifero, ac de agnatione partium aut defectu, atque etiam de monstrifico partu dictum iam est.

Quam ob rem animalia alia superfœtent, alia non: & quæ superfœtant interdū fœtus enutriant, interdū non: & alia libidinosa in eo genere sunt, alia non. Caput V



Nimalium uero alia nunquam superfœtāt, alia superfœtant, quorum quædam enutrire suos conceptus semper possunt, quædam interdum possunt, interdū nequeunt. Causa ne superfœtent est, quod singula pariūt, solipedes enim, & quæ ijs auctiores sunt animātes, nunquam superfœtāt, facit enim earū magnitudo, ut excrementū omne in conceptum absumatur, quippe cum in ijs omnibus, corporis sit magnitudo, quæ autē magno corpore sunt, eorū fœtus quoque magni pro sui generis magnitudine insti-  
tuuntur, ex quo fit, ut elephantorū fœtus magnitudine uituli gestetur, multipara  
ideo superfœtant, quoniam plures conceptus superfœtatus quidam, alter alteri  
sunt, Quæ autē ex his magnitudine prædita sunt, ut homo, si alter coitus proxime  
ab altero accessit, enutrire quod superfœtatum est possunt, Iam enim id euenisse  
uisum est, cuius rei causa id quod diximus est, eodem enim coitu plus seminis mitti-  
tur, quod partum multiplicare cōceptum potest, si alterum post alterum accedit,  
sed si iam aucto conceptu coitus adhibetur, superfœtari quidem potest, sed raro,  
quoniam uterus magna ex parte ad partum usque se comprimat, Si tamen alia  
quando accidit ut superfœtetur (iam enim id euenisse constat) perfici non potest.

sed

sed conceptus abiguntur similes ijs, quos abortus uocamus. ut enim in uniparo genere omne excrementū absumitur in id quod præcesserit, ob corporis magnitudinem, sic in ijs fieri solet. sed in illis statim, in his cum iam foetus accreuerit. tunc enim similem uniparis conditionē recipiūt. pari ratione sola animalū mulier, & equa grauida coitū patiuntur. homo enim sua natura præfecundū animal est. aliquid etiā in utero, tum spacij, tum excrementi superest, quanquā non tantū, ut uel alterū possit alere. mulier itaq; ob eam causam coitū recipit. equa autē soliditate suæ naturæ, & quod aliquid spacij in utero superfit, ut dictū est, amplius quidē, quā ut ab uno ocuperetur, sed arctius quā ut alterum perfectē possit superfoetari. libidinosa natura est equa ob eundē affectū, quo solida omnia Veneris sunt appetētia. illa enim ita se habēt, quia carent purgatione, quæ perinde est foeminis, ut coitus maribus. equa enim mēstrua minime emittit. omniū autē uiuiparorū foeminæ solidæ sunt libidinosiores, quoniā simili modo se habēt, atq; mares, qui semē genitale collectū nō excernunt. foeminis enim purgatio menstruorū seminis exitus est, cum mēstrua non nisi semē sint inconcoctū, ut antē diximus. quam ob rem mulieres quæ incōtinentes ad rem uenerē sunt, libidine cessant, cum sapius generarint. iam enim seminale excrementū, quod libidinē accēdebat, emissum facit, ne præterea cōcumbēdi auaritia stimulet. In genere autē foeminæ minus quā mares Venerē appetūt, quoniā uterum cōtinent iuxta septū. mares cōtrā salaciores sunt, quoniā testes intus habēt re-  
 20 tractos. Itaq; fit, ut quæ ex ijs sua natura abundāt semine, coitū semper desiderēt. foeminæ igitur huius generis propēsiiores ad coitū sunt uteri descensu: mares testium re-  
 tractu. Diximus quam ob causam alia nullo pacto superfoetāt, alia superfoetāt quida-  
 dem, sed cōceptus interdū enutriūt, interdū non, & quā ob rem alia libidinosa, alia non libidinosa in eo genere sunt. Sunt autē nonnulla superfoetātia, quæ longo etiā  
 30 interposito tēpore cōeundi possint enutrire conceptū, quē superfoetarint: uidelicet ea, quorum genus semine genitāli abundat, & corporis magnitudine caret, & multa generat. Cum enim multiparū sit, uterū habet ampliōrē. cum semine abundet, multum purgationis excrementitiæ emittit. cum corporis magnitudine careat, maioreq; portione purgatio superet quā cōceptus desideret nutrimentū, possunt uel post  
 30 constitui animalia, eadēq; enutrirī, ac perfici. utri etiā eorū non se cōprimunt, quoniam excrementum purgationis superest. quod mulieribus quoq; euenit. fit enim nonnullis grauidis purgatio, & interdū quæ ad finē usq; perseueret. sed ijs præter naturam hoc euenit. quam ob rem foetus afficitur detrimēto. at eiusmodi animalibus per naturā sic agitur. Ita enim corpus eorū principio constitutū est, quale corpus leporum est. hoc enim animal superfoetāt. quippe quod nec magnū sit, & plura generet. multitudine enim est. tale autem quoduis plura generat. semine etiā abundat, quod eius hirsutis significatur. copia enim pilī exuperat. nam hoc unū pilos & sub pedibus habet, & intra genas. pilī autē abundantia & hirsuties, copiā indicat excrementi. Quā ob rem homines pilosi libidinosiores, & seminis copiosiores sunt quā læues.  
 40 lepus igitur sæpe numero foetus alios imperfectos gestat, alios perfectos iam ædit.

Quare uiuiparorum alia perfectum, alia imperfectum animal pariunt.

Caput VI



uiuiparorum alia imperfectum animal pariunt, alia perfectum. solipedes & bisulcæ perfectum: multipedes complures imperfectum, cuius rei causa est, quod solipedes singulos pariunt: bisulcæ aut singulos, aut binos magna ex parte. enutrire autem quæ pauca gignuntur, facile possunt. multipedes, quæ pariunt imperfecta, omnes multipedes sunt. quo fit, ut partum adhuc recentem alere possint, auctum iam, ade-  
 40 primumq; magnitudinem nequeant: sed cum corpus ad nutriendum non sufficiat,

partum emittant, ut ea quæ uermem pariunt. quædam enim ex ijs catulos inarticu-  
 latos propemodum pariunt, ut uulpes, ursa, leæna, & alia nonnulla. sed omnia ferè  
 cæcos, ut ea quæ modo dixi, atque etiam canis, lupa, lupus ceruarius. sola inter mul-  
 tipara sua parit perfectos, eaq; una euariat. generat enim multos more multifidi ge-  
 neris, cum & bisulcum, & solipes sit. Sunt enim locis quibusdam sues solida ungu-  
 la, partu igitur numerosa est, quoniam alimētum quod in corporis magnitudinem  
 absumeretur, in excrementum feminale decedit. Id enim ut solipes magnitudine  
 caret. quin & potius quasi ambigēs cum natura solipedum bisulcum est, hac igitur  
 causa & unum parit, & duos, & quod plurimum, multos. enutrit uero usque in fi-  
 nem, quæ peperit, propter sui corporis alimoniam probam. habet enim ut solum  
 pingue suis stirpibus: sic scrofa filijs alimētum copiosum & cōmodum. Aues etiam  
 nonnullæ imperfectos & cæcos pariunt pullos, uidelicet quæ cum paruæ corpore  
 sint, multos progenerant, ut cornix, pica, passer, hirundo, & paucipari generis, quæ  
 copiam alimentū parere unā cum prole non solent, ut palumbes, turtur, columba.  
 quam ob rem si quis hirundinum nouellarum adhuc oculos præpungat, rursum  
 in columbes reddentur. Cum enim fiunt, non facti iam corrumpuntur, itaq; denuò  
 oriuntur, ac pullulant. Omnino hæc præueniunt generationē perfectā ob alen-  
 di inopiam, generant uero imperfectos, quoniam perfectionem præueniūt. quod  
 in pueris etiam patet, qui mense septimo nascuntur. Sæpe enim nonnulli eorū præ  
 sua imperfectione, ne meatus quidē integros adhuc habēt, ut aurium, aut narium;  
 sed post accrescentes recipiunt, multiq; ex ijs uitæ compotes euadunt. Mares po-  
 tius quā foeminae oblati in genere hominum nascuntur, cum in cæteris animalibus  
 nihil potius mares, quā foeminae ita proueniant. cuius rei causa est, quod in  
 hominibus longe mas a foemina differt calore naturæ, quo fit, ut mobiliiores sint ma-  
 res in utero quā foeminae, motu autem ipso franguntur, cum recens quoduis faci-  
 le præ sua imbecillitate frangi possit, hæc eadem causa est, ne foeminae similiter atq;  
 mares perficiantur in genere hominū. quippe cum & intra parentem foemina tem-  
 pore longiore conficiatur, quā mas: & ubi in lucem uenerint, celerius foeminae  
 quā mares perficiantur. nam & pubes, & uigor, & senectus foeminis prius uenit  
 quā maribus, sunt enim foeminae sua natura debiliores, frigidioresq;. & sexū fœ-  
 mineum quasi læsionem naturalem, & detrimentū esse putandum est. Intus igitur  
 tarde præ sua frigidityte discernuntur. hæc etenim discretio concoctio est, calor au-  
 tem concoquit, & quod calidius, id concoctū facilius est. sed foris propter suam de-  
 bilitatem citò ad ætatis florem, senectutemq; perueniunt. etenim omnia minora,  
 ut in artis operibus, sic in naturæ citius ad finem deueniunt. eadem causa est, ut qui  
 gemini mas & foemina in genere hominum prodeunt, minus seruētur, cum in cæ-  
 teris animalibus nihil referet. hominibus enim hic concursus præter naturam est,  
 cum non pari tempore mas & foemina discernatur, sed aut marem contari, aut fœ-  
 minam præuenire necesse sit, at in cæteris id non præter naturam est. In ferendo  
 etiam utero homines cum cæteris animalibus diffidēt, cum enim cætera plurimum  
 temporis ualeant corpore, cum uterum ferunt, mulieres magna ex parte ægræ de-  
 gunt. cuius rei causa aliqua uel ad uitam referri potest. Cum enim mulieres uitam  
 ociosam & sellulariam quandam degant, plus contrahunt sibi excrementū, nam quibus  
 genibus solitum est, ut mulieres labores suscipiant, ijs nec uterus tam difficul-  
 ter gestatur, & partus facilis est. deniq; quibusuis locis mulieres, quæ laborare con-  
 sueuerunt, facilius pariunt. labor enim excrementa consumit, quæ in mulieribus  
 ociosis augentur. Cumq; parturigo laboriosa sit, labor & exercitatio actæ uitæ facit,  
 ut spiritum possint retinere: in qua re partus facilitas conciliatur. Afferunt igitur ea  
 quoque, ut modo dixi, aliquid causæ ad eius affectionis differentiam, qua mulieres  
 cæteris



cæteris animalibus in ferendo utero discrepant. sed maxime causa est, quod cum cæteris aut exigua purgatio, aut nulla manifesta fiat, mulieri plurima euenit. quæ cum per uteri gestationem defierit, infestat atq; perturbat. quippe cum etiam non grauidis, nisi purgationes fiant, ægritudines accidunt. principio potius cum concipiunt perturbari solent magna ex parte. conceptus enim purgationem impedit, & præ sua exiguitate absumere copiam excrementi inter initia non potest: quanquam post, ubi iam plenius assumere coeperit, leuat. at in cæteris animalibus, quoniam parum excrementi est, modice ad foetus incrementum accommodatur. Cumq; excrementa, quæ nutritionem impediunt, absumantur, ualent felicius.

10 Nec secus aquatile genus, aut uolatile afficitur. Iam uero accrescente foetu, quibus non æque proba alio contingit, causa est, quod foetus incrementum plus excrementi alimenti desideret. paucis quibusdam mulieribus euenit, ut prægnantes melius ualeant corpore, uidelicet ijs quarum in corpore exigua continentur excrementa, quæ absumi possint cum alimento quod foetui administratur.

*Quam ob causam mola in utero mulierum generetur, & quare potius in muliere, quam in cæteris animalibus.*

Caput VII



Eo quod mola uocatur uidendum est. accidit hoc uitium mulieribus nonnullis grauidis, quanquam raro. pariunt enim quod molam uocant. Iam accidit enim mulieri cuidam, ut cum concubuisset & se concepisse putasset, primum uentris moles augetur, & reliqua ex ratione uenirent. Sed cum tempus pariendi iam esset, nec pareret, neque moles minueretur, sed annos tres aut quatuor ita perseueraret, quoad dysenteria, id est, difficultati intestinorum implicata, eoq; modo periclitata, demum peperit carnem, quam molam uocant. Quin & tota uita edurat hoc uitium, ut & consenescat & commoriatur. Quæ autem prodierit, adeo obdurefcit, ut uix ferro transigi possit. causam huius affectus dixi in problematibus. Afficitur enim conceptus eodem modo, quo ea quæ inquinari dicimus, cum elixantur, nec per calorem ut quidam uolunt, sed potius propter caloris debilitatem, natura enim de uita

30 certare uidetur, nec posse perficere, finemq; apponere generationi. quam ob rem aut tota uita, aut longo tempore durat, quod inchoatū est. nec enim ut perfectam, nec ut alienam omnino habet naturam. causa nanque duritiæ cruditas est. quippe cum inquinatio quoque cruditas quædam sit. Sed quæritur cur cæteris animalibus idem non accidat, nisi quid admodum lateat. causam uero esse putandum, quod mulier una omnium animalium affectionibus uteri obnoxia est, & mensis firuis abundat, nec potest ea concoquere. Cum igitur ex humore concoctio difficili conceptus consistit, tunc gignitur quod mola uocatur, idq; in mulieribus merito, aut solis, aut maxime.

*Quæ animalia lac habeant, & quam ob causam à natura datum sit.*

Caput VIII



40 Acautem sit ijs sceminis, quæ animal intra se generant. quod utile partus tempore est. natura enim id alimēti gratia externi animalibus parauit, ut nec deesset tempore debito, neque ultra id tempus superesset. quod ita planè euenire uidemus, nisi quid præter naturam acciderit. Sed cæteris animalibus, quoniam tempus simplex ferēdi uteri, partusq; datum est, lactis concoctio ad hoc tempus solet accedere. hominibus uero quoniam plura sunt tempora, primo adesse necesse est. quam ob rem lac mulierum, cum ante septimum mensem inutile sit, utile iam septimo redditur mense. Causa etiam necessitatis propria, concoctio lactis temporibus ultimis habetur. prin-

cipio enim decessio huiusmodi excrementi absumitur in foetus generationem. Omnibus autem alimento est, quod dulcissimum & coctissimum sit. Itaque sublata hac facultate, reliquum salsum, maleque sapidum esse necesse est. Sed cum foetus magis, magisque perficiatur, plus excrementi superest. minus enim absumitur, idque dulcius est, cum non aequae detrahatur, quod bene concoctum sit. non enim insuper ad foetus informationem consumitur, sed ad incrementum mediocre, quasi iam foetus constet adeptus finem suum. est enim & conceptus perfectio, quam ob rem exit, permutatque generationem, ut qui iam sua receperit, nec praeterea accipit quod suum non est. quo tempore lac utile datur. Colligitur hoc parte superiore corporis, & mammis, propter ordinem primae, originalisque constitutionis. praecipua enim pars animalis quae supra septum est, inferior uero ad cibum, & excrementum accommodata est, ut gressile animalium genus habens intra se alimenti suppetias loca permutet. hinc feminale quoque excrementum secernitur ob eam, quam inter initia disputationis nostrae reddidimus causam. est enim naturae sanguineae, tum excrementum maris, tum menstrua feminae. sanguinis autem & uenarum principium cor est, quod in ea ipsa parte superiore positum est. quapropter hic primum excrementi talis mutationem innotescere necesse est. ex quo fit, ut & uoces, tum marium, tum foeminarum immutentur, cum semen ferre incipiunt (hinc enim uox suam originem trahit, alteratur uero cum id, quod moueat, alteretur) & mammae subleuentur etiam maribus plane, sed foeminis amplius. quod enim parte inferiore multum excernitur, ideo locus mammarum inanis, fungosusque foeminis fit. eodemque modo istis euenit animalibus, quibus mammae infra habentur. Igitur & uox, & mammae in ceteris quoque animalibus documentum euident praebent homini usum habenti generis cuiusque. sed plurimum in genere hominum interest. Cuius rei causa est, quod excrementum plurimum, & mulieribus praeter ceteris foeminis, & uiris praeter ceteris maribus est pro magnitudine, alteris menstruorum, alteris geniturae. Itaque cum hoc foeminae excrementum non a foetu hauritur, & tamen ne foras profluat prohibetur, colligi id in loca inania, quaecunque eisdem meatibus adhaeret, necesse est. Talis autem locus mammarum in omnibus est utraque de causa, scilicet notae melioris gratia ita conditus, atque etiam necessario hic iam consistit, & alimentum concoctum animalibus redditur. Concoctionis autem causam non solum quam modo diximus accipere licet, sed contrariam etiam. nam & ut foetus maiusculus iam factus plus assumat cibi, minusque ob eam rem per id tempus super sit, ratio probabilis est. quod autem minus est, concoqui celerius potest. Sed lactis naturam eandem esse, quam excrementi, ex quo unum quodque generetur, apertum est. nam quod ante diximus, eadem materia est quae alit, & ex qua generationem natura constituit, eaque sanguineus humor in sanguine habentibus est. lac enim sanguis concoctus est, non corruptus. Empedocles uero aut non recte putauit, aut non bene uerbo translatio est, cum dixerit: Octauo decimo mensis pus exitit albu. putredo enim concoctioni contrarium est. Pus autem putredo quaedam est. lac uero res est concocta prorsus, nec lactatibus fiunt purgationes secundum naturam, neque lactantes concipiunt. & si conceperit, lac extinguitur. quoniam eadem lactis, & menstruorum natura est. natura autem non tam large profundere potest, ut anceps sit, sed si alterutram in partem secernitur, in alteram desit necesse est, nisi quid acciderit uiolentum, & praeter id, quod solitum magna ex parte est. Temporibus etiam bene praescripta est generatio animalium. cum enim praeter magnitudinem non satis praeterea foetui est alimentum, quod per umbilicum ministratur, lac ad alendum utile succedit. Cumque per umbilicum alimentum non subeat, comprimunt sese uenae illae circum quas tunica est, quae umbilicus uocatur, atque ob eam rem tunc exitus opportune foetus consequitur.

Quam

Quam ob causam partus nonnullis animalibus in caput uersis fiat.

## Caput IX



Artus autem pronis in caput conuersis fit per naturam animalibus omnibus, propterea quod partem ab umbilico maiorē habeant, quā in inferiore. maiora autem plus ponderis continent. itaq; ueluti in statera dependentes eō uergunt, quō trahuntur.

De tempore ferendi uteri. Et quare non omne animal possit esse diuturnius.

## Caput X

10



Teri autem ferēdi tempora certa, cuiq; animalium sunt magna quidem ex parte pro uitæ spatio. uiuaciorum enim generationes quoq; diuturniores esse necesse est, non tamen id causæ est, sed magna ex parte sic euenit, maiora enim perfectioraq; sanguinei generis animalia plus temporis uiuunt, sed non omnia maiora sunt uiuaciora. homo enim plus temporis, quā quoduis animal uiuit, excepto elephante, quod quidē usu adhuc fide digno nouerimus, quanquam homo minoris est incrementi, quā ueterina, & alia multa. Causa ne quoduis animal possit diu uiuere, est, quod pro aëre ambiente temperatur, atque etiam ob alios naturales casus, de quibus mox dicam. Tempora ferendi uteri pro magnitudine animalium, quæ generatur  
 20 descripta sunt, haud enim tempore breui constitutiones perfici magnas, uel animalium, uel quorumuis aliorum ferē facile est. Quam ob rem equi, & quæ ijs cognata sunt animalia, quanquam minus temporis uiuunt, tamen diutius uterum ferunt: alia enim annum, alia quod plurimum menses denos grauida exigunt. hac eadem de causa elephantium etiam uterus diutinus est: biennio nanque gestatur, propter exuperantiam magnitudinis. Ratione autem optima tempora omnium & grauiditatum, & generationum, & uitarum dimensionem circuitibus sibi  
 30 exposcunt recipere. circuitum appello diem, noctem, mensem, annum, & tempora, quæ ijs describuntur, atque etiam lunæ traiectiones, sunt enim lunæ circuitus complementa, & silentia, & interpositorū temporum sectiones. ita enim coit cum  
 40 sole, mensis namq; communis amborum circuitus est, luna autem principium est propter solis societatem, receptumq; lucis: fit enim quasi alter sol minor, quam ob rem conducit ad omnes generationes, perfectionesq;. calores enim & refrigerationes cum moderatione quadam generationes, sine moderatione corruptiones efficiunt. terminum autem tum principij, tum finis qualitatum earum motus horum syderum obtinet, ut enim & mare, & omnem humorum naturam subsistere, mutari ue pro flatuum motu, & quiete uidemus, aërem uero & flatum pro solis, lunæq; circuitu affici: sic ea, quæ ex ijs aut in ijs oriuntur, sequi necesse est. Nam ut rerum minus principalium circuitus sequatur, magis principalium rerum circuitum ratio est. Vitam enim quandā & ortum, & interitum, uel flatuum esse fateor. Con  
 40 uersionis uero eorum syderū alia fortasse principia sunt, natura igitur ita sibi uult, ut eorum numeris generationes & obitus numeret, sed exquisitè id facere nequit, propter materiæ indefinitionem, & quod multa principia incidunt quæ generationes destinatas secundum naturam, & corruptiones sæpe impediunt, atque ita causa sint earū, quæ ueniant præter naturā. Sed de alimento intrinsecus ministrando animalium, atque de generatione in lucem agenda, & seorsum de singulis, & summam de omnibus dictum iam est.

His enim ad solem commutatur

## ARISTOTELIS STAGIRITAE DE

GENERATIONE ANIMALIUM LIBER QVIN-

TVS, INTERP. THEODORO.

De discrimine oculorum in animalibus, & eorundem differentia, & quid sit  
somnia, quid item uigilia.

Caput I



E affectionibus, quibus animalium partes differant inter se, dis-  
cendum nunc est, affectiones partium dico caecitatem oculo-  
rum, aut nigredinē, uocis acumen, aut grauitatē, & coloris, aut  
corporis, & pilorū, aut pennarū discrimen, quorū alia totis ge-  
neribus insunt, alia utcūq; fors tulit habentur. quod maxime  
in hominibus accidit, mutationes etiam per aetatem alia omni-  
bus aequae animalibus ueniūt, alia contra: ut in uocis, colorisq;  
pilorū ratione uidere licet. Cum enim cetera nō canescant, manifeste in senectute,  
homo maxime omnium ita afficitur, & alia statim ab ortu naturae consequuntur, alia  
progrediente aetate, & senescentibus accidunt. de his igitur, ceterisque huiusmodi  
omnibus non eundē praeterea modum causae esse putandum, quae enim non sint  
opera uel naturae communia, uel generum singulorum propria, horum nullum ali-  
cuius gratia, aut est, aut fit. Oculus enim alicuius gratia est, sed caecus non alicuius  
gratia est, nisi haec affectio sit propria generis, nec uero ad rationem substantiae perti-  
net in nonnullis, sed ut quae necessariiō fiant, ad materiam, & principium, quod mo-  
uerit, causae eorum referendae sunt. etenim, ut initio disputationis nostrae dictū est,  
nō quia tale quid gignitur, quodq; ideo tale quid est, scilicet in ijs, quae statuta, defi-  
nita & certa naturae sunt opera: sed potius quia tale est, idcirco tale & gignitur. sub  
stantia enim generatio sequitur, & substantiae gratia est, non ipsa generationem. Ve-  
teres tamen naturae interpretes contra esse putarunt, cuius erroris causa fuit, quod  
causas plures esse non uiderent, sed materiae tantū, & motus causam, eamq; indefi-  
nite cognoscerent, Rationis uero, & finis causam non considerarent. sed enim ali-  
cuius gratia unumquodq; est, gignitur autē iam ob eam causam, & reliquas, quae  
in ratione cuiusq; continētur, quae uel alicuius gratia est, uel cuius gratia aliud est.  
Quae uero nō eiusmodi sunt, uidelicet quorū generatio est, eorum iam causa quae  
renda in motu, generationeq; est, utpote cum discrimen constitutione recipiant,  
oculum enim necessariō habebit, tale enim animal subiectū est. Sed talem oculum  
necessariiō quidē, sed non tali necessitate. Verum alio modo, scilicet quoniam talem,  
aut talē rem suapte natura agere, pati uel potest, his ita definitis, de rebus quae dein-  
ceps eueniant, differamus. Principio pueri cum nati fuerint, dormire omnium ma-  
xime imperfectorum animalium solent, quoniam intra parentē cum primum sentire  
coeperint, tempus dormiēdo totum ferē consumunt. Sed quaeritur de prima gene-  
ratione, utrum uigilia praecedat, an somnus, quod enim proficiscente aetate magis  
expergisci uiisunt, contrarium, id est, somnum principio generationis inesse pro-  
babile est. Tum etiā transitio de nō esse in esse per medium fieri solet, somnus autē  
talis sua natura esse uidetur, ut uiuendi, & nō uiuendi interliminium sit, & neque  
omnino sit, qui dormit, neq; non sit. Viuitur enim potissimum uigilia propter sen-  
sum, sed si animal habere sensum necesse est, & tunc primū est animal cum primū  
contingit sensus, primam illam dispositionē non somnum, sed similem somno esse  
putandum, qualis plantarum est. etenim ita accidit, ut per id tempus uita plantae  
animalia uiuāt. At plantis somnum inesse impossibile est, nullus enim somnus in-  
expergiscibilis est. Affectio autē illa plantarū, quae somni est proportionalis, inex-  
pergiscibilis est. necesse etiā est animalia dormire partem maximā temporis, quo-  
niam incrementum & pondus locis superioribus impositū est. Causam autē dor-  
miendi

miēdi tācē esse alibi exposuimus. Verūtamen expergisci in utero etiā uident, quod  
 tum in dissectionibus, tū in prole ouipari generis patet: mox obdormiscunt statim,  
 rursusq; delabūtur. quam ob rem egressa quoq; in lucē, bonā temporis partē dor-  
 miendo traducūt. Cum pueri uigilant, nō rident, cum dormiunt, rident, interdum  
 etiā lachrymant. Accidit enim dormiētibus etiā animalibus sensus, nō modo, quā  
 somnia uocātur, sed etiā prāter somnia, ut ijs, qui dormiētes resurgunt, & quidem  
 plerāq; agunt sine somnio. sunt enim qui dormiētes resurgāt & ambulent, uiden-  
 res eo modo, quo qui uigilāt. ijs enim sensus accidentiū contingit, quanquam non  
 uigilantibus: tamen nō ut somnium. Infantes uero propter consuetudinem quasi  
 10 nescij uigilādi, sentire, uiuereq; in dormiēdo uidētur. Tempore autē procedente,  
 incrementōq; transeunte in partem inferiorē expergiscuntur, iam magis & partem  
 maiorē temporis ita degūt, sed initio plus, quā cātera animalia somno dediti ui-  
 uunt. Imperfectissimi enim omniū perfectiorū partuum nascūtur, & incremento  
 partis superioris exuperant. oculi omnium puerorū statim ā partu caesiūsculi sunt,  
 pōst uero immutātur in eam naturā, quā futura est. quod in cēteris animalibus nō  
 euenit manifeste. cuius rei causā est, quod cāteris animalibus oculi in suo cuiusq;  
 genere unicolores potius sunt, ut boum nigri, ouium omniū aquini, aliorū rufi  
 toto genere, aut caesij, nōnullorū caprini, ut caprarij generis. At hominū oculos ua-  
 rios, uersicoloresq; esse euenit. nā alij caesij, alij flauidi, alij nigri, alij caprini. quam  
 20 ob rem cāterorū, ut nulli suo in genere dissident inter se, sic nulli ā se ipsi differunt.  
 quippe qui nō plus, quā unū colorē habeant sua natura. Equus maxime omniū  
 cāterorum animalū uersicolor est. aliqui enim caesij altero oculo nascuntur, quod  
 nulli ex cāteris bestijs euenit manifeste. quanq; homines nonnulli altero oculo di-  
 uerso gignantur. ergo ut cātera animalia nihil mutationis, uel recens nata, uel aēta  
 re prouectiora recipiant, pueris autē id eueniat, satis causā hoc esse existimandum,  
 quod cāterorū ea pars unicolor, hominis uersicolor est. sed ut caesiū potius, quā  
 alium habeāt colorē, causā est, quod partes nuper natorū imbecilliores sunt. caesie  
 ras autē imbecillitas est. Sed in uniuersum de oculorū discrimine quārendū, accipi-  
 endumq; est, quam ob causā alij caesij, alij flauidi, alij caprini, alij nigri, sed caesios  
 30 opinari plus ignis habere, ut Empedocles ait, nigros autē plus aquā, quā ignis.  
 atq; ob eam rem caesios interdū acute cernere nō posse, scilicet ob aquā inopiam:  
 nigros noctū deficere ob ignis inopiam non bene est. siquidem uisus non igni, sed  
 aquā tribuendus in omnibus est. causā etiā colorū, uel alio modo reddere possu-  
 mus, sed si ita est, ut antē dixi, cum de sensibus agerem, atq; etiam prius cum de ani-  
 ma, ut aquā propria pars hāc sensoria sit, non aeris, aut ignis, cur ita hanc esse cau-  
 sām eorū putandū est, quod alij plus humidi habēt, alij minus, quā motus com-  
 perens requirat, alij modicū: Itaq; qui multū humoris continēt, nigri sunt, quoniā  
 humoris copia transpici satis non potest. caesij qui parū habent humoris, ut in mari  
 etiā cernitur, etenim quantū eius satis transpicitur, caesium apparet: quantum mi-  
 40 nus, aquinum: quantum prā gurgite alto nō prāfinitur, id opacat, & nigrum, aut  
 ceruleum fenitur. qui autē inter eos sunt, eo iam differūt, quod magis minus ue-  
 ita cōstiterint, eandem causā esse putandū, & ut caesij acute interdū cernere ne-  
 queant, nigri noctū. caesij enim prā sui humoris exiguitate mouentur magis ā lu-  
 ce, & rebus uisibilibus, scilicet qua humidi, quāq; perlucidi sunt, quanq; motio eius  
 partis uisio est, qua perlucida, nō qua humida est. Nigri uero ob humoris copiam  
 minus mouētur. lux enim nocturna exilis est, & simul quiuis humor per noctem  
 moueri difficilior potest. conuenit autē eum qua perlucidū, nec non moueri, neq;  
 magis moueri, quā congruum sit. leuior enim motus expellitur ā uehemētiore,  
 quam ob rem, qui aut suū conspectum ā calore ualidiore transfulerint, aut de sole

in opacum se contulerint, nō cernunt. motio enim quæ iam uehemens inest, impedit eam quæ extrinsecus accidit, deniq; uisus siue ualidus, siue inualidus, nequit res splendidas cernere, quoniā eius humor ultra modum afficitur, & mouetur. Aegritudines etiam oculorum, utrorumq; indicium faciunt. Glaucoma enim cæsis potius accidit, lusciositas nigris. est autē glaucoma siccitas potius oculorum. Itaque senescentibus magis euenit, nam oculi quoq; ut reliquum corpus senectute siccescunt, lusciositas uero humoris copia est, quapropter minoribus natu potius accidit. cerebrum enim eorū humidius est. Visus autē optimus est, qui inter multum & parum humoris moderatus constat. hic enim nec per exiguitatem turbatur, ut colorum motiones impediat, neq; per nimietatem præbet mouendi difficultatem. 10 sed non modo ea quæ diximus, causam habet, ut obtuse, acutē ue cernatur, uerum natura etiam cutis, quæ pupillæ uocatæ obtenditur, translucidā enim esse eam requirit. Talem autē esse quæ tenuis, alba, & leuis sit, necesse est. Tenuis igitur est, ut motus, qui extraneus ueniat, recto tramite feratur. leuis, ne rugis obumbret, senes enim ob eam rem acute non cernunt, nam, ut cæterarum partium cutis, sic oculorum quoq; senescentibus obrugatur, & crassior redditur. alba autē esse debet, quoniam nigrum translucidū esse non potest, hoc enim ipsum est nigrum, quod non transluceat, unde fit, ne laternæ possint lucere, si ex tali cute confectæ sunt. Per senectutem igitur & morbos acute cernere ob eas causas nequeunt. Pueri uero paucitate humoris cæsi principio sunt, sed altero oculo cæsi præcipue homines, atq; 20 equi gignuntur eadem de causa, qua & homo solus canescit, & equus inter cætera animalia unus euidentius albescit pilo per senectutem. canities enim debilitas quædam humoris sita in cerebro, & cruditas est, quod idem cæstas quoq; est. Vis enim eadem est humoris admodum tenuis, quæ pauci, & admodum crassi, quæ multi. Cum igitur natura æque conficere nequit, aut utroq; concocto humore, aut non utroq; concocto, sed altero concocto, altero non, tunc euenit, ut cæsi altero oculo reddantur, quam ob rem autē alia acute cernant, alia non, duplex ratio est: acumen enim cernēdi bifariam ferē dicitur. Audiendi etiam, olfaciendiq; ratio similis est, dicitur enim acute cernere, aut quod procul cernere potest, aut quod differētiis rerum quæ cernuntur, quammaxime sentiat, quæ quidem simul nullis eisdem con- 30 tingunt. Idem enim manu admota, aut per fistulam, quantū nihilo magis colorum differētiis indicet, tamen longius cernit. & quidem ex foueis, puteisq; interdum stellas cōspiciunt. itaq; si quod animal multum quidem prominentiæ adiunctum oculis habet, sed humorem pupillæ non purum, neq; modicum conueniēter extraneo motui, neq; summam cutem prætenuem obtinet, id ut exquisitè colorum differētiis nō percipiet, sic procul cernere poterit. quomodo etiā cominus magis, quam quæ humorem quidem illum syncerum, operimentumq; eius prætenue habeant, sed supercilio, quod promineat oculis, careant omnino. causa enim cernēdi tam acute, ut differētiæ percipiatur, in ipso oculo est. nam ut in ueste mundissima uel minima macula perspicua est, sic in puro, synceroq; oculo, uel parua morio 40 patet, sensumq; afficit. At, ut procul cernatur, motusq; à longinquis uisibus deueniat, causæ situs est oculorum. quæ enim oculis prominentibus sunt, procul cernere nequeunt. Quæ contrā intus in cauo oculis habent positos, longe aspicere possunt, quoniā motus in uastum nō dissipatur, sed recto tramite meat. nihil enim interest an uisus exitu cerni dicatur, ut quidam aiunt, nam nisi ante oculos quicq; sit, dissipari uisum, atq; ita minorem rebus occurrere, quæ cernuntur, necesse est, minusq; procul uidere, quam si motu à rebus, quæ uidentur, proficiscente cernatur, similem enim motui effici uisionem necesse est. Ita igitur potissimum res cernerentur longinquæ, si ilico ab oculo ueluti fistula quadam porrecta ad rem usque cer-  
nendam

nendam cōtinuaretur, sic enim nulla ex parte dissolueretur motus, qui à re uisibili proficisceretur. Sed cum ita nō sit, quo amplius porrigitur, eo lōgius cernatur necesse est. Causæ discriminis oculorum hæ sunt.

De auditorijs sensibus, & olfactu, eorumq; ratione.

Caput II

**A**dem uero audiendi, olfaciendiq; ratio est, aut enim ita exquisitè audiunt, & olfaciunt, ut quammaxime differētias omnes subiectarum sensibilium rerum sentiant; aut ita, ut procul audiant, aut odorentur. ut igitur bene differentia iudicentur, causæ sensorium est, quomodo in cernēdo, uidelicet si syncerū, tum ipsum, tum eius membrana est. Meatus enim sensoriorum omnium, ut dixi, cum de sensibus agerem, tendunt ad cor, aut ad cordis proportionale, si corde carent. Itaq; meatus audiendi, quoniā sensorium hoc aëris est, quā spiritus natiuus in alijs pulsum, in alijs spirationem facit, hac definit. quapropter uerba ediscunt, ut quod audieris reddere ore possis, qualis enim motus subierit per sensorium, talis quasi ab una, eademq; effigie motus per uocem agitur, ut quod audieris, idem dicas. Oscitantes etiam, aut spiritū reddētes, accipientes uē, minus audiunt, quoniā extremum sensorij auditus ad partē spiritalem terminetur, & quatiatur, moueaturq; unā cum instrumento spiritali, quoties illud spiritū mouet, mouetur enim cum mouet. necnon temporibus anni, temperaturamentisq; humidis idem accidit, ut aures impleri spiritus uideatur, quoniā uicinæ sint origini loci spiritalis. Iudiciū igitur exquisitum differentiarū tum soni, tum odoris, in synceritate sensorij, summæq; membranae positū est. ita enim omnes motus manifesti, ut in uisu, in his etiā ueniunt, quoniā & procul sentire, aut nō sentire, similiter atq; in ratione uidēdi accidit. Quæ enim ante suas sensorias partes productiores, ueluti aqueductus possident, hæc procul sentire possunt, quā ob rem quorum nares porrectæ sunt longius, ut catellorum laconicorū, hæc ualēt olfactu. Ita enim motus nō interpellatur, sed à longe directi sensoriū subeunt integri, quomodo in ijs, qui manu admota fronti lōgius cernunt. Auriculæ etiā longæ, imbricataq; amplius, quasi grundis, intusq; anfractu lōgiore intortæ (quales nōnullarū quadrupedum sunt) melius administrant, quippe quæ motum eminus excipiētes ad sensoriū reddant. homo pro magnitudine minime ferē omniū animalū procul sentire potest, cum tamen differentiarū sensu maxime omniū ualeat, cuius rei causa est, quod sensoriū syncerum, minimeq; terrenū, corpulētum uē obtinet. cutem etiā tenuissimā præ cæteris animalibus homo suapte natura pro magnitudine habet. Vitulus marinus nimis recte à natura cōstitutus est. Cum enim quadrupes ouiparū sit, auribus caret, meatusq; tantū habet, quibus audiat. causa est, quod uitā hic in humore traducit. Pars autē auriū addita meatibus est, ut motus à longe delatus aëris feruaretur. itaq; nihilo utiles ei auriculæ essent, imò uero offenderēt, cum intra se copiam reciperent humoris. De uisu, auditu, olfactuq; dictum iam est.

De pilorū in animantibus uarietate, & quæ pilorum loco sint.

Caput III

**I**lli discrepant, & inter se in hominum genere per ætates, & cum cæteris animalibus, quæ habent pilos, habent autē quæ intra se animal generant ferē omnia. Iam & aculeos, qui à nonnullis uice pilorū geruntur, genus esse pilorum existimandum est, ut herinaceorū aculeos, & si quid eiusmodi aliud in genere uiuiparo est. differentia uero pilorum existunt duritie, mollitie, longitudine, breuitate, rectitudine, crispitudine, multitudine, paucitate, ad hæc, coloribus, ut albedine, nigredine, eorumq; medijs, sed nonnullas earum differentiarum per ætates quoq; recipiunt, uidelicet cum mī

nora natu, aut maiora sunt, quod præcipue in homine palam fit, pilosior enim æta-  
te prouectus redditur homo, & parte priore capitis nonnulli caluescunt, pueri quidē,  
mulieresq; non caluescunt, Viri autē procedente ætate calui euadunt, nec non ca-  
pite homines senescentes canescunt, quod nulli ferè ex cæteris animalibus accidit  
manifeste, quamuis equus euidentiùs quàm cætera ita afficiatur, Caluescunt homi-  
nes parte capitis priore, Canescunt primo temporibus, sed nemo uel temporibus,  
uel occipite caluescit, Quibus autē animalium pili non sunt, sed pilorum propor-  
tionale, ut auius pennæ, piscibus squamæ, ijs etiā nonnulli ex ijs affectibus ueniūt  
ratione eadem, sed cuiusnam rei causā genus pilorum datum animalibus à natura  
est, diximus antè, cum causas partiū redderemus, Nunc præsentis operis, atq; offi-  
cij est, ut quibusnā præcedētib; rebus, & quas ob necessitates hæc eueniāt, expli-  
cemus, Causa crassitudinis, tenuitatisq; pili, cutis potissimū est, alijs enim cutis cras-  
sa, alijs tenuis, & alijs rara, alijs densa est, tum differētia humoris inditi cōfors causæ  
est, Alijs enim pinguis, alijs aquosa est, omnino cutis naturam terrenam esse sta-  
tuimus, Cum enim per summa sit, humore euaporante solida, terrenaq; redditur,  
Pili autē, proportionalesq; pilorum nō ex carne, sed ex cute oriuntur, cum humor  
in ijs euaporetur, atq; exhalet, quam ob rem crassi ex crassa, tenues ex tenui cute  
proveniunt, quod si cutis rarior, & crassior sit, crassi gignētur propter copiam por-  
tionis terrenæ, & meatuum laxitatem, sed si spissior est, tenuiores exeunt propter  
meatuum angustiam, Item si uapor aquosus inest breui resiccescens, facit ne pili ca-  
pian magnitudinem, At si pinguis est, contrā euenit, non enim facile exiccare po-  
test, quod pingue est, quam ob rem in totū animalia quorum cutis crassior est, pilo-  
sunt crassiores, quamuis nō quæ cute maxime ita constāt, magis ita habeant pilum,  
propter eas, quas modo diximus causas, ut generi suum præbubus & elephantis,  
& multis alijs usu euenit, nam & si cutem crassiorem boues, elephantis, & pleraq;  
alia habent, quàm fues, tamen pilo tenuiore reguntur, Eadem causa est cur homi-  
num capilli crassissimi sint, capitis enim cutis crassissima est, & humoris plurimum  
cōtinet, rara etiā admodū est, quinetiā ut pili longiores breuiore uel sint, causa est,  
quod humor qui euaporetur, nō facile exiccare potest, causa uero ne facile exice-  
tur duplex est, scilicet quātitate & qualitate, nam si humor aut multus, aut pinguis  
est, nō facile exiccare potest, ideoq; hominum capilli longissimi sunt, cerebrū enim  
quod humidū, & frigidū est, largam humoris copiā præbet, simplex aut, crispus uel  
oritur pilus exhalatione pilorum, Nam si fumosa est præ sua caliditate & siccitate,  
crispū efficit pilū, Inflectitur enim, quoniā duplici delatione feratur, terrenū enim  
deorsum, calidum sursum fertur: cumq; præ sua imbecillitate inflecti facile possit,  
intorquetur, quod pili crispitudo est, Aut igitur ita causa reddenda est, aut quoniā  
parum humoris, multū aut portionis terrenæ inest, efficitur, ut pili resiccari ab aëre  
ambiente cōtrahantur, Inflectitur enim quod rectū est, si euaporat, & cōtrahitur,  
atq; cōuelliuntur pilus, quemadmodū cum igne aduritur, utpote cum crispitudo con-  
uulso sit ob humoris inopiam ab aëris continētis calore, indicium rei est, quod & du-  
riores sunt pili crupi, quàm recti, durū enim quod siccum est, simplici aut pilo sunt,  
quæ humore abundant, fluuit enim humor in ijs, nō stillat, quocirca Scythæ incolæ  
Ponti, & Thraces pilo sunt promisso, & simplici, nam & ipsi humidi sunt, & aër  
ambiēs eos, humidus est, Aethiopes cōtrā, qui loca incolūt calida crispo sunt pilo,  
siccū est enim & cerebrū eorū, & cælum ambiēs, Sed sunt quæ quamuis cutem ha-  
beant crassiorem, tamen tenuiori sint pilo, ea uidelicet causa, quam antè exposui,  
quo enim meatus tenuiores sint, eo pilos enasci tenuiores necesse est, quapropter  
ouiu generi tales sunt pili, uellus enim multitudo pilorū est, Sunt etiā, quæ mollem  
quidē habeant pilum, sed minus tenuē, ut lepores contrā quàm oues, leporū enim  
pilus



pilus per summa cutis enascitur, quam ob rem longitudine caret, & simile accidit, ut in ijs, quæ lino decerpuntur, quæ quamuis mollia sint, tamen nullam longitudinem habent, nec implexum ullum recipiunt. Oves frigidi tractus contra quam homines afficiuntur, Scythæ enim molli sunt pilo, at oves Sauromaticæ duro, causa eadem, quæ in omnibus feris est, frigus enim indurat propterea quod cogendo exiccat, cum enim calor eximitur, humor una euaporatur, itaque non solum pilus, sed etiam cutis terrena, duraque euadit, causa in feris uita agrestis est, in cicuribus autem his loci frigiditas, indicium uel echini pelagici faciunt, quorum usus contra urinæ stillicidia est, quippe qui frigiditate maris præalti, in quo degunt (sexaginta enim, atque etiam amplius passuum gurgite oriuntur) ipsi quidem exigui sint, sed aculeos grandes, durosque gerant, causa magnitudinis est, quod incrementum corporis diuersum eo est, cum enim parum caloris obtineant, neque concoquere possint, multum ob eam rem habent excrementi, aculei autem, & pili, & reliqua generis eiusdem excremento nascuntur, duri uero & rigidi modo penè lapidis constant propter frigus, & gelu, eodemque modo cætera, quæ terra gignit, duriora, & terrosiora, lapidosioraque gignuntur locis aquilonijs, quam austrinis, & uento expositis, quam concauis, & quietis, frigent enim omnia magis, humorque euaporatur, Indurat igitur tum calor, tum frigus, nanque euenit, ut ab utrisque humor euaporetur, scilicet a calore per se, a frigore per accidens, una enim cum calore humor abstrahitur, nullus enim humor sine calore est, sed frigus non modo indurat, sed densat etiam, calor uero laxat, rarioraque facit, Eadem causa est, ut natu grandibus duriores & pili, & pennæ, & squamæ reddantur, cutes enim duriores, crassioresque efficiuntur senescente ætate, resiccantur enim, & quidem senectus ipsa, ut nomen significat, terrena est, quoniam sine calore est, & cum calore humor defluit, Calui omnium maxime animalium homines aperte efficiuntur, quod genus affectionis generale quodammodo est, nam & plantarum alia semper frondent, alia frondem amittunt, Et aues, quæ certo tempore se abdunt, & latent, pennas amittunt, qualis affectus caluitium in hominibus est, quibus accidit, ut caluescant, Cum enim paulatim & frondes, & pennæ, & pili defluant, ubi uniuersum hic affectus euenit, uocabula accipit hæc, caluescere, defrondescere, depennescere, Causa autem huius affectus inopia humoris calidi est, qualis præcipue est humor pinguis, quocirca platiæ, quæ pingues sunt, fronde perpetua uirunt, sed de his aliàs, sunt enim ijs uel alia causæ huius comites affectionis, Euenit hoc platis hyberno tempore, mutatio enim hæc potior, quam ætas earum est, Animalibus etiã, quæ latent, idem tempus iactura est, sunt enim minus, quam homines natura humida, atque calida, homines autem suis ætatibus hyemem, æstatemque agunt, quam ob rem nemo ante, quam coire incipiat, caluescit, sed a uenereo coitu potius id euenit, scilicet ijs, qui sua natura sint eo propensiores, Cum enim cerebrum frigidissimum omnium corporis partium sit, tum rei ueneræ usus refrigerat, calor namque synceri, naturalisque secretio est, itaque cerebrum sentit merito prius, quæ enim imbecilla, uitiosaque sunt, causa parua, exiguaque momento immutatur, Quapropter si quis cogitet, ut & ipsum cerebrum parum calidum est, magisque talem esse obductam cutem necesse est, atque etiã magis naturam pilorum, uidelicet quanto plus ipsa caloris origine distet, recte id ita euenire existimabit, ut qui semen ferant, ea ipsa ætate caluescant, qua semen emittant, eadem causa est, & ut priore capitis parte caluescant, & ut hominibus solis omnium animalium id eueniat, quod enim parte priore cerebrum continetur, hinc ea parte caluescimus, quod autem homo maximum, humidissimumque cerebrum habet, hinc solus animalium ita afficitur, mulieres non caluent, quoniam natura earum similis puerorum natura est, utraque enim sterilis seminalis excrementi est, spadones etiam non caluescunt, quoniam in feminam mutantur, & pilos,

qui postea gignuntur, aut nō producūt, aut amittunt, si fortē habent, praterquam pubem, quam mulieres etiā habent, cum ceteris illis careāt. oblatio enim hac, mutatio de mare in feminam est. causa uero, ut quæ latent, rursus pennas recipiant, quæq; frondem amiserint, denuō frondescant, caluis autē nunquam redeat pilus, quod anni tempora illis mutationem corporis magis afferūt. itaq; pro temporum mutatione uicissitudo gignēdi, amittēdiq; sequitur, ut animalia pennas, pilos ue, plantæ frondes aut dimittant, aut recipiant. At uero hominibus per ætatem euenit, uer, ætas, autumnus, hyems. Itaq; cum ipsæ ætates non permutētur, sit, ne affectus, qui ob eas accidunt, permutentur, quanquam similis causa est, ac de ceteris pilorum affectionibus diximus ferē.

Quam ob causam homines canescant.

Caput IIII



Olorum autem causa ceteris quidem animalibus cutis natura est, ut unicolora sint, & uaria. sed hominibus nihil causæ cutis affert, nisi ad canitiem, uidelicet eam, quæ morbo, non quæ senio accidat, nam eo uitio corporis, quod uiriligo uocatur, pili efficiuntur albi, sed si albi sunt pili, cutem albedo non sequitur. cuius rei causa est, quod pili cūte exeunt. Itaq; si cutis ægrotat, extenuataq; est, pilus quoq; ægreditur. ægritudo autē pili canities est, ætatis uero illa canities inopia, & exilitate caloris contrahitur. Omnis enim ætas labitur in frigiditatē, cum iam corpus inclinatur, & consenescit. senectus enim frigida est, & sicca, de alimento autē, quod quamcunq; partem corporis subeat, ita intelligendum est, ut calore proprio concoquatur, qui cum agere nequeat, deprauetur alio, & aut repletio sequatur, aut ægritudo. sed de eiusmodi causa postea disseremus, cum de incremento, & alimento agemus. Quibus igitur hominibus natura pilorum parum calida est, plusq; humoris subit, calor proprius nequit cōcoquere: atq; ita humor putrescit, calore aëris ambiētis. sit enim putredo quæq; a calore, sed non suo, natiuoq; ut alio loco exposui. putredo autē & aquæ, & terræ, & quorumuis eiusmodi corporū fieri potest. quam ob rem terreni etiam uaporis putredinē nouimus, quæ situs uocatur. etenim situs caries uaporis terreni est. Itaq; in pilis quoq; alimentum tale, cum non concoquitur, putrescit, atq; ita efficitur ea, quæ canities appellatur: quæ alba propterea est, quod & situs unus cario-  
 30  
 forum ferē albus est; cuius rei causa est, quod multum aëris continet. Omnis enim uapor terrenus uim habet aëris crassioris, situs enim quasi respondēs pruinae existit matur. nam si uapor se effrens cōcrefcit, pruina fit. sin putrescit, situs. quapropter utraq; per summa hærent. uapor enim per summa est, & recte a poetis in comœdijs transfertur conuicio in canitiem, cum senectutis situm, pruina nō nominant: alterū enim genere idem est. uapor nanq; utrunq; est. alterū, id est situs, specie idem est. putredo enim utrunq; est. hoc ita esse indicium est, quod pleriq; per ægritudinem pili canuerint, mox ualetudini restituti nigruerint. causa est, quod per ægritudinem, ut totū corpus inopia caloris naturalis laborat, sic partes etiā minimæ eadē  
 40  
 rem in pilis etiā cruditas est, quod canitiem faciat, post uero cum conualuerint, & uires receperint, denuō mutantur, & quasi iuuenes ex senibus reddūtur, affectio- nesq; proinde mutantur. recte etiā dixeris morbum esse aduentitiam senectutem. Senectutem autē esse morbum naturalē. itaq; morbi nonnulli idem faciunt, quod senectus. tempora autem primō canescunt, quod occipit uacat humore, cum non contineat cerebrum. sin cupit uero habet multū humoris. quod autē multum est, difficile id putrescit. At in temporum pilis, nec tam parum humoris est, ut concoqui possit, nec tam multū, ut putrescere nequeat. Cum enim is locus medius inter utroq; sit, extra utrunq; affectū esse potest. causa canitiei humanæ dicta iam est.

Quam

Quam ob causam nonnulla animalia pilis, aut ijs, quæ pilorum uicē fungantur, immutentur.

## Caput V

**C**Aeteris autē animalibus, ne per eam ætatem hoc idem manifeste eueniatur, causa est eadem, quam de caluitio diximus. Parum enim cerebrū idē minus humidum habent, ut calor ad concoquendum sufficiat. Equis maxime omnium, quæ nouerimus animalium, canines innotescit, quod os, in quo cerebrū tenuius, quàm cætera pro magnitudine habeant, argumentum est, quod ictus in eo loco periculosus est, unde illud Homeri: Et quàm setæ hærent capiti, letaleq; uulnus præcipue fit equis. Cum igitur præternaturalitate ossis affluat humor, & per ætatem calor deficiat, pilī istī canescūt. Rursus etiā celerius, quā nigri canescunt, nam & rufitas, quasi imbecillitas pilī est. Imbecillia autem quæq; celerius senescunt. Grues senescentes effici nigriores aiunt, cuius affectus causa esse potest, quod pennarū natura earum albicet, plusq; humoris senescentibus ijs constituitur in pennis, quàm ut facilius putredini pateat. Canitiem autem effici putredine quadam, nec esse, ut quidam putant, ariditatem, indicium est, quod pilī, qui uel pileo, uel alio tegmine operiūtur, celerius canescūt. Flatus enim putredinem prohibent, operimentum autem flatum arcet. Iuat etiā olei aquæ misti perunctio, aqua enim refrigerat, oleum uero ne celeriter exsicceetur, prohibet, aqua enim facile resiccat. Canitiem autē non esse ariditatem, nec pilū, ut herbam exsiccatum albescere, indicium est, quod pilī nonnulli canilico oriuntur, at nullum oritur aridum, multi etiā suo extremo albescunt: in ultimis enim, ac tenuissimis capillis minimus habetur, cæteris animalibus, quibus pilī albi gignūtur, natura, nō affectu id euenit. Causa autē colorum in cæteris cutis est. Alborum enim alba est cutis, nigrorū nigra, uariorū, permistorumq; partim alba, partim nigra esse conspicitur. At in homine cutis nulla causa est. Qui enim sunt albi, admodū nigros habent capillos, causa est, quod homo omnium maxime tenuem cutem habet, pro magnitudine itaq; nihil ad pilorum mutationem cutis ualet, imō præ sua imbecillitate ipsa mutatur, & uel à sole, uel à flatu redditur nigrior, nec pilī ullo pacto cum ea mutantur, at uero in cæteris cutis uim loci præ sua crassitudine obtinet, itaq; fit, ut pilī pro cute immutentur, cutis autē ipsa nihil à flatu, aut sole afficiatur.

## De coloribus animantium.

## Caput VI

**A**Nimalium uero alia unicolora sunt (appello unicolora, quorū genus totum unū habet colorē, quomodo leones fului sunt omnes, idemq; in auiibus, & piscibus, & reliquis animalibus omnibus intelligi uolo) alia uersicolora sunt. Sed toticolora ea dico, quorū corpus totum quidem eundem habet colorem, sed nō omnium eundem, ut bos totus albus est, aut totus est niger. Alia uaria sunt, idē dupliciter: aut enim genere, ut panthera, ut pauo, & piscium nonnulli, ut quæ thrasæ uocantur, aut non genere toto, sed parte, ut boues, ut capræ interdum uariæ generantur, in auium etiā genere columbæ, & alia pleraq;. Transeunt uero toticolora multo magis, quàm unicolora, tum in colorē sui generis simplicem, ut ex albis nigra, & ex nigris alba reddantur: tum uero in mistum ex ijs, quoniam in totius generis natura inest, ne unum habeat colorē, hinc enim facile utroq; uersus mouetur, ut uicissim mutetur, & uariū efficiatur, unicolora contrā, nunquam enim mutantur, nisi per affectum, idē raro, iam enim perdidit uisa est alba, & coruus, & passer, & ursa. Accidunt hæc cum in generatione peruertuntur: facile enim moueri, deprauariq; potest, quod paruum est, tale autē quod gignitur, est. Principiū enim ijs quæ gignuntur, in paruo consistit, Aquis etiā immutantur ea potius, quæ sua natura toticolora, genere autem

uerficolora sunt. calidæ enim aquæ pilum faciunt albū, frigidæ nigrum: quomodo plantis etiā euenit. causa est, quod calida plus aëris habet, quam aquæ. Aër autem perlucens, albedinem facit, quemadmodū spumam quoque effici certū est. Vt igitur cures per affectū albæ differūt ab ijs, quæ tales natura sunt: sic pili inter se differūt, qui morbo, aut ætate, quicque natura albuerint, scilicet eo quod causa est diuersa. alteri enim calore naturali, alteri alieno albi efficiuntur. albedinem uero omnibus aër uaporosus præbet inclusus. quam ob rem quæ unicolora non sunt, uentre omnia plenius albent. calidiora etiam, suauioraque sunt omnia alba ferè eadem de causa. concoctione enim dulce efficitur: concoctio autem calore. eadem causa unicoloribus quoque, sed aut nigris, aut albis reddenda est. caliditas enim, atque frigiditas causam habent naturæ cutis, & pilorum. membrū enim unumquodque suum habet calorem. Quinetiam linguæ simplicium ac uariorum inter se differunt, atque etiam ipsorum simplicium, sed uersicolorum, ut alborum, & nigrorum. causa uero est, quod antè dixi, quod uariorū cutes uariæ sunt, alborū albæ, nigrorum nigræ. linguam autem perinde, ac partem aliquam esse exteriorem putandum, qualis manus, aut pes est, quanquam ore operiatur. Itaque cum uariorū cutis non sit unicolor, cutis quoque linguam ambientis ea ipsa causa est. Mutant colores auium nonnullæ, atque etiā quadrupedum syluestrium aliquæ per tempora anni. cuius rei causa est, quod ut homines per ætatē mutantur, sic illa per tempora. plus enim discrimen hoc in ijs potest, quam mutatio ætatis. uaria etiā magis sunt, quæ uario magis cibo uescuntur. quod parte plurima dixerim, idque recta ratione, ut apes unicolores sunt magis quam crabrones, aut uespæ. nam si cibi causæ sint mutationis, meritò ciborum uarietas facit, ut magis euariant morus, & alimenti excrementa, ex quibus & pili, & pennæ, & cures gignuntur. Ac de coloribus & pilis satis definitum sit ad hunc modum.

*De uoce animantium, & eius mutatione.*

*Caput VII*



**D**E uoce, cum animalium alia uocis grauioris sint, alia acutioris, alia firmæ, ac in utranque exuperantiam modice cōstantis: cumque etiam alia magnam uocem, alia paruam reddant, & leuitate, aut asperitate, flexibilitateque, aut rigiditate discrepent, considerandum quas ob causas hæc singula habeantur. Igitur acuminis, grauitatisque causam eandem esse arbitrandum, quam mutationis, cum minora, maioraque natū mutantur. Cætera enim omnia cum natū minora sunt, uocem mittunt acutiorem. uitulī autem bubuli grauiorē. quod idem maribus etiā, & fœminis eius generis euenit. Cum enim in cæteris generibus fœmina uocem mittat, quàm mas acutiorem (quod maxime in homine patet. hanc enim facultatē natura homini potissimum tribuit, quoniam oratione solus animalium homo utitur, orationis autē materia uox est) cum inquam cæteræ fœminæ acutius sonent, contrā in bubus est. Vaccæ enim grauius, quàm tauri sonāt. sed cuiusnam gratia, uocē animalia habeāt, & quid uox sit, & omnino quid sonus, & strepitus. partim in ijs, quæ de sensu, partim in ijs, quæ de anima differuimus, explicatū est. Cum autē graue in tarditate motus consistat, acutū uero in uelocitate, utrū quod moueat, an quod moueatur, causa sit tardī, aut uelocis, quærendum est. quidam enim, quod multū est, tarde moueri, quod parum, uelociter id moueri aiunt: eamque esse causam, ut alia uocē grauem emittant, alia acutā. quod recte aliquatenus dicitur, sed nō recte in totū. genere enim recte dici uideretur, graue in magnitudine quadam esse eius, quod mouetur. nam si hoc ita esset, paruam, eandemque grauem emittere uocem nō facile liceret: nec magnā, & eandē acutam. Videtur etiā grauitas uocis naturæ generosioris esse, nec non in modulatu grauis modulus præstātor incitato est, perfectū enim in superātia cōsistit. Grauitas autē superantia

perantia quædam est. Sed cum acutum & graue in uoce diuersa sint à magnitudine uocis, & paruitate (est enim & acuta magna, & parua grauis) simili modo medius eorum tenor ambigit. quoniam alio definienda sit magnitudo uocis, & paruitas, nisi multitudine eius quod mouetur, & paucitate: quod si definitione illa statuendum sit acutum & graue, accidet, ut eadē sint grauis, magnæq; uocis, & acuta, paruaq; uocalia, sed enim causa est, quod magnū, & paruum, & multum, ac paucum, non eodem accipiuntur modo, sed altera simpliciter, altera respectu quodam. magni uocæ enim sunt, eo quod multum simpliciter est, quod mouetur: parui uocæ, eo quod parum: graui uocæ autem, & acuti uocæ, eo quod respectu inter se habito differentiam hanc recipiunt. Nam si quod mouetur, superat uires eius quod mouet, tarde quod fertur ferri necesse est: si superatur, uelociter. Itaq; quod ualeat, interdum multum pro uiribus mouens, tardum efficit motum: interdum uelocem, si superat. eademq; ratione, quod debile est si plus mouet, quam uires patiuntur, tardum efficit motum: si parum præ sua imbecillitate, uelocem. Causæ contrarietatum hæc sunt, ne aut omnia minora natu uocem mittant acutam, aut maiora grauem, neq; mares & foeminae æque omnes aut graue, aut acutam. Ad hæc, ut & ægri acutum sonent, & qui bene ualent, atq; etiam ut senescētes uocem mittant acutiorem, quanquam senilis ætas contraria iuuenili est, plurima tamen parte minora natu, & foeminae acutæ sunt uocis, cum præ sua imbecillitate parum aeris moueant, fertur enim uelociter, quod parum est. uelocitas autem acumen in uoce est. Vituli & uaccæ partem quam mouēt, non habent ualidam, alteri propter ætatem, alteræ propter foemineæ sexus naturam. cum tamen moueant, multum graue sonāt. Graue est enim, quod grauiter mouetur, multumq; aeris tarde fertur, multū autem ea mouent, cum cetera parum moueant, quia uas, per quod primum spiritus fertur, amplum in ijs est, multumq; aeris mouere cogitur. ceteris angustius, ac parcius est. ætate autem procedente, uires ea pars recipit, quæ in unoquoq; moueat. Itaq; in contrarium mutatur, ut quæ uocem acutam mittebant, grauiorem, quam prius mittant: quæ autem grauem, acutiorem, quam ob rem tauri acutius sonāt, quam uituli, & uaccæ. Vires autem omniū neruis continentur. quapropter cum ætate florent, robustiora sunt. minus enim compacta, neruataq; sunt, quæ minora natu adhuc sunt. Item recentiorum nerui nondum intenduntur, senescentium iam laxantur: quam ob rem ad motum quoq; sunt imbecilliora. sed potissimū tauri neruosi sunt, & eorum cor ita constat, itaq; contentiorem eam obtinent partem, qua spiritum mouent, quasi fiduciam intentam. talem cordis bubuli esse naturam significatur, uel eo offē, quod in nonnullis gignitur: ossa enim naturam neruorū requirunt. Execta omnia in foemina mutantur. & quoniam uires neruosa in suo originali principio laxantur, similem foeminis mittunt uocem. laxatio uero similis sit, ut si quis fides intendens adhibuerit pondus, quod annexum reddat cōtētiore, quomodo textrices faciunt, quæ cum stamina distēderint, annectunt quas leuas uocant. ita enim natura quoq; testium annexa meatibus feminalibus depēdet, qui meatus ex uena tendunt, cuius origo ex corde est, iuxta ipsum principium, quod uocē moueat. quam ob rem meatibus feminalibus immutatis, ad eam qua semen excernere possunt ætatē, pars illa quoq; una cum ijs immutatur, qua immutata, uox etiā mutatur, maxime scilicet maribus. sed foeminis etiam idem accidet, quanquam obscurius: quod quidam hircire appellant, cum uox mittitur inæqualis. post uero restituitur in sequētis ætatis grauitatem, aut acumen. Sublatis igitur testibus, tentio quoq; meatuū laxatur, quomodo in fiduciala & stamine sublatō pōdere. laxatis his, principium, quod moueat uocem, eadē ratione laxatur. Causa hæc est, quam ob rem execta mutantur in foeminā, tum uoce, tum etiam reliqua forma: quoniam ita accidet, ut principium laxetur, ex quo intentio

corporis est, non ut quidam existimant, quod testes ipsi copula sunt multorum principiorum, sed parua mutationes causam afferunt magnarum mutationum non sui ratione, sed cum euenit, ut principium una cum ijs ipsis mutetur. principia enim quamuis magnitudine parua sint, tamen facultate sunt magna, hoc est enim principium esse, ut ipsum quidem causa sit multorum, sed ipsius nulla sit superior causa. Caliditas etiam, aut frigiditas loci confert eodem, ut natura tale constitutatur animal, quod aut grauem, aut acutam uocem emittat. Spiritus enim calidus crassitudine sua grauitatem efficit uocis: frigidus pra sua tenuitate contrarium facit: quod uel in tibijs patet, qui enim calidiores utuntur spiritu, & talem emittunt, qualem suicines, & lamentantes, grauiorem sonum inspirant tibijs, asperioris autem uocis, aut leuioris, 10 omnis denique huiusmodi inaequalitatis causa est, membrum, instrumentumque per quod uox fertur, cum aut asperum est, aut leue: denique aut aequale, aut inaequale, constat hoc ita esse, cum aliquid humoris in arteria inest, aut asperitas affectu aliquo fit: tunc enim uox redditur inaequalis, flexilis autem uocis, instrumentum molle causa est, ut rigidae durum. molle enim parcius dispensari potest, & uarium fieri, durum non potest. & molle quidem tam magnam, quam paruam reddere uocem potest, & proinde tum grauem, tum acutam. facile enim spiritum dispensat, ipsumque de facili magnam, paruumque fit, quod autem durum est, indispensabile est. De uoce igitur, quae non ante differuimus, cum de sensu aut de anima ageremus, huc habeant modum.

*Quare dentes à natura constituti sunt, & cur partim decidant, denuoque nascantur.*

*partim autem non,*

*Caput VIII*



DE dentibus non rei unius, aut eiusdem gratia animalia eos habere omnia, sed alia ad cibum, alia ad uocis orationem, dictum antea est. sed cur priores gignantur primo, maxillares post, & hi non decidant, illi decidant, ac denuo nascantur, hanc rationem disputationi de generatione cognatam esse putandum est. Differuit igitur de his & Democritus, sed non bene. non enim omnibus consideratis, causam reddidit uniuersim. Ait enim decidere, quoniam properant, & ante tempus oriuntur. nam ad aetatem penes florentem enasci per naturam debere. causam autem ut ante tempus gignantur, usui 30 tribuit lactis, & sus lactet, qui tamen dentes non amittit. & quare dentes habent serratos, omnia lactent, quanquam nonnulla eorum non amittunt nisi caninos, ut leones. hoc igitur ille errauit, exponens uniuersim, cum id non animaduertisset, quod in omnibus eueniret. At agere ita oportet, qui enim differit uniuersim, ac de omnibus dicat, necesse est. Sed cum naturam ita subiiciamus, scilicet ratione ducta ex ijs, quae cernimus, ut neque deficiat, neque frustra agat quicquam in singulis quoad eius fieri potest, quare autem cibum assumere debent post lactis usum, instrumenta habeant necesse sit ad cibum conficiendum: si ita eueniret, ut ille dicit, ad pubertatem, natura profectio deficeret agendo rem, quam facere posset, atque opus naturae fieret praeter naturam. Violentum enim praeter naturam est. Generationem autem dentium euenire uiolenter asseuerat, sed hoc uerum non esse apertum ex his, alijsque huiusmodi rationibus est. Oriuntur autem prius ijs, quam lati, quod & officium eorum prius est. Secatur enim prius, quam molitur, quod comeditur. sunt autem illi molendi officio delegati, hi uero secandi. tum enim quod res minor, etsi simul inchoatur, tamen celerius solet perfici, quam maior. Minores autem primores, quam maxillares sunt. nec non maxillae os à latere latum, in ore angustum est. Itaque ex ampliore plus alimenti affluere necesse est, ex arciore minus. lactis autem usus ipse nihil confert, quanquam lactis calor faciat ut dentes ijs oriatur, indicium est, quod & ipsorum lactentium infantes qui calidiores utuntur lacte, ocyus dentiunt, calor enim uim obtinet augendi. Decidunt qui prodierint 40 primi,

primi, tum notæ melioris gratia, tum necessariò, melioris ratione inquam, quod citò hebetescit quod acutum est. Itaque alteros succedere in officium oportet. lati autem non hebetantur: sed tempore duntaxat attriti leuigantur. necessariò uero decidunt, quod maxillarium radices in lata nituntur maxilla, & ualido osse continentur: primorum autem in tenui, unde fit, ut infirmi & mobiles sint. nascuntur autem denuò, quod in osse adhuc nascète oriuntur, & cum tempus adhuc est ad dentium generationem idoneum, cuius rei indicium est, quod maxillares diu oriuntur. Vltimi enim uicesimo anno exeunt, nonnullis etiam senescentibus omnino prodierunt, qui loco ultimo habentur: quoniam multum alimenti in amplitudine ossis continentur. At uero prior pars ossis præ sua tenuitate citò perficitur, nec excrementum in eo fit, sed in debitum incrementum absumitur alimentum. Democritus uero missa ratione, cuius causa agatur, omnia referēda censer ad ea quibus natura utitur, quæ talia quidem sunt, sed alicuius causa, & notæ melioris gratia sumuntur. Itaque nihil prohibet, quo minus ita dentes fiant, & decidant: sed non propterea, sed propter finem. hæc autem ipsa causæ sunt, ut mouentia, & instrumenta, & materia. Nam & spiritus magna ex parte agere consentaneum, ut instrumento est. ut enim nonnulla artium instrumenta utilia sunt ad plura, uerbi gratia in excusoria malleus, & incus: sic in rebus à natura institutis spiritus uarium exhibet usum. simile dici uidetur, cum causas necessariò esse dicunt: ut, si quis propter cultellum tatummodo aquam exisse ijs qui intercutere laborāt, non etiam propter sanitatem, cuius causa secuit cultellus, existimet. Sed de dentibus cur partim decidant, ac denuò nascantur, partim non: & omnino quam ob causam fiant, dictum est, dixi etiam de cæteris membrorum affectibus, qui non alicuius causa, sed necessariò ueniant, & quam ob causam, uidelicet eam cui motum tribuimus.

## LIBRORVM DE GENERAT. ANIMAL. FINIS.



## ARISTOTELIS

DE COMMVNI ANIMALIVM GRESSV, LIBER,  
INTERP. PETRO ALCYONIO.



DE PARTIBVS quæ usui animalibus sunt ad motionem per locum ciendam differendum, cur quæque talis habeatur, & cuius rei causa ipsæ ipsis affixa sit. De differentiis item habebitur oratio, quæ explicentur inter partes unius eiusdemque animalis, & inter partes cæterorum animalium, quæ specie inter se differant. Sed initio ea proponamus de quibus uerba facienda sint. Primum igitur eorum est, quot minimum signis animalia sese moueant: mox quam ob causam sanguine prædita quaternis, illo uacua pluribus agantur signis. & generatim, cur alia nullis fulciantur pedibus, alia bipeda, alia quadrupeda, alia etiam multipeda sint, & quam ob rem omnia paribus subniantur pedibus. de ijs lo

loquor quæ pedibus insistent, & omnino quibus moueantur signis, ut paribus instruatur pedibus. Iam uero quid causæ sit, quare homo, & aues bipedes, pisces pedibus nudati formetur, atque etiam homo, & aues, quanquam bipedi habitu finguntur, tamen flexus cruribus aduersos agant. Siquidem homo in ambitum crus inflectit, aues in cauum. Idem etiā homo sibi ipsi tum crura, tum brachia contraria detorquet, nam brachia in cauum, genua in ambitum contrahit, item quadrupeda, eademque uia uipara contra quam homo faciat, crura inflectunt, atque etiam illa contrarium sibi ipsis nauant motum, genua enim in ambitu conuexa, suffragines in caua adducunt. Præterea de quadrupedum genere, quæ non utero à uiuis paribus adduntur, sed quæ ouo excluduntur, crurum inflexus præcipue obliquat, & in latus detorquent. Item 10  
quam ob causam omnibus quadrupedibus motus per transversum cieatur. Causæ igitur horum omnium, & cæterorum, quæ naturam cum his ipsis cognatā habeant, exponendæ sunt. Hæc uero sic fieri solere, quamuis in cōmentarijs qui naturam animalium complectuntur, testatum reliquimus, tamen nunc differendum est, cur ita de illis statuatur. Ac disputatio quidem hæc, ab eo initio repetenda uidetur, quod ad res naturæ, uia, & ratione demonstrandas usurpare cōsueuimus, atque interim proponemus quæ hoc se habent modo in omnibus naturæ operibus, illorum autem unum est, naturam nihil frustra moliri: imò semper id machinari, & efficere, quod optimum sit de ijs, quæ pertinere possint ad statum cuiusque generis animalium. & res\* quidem se habent per naturam ob potiorē rationem, quam ipsa natura eximiā 20  
fecerit, iam uero quæta, & quales magnitudinis dimensiones, & quibus attribuatur, proponere cōuenit. Hæc quidem sex enumerantur, sed tria paria conficiuntur, unum quod summum, & infimum: alterum quod ante, & ponē: tertium quod dextrum, & sinistrum contineat. Præterea initia motionū, quæ per locum obeuntur, esse tum pulsū, tum tractū. itaque hi per se aguntur, ex accidenti autem id quod agitur, ab alio mouetur, nam idem ab eodem moueri non uidetur, imò id quod ab aliquo agitur, pulsū agitur externo. His præscriptis ac explicatis, trademus quæ proxima habeantur. Animalium igitur, quæ per locum se mouent, alia in summa toto corpore id præstant, ut profluentia: alia per partes, ut ingredientia omnia. Sed in utroque motionis genere ipsum mobile, re, quam subditam habet, se susten- 30  
tans semper mutatur. Quapropter si eiusmodi res celerius subtrahatur, quam id, quod in eo se moturum est incubare, innitiq; possit, aut si nullus omnino contrarius detur conatus, profectò nihil in eodē se ipsum mouere poterit. Nam id, quod profluit, cum superiore parte in se ipsum innitatur, & in pedum stratum inhæreat, saltum agit. & eo quidem magis, quod partes mutuum in flexuris rensum habent, atque  
omnino tale est id, quod comprimit, præ eo, quod comprimitur. Quinque igitur halteribus utraque manu comprehensis maiorem & concitatiorem saltum ædunt, quam non cōprehensis. & qui currunt obquatiendis manibus celerius currunt, quoniam in ea diuicatione, & explicatione tum in manus, tum in brachialia innituntur. At uero id, quod motu exercetur, semper ex duarum ad minimum par- 40  
tium usu, quæ instrumētariæ sint, mouetur, ut quasi altera comprimatur, altera cōprimatur. nam id, quod quiescit, cōprimatur, quia pondus sustinet, cum id, quod effertur, unā cum eo, quod sustinet pondus, prorsum impellatur. & ob eam rem quæ instrumentarijs partibus caret, ad hunc modū se mouere non queunt, propterea quod distincta partium agentium & partium descriptione uacant. Sed cum sex dimensiones cōstituuntur, quibus animalia suapte natura distingui possint, summum & infimū, ante & ponē, dextrum & sinistrū, pars summa & infima omnibus, quæ uitam adipiscuntur, tribuitur, quandoquidē non solum animalia, uerum etiā stirpes in utraque excurrunt, quāquam non solum munere, sed planē etiam positione, &  
situ

πενταβλοι,  
id est quinque  
tiones. quid au-  
tem sit pentas-  
tblū, uide apud  
Festum Pomp.  
Halteribus,  
id est lapidibus  
saltatorijs, ut  
habet antiquus  
interpret.



situ inter se differāt, si ad tellurem, & cœlum respectum habeas. Summa enim pars omnibus uita prædit est, per quam cibus recipitur, & accessio adiūgitur, infima autem, ad quam postremo accedit, ac partim initium quoddam, partim exitus patet. Summa tamen pars initium est. Atqui pars infima potius, ac nobilior initium in stirpibus uideri poterit, præsertim cum non eodem situ partes summæ, & infimæ in illis quo in animalibus disponantur. Sed quâquam similitudine uniuersi idem minime respōdeat, munere tamē quo funguntur, idem omnino respōdet. radices enim stirpibus pro summa parte sunt, cum succus ijs, quæ è terra oriuntur, inde dispēsetur, & illum ipsum radicibus perinde trahant, ut animalia ipsius oris hiatu. Itaq; antè & 10 ponè non modo adscribitur ijs, quæ uiuunt, uerum etiā ijs, quæ animalia sunt, quâdo hæc omnia sensu uigere intelliguntur. & illius opera antè à ponè disungitur, propterea quod unde origo sensus ducitur, & quò dimanat, hæc ipsa ut priora, opposita ut posteriora signantur. Sed animantibus ijs, quæ nō modo sensus participes sunt, sed per locū etiam per seipsas moueri queunt, dextrum & sinistrū ita assignatur, ut paulò ante diximus, hoc est utrunq; disclusum, ac munere descriptū, quod obiturae sunt, non situ. itaq; dextrum cuiq; est, unde primordia motus per locum natura ipsi corpori trahantur, sinistrum, quod oppositū est, & ad illud consequendū suapte natura propensum est: etiam si hoc ipsum de animalibus alia distinctius, quàm alia indicent, nam ratio dextri, & sinistri proposita magis declaratur in ijs, quæ instrumētales 20 obinētia partes, ut alas, ut pedes, & alia id genus instrumēta, per locum sese agitant. quæ etiā non his partibus, sed suo ipsorū corpore intercapedines indicētia progrediuntur: ut de pedum experibus nonnulla, quales serpentes, erucæ, & præterea quæ terræ intestina appellant, id quod de dextro, & sinistro scriptū reliquimus, sibi euenire demonstrant. quanquā res non ita nota pateat & illustris. Motionis item originem trahi à dextra parte argumēto sunt omnes, qui sinistra solent onera baiulare. ita enim gerulus soluto motore ac distincto facile moueri potest. Quapropter sinistrae sunt sustentantes facilius unctos supersiliunt utres, quandoquidē dextra mouere, sinistra moueri apta est. ob eamq; rem onera non parti mouenti, sed mobili imponi debent. Quod si mouēti, & loco ei imponatur, unde motus proficiscitur, impulsus 30 uel nullus omnino, uel difficilior agetur, & grauior. Pedum etiā proiectiones in cursu indicio sunt motus initia à dextra duci parte. siquidē omnes sinistram proijciunt, atq; stantes, & in sublime erecti eandem magis proiexisse uidētur, nisi fortuito aliter cōtigerit, nec enim parte porrecta, sed cōtracta motus ille nauatur. Dextra etiā defensio sit, ac propterea dextræ partes omnibus eadē afformantur, unde enim primū oritur motus, idem uniuersis est, atq; etiam secundū naturam in eodem loco situm, positionemq; obtinet suam. Dextrum autē est, unde primū motus emanat. quam ob rem turbinata è genere eorum, quæ ad saxa natiuis testis adhærescunt, omni ex parte dextra sunt. in anfractum enim, aut clauiculam non uoluunt, sed in aduersum progrediuntur omnia, ut purpuræ, ut buccinæ. itaq; cum omnia à dextris mo 40 ueantur, & illa in seipsa globo circumagantur, dextras omnes partes æque descriptas habeāt necesse est. At homines præter cætera animalia sinistra distinctam obtinent, & agilem, quoniā maxime omnium ipsi secundū naturam fingantur. Dextra autem pars & abiuncta potior est sinistra. idcirco dextræ partes in hominibus maxime tales sunt. quæ quidē cum distinctæ sint, ratione optima leuæ rigidiusculæ subeunt, & ab ijsdem ipsi abiunctæ maxime pendent. Reliqua etiam initia per naturā descripta, & abiuncta in hominibus potissimū disponuntur. summam dico, & priorē partem, sed in quibus summa pars à priorē distrahitur, ut in hominibus & auibus, hæc bipeda formantur. Ad bina autem de quaternis reddēda signa, alteris alæ, alteris manus, & brachia adiunguntur, cum quæ ad idem priorē, & summā agent partem,

quadrupeda, multipeda, & pedibus nudata uiuant. Siquidem nomine pedis appello partem, qua in terrestribus animalibus nota exprimitur, quotiescūq; per locum se mouent, uidetur enim pedes à pedo, hoc est solo nominati. Nec uero defunt quæ partem tum priorem, tum posteriorem in idem omnino detorqueant, ut mollia, & quæ ex testatis turbinis specie formata existunt, de quibus alio loco supra differuimus. Sed cum loca tripartito distinguantur, in summum, infimum, & medium: bipeda summum ita obtinent, ut æditæ parti ipsius uniuersū respondeat, multipeda, & pedibus cassâ mediæ, stirpes infimæ. Cuius quidem rei causam afferimus, quod stirpes ipsi terræ immutabili hæsu affiguntur. At summa pars præ cibo est. Stirpibus è terra uictus petitur. Quadrupeda autem, & multipeda, & nullis pedibus subnisa ideo summum locum in medio tenent, quod celsa, atq; erecta fabricatione priuentur. Bipeda eum summæ parti respondentem habent, quoniam erecta in sublimem se attollunt, imprimisq; homo qui secundum naturam celsus, ac erectus constituitur. Quare cōsentaneum est ab his ipsis partibus initia duci, præsertim cum initium nobilius sit, summum autem infimo, prius posteriori, dextrum sinistro nobilius habetur. Sed bene est permutato etiā ordine idem probare. Nam quia initia his partibus redduntur, idcirco hæc oppositis nobiliora sunt, motionem à dextra oriri ijs quæ tradidimus, planum fecimus.

SED quoniam necesse est cuiuscq; corporis cōtinui, cuius altera pars mouetur & altera quiescit (id intelligo quod totū moueri potest, altera parte quiescente, quatenus utraq; contrarijs motibus impellitur) commune quiddam esse, quo illæ inter se ductæ perpetuo cōmitantur, atq; eo loci principium statui motionis, & pariter quietis utriusq; partis, cōstat, per quæcūq; dicta repugnantiæ genera, proprius utrarūq; aduersarū partium motus agitur, omnia hæc unum commune habere principium, per quod partes, quas diximus cōnectantur, partes inquā dextras, & lauas, summas & infimas, priores & posteriores. Itaq; in eo, quod sibi ipsi motū affert, nulla eiusmodi summæ, infimæq; partis distincta descriptio est, tum quod motus naturalis à nullo retrouersum cieatur, tum etiā quod mobile nullo modo distinguitur in mutatione quæ utroq; uersum fiat. At dextræ & sinistræ, summæ & infimæ partis notatur distinctio. Quæcūq; igitur animalia instrumentarijs usa partibus progrediuntur, partis prioris & posterioris discrimine illas discretas non habent, cum reliquæ ambæ signentur, & primū discrimen dextrum, & sinistrū separans non desideretur, propterea quod discriminē statim in binis necessariò, in quaternis uero præcipue notatur. Cum igitur summū & infimum, dextrum & sinistrū in eadem, cōmuniq; origine inter se cōnectantur (eam designo, quæ princeps motionis est) oportet in singulis, quæ per locum à quouis horum motum cient, præscriptā quodam modo, & definitā esse omnium propositorū motuū causam, idq; interuallis ex principijs expositis, quæ in hisce partibus situ tum cōtrario, tum eodem disponantur, atq; illa est, cui cōmune quocq; principii mandatur, unde animali motus uel dextrorsum, uel sinistrorsum, & pariter uel sursum, uel deorsum agatur. item quodcūq; similiter hoc retineat oportet, ut quoduis principium quod in partibus, quas cōmemorauimus, inest. Cōstat igitur motionē per locum aut solum, aut maxime ijs animalibus obiri, quæ uel binis, uel quaternis notis per locū moueantur, ut, cum id tale ferè sanguinem obtinentibus potissimū eueniat, perspicuū sit nullum sanguine præditū animal pluribus, quàm quaternis notis posse motu citari, atq; si tali notarum numero duntaxat motū nauare suapte natura aptum est, illud necessariò sanguine cōstare. Quæ etiā ipsis animalibus eueniunt, ea cōprobant quæ demonstrauimus. De sanguine enim præditis nullum in plures dissectū partes, ut ita loquar, protrahere uitā potest, quod particeps esse nequeat motus per locū, quem iam antè exequabatur, cum

cum totius integritate cōtinuum, & minime diductum esset. Contrā de exanguī ac multipedū genere quādam habentur quæ præfecta singulis partibus diu uiuere possint, & non dissimilem ei motum agere, quem antē, quā id paterētur conficiēbant, ut quæ cētipedes uocātur, & reliquæ insecti generis animātes, etiā si prælongæ formētur, quippe cum harū omniū posterior etiā pars in idem, quod prior, gressum tentat. causa inde ducitur, cur dissectæ uiuāt, quod perinde quæcūq; illarū constituta est, ut res cōtinua, quæ multis ex animalibus coaluerit. Hoc autem quam ob rem ita habeat, ex ijs, quæ paulō ante disputauimus, cōstat. Etenim quæ per naturā potissimū constituitur, ad suos ipsorū motus ciendos binis, aut quaternis notis apta sunt. quod idem in ijs probatur, quæ ex sanguinē adeptis, pedibus carēt. Hæ enim quaternis impelluntur signis, per quæ motū cieāt, quia maxima ē parte flexuosum geminātes impulsū procedunt. dextrū enim & læuum, prius & posterius in latitudine exprimitur, hoc est in utroq; flexuoso impulsu. In parte quidē capiti proxima prior nota, dextrum & sinistrū declaratur: sed in parte quæ in caudā definit, posteriores designātur notæ. attamen binis moueri signis uidentur parte tum priore, tum posteriore in reptationem sese distēdentes. Huiusce rei causam breuitas corporis, quæ in hoc animalium genere perlatum consumitur, præbet, cum in illis planē, ut in quadrupedibus dextra dux motus sit, & per posteriora compensatio fiat. Longitudo autē flexuosos illos impulsus facit, ut enim procerosi homines cernui, & obstripi incedūt, & dextro humero in priorē partem uergente, sinistra coxa in posteriorem magis reclinat, & mediū tum cauatur, tum incuruatur: ita serpētes per summam telluris sese curuantes & flectentes, reptare intelligēdæ sunt. Atq; documento illo constat eas similiter moueri, ac quadrupeda. nam cauum, & deuexū uicissim transferuntur, cum enim læua pars priorum dux sit, cauum ē cōtrario redditur, propterea quod dextrum introrsum denuō subit. atq; dextri prioris nota sit in A, sinistri in B, posterius sinistrum in C, dextrū in D. Ad hunc certe modū ex terrestribus serpentes, ex aquatilibus anguillæ, congrī, murenæ, & reliqua serpentis faciem referentia ludunt. Sed tamen in aquatilibus aliquot habētur, quæ nihil talē habent, quales pinnulæ sunt, ut murenæ, quippe quæ perinde in mari agitantur, ut serpentes in terra & mari. serpentes enim eodem natant modo, quo in sicco reptant. Neq; uero desunt quibus pinnulæ duntaxat binæ applicentur, ut congris, ut anguillis, ut mugilibus, qui in lacu Sipharum nascūtur: ob eamq; rem, quæ uitam in terra agere consueuerunt, ut anguillæ, minus flexuoso corporum impulsu in humore, atq; in terra exaquant notas. Causa cur serpentes nullis pedibus innitantur, ea reddi potest, quod natura nihil frustra machinatur: imō uero in omnibus quæ fieri possint, semper ad optimum respiciat, & priuatū cuiusq; rei statum, & id ipsum, quod in omnibus quid res sit dicunt, conseruet. Accedit, quod antē etiam proposuimus, de animalibus ijs, quæ sanguine fouentur, nullum pluribus, quā quaternis signis posse motum nauare. Per hæc igitur planum factum est, nullum inter ea sanguine prædita, quæ per longitudinem ueri commensus expertia sunt præ alia corporis natura, ut serpentes, pedibus augeri posse, hæc enim plures, quā quaternos pedes habere non queunt. sin minus, sanguinis expertes forent. Quod si binos, aut quaternos sulco subditos haberēt, omnino ferē immobilia iacerent, adeo necesse esset motum illorum tardum, & ad nulla uitæ cōmoda aptum esse. Omnia quæ pedibus augentur, illos ipsos pares necessariō tenēt. quæ enim per saltum sese per locū mouēt, nullum pedum ministeriū ad eiusmodi motionem desiderant. At quæ saltu utuntur, & gressus insuper indigent, cum illis saltus satis non sit, certum est alteris eorū melius esse, alteris facultatem omnē eripi ingrediēdi. Quam ob rem cuiq; animalī necesse est paribus instrui pedibus, cum enim talis motus per partes, non in summa

toto corpore fiat, qualis saltus est, alteris quidē partibus necesse est quiescere per agitationē pedum, alteris uero impelli, & oppositus illarū utrunq; præstari, cum à mobili parte ad quiescentē traducitur pondus. idcirco nullum aut ex trium pedum usu, aut ex unius tantummodo ingredi potest, hoc enim nullo fulcitur firmamēto, quo corporis pondus sustineatur, illud autem labore aggrauatur per alterū oppositū firmamentū, quapropter necesse est id ipsum collabi, cum uires ad motum sic agendū intenderit. Pluribus uero pedibus constantia, ut centipedes, possunt uel imparibus pedibus ingressum corporis sustinere, ut nunc etiam uidentur, si pedum detrimento illæ afficiantur, propterea quod mutilatio pedum cōtraria serie annexorum, reliquæ frequentia pedum, qui utrinq; protenduntur, quasi medetur. & eo quidē magis, quod alijs non gressus, sed quasi tractus partis decurtata sit. Attamē nemini dubium, quin hæc etiam ipsæ commodius se mouerent, si paribus corroborarentur pedibus, nulliusq; defectum perpererentur, quā si pedibus cōtraria serie sibi respondentibus sustinerentur. ita enim possent cum eorum pondere magis adæquare, nec tanquam lance æqua in alteram partem magis præponderare, si firmamenti cōtraria serie sibi respondentibus fulcirentur, & alteram sedem à pedibus ē diuerso subditis uacuam non haberent. id autem quod ingreditur uicissim ab utraque parte procedit: nam ita in pristinum situm sit restitutio.

EXPOSVI animātibus omnibus pedes pares subdit: atq; etiā causa, cur ita fieret, explicata est. Verū ex ijs quæ edisseremus patebit, neq; flexionē, neq; natatū, neq; directionē ullam agi posse, nisi quid ociosum iaceat. nam flexio nihil aliud est, quā mutatio, quæ ex directo uel in orbē, uel in angulum agatur, directio, quæ ex alterutro eorū in directū procurrat. At necesse est in omni eiusmodi mutationū generare flexionem, aut directionē ad unum procumbere signum: & eo quidē magis, quod nisi nodus flecteretur, nec gressus, nec uolatus, nec natatus fieri posset. cum enim pedibus aucta utroq; obuierorū crurum ordine uicissim & consistant, & pondus gestent, necesse habent altero progrediēte alterius nodum flectere, propterea quod superiora, & inferiora corporis mēbra cōtrario ordine formata magnitudini paria respondent. atq; etiā subdita ponderi pars tanquam perpēdiculum ad terram demissum erecta consistere debet: quādoquidē in progressionē diuarcatur, & extenditur, & tum magnitudinē ociosam, tum id, quod mediū interiectū est, ferre potest. Sed cum superiora, & inferiora mēbra æqualia sint, necesse est ociosam partem nodum flectere, uel in genu, uel in parte, quæ unā flectatur, ut si de animalibus quæ ambulant, aliquod genu careat. Ex eo nimirū documentū capitur, rem ita se habere, etenim si quis per terrā ambulans ad parietē adhærescat, profectio linea, quæ designatur, non recta, sed obtorta erit, quia partis flectentis linea breuior euadit, cum quæ consistit, & effertur, porrectior ducatur. Verūtamen accidit motum præstari, etiam si nullus cruris inflexus agatur, quemadmodum pusiones serpente uidemus. Quinetiā elephāti ita se mouere diuturna hominū fama celebratur. quæ tamē falsō cōfirmata est, cum id genus animalium inflexu uel in scopulis opertis, uel in cluni bus adducto sese moueāt. At nullū erectū, & stans cōtinenter, & tutō incedere potest, quia perinde se mouebit, ut palæstritæ, qui per puluerem in genua subfidentes procurrunt. Magna enim pars superne aggrauat. ideo par est maiora adhiberi crura. quod si hæc dentur, nodus etiam inflectatur necesse erit. Sed cum erectum consistat, si pars, quæ prorsum mobilis est, rigida sit, uel cōstitutum extra perpēdiculum cōcideret, uel non progredietur. si enim altero crure erecto, alterum progreditur, maius erit cum æquale omnino sit: quandoquidem hoc ipsum tum crus quiescēs, tum nodum, qui subintenditur, gestare poterit. Ergo per id tempus, cum alter pedum progreditur, necesse est quiescentem inflecti. & simul quia hic inflectat, necesse est alterum

alterum extendi, superiora enim & inferiora corporis membra æquis lateribus triquetram efficiunt figuram; & caput in infimum magis deprimitur, cum perpediculum eum attigerit locum, cuius est basis. De pedibus uacuis alia quasi undantia, siue fluctuantia procedunt; idq; dupliciter accidit. quædam enim flexuosis impulsibus per terram obrepant, ut serpentes. quædam ultro progressum moluntur, ut erucæ. Fluctuatio porro ipsa flexuosus est impulsus. Alia uolutationibus utuntur, ut quæ terræ intestina uocantur, & hircines. Siquidem hæc præcedente parte progrediuntur, & reliquum corporis ad eandem ipsam cōducunt, atq; ita certis abiuncta sedibus uagantur. Ex his perspicue intelligi licet animalia fluctuantia nullo modo posse motum exercere, nisi flexuosus impulsus, idemq; duplex simplici maior sit. per impulsus enim illum flexuosum eundem que extentum nunquam progredierentur, si æqualis esset. At ut nos statuimus, extentus omnino superat, & parte ociosa relicto animalis conducitur. Sed tamen in quocunq; superiorum mutationū genere id quod mouetur, nunc extentum recta progreditur, nunc unā inflexum cum præcedentibus partibus dirigitur: cum subsequenter autem unā inflectitur. Saliencia omnia in terra flectuntur. quo etiam modo quæ uolant, & quæ natant, saliant. altera enim per productas & contractas alas uolant, altera per pinnulas agitas natant; quorum alijs quaternæ, alijs binæ ingenerantur, ut longiore corporis habitu formatis: quales anguillæ sunt, quia motum qui superest, loco binarum pinnularum reliquo corporis impulsu, eodemq; flexuoso, ut præcepimus, conficiunt. Piscium de genere planorum, alij loco binarum pinnularum ampla corporis latitudine utuntur, alij binis pinnulis id præstant, cum qui plani omnino sunt, ut raia, ipsis pinnulis, & extremis corporis rotundationibus sese dirigentes & flectentes natent. Sed in dubium fortasse, & contentionem uenire poterit, quonam modo aues quaternis sese moueant notis, utrum uolantes an ambulantes: præsertim cum exposuerimus quæ sanguinem obtinent, omnia quaternis moueri signis. At hoc dictum non est, imò non pluribus eadem moueri affirmauimus. Quinetiam sillarum crura utraq; de coxa truncantur, nullo pacto uolare poterunt. nec contrā, si alæ ex scopulis operis eximantur, facultatem ambulandi ullam habere poterunt, cum ne homo quidem incedere possit, nisi humerorū motus adiuuet, per inflexionem autem & intentionem omnia mouentur, ut docuimus. Nam in rem aliquandiu subiectam, & quasi sensum cedentem progrediuntur. Quapropter, nisi beneficio alterius partis flexura adducatur, quam unde primum ortus proficiat, integrā pinnam habentibus pinnæ, a uibus alæ, cæteris, ut piscibus, pars necessaria est, quæ proportionem cum superiorum animalium partibus tueatur. in quibusdam tamen, ut in serpentibus, principium flexuræ signatur ex spiris, & corporis inuolucris. Vropygium perinde uolucris ad dirigendos uolatus affigitur, ut nauigijs gubernacula: atq; etiam illud, quæ parte cum cute coalescit, flectant necesse est. & ob eam rem quæ pinnam integram, aut discretam habent, uropygium ad eiusmodi usum inaptum habet, ut pauones, ut gallinæ. & omnino quæ uolaciam non sunt, directum cursum conficere nequeunt. Siquidem integram habentia pinnam, ut rem simpliciter ratione complectar, uropygio carent: quod idem causæ est, quare tanquam nauigium temone priuatum, agitentur, & quocunq; fors tulerit, allidunt & impingant. Idem quoque sentiendum est de ijs quæ pinna in uaginam inclusa instruantur, ut de scarabeis, de gallerucis, & de ijs, quæ alis nudis, & nulla omnino crusta munitis prædita sunt, ut de apibus, de uestispis. Atqui nonnulla etiam ad uolatum minus propensa uropygium suis commodis parum aptum receperunt, ut porphyrones, ut fulicæ, uel potius ardeolæ, ut ad nandum aptæ aues. imò uero hæc loco uropygij pedes protendendo uolant, & ad uolatum dirigendum crurum

utuntur ministerio. Volatus earum, quibus integræ alæ explicantur, deses, & imbecillis est: quia alarum naturam ex proportionem ad gravitatem corporis non habent, imò corpus plenius est, & alæ parvæ, ac imbecilles adiunguntur, & non aliter hæ uolatu utuntur, quàm si nauim onerariam remis agere coneris, atq; etiam alarum imbecillitas, & ea quidem à primo naturæ ortu contracta, non nihil ad eiusmodi tarditatem probandam pertinet. inter aues pauoni uropygium aliquando propter magnitudinem nulli usui est: aliquando nihil opis utilitatisq; affert, quoniã deciduum est. & aues quidem pinnarum naturam aduersam habent, ijs, quibus integræ adhibentur alæ, imprimisq; eæ, quæ celeri uolatu uitam agunt, quales uncungues, his enim ipsius uolatus pernecitas ad uitæ officia præsidio est. Membra item corporis reliqua proprie illarum motioni conformantur: caput enim paruum omnibus impostum, collum non admodum succi plenum, crassumq; subest, pectus tum ualidum, tum acutum propendet, acutum, ut contentius uiam sibi parare possit, quasi rostrata nauigij prora, quod speciem lembi præbeat, ualidum, ob circumnascens carnem copiam, ut aërem occurrentem ac incidentem queat propulsare, idq; facile, nec uiribus fatigatis, quæ à tergo partes adiunguntur, leues sunt, in arcumq; coeunt, ut melius eas subsequi possint, quæ à fronte præceduntur, quippe cum liberiores ex latitudine non trahant aërem. Hæc ita. Et planum quidem iam fecimus, animal, quod erectum ingressurum est, bipes necessariò esse, atq; etiam superiores corporis partes leuiiores habere, & inferiores grauiiores subdi, quia hoc duntaxat modo suam ipsius molem facile sustinere potest. Quapropter cum animalium omnium unus homo celsus, atq; erectus fingatur, crura superioribus partibus respondentia proportionem maxima, & firmissima omnium quæ pedibus insident, habet. Hoc autem ipsum ea planè res declarat, quæ pusionibus euenire solet, siquidẽ hi erecti incedere non queunt, propterea quod in pomilionis habitum delabuntur omnes, & summas partes auctiores robustioresq; infimis tenent, sed procedente ætate ad infimas accessio adiungitur, donec ad iustam perueniant magnitudinem, atque tum in uestigio stare, & incessum erectum peragere queunt. Aues cum leues gignantur, bipedes sunt, quoniam pondus illis ex auerso accubat, non aliter, ac equis, quos ex ære fingunt prioribus cruribus sursum uersus elatis. Illud potissimum causæ est, quam ob rem bipeda erigere se ac stare possint, quod clunem femori similem habent, & talem, tantumq;, ut duo femora tenere uideatur: alterum in crure ab ipso inflexu productum, alterum ad hanc partem directâ formatione à sede protectum, quod planè non femur, sed clunis est. & eo quidem magis, quod aues bipedi habitu non procrearentur, nisi tantus afformaretur, femur enim, & reliquum crus directum à coxa quæ admodum breuis est, produceretur, ut in hominibus fit, & quadrupe libus. propterea illarum corpus ualde prominens pateret. At cum porrectior ducatur, usq; ad medium uentrem ita pertinet, ut crura eo modo suffulta molem totius corporis gestare possint. Ex his compertum est, nulla ratione cõtingere posse, ut aues perinde ac homines erectæ sint, obtegentium enim pinnarum congeries utilis est ijs, quæ corpus eo modo coagmetatum habet, quo nunc spectatur. Quod si erectum attolleretur, inutilis omnino esset: quales Cupidinũ imagines uidemus, quas aligeras pingunt. & simul superiore ex disputatione patet, nec hominem nec si quid aliud tali sit habitu, pinnigerum esse posse: non solum quod sanguinem habens pluribus notis, quàm quaternis se moueret, uerum etiam quia talis pinnarum congeries ipsi nulli usui foret, cum per naturam se mouerent. At natura nihil præter suam ipsius normam fingit, & molitur.

N V L L V M animal quod sanguine cõstat, & pedibus innititur, progredi potest, nisi nodus aut in curibus, aut in scoptulis opertis, & in clunibus inflectatur, antequam proba

te probatum est. atque etiam liquet nodum minime inflecti, nisi quid interquiescat.  
 & homines, auesq̃, tamen si bipedes formantur, tamen cōtrarium agere inflexum.  
 Item quadrupeda tum sibi ipsi, tum homini contraria in cruribus flectendis esse. ho-  
 minum enim brachia cauantur, poplites incuruātur. Quadrupeda, quæ tamen ut  
 uipara sint, genua in curuum, suffragines in cauum contrahunt. atq̃ id ipsum aues  
 etiam præstāt. Causa ea reddi potest, quod natura nihil frustra machinatur, quem-  
 admodum supra demonstrauius, sed semper in ijs, quæ fieri possint, ad id respicit,  
 quod potius sit, & melius. Cum igitur omnium, quibus mutatio per locum natu-  
 ra efficitur, crus consistens pondus gerat, cumq̃ in aduersum motus obeatur, con-  
 10 uenit præcedentem pedem situ perleuem esse: & cum gressus cōtinue intendatur,  
 in eo iterum pōdus medium teneri, constat necessum esse, quia crus inflectitur, de  
 integro ipsum rectum explicari, idq̃ progressu pede quiescente. Et certe accidit ut  
 altera pars quiescat, & altera progrediat, & simul animal procedendi facultatem  
 habet per crus nimirum præcedens, quod ante se inflexum agat, cum retrorsum  
 minime agi possit. ita enim crus extenditur projecto corpore, altero autem modo  
 retracto. Iam uero si retrorsum nodus inflectatur, situs pedis per duas motiones,  
 eademq̃ cōtrarias reddetur, altera ante, altera retro facta. siquidē necesse est quo-  
 ties cruris flexio adiuuatur, toties extremā femoris partem retro produci, & tibiam  
 à nodo deductam pedem in aduersum promouere. Quod si nodus in aduersum  
 20 inflectatur, ingressus quem proposuimus fiet, motionibus tamen non ita contra-  
 rijs, ut una in aduersum agatur. Itaque homo cum bipes sit, cumq̃ secundum natu-  
 ram ipsius cruribus per locum moueatur ob eam, quam explicauimus, causam, po-  
 plites in aduersum, brachia in cauum contrahit. Nec reclamatur ratio, si enim contrā  
 adducerentur, inutilia partim ad utriusque manus usum, partim ad cibum capien-  
 dum pēderent. Sed uiuipari generis quadrupeda, cum priora crura sui gressus præ-  
 cedentia habeant, cumq̃ eadem uicissim prioris corporis parte transferantur, ne-  
 cesse habet illa in ambitum eadem ipsa causa agere, qua homines, in hoc enim con-  
 ueniunt. Proinde quadrupeda illo etiam quo supra exposuimus modo, in aduersum  
 30 inflectunt: quandoquidem nodo ita inflexo, pedes quasi ad libramentum diu  
 suspendere queunt. Quod si aliter inflecterent, breui sanè tempore eos e terra su-  
 spensos haberent, quia totum semur, & nodus, à quo tibia ducitur, cum progres-  
 sus fieret, ad uentrem contraheretur. Ac posteriorum quidem crurum suspensio  
 si pedes in aduersum inflecterentur, æque fieret, ac priorum: breuisq̃ illa foret  
 elatio, idq̃ per ipsorum crurum defatigationem, cum utriusque cruris tibia & no-  
 dus ad unum, eundemq̃ uentris locum procumberet. At si in aduersum flectan-  
 tur, quemadmodum nunc fieri uidemus, nullo impedimēto in gressu, qui eiusmo-  
 di motu conficitur, distinebuntur. Huc accedit, quod uel necessarium uel melius est  
 crura sic inflecti ijs, quæ ex illorum genere mammas nouis foetibus præbent, & id  
 genus munera exequuntur. curuatis enim introrsum cruribus, magnū negotium  
 40 sibi exhiberi sentirent, cum sobolem quæ subruinatur, fouerent. At uero quatuor  
 pares inflectendi modi constituuntur, siquidem necesse est genua, & suffragines uel  
 in cauum contrahi, ut in quibus A A, uel in cōtrarium, hoc est in curuum, ut in quibus  
 B B, uel ordine permutato, nec ad eadem ipsa, sed genua in curuum C, suffragines in  
 cauum, ut in quibus C, uel contrā, hoc est, ut crura mutuo se respiciant, & caua ex-  
 tra propellantur, qualia sunt in quibus D. Itaq̃ nullum animal quod aut bipes, aut  
 quadrupes sit, in ea flectit, in quibus A aut B inest: cum in C quadrupeda curuent,  
 & inter quadrupeda nullum, excepto elephante, in D adducat. Homo brachia, &  
 crura habet, atq̃ illa in cauum, hæc in curuum contrahit. Omnino semper lacerti,  
 & crura in hominibus contrarios uicissim inflexus agunt, gibber enim cauatur,

brachiale incuruatur, atque iterum humerus in curuum conducitur. Nec secus fit in cruribus, femur enim cauatur, genu incuruascit, cum pes ē diuerso in cauum niatatur. Inferiora etiam contrā, quā superiora se mouent, quoniam origo ē contrārio se habet. Nam humerus curuatur, femur cauatur, gibber etiam in cauum, genu in curuum, pes cōtrā in cauum defleſcitur. Ratio inflexus crurum talis est, & quidem ob eas causas, quas iam reddidimus.

POSTERIORA quidem crura cum prioribus in motu per trāſuerſum conſentiunt. Nam poſt dextrum prioris partis latus ſiniſtrum poſterioris impellitur, mox ſiniſtrum prioris, motus dextri poſterioris excipit. Ac huiuſce quidem rei cauſam ponimus, quod ſi poſteriora ſimul & priora mouerentur, ingreſſus ipſe diſtraheretur & præceps eſſet: non aliter, atque ſi à poſterioribus connexa traherentur. Præterea non ingreſſus, ſed ſaltus id tale habendum eſſet, arduum porrò, & difficile eſt ſaltu continentem agere motum. Argumēto quidem ſunt equi ita ſe mouentes, qui citò laſſeſcunt & fatigationem ſentiunt, eos intelligo, quos pompæ gratiā ſeſſores ſuſtinere ſolent, nec progredi ſinere, itaque ſine prioribus & poſterioribus cruribus, ob ea, quæ expoſuimus, nullum præſtant motum. Quod ſi utriſq; dextris primum ille præſtaretur, nimirum firmamenta nulla ſubderentur, ipſaq; animalia collaberentur. Ergo ſi neceſſe eſt uel horum modorum utrouiſ, uel per trāſuerſum motionem agi, & neutro ſuperiorum modorum fiat, per trāſuerſum motio agatur, neceſſe eſt. Nam ut ſcripſimus, cum ita moueantur, neque ſine firmamentiſ eſſe, neque collabi poſſunt. Quapropter equi & alia eiuiſdem generis animalia per trāſuerſum progreſſa conſiſtunt: nec dextris, aut ſiniſtris utriſque cruribus ſimul ſuſtentantur. Eodemq; modo gradiuntur quæ plures, quā quaternos tenent pedes, nam ſemper in quaternis proximis, poſteriora per trāſuerſum ad priora arripiuntur. Declarant hoc, quæ lento gradu motum cient, ut cancri, hi enim ita ſe mouent: quia de eorum genere ſunt, quæ multis fulciantur pedibus. ſiquidē per trāſuerſum ſemper eò ſe mouent, quò greſſum dirigunt ſuum, quod etiam animalium genus præter cætera proprium & ſui generis motum agit: quādo quidem omnium unum in priorem non mouetur partem, ſed in latus. Cum autem prior pars in oculis diſtincta eſſet, natura oculis ita affixit, ut cruſcula ſequerentur. in priorem enim partem illorum motus tendit, ob eamq; rem cancri etiam quodam modo in priorem partem ſe ſe uidentur mouere.

AUES RITV quadrupedum inflexus crurum agunt, natura enim illarum quodam modo quadrupedum ſimilis eſt, propterea quod alæ priorum crurum loco annectuntur, ideo perinde illas infleſcunt, ut quadrupeda genua. Iam uero cum in ambulādo iſſdem ipſis naturalis motus origo ab aliſ trahatur, uolatus enim proprius auium eſt motus, ideo ſi ipſæ eadem alæ eximantur, nullum auium genus nec conſiſtere, nec procedere poterit. Præterea cum bipedes quidem ſingantur, ſed non erectæ, cumq; priores corporis partes exutas, leueſq; teneant, uel ad neceſſitatem, uel ad commodioris uitæ rationem pertinet illas, quò ſtare poſſint, femur ita ſubditum habere: tale inquam, ut in poſtერიorem defleſcatur partem. Enim uero ſi oportebat rem hoc modo habere, neceſſitas etiam cogebat auium ſuffragines in cauum trudi, quo etiam modo quadrupedum ſuffragines adducuntur, & quidem ob eandem ipſam cauſam quam probauimus in motu eorum quadrupedum, quæ ex animalis procreatione partum formant ſuum. Omnino aues, & de uolucribus integram pinnam adepta, & in humore narrantia, & quæcunque iſſdem inſtrumentis, quibus ſuperiora, prædita in humore ſe mouent, facile declarant cōmodis ſuis melius conſuli, ſi quas diximus partes à latere annexas habeant, quales nunc habere ſpectantur. In auiſbus, & integra pinna inſtructis, ita res habet, quæ eadem in piſciſbus



bus quoque ostenditur, siquidem aibus alæ, aquatilibus pinnulæ: integram pinnam habentibus membranulæ siccæ à latere adherent, quandoquidem ita eorum alia firmissime, & celerrime aërem, alia humorem distrahentia sese mouere poterunt, eoq; etiam magis, quod corporis partem in auersum, & in aduersum inclinantes, rem lubricam & cedentem sequentur, cum alia in humore, alia in aëre sese impellant. At uero ex cauernas subeuntibus quadrupeda, eademq; ouipara, ut crocodili, lacertæ, stelliones, mures aquatiles, & reliqua testudinum genera, omnia à latere crura adiuncta & summam terram obradentia habent, eademq; in obliquum detorquent, quoniam ita formata usui sunt ad commodius subeundum, & ad ouorum incubatum, atque custodiam peragendam. Cum igitur extrorsum pateant, necesse est ut femoribus contrahendis, & sub se condendis toto corpore in sublime sese efferant. quod quidem corpus cum ita se moueat, fieri non potest, ut crura aliter inflectantur, quam extrorsum. Et iam quidem ante probauimus genus exanægue animalium eorum, quæ pedibus corroborantur, multipes esse, nec ullum quadupes haberi, ideo necessitas præscribit, ut cruscula omnia præterquam extrema à latere affigantur, & simul constat eadem ipsa tum sursum uersum flecti, tum sub tota retro uergere, siquidem media horum omnium cruscula & præcedant, & subsequantur necesse est. Quod si in illis ipsis hoc seruatur, oportet in priorem & posteriorem partem inflexum agi, in priorem inquam partem, quia præcedunt: in posteriorem, quia subsequuntur. Et quoniam necesse est utrumque accidere, propterea uergunt, & in latus flectunt, exceptis tamen ultimis, quippe quæ ut magis apta sunt, inflectantur, alia quidem ut subsequantur, sed alia ut præcedant. Item propter cruscula, quæ frequentiora sunt, hoc etiam modo inflectunt. Siquidem in gressu minus ita sibi impedimento sunt, minusq; offendunt. Natura uergendi his ipsis attribuitur, quod uel omnia, uel plurima cauernas subeant, hoc enim modo agentia efferre se non queunt. Cancri multipedum omnium maxime sui generis natura constant, nec aliter in priorem partem gressum tentant, atq; paulo ante docuimus, soli etiam multis pedibus, qui præcedant fulciuntur, quod efficit partim obducta durities, partim ratio ut edicti, quæ quidem non ad natatum, sed ad ipsum planè gressum adaptatur, dum enim uiuunt, terra sustentantur. Flexus igitur cunctorum multipedum æque in latus deflectuntur, ac quadrupedum in latibula se recipientium. Talia enumerantur lacertæ, crocodili, stelliones, & cætera quadrupeda, quæ oua ædunt. Huiusce quidem rei causa hinc oritur, quod alia in prole duntaxat suscipienda abdita umbracula ingrediuntur, alia toto uitæ cursu. Artus cæterorum propter mollitudinem in latus obliquantur. Locustæ cum generi crustato annumerentur, pedibus non gressus, sed natatus causa subnituntur. Cancrorum autem inflexus in latus detorquetur. Cruscula etiam cute, uel potius crusta aspera, & in morem silicis prædura obducta causæ sunt, cur non uergant, ut ouipara quadrupeda, & sanguine cassæ, & multipeda: cum neque nandi studiosi sint, neque in cauernulis se condant.

40 in terra enim uiuunt, & facie rotunda formantur, & uropygio carent, quo tamen locustæ præditæ sunt, quâdoquidem ad natatum usui est, illi autem à natatione abhorrent. Quin etiam soli omnium latus parti posteræ simile habent, quoniam frequentibus pedibus, iisdemq; ducibus regantur. Cuius rei causa est, quod nec ante se flectant, nec uergant. uergendi causa paulo ante exposita est, quæ sanè ad crustæ duritiem, solidamq; naturam refertur, quapropter omnes præcedant, & in latus deflectantur necessum est. in latus inquam, quoniam inflexus in latus curuatur. Quod si omnibus pedibus id præstaretur, quiescentes motum nauantibus impedimento forent.

PISCES qui passeris siue rhombi effigiem repræsentant, eo modo natant,

quo cœlites, alteroq; oculo capiti incedunt, quia natura illorum transuersa, distorta q; est. Aues palmipedes remigatione pedum natant, & bipedes gignuntur, propterea quod extrinsecus aërem arripiunt, & spirant: palmipedes, quoniam uitam in humore, fluidisq; locis degunt, cum enim tales subnectantur, loco pinnularum utiles sunt. Crustulis item subnituntur, non parti quidem mediæ subditis, ut reliquæ aues, sed magis ad posteriorem partem adherentibus, cum enim breuib; illæ sint præditæ cruribus, eadem ipsa posteriori adiuncta parti ad natatum accommodant. Cruribus autem breuib; sunt, quia natura quod longitudini crurū dempsit, id totum ad pedes addidit, & pro longitudine cruribus crassitudinem, pedibus latitudinem tribuit, quandoquidem inter natandum crassi, & habitiores magis usui sunt, quàm longi ad propulsandum humorem. At enim ab ratione non abhorret, ut uolucris pedes habeant, pisces careant, alteris enim uita in sicco agitur, cum fieri non possit, ut semper sublimes ferantur: ob eamq; rem pedes habeant, necesse est. alteris uero in humore uita est, & aquam non aërem exceptant. itaque pinnulæ ad nandum utiles sunt, pedes inutiles. Quod si pinnulis & pedibus instruerentur, in numero eorum reponerentur, quæ sanguine defecta rigerent. Aues quodammodo similiter atq; pisces se habent, illis alæ duæ superne dependent, his pinnulæ duæ parte prona, illis pedes resupinæ parti subduntur, his pinnulæ adherent resupina etiam parte, & iuxta pronam maxima ex parte, illæ uropygij gubernaculo reguntur, hi caudæ. De his autem animalibus, quibus silicea testa præsidio est, controuersa res est, plenaq; dissensionis, ecquis illorum sit motus, & si careant parte dextra, & sinistra, unde moueantur: & eo quidem magis, quod uidentur moueri. An uniuersum hoc genus, ut mancum, & deprauatum statuere debemus, & æque motum illorum effici, ac si ea cruribus mutilaueris, quæ pedes habent, ut uitulum marinum, & uespertilionē. hæc enim peruerse quadrupeda sunt. At quæ eiusmodi testæ munimento defenduntur, quanquam se moueant, præter naturam tamen id præstāt, siquidem illorū motus uagus, & solutus non est. Quod si ut fixa, & ad terram adherentia spectentur, sede uaga sunt: si gressu utentia, fixa, & statua haberi debent. Ad caneros etiam dextra pars uitiose adiungitur, cum omnino adiungatur: forficulus denticulatus indicio est, qui dexter magnitudine, & uiacrior propendet, quippe cum dextra pars à sinistra distinguere exigit. Partes animalium cum aliis, tum quæ ad gressum, & ad omnem per locum motionem aptantur, sic se habent, quæ omnia cum præscripta iam explicataq; sint, proximum est, ut ad disputandum de anima aggrediamur.



# ARISTOTELIS

DE COMMUNI ANIMALIUM MOTIONE, LIBER,  
INTERP. PETRO ALCYONIO.



**D**E ANIMALIUM motione quæcunque per singula genera illis attribuantur, & quæ discrimina, causasque eorum, quæ singulatim iisdem ipsis accidere soleant, alibi de omnibus disputatum est. Nunc autem communis omnino explicanda causa, cur quocunque motionis genere agitentur, alia enim uolatu, alia natatu, alia gressu, alia per alios eiusdem generis modos impelluntur. At uero iam antè præfinitū reliquimus id principium aliarum motionum esse, quod sibi ipsi motum affert, idemque immotū præesse, primumque mouens

10 necessarium ab omni motu, & agitatione uacuum esse. quod quidem commodum actum est, cum de motu disputabamus sempiterno, utrum ille esset, nec ne: & si esset, ecquis esset. Et hoc quidem ipsum non modo ratione communi proponere conuenit, sed in ipsis etiam rebus singulis, & sensilibus, quorum gratia communes querimus rationes, quas quidem singulis rebus accommodari oportere iudicamus. nam uel in his ipsis constat fieri non posse, ut quicquam ad motum exciteretur, nisi etiam aliquid ocietur & per quietem agat. Ac primum quidem in animalibus id comper-  
20 tum est. Nam si membrum aliquod motum nauat, oportet etiam aliquod ociari, ob eamque rem copulæ, & nodi animalibus affiguntur, quoniam cardinis loco nodis  
30 utuntur, totiusque partis integritas, quæ insertū flectit nodum modo una & duplex, modo recta, & flexibilis redditur, quippe quæ per ipsum nodum in mutationem ducatur potentia, & actu. Siquidem partis quæ flectitur & adducitur alia nota motu fertur, alia in nodis quiescit. ut si dimetientis lineæ A & D quiescat, B moueatur, & A C acquirantur. Sed hoc in exemplo cardo omni ratione uidetur impartibilis, atque motum in seipsis, ut inquit, tacita cogitatione architectantur, quandoquidem res mathematicæ nullo motu genere impelluntur. At quæ copulis continentur, potentia & actu partim simpliciter consistunt, partim distrahuntur, cum tamen  
40 initium, quoad initium est, quiescat, dum membrum quod cohaeret, motum expectat. uerbi gratia, dum brachiū mouetur, gibber quiescit. dum iacerti motum agunt, humeri, dum tibia, genu, dum totum crus, coxendix. Certum igitur est cuique etiam parti opus esse in seipsa aliquid retinere, unde partis motus initium proficiatur, & cui innisa eadem illa in summa, & per partes moueatur: imò quies omnis interna ad id præstandum minus idonea est, nisi extrinsecus aliquid simpliciter adhibeatur, quod & quiescat, & omni uacet motu. Ac operæ precium quidem erit accuratus æstimare sententiam, quam supra attulimus, propterea quod contemplationis genus eiusmodi attingit, quod non solum animalia comprehendit, sed ipsius etiam uniuersi motum, & interitum. Siquidem ut intus quicquam condi debet, si ad motum animal exiturum est: ita extra potius aliquid statuendum est, in quo insistsens moueatur. Nam si tanquam strato semper cesserit, ut muribus euenit, quotiescunque

per terram, aut arenam gradiuntur, nullos habebit progressus, nec gressus perage-  
 tur, nisi terra habitu rigenti consistat: nec uolatus, aut natatus conticietur, nisi uel  
 aër, uel mare obnixè relucietur. Atque id necessariò aliud ab eo esse debet, quod  
 motu exercetur, totumq; à toto. atque id, quod proprie omnis motus expers est, in  
 nullam eius partem receptum est, quod motum obit, sin minus, idem motu desistit  
 cuius rei testimonio esse potest id, quod in controuersia uersatur & cōtentione. cur  
 si quis extra nauigium remo, aut alio instrumento malum propellat, nauigium nul-  
 lo negotio moturus est, contrà si in eodem sit nauigio, & idipsum conetur, nullam  
 mouendi facultatem habebit, nec si tityus, aut aquilones extra nauigium spirent, si  
 modo casus ferat, ut quis eo modo uentum reddat, quo pictores facere uidemus, 10  
 qui ex eodem nauigio uentum mitti pingunt. Nam siue leniter flatus spirat, siue ita  
 uehementer, ut maxima uenti uis ingruat, siue aliud sit, quod projiciatur, uel impel-  
 latur, necesse est primum, ut qui impellit, in sua aliqua parte quiescente insitens id  
 præstet. Dein hanc ipsam partem, uel id cui pars adiungitur, quiescere externæ rei  
 innisum. At qui nauigium impellere uolebat, cum ipse in nauigio esset, ad ipsumq;  
 adhereret, optima ratione nauigij mouendi autor esse non poterat, quia necessitas  
 præscribebat, ut id quiesceret, cuius innisu se sustinebat: cum tamen qui extrinse-  
 cus ei uel impellendo, uel trahendo intentus erat, motus autor esse poterat, quoniã  
 terra nulla nauigij pars habetur. Sed quæres, an si quid uniuersum agitat cœlum  
 tantæq; molis gubernacula sustinet, omnis motus expers esse debeat, nec ulla coeli 20  
 pars sit, nec in cœlo cōdatur. Nam siue idem ipsum cum mouetur, cœlum circum-  
 agit, necesse est uolubilitatem eiusmodi cōficiat rem immotam attingens, quæ quie-  
 dem autoris motus nulla pars sit, atque si mouens immotum continuo est, nulla ite-  
 dem pars fuerit eius, quod motu tenetur, & agitatione. Quinetiam qui memoriæ  
 literisq; hæc mandarunt, illud scite tradunt, per globi conuersionem nullam omni-  
 no partem quietem fouere, quandoquidem necesse esset, uel totum quiescere, uel  
 facio partium diuortio illius distrahi continuum. Sed cum arbitrantur uertices nul-  
 la præditos magnitudine quandam uersandi coeli habere facultatem, & extrema,  
 & puncta inducunt, falsæ sententiæ se autores probant. Nam fieri non potest, ut  
 quicquam ad huiusmodi uerticem naturam pertineat, & motus unus à duabus re- 30  
 bus agatur, sed illi duos constituunt uertices. Ex hoc disceptationum genere addu-  
 ci poteris, ut existimes aliquid omnino ita statui oportere ad uniuersam naturam,  
 ut terra ad animantes habetur, & quæ per easdem ipsas animantes motus cōficiunt  
 suos. At qui fabulose comminiscitur Atlantem in terra pedes fixos habere, uiden-  
 tur ex suo ipsorum commento fabulam finxisse perinde, ac ille dimetiens linea sit,  
 & circum uertices cœlum torqueat, hoc autem ipsum recta euenit ratione, quoniã  
 terra per quietem consistit perpetuam. Veruntamen huiusce sententiæ ad stipula-  
 tores necessariò confirmare debent eos ipsos uertices nullam uniuersam partem esse.  
 Adde illud etiam, quod robur, motorisq; nîsus ad rem quiescētem æquabiliter re-  
 spondere debet. Nam roboris & facultatis magnitudo est, qua sic id, quod quiescit, 40  
 potest quiescere, ut id quod mouet, potest mouere, atque necessariò quædam pro-  
 portio, ut contrariæ motionis, ita quietis animo concipitur, motusq; aut facultates  
 per exuperantiam uincuntur. Quapropter siue Atlas, siue mouens quid aliud sit  
 ex ijs, quæ intra contineantur, nihilo minus oportet quietem reluctari, quam terra  
 obtinet, aut terra de medio, suoq; ipsius loco diuelleretur. Vt enim impellens im-  
 pellit: sic impulsus impelletur, atque adeò per tantundem roboris. Sed primum  
 quiescens hoc est Atlas motum parit, idcirco robur maius, & uehementius erit,  
 quàm æquabilis, & quieti par sit. Eodemq; modo se habebit robur eius, quod tam-  
 en mouetur, tamen ipse non mouet, atque oportebit tantum facultatis superesse  
 terræ

in quiescendo; quantum uniuerso cœlo, illiusq; motori. Quod si hoc fieri nequit, nulla itidem facultas suppetit, qua cœlum ab aliqua eiusmodi re intus condita motus incitationem nanciscatur. Sed tamen quæstio existit de partium cœlestium conuersionibus, quam ut instituat tam disputationis propriam, & cognatam æstimare poteris, nam si quis motionis ui terræ quietem excelsit, certum est illum e medio eam diuulsurum, nec minus constar robur, à quo ipsa uis proficiscitur, in infinitum non excursurum, cum neque terra infinita sit, ac propterea ne ipsa quidem terræ grauitas eiusmodi fuerit. Sed cum id, quod fieri non possit, multipliciter dicatur, propterea quod non eodem modo asserimus fieri non posse, ut uox à nobis cernatur, quo ea sunt, quæ in luna cōsistunt, cum alterum ex necessitate sit, alterū quam uis suapte natura aspectu pateat, id tamen nunquam cernitur. Cœlum uero immortale, & nequaquam dissolubile ex necessitate arbitramur. At si hæc recipiatur ratio, non ex necessitate id putabitur: si quidem motus maior suapte natura esse, atque contingere potest, eum dico à quo terra quiescit, & eum à quo ignis, & summum corpus uoluitur. Itaque si in rebus facultates uehementiores ijs, quas cœlum & terra obtinent, reperientur, cœlum & terra dissipabuntur à uehementiore facultate, quam ea sit, quam utrunque obtinet. Sin tales non sint, possint tamen esse (in finitum enim haud incidit, quia nullum corpus in infinitum dimanat) profectò contingere poterit cœlum dissolui. Quid enim impeditenti interuenit, quo minus id consequatur: si quidem non potest non esse, ac non posse non esse minime est, nisi contrarium sit necessarium. De huiusmodi ambiguitate alia instituetur oratio.

SED utrum extra id, quod mouetur, quicquam collocandum est immotum, & quiescens, quod nulla eius pars sit, an secus: Et si hoc dederimus, an necesse est in uniuerso ita se rem habere: fortè enim perabsurdum uideri poterit, si circumuectionis origo intus habeatur. Quapropter istam probantibus sententiam Homæus recte cecinisse uideri potest:

Sed neque supremum in terram deducere cœlo  
Vestra louem uis ulla queat, non diq; deaq;  
Annisi quanquam, at libramini simul omnes,

Nam id, quod agitatione, & motu uacuum est, à nemine moueri potest. Vnde si ex principio pender immoto, quæ olim proposita est controuersia, \* explicabitur, utrum contingat cœli coagmentationem dissipari nec ne. Sed enim huiusmodi immotum principium non modo in animalibus condendum est, uerum etiam in ijs, quæ per locum motu cientur, ea designo, quæcunque seipsa moueant. Siquidem alia pars debet moueri, alia quiescere, cui id, quod mouetur, innisum motum perficit, ut si illud sit pars, quæ mouetur. Nam altera innititur, altera quiescit, inanima tamen in cōtentionem uenire possunt, utrum hæc quoq; necessariò in seipsis omnia principium quiescendi, & mouendi habeant, & in aliqua re extra quiescente insistant, an id fieri nequeat, ut ignis, ut terra, ut aliud quod anima orbatum sit. Inanimis quidem haud contingit, ut & quiescens res sit, sed in ipsis planè animalibus, à quibus inanima motum nanciscuntur, inanima enim omnia pulsū agitantur exter-  
no, atque principium omnium, quæ ita agitantur, est, ut illa seipsa moueant. Et hæc quidem omnia, quæ de animantibus & inanimis dicere habuimus, necessariò probant illa & in seipsis, & extra rem quiescētem habere, qua se sustentent, & firment. At uero incertum est an quicquam superius sit, quod primum mouet. & omnino de huiusmodi initio alia suscipienda oratio. Animalia, quæ motu aguntur omnia externæ parti incubantia id præstant cum spirant, & expirant, nihil enim interest magnum proicias pondus, an paruum, quod quidem faciunt qui despuunt, qui tussunt, qui spirant, & qui expirant. Sed in controuersiam quoq; trahitur, utrum

in animalī duntaxat cum per locum mouetur, quippiā debeat quiescere, an etiam cum ex se alterascit, & auctum recipit. De prima formatione, & interitu, longe alia afferenda est præceptio. si enim primus motus generationis, & interitus is est, quē exposuimus, hæc ipsa profectō causa explicabitur aliarū omnium motionū. & eo quidem magis, quod ut primus ille motus causa in uniuerso, sic in animalī, postq̃ absolutum est, statuitur: quapropter auctōnis etiam & alterationis, si modo idem sibi ipsi causa esse poterit. Quod si motus per locum alios non præcesserit, necesse non est aliquid statui quiescens in ijs, quæ ex se tum in alterationem incidunt, tum partium auctōnem recipiunt. Prima quidem auctōnis & alterationis genera alia ab re, & per alias inducuntur, cum tamen fieri non possit, ut idem sibi ipsi genera-  
tionis, & interitus causa sit. motor enim rem mobilē, effector opificiū præcurrere debet. nihil autem seipso prius, & antiquius est. De anima, utrum illa moueatur nec ne: & si moueatur, quo modo id cōiungat, proximè in ijs libris disputauimus, quibus naturā illius cōplexi sumus. Sed cum in anima omnia ab alijs motu cīant, (de primo autē eodemq̃ perpetuo mobili, qua ratione motu incitetur, & quo pæ-  
cto princeps motor agitur, in principis philosophiæ cōmentarijs disputauimus) reliquū est, ut explicemus, quo modo anima motū corpori afferat, & quodnam in-  
itium statuendum sit motionis animalī. Siquidem animata causam afferunt motui aliorū, præterq̃ ipsius uniuersi conuersioni, modō illa mutuos non præstent mo-  
tus, quoniā inter se colliduntur. Quapropter omnes eorū motiones exitū habent,  
animatorū enim sunt, quandoquidē animalia omnia alicuius rei causa & mouent, & mouentur: ita ut hoc ipsum constituat exitus cuiusq̃ motionis. At uidemus co-  
gitationem, uisum, uoluntatem, selectionem, cupiditatem animalibus motū affer-  
re. Hæc autē omnia ad mentem referuntur, & appetitionē, uisum enim, & sensus eandem, quam mens, obtinent sedem, cum omnia iudicandi & statuendi facultatē habeant, at tamen eo discriminū genere separantur, quæ alio tradidimus loco. Vo-  
luntas, ira, cupiditas appetitioni redduntur. Selectio cōmunis est cogitationis, & appetitionis, quapropter id etiā quod seligi potest, tale erit, cum non omne ratio-  
nale seligi queat, sed rerū agendarū finis est: idcirco is, qui ita mouet, cōmodi & bo-  
ni rationem obtinet. imō non omnis honestus est. nam quoad gratia huius, alius  
est, & quoad finis est rerū, quæ rei alterius gratia sunt, eatenus mouet. Bonū quoq̃  
emenitū boni locum tenet, atq̃ iucundū tale etiam est, quandoquidē illud emen-  
titum bonū est. Constat igitur mobile perpetuū, partim simili modo à primo agita-  
ri motore, ut singula animalia ab re appetibili, partim alio modo. Ergo perpetuū  
obtinere motum, cum animalium impulsus exitu terminetur, & sine, id enim quod  
perpetuū est, pulchrum habetur: & quod re uera est, & prius, bonū statuitur. nec  
modo est, modo non est: ac omnino diuinius atq̃ nobilius est, quā ut quicquam  
aliud prius se habeat. Et certe primū immotū mouet, sed animal appetitio mouet:  
quæ ipsa etiam si moueatur, non tamen per locum mouetur. Ex his compertū est,  
idq̃ optima ratione, impulsus eorum, quæ oriuntur, ultimum eorum esse, quæ  
prodeunt. animal enim motu agitur, & ingreditur, uel appetitione, uel optione:  
alteratione tamen aliqua facta per sensum, aut uisum.

QVI intelligit, quodam modo in actionē nunc incumbit, nunc non incumbit:  
& mouetur, nunc non mouetur. eodem sanè modo de rebus statuendū uidetur,  
quæ immota cogitatione cōprehendunt, & ratiocinatione colliguntur. Verum in  
his cōtemplatio finis est, nam ut duas homo percepit propositiones, cōclusionem  
excogitauit, eandemq̃ cōposuit, sed in ijs quæ geruntur, duabus à propositioni-  
bus conclusio ducitur, quæ eadem actio est, ut cum nouerit cuiq̃ hominī inceden-  
dum

dum esse, & ipse homo primo quoque tempore incedit. Item si nulli incedendum sit homini, & ipse homo confestim quiescit. & hoc utrumque efficit, nisi ab aliquo uel prohibeatur, uel ad aliud cogatur. Commoda res conficienda; ades comoda; ades primo quoque tempore architectatur. integumentum indigeo, id cuius indigeo, mihi conficiendum: tunica indigeo, tunica conficienda est. ita conclusio, quæ est, tunica conficienda, actio & functio erit. Quinetiam sumpto initio à re, quæ principium operis est, agit, ut si tunica fuerit, necesse est principium antegressum esse, unumque aliud consequitur, & statim alterum conficitur. Ex his probatum uolumus conclusionem esse notionem. Propositiones, quæ actionem afferunt, ex duplici genere coniectuntur, rei comoda; & eius, quæ fieri possit. ut qui disputant, & interrogant. hi enim com-  
 10 pertiorem omittunt propositionem, alteram uero proponunt, ut cogitatio quæ præest, nihil consideret. ita in rebus quæ geruntur accidit, ut si commodo sit homini incedere, certe non immoratur in agnoscendo se hominem esse. Quæcunque igitur alia, nulla rationatione duce, agimus, celeriter agimus, nam postquam actionem, quæ cuius rei gratia notatur, suscepit uel sensu, uel uiso, uel mente, quæ primum actione, cuius desiderio flagrabat, fungitur, propterea quod loco interrogationis, uel notionis, munus appetitionis præstatur. Cupiditas mihi dicitur ebibendum esse: tum uel sensus, uel uisum, uel mens subdit hocce potulentum esse: confestim illud hauritur. ita animalia impetum capiunt uel ad motum uel ad actionem.  
 20 nem. Et cum appetitio præcipua causa motus sit, eademque excitetur uel per sensum, uel per uisum, & notionem: & qui agunt, partim cupiditate, aut ira, partim appetitione, aut uoluntate concitantur: accidit, ut alia faciant, alia agant, non aliter quam ea opera quæ non alieno impulsu, sed sua sponte agitari uisuntur paruo excitato motu, laxis rotis, seque mutuo trudentibus. & quadrigæ, quæ ab auriga agitata statim mouentur, & rursus in orbem uersantur, quoniam inæqualibus utuntur rotis: minor enim quasi cardo euadit, ut in cylindris fit: ita moueri animalia confirmamus. quippe quæ hisce instrumentis ornentur, & machinationibus instruantur, hoc est neruorum, ossiumque natura, quandoquidem ossa, tanquam ligna & ferrum sunt: nerui tanquam rotæ, quibus laxatis & remissis motus agitur.  
 30 Veruntamen in operibus, quæ sua sponte mouentur, & in quadrigis, nulla suboritur alteratio, etiam si in orbem idem uertantur. Contra in animali idem tum ampliari, tum diminui, & faciem corporis uariare potest, partibus ex calore augescens, & iterum sese adstringentibus ob frigus, ipsædemque alterationem contrahentibus. Visus, sensus, & consignatus in animo notiones comouent, sensus enim cum alterationes quædam sint, confestim inducuntur. Visum, & notio rerum agendarum uim obtinent. etenim species uel caloris, uel frigoris, & rei uel iucundæ, uel formidabilis mente percepta quodam modo talis agnoscitur, qualis res quæque est. idcirco notione solum affectu tum horrore, tum metu percussi uidemur. atque hæc omnia perturbationes, alterationesque haberi debent. Partium corporis, quæ per alterationem  
 40 uariantur, aliæ augescunt, aliæ decrescunt. Nec uero dubium est, quin parua admodum initio facta mutatione, in corpore multiplices & longinquo uarietates suboriantur, ut cum per temonem paululum tralatum longe diuersa prorsus positio uisitur. idem quoque efficitur uel per calorem, uel per frigus, uel per rem eiusdem generis aliam. Nam quoties in cor alteratio inducitur (etiam si in exigua eiusdem uisceris parte, quæ sensu minus pateat alteratio excitetur) toties multiplices corporis facies annotantur, est rubore, pallore, horrore, tremore, & rebus eiusmodi contrariis. Ergo initium motionis quemadmodum præcepimus, res consecranda, & declinanda est, in ipsis tamen, quæ geri, administrarique possint. Calor autem & frigus necessario earum notionem, atque uisum consecrantur, quia res tristifica euitari,

iucunda affectari solet. ueruntamen tenuibus in rebus, id ualde obscurum est. tristificæ enim iucundæq; res ferè omnes cum frigore, aut calore occurrūt, quod quidem ex animorum nostrorū perturbationibus colligitur. Etenim audacia, pavor, concubitus, & alij in corpore suborientes motus tristifici, iucundiue sunt partim in certis membris, partim in toto corpore. idq; cum calore, aut frigore. At memoria, & spes ex usu eiusmodi motuum, quasi spectrorum nunc magis, nunc minus causæ eorum ipsorū sunt. Ratio igitur exigit, ut tam interiores partes formentur, quàm partium instrumentarium initia commutentur, ex concretis mollia & soluta, ex mollibus & solutis concreta. & mollia uicissim, & dura. Quæ cum ita commutentur, & uis quoq; agendi, & patiendi ea natura prædita sit, quam sæpe indicauius, cum accidit aliud patibile, aliud agens esse, & nihil ex ijs desideretur, quæ ad formā, & quid res sit pertineant, primo quoq; tempore aliud agit, aliud patitur, ob eamq; rem simul, ut ita dixerim, homo intelligit incedēdum esse, & incedit, nisi fortè aliud impedimento sit. Instrumentariæ quidem partes congrue affectiones præparant, appetitio affectiones, appetitionem uisum. hoc autem uel ex sensu, uel ex notione efficitur. simulq; & celeriter ipsa res euenit, quoniam principium agendi, & patiendi inter ea refertur, quæ mutuam habeant naturam.

PRINCEPS animalium motor necessariò in aliquo initio situs esse debet. Quinetiā exposuimus copulam ipsam alterius partis initium esse, alterius exitum, propterea efficitur, ut natura eiusmodi copula modo tanquam re singulari, modo tanquam duplici utatur. cum enim ex uno loco in alium motus agitur, necessitas cogit, ut extrema altera nota quiescat, altera moueatur. quandoquidem paulò ante probauimus id quod motum parit, in re quiescente se sustinere. Itaque extrema brachij pars mouetur, & non mouet, cum tamen gibberis inflexu pars, hoc est manus moueatur, quæ sanè cum toto brachio agitur. atq; etiam necessariò aliquid consistendum est, quod facultate quidem singulare signum habeatur, sed actu duplex. idcirco si animal brachium esset, in gibbere profectò mouētis animæ originē locandam existimaremus. Et certe ut brachium ad gibberem se habet, ita contingit inanimata quadam, quorū de genere est bacillum, se ad manum habere, ut si bacillum moueat, perspicuū sit animam in neutro extremo consistere, neq; in extrema rei motæ parte, hoc est manu, neque in altero principio, hoc est bacillo. Hoc enim præ manu summam, tum infimam obtinet partem, ut hac saltem causa, nisi principiū animæ mouēs in bacillo cōdatur, neq; in manu fuerit. nam summa ipsius manus pars ita ad brachiale comparatur, ut hæc pars ad gibberem, propterea quod nihil differunt partes, quæ coaluerint ab ijs, quæ non eiusmodi sunt. quippe cum ipsum bacillum ut pars separabilis euadit. Itaq; necesse est illius sedem nulla origine cōtineri, quæ alterius sit finis. neq; si aliud cum eo magis continens sit, ut principium extremæ bacilli partis in manu, huius in brachiale. Quod si in manu id non sit, nimirum in parte habebitur superiore. atq; etiam gibbere quiescente tota inferior pars, quæ tamen continens sit, mouetur. Sed cum similiter cor ad membra tam dextra, quàm sinistra se habeat, & per partes contraria membra ita agantur, ut neque ex perpendiculari quiete sinistra partis dextra moueatur, neque e contrario fiat, cum exordium à superiore ambarum partium loco semper ducatur, necesse est medio pectoris, hoc est cordi ipsam animæ mouentis originem reddi, quandoquidem ambarum extremorum medium est ultimum. Et hoc ipsum æque comparatur ad motiones superiorum, & inferiorum partium, ut ad lacertorum, & crurum, quorum origo est ipsa capitis, in ijs tamen, quibus illa dorsum perrepat, quod quidem omni etiam ratione probatur. sentientem enim facultatem hic locari oportere censuimus, ita ut hoc loco, quo principium continetur, sensus opera alteratione affectio & immu-



rato partes proximæ adiuuent extenſæ & contractæ, atque ita neceſſariò uel propter hanc ipſam cauſam motus animalibus agitur. Media ſanè corporis pars, quæ quidem cor eſt, & in eo diffuſi ſpiritus, quanquam una eſt, actu tamen plura reddatur neceſſe eſt, propterea quod lacerti & crura per partes motum nanciscuntur ab initio. & alteris quieſcentibus, altera mouentur. exempli gratia, in A, B, C, ipſum B mouetur, mouet autem A, certe aliquid debet quieſcere, ſi aliud mouendum eſt, aliud moturum, A igitur, quod unum poteſtate eſt, duo erit. itaque neceſſe eſt non punctum, ſed quandam eſſe magnitudinem. Verum contingit C, per partes cum B moueri, ut neceſſe ſit utrunque originis genus partium quæ in A impelluntur, motum agere. Oportet igitur præter hæc principia aliud quicquam mouens eſſe, quod nullum ſubeat motum, innitantur extrema, & principia membrorum eorum quæ uiciſſim in A mouentur, ut ſi qui ſint, qui ex dorſi inniſu crura moueant. Enim uero id, quod utraque mouet, neceſſariò eſt. hoc nimirum anima erit, quæ quidem licet ab hac magnitudine ſit diuerſa, tamen in ea collocatur. ſed è ratione, quæ probat motionis cauſam, appetitio eſt medium, quod mobile \* mouet. In animatis planè corporibus, aliquod eiufmodi corpus inelle debet. Ergo id quod mouetur, nec mouere poteſt, alienas uires pati ualeat. Mouens item neceſſariò quadam facultate, & uigore niti debet, eoſq; magis, quod animalia omnia partim natiuum hunc ſpiritum habent, partim eo uigent. atq; alio præcepimus loco quenam ratio ſalutis eiufmodi ſpiritus ſit. At enim uidetur ille ipſe ſpiritus æque ad uitalem originem ſe habere, ut nota in copulis expreſſa, quæ impellit & impellitur ad rem omnino immobilem. ſed quando principium alijs in corde locatur, alijs in eo, quod cordi proportionem redditur, ideo natiuus quoque ſpiritus in eodem uidetur ſedem tenere. aliaq; omnino inſtituenda oratio, utrum eiufmodi ſpiritus idem ſit, an ſemper diuerſus eſſiciatur. Idem de reliquis etiam partibus decernendum eſt, quippe cum appoſite ad uitam mouendi, uigorisq; afferendi ſe habeant. Motionum opera ſunt pulſus, & tractus. idcirco inſtrumētum & augetur, & corripitur par eſt. talis autem ſpiritus natura: nam in immenſum contrahitur. atq; etiam coactrix & eandem ob cauſam impultrix eſt, & ad ignea grauitatem, ad contraria leuitatem obtinet. Enim uero id, quod motionem per locum, non per alterationem allaturum eſt, debet uel grauitatem, uel leuitatem habere, quādoquidem naturalia corpora per exuperantiam inter ſe primas tenent. Leue in inſimum deprimitur à grauiori domitum, graue ad ſummum cōtendit ab leuiori expugnatum. Qua parte, quæ tamen moueatur, anima moueret, & quam ob cauſam tradidimus.

ANIMAL ſanè ita cōſtitutum eſſe iudicare debemus, ut ciuitatem legibus bene inſtructam, & temperatam, in hac enim poſtquam adminiſtrationis ratio ſemel inſtituta eſt, nihil oportet abſentem principem rebus ſingulis, quæ gerantur, intereſſe. imò uero quiſq; officijs fungitur ſuis ut mandatū eſt, & aliud poſt aliud ex conſuetudine adminiſtratur, & inſtituto. In animalibus hoc ipſum tum per naturā eſſicitur, tum quod ſingula, quæ ita conſtituantur, ad munera ſua exequenda probe affecta ſunt. Quocirca opus non eſt in quocq; membro animam inſe, ſed cum in certo principio conſiſtat, & reliqua membra, quod illi adiungantur, uiuunt, atque officia per naturam obeunt ſua. Expoſuiſimus quemadmodum animalia uoluntarijs ſeſe mouerent motionibus, & quas ob cauſas. Atqui non deſunt quedam partes, quæ inuitis etiā motionibus agitentur, cum plurimæ non uoluntarijs agitentur. Motiones inuitas intelligo, quales cordis, & mēbri genitalis, quia ſæpenumero ex occurſu rei illa ſeſe mouēt, quanquam mens nihil interea decernat, & ſtatuat. Non uoluntarias deſigno, quales ſomnum, uigiliam, ſpirationem, & reliquas eiufdem generis, quandoquidem nulli horum ſimpliciter aut uifum, aut appetitio præeſt.

Sed cum necesse sit animalia naturali quadam uariari alteratione, ideo\* necesse est per occursum rei illa commoueri. Partium quæ alterationem contrahunt, aliæ augentur, aliæ diminuuntur. propterea non ex motu, & commutatione innatæ mutationes mutuò se sequuntur, & continentur. Naturales uero motionum causæ & partium prædictarum inuiti impulsus excitantur, ut alteratio inciderit. Siquidem notio, & usus, ut suprà docuimus, agentes pariunt affectiones, quia rerum agentium imagines effingunt, & afferunt. Inter omnes autem partes, cor & genitalis potissimum id perspicue agunt, quia utrumque membrum, tanquam abiunctum est animal. A huiusce quidem rei causam asserimus humorem, qui in utroque uitalis continetur. In corde quam ob rem id fiat, causa patet, quia sensuum principatus ei deferitur. In genitali membro, quoniam tale signum est. ex eodem enim ipso uis genitalis seminis quasi animal quoddam promittitur. Optima igitur ratione motiunculæ à partibus ad initium, & ab initio ad partes contendunt, atque ita se mutuò perunt. Siquidem A, initium intelligi debet, propterea motiunculæ pro ratione singulorum elementorum, quæ adscripsimus, ad initium perueniunt, & ab initio, quod mouetur, & commutatur, quādoquidem potestate B, initium multa est, ad B. & C, ad C. B autem & C, ad B & C. à B, ad C, non postea itur, sed à B, ad A, ut ad initium pergatur: ab A, uero ad C, ut ab initio. Præterea in iisdem percipiendis aliquando motus suboritur, qui præter rationem partes occupat, aliquando non suboritur. Causa inde ducitur, quod patibilis materia modo non subternitur, modo non tanta, aut talis subternitur, ut motum nauare possit.

De partibus per singula animalium genera, & de anima disputauimus. item causas sensus, & sensilium, memoriæ & reminiscentiæ, somni & uigiliæ, communisq; animalium motibus reddidimus. Reliquum est ut ortus persequamur.

VOCABVLA LATINA ET GRÆCA, SECVNDVM  
 latinarum literarum ordinem, ex libris Aristotelis de ani-  
 malibus, Theodoro Gaza interprete.

<b>A</b> bdomen, uel fumen,	κράνδιος.	aquila,	ὁ αἰτός.
abomasum, ἡ ἄνυστρον.	albumē oui, τὸ λευκὸν τῷ ὠθ.	aquila fuluia, ὁ μελαιναετός.	
abortiones, οἱ ἐκτρωσμοί.	alcyon, ἡ ἀλκυών.	aquila morphna, ὁ μορφνός.	
abortus, ἡ ἀμβλωσις.	alofa piscis, ἡ θείασα.	Theodorus ait nauiā dia-	
acari, τὰ ἀκαρεῖ, candidū aīal,	aluco, ὁ ἐλεός.	ci postie.	
quod in lignis nascitur,	aluus, utriculus, sinus, uen-	aquia marina auis, ὁ	
accipenser, ὁ ἐλσψ.	ter, ἡ κοιλία.	ἀλιαετός.	
accipiter, ὁ ἱέραξ.	aluus, ἡ κοιλία καὶ τὸ	aquila aquatica, ὁ αἰτός etiā.	
accipiter fringillarius, ὁ σπι-	ambidexter, ὁ αἰμαῖος.	aquilæ species, quæ ueræ,	
zius ἱέραξ.	anas, ὁ βργνήθ.	ἔξ germanæ dicuntur, οἱ	
accipiter palumbarius, ὁ	anas, ἡ νύττα.	γνήσιοι αἰετῖ.	
φασοφόνθ.	anataria aquila, quæ ἔξ plan-	aquila leporaria, λαγαφόνος	
accipiter pernix dictus, ὁ	ca morphna, seu nauiā,	αἰτός.	
πέρνυξ ἱέραξ.	ὁ νητοφόνος αἰτός.	araneus, ὁ ἀράχνης.	
accipiter stellaris, ὁ ἀστερίας	angina, ἡ κυανόγχη.	archanus, uel archanas pi-	
ἱέραξ.	angulus oculi, ὁ κανθός.	scis, ὁ ἀρχάνος.	
acheta, οἱ ἀχέται, cicadae	anguilla, ἡ ἐγγελλύς.	arctus urfa, piscis, ἡ ἀρκτος.	
rum species, argutas alibi	animal, τὸ ζῷον.	arcus piscis, ἡ βελόνη.	
Theodorus interpretat.	anser, ὁ χίμ.	ardeola, ὁ ὀρνιδίος.	
achilleæ spōgia, οἱ ἀχιλλαιοί	antennæ, pars scilicet in ta-	arenidum, seu arenulentiū,	
σπόγγιοι.	lis superior, αἱ κράναι.	τὸ ψαθυρόν.	
acia insectum, ἡ πελυσία.	antix, τὸ περικύμιο.	argatilis, ἡ ἀκαθυλλίς, quæ	
aculeati fuci, οἱ κνήκωδοι κνήκω	anthias, ὁ ἀνθίας, sacer piscis,	ἔξ spinus, siue ligurinus	
aculeus, τὸ κνήκωρον. (νις.)	græce quocq; ἱσπος ὀκθός.	auis.	
acus piscis, ἡ βελόνη.	anus, uel podex, ὁ ἀρχός.	aries, ὁ κερός.	
adeps, axungia, ἡ πικμελή.	aorta uena, ἡ ἀορτή.	arista, uel aristula piscis, ἡ	
adminicula rami in ceruo-	aper piscis acheloi fluuij pe-	ἀσπίνη.	
rū cornib, qui imi pēdent	culiaris, ἔξ aper syluestris	arteria, ἡ ἀρτηρία.	
ante frontē, οἱ ἀμωτῆρες.	ὁ κάρπος.	articulus, ὁ κύνδιλος.	
adrianæ gallinæ, ἀδριακὴν κῆ-	apes apedis auicula, ἡ ἀπὸς	ascalaphus auis, ὁ ἀσκά-	
ἀδριακὴν κῆ-	ἀπὸ δὲ.	λαφος.	
ægithus, ὁ ἀγίθιος.	apex, cristā, ὁ λόφος.	alcaris, ἡ ἀσκαρίς, lumbrici	
æquamētū, uel discriminē ca-	aphareus pinula, sub thyn-	species. tipulam alibi in-	
pillorū, τὸ λύσσωμα τῶν χυλῶν	ni uentre, ὁ ἀφάρδης.	terpretatur.	
æfalo accipitris spēs, ὁ αἰσά-	apis, ἡ μέλιττα.	afelius piscis, ὁ ὄνος.	
artolius auis, ὁ αἰτωλός. (λωρ)	apū rex, βασιλεὺς τῆς μελιττῶν.	afilus, ὁ οἰστῶ.	
agnationes, αἱ ἀγναφύσεις.	aplua, ἡ ἀφύνη.	afinus, ἔξ afina, ὁ κῆς ὁ ὄνος.	
ala, ἡ πτέρυξ, ἡ ἡ μασχάλη.	aplyfias, ἡ ἀπλυσίας, spōgia	afinus Indicus, ὄνος ἐν δὲ κῆ.	
alauda, ἡ κῆρυς κῆρυδης. quæ	genus, illotariam Theo-	afio, auis nocturna, ὁ σκάψ.	
autē galerita dicit, græco	dorus interpretatur.	afpis serpens, ἡ ἀππίς.	
noīe proprio carere uide-	apria, quæ scrophis excidit	artagena auis, ὁ ἀρτηγῆ.	
tur. λόφος enim ἔχειτο	cum castratur. ἡ καπρία.	attendo neruus, ὁ ἐπίπυμος.	
Aristoteles uocat.	apria, ἡ καπρία, uirus suum,	atherina piscis, ἡ ἀθερίνη.	
alba, τὰ λευκὰ.	q̄le equorū hippomanes.	aramentum, ὁ θόλος. alibi	
alba auis ex ardeolarum ge-	appēdix, ἡ ἀπφύας ἡ ἐκφύας	θόλος.	
nere, ὁ λευκός.	aquatculus, τὸ ἐπίστον.	aricapilla auis, μελαγνό	
albardeola auis, ὁ λευ-	aquatle, τὸ γύνδορον.	ρυφος.	
		auditus, ἡ ἀκοή.	

VOCABULA LATINA ET GRAECA

auis rex auicula, ὁ πρῶτος.	calua, τὸ κρανίον.	tippeda, ἡ σκολόπενδρα.
alibi senatorē interpretať	caluaria, τὸ βρέγμα.	cerago siue cerea, ἡ κήρυθος.
auiculā scilicet, quæ eadē	caluæ pars ferrata, ἡ βραχίς.	cerebrum, ὁ ἐγκεφαλος.
cum Trochilo.	caluitium, ἡ φραλακρότης.	cerebellum, ἡ πρὸς ἐγκεφαλὸς.
auis, ἡ ἄνις.	calx, ἡ πτέρνα.	cernua piscis, ὁ ὀρφός.
aurata, ὁ χρυσοφόρος.	camelus, ἡ κάμηλος.	cerrus piscis, ἡ σμαρίς.
aurelia, ἡ χρυσάλις.	cancer, ὁ καρκίνος.	certhia auis, ὁ κέρθιος.
auriuitis auis, ἡ χρυσομήτης.	cancellus, τὸ καρκίνιον.	ceruleus auis, ὁ κύανος.
auris, τὸ οὖς.	candidū, siue albugo oculi,	cerui, cum primum eis cor
auxuma, ἡ αὐξίς. idē quod	τὸ δολύχον.	nua prodire incipiunt, αἱ
scordula.	candidi, οἱ δολύχοι.	παθηλῖαι.
<b>B</b>	caniculæ pisces, τὰ σκύλια.	ceruus, ὁ καὶ ἡ ἐλαφός.
Alæna, ἡ φάλανα.	canicipites, οἱ κυνοκέφαλοι.	ceruix uulvæ pars, ἡ ἐρὸς θῆλα.
balerus piscis, ὁ βάλερος.	canis, ὁ κύς ἡ κύων.	ceruix uesticæ, ὁ καυλός.
barba, seu mētū, τὸ γένειον.	canire, σκυζᾶν.	ceruix, ἡ ἐπιτομία.
bilis flaua, ἡ χολή ξανθή.	cantharus scarabeus, ὁ κῆν.	cetus cete, τὸ κύτος.
bilis atra, ἡ χολή μέλαινα.	capella auis, ἡ αἰξίς. (θαρσ.)	chalcis auis, ἡ χαλκίς. cuius
bilis, fel, ἡ χολή.	capillus, pillus, uillus, ἡ θρίξ.	Homerus meminit.
bifidula, τὰ διχρῆλα.	capito, piscis ē mugilum ge-	chalcida animal, lacerti fer-
blatta, ἡ περασκουρίς.	nere. mugilem etiam ali-	mē species, ἡ χαλκίς.
bolitæna polypi species, ἡ	biinterpretať, ὁ κίφαλος.	chama ē testa itectis, ἡ χήμη.
βολίταινα.	capra, ἡ αἰξίς, ἡ διορκάς.	chamæleon, ὁ χαμαιλεων.
bombyx, ὁ βομβύλιος. infē-	capriceps auis, ὁ αἰγέκε-	chronus, ὁ χρόνος, χρόνις
cti genus.	φαλός.	etiam καὶ χρόνις.
bonafus, qui & monapios	caprimulgus auis, ὁ αἰγώ-	chrysalis, ἡ χρυσάλις. Theo-
fera est, ὁ βόνασος.	caprire, τραγίζειν. (θῆλας.)	dorus interpretať aureliā.
bosca auis, ἡ βόσκα.	caput, ἡ κεφαλή.	cicadaftræ mutæ alibi, τὰ
bos, & uacca, ὁ κύς ἡ βῆς.	carduelus, ἡ θρανπίς.	τεττινόνια.
bos aquatilis, ὁ βῆς.	caro, ἡ σὰρξ.	cicada, ὁ τέττιξ.
brachium, ὁ βραχίον.	carulus auis, ὁ κήρυθος.	cicatrix, ἡ ὄλη.
brachia cirri, αἱ πλεκτάναι.	cartilago, ὁ χόνδρος.	cicindela, ἡ πυγολαμπίς.
branchiæ, τὰ βραγχία.	cartilaginea, τὰ σελάχη.	ciconia mōtana aquilæ spe-
brenthus, ἡ βρεγνίθος.	caseus, ὁ τυρός.	cies, ὁ ὀρεπελαργός.
brissus echinorum species,	catarrhacta auis, ὁ κα-	cicuma, ὁ νυκτινόρας.
ὁ βρίσος.	ταρράκτις.	cilia, palpebræ, αἱ ἐλε-
brucus, ὁ ἀπῆλαβος.	cataractes auis, ὁ κατὰ	cimex, ἡ κόρσις. (φαρίδες.)
bubalus, ἡ βοεβάλις.	ράκτης.	cinamomus auis in Arabia
buto, ὁ βούας.	catellus, τὸ σκυλάκιον.	ὁ κινάμωνος.
buccina, species testa inte-	catulus, ὁ σκύμνος.	cinchilus auis, ὁ κίγγλος.
ctorum, ὁ κύρυξ.	catus, ἡ γαλή.	cinctus, τὸ διάζωμα.
buteo, accipitris gen <sup>o</sup> , trior	catus syluest. ἡ γαλήνη.	circus accipiter, ὁ κίρκος.
cha etiam à testiculorum	cauda, τὸ ὀροπύγιον, ἡ κόρσις.	cirrus infectū, ὁ βόστροχος.
numero, ὁ τριόρχης.	caulis in pennis, ὁ καυλός.	clauicula humerus, ἡ κλάς.
<b>C</b>	caulium, τὸ καυλίον.	clerus, uermiculus infestās
Accabare, perdicum	cebus, ὁ λῆβός.	apum aluearia, qui & py-
uox, κακακίζειν.	cecilia serpentes, αἱ τυ-	rausta, ὁ κληρός.
calcar, siue aculeus, τὸ	φλίναι ὄφεις.	coagulum, ἡ παννίτις.
πλινκτρον.	cella apum, ὁ κύττερος.	cocalia species ē testa rectis,
calcarigera, τὰ πλινκτροφόρα.	centipes, & marina quocq,	τὰ κωνάλια.
calidris auis, ὁ κελιδρίς.	ut terrestris, quæ & cen-	cochlea, turbo, ὁ σπόμεβος.
		cochlea

EX LIBRIS ARISTOT. DE ANIMALIBVS.

cochlea, ὁ κόχλος.  
 coitus, ἡ οἰκία.  
 cholago, ἡ χολάξ.  
 colaris auis, ὁ κολαρίς.  
 coles, ὁ κολέος.  
 colliquamentum, quod ex  
 incremēto secernitur re=  
 solutioe præter naturā, τὸ  
 σιῶν κῆμα.  
 colostrea, αἱ τροφαλίδες.  
 colora auis, ἡ κωλωτή.  
 colum, ὁ ἰδύμος, τὸ κώλον.  
 collum, ὁ πρήχμιλος, ὁ ἀντήν.  
 columba, ἡ πέρβερα.  
 columella, ἡ κωμή.  
 collurio auis, ὁ κωλλυρίων.  
 commosis excrementum  
 quoddam cera, ἡ μίσις.  
 conger, ὁ κωγγρος.  
 confidūm in augurū cisci  
 plina, ἡ κωιδία.  
 conuulsio, ὁ κωυλμός.  
 copula, amentum, τὸ ἀμμά.  
 cor, ἡ καρδία.  
 cordula, alibi cordulum,  
 co piscis, ὁ κωρδύλος.  
 cornix, ἡ κωρύνη.  
 cornu, τὸ κέρα.  
 cornua partes in uulua, τὰ  
 κέρατα.  
 cortex, ἡ φολίς.  
 coruus, ὁ κωρεξ.  
 costis, σκώληκες ἐκ τῶν δίνων.  
 coturnix, ὁ κωρνίξ.  
 coxa, nates, clunis, canis in  
 talis, pars tali scilicet, τὸ  
 ἐξόν.  
 coxa uel acetabulum, ἡ κω  
 τυλιδία.  
 crabro, ὁ ἀνδρινός, ἡ ἀνδρίνη.  
 crangines genus squillæ,  
 αἱ κράγγινες.  
 crex auis, ἡ κρέξ.  
 crista, τὸ κάλλιστον.  
 crocodilus, ὁ κροκόδειλος.  
 crustata, quibus crusta pro

tegmine est, τὰ μαλακὰ  
 τρακα.  
 crustula polentis obducta  
 uetula, ἡ γράνυς.  
 cubitus, ὁ πῆχυς, ἡ ὁ ἀγκών.  
 cuculus piscis, & cuculus  
 auis, ὁ κώκυξ.  
 cucurrire gallinacei gene=  
 ris est, ἡ κωκύνει.  
 culex qui mulio dicitur, ὁ  
 κνίψ.  
 culex, mulio, ἡ ἐμπίς.  
 culex, ὁ κώνωψ.  
 culicilega auis, ὁ κνιπολόγος.  
 cūculus lepus, ὁ δασύπους.  
 cursor piscis, ὁ δρομέας.  
 curuca, ἡ ἐπικαίς, alibi ἡ ὑπο  
 λαίς.  
 cutis, τὸ δέριμα.  
 cutē pro pennis habenna,  
 τὰ δερμόπτερα.  
 cynchramus auis, ὁ κύτ  
 ραμος.  
 cynocephali, οἱ κνωκεφαλοί.  
 cyprinus piscis, ὁ κυπρίνος.  
 cypsellus auicula, quæ ea  
 dem cum apodibus est,  
 ὁ κυψέλλος.

**D** Ama, ἡ πρῶξ.  
 Dasquyllus piscis, ὁ  
 δάσκυλλος.  
 delatio, ἡ φορέα.  
 delphin, ὁ δελφίς.  
 dens, ὁ ὀδόντος.  
 dentes asini ex quibus æ=  
 ras dignoscitur, αἱ γνάθια  
 νες, gnomones.  
 dentes maxillares, οἱ ὀδόν  
 τος γόμφιοι.  
 dētibz serratis animalia,  
 τὰ κερκιδόντα.  
 dentes qui gemini dicun=  
 tur, οἱ κραντίδες.  
 dentes canini, οἱ κνωδόντες.  
 denūbz exertis animalia,  
 τὰ χειλιόδοντα.  
 dētes exerti, οἱ χειλιόδοντες.  
 dētatū utrinqz, τὸ ἀμφόδυν.  
 dentex, ὁ σιῶν δυνῶν ἢ σιῶν

γρίς.  
 depes, ὁ κα κόπος.  
 diarium, τὸ ἐφήμερον.  
 digitus, ὁ δάκτυλος.  
 dissidium in augurū disci=  
 plina, ἡ διεδρία.  
 dissimulare, τὸ ἀνομοιομερές.  
 dodrās mensura, ἡ παλαιὰ  
 dorfum, τὸ νῶτον.  
 draco serpens, ὁ δράκων.  
 draco piscis, ὁ δράκων.  
 dygnis animal, quod &  
 chalcidē appellant, ἡ δ'υ  
 γνίς.

E

**E** Chinus aquatilis,  
 ὁ ἐχίνος.  
 effluxio, ἡ ἐκρυσις.  
 eiecicia oua, τὰ ἐκβόλι  
 μα ὠά.  
 Eledona, polypī species,  
 ἐλεδὼνη.  
 eleginus piscis, ὁ ἐλεγίνος.  
 elephas, ὁ ἐλεφας.  
 encraulus, ὁ ἐγκρανυλος.  
 epipetrum, τὸ ἐπίπτερον.  
 epiolus papilio, qui lucer=  
 narum luminibus aduo=  
 lat, ὁ ἐπίολος.  
 epitrageæ piscēs, οἱ ἐπίτρα  
 γεαί.  
 ephemerū diarium, τὸ ἐφή  
 μερον.  
 eques formica, ὁ ἰσσωμύρ  
 μης.  
 equus, equa, ὁ κα ἡ ἰσπος.  
 equus fluuiatilis, ἡ ἰσπος  
 ποτάμιος.  
 equicervus, ὁ ἰππελάφος.  
 equire, ἡ ἰσσωμένη.  
 equimulgi, οἱ ἰσσωδὲλαι.  
 equiselis, ὁ ἰσσωρος.  
 erica piscis spuria, ἡ χελκίς.  
 erithaca, ἡ ἐριθάκη.  
 eruca, ἡ κερκίς.  
 eruum, ὁ ἐροβος.  
 etelis piscis, ἡ ἐτελίς.  
 excaule, τὸ ἀκαυλον.  
 excremēta, τὰ περιττώματα.  
 expes, τὸ ἐπώμι.

VOCABVLA LATINA ET GRÆCA,

**F**acies, τὸ πρόσωπον.  
 falcula, seu riparia, ἡ δρεπανίς.  
 fauago purpurarum, ἡ μελίκηρα.  
 fauare, κηιδάειν.  
 fauces gutturis, ὁ φάρυγξ.  
 fauus, ἡ κηιδίον.  
 fel, bilis, ἡ χολή.  
 felis, ὁ αἰλουρος.  
 femen, femur, ὁ μηρός.  
 fiber, ὁ κέστωρ.  
 fibra, ἡ ἴμ, καὶ ὁ ἵος.  
 fibula ossis nomē, ἡ τρεῖς.  
 ficarius culex, ὁ ψήξ.  
 ficedula auis, ἡ συναλὶς.  
 fidicula piscis, ὁ κίδαρις.  
 fistipes, τὸ χιζόπιον καὶ τὸ ὑπόπαιον.  
 florus auis, ὁ αἰδός.  
 flos ætatis, ἡ ἀκμή.  
 fluctiones, τὰ ῥόμματα.  
 fluta, spargus, ἡ ῥυάξ.  
 fluuiale, ἡ ποτάμιον.  
 fluxio, ἡ ἐκρυσις.  
 fœmina, ἡ πῆλυ.  
 fœtus, partus, ἡ ἐμβρυον.  
 forcipatū pedis forceps ungula, ἡ χαλὴ.  
 formago, ἡ τρυφαλὶς.  
 formica, ὁ μῆρμηξ.  
 fringilla auis, ἡ σαρὶς.  
 fringillarius accipiter, ὁ σαρὶς ἱεραξ.  
 fringillago parī species, ὁ σαρὶς αἰγιδάλος.  
 frons, τὸ μέτωπον.  
 frugilega auis, ὁ σαρὶς μολός.  
 fuca parua, piscis, ἡ φουκίον.  
 fuca piscis, ἡ φουκίς.  
 fuci, qui inter apes degūt, ὁ κωφίτης.  
 fulica, ὁ κέστωρ.  
 fullo, insectum quoddam, ὁ κέστωρ.  
 fullo piscis, ὁ ψύλαον.  
 fur apīs species, ὁ φάρ.  
 fufanei pīscēs, quod fufum

reūbus capiantur, ē qui-  
 bus thunni, passerēs, &  
 aliī, διχύδοι ἰχθύες.  
 fufus agrestis, ἡ ἀφρακτυλλίς.

**G**Alades, concharum species, αἱ γαλάδες.  
 galena, ἡ μολιβδαῖνα.  
 galgulus, ὁ κολίος. alibi ὁ κολίος. alibi ὁ κολίος.  
 gallina, ἡ ἀλεκτορίς.  
 gallinaceus, ὁ ἀλεκτρονός.  
 gallinago auis, ὁ σκολόπαξ.  
 alibi ὁ σκολόπαξ.  
 gammari, ὁ ἀσπεκός.  
 gautia auis, ὁ λάρος.  
 gena, ἡ γνάθος.  
 genitura, ἡ γονή.  
 genu, ἡ γόνυ.  
 germane aquile, ὁ γνήσιος.  
 gibba genus squillæ, αἱ κύφαι.  
 giber, τὸ ἀλεκτρονός.  
 gingiua, τὸ οὖλον.  
 ginnus innus, ὁ γίνος.  
 gladius piscis, ὁ ξιφίς.  
 gladiolus, qui lolliginum corpore continet, τὸ ξιφός.  
 glan, qui et hyena ὁ γλαῖος.  
 glans penis extrema pars, ὁ βάλανος.  
 glans ē testaceo genere a quatle animal, ὁ βάλανος.  
 glaucus piscis, ὁ γλαῦκος.  
 glīres, ὁ ἑλαῖος.  
 gobio, ὁ κωβίος.  
 gobionaria, ἡ κωβίτης.  
 gula, ὁ στόμαχος, καὶ ὁ οἰστροφάτος.  
 gurgulio, ὁ γαργαρεῖον.  
 gustus, ἡ γούσις.  
 guttur, ὁ φάρυγξ.  
 graculus piscis, ὁ κωρακίος.  
 graculus ē monedularum genere auis, ὁ κωρακίος.  
 gregale, τὸ ἀγελίον.  
 gretille, τὸ ποδόντιον.  
 grus, ὁ γέρας.

**H**Alecule, τὰ μακρίδια.  
 h aleo mana, ἡ μαυρίς.  
 halcedon, ἡ ἄλκυον.  
 halosachne flos maris, ἡ ἄλυσάχνη.  
 hamia, αἱ ἁμῖαι.  
 harpa auis, ἡ ἄρπη.  
 heledona polypispecies, ἡ ἑλεδονή.  
 hemina dimidium, τὸ ἡμισυ.  
 herinacei, ὁ ἑχίνος χερσαῖος.  
 hiatula, ἡ χάνη.  
 hinnulus, ὁ νεβρός.  
 hippardium, ἡ ἵππαρδιον.  
 hippeus cætri gen<sup>o</sup>, eques, ὁ ἵππος.  
 hippomanes, τὸ ἵππομανες.  
 hircina capra, quæ genita le habent maris, & tæminæ, αἱ τρέχουσαι αἰγες.  
 hircus spongiæ genus, ὁ δερμάτιος.  
 hircus ὁ τράγος, ita etiā appellatur mēne, siue haleces mares, cum fœtu impleri fœmina incipit.  
 hirsuties, ἡ διασύντης.  
 hirundo marina, & terrestris, ἡ χελιδόν.  
 homo, ὁ καὶ ἡ ἀνδρῶπις, τὸ ἄνθρωπον.  
 hordeaceo morbus equorum, ὁ κελίτις.  
 humerus, ὁ ὤμος.  
 humerarius neruus, ὁ ὤμος.  
 hyæna, ἡ ὑάνα.  
 hyperina, id est effœta propter nimium partum, ὁ καὶ ἡ ὑπερῖον.  
 hypochondrium seu subcartilagineum, ἡ ὑποχόνδριον.  
 hyfrix, ὁ ὕσφις.

**I**Bis auis, ἡ ἱβίς.  
 Ichneumon, uespæ species, & quadrupes animal

EX LIBRIS ARISTOT. DE ANIMALIBVS.

mal,	ὁ ἡνδύμων.	lana,	τὸ ἔλαιον.	mamma,	ὁ μαστός.	
iecur,	τὸ ἥπαρ.	latax,	ὁ λάταξ.	mandibula,	ἡ γένυς.	
iecorinus piscis,	ὁ ἡπαλός.	latera,	τὰ πλάγια.	manus,	ἡ χεὶρ.	
iecoraria uena,	ἡ ἡπατική.	leana,	ἡ λεάνα.	mantichoras,	ὁ μαντιχώρας.	
ieiunum inter intestina,	ἡ ἡσῆς.	lendes,	οἱ κύνιδες.	marinum,	τὸ θαλάσσιον.	
ientaculum,	τὸ ἀκράσισμα.	lentor,	ἡ γλιχρότης.	marini pisces,	οἱ μαρίνοι.	
ignaria auis,	ἡ πυράλις.	leo,	ὁ λέων.	mariscæ,	αἱ αἰμορροΐδες.	
ileus morbus intestini in equis,	ὁ ἐλῆος.	lepus,	ὁ λαγώς.	matrix,	ἡ μήτρα.	
iliacus ex turdorum genere,	ἡ ἰλιάς.	leporaria aquila,	ὁ λαγωφό- νος ἀετός.	matrices i uesperti genere,	sunt ueluti duces, αἱ μῆραι.	
ilia,	οἱ λαγόνες.	leuitaia piscis,	ὁ λευόβατος.	matrix auis,	ἡ ὀρτυγινήτρα.	
improlis, infemini,	ὁ ἀγονος.	leuis mustelus,	ὁ λῆος γαλι- ός.	maxilla,	ἡ σαγών.	
inceffus,	ἡ πορέα.	libella piscis,	ἡ ζύγαννα.	maxillares dentes,	οἱ γόμφιοι ὀδόντες.	
incubitus,	ὁ ἐπωασμός.	libyus, alibi lœdus,	ὁ λιβύος.	medulla,	ὁ μυελός.	
ingluuius,	ὁ πρόλοβος.	lien,	ὁ σπλήν.	meleagris auis,	ἡ μελεαγρίς.	
ingressio,	ἡ βάσις.	lienaria uena,	ἡ σπληνική.	membras, adis,	ἡ ἀρσ.	
inguen,	ὁ ἐκβών.	ligula,	ἡ ὠδύγλωττις.	membra,	τὰ μέλη.	
innus,	ὁ γίννος.	ligurinus auis, siue spinus,	ἡ ἀκανθίς.	membranis siccis uolatia,	τὰ σπληνικά.	
insecta,	τὰ ζῷα.	limaces umbilici,	οἱ κοιλίαι.	membranæ, quibus foetus	inuoluitur,	οἱ ὕμνοι.
internodium in digitis,	ἡ φάλαγξ.	limosa, limaria,	ἡ πηλαμία.	mēbrana cerebri custos,	ἡ	
intestinum,	τὸ ῥέτρον.	lingua,	ἡ γλῶττις.	membrana, ὁ ὕμν.	(μήνιξις.	
iuba,	ἡ χούτη.	lingulaca auis,	ἡ γλωττις.	membrana,	ὁ ὕμν.	
iugale ossis nomē,	αἱ κλάδες.	lituus piscis,	ὁ θίς.	mentis, id est menstrua pur-	gatio,	τὸ κατὰμήνιον.
iugulum,	ἡ σφαγή.	liuia colūbæ species à liuo-	re dicta,	ἡ πελειάς.	menstrua,	τὰ κατὰμήνια.
iugulares uenæ,	αἱ σφαγιτι- δες.	locusta,	ὁ κάραβος, ἡ ἀκρίς.	mentum, barba,	τὸ γένειον.	
iulia piscis,	ἡ ἰουλία.	loligo,	ἡ τευθίς.	mergus,	ἡ ἀββα.	
iulus,	ὁ ἰούλος.	loli,	οἱ τευθοί.	merops auis, apiastrum uo-	catur,	ὁ μέροψ.
iumentū ueterinū,	τὸ λό- φορον.	lumbi,	ἡ ὀσφύς, ἡ αἰψοία.	merula, & auis & piscis,	ὁ	κόττιφος.
iunco auis,	ὁ χοϊνίλος.	lupus piscis,	ὁ λάβραξ.	metachœrum Iesus suis foe-	tus, posthumū,	alibi apor-
alibi	ὁ χοϊνίον.	lupus animal,	ὁ λύκος.	cellum,	τὸ μετὰ χοίρον.	
iuuenca,	ἡ νεοτίς, ut ἀλεκ- ρίδων αἱ νεοτίδες, gallinæ.	lupus ceruarius,	ὁ πανθήρ.	milus,	ὁ ἰκτινός.	
iuuenca, nouella alibi.		luscina,	ἡ αἰδών.	mingentia ex auerfo,	τὰ	ὀπιδορπητὰ καὶ τὰ ἐμπροδὲς ρηπητὰ.
		lutaria,	αἱ ἀμμύδες.	miscella, mistio,	ἡ σύνκρσις.	
		lutea auis luteus,	ὁ χλωρόδός.	miulus e testa i rectis,	ὁ μύς.	
		luteola auis lutea,	ἡ χλωρίς.	mola,	ἡ μύλη.	
		lutra,	ἡ γυνδρίς.	moles,	ὁ ὄγκος.	
		lynx,	ἡ λυγξ.	mollia,	τὰ μαλάκια.	
		lyra piscis,	ἡ λύρα.	molliceps auis,	ὁ μαλακί- κεράνος.	

M

<b>M</b> Aia cancerorū gene- ris,	αἱ μάια.
malida asinorum quidam morbus,	ἡ μάλις.
malleolus,	τὸ σφυρόν.
malleol <sup>9</sup> piscis,	ἡ σφυρανα.

L

**L** Abeo piscis è mugilū  
genere, ὁ χαλῶν, alibi  
χαλῶν.

labrum, τὸ χαῖλος. || lac, | τὸ γάλα. |
lacertus piscis,	ὁ σαύρο<sup>9</sup>.
lacertus,	ὁ σαύρος.
lacerta,	ἡ σαύρα.
lactes,	τὸ μωσεντέον.
lacustre,	τὸ τελμακίνηον.
lamia piscis è cartilagine=	
is,	ἡ λαμία.

E c 2

VOCABULA LATINA ET GRAECA,

monstrum, τὸ τέρας.  
montisfringilla avis, ὁ ὄρεο-  
πίγυς.  
mormur piscis, ὁ μόρμυρος.  
muco piscis ē mugilum ge-  
nere, ὁ μύζωμ, alibi  
μύζωμ.  
mugil, ὁ κερδύς.  
mulio,  
mulus, ὁ ἡμίονος, ὁ ὄρδύς.  
mulus piscis, ἡ εἰργίλα.  
multifidus, πολυεπίθης.  
muræna, ἡ μύρανα.  
murices, αἱ ἀκρεβράδες.  
murinus piscis, ὁ μύρινος.  
murus piscis, ὁ μύρος, mas-  
in muranis.  
mus aquaticus, uel testudo  
lutaria, ὁ ἐμύς, ἢ ὁ ὠμύς.  
mus terrestris & aquaticus,  
ὁ μύς.  
mus ponticus, μύς πον-  
τικός.  
musca, ἡ μύα.  
musculus piscis, ὁ μυσ-  
κύριος.  
mustax, ἡ ὑπὸ γένυ.  
mustellus spinax, ὁ ἀκανθί-  
ας γαλέος.  
mustellus nebris, ὁ γαλέος  
mustella, ἡ γαλήνη, (νεβείας).  
mutis, ἡ μύτις, quæ et μύ-  
κωμ, id est papauer appel-  
latur.

N

Naris promuscis eti-  
am in elephante, ὁ  
μικτήρ.  
nasus, ἡ ῥίς.  
natio, ἡ γένεσις.  
natio, ἡ γένεσις.  
natio, ἡ γένεσις.  
nates, ὁ γαλῶτος.  
natex, ἡ νεοίτης.  
natrix, ὁ ὕδρος.  
nauta polypti spēs, ὁ ναυτίλος.  
necydalus, ὁ νεκύδα-  
λος insectum inualidum  
Theodorus interpreta-  
tur.  
nepos ex filio, ὁ ἐπιδείξ.  
neruus, τὸ νῆρον.

nigrū, quod pupillā ambit  
τὸ μέλαμ.  
nidus, νεστέα.  
noctua, ἡ γλαύξ.  
nodus, siue articulus, ὁ κό-  
νυς, τὸ σημῆμα.  
nymphæ, ἡ νύμφη.

O

Occhiput, τὸ ὀπίον.  
Ocrea, τὸ ἀντικνήμιον.  
oculus, ὁ ὀφθαλμός.  
oculata, piscis, ὁ μελαίντρος.  
officiales, seu instrumen-  
tales partes, τὰ οργανικὰ  
μέρη.  
olfactus, ἡ ὀσφρησις.  
ololygo, ὁ ὀλολυγὼμ, uox ra-  
narum, ὁ κύκνος.  
olor, ὁ κύκνος.  
omasum in uētre propè re-  
ticulum, ὁ ἐχίνος.  
omentum, τὸ ἐπίπλοον.  
orchylus avis, ὁ ὄρχυλος.  
orcynus piscis, ὁ ὄρκυνος.  
orfodagna ἡ ὀρφοδάκη, quā  
ait interpretari posse mor-  
tellam.

oryx, ὁ ὄρυξ.  
os offis, τὸ ὀστέον.  
os oris, τὸ στόμα.  
ossifraga, ἡ φάλαγξ.  
ostole polypti species, ἡ ὀ-  
στόλη.  
ostrea, τὰ λιμνὸςρεα.  
ostrea conchæ, τὰ ὀστρεα.  
otus ab auribus, quasi auri-  
tus, avis est, ὁ ὠτός.  
ouipera, τὰ ὠοτόκη.  
ouis, τὸ πρὸ βοῶντος.  
ouum, τὸ ὠόν.  
Oua eiecticia, τὰ ὠοεικτα-  
λμα.

P

Pagrus piscis, ὁ φάγρος.  
pagurus, ὁ πάλγυρος.  
palatum, ἡ ὑπερώα, ἢ ὁ ὀ-  
φθαλμός.  
palma uola, τὸ πελάγος.  
palma mensura, ἡ ἀντιμέτρον.  
palmipes, τὸ πελάγος.

palumbarius accipiter,  
ὁ φαβότυπος ἱέραξ.  
palpebrae, αἱ βλέφαρα, &  
cilia.  
palpebra, τὸ βλέφαρον.  
palumbes, φάβες, ὁ cuius ge-  
nitium inuenio, φάβος.  
palumbes, ἡ φάβη.  
palustre, τὸ λιμνῶδες.  
pancreum à carnis multi-  
tudine, τὸ πάγκρεον.  
panthera, ἡ πένθηρα.  
papauer piscis, ὁ μύκωμ.  
papauerculū excrementū,  
quod primū à pueris emit-  
titur, τὸ μύκωμ.  
papilla, ἡ θηλή.  
papilio, ἡ ψύλλα.  
pardalus avis, ὁ πέρδαλος.  
pardalianches, τὸ πέρδα-  
λινον.  
partes, τὰ μέρη.  
part, τὸ ἐμβρυόν, ὁ κύημα.  
parus avis, ὁ αἰγινθαλός.  
par monticola, ὁ αἰγινθαλός.  
parturigo, ἡ ὠδὴ.  
passeres aues, τὰ πτερόδια.  
passer piscis, ἡ ψύλλα.  
passer, ὁ πτερόδιος.  
pastinaca piscis, ὁ ἐραγώμ.  
pastinaca bestiola uerticilis  
le similis, ὁ σαφιδίνος.  
parella, ἡ λεπτή.  
parella fera, quæ etiā θαλάσσι-  
ον οὖς, id est marina avis  
appellat, ἡ λεπτή ἀγρία.  
pauo, ὁ παύος.  
pectus, ὁ θώραξ, ἢ τὸ στήθος.  
pectunculus, pecten, ὁ κτενίς.  
pedestre, τὸ πεζόν.  
pediculus, ὁ φθέρ.  
piscis etiā eodem nomine.  
pediculus fer, ὁ φθέρ ἀμμος.  
pella ardeolæ species, ὁ  
πέλλος.  
penelops avis, ἡ πηνελόπη.  
penis genitale, τὸ αἰδοίον.  
penna, τὸ πτερόν.  
pennarū loco quibus cuius



EX LIBRIS ARISTOT. DE ANIMALIBVS.

est, τὰ δερμόπτερα.  
perca accipiter, ὁ πέρκος  
ἱέραξ.  
perca piscis, ἡ πέρκη.  
percnopterus aquila spec  
es, ὁ πέρνόπτερος.  
perdix, ὁ πέρδιξ.  
perne, seu culine, οἱ κωλλινίς  
pes, ὁ πέρς.  
pes, crus, τὸ σκέλος.  
phalangium, ὁ φαλάγγιον.  
phalanx animal, ὁ φαλάγγξ.  
phalaris auis, ἡ φαλακρός.  
phaleria, ἡ φαλαγγική.  
phanger piscis, ὁ φάγγερος.  
phasianus, ὁ φασιανός.  
phocæna, ἡ φώκαινα.  
phoix, seu phoicus, ὁ φώξ.  
pholis piscis, ἡ φωλὶς.  
phoxinus piscis, ὁ φοξίνος.  
phuca piscis, ἡ φυκίς.  
phuca parua, ὁ φυκίσδιον.  
pica, ἡ κίττις.  
picare, κίττειν.  
picatus cereus in alueari  
bus, ὁ προσόκηρος.  
pic<sup>9</sup> marti, ὁ δριφοκλάτης.  
pilare malum, quod mulie  
res inuadit, si pilum in po  
culo hauserint, ὁ ξημίας.  
piña species testa intercori  
pinna, τὰ πτερυγία, (ἡ πίννα.  
pinnula sub thygni uentre.  
pinnother, ὁ πιννοθήρ.  
piphex auis, ὁ πίπξ.  
pipo auis, ἡ πίπις.  
piscis, ὁ ἰχθύς.  
piscatrix raia piscis, ὁ ἁλίας.  
pituuta, τὸ φλέγμα. (βάτος.  
planipes, ὁ στεγανόπους.  
plateæ aues, οἱ πελεκάνες.  
podagra, ἡ ποδάγρα.  
podex, ὁ πωκίς.  
podex anus, ὁ ἀρχός.  
polluere, semen per som  
nū emittere, ἐξ ὀνειρώτην.  
polypus, ὁ πολύπος.  
pompilus, quem et ὠν πο  
λύποου polypi uocant,  
ὁ ναυπηγός.

poples, ὁ ἰγνύς, ἢ ἰγνύα.  
porphirio auis, ὁ πορφύρεον.  
portæ in iecinore, αἱ πυλάαι.  
præcordia et cinct<sup>9</sup>, αἱ φλι  
præcordia, αἱ φρενές. (βέρ.  
præputium, ἡ ἀκροποδία.  
primada, αἱ πριμαδία.  
pristes piscis, ὁ πρίστης.  
pronum, ὁ προνός.  
propherus cruentus qui  
dam humor, qui inter du  
as mēbranas continetur,  
cum foetus in utero forma  
ri incipit, ὁ πρόφερος.  
pittace auis indica, ἡ πίτ  
τάκη.  
ptynx auis, quā eandē cū  
chalcide esse qdā credunt  
pubes, ἡ ἡβη. (ὁ πῆνγξ.  
pudenda, τὰ αἰδοία.  
pulla, seu fulua aquila, ὁ  
μελαινάτος.  
pulcher piscis, ὁ καλλι  
νυμος.  
pulex, ἡ ψύλλα, ἢ ψύλλος. uī  
de etiā, aranei species esse.  
pulicaria herba, ἡ κέρυθα.  
pullium, quod equa ante  
pullum emitit, ὁ πώλιον.  
pulmo, ὁ πνύμων.  
pulmo aquatilis, ὁ πνύμων.  
pumiliones, οἱ ναυνοί.  
pupilla, ἡ κούρη.  
purpurissum, ὁ ὠδρόκελον.  
purpura, αἱ πορφύραι.  
pus, ὁ ποῖος.  
putamen, ὁ κέλυφος.  
putamen non tamen puto  
propriū id græcē esse, ἡ  
προβολή.  
pygargus aquila species.  
Theodorus posse ait albi  
cillam interpretari, ὁ πύ  
γαργός. uocatur & ὁ νεβρο  
φόνος, quod Theodorus  
transfert hinnulariam.  
pyrausta uermiculus infe  
stans apum aluearia, qui  
& clerus, ὁ πυρανύς.  
est & paruū animal, quod

uolans in lucernam, ut fa  
gnē attingat, adunif. Hinc  
prouerbiū, πυρανύς τε μῶρος.  
in eos qui sibi mortem as  
ciscunt.

R

Abies, ἡ λύτηα.  
raia mas, ὁ βάτος.  
raia foemina, ἡ βατίς.  
rana, ὁ βάρεαρος.  
raucedo, ὁ βραγγος.  
redius, ὁ κρότων.  
regulus auis, ὁ βασιλόβης.  
remora, ἡ ἑχέπαις.  
renes, οἱ νεφροί.  
ren, ὁ νεφρός.  
reptio, ἡ ἑρμῆς.  
reptile, τὸ ἑρπυσικόν.  
resimatum, τὸ ἀνώσιμον.  
reticulum, uel arsin eum,  
κεκρύφαλος.  
rex apum, ὁ βασιλεὺς τῶν  
μελιτῶν.  
ricinus foedum animal ca  
nibus infestū, ὁ κωροκίσκος.  
ricu, quod est adunco, τὰ  
ἐπίγρυπον.  
ricus, rostrum, τὸ ξύγχος.  
riparia, ὁ ξύγχος.  
rostrum, τὸ ξύγχος.  
rubellio, uel rubellus piscis  
rubellus, ὁ ἐρυθρεμένος, ὁ ἐρυθρείνος.  
alibi.  
rubetarius accipiter, ὁ φρω  
λόχος ἱέραξ.  
rubetra, ἡ βατίς.  
rubeta, ἡ φρωή.  
rubicilla auis rubecula, ὁ  
πυρρόλας.  
rubri, οἱ ἐρυθρεῖνοι.  
ruminalis piscis, ὁ μέγεξ.  
rupex auis, alibi hiaticulā  
uocat, ὁ χερσάδριος.  
ruticilla, ὁ φοινικουργός.

S

Acer piscis, ὁ ἀνθίας, qui  
senā anthias, græce quo  
que ἱέρως ἰχθύς, qui & αὐλο  
πίας dicitur.  
sacer serpens, ἡ ἱέραξ.  
salamandra, ἡ σαλαμάνδρα.

VOCABULA LATINA ET GRAECA,

salitium, ἡ ἀναφαλαγγτίας.	semen genitale, ὁ βορέος, καὶ	squatina, ἡ ῥίνη.
salpa, ἡ σάλπη.	γονή, καὶ τὸ σπέρμα.	squatrata, ὁ ῥινόβατος, rhino-
salus avis, ὁ ἀγνός, agithus	seminaria uena, ἡ σπερμα-	batus.
nōnunquā. alibi, ἀγνός.	πίσις.	squilla squillus, ὁ κρεῖς.
sandaraca, genus cibarij a=	femitalus, ὁ ἡμισφαγγαλος.	squilla parua, τὸ κρεῖδιον.
pū duricie cere, pximum,	fempasiones aues, οἱ αἰετο-	stabilis, et fellularia, ἡ
ἡ σενδεράκη.	κώπες.	ἰδρύα.
sanguis, τὸ αἷμα.	senforia, τὰ αἰδνητήρια.	stellatus piscis, ex mustello
sanguinea, τὰ χροαίμα.	senfuū sedes, τὰ αἰδνητήρια.	rum genere, stellaris alibi,
sanies, ὁ ῥῶγ.	sepia, ἡ σπηπία.	ὁ ἀστερίας.
saperdis piscis, ἡ σπερδίδις.	sepium, τὸ σήπιον.	stellaris auis cognomento
sarda piscis, ὁ ῥαγίας.	sepiū tranfuerfum, siue cin-	piger, ex ardeolarū gene-
sarda, ὁ ῥαγιάθ.	ctus, διάζωμα.	re, ὁ ἀστερίας.
sardæ, αἱ ῥαγίαι.	septum, præcinctus, τὸ ὑπὸ	stellaris accipiter, ὁ ἀστερίας
sardinæ, αἱ ῥαγίδες.	ζομα.	ἱέραξ.
sargus, ὁ σάργος.	serpens, ὁ ὄφεις.	stella aquatilis, ὁ ἀστὴρ.
sargus, piscis ē mugilū ge=	serpens marina, ὁ ὁ ὤς θα-	stellio, ὁ ἀσκαλαβώτης.
nere, ὁ σάργος.	λάτης.	stercus, ἡ κοπρος.
sargini pisces, οἱ σάργινοι.	serum, ὁ ὀρέρος.	sterilitas, ἡ ἀτεκνία.
satheriū animal, τὸ σαθέριον.	setauræ iuuenæ, quedā in	sternutamentū, ὁ ἥαρμός.
satyras morb⁹, ἡ σατυρία.	Epiro, quæ et pyrrhica, αἱ	struma, τὸ κροῦρος.
satyriū animal, σατύριον.	ἄποσταυροί.	struthio libyca, ὁ στρουθός γι-
schadon apū soboles, ὁ σχά-	seum, τὸ εἶαρ.	λιβύη.
δουμ.	silpha insectum, ἡ σίλφη.	sturnus auis, ὁ ψάρος, καὶ ἡ
scapulæ, αἱ ὠμοσπλάγται.	silurus, ἡ γλανίς.	κίχλη.
scarabæus, ὁ κάρβαρος.	siluia auis, quæ rubecula	subaquila aquilæ species,
scarabæus taurus, insectū,	alibi interpretat, ὁ ἐρίβακος.	ὁ ὑπαιετός, habent tamē co-
ὁ κάρβαρος.	simia porcaria, ὁ χειροπύθι-	dices quos uidimus, non
scarabæus pilularius, ἡ κεν-	κος.	ὑπαιετός, sed γυναιετός qua
θάρσις. qui et cantharus di-	simia, ὁ πύθικος.	si uulturinā aquilā dicas.
citur,	similare, τὸ ὁμοιομερές.	subare, καὶ πρῶξις.
scarabæus piscis, ὁ κάρβαρος.	inciput caluaria, τὸ βρέγμα.	subnatale, ἡ ὑπογαστρίς.
scarabæus galleruca, ἡ μηλο-	siren insectum est quoddā,	subuentanetū, τὸ ὑπηνέμιον.
λόνδην.	σειρήν.	subuteo accipiter, ὁ ὑποβόρος
scarus, ὁ σκῆρος.	sitta auis, ἡ σίτην.	χρὺς ἱέραξ.
scombrus piscis, ὁ σκόμβρος.	solida ungula, ἡ ὥαλῃ.	lues cicures, οἱ ἡμεροί νες.
scordula piscis, ἡ σκωρδύλη.	solipes, τὸ μώνυχον.	suffrago, poples, nodus, ἡ
scordula, ἡ αὔξις.	forices, οἱ ἀερεαῖοι μύες.	καμπή.
scorpius piscis, ὁ σκωρπίος.	spargus, ἡ ῥυάς.	summi armī ἡ ἀκρωμία.
scorpio piscis scemina, ἡ	spatagus echinorū species,	supera, τὸ ὑπερον.
σκωρπίς.	ὁ σπάταγθ.	supercilium, ἡ ὀφρύς.
scortum, ὁ ὀχεύς.	spina, ἡ ἀκανθα, ἡ ῥάχις.	supinum, τὸ ὑπῆλον.
scortum pellicula, quæ te=	spinax mustellus, ὁ ἀκανθί-	fura, ἡ γαστροκνημία.
stes continet, ἡ ὀστέα.	ασ γαλέος.	fus, ὁ ὕς.
secundæ, τὸ ὑπερον.	spinus siue ligurinus auis,	futura pars caluæ ferrata, ἡ
secundæ, quibus foetus in=	ἡ ἀκανθίς, siue ἀκανθίλις, ali-	ῥαφίς, καὶ ῥαφή.
uoluitur, τὰ χόρια.	bi argatilis.	syderatio morbus, ὁ σφακε-
sedimenta alui, τὰ ὑποσῆμα	spongia, ὁ ἀνύγθ.	λισμός.
τὰ τ' κοιλίας.	spuma piscis, ὁ ἀφρός.	
sellularia, ἡ ἰδρύα.	squama, ἡ λεπίς.	

T Abanus, ὁ μύαψ.

EX LIBRIS ARISTOT. DE ANIMALIBVS.

taetus,	ἡ ἀφῆ.	turbo cochlea,	ὁ σρόμβος,	uiscera,	τὰ σπλάγχνα.
talpa,	ὁ ἀσπίλαξ.	turbinatus,	ὁ σρομβώδης.	uisus supercilium interpre-	
talus,	ὁ ἀσπύγκλος.	turdus auis, & turdus pi-		tatur,	ὁ ὄψις.
tarda auis,	ἡ ὠτίς.	scis,	ἡ κίχλη.	uitellus,	τὸ ὠχρόν τῷ ὄ.
tempora,	οἱ κροτάφοι.	turtur auis,	ἡ τρυγών.	uitellus,	ὁ λεκυθῶς.
tendo neruus,	ὁ τένων.	tympan <sup>o</sup> auis,	ὁ τύμπανος.	uitiflora auis,	ἡ οἰνωδής.
teredinariū, ubi scilicet tere-		tyrānus auicula,	ὁ τύραννος.	uitiligo,	ἡ λδύκη.
dines foetū edunt,	τὸ πέν-			uita piscis,	ἡ ταινία.
derhniou.				uitulus marinus,	ἡ φώκη.
teredo eruca, quæ alueari-				uiuterra, mustela scilicet ru-	
bis apum innascit,	ἡ περι-			stica,	ἡ ἰκτίς.
διων, καὶ πενθροδών.				uiuiparum,	τὸ ζωτόνιον.
terrestre,	τὸ χερσαῖον.			ulula,	ὁ αἰγώλιος, αἰγωλῖος.
terre intestina, unde anguil-				umbilicus,	ὁ ὀμφαλός.
la oriuntur, τὰ γῆς ῥήματα.				umbra piscis,	ἡ σκίασμα.
testa quibus pro tegmine				uncūguia, quibus ungues	
est,	τὰ ὀστρακώδεα.			adunci,	τὰ γαμψώνυχια.
testis,	ὁ ὄρχης.			ungula solida,	ἡ ὀσλή.
testudo,	ἡ χελώνη.			ungula, seu digitus, seu un-	
testudo lutaria, ἡ ὠμός, alibi				guis ē testa itectis, ἡ ὀπλή.	
tetrix auis, ἡ τέτριξ. (ζεύς.)				unguis,	ὁ ὄνυξ.
tetrigometra cicadæ maritix				unguiculi,	τὰ ὀνύχια.
ex qua orit, ἡ τετρίγονμήτρα				uoca piscis,	ἡ βώκη.
thorax,	ὁ θώραξ.			uola planta pedis, ὁ τρωτός.	
thos, uel lup <sup>o</sup> ceruari <sup>o</sup> , ὁ θώος				uolatio,	ἡ πτήσις.
thunna,	ἡ θυννίς.			uolax,	τὸ πτηνόν.
thunmus,	ὁ θύννος.			uolucra,	τὸ πτηνόν.
thunnarius, ὁ θυννοσκόπος.				upupa,	ὁ ἑποψ.
thymum herba,	τὸ θυμάριον.			urax auis ex tetrigū genere	
tibia,	ἡ κνήμη.				
tillo piscis,	ὁ τίλλων.			urinatrix auis, ἡ κολυμβέτις.	
tinea, uel lumbricus, ὁ ἑλμύς				urinū ouū,	τὸ οὐρινόν ὠόν.
tinea,	ὁ σῆς.			urfa piscis, ἡ ἀρκτος αἰκτός.	
tinunculus,	ἡ κίχλη.			urfa,	ἡ ἀρκτος.
tiullatio, ὁ γαργαλιόμας.				urtica marina,	ἡ ἀγκυλίωκη.
tiullor,	γαργαλιόμας.			usus,	ἡ χηλῆσις.
tosus,	ὁ πόρος.			uterus, ἡ δελφίς. unde, ἀδελ-	
tonfille,	τὸ παρῆμιον.			φοί, uterini fratres.	
torpedo,	ἡ νάρεκ.			uua,	ἡ πεφυλή.
totipennia,	τὰ ὀλόπτερα.			uulpanfer auis ἡ χυκαλώπηξ	
tractile,	τὸ ἄλγιστον.			uulpecula,	ἡ ἀλώπηξ.
tiorchia accipitris gen <sup>o</sup> à te-				uulpes marina,	ἡ ἀλώπηξ.
sticulatorū nūero, ὁ τριόρχης.				uultur,	ὁ αἰγυπτιός, ὁ γυψ.
tiurio, uel ut alibi, tiurio, ἡ				uulua uterus,	ἡ ὄστρεα.
φώκαινα.				Xylophthor <sup>o</sup> uermis à cor-	
trochilus, ὁ τροχίλος.				rūpendis lignis ita appel-	
trochus,	ὁ τροχός.			latus. Theodorus ligniper-	
trynga auis,	ὁ τρυγας.			di interpretari posse ait, ὁ	
tuberī cameli dorso, ὁ ὕβος				ξυλοφθόρος.	
turbo, iynx, torquilla, ὁ ἰνγξ					

FINIS.

# THEOPHRASTI PHILOSOPHI CLARISSIMI,

De historia plantarum, Libri VIII.  
Et Decimi principium,  
De causis, siue generatione plantarum, Libri VI.

THEODORO GAZA INTERPRETE.

Cum eorum omnium quæ his Theophrasti  
libris continentur, indice.



EX VOLATERRANO.

Theophrastus ex Eresso Lesbi ciuitate fuit, Aristotelis & discipulus, & scholæ successor. Euphrastus, deinde Theophrastus uocatus, ob oris & eloquentiæ suauitatē: cum antea Tyrannus appellaretur. Habuit discipulos ad duo milia: fu- itq; in honore apud Cassandrum Antipatri. Opera eius, quanta nullius alterius, à Diogene commemorantur. Inter quę sunt libri sex Epitomes in Aristotelem de animalibus. Exstant hodie tantum de plantis, conuersi à Gaza: de lapidi- bus & metallis: de sudore, Metaphysica parui tractatus. Excessit admodum senex. Ex Suida, Diogene, Strabone, Cice- ro dulcem eum appellat.

# EORVM QVAE

HISCE THEOPHRA=   
 sti libris continentur, index copiosiss=   
 simus. Prior numerus paginam, al=   
 ter uerò uersum usq; ad deci=   
 mum sequentē designat.



Bies. pag. 56. ver. 1.   
 & 71.20. & 166. 1.   
 Abietis ad plurima   
 usus. 75.30.   
 Abies maximi u=

fus. 75.30.   
 Abies decacuminata morif. 67.30   
 & 229.30.   
 Abies ablatis quibusdam parti=   
 bus moritur. 36.10.   
 Abies apta nauibus. 75.1.   
 Abies quomodo nascatur. 23.1. &   
 49.1. & 69.40.   
 Abietis germinatio. 35.20.   
 Abies squamosa. 34.10.   
 Abies coli non uult. 10.10.   
 Abies quare fissilis fit. 11.30.   
 Abies ubi non nascatur. 52.30.   
 Abies uentis obnoxia. 35.40.   
 Abies montis ppria arbor. 32.10.   
 Abies ualida propter nodos. 15.1.   
 Abies pondus sustinet. 74.20.   
 Abies umbrifis locis gaudet.   
 48.40.   
 Abieti una radix tantum. 12.10.   
 Abietis nodus. 73.20.   
 Abies Macedonica. 15.30.   
 Abietis & pini differentia. 69.20.   
 Abietis succus. 111.40.   
 Abietis materies quando colora=   
 tior fit. 68.40.   
 Abietis materies incorrupta. 73.1.   
 Abies quē locū defideret. 160.10.   
 Abietis lachryma. 244.40.   
 Abietis fructus. 248.10.   
 Ablaqueationis uitii usus. 64.40   
 Ablaqueationes quid sibi uelint.   
 221.10.   
 Abrotoni odor. 248.40.   
 Abrotonum quomodo germi=   
 net. 85.20.   
 Abrotonum quomodo nascatur.   
 13.30.   
 Abrotonum. 78.30. & 198.1.   
 Abfinthium. 54.30. & 95.40. &   
 175.10. & 234.30.   
 Abfinthii pecora pascunt. 125.30.   
 Acanum. 78.40.   
 Acarna. 82.1. & 20.   
 Accipiter mutatur. 25.20.   
 Accipiter tritesticgerus. 118.1.

## I N D E X,

Acer quando cædatur. 68.40.   
 Acer spissa. 71.20.   
 Acer aliud nomen in monte, ali=   
 ud habet in plano. 32.10.   
 Aceris utilitas. 75.40.   
 Aceris genera. 40.20.   
 Acerbus sapor. 231.20.   
 Acerbi fructus primo. 236.40.   
 Acefina amnis habet robustos ha=   
 rundines. 62.40.   
 Aceti usus. 125.20.   
 Acetum quo pacto fiat. 238.30.   
 Acharnica regna. 47.20.   
 Aconitum unde dictum. 124.10.   
 Aconitum ubi optimum nascat=   
 ur. 124.1.   
 Aconiti descriptio. 124.10.   
 Aconiti ueneno nihil resistit.   
 124.20.   
 Aconitū habere capitale. 124.30.   
 Acris sapor. 231.30.   
 Acria calida. 152.1.   
 Acris sapor siccitatis est. 242.30.   
 Acria cur quibusdam adferantur.   
 255.10.   
 Aculeatorum differentia. 78.40.   
 Acutus iuncus. 69.1.   
 Acutus sapor. 234.30.   
 Acutus sapor humiditatis est.   
 242.30.   
 Acuta spina semper uiuet. 15.40.   
 Acuta ex acerbis ueniunt. 256.20.   
 Acylum uocat ilicis fructū. 45.30.   
 Adianti folium. 99.10.   
 Adonidis horri. 85.20.   
 Adramyta quid gignat. 114.20.   
 Adria nō habet platanum. 55.20.   
 Aeanica materies. 70.20.   
 Aegæ meliora medicamenta fc=   
 runt. 128.20.   
 Aeger utrum moriatur quomo=   
 do sciri possit. 121.10.   
 Aegis quem usum præbeat. 39.10.   
 Aegidem pinus gignit. 38.30.   
 Aegyptus fecunda. 34.40. &   
 120.20.   
 Aegyptium triticum. 104.10.   
 Aegyptium frumentum purum.   
 105.1.   
 Aegypti arbores. 49.30.   
 Aegyptiorum cibus. 59.10.   
 Aegyptus infinitas habet plan=   
 tas. 58.10.   
 Aegyptus fert coctilia. 206.10.   
 Aegyptus medicamentis plena.   
 122.40.   
 Aegyptus apta arboribus. 153.20.   
 Aemi montis quercus. 161.40.   
 Aepisyngis ager. 205.1.

Aequorum species. 46.40.   
 Aër multum ad plantas immu=   
 tandas ualet. 23.40.   
 Aër omnibus pestilens. 235.30.   
 Aëris bonitas. 160.30.   
 Aër humo permixtus. 133.40.   
 Aër arboribus commodus. 155.1.   
 Aëris inæqualitates. 195.30.   
 Aër nutrit plantas. 186.10.   
 Aëris uitia. 194.1.   
 Aër etiam alit. 159.30.   
 Aëris clementia facit ad maturi=   
 tatem. 205.20.   
 Aër qui facilius gelerur. 226.20.   
 Aëris bonitas ad succum facit.   
 136.10.   
 Aër qualis optimus. 130.20.   
 Aër circumsusus spectadus. 195.10.   
 Aesculus. 38.11.   
 Aestare qui uenti boni. 154.40.   
 Aestare etiā sicca germinat. 141.20.   
 Aestatis tempus. 141.1.   
 Aestus fructus adurunt. 222.20.   
 Aestus quid noceat plantis. 227.10.   
 Aestus quibus noceat. 223.20.   
 Aestus uehemētiore officit saporē.   
 252.1.   
 Aethiopiæ imbres. 177.20.   
 Africa. 195.10.   
 Africum triticum. 104.10.   
 Ager optimus. 180.10.   
 Ager bene agitur. 175.10.   
 Ager ferens coctilia. 206.10.   
 Ager pluuius plus stercore defi=   
 derat. 183.40.   
 Agitarorium. 54.30.   
 Agnatio in abiete. 36.10.   
 Agnina lingua. 96.40.   
 Agricolatio. 168.20.   
 Agricolatio quid moliat. 145.10.   
 & 175.10.   
 Agricolæ quæ cōsideranda. 193.20.   
 Agriculturna opera. 175.30.   
 Agriculturna cur inuenta. 143.30.   
 Agri finis. 195.10.   
 Agri quibus rebus steriles fiunt.   
 227.10.   
 Agri natura cognoscēda. 170.40.   
 & 179.20.   
 Agri quidam nullum cultum de=   
 siderant. 192.1.   
 Agrorum differentia. 205.10.   
 Agrestium odor. 256.1.   
 Agrigentinum frumētum. 105.1.   
 Alba infirmiora sunt nigris.   
 193.40.   
 Albucum. 98.1.   
 Albuci folium. 97.40.   
 Alexias medicus. 124.40.

# I N D E X.

- Algarum genera.** 95.40.  
**Alica diuturna.** 210.20.  
**Alimenti minus habent uetera.** 93.10.  
**Alimenta ut se habeant.** 234.40.  
**Alimenta diminuentia.** 221.10.  
**Alimētum quomodo coquatur.** 190.10.  
**Allium.** 88.10.  
**Allium quomodo feratur.** 88.20.  
     & 92.1. & 131.40.  
**Alliū habet plura genera.** 90.40.  
**Allium Cyprium.** 92.1 (& 91.20).  
**Alliorum sapor.** 244.30.  
**Allij semen.** 92.10.  
**Allij radix.** 92.10.  
**Alnus quando germinet.** 33.20.  
**Alni radices.** 35.40.  
**Aluum purgans remediū.** 121.20.  
**Aluum cultū non admittūt.** 175.10.  
**Amara pleraque odorata sunt.** 240.40.  
**Amarago quando floreat.** 97.20.  
**Amaracum recens.** 131.20.  
**Amarus succus.** 19.10.  
**Amarus sapor.** 231.30.  
**Ambustus aptū medicamen.** 117.30.  
**Amentum in arboribus.** 34.40.  
**Amerina ad iustā arboris magnitudinem peruenit.** 9.30.  
**Amerinæ flos.** 20.20.  
**Amomum.** 116.40.  
**Amphiergum solum.** 194.30.  
**Amplexicaulia.** 94.40.  
**Ampulla herba.** 95.10.  
**Amputationes.** 175.40.  
**Amygdala.** 166.10. & 228.40.  
**Amygdalarū humor gummosus.** 221.40.  
**Amygdalæ fructus sine folijs.** 214.30.  
**Amygdala alijs damnoſa.** 184.30.  
**Amygdalæ sterileſcunt propter copioſum alimentum.** 147.1.  
**Amygdala qua ratione dulcis ex amara fiat.** 129.10. & 147.1.  
**Amygdala quale ſolum poſtulet.** 180.10.  
**Amygdalæ mutatio.** 24.10. & 169.40. & 190.10.  
**Amygdalæ lachryma.** 244.40.  
**Amygdala quomodo crefcat.** 130.30.  
     (183.20).  
**Amygdalæ dulces quomodo fiāt.** 190.30.  
**Amygdalas quomodo quidam emendunt.** 221.1.  
     (190.30).  
**Amygdala quomodo colenda.** 190.30.  
**Amygdala facile amittit fructus ſuos.** 161.40.  
**Amygdala quo pacto ſeruetur.** 230.40.  
**Amygdalæ uires.** 169.1.  
**Amygdala qualis primo.** 237.20.  
**Amygdalæ flos.** 162.1.  
**Amygdalas adultas Thafij inoculant.** 136.10.  
**Amygdalæ non durant.** 197.20.  
**Amygdaliſ quale ſolum cōgruū.** 170.40.  
**Amygdala amara cur fiat.** 229.40.  
**Amygdalæ radix.** 12.10.  
**Amygdala qua ratione reddatur fertiliſ.** 120.10.  
**Amygdalæ cinis.** 77.30.  
**Amygdaliſ quibus auxilietur.** 168.10.  
**Amygdala ſata prouenit.** 22.30.  
**Amygdalæ ſuccus.** 111.40.  
**Amygdala perdit ante maturitatem fructum.** 129.20.  
**Amygdaliſ nuceſ ſimileſ.** 53.30.  
**Anaxagoraſ de ſeminibuſ.** 30.40.  
     & 132.20.  
**Anchuia ab radice tantum foliata.** 95.1.  
**Anchuſæ radix.** 95.30.  
**Androcideſ quomodo inuenerit medicinā contra uinum.** 68.20.  
**Androſion de arboribuſ.** 28.30.  
**Androſtheneſ de Tylo iniula.** 158.40.  
**Andryala.** 94.1.  
**Anethū.** 87.10. & 116.40. & 240.30.  
**Anethū quando erumpat.** 87.20.  
**Anethi radix.** 89.30.  
**Anethi ſemen.** 90.10.  
**Annus facit ad odorē flori.** 86.30.  
**Annus fructificat, nō telluſ.** 195.10.  
     & 107.30. & 195.10.  
**Animalium differentia quod ad cibum artinet.** 246.30.  
**Animal an cleat.** 252.30.  
**Animalium natura.** 252.30.  
**Animalium parruſ.** 196.40.  
**Animalia q̄modo creant.** 129.20.  
**Animalium generatio.** 132.20. & 194.1.  
**Animalium deſapio quid nocet plantiſ.** 230.1.  
**Animo ueſſicariā adnorāt.** 127.10.  
**Anocho caprę purgantur.** 48.20.  
**Antēnæ medulla.** 73.40.  
**Anthedon meſpiliſ ſpecieſ.** 42.1.  
**Anthemii floreſ.** 99.10.  
**Antirrhizū ad gloriā utile.** 127.20.  
**Apargia.** 95.1.  
**Apes oppugnant unctioſ.** 235.1.  
**Aphaca.** 94.1. & 100.30.  
**Aphaca inguſtabilis.** 97.10.  
**Aphaca quomodo floreat.** 96.20.  
**Apharca nunquā nō uiuet.** 15.40.  
**Apharca quando maturerit fructū.** 33.40.  
**Apharcæ germinatio.** 33.20. & 94.20.  
**Aphia quando floreat.** 94.20.  
**Aphytæ uiriſ.** 188.30.  
**Apium quomodo crefcat.** 172.30.  
**Apium figuram mutat.** 217.20.  
**Apium quo pacto transferendū.** 217.30.  
**Apiū quo pacto colantur.** 216.40.  
**Apium quando exeat.** 197.40.  
**Apium quomodo ſeratur.** 90.20. & 217.40.  
**Apij odor.** 248.20.  
**Apij radix.** 12.30. & 89.30. & 244.1.  
**Apium difficile naſcitur.** 87.30.  
**Apij genera.** 91.20.  
**Apiū quomodo criſpū fiat.** 25.10.  
**Apium perpetuū uiuet.** 16.1.  
**Apium quando ſeratur.** 87.20.  
**Apriciſ in lociſ qualeſ arboreſ.** 49.20.  
**Aquæ inter cutim remediū.** 93.30.  
**Aqua quando deſ herbiſ.** 92.30.  
**Aquam quæ olera magiſ deſiderant.** 92.30.  
**Aqua deſicienteſ loci.** 52.10.  
**Aquarum quæ optimæ.** 92.30.  
**Aqua quibuſ proſit.** 106.10.  
**Aqua uiniſ opuſ eſt.** 185.20.  
**Aquæ nitroſæ.** 233.1.  
**Aquæ putidæ.** 233.1.  
**Aqua quomodo noceat arboribuſ.** 227.20.  
**Aquarum miſtura utiliſ.** 159.20.  
**Aqua leproſoſ facieſ.** 159.30.  
**Aqua quæ gelerit celeriſ.** 226.10.  
**Aqua adſerens ſterilitatem.** 127.1.  
**Aqua ſeruēſ quibuſ utiliſ.** 190.20.  
**Aquæ ſalſæ oleribuſ quibuſdam prodeſt.** 190.20.  
**Aqua deterioreſ fructuſ facit.** 182.40.  
**Aquæ utilitaſ in rigando.** 182.30.  
**Aquam quandam grauidaſ muliereſ facere.** 127.1.  
**Aqua mutat plantiſ.** 168.10.  
**Aquæ dulciſ præſtantia.** 159.20.  
**Aqua ſeruenti quare perfundantur frumenta.** 210.40.  
**Aquæ ſalſæ non bene nutriunt plantiſ.** 158.20.  
**Aquæ copiā amāt arboreſ.** 153.20.  
**Aquæ ſapor & odor.** 255.20.  
**Aquæ afficiunt ſidenbuſ.** 174.10.  
     Aquarum

# I N D E X.

- Aquarū terrestriū discrimen. 158.1  
 Aqua nitrosapantis inutilis. 158.1  
 Aquæ alumen sapientes inutiles plantis. 158.1  
 Aqua per se insipida. 233.1  
 Aquæ frigida. 159.11  
 Aquatilia. 151.30  
 Aquatiliū radix. 244.20  
 Aquatilibus breuior uita quàm terrenis. 63.30  
 Aquatiles plantæ. 55.30  
 Aquilonis statu fructus decidunt. 29.20.  
 Aquilonem spectans materies omnis præstantior, quàm quæ nascitur ad meridiem. 15.40  
 Aquilonem uersus optimæ arbores sunt. 49.20  
 Aquilo uetus amicus arboribus. 154.20  
 Aquilones crassant semina. 208.10  
 Aquilonij imbres utiles. 153.1  
 Aquilonijs imbribus ualidiores redduntur arbores. 153.20  
 Aquilonū frigus mediocre quare feminibus utile. 194.40  
 Aquilonis noxæ in plantis. 178.10  
 Arabia quid ferat. 54.20. & 114.20  
 Asachidnæ radix. 13.40  
 Arachinium morbus olearii. 66.1  
 Aracus ubi nascatur. 108.10  
 Arare bene summum est. 192.10  
 Arandi tempora. 98.20. & 105.1  
 Ararri pusillis qui utantur. 192.10  
 Arborum ariditas. 222.30  
 Arbor femina. 151.20  
 Arbores alternis annis fructificantes. 149.20  
 Arborū fructiferarum discrimen. 145.30  
 Arborum curæ. 175.40  
 Arbores quælibet sibi accommodatum sterco postulant. 183.1  
 Arbores quibus causis eruginem sentiunt. 222.10  
 Arbores nō possunt stercoreationem frequentem ferre. 183.1  
 Arbores quomodo mutant. 196.1  
 Arbores omnes ablaqueantur. 182.20  
 Arbores utrum sint prægnantes. 140.30  
 Arborum fructus quomodo mutantur. 162.20  
 Arbor prostrata. 215.30  
 Arbores quomodo arescant. 183.1  
 Arbores inoculata. 168.30  
 Arbores in radicibus morderi desiderant. 190.1  
 Arbores in mari. 158.10  
 Arborum flores minores odoratiore sunt. 248.1  
 Arbores pereunt ob corticem detractum. 229.10  
 Arbores quando potissimum laborent. 219.40  
 Arbor in Aegypto centesimo fructificat anno. 147.1  
 Arbores q̄ pacto intereant. 165.30  
 & 220.40  
 Arbores quando serantur. 176.30  
 Arborum morbi uiolenti. 227.20  
 Arbores quando cripari incipiunt. 243.40  
 Arbores suis quisq̄ locis gaudere. 159.40.  
 Arborum semina quare degenerent. 197.1  
 Arborum semen. 196.20  
 Arborum gelatio unde fiat. 223.20  
 Arborum lachrymæ. 244.40  
 Arboribus solum commodum. 147.10. & 156.10. & 157.20.  
 Arbores quæ oporteat habere statum. 154.40  
 Arbores quæ excelsiores. 161.30  
 Arborū fructus eiuſdem generis, alij serotini, alij præcoces. 147.30  
 Arbores quæ diutius uiuūt. 164.30  
 Arbor nulla sine nodo. 14.20  
 Arbores quæ nodosiores. 14.30  
 Arbores frigida. 71.30  
 Arborum longirudo. 76.20  
 Arbores odorata. 54.20  
 Arbores auctu faciles. 35.10  
 Arbores quæ facili terebrentur. 74.40  
 Arborum semina quæ celerius pereant. 197.10  
 Arbores quæ & ubi folia nō amittant. 10.1  
 Arbores quæ spissiores. 72.20  
 Arbores quæ ex semine crescunt, degenerant. 23.10  
 Arbores annoſæ ad carbones inutiles. 77.10  
 Arbores quæ præſtatiores, in montibus ne, an in plano. 32.10  
 Arborum humor uarius. 19.20  
 Arborum uarietatis causa. 10.1  
 Arborum generationes multiplices. 22.1  
 Arborum mutatio. 24.20  
 Arbor ob ademptam partē nunquam fructificat. 25.20  
 Arbor ingens circa Memphim. 51.20  
 Arbores in quam cœli partem spectent uidendum. 26.1  
 Arbores uenti exurunt. 66.20  
 Arbores ad Aquilonē spectantes. 49.10  
 Arbores uariè fructus ferūt. 7.10. & 21.1  
 Arbores quæ in mari, quæq̄ in terra nascantur. 10.30  
 Arbores crebrè sata. 15.30  
 Arbores quæ uidentur steriles nō sunt. 30.20  
 Arbor quid sit. 9.20  
 Arbores lanigeræ. 57.30  
 Arbores qua ratione urbanae aut syluestres reddantur. 10.1  
 Arbores urbanae quid differant à syluestribus. 31.20  
 Arbores in apricis locis, an in locis opacis nascantur interest. 49.20  
 Arboribus quando folia decidat. 16.10  
 Arbores magna in mari ætuoso. 57.10  
 Arborum morbi qui. 65.1  
 Arbores semper uiuentes. 15.40  
 Arbores ætterna retinēt fructus. 29.20  
 Arborum semen unde potissimum petendum. 178.10  
 Arborum ætas quæ melior. 69.20  
 Arborū naturæ discrimina. 71.10  
 Arboribus prodest algor. 65.10. & 155.1  
 Arbores miræ in India. 53.10  
 Arbores præcisæ. 64.10  
 Arbores amittentes fructum an requām coquant. 29.10  
 Arbor mira in Arabia. 73.10  
 Arboribus quomodo cortices detrahantur. 67.20  
 Arbores ne findantur quid proſit. 74.10  
 Arbores quomodo fructiferae reddantur. 29.1  
 Arborum flores pleriq̄ candidi. 95.20.  
 Arborum fructus cur degenerēt. 147.30.  
 Arborum mutatio. 190.10  
 Arboribus qd detrahendū. 181.30  
 Arbores quomodo tractandæ sint. 180.40.  
 Arbores quæ sunt refrigerari. 147.20. & 159.1  
 Arbor quæ facili germinet. 78.10  
 Arbores præcoces. 146.10  
 Arbores quomodo uarios ferant fructus. 7.10. & 21.1. & 148.40. & 216.1



# INDEX.

Arbores quæ uulnere pereant. 228.40  
 Arbor an pereat medulla detracta. 229.20  
 Arbores quæ folia uertant. 16.30  
 Arborum quæ congelauerint germinationem uelocē esse. 225.30  
 Arborum formatio. 181.1  
 Arbores quādo purgādæ. 181.40  
 Arboresubi meli⁹ fructificēt. 180.1  
 Arboribus noxiā inferētia. 173.20  
 Arbores fertiliores. 166.20  
 Arbores detruncatæ. 195.20  
 Arbusculæ miræ marinæ. 57.1  
 Arbutus optimos carbones facit.  
 Arcadiæ arbores quomodo pereant. 223.20  
 Arcadiæ materies. 70.20  
 Arcadia herbis constat. 123.10  
 Arcadia quid ferat. 54.30  
 Arc⁹ cœlestis loca odorata reddit.  
 Arenosum solum. 156.1 (232.10)  
 Argemam quid auferat. 93.30  
 Argilla dulcis est. 233.10  
 Argilla. 191.30  
 Argilaceum solum quibus commodum. 156.20  
 Ari folium. 97.40  
 Ari radix. 13.1. & 95.30  
 Aria. 72.20  
 Aria facit bonos carbones. 77.1  
 Aria quando cadatur. 68.40  
 Aria regio quid ferat. 54.1  
 Aria difficilis in opere. 73.20  
 Aristophil⁹ pharmacopola. 126.10  
 Arrus quomodo feratur. 88.20  
 Ars naturæ imitatrix. 173.10  
 Artis operæ in agricultura. 24.10  
 Articulatorio uitium. 221.1  
 Aruentia olera. 93.20  
 Ascalonia cepæ. 91.30  
 Asciun an radix. 13.20  
 Asia quæ peculiararia pducat. 52.20  
 Asiæ grande frumentum. 104.40  
 Aspalathus. 116.40  
 Aspalax qualē habear radicē. 13.30  
 Asparagus. 17.20  
 Asphyrium triticum. 104.10  
 Astula regia. 97.20  
 Astula regiae semen. 98.1  
 Astula regiae caulis. 98.1  
 Atheniensis ager plurimum fert hordei. 108.1  
 Atragena facit ignaria. 77.40  
 Atrifer iuncus. 63.1  
 Atriplex quando exeat. 87.20  
 Atriplicis qualis radix. 89.10  
 Atriplicis fatio. 87.20  
 Atriplicis semen. 93.10  
 Auiæ fertilitas. 102.30

Auellana alias habet radices. 35.40  
 Avena terram exten. 109.10  
 Auenam in hordeo nasci. 108.20  
 Avena multis tunicis à natura operata. 103.40  
 Auenæ peculiaris proprietates. 111.1  
 Avena quo pacto generet. 199.40  
 Avena quomodo feruetur. 210.20  
 Auenæ delenda ratio. 199.40  
 Avena tritico inimica. 228.10  
 Auerisiferum genus. 213.10  
 Aues quo pacto mutentur. 218.40  
 Aues sibi remediaco perit. 234.40  
 Aula uinum ficus. 65.30  
 Aulo campus. 116.30  
 Aurelia. 86.1  
 Aurelia ex eruca. 218.40  
 Aureliæ flos. 127.30  
 Auro arbores necat. 68.10. & 228.10  
 Aurium remedium. 120.40  
 Auster⁹ sapor humidi plus habet.  
 Austerus sapor. 231.30 (242.30)  
 Austrini imbres. 153.20  
 Austrino tempore melius feri. 178.1  
 Austrino statu eruca nascunt. 66.1  
 Autumnus quale tempus. 141.1. & 176.30  
 Autumnalis putatio. 186.20  
 Autumnino arbores recte feruntur. 176.30  
 Auuisione prouenientia. 88.20. & 130.20.

## B

Babilonia fecunditas. 107.10  
 Balsamū ubi pueniat. 116.1  
 Balsami incisura. 112.20  
 Balsami arboris magnitudo. 116.1  
 Balsami fructus. 116.1  
 Balsamum q̄ pacto colligat. 116.1  
 Balsami odor. 116.10  
 Balsamum ad nos non affertur syncerum. 116.10  
 Balsami uirgæ. 116.10  
 Balsamū quomodo uendat. 116.20  
 Batoni hortus quales palmas habeat. 27.30  
 Beta. 94.10  
 Beta syluestris. 82.10  
 Beta quā magna fiat. 9.30  
 Betae feminis peculiare. 88.1  
 Betae genera plura. 90.40. & 91.10  
 Betae semen. 90.10. & 93.10  
 Betae fatio. 87.10  
 Beta aqua falsa gaudet. 158.20  
 Beta radix. 12.40. & 89.10. & 144.1  
 Betae quædam quando erumpat. 87.20. & 172.10. & 198.1  
 Betula. 49.10

Bibinella. 96.40  
 Bidentis cultura. 192.20  
 Bifera quæ sint. 141.40  
 Blechni ramuli. 135.10  
 Bleti semen. 90.10  
 Bliti radix. 89.20  
 Bliti fatio. 87.20  
 Boëdrias. 62.10  
 Boërium cucumeris genus. 91.20  
 Boërium genus radicis. 90.40  
 Boëricum frumentum. 203.30  
 Boum stercus. 28.40  
 Brassica semper uiret. 16.1  
 Brassica temulentia ppulsat. 68.20  
 Brassica syluestris. 93.20  
 Brassicæ genera. 90.40. & 91.10  
 Brassica syluestri ad aluum purgandam utuntur. 91.10  
 Brassica uitent offendit. 68.10  
 Brassica quando feratur. 87.10  
 Brassicæ erumpēdi tempus. 87.20  
 Brassicis erucæ innascuntur. 92.40  
 Brassicæ odor. 173.30  
 Brassica quo pacto curetur. 191.10  
 Brassica quomodo oriat. 88.20. & 131.30.  
 Brassica aqua falsa gaudet. 158.20  
 Brassicæ falsugo nō nocet. 242.10  
 Brassica mutatur. 197.40  
 Brassicis eruum interferit. 184.20  
 Brutum animal an persequatur odorem. 235.1  
 Bryorem quam uocent. 120.10  
 Bryum. 56.1  
 Bulbus cur diu duret. 131.20  
 Bulbi generatio. 199.40  
 Bulbus quomodo exeat. 98.20  
 Bulbus quomodo feratur. 88.20  
 Bulborum genera. 96.40  
 Bulbacea. 88.30  
 Bulbina. 99.1  
 Bulbosa. 99.1  
 Buprestis germinatio. 94.20  
 Butomi caulis. 11.30  
 Butomi folia. 17.30  
 Buxus afininus. 82.1  
 Buxus quare grauis. 11.30  
 Buxus qualē locū desideret. 155.1

## C

Achrys diuturna est. 210.20  
 Cachryliū iungitur apio. 216.40  
 Calamus. 116.40  
 Calamus odoratus. 98.20  
 Calami odorati odor. 116.30  
 Calamus odoratus ubi nascatur. 116.20  
 Calcidici agri locus. 59.1  
 Calida quæ ferri acie hebetet. 152.1  
 Calida

# I N D E X.

Calida quæ sunt. 144.30. & 198.10	Carcinatio. 139.20	Centifoliæ rosæ. 84.1
Calidum quod nam sit quo pa-	Cardamomum. 116.40	Centinæ. 29.30
cto sciri possit. 152.1	Carduus. 82.1. & 96.10	Cepæ genera. 91.20
Caligo flores exurit. 160.30	Carduus q̄modo floreat. 99.30	Ceparum color. 91.40
Caliginis oculorū remediū. 93.30	Carduus pinea. 82.40	Cepe diligit aquam. 92.30
Calor in solo. 157.30	Cardui peculiare. 82.30	Cepæ radix. 13.1. & 92.10
Calor causa agens saporis est. 237.40	Caryæ pironum genus. 242.1	Cepe quomodo feratur. 88.20. & 91.40. & 131.40
Calor feruat frondes. 151.1	Carica qualis sit. 119.1	Cepæ ferunt iuxta plantas. 255.10
Caloris differentiæ. 210.30	Caricæ natura. 119.1	Ceparum sapor. 244.30
Calor in plantis. 150.20	Caro in plantis quæ sit. 9.1	Cephus fluius. 216.1
Calores amantes arbores. 155.1	Carpæ in oleis. 194.10	Cephisi osium. 62.10
Calor modicus requiritur ad uiuentia. 151.20	Carpinus spissa. 71.20	Ceran quam uocent. 123.20
Camatiā quid uocent. 107.10	Carpinus quando egdanur. 68.40	Cerasti descriptio. 42.40
Canariæ germinatio. 94.20	Carpini usus. 75.40	Cerasti fructus. 43.20
Cāchrydias triticū. 104. et 10. 193.1	Casia. 54.20. & 79.10	Cerasti lachryma. 111.40
Cancri contra culices. 29.40	Casiæ genera. 79.20	Cerasti cortex detrahatur. 67.10
Candralia. 97.10	Casiæ radix. 79.20	Cerasta. 65.30
Canis calidus. 151.20	Casia ubi producantur. 114.20	Cerastam in olea fieri, & in fico parere. 222.20
Canes inæqualiter ferus ferunt. 147.30	Casiæ frutex. 115.30	Cerdones ex piro syluestri rabulas faciunt. 73.30
Caninæ sentis fructus. 117.40	Casiæ cortex. 115.40	Cerinthus. 86.10
Caniculæ marinæ. 56.40	Casiæ descriptio. 115.40	Ceronia. 30.1
Canirubus. 47.10	Casta radix qñ effodienda. 118.1	Cerrus roboris genus. 37.10
Cantharis in tritico. 109.30	Castanea plurima ubi. 55.1	Cerui uiperas edunt. 203.10
Canthari rosis permuntur. 235.1	Castanea an floreat. 33.10	Chalbanum. 116.30
Capilli ueneris folium in aqua non madescit. 99.10	Castanea montis propria. 32.10	Chironiæ usus. 119.40
Capillus semper uiret. 96.30	Castanea quando germinet. 33.30	Chironia panax. 119.10
Capilli desuents remediū. 99.10	Castanea syluestris. 31.40	Chytri pelicanie partes. 62.1
Capiti aptum remedium. 121.40	Cauda uulpina. 96.40	Cibi differentiā quæ faciāt. 203.20
Capparis. 81.30. & 175.20	Caudex fundamentum arborū. 64.20.	Cibus non omnibus idem. 203.10
Capparis syluestris. 31.30	Caudex quid sit. 7.30	Cibi rano alia hominibus, alia animalibus. 109.20
Caprarum solertia. 123.40	Caudice præciso quid quibus conringat. 36.1	Cicer. 100.10 & 30. & 197.30. & 210.20
Caprifici succus. 144.30	Caudices crispiores. 243.30	Cicer quomodo grandescat. 25.10
Caprificus non facit putrefcit. 220.10	Caudices qñ germinant. 139.10	Cicer a flore quandiu periciatur. 102.10
Caprificandi ratio. 162.10. & 40	Caulias. 112.30	Ciceri aqua nocet. 106.10 (102.10)
Caprificus generat. 199.20	Caulis. 7.20. & 198.30	Ciceris propria. 106.40
Caprificus quæ ferat. 212.1	Caulium differentiæ. 98.1	Ciceris radix. 101.30
Caprificus cur adferat fici. 162.10	Causæ rerum cognoscendæ. 176.10	Ciceris flos. 102.1
Caprificus grossi cur delabatur. 221.20	Cedrida. 243.10	Ciceris caulis. 103.10
Caprificus nequit perficere fructus. 163.30	Cedrus sudat. 215.10	Ciceris morbi. 109.30
Caprificus quādo germinet. 33.30	Cedrus diuturnæ naturæ. 72.20	Cicer nullū animal gignit. 110.10
Caprificus morbis minimè obnoxia. 65.20	Cedri usus in nauibus. 75.1	Cicer arietinum. 105.10
Caprifici fumus. 77.30	Cedri species. 41.10	Cicer columbinum. 105.10
Caprifico longior uita quam fico 63.40	Cedri materies. 78.10	Ciceris differentiæ. 105.10
Caprificatio quare inuenta. 29.20	Cedri fructus. 41.40	Cicera. 210.20
Caprifici meliores. 29.30	Cedri in syria præstātissimæ. 76.20	Ciceri uermes innascuntur. 194.1
Caprificus flexibilis. 74.30	Cedro similis taxus. 39.40	Cicer fenit triticum. 209.10
Caprinus aceris genus. 40.20	Celastrus semper uiret. 15.40	Ciceri salisago putilis est. 241.30
Caprinum stercus. 28.40	Celastr⁹ coli prius nō uult. 19.10	Cicer saluginis nonnihil habet. 202.30. & 241.1
Carbones ad quas resutiles. 77.20	Celastrus summis locis & algentibus prouenit. 49.10	Ciceri in flore nocet iber. 195.40
Carbones quomodo fiant. 77.20	Celastrus tarde maturat fructū. 63.40	Cicer quo pacto intereat. 220.20
Carbones optimi qui. 77.1	Celastr⁹ usus. 76.1. (63.40)	Cicer commodè feratur. 209.40
	Celidemus de plantarum morbis. 221.1	Cicer quomodo feratur. 218.10
	Celtis. 27.20. & 51.30	Cicer perit imbre. 204.1. & 208.10
	Celtis ubi plurima gignitur. 51.20	Cicer agrum emacrat. 120.30
	Celtum habere medullam. 74.1	
	Centaurium ubi fecundū. 32.40	

# I N D E X.

Ciceri aptum solum.	193.1	Comitialis morbi remediū.	120.1	Crada.	15.10. & 211.30
Cicercula uermes innascuntur.	194.10	Comythes.	61.10	Cradicatio quid sit.	65.20
Cicerculae caulis.	103.10	Conchis uita opera cancri seruat.	172.30	Crana in Arcadia habet excellen-	48.40
Cichoracea.	97.1	Coniferarum semina.	148.10	tes abietes.	221.30
Cichorea quando floreat.	96.20	Consecratrix.	116.40	Crambus uuarum qualis.	226.40
Cicuta ubi optima.	123.20	Consecratrix quale foliū.	97.40	Crepis.	95.1
Cicuta ualidior quæ in frigidis lo-	124.40	Consecratrix ubi optima nascit.	117.1	Crescentia celeriter.	135.30
cis est.	117.30	Constitutionis interuallum.	135.40	Creta quæ præstantiora ferat.	124.1
Cicutæ succus.	124.40	Corchorus.	94.10	Cretæ dictamum propriū.	123.30
Cicutæ usus.	54.20	Coria alba gbus inficiatur.	47.10	Creta cupressum habet.	49.10
Cinamomum.	115.30	Coriannum prouentu cōtumax.	87.30	Creta insula algam fert optimā.	55.40
Cinamomi frutex.	115.30	Coriannū quando exeat.	197.40	Creta quid gignat.	54.40
Cinamomum ubi crescat.	114.20	Corianni semen.	93.10	Cretenses cepæ.	91.40
Cinamomi partes & bonitas.	115.30	Corianni radix.	89.30	Crispa ligna quare fiant.	243.30
Cinamomi cortex.	115.30	Corinthiū genus radices.	90.40	Crocum.	116.40
Cinamomi colligendi fabula.	115.40	Corinthij agri quibusdam locis	29.20	Croci odor.	248.40. & 255.1
Cinis utilis additus radicib.	218.1	caprificatio nulla est.	41.20	Croci descriptio.	84.40
Cinis fico additur.	189.20	Cornus qualis.	33.30	Croci sano.	85.1
Cineris usus.	255.10	Cornus quando fructificet.	75.1	Croci radix.	12.40. & 85.1
Cinerē roboris nitrosum esse.	37.1	Cornus ualidissima est.	33.20	Croci folium.	97.40
Circe ubi habitauerit.	76.40	Cornus quando germinet.	75.1	Croci flos.	86.10
Circæum promontorium.	76.40	Cornus ingustabilem fructum gi-	34.1	Croton arbor qualia habeat fo-	16.30. & 170.10
Cinibana quid gignat.	114.20	gnit.	175.20	lia.	90.1
Clauicula ederae genus.	47.30	Corni fructus.	207.40	Cucumer quomodo floreat.	90.1
Clauus in olea.	65.10	Cornum nimis multum alimen-	213.1	Cucumis qua ratione formam ac-	90.30
Cleodemi de plantis & animalibus	30.40	cupit.	184.10	cipiat.	87.20
opinio.	90.40	Cornu quæ attingit, incoctilia	207.40	Cucumis quando feratur.	20.40
Cleonæum genus radices.	194.30	fieri.	121.20	Cucumeris flos.	39.10. & 87.40
Clidemus de semente.	137.1	Cornu in pectore.	198.10	Cucumeris semen.	189.10
Clidemi opinio de germinatione.	78.40. & 82.1	Cornicularium papauer.	248.20	Cucumeris radix.	89.40
Cnecum.	20.30	Coronaria.	191.1	Cucumeris genera plura.	90.40
Cnici flores.	240.30	Coronariæ herbæ.	83.40	Cucumeris an sint diuersæ spe-	91.20
Cnicum.	230.40	Coronaria quo potissimum mo-	230.30	cies.	165.10
Cnici semen.	91.30	do intereant.	78.40. & 81.40	Cucumis.	137.1. & 173.10. & 198.1
Cnidia cepæ.	29.40	Coronarium genus.	238.30	Cucumis non durat.	165.10
Cnipes bestiola.	172.30	Coronariæ plantæ.	219.10	Cucumeris syluestris radix ad	118.40
Coccyis genus.	206.1	Corruda.	76.20	quæ utilis.	217.20
Coctile quid sit.	108.40	Corruptio quomodo fiat.	59.20	Cucumeris semina quo pacto fe-	245.10
Coctilia legumina.	205.40	Corruptiones duplices.	9.10	renda.	168.20
Coctilia cur semina fiant.	146.20	Corficæ arbores.	68.30	Cucumeres pusillam habent ra-	242.1
Coctionem impediencia.	161.10	Corfium lori radix.	42.40	cem.	189.10
Coctiois ratio.	149.30	Cortex ex quibus constet.	34.10	Cucumeres.	245.10
Codrosia puincia qd ferat.	54.10	Cortex quando facile arboribus	228.20	Cucumerum amaritudo.	242.1
Cœli status ad fructus multum	149.30	demi possit.	228.20	Cucumeres quomodo nutriant.	189.10
ualer.	205.1	Cortices cerasi.	228.20	Cucumeres qua ratione colant.	161.20
Cœli obseruatio in plantis feren-	168.10. &	Corticis definitio.	11.20	Cucurbira.	217.1
dis.	188.20	Corticis uarietas.	34.10	Cucurbira quādo prodeat.	87.20
Cœlum mutar plantas.	233.40	Corricum squamæ unde.	228.20	& 197.40	
Colendum quando fit.	25.20	Corticis durities alimentum in-	228.20	Cucurbira quomodo magna fiat.	217.1
Colorum quor genera.	46.1	hibet.	133.20	Cucurbira quomodo floreat.	20.30.
Coluber quomodo mutet.	44.10	Corticis detractio quid faciat.	116.40	Cucurbiræ radix.	89.40. & 245.10
Colutea ubi nascatur.	116.40	Costus.	96.40	Cucurbiræ semen.	90.40. & 93.10
Colytea arbor.		Coturnix herba.		Cucurbiræ sano.	87.20
Colytea qualis.				Cucur-	

# INDEX.

Cucurbitæ an sint plura genera.

91.20  
Culices in quibusdam arboribus nascuntur. 66.10  
Culices ficarij unde. 29.30  
Cultra celerius senescunt. 165.1  
Cultra tardius germinant. 142.40  
Culturam quædam plantæ non admittunt. 174.40  
Cultura quid efficiat. 9.20. & 31.30 & 107.40. & 165.1. & 190.1  
Cultura potest immutare plâras. 168.1  
Cultura & alimentû quid in planis possit. 23.40  
Cultura multum potest. 15.30  
Cultura quibus necessaria sit, quibus perniciofa. 10.10  
Culturæ communia. 28.20  
Cuminum qua superfluitate feratur. 118.10  
Cuminum fertile. 209.30  
Cumini radix. 166.40  
Cunila. 175.20  
Cupressus. 166.1. & 227.40  
Cupressus procera. 18.1  
Cupressus qualis in fructificatio. 199.10  
Cupressi semen. 132.40 & 148.10  
Cupressi fructus. 146.20  
Cupressi in Creta insula. 31.1 & 130.1  
Cupressi statua. 215.10  
Cupressi odor. 245.20  
Cupressi diffculter crescit. 135.40  
Cupressus qmodo generetur. 23.1  
Cupressus semper uiret. 15.40  
Cupressus in Cyrenensi agro prouenit. 51.20  
Cupressum calida loca magis habent. 54.40  
Cupressi folia. 17.1  
Cupressus diurna. 72.20  
Cupressus ubi exuberet. 32.1  
Cupressus recusat simum. 28.20  
Cupressus in frigidissimis locis. 49.10  
Cupressina materies. 72.20  
Curculionem quæ creent. 210.1  
Cyce palmarum genus. 28.1  
Cypria ficus. 30.1  
Cyrena producit odoratissimas rosas. 84.20  
Cyrenea maximam buxum habet. 45.1  
Cyrenenses. 81.1  
Cytisus arbores necat. 68.10  
Cytisi medulla. 71.10  
Cytisæ buxo abundat. 15.1

D  
Decaminationes. 175.40 & 229.30  
Decaminatio quæ sit. 187.1  
Decaminatio quas necat arbores. 67.30  
Decaminatio quando tempestiua. 188.40  
Decaminationis ratio. 229.30  
Definitiones probandæ. 9.20  
Democriti opinio de arboribus. 165.40  
Democriti de saporibus sententia. 165.40  
Densum solum. 157.20 (331.20)  
Dicæ fructus. 248.10  
Dictami usus. 123.40  
Dictami probatio. 123.40  
Dictami seruandi ratio. 123.40  
Dictamum salum. 123.40  
Dictamû ppiu esse Cretæ. 123.30  
Diminutionis ratio. 229.30  
Diminutione qd pereat. 229.40  
Diogenis de plâtis sententia. 30.40  
Dipias spina. 56.20  
Dolantia ligna. 74.10  
Dracontias triticum. 192.40  
Dracuntuli radix. 97.30. & 128.1  
Dulcia celerius putrescunt. 220.10  
Dulcia raro bene olent. 248.10  
Dulcia breuiore tempore marurescunt. 146.10  
Dulcissima noctu effodienda. 118.1  
Dulcis sapor. 231.20  
Dulcis sapor aptissimus. 235.30  
Dulcis aquæ usus. 159.20  
Dulcis sapor siccitatis esse potius quàm humiditatis. 242.30  
Dulces quædâ radices uenenoas. 95.40  
Dulce principium. 237.20

E  
Ebenus. 72.20  
Ebenus grauis. 11.30  
Ebeni lignum. 128.1  
Ebeni medulla. 17.10  
Ebrus amnis. 226.20  
Edera. 79.10 & 160.10 & 173.10  
Edera uiuax est. 13.30  
Edera arbores necat. 228.10  
Edera nocet plantis. 216.20  
Edera uisa in cornibus. 171.20  
Edera calida. 71.30  
Edera ab alijs uiuit. 48.1  
Ederæ folia. 16.30  
Edera cupit frigus. 155.1  
Edera cilicia. 48.1  
Edera in Asia non nascitur. 52.20  
Ederæ genera. 79.20

Ederæ species. 47.20  
Elaterium unde sit. 123.20  
Elaterium medicamen. 118.40  
Elaterium diuturnum. 122.20  
Elementorum natura. 168.20  
Elementales partes plantarû. 8.1  
Eleuantius ager. 10.1  
Elium. 78.30  
Elium semine prouenit. 85.1  
Elpenoris tumulus. 76.40  
Empedoclis dictum. 134.30  
Empedocles de animalib. 150.40  
Enhis radix. 97.30  
Ensi herbæ quale folium. 97.40  
Enthuficum. 94.10  
Epimenidiæ scillæ. 97.20  
Epimeitrum. 94.30  
Equapium. 93.30 & 123.20  
Equapij humor. 112.1  
Equapij radix. 89.30 & 244.1  
Equapium lachryma feritur & nascitur. 22.40 & 112.10 & 132.1  
Equapium perpetuo uiret. 16.1  
Equestri radice sitis extinguitur. 121.20  
Eringium. 78.40 (121.30)  
Errancum papauer. 121.20  
Eruanga. 108.20  
Eruca celerrimè nascitur. 87.20  
Eruca ex rinea. 25.30  
Eruca rectè riganur aqua salia. 158.20  
Eruca gignit aureliam. 218.40  
Eruce quomodo nascantur & intereant. 194.1. & 222.1  
Eruce semen. 93.10  
Eruce satius. 87.10  
Eruce oleis nocent. 66.1  
Eruce radix. 89.30  
Erugo quid sit. 193.40  
Erugo iegerum. 193.30  
Erugo frumenta magis infestat. 208.40  
Eruginis causa. 193.30  
Erugine qui agri potissimum infestentur. 196.1  
Eruialæ caulis. 103.10  
Eruum durat diu. 110.10  
Eruum quando ferendum. 25.10 & 100.30. & 204.10  
Eruum inter radices ferere. 173.10  
Eruui caulis. 103.10  
Eruui flos. 102.1  
Erysimum. 166.30 & 246.30  
Eteochritum hordeum. 193.30  
Etruria caret medicamentis. 122.40  
Eubœa quid ferat. 55.10  
Euboia tepida. 224.40  
Euboica materies. 70.20  
Eudemus medicamentarius. 125.20

Euentari quid uocent quidam.  
109.40.  
Euonymus arbor 48.10.  
Euphrates fructum fabæ similem  
mirè producit. 59.10.  
Europa ex odoratis parum pro-  
ducit. 116.48.  
Europa quid ferat. 55.10.

## F

**F**aba. 58.30. & 100.10.  
Fabæ fatio. 100.30. & 167.10.  
& 195.40. & 201.10.  
Faba quâdiu floreat. 90.1. & 102.1.  
Faba quomodo pereat. 208.10.  
Fabæ infirmitas. 206.40. & 166.40.  
Fabarum discrimen. 206.40.  
Faba sterilis flore. 204.11.  
Fabæ in coctione differūt. 205.40.  
Faba stercore putat agrū. 109.1.  
Faba coctibilis. 108.40.  
Fabæ midam creant. 210.1.  
Faba nigra ex candidis. 207.1.  
Fabæ quomodo seruandæ. 207.1.  
Faba eruginem sentit. 209.1.  
Faba cur tarde crescat. 202.20.  
Faba apud Apolloniâ Ionij ma-  
ris non corroditur. 110.20.  
Faba florens aquam desiderat.  
106.10.  
Fabæ ubi durēt. 197.30. & 210.20.  
Fabæ caulis. 103.10.  
Fabæ folium. 103.1.  
Faba quando exeat. 100.40.  
Faba ubi uelut feri. 106.40. & 193.1.  
Fabæ radix. 167.10.  
Fabarum putamina. 227.30.  
Fabeta quomodo fiant. 58.40.  
Faba in aqua durat. 72.30.  
Fagi fructus. 37.10.  
Fagus quando germinet. 33.30.  
Fagus Troiæ. 64.1.  
Falcatio uinum. 187.  
Farina uisitur Aegyptij ad sacra.  
102.20.  
Fauonij præstant uenti. 154.30.  
Fefruga. 54.30.  
Fefruga efodiendi quomodo  
sit. 118.10.  
Fel terræ. 95.40. & 175.10. & 234.30.  
Fel terræ quandiu durat. 122.10.  
Ferrum quam materiam magis  
cadere ualeat. 73.30.  
Fertilitas unde. 175.30. & 179.10.  
Fertiliora quæ sint. 209.30.  
Ferulacea quæ. 80.1.  
Fex pellium. 227.30.  
Ficus. 46.30.  
Ficus Cypria. 30.1.

## I N D E X.

Ficus India. 53.1. & 164.10.  
Ficus quid ferat. 36.20.  
Ficus fruticosa. 223.40.  
Ficus in Aegypto. 147.1.  
Ficus exposita frigori cur sit.  
224.20.  
Ficus obnoxia uermibus. 220.10.  
Ficus quomodo perurganda.  
182.1.  
Ficus non caprificata. 163.20.  
Ficus superferant. 163.30.  
Ficus uiti molesta. 184.30.  
Ficus ualida. 74.20.  
Ficus iuxta scillam satus ocyus  
crescit. 26.10.  
Ficus reddit deteriore fructum  
rigatione. 28.20.  
Ficus quomodo crescat. 130.20.  
Ficus quomodo inserat. 134.10.  
Ficus facile augetur. 155.40.  
Ficus cur feronna. 146.1.  
Fici locus competens. 26.20.  
Ficus ubi sentiat morbum. 220.40.  
Fici odor. 245.30.  
Fici accommodatū solum. 180.10.  
Ficus quomodo reddatur fertilis.  
29.10. & 147.10.  
Fici amputatio. 221.1.  
Ficus ex crada prouenit. 22.10.  
Ficus raro corpore. 71.20.  
Ficus qualem amet locū. 179.40.  
Ficus multa sustinet. 228.49.  
Ficus incrementum. 164.20.  
Ficus facile amittit fructū. 161.40.  
Ficus cur arena inspergant. 163.1.  
Ficorum genus. 212.1.  
Fici quomodo meliores fiât. 168.10.  
Fici cito senescunt. 164.40.  
Ficus ex nouellis affert fructum.  
12.1. (221.30.)  
Fici fructus uermiculos sentit.  
Ficus quomodo pullulare queat.  
129.40.  
Fico cinis additur. 189.20.  
Fico quid sit peculiare. 149.40.  
Fici radix cur obliqua. 12.20.  
Ficorum succus. 144.30.  
Ficum ferendi ratio. 26.10.  
Ficum succus quomodo expri-  
matur. 242.30.  
Fici succū hyems crassat. 177.10.  
Ficus aptissima ad ignem accipi-  
endum. 77.40.  
Ficus quando germinet. 33.30.  
Ficus à ficu differt. 204.30.  
Fici natura. 211.40.  
Fici fumus. 77.30.  
Fici quid auxilietur. 168.20.  
Fici amplæ in ponto. 54.40.

Ficu in caprificū mutari. 24.20.  
Fici in Aegypto bonæ frugis non  
sunt. 155.40.  
Fici radix. 14.10.  
Ficus qualē habeat succū. 236.40.  
Ficus præcipuè infestatur uen-  
tis. 66.30.  
Fici Indicæ radix. 14.10.  
Fico scabies accidit. 221.1.  
Ficus breuis uitæ. 64.1.  
Ficorum peculiare morbi. 65.20.  
Ficulneum uallum. 211.30.  
Fidicula ad defillationes urinæ  
facit. 99.10.  
Fidicula quando erumpat. 128.1.  
Fidiculæ radix. 122.10.  
Figuræ saporum iuxta Democri-  
tum. 232.1.  
Figurarum ratio. 232.40.  
Filix ad quæ utilis. 126.30.  
Filicis radix. 128.20.  
Filici stercoreatio inimica. 107.40.  
Fimus idem non omnibus con-  
uenit. 28.40.  
Fimus hominis acerrimus. 28.40.  
Fimus adiuvat fruges. 107.49.  
Fimum herbæ desiderant. 83.10.  
Fimū quæ magis desiderat. 92.20.  
Fimum stipulariū laudant. 92.20.  
Fimi genera. 28.40.  
Fimi usus. 92.20.  
Fimum riuus misceri. 27.1.  
Fissiles cepæ. 91.30.  
Fissilia ligna. 74.10.  
Fissularia harundo. 62.20.  
Flamma floris species. 84.1.  
Flatus in ponto quo pacto no-  
ceant. 224.40.  
Flatus calidiores & frigidiores iu-  
xta nocent arboribus. 153.30.  
Flos lappæ. 99.20.  
Flos incertus quorundam. 85.10.  
Flos loti in Euphrate. 173.40.  
Flos frumenti. 96.40. & 230.40.  
Flores quidam distantes odora-  
tiores. 251.20.  
Flores æstiuæ. 86.10.  
Flores plantis aliis odoratis qua-  
re non odorati sint. 249.30.  
Florum differentia. 95.20.  
Flores nitici & hordei. 101.40.  
Flores leguminum. 102.1.  
Florum genera. 20.1.  
Flores cur comprimantur. 174.1.  
Flores nō odorati qui sint. 243.1.  
Florum uarietas. 90.1.  
Florum usus. 84.1.  
Florum folia. 13.1.  
Florum odor. 19.40.  
Flores

# I N D E X.

- Flores arborum. 33.1.  
 Flores odorati. 247.30.  
 Floris generatio. 249.30.  
 Florum sapor. 249.40.  
 Flores herbarum. 95.20.  
 Flores gerentium spicam. 103.20.  
 Flores lanuginei quibus. 103.20.  
 Florentia particulatum plura. 204.10.  
 Florentibus ferè omnibus imber nocet. 66.1. & 222.1.  
 Fluida medicamentum. 47.10.  
 Fluidarum species. 47.10.  
 Fluuiatiles plantæ. 38.1. & 59.30.  
 Fœminæ facilius augetur. 135.40.  
 Fœminificam herbam quam uocent. 126.20.  
 Fœminicornus. 41.20.  
 Fœniculum. 80.20. & 240.30.  
 Fœniculi semen. 90.10.  
 Fœnigræci odor. 249.1.  
 Fœnumgræcum limodoro interitur. 228.10.  
 Folia quando decidunt. 16.10.  
 Folia ex quibus consistunt. 18.1.  
 Foliorum figura. 17.10.  
 Foliorum discrimen. 97.40.  
 Folia parte prona supinæque inter se distant. 16.30.  
 Folia quæ nunquã amittit. 138.30.  
 Folia in arboribus sibis ipsi similia sunt. 16.30.  
 Foliorum differentia. 17.1.  
 Folia fici & uitis. 18.40.  
 Folium abietis. 39.10.  
 Folia tiliæ. 174.1.  
 Folia olerum. 17.30.  
 Foliorum sapor. 245.40.  
 Folia uertentes arbores. 16.30.  
 Foliorum alimentum. 16.40.  
 Foliorum mutatio. 170.10.  
 Fomites optimi. 77.40.  
 Fontes rigando boni. 57.40.  
 Fossiones. 176.1.  
 Fossio quibus proficit locis. 184.1.  
 Fossio quid efficiat. 188.20. & 221.10.  
 Fossio omnibus arboribus prodest. 28.40. & 183.40.  
 Fraus herba ab radice tantum foliata. 95.1.  
 Fraxinus. 138.1.  
 Fraxinus qualem radicem habeat. 35.40.  
 Fraxinus quando cœdatur. 68.40.  
 Fraxinus humida. 75.1.  
 Fraxini genera. 40.40.  
 Fraxinus bubula. 58.10.  
 Fraxinus facilis auctu. 35.10.  
 Fremium. 95.1.  
 Fremiũ quando floreat. 136.40.  
 Fremiũ genus. 86.1.  
 Frigidæ in rigatione usus. 159.1.  
 Frigida quæ sint. 144.30.  
 Frigiditas. 150.20.  
 Frigus prodest crescētib. 153.10.  
 Frigus exiccat. 186.20.  
 Frigus quid noceat. 223.20.  
 Frigus arboribus prodest. 65.10.  
 Frigus perdit & sãpores & odores. 251.40.  
 Frigori quænam loca magis exposita. 223.40.  
 Frigora cultus terræ desiderat. 195.10.  
 Frigoris incommoda. 221.30.  
 Frigora satis utilia. 193.20.  
 Frondes arborum. 145.30.  
 Frondiflora. 95.1.  
 Fructus ex caudice. 49.40.  
 Fructus ex quibus consistunt. 18.1.  
 Fructuum bonitas & prauitas unde. 16.20.  
 Fructuum differentia. 142.30.  
 Fructuum iactura. 153.30.  
 Fructuum impedimentũ. 144.10.  
 Fructus sãporem plantæ monstrant. 237.1.  
 Fructuum concoctio quibus rebus perficiatur. 160.40.  
 Fructuum maturitas. 142.30.  
 Fructuum copiae indicium si in cacumine fuerint. 21.20.  
 Fructus quomodo uirides feruntur. 217.10.  
 Fructus omnis primo siccat. 236.30.  
 Fructus rigati meliores. 159.1.  
 Fructum integere folijs. 189.20.  
 Fructus quid sit. 8.10.  
 Fructus qui bene oleant. 248.10.  
 Fructibus quæ noceant. 65.40.  
 Fructus quomodo corrumpantur. 238.40.  
 Fructum largũ ferentes arbores. 143.20.  
 Fructuũ maturitas diuersa. 33.20.  
 Fructum assidue habentes. 34.1.  
 Fructuũ mutatio. 24.20. & 190.10. & 213.30.  
 Fructuum odor. 252.10.  
 Fructus in arboribus diuersis nascuntur. 7.10.  
 Fructificant omnia. 32.30.  
 Fructificatio uiribus detrahit. 164.30.  
 Fructificationis causæ. 167.10.  
 Fruges quibus locis citissime perficiantur. 102.20.  
 Frugum differentia. 201.10.  
 Fruges qualem terram cupiant. 156.40.  
 Frugibus optimum solum. 157.20.  
 Fruges quid potissimum lætas faciat. 107.30.  
 Fruges quæ degenerent. 197.1.  
 Fruges quãdo demerendæ. 208.10.  
 Frumentago. 101.40.  
 Frumentaceorum caulis. 103.10.  
 Frumentaceis aqua quando obfist. 106.10. & 20.  
 Frumentacea ualidiora. 103.30.  
 Frumentorum morbi. 209.20.  
 Frumenta unde radicem, unde germen fundant. 201.30.  
 Frumentis solum commodum. 147.20. & 156.10. & 192.30.  
 Frumentarius qualis ager sit. 195.1.  
 Frumentum in Pissoris firmissimum. 104.40.  
 Frumentorum incrementũ. 35.30.  
 Frumentum ante herbam debet nasci. 192.30.  
 Frumenti radices. 147.20. & 201.10.  
 Frumenta in flore imbres non ferunt. 204.1.  
 Frumenta quomodo pereant. 230.20.  
 Frumenta cur exhauriant terrã. 202.20.  
 Frumenta quæ ualida. 203.30.  
 Frumentum grande. 104.40.  
 Frumentorum comoda satio. 105.30.  
 Frumenta breuiori tempore florent. 203.40.  
 Frumenta conuenientiora hominibus quàm legumina. 203.1.  
 Frumenta quali folio consistunt. 103.1.  
 Frumenta qui depascant. 107.10.  
 Frumenta quomodo renascantur. 107.20.  
 Frumenta primũ insipida. 237.10.  
 Frumentum quod celerius deficiat. 230.30.  
 Frumentis seruandis aptus locus. 230.30.  
 Frumentum peruenire debet. 210.30.  
 Frumentum demessum componendum in metas. 208.30.  
 Frumenta quomodo augeantur. 145.40.  
 Frumenti genera. 100.10.  
 Frumenta quæ pura proueniant. 105.1.  
 Frumentacea etiam sunt uaria in coctiõne. 108.30.

Frumenti alimentum. 202.1  
Frumentorum radix. 101.30  
Frumentorum semen. 196.20  
Frutex quid sit. 9.20  
Frutices quomodo fructū ferant. 21.10  
Frutices semper uiuentes. 16.1  
Fumus acerbus. 77.30  
Fumosa quæ sint. 77.30  
Fungus caret radice. 12.30  
Fungi è robore. 36.40  
Fungi pediculus. 11.30  
Fungi mirabiles. 56.40  
Fusus agrestis. 82.1

## G

Galla quando gignat. 34.20  
Gallam fert robur. 36.20  
Gallinæ multo partu intereunt. 165.10  
Gardie cepæ. 91.30  
Gelatio unde fiat. 226.10  
Gelucidium quando potissimum noceat. 225.1  
Geminalis. 100.30  
Geminalem an uiridem comedat animalia. 107.1  
Gemma in uire. 15.10  
Gemma hyeme periclitant. 188.10  
Germen quomodo ex radice erumpat. 130.40  
Germine nouello fructificantes. 149.1  
Germine annotino fructificantes. 148.40  
Germinandi tempus. 87.40. & 136.30  
Germinantia sponte. 132.30  
Germinantia celerius. 198.40  
Germinantes primum. 33.20  
Germinatio optima. 149.40  
Germinatio quid sit. 139.1  
Germinationes in arcturo. 34.30  
Germinatio plantarum. 6.30  
Generatio plantarum. 6.30  
Gethyum quale semen habeat. 93.10  
Gethyū difficile germinat. 198.10  
Gethyum diligit aquam. 92.30  
Gethyum quando feratur. 87.20  
Gethyum quando satū prodeat. 87.30  
Gethij radix. 13.10  
Gith flores. 20.30  
Glabratio. 220.40  
Glacies quæ nocentissima. 225.10  
Gladiolus. 116.40  
Gladioli odor. 244.30  
Gladioli caulis. 11.30

## I N D E X.

Gladioli folia. 17.10  
Gladioli radix. 244.1  
Gladiolus ubi nascatur. 58.1  
Glans in mari nascens. 16.10  
Glans qua ratione seruet. 230.40  
Glandis sapor. 161.10  
Glandes munitæ sunt. 148.10  
Glandes tardè maturæ quare fiāt. 146.30  
Gongri in arboribus. 13.10  
Græca lingua copiosior quàm latina. 4.1  
Græcia quas arbores gignat. 53.30  
Græci coloni quando ferant. 101.1  
Graminum radix. 12.40. & 244.1  
Granata qd meliora faciat. 168.1  
Grando unde sit. 219.20  
Granum cnidium. 127.40

## H

Hæmorum. 108.20  
Hæmus scater tamarice. 55.20  
Harundo. 150.40  
Harundo geniculata. 11.20  
Harundo hifularia. 62.20  
Harundinis folia. 17.10  
Harundo perpetuò uirot. 16.1  
Harundo ubi nascatur. 58.1  
Harundo quibus occasionibus crescat. 61.20  
Harundinis genera. 61.10  
Harundo cretica siue sagittaria. 62.30  
Harundo quomodo nascat. 131.40  
Harundo armamentaria. 61.30  
Harundinis in Aegypti paludibus natura. 244.10  
Harundines quando cædendæ. 61.40  
Harundinis præparatio. 61.40  
Harundo facilè coit uulnerata. 229.10  
Harundo adusta melius resurgit. 62.40  
Harundo tibialis. 60.10  
Harudiniū radix. 12.40. & 244.20  
Harundinaceum folium. 97.40  
Hebenus cuius regionis uernacula. 53.30  
Helenium. 78.30  
Helenium odoratum. 84.1  
Helenij flores. 243.1  
Helicon mons. 119.20  
Helleborus in Arcadia nascitur. 123.10  
Hellebori utilitas. 118.30  
Helleborus melior nascens in Oetamonte. 247.10

Hellebori fructus. 122.30  
Helleborus ætæus. 119.20  
Helleborum quomodo effodiāt. 118.1 & 10  
Helleboro quidam sine noxa uiruntur. 125.1  
Helleborus parnassius. 119.30  
Helleborus atolicus. 119.30  
Hellebori radix. 117.40  
Helleborus quandiu utilis. 122.20  
Hellebori genera. 119.10  
Helleborinæ semen. 119.20  
Helleborus ponticus. 119.20  
Helleborus eleaticus. 119.20  
Helleborus massalioticus. 119.20  
Hellica. 43.40  
Heracliti dictum. 2.30  
Herba quid sit. 9.20  
Herbæ quomodo nascantur. 22.40  
Herbæ quæ cura maiore egeant. 88.10  
Herbæ lanigeræ. 98.40  
Herbas quas uocent. 128.40  
Herbæ quæ celerius quæq; tardius nascantur. 87.20  
Herbarum uires. 117.10  
Herbariorum superstitio. 117.40  
Herculæa spina. 54.1  
Herculana. 123.20  
Herous sinus. 56.40  
Heroum ciuitas. 115.10  
Hesperidi herbæ in nocte melior odor, quàm in die. 251.30  
Hibiscum. 123.20  
Hibisci radix. 125.40  
Hibiscum quale sit. 125.40  
Hippon de plantis. 10.1  
Hippophaës. 123.20  
Hircibarbula. 94.10  
Hircispina. 112.1  
Hircispina ubi nascatur large. 123.30  
Hircispinæ succus. 117.20  
Hirculatæ uires quomodo coëcendæ. 147.10  
Hirundinaria. 99.30  
Homo urbana species est. 10.20  
Hominis olfactus deterrimus. 235.10. & 252.40  
Hominis fimus optimus. 28.40  
Homines macilentum qualem desiderant cibum. 156.40  
Hordeum è radicibus enascitur. 202.40  
Hordeū quomodo pereat. 208.10  
Hordeo quod sit aptum solum. 105.30. & 109.1. & 192.30. & 40  
Hordei satio. 201.10. & 204.20  
Hordeum achilleis. 193.30  
Hordeum

# I N D E X;

- Hordeum trimestre & bimestre. 203.1. & 204.20  
Hordeum quale alimentum potest. 192.40  
Hordeum erugo magis infestat. 208.40  
Hordeum plantis vitium interferitur. 184.10  
Hordeum degenerat. 197.10  
Hordeum maturè feritur. 100.20  
Hordeū ubi rectius feratur. 106.1  
Hordeū q̄modo seruandū. 110.10  
Hordeum syluestre. 53.40  
Hordeum quibus rebus differat à tritico. 103.40  
Hordeum ab hordeo quid differat. 104.1  
Hordeum Indicum. 104.1  
Hordeū quor diebus à flore perficiatur. 102.10  
Hordeū mutatur in lolium. 106.30  
Hordeum statibus quando pereat. 109.40  
Hordeū quādo metendū. 110.20  
Hordeum mutatur satione. 25.1  
Hordeum optime provenit Arhenis. 108.1  
Hordeū quando erumpat. 100.30  
Hordei radix. 12.30. & 101.30  
Hordei in triticū immutatio. 24.1  
Hordei usus ad conficiendum potum. 242.40  
Humicaulia. 94.40. & 173.10  
Humida quæ sint. 77.30  
Humida loca deteriorem materiem producant. 70.20  
Humirubus. 47.10  
Humor & calor ineſt omnibus plantis. 8.30  
Humores quidā in animalibus & in plantis nominib. carent. 8.30  
Humorum differentia. 244.40  
Humorum ſapores. 233.20  
Humor in omnibus. 18.10  
Humor ſaporis materia. 237.30  
Humor ſecundus. 133.10  
Humor quid ſit. 8.20  
Hyacinthus. 86.1  
Hybernis locis quid potius ſerai. 106.1  
Hyberni imbres tempeſtīui arboribus profunt. 153.40  
Hyems tempeſtīua prodeſt. 219.20  
Hyemes poſteriores nocent arboribus. 153.30  
Hyems quæ optima. 152.40  
Hyeme quid creſcat. 140.1  
Hyemes tempeſtīuæ non nocent arboribus. 65.1  
Hyems ad fructificationem multum ualet. 152.40  
Hyeme deteriores omnes plantæ. 55.40  
Hyems quibus noceat. 177.10  
Hyeme qui uſti meliores. 154.40  
Hyemis commoda. 195.20  
Hyphear. 45.20. & 171.1  
I  
Icma. 60.10  
Ida quas nō habeat plāras. 55.1  
Idæa ſpelunca. 32.30  
Idæa pinus. 113.10  
Idæa peculiare arbore. 46.20  
Idæi roboris genera quomodo diſtingui ſoleant. 37.40  
Ignaria unde. 77.40  
Ilex qualis. 45.10  
Ilicis fructus. 45.20  
Ilex montis propria. 32.10  
Ilex diſcilius moritur. 67.20  
Ilex quid aſſerat. 36.20  
Ilex quo tempore perficiat ſuum fructum. 33.40  
Ilex habet altam radicem. 35.30  
Ilicem habere medullam. 74.1  
Ilicis commoditas. 75.40  
Imber poſt ſationem prodeſt. 105.40  
Imbres nocturni. 159.10  
Imbres aquilonij. 159.10  
Imbres quid faciant. 132.20  
Imbres quare ſecunditatem aſſerant. 31.1  
Imbres optimi. 154.20  
Imbres nocent frumentis. 106.20  
Imbres miniſtrant arboribus alimentum. 152.40  
Imbres tempeſtīui arboribus profunt. 153.40  
Imbrium copiam quæ deſideret. 192.30  
Imbres groſſis ſicuū nocent. 163.10  
Imbres poſt uergilias. 194.30  
Impes uermiculus quādo pereat. 110.1  
Incoſtile quid ſit. 206.1  
Incoſtilia cur quædam. 205.40  
Incrementa uaria plantarū. 35.20  
Incultra prius germinant. 142.40  
India quas plāras producat. 54.20  
India monuſa quid ſerai. 54.1  
Indiæ imbres. 177.20  
Indica regio qd ſerai. 53.1. & 123.1  
Inoculatio. 133.10  
Inoculationi aqua nocet. 133.40  
Inoculare arbores. 168.30  
Infamia quo pacto induci poſſit. 120.10  
Infamiam inducens herba. 99.40  
Inſecta oleum odiunt. 235.20  
Inſitio quæ ſit. 133.10  
Inſitionis diſciplina. 134.1  
Inſitionis ratio. 216.10  
Interpretis officium. 3.1  
Interpretandi ſtudium. 2.30  
Intubum. 94.1  
Intubi germinatio. 94.20  
Intubi uſus. 97.1  
Intuborum genus. 158.30  
Inturis. 94.30  
Inturis cultu deterior efficitur. 175.20  
Inturis aculeum iuxta folium habet. 83.10  
Iouis ſlos. 78.30. & 84.1  
Iouis ſlos ſemine ſeritur. 85.1  
Iouis ſlos aſtius eſt. 86.10  
Ipſes uermes in uinibus uocantur. 194.10  
Iphyum. 86.10. & 98.30  
Iphyum quomodo ſeratur. 85.1  
Ipnium. 60.10  
Iris. 240.30  
Iris ubi melior. 255.1  
Iridis radix. 14.10. & 244.20  
Iridis odor. 248.30  
Italia materiem ad naues gignit. 55.10  
Italiae tellus uidetur recuſare plaranum. 55.20  
Italiae incolis caprificadi uſus nullus eſt. 29.20  
Iubam quæ gerant. 103.20  
Iuglans quomodo frangat. 74.20  
Iuglandis uius. 75.40  
Iulus quid. 35.1  
Iumentorum ſtercus. 28.40  
Iuncus. 38.1. & 116.40. & 150.10  
Iuncus odoratus ubi naſcat. 116.20  
Iunci genera. 65.1  
Iunci lapidei. 57.1  
Iuncorum radix. 244.20  
Iuniperi materies. 75.20  
Iuniperus quomodo fructificet. 139.1  
Iuniperi ſuccus. 111.40  
Iuniperus qualem radicem habeat. 35.40  
Iuniperum quo pacto tractare cōueniat. 190.40  
Iuniperus ad quæ apta. 75.40  
Iuniperi binæ. 33.10  
Iuniperus an floreat. 35.10  
Iuniperus quomodo naſcat. 49.1  
Iuniperus tarde perficit fructum. 33.40



# I N D E X.

**L** Ac quomodo corrumpatur. 238.40  
 Lac purgans. 123.10  
 Lac bubulum. 123.10  
 Lactis semina macerata. 218.10  
 Lactis succus. 236.40  
 Lactis sapor. 234.1  
 Lactis ubertatem faciens. 120.40  
 Lactisuccatio quomodo fiat. 117.20  
 Lacara quam facile crescat. 35.10  
 Lachryma gignit. 22.40  
 Lachrymæ quam germinatione præbeant. 132.1  
 Lachrymarum cura. 244.40  
 Lachrymarum odor. 244.40  
 Laconia plena herbis. 123.10  
 Laconica harundo. 62.30  
 Laconica ficus. 212.10  
 Laconici cucumeris genus. 91.20  
 Laconicus ager. 54.30. & 177.30  
 Laconicus ager medicamentis scatur. 123.20  
 Laconica lactuca. 91.10  
 Lactaria. 123.20  
 Lactariae caulis. 117.20  
 Lactariae species. 120.10  
 Lactucarum genera. 90.40. & 91.10  
 Lactuca candida dulcior. 91.10  
 Lactucis porricidæ innascuntur. 92.40  
 Lactuca quam cito erumpat. 87.20  
 Lactucæ caulis. 88.40. & 117.20  
 Lactuca sylvestris. 93.30  
 Lactucæ sylvestris succus. 93.30  
 Lactucæ radix translatæ. 89.40  
 Lactucæ semen. 90.10  
 Lactuca tonsa. 169.30  
 Lactuca latitudo mira. 91.20  
 Lactuca sativa. 87.10  
 Lactucæ radix. 89.40  
 Lanam gerentes herbæ. 98.40  
 Lanæ arborum. 57.30  
 Lapago. 83.10  
 Lapis ex fungo. 56.40  
 Lapis qualis arboribus bonus. 179.30  
 Lapidēs. 235.10  
 Lapidēs cur subijciantur. 178.1  
 Lapidēs non ubique ex agris colligendi. 192.10  
 Lappa. 94.40. & 108.20  
 Lappa lentis inimica. 22.10  
 Lappa quod notabile habeat. 99.20  
 Lactucæ caulis. 91.10  
 Laricis odor. 245.20  
 Larix quomodo proveniat. 23.1  
 Larix cacumine ablato steriles fit. 65.40

Larix decacuminatione perit. 229.30  
 Larix quando cadatur. 68.40  
 Laricis fructus. 146.20  
 Laricis humor. 111.40  
 Laser. 54.20. & 175.20  
 Laser quo pacto in Africa ortum. 132.20.  
 Laseris succus. 112.1  
 Laseris folium. 246.1  
 Laserpinum ubi optime proveniat. 51.20  
 Laserpitij semen. 90.1  
 Laserpitium quomodo nascatur. 81.10  
 Laserpitij radix. 13.40. & 81.1  
 Laserpitij lachryma qualis gustu. 112.10  
 Laserpitij causa. 31.10  
 Laserpitij descriptio. 80.30  
 Laserpitij præparatio. 244.40  
 Lanifolia. 37.10  
 Latina in quare præstet græcorum linguæ. 4.10  
 Latinus ager. 76.30  
 Latinus ager plenus medicamentis. 122.40  
 Lauri fructus. 248.10  
 Laurus semper virescit. 15.40  
 Laurus vitæ offendit. 68.10  
 Laurus quid ferat. 36.20  
 Lauri sativæ. 26.20  
 Laurus ad quæ utilis. 76.1  
 Laurus putrescit magis quam uer miculetur. 220.10  
 Laurus quomodo crescat. 130.30  
 Laurus difficulter augetur. 135.40  
 Lauri proprietates. 46.20  
 Laurus ubi daret. 54.40  
 Laurus feritur sub pinum. 184.20  
 Laurus quando germinet. 33.20  
 Laurus marina. 56.40  
 Laurus alexandrina. 46.20  
 Laurus in platano. 171.30  
 Laurus facile perit. 165.20  
 Laurus rari corporis. 71.20  
 Lauri odor. 173.30  
 Lauri generatio. 22.20  
 Lauriformia. 56.30  
 Lectuotaria. 40.20  
 Legumina. 100.10. & 197.30  
 Legumina quando metantur. 110.20. & 208.10  
 Legumina incoctibilia. 108.40  
 Legumina quali folio contentent. 103.1  
 Leguminum sativæ. 201.10  
 Legumina cibo difficiliora sunt homini. 203.1

Legumina cur celeriter germinant. 202.1  
 Legumina minus terram exhaustunt. 202.10  
 Legumina variè in coctione se habent. 205.40  
 Legumina quomodo radicem & germen fundant. 201.30  
 Legumina quomodo pereant. 230.20  
 Legumina candida. 105.10  
 Leguminum caulis. 103.10  
 Legumina secunda. 103.30  
 Legumina quoradices habeant. 101.30  
 Leguminum radices. 12.30. & 201.20  
 Legumina quæ ferant. 105.1. & 30  
 Leguminibus florētibz quibus imber proficit. 195.40  
 Legumina ubi ferenda. 192.10  
 Legumina quando exeat. 100.40  
 Leguminum differentia. 105.10  
 Legumina quomodo florent. 204.1  
 Legumina diutius florēt. 203.40  
 Legumina cur fecundiora sint. 166.30. & 202.20  
 Legumina quæ cui conveniant solo. 193.1  
 Legumina quæ eruginē sentiunt. 209.1  
 Legumina quomodo coctilia fiunt. 25.10  
 Legumina frigus non possunt perferre. 204.20  
 Leguminibus qua via alimentum dispenietur. 202.1  
 Leguminibus aqua nihil officit. 106.10  
 Lemna. 60.10  
 Lens. 100.30. & 240.30  
 Lens coctibilis. 108.40  
 Lens fertilis. 103.30  
 Lentem quomodo possis grandē facere. 25.10  
 Lentis semen quomodo ferendū. 218.1  
 Lentis caulis. 103.10  
 Lentici succus. 111.40  
 Lentisco inserta minus vermiculatonem sentiunt. 220.20  
 Lentisco inserta meliora efficiuntur. 218.1  
 Leophanes commendat nigrum solum. 157.40  
 Leporum uestigia quando potissimum oleant. 255.40  
 Lepre remedium. 121.10  
 Leprosos efficiens aqua. 159.30  
 Leucomphalia ficus. 212.10  
 Liber

**Liber pater unde.** 52.30  
**Lienis remedium.** 119.40. & 126.30  
**Lignum à carne in plantis quid differat.** 9.1  
**Lignum ex quibus conficitur.** 9.10  
**Ligna sponte germen emittentia.** 215.1  
**Ligusticum.** 116.40  
**Lilium quando nascatur.** 85.40  
**Lilij odor.** 247.30  
**Liliorum differentia.** 84.30  
**Liliorum uariatio.** 84.10  
**Lilij ex lachryma germinatio.** 132.1  
**Liliorum caules.** 135.10  
**Lilium quomodo nascatur.** 131.40  
**Lilia quomodo ferenda.** 84.40  
**Liliū sua lachryma feritur.** 112.10  
**Liliū quomodo proueniat.** 22.40  
**Limodorum.** 228.10  
**Limonium.** 86.1  
**Linum mutatur in lolium.** 170.1. & 199.10  
**Lini odor.** 247.30  
**Liothalaſſiū genus radicis.** 90.40  
**Liparæ peculiaris colurea.** 46.1  
**Lippitudinem curans.** 120.40  
**Liquano succorum.** 117.30  
**Liquor quid.** 8.20  
**Lirium.** 98.20. & 131.20. & 137.10  
**Lirium quando nascatur.** 86.1  
**Liriū idem quod narcissus.** 84.40  
**Lixiua acris.** 77.30  
**Loci natura ad producēdas plantas plurimum ualet.** 23.40  
**Loca mutantur.** 170.20  
**Loci singulis ſua eſt proprietas.** 46.40  
**Loca cōuenientia plantis.** 48.40  
**Locorum ſitus ad fructus quid faciat.** 109.30  
**Locorū discrimina.** 32.1. & 177.30  
**Locorū natura quid ualet.** 15.30. & 16.10. & 84.20. & 208.1  
**Locorum rano habenda.** 105.40  
**Locorum discrimina ad fructus.** 102.30  
**Lolium aquam amat.** 170.1  
**Lolium quale.** 106.30  
**Loliū unde fiat.** 106.40. & 108.10  
**Lolium inimicum hordeo.** 228.10  
**Loliū in triticū mutatur.** 199.40  
**Lolium ex tritico.** 197.10  
**Lotus.** 59.1. & 95.1. & 99.30. & 116.40  
**Loti ſemen.** 200.40  
**Loti generatio.** 199.40  
**Lotophagorum celſis.** 51.40  
**Lucernula.** 66.10

## I N D E X.

**Lucinas quas uocēt augures.** 215.10  
**Lumbrici quibus gentibus à natura ſint.** 128.20  
**Lunæ calor.** 193.40. & 209.10  
**Lunæ ratio habenda in cædendis arboribus.** 69.10  
**Lupinum.** 197.10. & 30  
**Lupinum diurnum.** 110.10  
**Lupinum quādo metatur.** 110.30. & 208.10  
**Lupinū coli nō uult.** 10.20. & 31.30  
**Lupini radicū mira natura.** 14.20  
**Lupinum inſecundum quomodo reddatur.** 175.20  
**Lupini ſatio.** 100.20. & 201.10  
**Lupinum uiride nullum animal mandit.** 107.1  
**Lupinum quale deſideret ſolum.** 201.20  
**Lupinum ualidum.** 172.1  
**Lupini proprietas.** 111.1  
**Lupinū optimè reponit.** 209.40  
**Luti in arboribus uſus.** 179.1  
**Lycia quid ferat.** 54.40

## M

**Macedonia quas plātas habet.** 55.1  
**Macedonia quomodo obnoxia ſit frigori.** 224.10  
**Macedones quomodo diſtinguāt roboris ſpecies.** 38.1  
**Macedones quomodo picem exurant.** 114.1  
**Macedonum pleriq; quomodo in terierint.** 104.40  
**Macedonica materies.** 70.20  
**Madonaim quam appellēt.** 121.30  
**Magydaris.** 81.10  
**Magydaris radix.** 13.40  
**Makol? ex qua materia fiat.** 76.10  
**Māla ſylueſtria.** 161.10  
**Māli odor.** 288.10  
**Māla quæ ſuauiſſimè oleant.** 350.1  
**Mālus à mālo diſſert.** 204.30  
**Mālus quomodo creſcat.** 22.20. & 130.30  
**Mālus medica ſimodo ſeraſ.** 52.40  
**Malus ne ulceribus lædatur.** 176.1  
**Māli medulla.** 73.40  
**Māli nodi.** 15.1  
**Māli breui putreſcunt.** 220.10  
**Māli quādam denſè ſerendæ.** 26.20  
**Mālus in plano melior.** 32.20  
**Māli terræ radix.** 95.30  
**Māli medicæ quæ regio ferat.** 52.30  
**Mālus perdit ante maturitatē fructum.** 29.20  
**Mālum terræ.** 21.40

**Māli terræ uſus.** 128.10  
**Mālus quantū alijs noceat.** 184.40  
**Mālus multa ferre poteſt.** 228.40  
**Mālus medica qualis.** 52.40. & 147.40  
**Māli uita.** 64.1  
**Māli fructus quos ſentiat morbos.** 221.30  
**Mālus uerna.** 165.30. & 190.20  
**Mālus plagis debilitatur.** 182.10  
**Mālos uermiculari.** 165.20. & 220.1  
**Mālum odores ſuſcipit.** 255.40  
**Māli terræ quandiu duret.** 122.20  
**Mālus raro corpore.** 71.20  
**Māli radices.** 12.10  
**Mālorū femina.** 148.10. & 196.20  
**Mālorum fructus terra obruti.** 216.20  
**Māli medicæ ſlos.** 20.40  
**Māli cur non cōgeſcant.** 224.20  
**Mamali quid producat.** 114.20  
**Malinathalla.** 59.20  
**Maloperſica.** 157.40  
**Malua coqui uult.** 94.10  
**Malua ſylueſtris.** 123.20  
**Maluæ folia.** 174.10  
**Malua quanta euadat.** 9.30  
**Mandragora.** 80.20  
**Mandragoræ uis.** 234.30  
**Mandragoræ folium.** 118.20  
**Mandragoræ radix.** 118.20  
**Mandragora quomodo eſſodierda.** 118.10  
**Mare quid gignat.** 153.10  
**Mare bellus reſertum.** 56.40  
**Mare rubrum.** 56.30  
**Mare etiam profert plantas.** 55.30  
**Maris aqua miſta.** 233.1  
**Maris odor unde ſit.** 233.1  
**Maritima loca feſtinātiora ad fructuum maturitatem ſunt.** 103.1  
**Marifica herba.** 126.20  
**Marina à terrenis quomodo diſſerant.** 57.20  
**Marinæ arbores.** 10.30  
**Marifcus iuncus.** 63.1  
**Maritimum granum.** 120.20  
**Marubij genera.** 79.40  
**Maſpetum.** 80.30  
**Materia quando cædenda.** 34.30. & 68.30  
**Materia in mari etiā naſcit.** 55.30  
**Materies in opere facilis.** 73.20  
**Materies optima ex arboribus uigentis ætatis.** 69.20  
**Materies uaria uariarum regionum.** 70.20  
**Materies optima ad Aquilonem.** 70.10

# I N D E X.

Matrx in plantis.	9.1	Mespila.	161.10	Myrrhæ arbor quanta.	114.20
Maturationis causa.	160.40	Mespilus syluestris.	45.10	Myrrhæ arboris folium.	114.30
Manuritas frugum.	102.20	Mespili odor.	248.10	Myrrhæ usus.	116.40
Medicus quid cognoscat.	176.10	Mespili quot genera.	42.1	Myrrhæ præparatio.	244.40
Medendi ars quid faciat.	176.20	Metalla.	233.10	Myrrha quomodo probet.	115.20
Media prouincia quæ peculiari- ter ferat.	52.30	Metere tēpestiue ad fructus quid faciat.	110.20	Myrrha quomodo emat.	114.40
Media excelsa regio.	110.40	Midam fabæ creant.	210.1	Myrrha qua ratione colliganur.	114.30
Medica tonsa.	169.30	Milium. 100.10. & 107.1. & 197.30		Myrrham sub cane incidi.	112.20
Medica urina & stercore perit.	107.40	Milium quot diebus maturū fiat.	102.20	Myrrhæ arbores.	114.20
Medica uis quæ sit.	175.20	Milij radix.	166.40	Myrrhæ arbores meliores.	115.1
Medicamentum ossium.	47.10	Milij caulis.	103.10	Myrrhæ arbores cuiusmodi solo gaudeant.	115.10
Medicamenta quo pacto uim a- mittant.	125.20	Milium ferax.	103.30	Myrtaria.	120.20
Medicamenta ex uarijs.	117.10	Milium fecundum.	166.30	Myrtus multo macerata melius redolet.	251.30
Medicaminibus scatentes regio- nes.	54.30	Milium bene reponitur.	209.40	Myrtus quæ ratione meliorescat.	190.20
Medulla fissa.	73.40	Milij satio.	209.20	Myrtus purgationē diligit.	28.30
Medulla in putando obseruāda.	187.20	Millipeda bestiola.	56.10	Myrti odorata.	86.30
Medullā habet omnis materies.		Miscum quid uocent.	192.20	Myrtus celerrimē uritur frigore.	225.20
Medulla uitium. 185.10		Mnadium.	58.10	Myrti plaga regenda.	179.1
Medullæ quid faciant ad fructus.	187.30	Moly ubi nascatur.	123.20	Myrtus ubi melior reddat.	167.30
Medulla in plantis.	9.1	Montapium.	93.30	Myrti cornicē nō detrahendū. 132.1	
Medulla detracta an moriatur ar- bor.	86.1. & 229.20	Montana scabra.	41.10	Myrtis quale stercur addat.	183.20
Medullæ uarietas.	11.40	Mons altus refertus myrrhæ ar- boribus.	114.20	& 190.1	
Medulla quibus sit membranis si- milis.	12.1	Montes ad olētiā qd faciāt.	86.30	Myrti satio.	16.20
Megarenfis ager.	29.20	Montium propriæ arbores.	22.10	Myrti amant umbras.	180.30
Megarenfies quomodo cucume- res tractent.	189.10	Montes pleni arboribus.	31.40	Myrtus in fruticem transit.	9.30
Melampodium.	119.30	Montes altissimi uenena ferunt.		Myrtus ualidissima.	28.40
Melampyrum frumentum.	105.1	Monnulus. 43.40	247.20	Myrtus qualis sit.	160.20
Melas amnis.	62.10. & 216.1	Morbus quid sit.	219.10	Myrti flos.	20.30
Mel frugum.	99.30	Morbi duplices.	219.10	Myrti fructus.	161.1
Melij agri fecunditas.	102.30	Morus Aegyptia.	49.30	Myrti generatio.	22.30
Melle macerata semina.	218.10	Morus Aegyptia quomodo fru- ctum ferat.	7.10	Myrtus ubicōmodius ferat.	54.40
Mellis prouentus.	79.30	Morus calida.	71.30	Myrti sapor.	238.10
Melleus humor è robore.	36.40	Moro Aegyptiæ fructus ex caudi ce profilire solet.	21.10	Myrti celeris interitus.	165.40
Melothrum.	79.10	Morus celeriter fructum suum conficit.	145.30	Myrti odor.	248.20
Memphis peculiarem materiam habet.	51.10	Mori sapor.	236.30	Myrtus quomodo putanda.	182.1
Menestor de plantis.	146.1. & 150.40	Mori flexibilitas.	74.30		
Mensiflora.	60.10	Mori germinatio.	146.1	N	
Menstruorum remedium.	93.40. & 118.30	Mori usus ad naues.	75.20		
Menta an habeat semen.	85.10	Mori fructus.	166.20	Narcissus.	84.40
Menta ex sisymbrio.	218.30	Mortis causa.	8.30	Narcissus quomodo sera- tur.	84.40
Mentæ odor.	248.20	Mulæ herbæ folium.	126.30	Narcissus quando nascat.	86.1
Mentastrum.	94.10	Mulierum profuuiū curās.	58.30	Narcissi flos.	98.20
Meridies quid ferat.	54.20	Muralis herba.	79.10	Narcissi folium.	97.40
Meridiem quæ arbores spectare debeant.	181.40	Muraleum.	94.10	Nardus.	116.40
Meridionalibus regionibus quæ nascantur.	114.10	Muscī fertilis laurus.	165.30	Narta.	116.40
		Mutatio quid faciat.	178.30	Nasturtiū quādo erumpat.	87.20
		Mutatio quot modis fiat.	213.10	Nasturtij semen.	93.10
		Mutilatio uinum.	189.10	Nasturtiū quando seratur.	87.10
		Myricæ folia.	17.11	Natura in quibus inuestiganda.	144.40
		Myrrha.	54.20		
		Myrrha ubi crescat.	114.20	Naualis materies.	75.10
				Naualem materiem quæ regio- nes ferant.	55.10
				Nebulæ floribus nocent.	160.30
				Nepa	

# I N D E X.

- Nepa. 78.40. & 81.40. & 137.10  
Nepæ radix. 122.10  
Nerum. 116.40  
Neruus in plâris. 8.20.40. & 11.20  
Nesbus fluuius. 30.40  
Nicolodori magistratu quid euen-  
rit. 148.30  
Nigella quomodo foliata fit. 95.1  
Nigrum solum. 157.40  
Nilus habet platanum. 58.10  
Nitrum cuius saporis fit. 231.30  
Nitro macerata semina coctibilio  
ra sunt. 218.10  
Nix quid fit. 226.1  
Nix Idæis montibus nunquam  
deest. 49.10  
Nix iuuat ad excoquendum. 203  
30.  
Niuus utilitas. 153.1. & 195.1  
Niuem non gelare. 225.40  
Nix hybernus noualibus prodest.  
192.10  
Nodi in arboribus quomodo te-  
gantur. 70.40  
Nodorum discrimen. 15.1  
Nodorum in arboribus uarietas.  
14.40  
Nodosæ quare sint plantæ. 70.30  
Nomina rebus quomodo impo-  
nenda. 2.40  
Nouale hybernū melius uerno.  
106.1  
Noualium cura. 192.10  
Nucleorum alimentum. 144.20  
Nux auellana. 44.20. & 197.20  
Nux auellana an floreat. 33.10  
Nucis auellanae fructus. 44.30  
Nucis auellanae iulus. 35.1  
Nucis auellanae quomodo fructi  
feræ. 9.30. & 167.20  
Nux Euboica. 72.20  
Nux Euboica quale solum deside-  
ret. 180.10  
Nux iuglans. 31.40. & 197.20  
Nux iuglans montis appria. 32.10  
Nucibus qui locus conueniat.  
26.20  
Nucum sapor quo pacto expri-  
matur. 242.30  
Nucis uersutæ plus olei reddunt.  
238.10  
Nucis durant. 148.10  
Nymphææ radix. 121.30
- O  
Besitare pereit animalia.  
223.1  
Ocimum tonsum. 169.30  
Ocimum quomodo ferat. 131.30
- 198.1  
90.20  
218.30  
93.1  
90.1  
88.20  
92.30  
12.40. & 89.20  
137.1  
90.10. & 93.10  
197.40  
87.20  
70.40  
96.40  
152.1  
250.1  
248.20  
169.40  
251.40  
19.40  
19.20  
252.20  
252.20  
240.40  
40  
54.20  
252.30  
256.20  
352.10  
248.20  
233.1  
231.10  
255.40  
255.40  
251.30  
252.10  
240.30  
251.30  
251.40  
169.40  
236.10  
250.10  
255.40  
255.30  
255.40  
255.1  
242.40
- Odoris durtia. 249.10  
Odoris dulcedo. 249.20  
Odores q̄modo æstu iuuentur  
& offendantur. 252.1  
Odorum potestas unde fit. 251.1  
Odorum & saporum cōiunctio.  
240.10  
Oenantha inter flores numerat.  
85.1  
Oenantha sæpe floret. 142.10  
Oenanthes odoratior est. 248.30  
Oenothera qualis. 127.20  
Oenotheræ radix hilares facit.  
127.20  
Oëta quid gignat. 54.30  
Olea diuturna. 64.30  
Olea & myrtus amicæ. 184.20  
Olea uertit sua folia. 173.40  
Olea fert multa. 228.40  
Olea in Cyrenensi agro bene pro-  
dit. 51.20  
Olea Athenis. 64.1  
Olea fragilis. 149.20  
Olea facile rumpitur. 74.20  
Oleam post arcturum non plus  
olei facere. 239.1  
Olea quomodo proueniat. 22.10  
Oleæ locus aptus. 26.20  
Olea molesta uiri. 184.30  
Oleæ semen. 196.20. & 197.20. &  
230.40  
Oleæ imperigo accidit. 221.1  
Oleæ morbi. 65.10  
Oleæ medulla. 73.30  
Olea uiret perpetuo. 15.4  
Oleæ radices. 12.10  
Olea frigori obnoxia. 155.30  
Oleæ iarus proprius. 26.20  
Oleæ præciæ meliores reddunt.  
67.30  
Olea præcipue exigit ablaqueatio  
nem. 182.20  
Olea amissis folijs fructificauit.  
Olea marina. 56.40 (24.30)  
Oleæ commodum sterco. 183.20  
Olea aptissima ad ignem. 77.40  
Oleæ quid apud Tarentum acci-  
dat. 160.30  
Olea quare fragilis. 11.30  
Olea uertit folia. 16.30  
Olea spissa. 71.20  
Olea putationem amat. 28.30  
Olea imprimis infestat uentis. 66.  
Oleæ plagæ tegendæ. 179.1 (30)  
Olea difficilis auctu. 135.40  
Oleæ serendæ ratio. 26.10. & 130.20  
Olea simū & rigationē amat. 28.  
Oleæ ne ulcera noceat. 176.1 (30)  
Oleæ ut elendg tempus. 133.40

# I N D E X.

Oleæ flos.	20.20	Olera.	169.30	Paliurus in aqua.	69.20
Oleæ quâ partē cœli spectare debeant.	181.40	Oleriarbores.	9.40	Paliurus in arborē trāsit.	9.30
Oleæ circa Tarentum male deſito reſcunt.	66.1	Olera rigata meliora.	159.1	Paliurus qualis.	51.40
Olearum genus Aegyptiū.	240.1	Olera quę humoribus ſaliſis iuuēt.		Paliurus.	51.20
Oleārū genera multa ſunt.	240.1	Olerū radix. 12.30 et 166.40 (158.20)		Paliuri diſcrimina.	46.40
Oleæ nocet hyems.	177.10	Olerū ſemina nullas beſtiolas gignunt.	210.1	Palma.	166.1
Oleæ ſtatua ſudare poteſt.	215.10	Olera q̄modo fructificēt.	21.40	Palma Deli.	64.1
Oleæ ſuccus.	229.1	Olera quæ uocemur.	94.1	Palma ubi præcellat.	155.40
Olearum uermes.	194.10	Olera in arboris figuram mutantur.	9.40	Palma ſterileſcit cacumine ablato	
Oleæ germen.	149.1	Olera ſunt fertilia.	209.40	Palma amat calorē. 155.1	(65.40)
Oleæ quo pacto arachniū innuſcatur.	221.40	Olera q̄ pacto pereant.	230.30	Palma apud Babylonē.	23.1
Oleæ ligna facile germināt. 211.30		Olera quędā culicē gignūt.	66.20	Palma facile amittit fructus.	161.
Oleæ nouellę pereūt ex fertilitate.	222.40	Olerum cultura.	191.10	Palma ubi fructū dior. 32.40	(40)
Oleæ florēti imber nocet.	66.1	Olerum radices q̄modo magnę ſiant.	216.30	Palme incoctę ſtrāgulātes.	54.20
Olea quomodo ſe habeat in fruſcificando & germinādo. 149.30		Olera quale ſolum uelint.	156.40	Palma qua cura retineat fructus.	
Oleæ etiā ſeriores imbres tēpeſti-		Olera urbana.	87.10	29.40. & 161.40	
Oleæ fructus. 221.30 (ui. 154.10)		Olera quę nulla habeant genera.	90.30	Palma uidet nullā habere medul-	
Oleæ cur noceat frigus. 224.20		Olerū ſemina. 134.40. & 245.40		Palmarū genera. 27.20	(lā. 12.1)
Oleæ cortex nō detrahend⁹. 132.1		Olera quędā amant aquā ſaliām.	190.20	Palma generatio.	149.1
Oleis quid apud Milētū accidat.	222.1	Olera aquanōnē deſiderāt. 183.10		Palma quale ſolum amet.	26.40
Oleis aptū ſolum. 156.20. & 180.1		Olerum genus.	191.1	Palma difficilis auctū.	135.40
Oleaginus.	60.20	Olerum folia.	145.40	Palme quādo trāſferēdæ.	27.20
Oleagineum.	211.30	Olympus Myſus nucē habet piumam.	55.1	Palma marina.	16.20
Oleaginea materies.	78.10	Olympus laurum habet.	54.40	Palme durabiles. 134.30. & 27.1	
Oleaginea ligna germē emittit.		Olympias uentus.	66.20	Palma leuis.	71.40
Oleaginoſū folia. 16.40	(215.1)	Ononis.	79.1	Palmarum ſatus.	26.30
Oleaſter ualde laborat frigore.		Ononis aculeū habet penes foliū	83.10	Palma ualida.	74.20
Oleaſter ſpiſſa. 71.20	(224.20)	Ononis q̄modo extirpāda. 83.30		Palma uirgis pcreatur.	130.1
Oleaſter Megaris in foro. 70.40		Orbes in ligno qui ſiāt.	70.30	Palma q̄modo emoriatur.	130.10
Oleaſter ad quā utilis.	76.10	Orchomenus lacus.	60.10	Palma ſemen. 197.20. & 230.40	
Oleaſter terebinthē nō ſentit.	72.30	Ordeago.	101.40	Palme qualia loca amēt.	189.30
Oleaſter Olympiæ.	64.1	Organum.	79.10	Palmas acerbitas ineſt.	190.20
Oleaſtro longior quā oleū uitæ.	63.40	Organū q̄modo ſeratur.	88.20	Palma ſemina fructū retinere nō poteſt.	190.20
Oleſia ex quibus efficiat.	250.40	Organū difficile germinat.	198.	Palma ubi naſcantur.	53.40
Oleū multū caloris requirit. 155.40		Organū quādo erūpat. 87.30 (10)		Palmis ſal. pdeſt. 158.20. & 189.20	
Oleum ex ſpina.	51.10	Organum ſemper uiuet.	16.1	Palma uulnerata perit.	228.30
Oleum omnia necat.	68.10	Organum ſpecies.	79.30	Palma decacuminata moritur.	
Olei penuria copiāq; unde.	148.	Orientalibus regionibus quæ proueniunt.	114.10	67.30. & 229.30	
Oleū ex phauliſ. 239.10	(30)	Oris ſuaue olēniā qd faciat. 52.40		Palme ubi magnę proueniant.	52.10
Oleum ex albis oliuis.	239.10	Oriza.	53.40	Palma in Creta.	28.10
Olei copia.	239.30	Orobancha.	228.10	Palma quibus modis naſcantur.	129.40
Oleū quare noceat plātis.	228.10	Oſtrys qualis.	39.40	Palma ubi ſterileſcat.	24.1
Oleo odores ſeruantur.	255.20	Ouis pinguefacit coluteę fructus.	46.1	Palma uiuet ſemper.	15.40
Oliſactus hominis deterrimus.	352.40	Oua animalium.	200.20	Palma fructus.	21.20. & 27.30
Oliua in locis gelidis ſapore caret. 239.40		Ouis ſemina ſimilia.	134.30	Palmarum flores.	20.40
Oliuæ riguæ deterius fundūt oleum.	239.30	Ouium ſimus.	28.40	Palma refrigerari cupit.	189.40
Oliuæ.	148.20			Palma qualē acirē cupiat.	189.40
Oliuæ quomodo intereāt.	154.1			Palma fumoſa.	77.30
Oliuæ ſapor.	236.20			Palma folia.	17.10

P

Adus arbor gaudet umbroſis.

Paluſtres

# I N D E X.

Palustres arbores. 10.30  
 Palustris faba. 58.40  
 Palustres plantæ. 38.1  
 Palustria loca non utilia ferunt. 206.20  
 Palustribus locis quæ gaudeant. 48.40  
 Palustribus locis fossio prodest. 184.1  
 Panax herculana. 119.40  
 Panacis genera. 119.40  
 Panacis utilitas. 118.30  
 Panaces multæ. 120.10  
 Panacem effodientes quid faciât. 118.10  
 Panacea. 123.20  
 Pandius mente alienatus. 121.40  
 Panicum. 100.10. & 107.1  
 Panicum quorundam maturum fiat. 102.20  
 Panicum quare optime reponitur. 209.40  
 Panici sario. 209.20  
 Panici caulis. 103.10  
 Panici radix. 166.40  
 Panis ex palmis. 25.10  
 Papauer. 166.30  
 Papaueris caput. 117.20  
 Papauer fertilissimum. 209.40  
 Papaueris semen. 18.20  
 Papaueris syluestris genera plurima. 121.10  
 Papiliones. 218.40  
 Papilio ex eruca. 25.30  
 Pappi lanuginē in quibus uocēt. 82.40. & 90.10  
 Papyrus. 58.10  
 Pardalis an oleat. 252.30  
 Pardalim olere. 235.10  
 Parnafus mons quid ferat. 54.30. & 123.10  
 Parnafica materies. 70.20  
 Parnafia abies. 15.30  
 Parnus mulierum iuuant folia diætami. 123.40  
 Passinaca ubi laudatiss. 127.40  
 Passinaca ubi præstantior. 123.30  
 Passinaca in Arcadia. 123.10  
 Passinum quid uocent. 192.20  
 Pediculus quid. 8.10  
 Pelecania habet multas harundines. 62.1  
 Pelium montem Thessaliæ medicamina ferre. 123.10  
 Pellium feces. 190.1  
 Pepo quomodo floreat. 90.1  
 Pepo cuiusmodi radicem habeat. 89.40  
 Perdicium quali sit radice, & cur

ita uocetur. 13.30  
 Peregrinationis studium. 167.40  
 Perfectio quid sit. 199.1  
 Periandrinorum uicus. 124.10  
 Perissus. 120.10  
 Persea arbor. 30.10  
 Perseica Aegyptia ubi melius proueniat. 155.30  
 Perficam, quam uocant, malum quæ ferat regio. 52.40  
 Perfica quomodo feratur. 52.40. & 53.1  
 Perfica qualis arbor. 52.40  
 Perficum pomū uō mādatur. 52.40  
 Perficæ arboris pomum & foliū odorantissima. 52.40  
 Perficum pomū inter uestes positum, eas inoffensas conseruat. 52.40  
 Perficum pomū cōtra mortiferū potum ualer. 52.40  
 Perfica arbor fert poma omnibus horis. 52.40  
 Perficum pomum suauem halitū reddit. 52.40  
 Perfica in Aegypto & locis proximis fructificat. 32.40  
 Perfica nō ubiq; fructificat. 32.40  
 Persis quæ peculiariter ferat. 52.40  
 Persis Carthiæ cōtermina. 57.10  
 Pes gallinaceus. 94.10  
 Pestilens lues quomodo inuadat. 224.30  
 Petina. 94.40  
 Petra Cappadociæ locus. 110.30  
 Petra ubi nascatur. 123.20  
 Peucedanum. 123.20  
 Peucedani radix. 127.40  
 Peucedanum quinque aur sex annis durat. 122.10  
 Phalacras. 46.30  
 Phalangium. 109.30  
 Phacon leguminis genus. 53.40  
 Phellodrys. 45.20  
 Philira perpetuo uiuet. 15.40  
 Philosophi est nomina rebus imponere. 3.10  
 Philycæ. 74.30  
 Philycæ quando germinet. 33.30  
 Philycæ utilitas. 76.1  
 Phleus altero folio cōditur. 79.1. & 81.30  
 Phleum ubi nascatur. 60.10  
 Phleum iuxta folium aculeum gerit. 83.10  
 Phocis uitis. 169.20  
 Phocenses quando ferant. 101.1  
 Phrygium. 86.10  
 Pica glandes reponit. 172.20

Picea. 38.30. & 54.40  
 Picea quando cædenda. 69.20  
 Picea regerminat. 38.40  
 Picea an floreat. 33.10  
 Picea decacuminata morit. 67.30  
 Piceæ lachryma. 111.40  
 Picea pediculifera. 136.10  
 Picea ad naues apta. 75.10  
 Piceæ fructus. 146.20  
 Piericus olympus. 55.1  
 Piesangensis agri triticum. 203.30  
 Pilulas comatas robur gignit. 36.20.  
 Pinastrum mōris propria arbor. 32.10  
 Pinastrum ubi excellentissimum est. 48.40  
 Pinastrum culturam recusat. 10.10  
 Pineæ. 82.10  
 Pinguedo quo pacto fiat. 243.20  
 Pinguedine pereunt & plantæ & animalia. 243.20  
 Pinguedinis causæ. 240.1  
 Pinguis saporis figura. 232.10  
 Pinguia calida. 152.1  
 Pinus feruari potest teda detracta. 228.30  
 Pini humor. 111.40  
 Pinus conifera. 136.10  
 Pinus plurimū usus. 69.20  
 Pini & abienis discrimen. 69.20  
 Pinus fructificat & redificat. 113.10  
 Pinus syluestris. 31.40  
 Pini semina. 148.10  
 Pini radix. 12.10. & 25.40. et 143.10  
 Pinus qualem locū quærat. 160.10  
 Pinorum species. 38.10  
 Pinus quid ferat. 36.20  
 Pinus difficilis aucū. 135.40  
 Pinus apra nauibus. 75.1  
 Pinus pondus sustinet. 74.20  
 Pinus præcisa arefcit. 36.1  
 Pinus spectabilis. 74.30  
 Pinus quomodo nascatur. 23.1  
 Pinus radice tēdam ingerit. 113.1  
 Pinus gignit ægidem. 38.30  
 Pinus nulli inimica. 184.20  
 Pinus frigus cupit. 155.1  
 Pinus alta. 18.1  
 Pinus marina. 113.10  
 Pinus in tēdam uersa moritur. 243.20  
 Pinus sine medulla uiuere nō potest. 229.20  
 Pini fructus. 248.10  
 Pini quando cædantur. 68.40  
 Pinus ulcere non perit. 67.40  
 Pinus decacuminata morit. 67.30  
 Pinus an floreat. 33.10

# I N D E X.

Pinus calida.	152.1	Plantago q̄modo floreat.	96.20	Plantarum succi.	144.1
Pinum Syria non fert.	114.10	Plantago.	95.1	Plantarum omnium communis	
Pini nodus.	73.20	Plantarum humor.	111.30	mors.	68.1
Pinum strangulari aiunt obestita- re & pinguedine.	223.1	Plantis cultura aliquando nocet.		Plantarum diuisio in suas partes	
Pini odor.	248.10		227.40	difficilis.	6.10
Pini lachryma.	244.40	Plantarum pernicies quæ ab alijs		Plantarum partes aliæ crispiores	
Pin <sup>o</sup> quo pacto corrūpatur.	223.1	uenit.	227.1	alijs quare sint.	243.30.
Pinus uentis obnoxia.	35.40	Plantæ quæ uidentur fructu & se		Plantarū partes primæ.	7.20
Piperis genera.	127.40	mine carere.	85.10	Plantæ in suo uigore odoratissi-	
Piper rotundum.	127.40	Plantæ sunt quæ nusquam quā		mæ.	251.40
Piper longum.	127.40	in mari uiuere possunt.	158.10	Plantas oleum necar.	68.10
Piræi agri aqua.	159.30	Plantarū morbi interni.	219.20	Plantæ nouellæ inualidæ.	68.10.
Pirum scindi.	229.10	Plantarū morbi externi.	219.20	& 251.40	
Pirastro lōgiōr uita q̄ piro.	63.40	Plantæ cur oleant.	252.30	Plantæ marinæ.	57.1
Pirus quomodo proueniat.	22.20	Plantis inest omnis sapor, præter		Platæ uetustæ odoratiores.	251.40
Piri syluestris sapor.	161.10	salus.	241.1	Plantis fata facilius germinant.	
Piri cur amittant fructus.	162.1	Plantæ omnes quando pulcher-		135.20	
Pirus à piro differt.	204.30	rimæ.	6.20	Plantarum partium ambiguitas.	
Pirus quomodo crescat.	130.30	Plantæ ex negligentia meliores		6.10	
Pirus obnoxia uermibus.	222.10	redduntur.	169.40	Plantæ ubi potissimum uires ha-	
Piri syluestris cur tardè maturita-		Plantæ recrecentes.	64.10	beant.	245.10
tis sint.	146.30	Plantarum species.	9.20	Plantarū historiæ diuisio.	6.1
Pirus quando germinet.	33.20	Plantæ cognatæ inter se.	171.40	Plantæ enerues.	11.20
Pirus resistit frigori.	224.30	Plantæ uariæ uaria animalia cre-		Plantæ quā crebre serēdæ.	26.20
Pirorum femina.	148.10	ant.	110.1	Plantarum crassitudo.	185.40
Pirus in Phocide.	169.1	Plantæ quæ longiores, quæq̄ hu-		Plantæ solo pingui offenduntur.	
Pirus qualis sit.	119.1	miliores sint.	11.10	156.40	
Pirus in plano melior.	32.20	Plantæ cortice differunt.	11.10	Plantæ uenenosæ.	246.40
Pirus syluestris facilius germinat.		Plantarū prima genera.	152.30	Plantarū internæ & externæ par-	
143.1		Plantæ quærūt sibi accommodatū		tes.	6.40
Pirus ne ulceribus laboret.	176.1	locum.	49.20	Plantæ comparandæ animalibus	
Pirus quibus locis gaudeat.	41.10	Plantis nō addēdū stercus quod-		6.40.	
Piri cortex.	9.10	uis.	227.40	Plantarum partium differētiæ in	
Pirus syluestris locis feruidis non		Plantarū uires mirabiles.	54.20	quibus sint.	7.1
nascentur.	155.30	Plantarū summa differētia.	55.20	Plantæ nouellæ leue stercus po-	
Pirus plagis infirmatur.	182.10	Plantæ frugifera in solo sibi con-		stulant.	183.30
Pirorum sapor.	236.20	ueniente.	26.30	Plantæ nouellæ.	146.40
Pirus quomodo reddat frugife-		Plantarum medulla.	11.40	Plantarum interualla.	18.20
ra.	20.10	Plantæ satiuæ molliorem aërem		Plantæ res uaria.	7.30
Pirus longioris uitæ.	166.10	quærunt.	155.20	Plantæ animalium depastione in	
Pirorū genus Caria.	242.1	Plantarum aliæ culturam exigūt,		festantur.	230.1
Pirus quando maturet fructum.		quædam recusant.	10.10	Plantis partes quæ sint.	6.20
33.40		Plantis aquatilibus breuior uita		Plantæ in solo tenui sitæ, odore	
Piri syluestris materies.	73.30	quā terrestribus.	63.30	meliores sunt.	251.40
Piri semen.	196.20	Plantarum differētiæ ex formis,		Plantarum partes maximæ.	7.20
Pisum generatio.	163.40	10.20		Plantæ aliæ aliud solum postulat.	
Pisces in mari quales sint.	241.10	Plantis nouellis exitio sunt faba-		170.40	
Pisum.	100.10.30. & 103.1	rum putamina.	227.30	Plantæ quomodo serendæ.	25.40
Pisum fragilissimum.	209.10	Plātē à quo loco accipiēdæ.	178.30	& 174.40.	
Piso uermes innascuntur.	194.1	Plantarum differētia ex locis.		Plantæ sapor mutatur.	236.20
Pix afficitur.	228.20	10.30		Plantarum radices quibus mor-	
Pix quare noceat nouellis plātis.		Plantas quo pacto frigore pere-		bis obnoxia.	220.20
228.10		ant.	223.40	Plantæ nouellæ non tangendæ.	
Pix.	38.20	Plantarum morbi.	219.10	180.40	
Pix optima.	113.1	Plātē saporē indicat fructus.	237.1	Plantæ serendæ quales esse debe-	
Pix quādo copiosa reddat.	113.1	Plantarum omnes differētiæ bre-		ant.	178.20
Picis incrementum.	113.10	uiter enumeratæ.	21.30	Plantæ aquis propinquæ, minus	
Pix qua ratione uratur.	113.30	Plantarū generatio.	6.30. & 22.1.	durant.	64.10
		& 30.40. & 129.1. & 196.10		Plantæ unius partes esse uariarū	

facultatum.	246.40	Populus facile crescit.	129.40	Punica quomodo durior efficiatur.	219.40
Plantarum partes ex quibus consist.	7.40	Populus alba quo pacto mutet.	170.1. & 199.30. & 218.40.	Punicam ferendi modus.	26.10
Plantæ quādo amputandæ.	181.1	Porcellia.	94.1. & 97.10	Punicæ flos.	20.40. & 142.40
Plantæ quasdam partes quotannis amittunt.	6.30	Porrum satum quando exeat.	87.20. & 197.40	Punicæ qua ratione curetur.	221.1
Plantæ quæ eligendæ.	26.1	Porrum tonsum.	169.30	Punica quātū alijs noceat.	184.40
Plantarum genus quale desideret alimentum.	159.30	Porrum quomodo feratur.	87.20 & 90.20. & 217.40	Punica ex uirga crescit.	22.10
Plantæ uarijs locis odorem continent.	242.40	Porri retonsum melius fit.	191.10	Punica aquam diligit.	28.20
Plantis satis qua ratione continetur humor.	178.1	Porri semen.	93.10	Punica qualis.	160.20. & 225.30
Plantarum agrestium morbi nulli traduntur.	219.30	Porri caput.	88.30	Punica brevis uiræ.	64.1
Platanus.	55.20. & 71.30. & 228.30	Porris porridgē in nascunt.	29.40	Punicæ facili putrescunt.	220.10
Platanus ex semine.	30.30	Portulaca.	198.1	Punica flores amittit.	161.40
Platanus in Lycio.	14.1	Portulaca qualis.	137.1	Punicæ radices.	12.10
Platanus in Antandro.	215.30	Portulaca quādo erumpat.	87.20	Punicæ umbras amant.	280.30
Platanus Delphica.	64.1	Portulacæ satus.	87.20	Punicæ dulcescunt suillo stercore.	183.20
Platanus in agro Cortinēsi.	16.10	Portulacæ radix.	89.40	Punicis quale stercus addat.	190.1
Platanus tolerat securim.	67.40	Portulaca.	67.10	Punicæ ubi meliores fiant.	167.30
Platanus i Caphysis Arcadiæ.	64.1	Portulaca qualis arbor.	45.40	Punica auctu facilis.	135.40
Platanus auctu facilis.	35.10	Portulaca quando maturet fructū.	33.40	Punicis quid eueniat.	213.1
Platanus in Creta.	15.40	Portulaca uiret semper.	15.40	Punicæ Aegypti.	136.20
Platanus palustris.	10.30	Portulaca quando germinet.	33.20	Punica nō bene prouenit semine.	136.1
Platani radices.	12.10	Portulacæ usus.	75.40	Punica quomodo putanda.	182.1
Platanus quid exigit.	30.10	Precari in colligendis herbis non absurdum.	118.10	Punicis frigus non nocet.	224.20
Platani usus.	75.20	Principiorum natura.	237.30	Punica rigationes & fimi amat.	28.30
Plato de saporibus.	231.30	Probatia amnis.	62.1	Punica quo pacto inferat.	134.10
Plinij errores.	3.20	Propontis quid ferat.	55.1	Punicarum fructus terra obruit.	216.20
Pluit nunquā in quadam Africæ parte.	52.1	Pruinam nocere noualib⁹.	192.10	Punicæ etiā seriores imbres tempestiui.	154.10
Pluuiæ raræ.	56.30	Pruina gelare potest.	25.40	Purgari omnia querunt.	28.30
Plysiæ spongiæ.	56.20	Pruina quid fit.	225.1	Purgans aluum radix.	122.10
Polium perpetuū floret.	96.30	Prunus.	45.40	Purganones.	175.40
Polium culices gignit.	29.40	Prun⁹ quales habeat radices.	35.30	Purganionis tempus.	181.40
Polium ad quæ utile.	127.20	Prunus q̄modo nascatur.	130.40	Putandi tempus.	186.20. & 188.1
Polij folia.	17.1	Prunus arbor.	51.10	Putatio locis aptanda.	187.10
Pollicaria.	96.10	Pruni flos.	20.30	Putatiōe quid querēdū est.	187.40
Polypodium.	171.30	Pruni succus.	111.40	Putationis utilitas.	121.10
Pomi perfici utilitas.	52.40	Pruni semen.	196.20	Putationis modus.	187.20
Poma punica quō feruent.	98.10	Pruni fatio.	26.20	Putationis intempestiuæ damna.	186.30
Poma cotonea qualem habeant odorem.	248.40	Ψευδα uitium morbus.	65.30	Putei altissimi.	52.10
Pomis locus quis sit aptus.	26.20	Pugio herba.	86.1. & 98.20	Pyrrhæus mons.	39.1
Pontus.	195.10	Pulicaria.	79.10	Pyrrheni propria suber arbor.	45.40
Pontus quid gignat.	54.30	Pulicariæ species.	80.1		
Pontica materies.	70.20	Pulices quibus innascatur.	92.40		
Pontici frumentū purū.	106.1	Pulpa prius quā semen gignitur.	150.1		
Pontici triticum.	104.10. & 203.30	Pulpa propter homines.	148.1		
Populus.	44.1	Pulpæ tempus.	148.1		
Populus uertit folia.	16.30	Pulparum concoctio.	143.30		
Populus quomodo feratur.	30.10	Pulueris utilitas.	28.40. & 165.1		
Populus auctu facilis.	35.10	Pulueris excitatio.	189.10		
Populus alba reuixit.	68.1	Puluis q̄modo possit alere.	189.20		
Populus nigra.	24.1	Puluis calidus.	210.10		
Populum quidam sterile putant.	32.30.	Pumicis uis mira.	125.30		
		Punica infirma.	165.30		
		Punica multa sustinet.	228.40		
		Punica quibus gaudeat.	24.10		

Q  
 Vercus. 56.1. & 166.10  
 Quercus in agro Thurio.  
 16.10  
 Quercus q̄ loco erecta fiat. 161.40  
 Quercus aliquando producit fructum.  
 171.30  
 Quercus apta ad carinas. 75.10  
 Quercus quando germinet. 33.30  
 Quinquæfoliæ radix. 122.1  
 Quinquæpetæ radix. 122.1



# I N D E X.

<b>R</b>	<b>Adicatio.</b>	65.10	<b>Radices suauiores.</b>	90.40.	<b>tur.</b>	217.40.
	<b>Radicio qñ fiat.</b>	177.10	<b>Radibus aliquādo nocet aqua.</b>	227.40	<b>Rapæ per hyemem seruandæ ra-</b>	89.10
	<b>Radicio quid fit.</b>	65.20	<b>Radices quomodo germinent.</b>	139.10	<b>tio.</b>	87.10
	<b>Radicias succus purus &amp; translu-</b>	112.30	<b>Radices supremæ amputandæ.</b>	182.20	<b>Rapa gaudet frigore.</b>	91.1
	<b>cidus.</b>	117.20	<b>Radices ubi crescāt feliciter.</b>	156.1	<b>Raparum radix.</b>	12.40. & 95.30
	<b>Radiciidum.</b>	89.10	<b>Radices rigatæ meliores.</b>	159.1	<b>Raphanus quomodo germinet.</b>	216.40
	<b>Radix faciens insaniam.</b>	234.20	<b>Radices in arboribus.</b>	168.20	<b>Raphanorū radix.</b>	12.40. & 89.30
	<b>Radix quo amplior, hoc commo-</b>	182.30	<b>Radices quædam quare tam bene</b>	243.1	<b>Raphani quomodo dulces fi-</b>	91.1
	<b>dior.</b>	89.30	<b>oleant.</b>	243.1	<b>ant.</b>	90.40
	<b>Radix uniuersipium.</b>	101.30	<b>Radices uentres sunt plantarum.</b>	243.10	<b>Raphani radix quomodo ma-</b>	216.30
	<b>Radix syluestris breuior.</b>	168.20	<b>Radices cautè putandæ.</b>	182.30	<b>gnā fiat.</b>	216.30
	<b>Radix quando fiat.</b>	89.1	<b>Radices dulces quædam necant.</b>	234.30	<b>Raphani radix non est durabilis.</b>	131.20
	<b>Radix plura habet genera.</b>	201.30	<b>Radices caudicem non attingen-</b>	14.20	<b>Rapo semen in filiqua est.</b>	90.10
	<b>Radix immutar plantas.</b>	82.30	<b>tes.</b>	14.20	<b>Recticortex.</b>	37.10
	<b>Radix quomodo seruetur.</b>	120.1	<b>Radices cibo idoneæ.</b>	95.40. &	<b>Regiones quo ad fructum diffe-</b>	29.20
	<b>Radix frumentorum.</b>	133.1	<b>244.1. &amp; 246.20</b>		<b>runt.</b>	205.1
	<b>Radix cardui cibi loco esse potest</b>	13.30	<b>Radicum altitudinis modus &amp;</b>	14.1	<b>Regionum discrimina.</b>	112.20
	<b>82.30</b>	72.10	<b>causa.</b>	14.1	<b>Refina quomodo parāda.</b>	244.40
	<b>Radix herculanæ.</b>	90.10	<b>Radicum uires.</b>	117.10. & 247.1	<b>Refina quæ optima est.</b>	112.40
	<b>Radix morifera.</b>	13.20	<b>Radices plus nocent quàm um-</b>	184.20	<b>Rhamnus.</b>	137.30
	<b>Radix uingj cibo idania.</b>	7.20	<b>bra.</b>	184.20	<b>Rhamnorum species.</b>	46.40
	<b>Radix thuij ad preciosa opera cō-</b>	90.10	<b>Radices prius quàm partes super</b>	14.1	<b>Rhodus quid ferat.</b>	54.40
	<b>ficienda apta.</b>	135.20	<b>na auqescunt.</b>	14.1	<b>Rhodiorū infula Chalcia.</b>	102.30
	<b>Radix thuij crispæ.</b>	13.20	<b>Radices capitatorum.</b>	89.30	<b>Rhutrum.</b>	82.10
	<b>Radix in plantis cuius usus.</b>	13.20	<b>Radices uirides non olent sicut</b>	244.20	<b>Rhyndacica materies.</b>	70.20
	<b>Radicis semen.</b>	13.30	<b>ficæ.</b>	244.20	<b>Rigandi tempus.</b>	92.30
	<b>Radice fata facilius crescūt.</b>	228.20	<b>Radiciū differētiæ.</b>	92.20. & 97.20.	<b>Rigationis usus.</b>	182.30
	<b>Radices quomō ampliores red-</b>	121.40	<b>&amp; 121.30. &amp; 214.1</b>		<b>Robur quomodo duret.</b>	72.30
	<b>dantur.</b>	97.40	<b>Radices habent medullas.</b>	12.20	<b>Robur quādo cædi debeat.</b>	68.40
	<b>Radices qua ratione pereant.</b>	229.40	<b>Radice quæ plantæ careant.</b>	12.30	<b>Robur difficilis in opere.</b>	73.20
	<b>Radicum colores.</b>	180.30	<b>Radices quādo decreſcant.</b>	14.10	<b>Robur quid ferat.</b>	36.20
	<b>Radices medicæ.</b>	244.30	<b>Radices lactuosæ.</b>	117.10	<b>Robur facit bonos carbōes.</b>	77.1
	<b>Radice singulari quæ nitantur.</b>	121.40	<b>Radices partibus superioribus ra-</b>	12.10	<b>Robur culicem gignit.</b>	66.20
	<b>229.40</b>	101.30	<b>riores.</b>	12.10	<b>Robur squamoia.</b>	34.10
	<b>Radicum breuitas &amp; longitudo.</b>	131.20	<b>Radices quæ durabiles, &amp; quæ</b>	122.20	<b>Robur difficiliter moritur.</b>	67.20
	<b>180.30</b>	177.30	<b>non.</b>	122.20	<b>Roboris genera.</b>	37.10
	<b>Radicularum sapor.</b>	173.10	<b>Radices etiam mutantur.</b>	64.20	<b>Roboris medulla.</b>	71.10
	<b>Radices dulces.</b>	87.10	<b>Radices olerum.</b>	12.30	<b>Roboris usus.</b>	37.30. & 75.40
	<b>Radices leguminum.</b>	92.40	<b>Radices carnosæ.</b>	12.30	<b>Roboris arboris ortus.</b>	23.1
	<b>Radice quæ proueniant.</b>	121.40	<b>Radices expetendæ.</b>	54.30	<b>Roboris cortex.</b>	9.10
	<b>Radices altæ altum producunt</b>	101.30	<b>Radibus pulices pereunt.</b>	93.1	<b>Roboris grauitatis causa.</b>	11.40
	<b>germen.</b>	131.20	<b>Radicum succus.</b>	14.10	<b>Rorationis causa.</b>	221.20
	<b>Radices à papilionibus eruo uen-</b>	177.30	<b>Radices odoratæ.</b>	14.10	<b>Roris marini genera.</b>	120.30
	<b>dicanur.</b>	87.10	<b>Rami in se habent principia uita-</b>	140.20	<b>Roris marini natura.</b>	119.1
	<b>Radicule satio.</b>	220.20	<b>lia.</b>	140.20	<b>Rosā salugine agrotat.</b>	241.30
	<b>Radicibus quæ bestiolæ innascan-</b>	58.10	<b>Rami in plantis.</b>	7.30	<b>Rosā adurere prodeit.</b>	191.1
	<b>tur.</b>	182.10	<b>Ramis arbores fieri.</b>	22.20	<b>Rosā quomodo prueniat.</b>	22.40
	<b>Radicis morbus.</b>	12.10	<b>Ramorum ordines.</b>	7.10	<b>Rosæ odoratæ ubi nascant.</b>	84.20
	<b>Radices papyri.</b>	177.30	<b>Rapa quando fata semen ocys</b>	88.10	<b>Rosæ semen.</b>	84.20
	<b>Radicibus uulneratis arbores æ-</b>	10. & 181.20. & 217.40	<b>reddat.</b>	131.20	<b>Rosā qua ratione ferenda.</b>	84.20
	<b>grefiunt.</b>	89.30	<b>Rapa non potest durare.</b>	93.30	<b>Rosā qmodo florē melius profe-</b>	84.30
	<b>Radicibus distant plantæ.</b>	221.10	<b>Rapa syluestris.</b>	91.1	<b>rat.</b>	84.30
	<b>Radices quomodo augeantur.</b>	221.10	<b>Rapæ genera.</b>	91.1	<b>Rosā sæpius transferēda</b>	84.30
	<b>10. &amp; 181.20. &amp; 217.40</b>		<b>Rapa quo pacto ampla efficia-</b>		<b>Rosæ syluestres.</b>	84.30

# I N D E X.

- Rosarum differentiæ. 84.10  
 Rosæ cõseruât suû odorẽ. 249.10  
 Rosæ odor. 243.1. & 255.1  
 Rosæ ætas. 86.20  
 Rosæ autumnõ erumpũt. 142.1  
 Rotunda ligna. 74.10  
 Rubeia. 79.10  
 Rubia qualis. 122.1  
 Rubiæ radix. 95.30. & 121.40  
 Rubigo. 109.30  
 Rubiginem quæ fruges maxime  
 fennant. 109.30  
 Rubus in aquis. 63.20  
 Rubus semper uiret. 16.1  
 Rubi genera. 47.10  
 Rubi fructus. 146.40  
 Rumex. 94.10. & 175.20  
 Rumex syluestris. 93.20  
 Rumicis sementis. 87.10  
 Rumicis qualis radix. 89.10  
 Runcatio adhibenda. 192.10  
 Rus à rure differt. 110.20  
 Ruta quomodo nascatur. 88.20  
 Ruta non quærit simũ. 92.20  
 Rutæ cinis additur. 189.20  
 Ruta semper uiret. 16.  
 Rutæ odor. 288.21  
 Rutæ fatus. 88.30  
 Ruta falsa aqua recte rigat. 158.20  
 Ruta quomodo oritur. 130.30  
 Ruta in fico melior reddit. 2180  
 Ruta qua ratione curetur. 191.1  
 Ruta utuntur uiperæ comesto al-  
 lio 234.40
- S
- Saba quid ferat. 114.20  
 Sabai in se iuste uiuunt. 114.  
 Sagittaria harundo. 62.30 (40)  
 Sal quid faciat. 242.10  
 Sal palmis prodest. 158.20. & 189.  
 Salis usus apud Babylonios. (20)  
 non stercoreis. 189.40  
 Salix 43.30. & 64.10  
 Salix tolerat securim. 67.40  
 Salix lenta. 71.30  
 Salix ficca leuis. 11.30  
 Salix palustris. 10.30  
 Salix in Philippiis. 67.40. & 215.30  
 Salix frugiperda. 30.20. & 61.40  
 Salix quid possulet. 30.10  
 Salix frugifera. 30.20  
 Salix facile pullular. 129.40  
 Salicis usus. 76.1  
 Salicornix roboris genus. 37.10  
 Salisilago quibus cõducatur. 158.30  
 Salisilago punilis est ciceri. 241.30  
 Salsugo qui ueniat in plâtas. 241.  
 30  
 Salsugo quãdo acris agar. 242.10
- Salsugine quomodo utantur. 189.30  
 Salsugo quid faciat. 202.30  
 Salsus sapor. 231.30. & 234.30  
 Salsus sapor solus non est in plan-  
 tis. 241.1  
 Salsum nõ potest generare. 241.10  
 Saluia. 79.10  
 Sambucus. 71.20. & 43.20  
 Sambucus facile crescit. 129.40  
 Sambucus quãdo germinet. 33.30  
 Sambuci uita. 64.10  
 Sambuci fructus. 43.30  
 Samothraciæ cepæ. 91.30  
 Sampsuci odor. 248.40  
 Sanguine fistens. 364.0. & 123.10  
 Sanficũ. 78.30. & 85.30. & 86.10.  
 Sapor quid sit. 231.10 (& 116.40)  
 Saporis generandi duplex ratio. 237.10  
 Sapor dulcis accomodatissimus. 235.30  
 Saporis ratio in qua re ueretur. 250.10  
 Saporis sedes in plâtis uaria 242.40  
 Saporũ et odorũ cõmunio. 240.10  
 Saporum species plures sunt. 233.  
 30. & 240.20  
 Sapores gelu peiores fiunt. 252.1  
 Saporum mutationes. 238.10  
 Saporẽ calor operatur. 237.40  
 Saporis melioris quæ sint. 236.10  
 Saporib⁹ immodicus calor officit  
 Sapor nõ omnib⁹ idẽ. 232.10 (252.1  
 Saporem permissione fieri. 235.1  
 Sapores humorum. 233.20  
 Saporũ materia humor. 237.30  
 Saporũ genera. 231.20. & 233.40  
 Saporum generatio. 236.30  
 Saporum differentiæ. 95.40  
 Sarculatio quibus proficit. 28.40  
 Sari. 58.10  
 Saria unde. 58.20  
 Sarmenis luxuriantib⁹ uires quã  
 Sarritio. 208.10 (do colẽdæ. 188.20  
 Sarritio adhibenda. 192.10  
 Saranea mespili genus. 42.1  
 Satio uerna melior. 177.10  
 Sationes tempestiuæ. 105.30  
 Sationis tempora. 185.40  
 Satio fera & matura. 101.1  
 Satureia. 79.10. & 175.20  
 Satureiæ semẽ melius uetus. 88.1  
 Satureia difficile germinat. 198.10  
 Satureiæ semen. 79.30. & 93.10  
 Satureiæ tempus ferendũ. 87.20  
 Scabies ficorum. 65.20  
 Scabies qua re tollatur. 118.40  
 Scabies fico accidit. 220.1  
 Scabiei causa. 65.20
- Scabiei in plâtis generatio. 221.20  
 Scalia. 85.1  
 Scammonia. 54.30  
 Scammoniæ humor in radice. 112.1  
 Scammoniæ radix. 118.20  
 Scammoniæ usus. 128.10  
 Scandix. 94.30  
 Scilla. 97.20  
 Scilla cur diu duret. 131.20  
 Scilla suspẽsa germen emittit. 215.  
 Scillẽ inserta meliora fiũt. 218.1 (10)  
 Scillæ uiuacitas. 98.10  
 Scillæ quicquid adferitur felicius  
 Scillæ foliũ. 97.40 (crescit. 26.10  
 Scillẽ flos. 58.20  
 Scillẽ usus. 98.10. & 179.1  
 Scillæ radix. 13.1. & 92.10. et 745.  
 Sciffima. 39.20 (10)  
 Sciffima arbor. 4.30  
 Sciffima quales radices habeat. 35.40  
 Sciffimẽ cõdendẽ tempus. 68.40  
 Sciffima ad quæ instrumenta apta.  
 Sciffima humida. 75.1 (75.40  
 Sciffimẽ usus. 75.10  
 Sciffima in aqua durat. 72.30  
 Scolopendrẽ qua herba gaudeat.  
 Scorpiorum radix. 126.1 (97.30  
 Scorpionis ictu utilis radix. 122.10  
 Scorpionũ ictu serpẽtes moriũt.  
 Scrobes quod faciendũ. 25.40 (103.10  
 Scrobes uinum. 186.1  
 Scrobes aq̃ debẽt impleri. 179.20  
 Scrobibus quid inijciendũ. 179.20  
 Scrobes quãdo fieri oporteat. 177  
 Scrobes nõ statim replẽt. 177.40 (40  
 Scytaliũ cucumeris genus. 91.20  
 Scythæ sitim diu tolerat. 121.30  
 Seago. 158.30  
 Selenusium triticum. 192.40  
 Semẽ exhaustit terram. 109.10  
 Semen læsum. 199.20  
 Semen anniculum optimũ. 110.30  
 Semen uim habet & agendi & pa-  
 tiendi. 196.30  
 Semẽ quãdiu durare possit. 93.10  
 Semen uariẽ cõnnetur. 103.20  
 Semen quod sit prẽstatiũs. 198.20  
 Semẽ seruẽfactũ sterile redditur.  
 Semine quẽ nascãt. 129.10 (111.1  
 Semẽ unde accipiendũ. 178.30  
 Semen quod uertendũ sit. 178.30  
 Semen primum eit. 129.10  
 Seminis causã. 143.40  
 Semẽ arborũ quarũdã. 152.40  
 Semen quando terrẽ committen-  
 dum sit. 176.30  
 Semẽ quali solo committendũ. 194.30

# I N D E X.

- Semē mutatur in auenā. 199.10  
Semē q̄modo in arboribus pullu  
let. 121.40  
Semē in quali solo feliciter erūpat  
192.10  
Seminis ubi plus, ubi minus iaci-  
endum. 105.40  
Semen rapæ quale bonum, qua-  
leq̄ malum sit. 91.1  
Semen post pulpam crescit. 150.1  
Seminis genitali accommodata.  
126.20  
Semen animalii. 134.40. & 164.10  
Seminis mutatio. 167.20. & 195.  
40. & 200.1  
Seminis rectitudo qd̄ faciat. 178.20  
Semen annuum quando mute-  
tur. 136.20  
Seminis q̄modo mutetur. 167.20.  
& 207.10  
Semen in omnibus. 18.10  
Seminis quibus includantur. 18.  
Seminis uaria. 18.20 (20)  
Semen quibusdam occultū. 30.30  
Seminis omnia in se alimentū con-  
tinent. 134.30  
Seminis non pariter perfici. 205.20  
Seminis in terra diu iacētis. 200.40  
Seminis unde petenda. 178.10  
Seminis peregrina quomodo tran-  
seant ad uernacula. 108.1  
Seminis quo tempore meliora.  
200.20  
Seminis optima eligenda. 195.20  
Seminis ætatis ratio habenda.  
90.20  
Seminis melle macerata. 218.10  
Seminis differentia. 90.1. & 98.1  
Seminis deponi debent. 92.40  
Seminis preparari debent. 90.30  
Seminis quæ firmiora. 93.10  
Seminis ætas. 87.40  
Seminis idonea. 193.30  
Seminis magnitudo. 166.30  
Seminis alimentum. 144.20. &  
200.30  
Seminis mutantur cultura. 26.10  
Seminis diuersitas. 203.30  
Seminis quæ diutissime maneant.  
230.40  
Seminis quæ coctiliora euadant.  
218.10  
Seminis arborū q̄modo feruntur.  
Seminis uires. 196.10 (30.40)  
Seminis crassantur. 208.10  
Seminis olerum nullas bestiolas  
creant. 210.1  
Seminis concoctio. 143.30  
Seminis nullus terminus. 148.1
- Seminis corruptiones. 230.20  
Seminis diu durantis. 230.20  
Seminis q̄ pacto aduehatur. 132.30  
Seminis quæ ratione à natura mu-  
nita sint. 135.1  
Seminis uitia. 109.30  
Seminis quædam firma. 205.30  
Seminis etiam infirma durare pos-  
sunt. 172.10  
Seminis infirmitas. 136.10  
Seminis morbi. 193.40  
Seminis quæ durent, quæ non.  
134.30  
Seminis uitium qualia esse oportet.  
185.30  
Seminis sata difficilius germinant.  
Sementes hortensium. 87.10 (135.30)  
Sementis pessima. 194.30  
Semperuiui natura. 99.30  
Semperuiuæ folia. 17.1  
Senecio diu floret. 94.30  
Senecio. 94.1  
Senectæ cōmunis corruptio. 25.20  
Senectæ causæ. 8.30  
Septentrionalis plantæ. 54.30  
Septentrionalis pars montium præ-  
stantiores arbores habet. 49.20  
Serere quando conueniat. 194.30  
Serere quæ conueniat solstitiis.  
194.30  
Serēdi tempus. 100.20. & 191.40  
Serendo locorum differentia ob-  
seruanda. 177.30  
Serotina lente pariunt. 195.30  
Serpentium ictus curans. 121.40  
Serpentium morui utilis aurelia.  
Serpentes minuti. 54.10 (177.30)  
Serpentes ictu scorpionum inte-  
reunt. 203.10  
Serpillū. 78.30. & 131.30. & 173.10  
Serpillum purgandum. 191.1  
Serpilli tota natura odorata. 84.1  
Serpilli flores. 243.1  
Serpillum ex ocimo. 218.30  
Serpilli odor. 249.10. & 256.10  
Serpillū an habeat semen. 85.10  
Serpillo quæ loca sciant. 85.20  
Serrulæ campanæ odor. 248.30  
Sesamum. 100.10. & 197.20  
Sesamum quomodo discernatur.  
103.10  
Sesamum quor diebus maturum  
fiat. 102.20  
Sesama. 246.30  
Sesama terram exhaurit. 109.40  
Sesama optime reponitur. 209.20  
Sesamæ satio. 209.20  
Sesamam uiridem nullam ani-  
mal mandit. 107.1
- Sesamæ caulis. 103.10  
Sesamæ genus candidum. 105.10  
Seseli. 123.20  
Seranica cepæ. 91.30  
Sicilia frumenti perferilis. 106.20  
Siciliæ pars fecunda. 102.20  
Sicilia recusat nimum cultū. 106.1  
Siccitas odores parit. 232.10  
Siccitas quid faciat. 246.10  
Siccum solum. 157.20  
Sicula beta. 91.10  
Siculum frumentum ualidum.  
203.30  
Siculum triticum. 104.10  
Siculum frumentum purū. 105.1  
Sida. 60.20  
Silago ab radice tantum foliata.  
95.1  
Siligo. 109.10  
Siligo multis tunicis includitur.  
103.40  
Siliqua. 30.1. & 103.10  
Siliqua quomodo fructum ferat.  
21.10  
Siliquam quæ gerant. 103.20  
Simulacra ex quibus fiant. 72.10  
Sinapi quando feratur. 87.10  
Sinapi habet durable semē. 93.10  
Sinapi quale semen. 90.10  
Sinapi quando erumpere soleat.  
87.20  
Sisymbrii odoris mentæ. 170.20  
Sisymbrii nepitis simile. 170.20  
Sisymbrii agreitis odor. 170.20  
Sisymbrium. 78.30. & 131.30  
Sisymbrio odor acrior est. 85.20  
Sisymbrio nocet cultus. 199.30  
Sisymbrium mutatur in mentam  
25.1. & 170.1. & 218.20  
Sisymbrii partes omnes odorata.  
84.1  
Sisymbrii flores. 243.1  
Sisyrinchio peculiare. 99.1  
Sisymbrium purgandum. 191.1  
Sitis quid faciat in arboribus. 220.1  
Sitim extinguens. 121.30  
Smerea. 79.10  
Smilax. 45.20. & 173.10  
Smilax quando maturat fructum  
146.30.  
Smilax edera est cilicia. 48.1  
Sol ex nube interimit triticum.  
106.40  
Sol etiam penetrat ad ea quæ sub  
terra sunt. 177.10  
Sol quid operetur. 241.20  
Sol omnia ficit. 251.30  
Solis calor uim habet gignendi.  
14.1

# I N D E X.

Solis delubrum.	114.40	Stelis.	171.1	Surculi ferendi qui optimi.	178.20
Solis potentia.	150.20	Stercus quale arboribus aptū fit.	179.10	Sus calidior.	151.20
Solaris.	94.30	Stercus quodlibet non conuenire cuiq; arbori.	183.30	Sues in ægypto ubi nascant.	63.20
Solaris herba semper floret.	90.1	Stercus ruminantium.	179.10	Syderatio.	65.10
& 96.30		Stercus quodlibet non conuenire cuiq; arbori.	183.30	Syderatio plantarum.	219.40
Solstitijs non ferendum.	194.30	Stercus aliquando nocere.	227.30	Syderum uis.	174.10
Solum murar plantas.	168.10	Stercus quod optimum fit.	92.20	Syluæ prouentus mirabilis.	31.30
Solum sæpe uerti debet.	192.10	Stercus uehementissimum.	190.1	Syluefres arbores quomodo fructificent.	31.20
Solum quando aptum sit accipere semen.	176.30	Stercoratio qbus proffit, quibusq; obfit.	107.40	Syluefria quæ natura fuit.	31.30
Solum quomodo aptum reddatur ad plantas.	177.30	Stercus uehemens.	183.20	Syluefria acrioris iucci.	93.20
Solum exile crebram agitationē exigit.	183.40	Stercus quid iuuat.	218.1	Syluefria magis montibus gaudent.	31.40
Solum aliud in æstate profcendendum, aliud in hyeme.	191.20	Stercus leuissimum.	183.30	Syluefria semper uiuentia.	32.20
Solum pluuiosum.	192.30	Stercus resistit frigori.	225.1	Syluefres arbores.	10.1. & 30.1
Solum nigrum.	157.40	Stercus qd efficiat in solo.	179.10	Syluefria cur odoratiore.	250.20
Solum ad odorē optimū.	169.40	Stercus quomodo addat.	183.20	Syluefria qmodo nascant.	132.40
Soli uarietas.	194.30	Stercoris plus quis ager possit.	183.40	Syluefria locis frigidis durant.	144.30
Soli differentia.	156.1	Stercoris suilli usus.	168.10	Syluefria qua remutentur.	190.1
Somnum faciens.	234.30	Stercorandi ratio.	179.10	Syluefres arbores quomodo floreat.	33.10
Sonchus.	95.10	Stercorata loca quantum præstet.	206.20	Syluefres plantæ.	31.30
Sorbum dulcius cultura reddit.	175.20	Stercoratio quomodo fieri debeat.	105.40	Syluefres arbores semina augēt.	144.10
Sorbo radix qualis.	35.40	Stercorare bonum est.	192.10	Syluefres plantæ longuæ.	63.40
Sorbi sapor.	161.10	Stercorationes.	175.40	Syluefria plura q urbana.	78.30
Sorborum genera.	42.10	Stercoratio quali solo commo- dior.	183.10	Syluefres plantæ quàm altè agāt radices.	35.30
Sorbum sterilecere in nonnullis locis.	24.10	Stercorandum quod solum copiosius fit.	191.30	Syluefres duriore urbanis.	72.20
Sphaceli folium.	79.40	Stercorandi tempus.	183.1	Syluefres arbores an morbis obnoxie.	65.1
Sphacellimus ubi fiat.	220.20	Sterilitas unde.	175.30	Syluefres cur prius germinent.	142.40
Sphondyla nullam radicem intra etam relinquit.	122.20	Sterilitatem asserens uinū.	127.10	Syluefrium in fructificando diuersitas.	164.1
Spica quando proueniat.	101.40	Stibæ folia.	17.1	Syri cuiusmodi aratri utantur.	106.1. & 192.10
Spicam quæ gerant.	103.20	Stimulus in lapide.	70.40	Syri qmodo colant plantas.	27.10
Spicæ positura.	193.30	Stræba.	79.1	Syriæ mons terebinthis plenus.	112.40
Spicationis causa.	149.10	Strangias triticum.	192.40	Syria pinum non fert.	114.10
Spina.	30.40	Stryax.	116.40	Syriæ odorata quæ.	116.30
Spina candida.	54.1. & 82.1	Suber.	71.40	Syria producit balsamum.	116.1
Spina ceanothos.	60.40	Suber ubi proueniat.	45.40	Syriæ plantæ.	54.20
Spina quando germinet.	172.40	Succatio quo pacto fiat.	117.30	Syria cedri gignit.	55.10. & 76.20
Spina quæ aquâ congelat.	125.40	Succi plantarum.	144.1	Syriaca herba.	171.20
Spina sitiens.	56.30	Succorum uarietas.	19.10. & 117.10	Syrinchij radix.	244.10
Spina regia.	137.10	Succus uinosus.	19.10		
Spina Indicæ succus.	111.40	Succus pinguis.	19.10		
Spina Aegyptia.	111.40	Succi odorati.	111.40		
Spina pro folijs quibus.	17.10	Succus dulcis.	19.10		
Spinarum lachrymæ.	244.40	Succorum cura.	244.30		
Spinæ ixinæ lachryma.	111.40	Succi colores.	111.30		
Spinaceorum fructus.	82.30	Suffrutices perpetuò uiuētes.	16.1		
Spinalis masticha.	83.1	Suffruticum differentia.	12.30		
Spodias quàm altas radices habeat.	35.30	Suffruticum pars maior semine radiceq; nascitur.	22.40		
Spongia ubi crescat.	55.40	Suffruticum genus.	191.1		
Squalor.	220.40	Suilli stercoreis usus.	183.1		
Stragritæ quomodo distinguant aceris species.	40.20	Suillum stercus.	168.10		
Strutæ quare fudent.	215.10	Suillus firmus.	28.40		
		Surculus quid fit.	7.30		

T

Abes arborum.	66.20
Tamaricis lignum.	73.20
Taxus gaudet umbrosis.	49.1
Taxus quando germinet.	33.30
Taxus tarde fert fructum.	340.1
Taxus qualis fit.	39.30
Taxi usus.	75.40
Tectis apta materies.	75.20
Teda ex radicibus pini.	237.1

# I N D E X.

Tedam habet pini radix.	113.10	bet.	55.1	Tofosum folium.	146.2
Telecthrii ferre medicamina.	123.10	Thracia.	195.1	Traductio de lingua in linguam	
Telecthrii locum esse rigui.	128.20	Thracia frigida.	224.40	quid postulet.	2.40
Tempora serendi.	185.40	Thracia quid ferat.	54.30. & 123.1	Transferendi ratio.	2.40
Temporis conditio.	133.20	Thracas quem locum inhabitant.	226.40	Transationis utilitas.	92.40
Temulentie medici brassica.	68.20	Thracium tritici.	104.10. & 193.1	Tribulus.	79.1. & 81.30. & 94.30
Terebinthum.	248.10	& 205.1		Tribuli semen.	79.1
Terebinthi usus.	76.1	Thraſas perinus radicem.	125.20	Tribuli species.	83.20
Terebinthus quomodo uratur.	114.1	Thraſas Mantinenſis quale uenenum inuenit.	124.30	Tribulus ubi nascatur.	59.40
Terebinthorum species.	44.30	Thraupalis gaudet umbrosis.	49.1	Tribulus iuxta folium aculei gerit.	83.10
Terebinthi lachryma.	244.40	Thraupalo quales radices.	35.30	Trimestria.	195.30
Terebinthus arbor.	115.10	Thua tarde fert fructum.	34.1	Trionum.	100.30
Terebinthus ubi nascatur.	53.30	Thua frigidis gaudet.	49.1	Triaui quomodo discernat.	103.10
Terebinthus ppetuo uiret.	15.40	Thuium.	72.1	Trionum amarum.	107.1
Terebinthi succus.	111.40	Thus ubi gignatur.	114.20	Trionisatio.	209.20
Terebinthi ubi ſequentes.	112.40	Thus quomodo ematur.	114.40	Trisaginis folia ad quod utilia.	118.40
Terebinthum in olea gigni.	171.30	Thuris arbores in quali terra nascantur.	115.1	Triticum.	100.10
Terebinthus quando germinet.	33.30	Thuris arbor quanta ſit.	114.20	Triticum optimè nascitur in Phocide.	108.10
Terebinthus spissa.	71.10	Thus.	54.20. & 244.40	Triticum quot diebus a flore matureſcat.	102.10
Terebratu quæ facilia.	74.40	Thuris arbores apud ſardes.	115.10	Tritici qualem terram poſcat.	109.1
Terebra ex quo arbore.	76.10	Thus qua ratione figuram accipiat.	115.20	Triticum quando erugine capiat.	195.40
Teredo qualis.	72.40	Thus quod melius ſit.	115.1	Triticum degenerat.	197.1
Teredinem quæ arbores ſentiant.	72.30	Thus incidi ſub cane.	112.20	Tritici radix.	12.30. & 100.30
Terra qua tritici conſeruatur.	110.40	Thuris arboris folium.	114.30	Tritici quomodo ſeruandū.	110.10
Terra quæ faciliſ ſit ad reddendum.	110.1	Thus quomodo legatur.	114.30	Triticum mutatum in Tiphā.	199.10
Terræ natura.	14.1	Thymi ſemen.	79.30. & 132.30.	Tritici immutato in hordeū.	24.1
Terræ genera.	156.20	Thymus ubi nascatur.	52.10	Tritico florēt aqua obefſe.	106.10
Terræ ſecunditas.	107.30	Thymi ſlos.	199.20	Triticum in Eubora.	104.20
Terra quo pacto in æſtate odorē concipiat.	252.10	Thymum.	175.20	Triticum uermem ſentit.	209.10
Terra terre miſcendum.	191.30	Thymum producit mare.	56.40	Tritici radicibus enaſciſ.	202.40
Terræ colores.	191.30	Tibialis harundo.	61.10	Triticum perit ex nimio ſtercore.	183.10
Terra aduſta.	233.10	Tilia diſcrimina.	40.1	Tritici magis infeſtatur erugine.	208.40
Terra cinerea.	233.10	Tilia ſlos.	40.10	Triticum trimeſtre.	192.40. & 203.1. & 204.30
Terra uertenda.	191.40	Tilia cortices.	42.40	Triticum Africū.	104.10. & 192.40
Terræ ſpecies.	157.30	Tilia quæ ex cauſa flexibilis ſit.	11.30	Triticum nudum.	196.20
Teſticuti uſus.	126.10	Tilia mollis.	71.20	Triticum qualis ager ferat.	193.10
Temalix.	82.10	Tilia facilis in opere.	73.20	Tritici genera.	104.10
Tenilis harundo.	61.10	Tilia ſerotina.	34.1	Tritici uſus ad coſciendum uinū.	242.20
Thalia.	211.30	Tilia qualis ſit.	74.30	Tritici quomodo percat.	108.10
Thaſia quomodo ſecāda.	117.40	Tilia qualem locum optet.	155.1	Tritici palea.	203.20
Thaſia ſuccus.	117.30	Tilia uertit ſua folia.	173.40	Tritici ſpecies.	204.20
Thaſia radix.	128.1	Tilia cædendi aptū tempus.	68.40	Tritico quod ſolum aptū.	105.30. & 192.30 & 40
Thaſia natura.	119.1	Tilia calida.	152.1	Tritici quomodo putreſcat.	210.1
Thaſia fructus.	118.20	Tilia uſus.	75.40	Tritici ſatio anceps.	204.20
Thaſi quid obſeruent cum agros conducunt.	105.10	Tilia fructus.	19.40	Triticum quando ſeratur.	100.20. & 201.10
Thaſi inoculāt amygdalas.	136.10	Tilia qua ratione tractāda.	190.40	Tritici quod hyeme ſerit.	204.30
Thebanus ager ſpinā habet.	51.1	Tilia ubi uix nascatur.	52.30	Tritici inſpidum primo.	237.10
Thelyphonum.	126.1	Tiphā.	60.10. & 100.10. & 103.40. & 199.1. & 118.10	Triticum in lolium.	25.1
Theſei radix aluum purgat.	97.30	Tiphā quali terra nascatur.	109.10	Tritici durabile.	197.30. & 210.10
Theſſalia quomodo frigore laborat.	224.20	Tiphā radix.	12.30		
Theſſalo Piſiſtrati filio quid acciderit.	24.40	Tiphā apta in aliud genus trāfire.	108.10		
Thmolus plurimam nucem habet.		Tiphā in triticum.	25.1		
		Tiphyum.	137.10		

# INDEX.

Triticum quādo erumpat. 100.30  
 Trinco sapiata multa animalia in-  
 tereunt. 203.10  
 Triticum ponticum. 104.10  
 Triticum quibus differat ab hor-  
 deo. 103.40  
 Triticum quando metatur. 110.20  
 Triticum ubi melius seratur. 106.1  
 Triticū statibus qñ pereat. 109.40  
 Triticum ex tithia. 199.40  
 Triticum mutatur in lolii. 106.30.  
 & 170.1. & 199.40  
 Tuber an radix. 13.20  
 Tuberis terræ radix & fructus.  
 113.20  
 Turdaria qmodo floreat. 96.20  
 Tussis remedia. 125.40  
 Tussis sicca remedium. 121.30  
 Tussis paliuri fructu curat. 46.40  
 Tylus insula Arabici sinus. 57.30  
 Tylus insula rubri maris. 158.40  
 Tyli Arabiæ materies. 73.10

V

Allatoria harundo. 61.10  
 Vela ex libro papyri. 58.20  
 Venæ in plantis. 82.10. & 9.1  
 Venena multa in montibus na-  
 scuntur. 247.20  
 Venena paulatim interficientia.  
 124.30  
 Venenum inferens mortem sine  
 dolore. 124.30  
 Venena debiliora usu longo fiit.  
 125.1  
 Venenosa plantæ. 246.40  
 Veneri accommoda herba. 126.40  
 Venti ad fructum multū momen-  
 ti habent. 29.20  
 Venti frigidi. 159.10  
 Venti marini meliores terrenis.  
 154.30  
 Venti occidui meliores exortiuus.  
 154.30  
 Venti frigidi quando adurant.  
 154.30. & 223.30  
 Venti ratio habenda. 186.40  
 Venti quibus, quandoq; obsint.  
 109.40  
 Venti qd faciāt ad fructus. 107.30  
 Ventorum proprietates quæ sunt.  
 224.30  
 Venerē iuuas medicamen. 126.10  
 Ver quale tēpus sit. 141.1. & 176.30  
 Veratrum. 54.30  
 Veratrum incendit. 118.1  
 Vere altē pascinandum. 186.10  
 Vere satio melior. 177.10  
 Vere arbores rectē serunt. 176.30

Vergilijs orientib<sup>9</sup> seredū. 194.30  
 Veri quercus. 38.1  
 Vermes gignunt omnes arbores.  
 65.10  
 Vermes in frumentis. 209.20  
 Vermes quomodo frugibus inna-  
 scantur. 194.1  
 Vermes fructū adimūt oleq. 66.10  
 Vermis in albuco. 98.1  
 Vermib. obnoxie arbores. 42.20  
 Vermes in quo ligno. 72.40  
 Vermes necans remedium. 121.1.  
 & 126.30  
 Vermes consumūt triticū. 109.40  
 Vermiculi qmodo nascant. 110.1  
 Vermes qua occasione fiāt. 220.1  
 Vermiculatio plantarum. 219.40  
 Vermiculatio arborū morb. 65.10  
 Vermiculorum discrimen. 222.20  
 Vermiculi qui caudicem inscri-  
 bant. 69.1  
 Vermiculationē qui fructus sen-  
 tiant. 66.10  
 Vernilago. 82.10. & 40  
 Vernilago nigra durat diu. 122.10  
 Vernilaginum genera. 121.1  
 Verna putatio. 186.20  
 Verni temporis dies. 177.10  
 Verni flores. 86.1  
 Vernilaginum radix occidit ca-  
 nes. 121.10  
 Vessicaria. 94.10. & 99.40  
 Vessicaria alienat mentem. 127.10  
 Vessicariæ species. 120.10  
 Vessicariæ genus. 123.20  
 Vinaceum unde gignitur. 215.40  
 Vineta quo pacto ponēda. 186.10  
 Vingum an sit radix. 13.20  
 Vingi radix cibo idonea. 13.30  
 Vini odor in uetustate melior.  
 249.1  
 Vinum attrahit odores. 173.30. &  
 255.20  
 Vinum certis saporibus immuta-  
 tur. 238.20  
 Vinū qmodo corrumpat. 258.40  
 Vinū ex hordeo quomodo fiat.  
 242.40  
 Vinum urinam mouens. 119.20  
 Vinum morale. 250.40  
 Vina mōtana odoratiora. 250.40  
 Vini mira natura. 127.1  
 Vinū quodnā odoratius sit. 250.30  
 Vinaceū quo pacto dures. 148.10  
 Vinosus sapor. 234.1  
 Vinosi saporis mutatio. 236.30  
 Vinosa dulcedo. 236.30  
 Viola. 84.1  
 Viola candida. 256.10

Viola alba. 99.1  
 Viola nigra. 142.10  
 Violarum differentia. 84.30  
 Violæ nigra odor. 255.1  
 Viola alba prima se ostēdit. 85.40  
 Viola celeriter euanesct. 249.10  
 Viola alba quomodo foliata. 95.1  
 Viola semine exir. 85.1  
 Violæ remotæ odoratiores. 251.20  
 Violæ odor. 243.1  
 Viola nigra perpetuō floret. 84.1  
 Violæ albæ differētiā habet. 84.10  
 Vipera quomodo pareat. 99.20  
 Vipera quomodo remediū quæ-  
 rant. 254.40  
 Vipera cibo sunt ceruis. 203.10  
 Viridia quædā nihil olent. 248.30  
 Viridia quædam mandi possunt.  
 sed non semper. 246.10  
 Virentia ficca. 32.20  
 Viscum habet ilex. 45.20  
 Viscum ubi crescat. 171.1  
 Visci differentia. 171.10  
 Viscum arbores necat. 228.10  
 Viscum ē robore. 36.40  
 Viscum non nisi aliena in arbore  
 nasci. 172.10  
 Viscū quale alimentū exigat. 172.1  
 Vitæ brevis sunt quæ large fructi-  
 fiant. 222.40  
 Vitæ longitudo arborum. 164.30  
 Vitæ brevis est animal fecundū.  
 165.10  
 Vitis ad maturitatem frigiditatē  
 cupit. 161.1  
 Vitis præcipue postulat ablaquea-  
 tionem. 182.20  
 Vitis syluestris radix. 127.40  
 Vitis lachryma. 112.10  
 Vites quare terra operiēde. 223.40  
 Vites necessariō putandæ. 181.10  
 Vites refecandæ. 186.20  
 Vites quomodo celerius feneſcāt.  
 188.30  
 Vites nouellas quatenus refecare  
 oporteat. 188.30  
 Vires in sicco solo quando pu-  
 tandæ. 188.1  
 Vires in humido quādo putandæ.  
 183.1  
 Vinbus q tēpore simus dei. 183.30  
 Vitiū oculi excācantur lachryma.  
 188.10  
 Vitium distractio. 189.10  
 Vitibus quæloca cōueniant. 26.20.  
 & 156.30. & 157.1. & 180.1  
 Vitium falcatio. 187.1  
 Vitis nouella dimutatione perit.  
 229.40

# I N D E X.

Viris tolerare potest plagā. 228.40	Viris oculorum obrusio unde accidat. 221.30	Vlcerum medicamentum. 120.40
Viris cur ferotina. 146.1	Vires quoniam breuioris uitę sint. 64.1	Vlceribus capitis aptum remedium. 121.40
Viris syluestris quā durabilis. 122.10	Vitium propagines. 221.10	Vlginosa quę sint. 170.1
Viris materies. 229.10	Vitis maturitas. 204.30	Vlmus quid flagitet. 30.10
Vires diligentiam postulat. 187.10	Vitis flos. 20.20	Vlmus ualida. 75.1
Vins odore lauri offendit. 173.30	Vitis morbi. 65.10	Vlmus non facile perit. 228.30
Vins in gelidis locis sapore non caret. 239.40	Vites nimio & frigore & calore laborant. 65.30	Vlmus auctu facilis. 35.10
Viris quomodo feratur. 26.10. & 178.40. & 186.1	Vins lauro & brassica offenditur. 68.10	Vlmus humida. 71.30
Viris quomodo excelsa fiat. 15.30	Vitiū depampinatio quid faciat. 221.10	Vlmus quando cadatur. 68.40
Viris an gaudeat puluere iam maturocente uua. 29.1	Vitis quomodo tractetur. 190.40	Vlmus frugifera. 30.20
Viris cortex. 11.20	Vitibus quid eueniat. 194.10	Vlmus uertit folia. 16.30. & 173.40
Viris fructum quando conficiat. 145.30	Vitis quomodo inferatur. 134.10	Vlmi usus. 75.40
Vins humida fumosa. 77.30	Viti cortex detrahitur. 67.10	Vlmus quid ferat. 36.20
Viris quomodo putanda. 28.30. & 176.1. & 187.10	Vitium cortex. 9.10	Vlmi humor. 111.40
Vins non bene ferit semine. 136.1	Vitis multū penit alimenti. 156.30	Vlmi genera. 43.40
Vins florens non uult imbrē. 66.1	Vitis aliquando tulit fructum sine folijs. 214.30	Vmbras quę plantę amēt. 180.30
Vins quare hirculetur. 65.30	Vites quo pacto crescant. 212.40	Vmbra nō tantum uocū. 184.20
Viris auctu facilis. 135.40	Vites desiderant pratenie solum. 185.20	Vnguentis apta. 116.40
Viris ex nouellis suum producit fructum. 21.1	Vitibus conueniens solum tribuendum. 150.1. & 185.20	Volucrum. 117.40. & 173.10
Vitem bene putatam quid conseruat. 187.1	Vitiū semina unde petēda. 185.30	Volucres quędam mutātur. 25.20
Vitium uulnera. 65.30	Vites quando colendę. 188.20	Volucris semen. 126.20
Viris quomodo pullulare queat. 129.40	Vins canthara. 169.20	Vpupa mutatur. 25.20
Viti quid proprium sit. 149.40	Vitis quando crescat. 188.40	Vrbana arbores. 10.1
Viti accidit roratio. 221.1	Vitis quandiu germinat. 189.1	Vrbana arbores morbose. 65.10
Vites recte conferere magni refert. 185.1	Vitium quo pacto fructus augeatur. 189.1	Vrbana cur minus odora. 250.20
Vites nigra solidiores. 185.10	Vitis seipsum nō sustentat. 173.10	Vrbanis breuior uita quā syluestribus. 63.40
Viris soluta quomodo cognoscenda. 185.10	Vitis clauicula. 173.20	Vrbana syluestribus melius inseri. 134.20
Vins semen. 196.20	Viti molesta olea. 184.30	Vrbana planra. 31.30
Viti etiam inferiores imbres tempestiui. 154.10	Viti ficus molesta. 184.30	Vrbanoꝝ odor. 256.1
Viris ferenda tempus. 185.40	Vitis densa quę sit. 185.10	Vrbanoꝝ quid uocet. 10.20
Vitis amar aquam. 28.20	Vins quę plus petit alimēti. 185.10	Vrbanoꝝ omnia rēperatiora. 10.30
Vitium genera. 26.30. & 185.1. & 205.10	Vitis alimentī copia sterilescit. 147.1	Vredo arborum. 66.20
Vires fructifera. 72.20	Viti quā ob causam offiat gelu. 224.30	Vrica quomodo nascantur. 110.1
Viris Ida. 46.30	Vitium morbus articulario. 22.1	Vricarum infestatio. 109.30
Vitium germina. 246.10	Vires cito senescunt. 164.40	Vrina. 190.1
Vites quomodo colendę. 64.30	Vins marina. 16.20	Vritica. 94.10
Vites quomodo restaurandę. 64.40	Vites quomodo tractandę quę materia luxuriant. 187.40	Vua siue uinacea. 211.10. & 215.40
Vitis articulatio ūde ueniat. 221.20	Vins incrementum. 164.20	Vua. 161.20
Vitibus quibus auxiliatur. 168.20	Vires quomodo non probē possint germinare. 153.40	Vuarū summa detrahūtur. 169.20
Vins qua ratione formāda. 186.30	Vitiſora. 86.1	Vua a medulla creatur. 187.30
Viris lenta. 71.30	Vinneum uallum. 211.30	Vuaſapor. 236.30
Vitium radices. 12.10	Vitiligo quomodo tollat. 118.40	Vuas sine uinaceis nasci molitur. 150.10
Viris fumida. 213.30	Vitiliginis remedium. 121.10	Vuarum morbus. 221.30
Vitium quarundam florē nullus sequitur fructus. 20.40	Viuiradices. 178.30	Vua uerſicolores. 213.40
Vins in flore quid patiantur. 221.30	Viuiradices quę potius ferendę. 185.30	Vulnerum remedia. 118.40
		Vultures ab unguentis perimuntur. 235.1

## Z

**Z** Ea ualida est. 200.40  
**Z** ethum quem potum uocent. 242.40

## F I N I S.

# THEODORI GRAECI THESSALONI

CENSIS, AD NICOLAVM QVINTVM PON

TIFICEM MAXIMVM.



VÀ M magna exultare lætitia possint homines nostræ ætatis, pater sanctissime, non absens nūc, ut tempore elapso, relatum accipio: sed iam annum apud te manens, rerum ipsarum experimento planè intelligo. Quod enim solum uetus illa & laudata Platonis sententiâ remedio urbibus futurū permultis ac uarijs detrimentis laborantibus asserit, nostris his temporibus certe uideo contigisse. Quod enim tu, qui summus philosophus semper fuiti, summus princeps creatus es, præclare actū iam est, quod uir doctissimus ille futurum affirmat, cum aut philosophus regnare, aut rex philosophari inceperit. Quippe nunc arma, quæ per Italiam, Europamq; toram sæuiebant, penitus conquiescunt, & Mars furens ille uinculis tuæ coërcetur prudentiæ: omneisq; inter se gentes reconciliatæ, pace tranquillissima ex tua opera, tuisq; consilijs perfiruntur: & clarissima quietis munera, id est, studia literarum, quæ diuturna bella erispuerūt, tuo pontificatu resflescere pulcherrime incepere. Pacem namq; ipsam abs te fundatam ueluti quandam plantam, flores eiusmodi, atq; fructus abūde sequuntur. Et urbes Italiæ omnes nūc literarum ornamentis exultantur, quibus prius orbata, deformes, & ueluti lugubri quadam ueste indutæ, modo uiduarum degebant: consistunt nunc, augenturq; maiorem in modum coetus philosophorum, oratorū, poetarum, deniq; professorum omnium liberalium artium: & excitantur mirum in modū ingenia hominū te autore diue Nicolaë, qui non solum tua tempora pacata sic reddidisti, uerumetiam cuiq; suæ uirtutis, laborisq; præmia magnifice proponis. Non enim tu pecunias conferuendas inutiles censes, sed assidue quæq; large distribuis, & diuitem sic te opinaris, si tibi pecuniæ usui sunt, si summa liberalitate laudem tibi comparas immortalē. Nec tu aurū ad condendos exercitus sumptitas, ut non nisi sanguinolenta manu calicem diuini sanguinis labijs admoveas tuis: sed fessa opida reficis, templa condis, omne literarum genus ut pulchre uigear, facis: quæ pauperibus inopiā reddant leuiorem animo largiris: omnia deniq; laudabiliter statuis, quibus felicitas publica cunctis mortalibus contingere possit. Sed nihil clarius, nihil sanctius, nihil deniq; humanæ uitæ commodius, quàm ea tua cura, & diligētia, qua literæ florent, & homines plurimi docti, eruditiq; euadunt, quæq; doctis nihil omnino deest, quod uel honoris, uel pecuniæ consequi debeant. Qua in re peculiarem profectō laudem illam quocq; tibi reddere licet, quod non solum uolumina omnia, quæ lingua latina præbere possit, summa cum diligētia colligenda, & usq; à barbaris ultra Aquilonem degentibus cōquirenda magno cum sumptu curas: sed etiam Græcorū numerosa opera cōuertenda in latinum sermonem percentes: idq; tanto cum desiderio agis, ut breui, pauci uix libri insignes restent linguæ illius, qui latine legi non possint. O rem perutilem, & summo pontifice dignā. Hæc enim ut homines eruditos, omniq; barbarie perpuratos reddere potest: ita etiam humaniores, iustioresq; reddat necesse est. Hæc tuas bibliothecas summe princeps non paucis quibusdam Iudæorum libellis, ut de Ptolemæo Philadelpho scribitur: sed plurimis, amplissimisq; Græcorum codicibus gentis nobilissimæ, omniq; literarum genere præstantissimæ faci pleniores. Quocirca ratione optima bibliothecas istas, quæ tantum luminis afferant linguæ latinæ, tantumq; utilitatis præstent hominibus, thesauros longe meliores illis existimari oportet, quos pontifices quosdam semper custodisse, modoq; Colchidici illius draconis, absq; ulla utilitate super eis assidue inui-



glaſſe accepimus. Quæ cum ita ſint, te iure optimo fundatorem quietis, autoremq; aurei cuiuſdam ſeculi, non ſolum Quirites, uerum etiam omnes Europæ incolæ ap- pellant, & ſummis laudibus extollunt, & honoribus perinde ac deum in terris alte- rum proſequuntur. Sed hæc quanquam plenius explicare magnopere cupio de- mentiffime princeps, tamen Theophrasti opus, quod mihi interpretandum decre- ueras, me iam ad ſe trahit, ut inſpici à te celerius poſſit: quapropter de his aliàs latius, uti debeo, referre pro uirili mea conabor. Nunc Theophrasti libros de plantis fron- te hilari, pro tua ſolita humanitate accipies: quos credo traduci à me iuſſeras, non quod me ſatis id facere poſſe putaueris (parum enim ea in re me ualere, tu minime ignoras) ſed ut hominem græcū latine dicentem aliquando audires. Nouitas enim rei non nihil delectationis afferre quoq; in genere poteſt. Mihi tamē res adeo meas uires excedere uifa eſt, ut niſi pro lege tuā uoluntatem firmiſſime mihi ſtatuere, facile hercle recuſaſſem, quæ bene expedire non poſſem. Caterū tua iuſſa tantum apud me ualent, ut quantulum ego ſummo cū labore alieno in cœlo ferere poſſim, cogitare nō uelim, dum modo tuę uolūtati morem geſſiſſe uidear. Inſpice igit & le- ge quoad tuæ occupationes permittant, libros quos iuſſu tuo in latinā cōuertimus linguam, atq; in tuo nomine adidimus: & ſi quid recte dixiſſe uideamur, id diuino tuo auxilio tribue. Te enim non ſecus ac deū piſſime inuocantes opus incepimus.

## THEODORI GRÆCI THESSALONI

CENSIS PRÆFATIO IN LIBROS THEO-  
PHRASTI DE PLANTIS.



RAEFANDVM illud Heracliti dictum arbitror, quo abie-  
ctæ cuiuſdam domunculæ aditū breuiter ſimul & pulchre mi-  
nus aſpernandum aſſeruit. Is enim caſam aliquando ingreſſus  
furnariam, ſediſſe ignis hyberni forſitan cauſa diutius dicitur.  
Quod cum à quibuſdam interim quaereretur, quos eum uifiſſi  
mum locū introire puderet: ſubridens ille, introite, inquit, ſunt  
enim hic etiā dij. Nam etſi nobīle, atq; graue ſtudiū illud puta-  
ri debeat, quo te non uoluminis alieni interpretem, ſed tui autorem exhibeas: ta-  
men non adeo contemnendum equidem interpretandi ſtudiū dixerim, ut nun-  
quam ad hoc digneris accedere. Eſt enim uel in eo ipſo utilitas quædam, quam ne-  
gliſſi minime ab homine philoſopho decet. Proderit nanq; hominibus non minus  
cum ſententiā al cuius utilem aperuerit, quā cū ſuam ipſe docuerit. Nec illa di-  
cendi ratio deeſt, quæ depromenda ſanē ſit ex philoſophiæ magiſtræ omniū rerum  
(ut ita dixerim) officina ſermonis: cum de aliena lingua in tuā traductio exigat qui-  
dem, ut diſi aperiās: ſed non idem, quod uulguſ ſeruare in transferendo conſue-  
uit: ſed quod proportionē linguæ utriq; philoſophus ſuo iudicio aptiſſime daret. Itē  
exprimi quidem ornate ſingula, præſtantius eſt: ſed nō adeo uerborum ornatui in-  
dulgendum, ut ſi quid non niſi mutata ſententiā transferre ornate ualeas, tueri ele-  
gantiam malis, quā ſententiā: quæ forma quodammodo eſt orationis. Vocabu-  
lorum etenim modum, utpote materiā quandam pro formæ iſtiusmodi ratione,  
non formam iſtam pro uocabulis capiendam philoſophus nouit. Adde etiam impo-  
nendorum nominum aptam inuentionem, quæ cum in interpretando perſæpe ne-  
ceſſaria ſit, philoſophia proſectō opus eſt: quæ natura perſpecta, nomina noua qui-  
dem, ſed quod ad recte rationis iudiciū pertinet, nullo minus reddat antiqua. Sūt  
enim

enim nomina rebus imposita, quemadmodum placuit: & poni quotidie pariter licet. Nec tempus ullum excogitare futurum ualeas, quo aut rerum inuentio, aut nomen impositio cesset. Non tamen id officium uulgo, cui temere omnia placent: sed philosopho certe homini rationum indagatori tribui debet, ut neque ratio desit nomen, & posita sint quemadmodum placuit: quanquam hac ratione potius, quam illa placuerit. Quamobrem interpretandi studium quamuis ampla quadam careat grauitate, spernendum tamen non ducimus: sed Heracliti dictum illud, deos immortales hic etiam esse, praefatur: atque ex ceteris philosophiae studiis, quibus nos dediti sumus, ad hoc nonnunquam uenimus: sed interest, quod partim libenter, partim non libenter id facimus. Cum enim ex latinis literis in graecam linguam uertendum aliquid est, libenter id uertimus: minore enim cum labore plura linguae usu paternae conficere possumus: an etiam non inepte, sit hoc aliorum iudicium. At cum latinis hominibus, quibus cum nunc uiuimus, aliquid nostrae linguae interpretari necesse est: hoc profecto libenter haudquaquam suscipimus. Sumus enim interpretes latinorum, non minus lingua, quam patria peregrini. Quapropter non solum amplum, ac difficile quoddam opus uertendum in linguam latinam nunquam meo arbitrio mihi sumerem, sed etiam nec paruum quoddam aggredi auderem. Verum mihi quoque idem euenire planissime uideo, quod actum sponte, sed animo inuito refert Homerus. Quod enim alias nollem, facit ut uellem diutius Nicolaus, quem nostra aetas summum habere pontificem merito gloriatur. Hic enim ut libros Theophrasti de stirpibus latino aperirem sermone iussit: rem uehementer arduam, non tantum homini graeco, uerum etiam latino. Nam & genus istud scribendi longe copiosius, ut omnia, graeca lingua obtinet, quam latina: & latinis autoribus cura defuit, qua suis hominibus plenius haec, & quoad romana posset oratio, sincerior explicarent. Licet id uidere, cum in alijs singulis, tum in ijs, quae Plinius secundus exposuit. Nam ut cetera omittam (uix enim pauca inter tam numerosa eius capitula, menda mihi carere uidentur) quod de arboribus glandiferis inquit, monstrasse satis hoc loco futurum reor. Has enim arbores generis unius uocabulo amplecti latinum sermonem posse omnino negat: ea credo de causa, quod nullum inuenerit, quod illi graecorum generi responderet, quod *δρυς* dicitur. Itaque quatuor quaedam genera reddit: Quercum, robur, esculum, cerrum: & graeca illa adiungit, *ἡμδρυς, αἰγύλον, ἐλίφασιον, παύφυλλον*: quasi quatuor haec, latinis quatuor illis respondere non possent. Nec robur pro communi omnium genere capi satis apte liceret. Sic per incuriam autor ille cum minus dilucide docet, tum inopem plus, quam sit, latinam linguam ostendit. Magna etiam in reliquis autoribus percipi potest negligentia. Quae tamen singuli ignorarunt, uel neglexerunt, colligi magna fere parte in omnium simul operibus possunt. Sed quam laboriosum id sit, uel ex interpretibus, tum antiquis, tum hisce nostrae aetatis, argumentum deduci facile potest. Prisci enim illi si quid traduxere, forensis id certe generis oratio est: aut rerum gestarum narratio, aut de uita hominum disputatio. Quae quidem dicendi genera, si non aequae plene, atque lingua graeca sermo latinus conficere possit: paulo tamen arctius potest. At commentationem plantarum attingere nemo ausus est: ob eam credo difficultatem, quae plus laboris, quam laudis afferret. Elymum enim & zeam, & olyram, & cetera generis eiusdem, quibus nam nominibus latini appellent inuenisse non est, qui non summo labori tribuerit. At cum panicum, & semen, & filiginem, & reliqua dicentem interpretem audis: nil penitus esse arbitraris de cuius inuentione laudem ipse mereatur. Inter iuniores uero scilicet nostrae aetatis homines, aut paulo antiquiores, qui elegantius interpretari studuerint, alia quaedam sibi traducenda sumpserunt: plantarum uero laborem, nec isti pati ullo pacto uoluerunt. Qui autem, ut latine singula dictarent mihi

nus curarunt, græcis ipsis uocabulis usi adeo sunt, ut nullum ferè fructum ex eorum interpretatione homo latinus capere possit. Itaque si eos quoque difficultatis potissimum causa nihil de plantis aperuisse putaueris, haud quicquam mea sententia erres. Fit ergo & autorum, seu ignauia, seu ignorantia, ut magna cum difficultate conuertere hæc possint in linguam latinam. Verum non minus difficultatis, quinimò longe plus parit linguæ ipsius inopia. Minus hoc fortasse credibile latinis hominibus propterea dici uideretur, quod M. Tullius, ne uerbis quidem à græcis latinos susperari autumat. Sed qui libros non solum latinos, sed græcos etiam pari studio lectitant, facile re ipsa persuaderentur M. Tullij sententiâ incredibilem potius esse arbi trari. Quod equidem, ut uere de me cõfitear, haud ita esse uehementissime uellem: 10 minus enim in hisce interpretandis nunc elaborarem, si M. Tullius non ex minimis quibusdam, quæ fortasse latini melius habent, simplici quadam, atque absoluta oratione cauillaretur, sed ueram sententiâ diceret. Nunc uero quàm laborandum sit, non solum, ut priuata quædam, & rari usus uocabula, sed etiam pleraque apud græcos usitatissima, & in promptu omnibus habita, latine dicamus, uel hinc satis possit intelligi: inter herbam enim & fruticem Græci genus tertium reddunt, idque phryganum nomine usitatissimo uocant. Latini autem eo nomine uacant, nec quatuor genera faciunt, sed arboris, fruticis, herbæque appellatione uniuersas plantas amplecti se satis existimant. Item, quid apud Græcos usitatius sit acremone, quod ramos prægrandes significat, in quos arbor continuo post caudicem spargitur. At apud latinos 20 nullum proprium nomen inueneris: sed ramos, tam eas partes, quàm germina ananacula dices. Adde opifimum & chylifimum, quorum differentiam nullus inter latinos autores nominibus proprijs exprimere potuit. Succatio enim uel liquatio, utriusque potius commune, quàm alterutro proprijs reddi debeat. Facit igitur & linguæ inopia, ut perardua sit plantarum interpretatio. Auger uero laborem, uel autorum magna in multis dissensio. Cum enim herbam, quam Græci ἄνθος uocant, alius Iouis caulem, alius uitalem, alius digitillum, alius sedum appelleret: quis sequendus potius sit, haud sine magno labore possit decerni. Etsi forte in his minutijs tam laborari curiosum nimis esse credideris, at arborem insignem, aut fruticem memorari dignum, inconsideranter coepisse, quis non summo errori dederit? Ut abieti similem 30 illam arborem, quam Græci ὀξύω uocant, quonam certo debeat appellari nomine inter latinos minime constar: alij enim fagum, alij scissimam, alij ornum appellasse appareant. Idque coniectura assequi tantum potueris. Nullus enim aperte de hac arbore scribit. Sed quod faguim, quidam in tenuissimas laminas secari dixerint, non eam fagum significari putatur, quæ glandem fert, & scabra materie constar: sed arborem potius illam, quam Græcos ὀξύω appellare proposui: eam namque ita secari omnium præcipue posse uidemus: quæ de causa scissimam alij appellare fortasse placuit. Verum quod manifeste nemo docuerit, hæsitare interpretem, & laborare necesse est. Hoc idem uel in alijs plerisque conspiciere licet. Sed omnium durissimum illud certe accidit, quod textus propositi operis, mēdosus adeo est, ut nulla ferè pars 40 sit exemplaris, quod unum tantum habere possumus, quæ uel librariorum incitiā, uel alia temporum offensa non tam deprauata sit, ut & summa cum difficultate sit emendandum: & nonnulla intermittere necesse sit, quæ uix congrue intelligi possint: præsertim in ijs libris, qui de plantarum hystoria describuntur. Quas ob res difficillimam porro prouinciam nobis hanc summus pontifex delegauit, remque profecto nostras uires penitus superantem, expediendam mandauit. Sed quid agam? Fieri non potest, ut eius principis iussa recusem. Res enim nulla tam plena laboris est, ut eam aggredi iussu diui Nicolai non debeam: quem deos immortales idcirco tam amplio principatu magnificasse existimo, ut eius singulari uirtute, humanum genus felicitatem

licitatem seculis memorandam omnibus ualeat adipisci. Quem ego non solum, ut dominum colo, & omni officio, uel potius pietate, obseruo: sed etiam ut uirum doctissimum, omnisque uirtutis genere preeditum, animo summe beneuolo amplector. Aggrediar igitur, quæ meus hic dulcis tyrannus interpretari coëgit: & partim plantarum nomina, quibus latina lingua non caret, diligenter pro uiribus quæram: partim noua, rebus nouis nomina imponam, ubi id non inepte pro meo modulo facere possim, & ex fonte deducendo Græcorum, quoad liceat Latinorum succurrā inopia. Nonnusquam etiam græcis utar, aut quia usitata latinis hominibus sint, aut quia proferri aliter nequeant. Denique singula textus græcæ orationis adeo perscrutemur, ut ne minimum quidem prætermittere uideamur, quoad scilicet sine absconsa, & barbara illa Gulielmi interpretis locutione, quæque græca latine aliquo pacto exprimi possint. Hanc enim cum in his omnibus Theophrasti libris probemus, tum maxime in his sex, quos de generatione, siue de causis plantarum addidit, percontamur modam ducimus: quippe cum rerum rationes naturalium dilucide potius traduci, quam eleganter desiderent. Sæpe namque rationes rerum, elegans latina peruertit traductio: præsertim eas, quas Peripateticorum ille æquabilis, eruditus, seuerus, minusque benignus sermo exponit. Sed forsitan non solum hæc prædixisse, uerum etiam deum aliquem inuocasse par est. Nam si in secandis quibusdam radiculis deos precari necessarium creditur: cur non in interpretandis omnibus plantarum generibus, hoc idem facere longe magis cōueniat? Igitur diuinum implorandum auxilium est. Sed quem potissimum deum uocemus? an non Syluanum, non Pana, non Cere rem, non Dryades, non Faunos? non eiusmodi aliquem, sed quem uera religio deum, aut iam habet, aut post nescio quot annos habebit. Ita hercle ac decet ipsum sanctissimum patrem inuocemus, quem uniuersa iam Europa, ob eius integerrimam uitam, innumeraque erga omnes beneficia, diuum appellat: deumque proculdubio post appellabit, cum immortalium petet collegium. Ergo tu diue Nicolæ, namque deus iam mihi es, adsis obsecro, & fructum nonnullum noscitur hic labor pariat hominibus, facias.

# THEOPHRASTI DE

HISTORIA PLANTARVM, LIBER PRIMVS,

THEODORO GAZA INTERPRETE.

Per quas partes historia plantarum haberi possit. Cap. I



**P**LANTARVM differentias, reliquamq; naturam ex partibus, affectionibus, generationibus, uitamq; petere oportet: mores enim & actiones, quemadmodum animalium genus, minime plantarum fortuitur. Sunt autem, quae per generationem, affectionem, uitamq; sumi debeant patetiora cognituq; faciliora. Quae uero per partes noscatur necesse est, uarietates utiq; plures habere uidemus. Hoc enim ipsum primo non satis constat, quae partes, quaeq; non partes debeant appellari. Sed nonnullam controuersiam recipit: partes enim quoniam suae naturae ratione consistant, perpetuo durare uidentur, aut simplici, absolutaq; ratione, aut postquam confectae fuere, ut scilicet animalium partes, quae postea concresecunt, nisi quid morbo, aut senectute, aut laesione perdat. At in plantis nonnulla ita se habent, ut annua duntaxat portentur natura, ut flos, muscus, folium, fructus: denique omnia quae ante fructus, aut una cum fructibus proueniant: quinetiam germen ipsum, quippe cum arbores annuatim incrementum tam partibus supernis, quam circa radices semper capeffant. Quamobrem si quis partes haec esse asserat, cum partium multitudinem incertam, tum partem nunquam eandem esse sequetur. Sin autem partes esse negauerit, continget protinus, ut ea partes minime sint, quibus plantarum perfectae redduntur, talesq; esse spectantur. Quippe omnes cum germinant, uirent, fructum gerunt, pulchriores atq; perfectiores & sunt & esse uidentur. Haec res sunt in his ambiguitates. Sed forsitan non omnia neq; in ceteris, neq; in ijs quae ad generationem pertinent, pariratione querere decet. Ea q; ipsa singulis annis oriunda, minime in partium genere collocanda sunt, ut fructus. Nec enim foetus partes animantium esse possunt. Sin autem clementia temporis plantarum aspectu pulcherrimae reddantur, at pulchritudo nullo ipsa indicio est. Nam & animalia dum uterum gerunt, pleniora, pulchrioraq; redduntur: pleraq; etiam partes quotannis amittunt, ut cerui cornua, aues nidificantes pennas, quadrupedes pilos. Quapropter haud temere factitatum dixerim, praesertim cum is affectus per similes sit foliorum: iactura. Pari modo de ijs, quae ad generationem attinent, differendum est: quippe cum etiam in animantium genere, quaedam simul nascantur, quaedam tanquam naturae alienae secernantur. Germinatio quoq; non secus esse uidetur: etenim generatio ipsa generationis perfectae gratia est: ad summam, quemadmodum diximus, non omnia similiter, atq; in animantibus accipi debent. Quamobrem numerus quoq; incertus est: Nam uis undiq; germinandi habetur, quoniam & undiq; animatum est. Haec ita opinari non tantum rei praesentis, uerum & futurae gratia conuenit. Etenim quae assimilari nequeant, assimilare contendere, superuacuum certe, ac recusandum, ne uel propriam ipsam rei speculationem amittamus. Plantarum uero historia (ut simpliciter dixerim) aut per partes externas, totamq; formam, aut per internas haberi potest, ut etiam in animalium genere partes abditae dissectionibus patent. Sed capere in his ipsis oportet, quae in omnibus insunt eadem, quaeq; propria cuiusq; generis sint, atq; etiam quae in his habentur similia: proprium inquam folium, radicem, corticem. Nec illud latere nos decet, quod proportionem intelligi debeat, ut in animalium genere, ad ea scilicet redigendo, quae quam similia, perfectissimaq; continentur. Ad summam, omnia quae

que in plantarū genere spectantur, similitudo petenda ex ijs est, quæ in animalibus insunt, quoad fieri possit. Igitur hæc ita determinare libeat. Partium uero differentiarum (ut formula rem complectar) tribus ferè in rebus cōsistunt: aut enim in eo quod quædam nō habent, ut folia, & fructus: aut quod nō similia, neq; paria habent: aut tertio, quod non similiter habent. Horū dissimilitudo figura, colore, spissitate, raritate, asperitate, leuitate, reliquisq; affectionibus enotescit: ad hæc omnibus differentiis saporem. Disparitas aut in excessu atq; defectu est multitudinis, magnitudinis uel: quantq; (ut pingui Minerua dicat) & illa omnia excessu, defectuq; distinguuntur: nam plus, minusq; nō nisi excessus, defectusq; sunt. Non similiter uero positu constat: exempli gratia, quod fructus quædā sub folijs, quædam super folia gerunt: ipsarumq; arborum, aliæ cacumine ferunt, aliæ latere, nonnullæ etiā caudice, ut morus ægyptia, & quæ fructum pariunt sub terrā, ut archidna, & quod uingum Aegyptij uocant: item si quædam pediculū habeant, quædam careant. Hoc idem uel de floribus dici decet, quippe cum alij circa fructū ipsum nascantur, alij secus. Ad summā, positio- nis ratio in his, & folijs, & germinib; accipi debet. Ordine præterea nonnulla differre uidentur: quibusdam enim rami incōditi, ut robori: quibusdam ordinati, ut abiecti, utrinq; miro ordine inuicem respōdent: quibusdam etiā rami prægrādes ordinati, paresq; numero, ut trinodibus. Quas ob causas differentias rebus his capi oportet, quibus uel tota forma in singulis perspicui potest.

*Quid radix, caulis, caudex, ramus, surculus.*

Cap. II



20 **D**E partibus autem ipsis sigillatim iam referre conandū, si prius eas numero persecuti fuerimus. Partes primæ, maximæ, communesq; pluri morū, radix, caulis, ramus, surculus: quibus ueluti partibus quispiam diuidere potest, quemadmodum in animalium genere: est enim quodq; eorum dissimile, atq; his omnibus tota conficiantur, necesse est. Radix est id, quo alimentum attrahitur. Caulis, in quod alimentū deferretur: caulem enim appello, quod supra terram simplex assurgit. Id enim commune pariter annuis atq; perpetuis est: quod in arborum genere caudicem uocitare solemus. Rami, qui a caule fissi multiplices sparguntur, quos nonnulli nodos appellant. Surculus, quod ex his indiuiduum, simplexq; oritur, quale præcipue germen annotinū appareat. Sed hæc potius arborum generi conueniunt. Caulis uero (ut dictum est) cōmunior quidē habetur: sed nec ipsum quidē omnia habere uidetur, ut ex herbaceis quædam habent, sed non perpetuū, sed annuū tantum, ceu quæ diuturnis radicibus uiuunt. In totum, planta res uaria est, atq; multiplex, inq; uniuersum de ea referre difficile. Indiciū uero, quod nihil penitus est, quod cōmune accipi possit cū cētis plantis cōueniens, ut animalibus, os, uenter, & alia proportionem eadem, alia quodā alio modo. Neq; enim radicē, neq; caulem, neq; ramū, neq; germen, neq; foliū, neq; florē, neq; fructū plantæ omnes habere uidentur. Cortex rursus, aut medulla, aut neruus, aut uena minime omnibus inest, ut in fungorū ac tuberū genere patet. Quibus rebus, 30 hisq; similibus natura utiq; plantarū cōsistit. Sed hæc (ut iam dictū est) arborū præcipue sunt, hisq; cōuenientius hæc accōmodet partitio, ad quas uel reliqua redigi par est: cæteras præterea omnes formas hæc propē exprimūt atq; declarāt. Distāt enim eorū multitudine, paucitate, spissitate, raritate: etiā eo quod simplicia prodeūt, uel in plura scindunt, reliquisq; similib; . Partium aut quas retulimus nulla ex particulis similibus constat. Similibus inq; particulis, qd ex eisdē pars quælibet radicis aut caudicis cōstat. Sed quod acceperis, caudex nullo pacto uocet, sed pars caudicis. Quemadmodū etiā in animalium membris: nam pars quæq; tibiar, aut cubiti ex eisdē cōstat: uerum nō ijs, quæ eodem uocabulo cognominentur, ut caro, ut os: sed nomine illa ca

rent, ut etiam quodq; uniformium instrumentorum. Eiusmodi enim omnium particulæ nomine carent, quanq̃ multiformiū particulę nomine suo noscunt, ut pedis, manus, capitis, digitus, nasus, oculus. Hæ ferè partes plantarum maxime habentur.

*Quid matrix, quid fructus, quid humor.*

Cap. III



Ed sunt etiam alię, quibus constant, cortex, lignum, & matrix, ubi scilicet esse potest. Quę quidem omnes particulis cōstant similibus, quęq; priores hisce habentur, quibusq; istæ cōsummant, ut humor, neruus, uenā, caro. Hęc enim principia sunt: nisi uires elementorū dixeris: sed illæ tamen communes rerum omnium habentur. Essentia itaq; naturaq; uniuersa plantarum his in rebus consistit. Quædam uero quasi annuæ partes accedunt, quæ partui fructuum accommodantur, ut folium, flos, pediculus, id est, quo folium dependet. Ad hæc capreolus, muscus, ubi scilicet esse potest: super omnia semen, fructus. Est autem fructus, quod carne & semine constat. Sunt præterea quibusdā propria quædam, ut robori, galla: uiti, capreolus. Arbores persequi hunc in modū possumus. Annuis uero quęq; annua gigni cōstat. Nam ad fructū usq; natura eorum tantum se ampliat, quæ suo uno fructificent anno, quæq; biennio durent, ut apium & alia quædam, quæq; plus temporis obtineant: his omnibus caulis quoq; proportionē conueniet. Cum enim semen parturiunt, caulem tum emittunt, utpote, quæ non nisi causa seminis caulem promant, hæc ita discerni placet. Partes autem nouissime dictas, quid quęq; sit, nota reddere subsignationis, conandum iam est. Humor itaq; patet, quem nonnulli simpliciter liquorem in cunctis appellant: quemadmodum etiā Menestor. Quidam in cæteris absq; nomine capiunt: in quibusdā uero liquorem, inq; alijs lachrymam uocant. Neruus ac uenæ per se nomine carent: quædam uero similitudine nomina partium animalium cōfortiuntur. Quin & alijs quoq; differentijs hæc fortasse inter se distent, atq; in totum genus uniuersum plantarum differat: est enim uarium atq; multiplex, ut proposuimus. Sed quoniam notis ignota persequamur oporteat, notaq; sint grandiora, patentioraq; sensui offerantur, hinc proculdubio de his primum prout rexerint, dicendū est. Reliqua enim ad hæc ipsa redigere habebimus, quantum & ad usq; quoq; modo similitudinem singula cōtingere uideantur. Cum uero partes sumpserimus, differentias protinus earum adijciendum: ita enim simul & natura euident, & tota generum differentia conspicua fuerit. Maximarum itaq; partium differentia penè dicta est, uidelicet radices, caulis, reliquarū: uires enim cuiusq;, quarumq; rerum gratia, quæq; sint, postea dicemus. Illa enim quibus tam hæc, quam cætera consent, explicare prius oportet, sumpto à primis initio. Sunt autem prima, humor atq; calor. Omnes enim plantæ humorem caloremq; sibi insitum quendam possident, sicut etiam animalia: quæ cum deficere incepere, senectā, diminutioq; consequitur: cum quę penitus defecere, exiccatio, morsq; occupat. In primis igitur illis humor nomine caret, sed in quibusdā (ut dictum est) nuncupatur. Hoc idem uel in animalium genere percipere licet. Solus enim humor habentium sanguinem certo nomine redditur. Quamobrem ad id priuatione ipsa discernimus. Alia enim sanguinem habere, alia carere fatemur. Est igitur ea pars, calorq; illi connexus.

*Quid lignum, quid caro, quid cortex, quid matrix, ex quibus cortex.*

Cap. IIII



Disunt uero & alia genera ab internis diuersa, quæ ipsa quidem per se nomine carent, similitudine autem ex animalium partibus appellatio nem sibi mutantur. Habent enim quodāmodo neruum, quod continuū, fissile, prælongumq; est, sed infociatile, germinisq; infœcundum, & uenas habens. Venæ ipsæ cætera neruo similes, sed maiores, crassioresq;

crassioresq; sunt, & ramulos, humoremq; habentes: item lignum & caro. Alia enim lignum, alia carnem habent. Lignum fistile est, caro omnibus dimensionibus diuidi potest: quomodo terra, quæq; ex terra consent. Vnde fit, ut inter neruum & uenam ipsa media sit: patet eius natura, cum in cæteris, tum in fructuum cute. Cortex & matrix proprie nuncupantur, sed ea quoq; reddere definitione debemus. Cortex est pars ultima, & à subiecto corpore separabilis. Matrix, qd in medio ligni tertium à cortice continetur, uelut medulla in ossibus: id nonnulli cor, alij medullam appellant. Partes tot penè numero habentur, quarum posteriores ex prioribus consistant. Lignum ex neruo & humore, nonnulla etiam ex carne. Cum enim indure-

10 scunt, transeunt in lignum, ut palma, ferula: quicquid ligneſcat, quemadmodum raphanorū radices. Matrix ex carne, & humore. Cortex quidem ex tribus illis, ut roboris, populi, piri: quidā ex humore & neruo, ut uitis. Folia uero ex humore & carne. Rurſum ex his maxime, & primæ illæ, quas enumerauimus, partes componuntur, non tamen omnes ex eisdem, neq; simili modo, sed diuerſo. Igitur expositis iam omnibus ferè partibus, differentias earum, & arborum, plantarumq; omnium naturam nunc assignare tentandum est.

Quid arbor, quid frutex, quid herba. De malua, beta, amerina, nuce  
auellana. Cap. V



20 Ed cum doctrina euidentius tradi solet, cum per species diuidimus, recte hunc in modum agetur, ubicūq; fieri possit. Sunt itaq; prima, & maxima, & à quibus omnia penè, aut certe plurima continentur, arbor, frutex, suffrutex, herba. Arbor est, quod ab radice, caudice simplici, ramosum, nodosum, furculosum aut facile dissolubile assurgat, ceu olea, ficus, uitis. Frutex, quod ab radice, caudice multiplici, ramosumq; se attollit, ut rubus, paliurus. Herba, quod ab radice foliatum, sine caudice proueniat, semenq; caule ferat, ut frumenta, & olera. Sed definitiones ita accipi, probariq; debent, ut notis ac lineamentis quibusdam quasi in uniuersum à nobis subsignentur: etenim di-

30 screpere nonnulla suapte natura fortasse appareant: quædam etiam ob culturam diuersa effici, atq; à sua natura discedere: ut malua in altum se attollens, atq; in arborem transiens: quippe ita sit, neq; tempore longo, sed mensibus senis, aut septenis, ita, ut longitudine, crassitudineq; instar hastæ possit grandescere, quapropter commode ad usum baculi uenit: tempore uero longiore exactio pro ratione, magis quoq; incrementa capeſcit. Simili modo & beta: nam ea quoq; ampliorem magnitudinē capit: sed longe magis amerina, paliurus, edera, ut proculdubio arbores efficiantur, quanquam frutices sint. At myrtus, nisi sæpius purgetur, in fruticem trans-

40 fit. Quin & nux auellana, quæ quidem & fructū meliorem, copiosoremq; feret, si quis plures uirgas reliquerit, scilicet, & quæ sua natura potius fruticosa sit: neq; malus, neq; punica, neq; pirus: deniq; nulla, quæ ab imis plantigera sit, caudice uno esse appareat, sed cultura cæteris abscessis utiq; tales redduntur. Nonnullas etiam caudice diffusas multiplici, causa exilitatis relinquimus, ut punicam, ut malum. Oleas quoq; & ficos multifidas dimittere assolent. Quinetiam magnitudine, paruitateq; omnino diuidenda nonnulla quispiam fortasse censuerit: quædam etiam robore imbecillitateq; & diurnitate, ac temporis breuitate: quippe cum uirgultorum, olerumq; nonnulla caudice uno consistant, & arboris quasi naturam adipiscispectentur, ut radix, ut ruta. Quamobrem eiusmodi olera, nonnulli oleriarbores uocant, & quidem omnia olerum genera certe, aut plurima cum perman-

serint, quasi ramos quosdam capeſcunt, totaq; in arboris figuram mutantur, diu tamen durare nequeunt.



*Arborum alie urbanae, alie syluestres, alie fructiferae, alie steriles, alie floriferae, alie flore carentes. De agro elephantio. Cap. VI*



Vas ob res, quemadmodum diximus, non exquisita, arctacq; ratione, sed potius nota quadā subsignandi & formula, definitiones accipi debent. Nam & diuisiones modo simili capiendę sunt, ut urbanarū, syluestrium, fructiferarum, steriliū, floriferarum, flore carentium, perpetuō uiuentium, folia deperdentium. Syluestres enim, atq; urbana, cultura potius esse uidentur: nam omnem plantam, & syluestrem, & urbanam effici posse Hippon autor est, scilicet, cultum adeptam, aut non adeptam. Steriles item, & fructiferae, & floriferae, & floris exortes, ob loca, cœlumq; ambiens, reddūtur eodem modo perpetuō uiuentes, & folia deperdentes. Etenim circa agrum Elephantium, neq; uiribus, neq; ficis folia decidere aiunt: ueruntamen eisdem rebus cuncta amplecti conuenit. Est enim quid naturæ commune pariter arboribus, fruticibus, suffruticibus, herbisq;: quorum etiā causas, cum referre placuerit, de omnibus cōmuni docere ratione oportet, omīsa penitus singulorum determinatione: nam causas quoque communes omnium esse ratio est. Quinetiam naturalis quædam differentia protinus in syluestrium, urbanarumq; genere nobis se offert: siquidem alia uiuere nequeant absque cultura, ceu illa, quæ coli solent: alia cultum nullum patiantur, sed deteriora reddantur, ut abies, pinaſter, celaſtrus. Ad summam, quæ loca frigida, niuosaq; adamant: pari modo in fruticum, herbarumq; genere, capparis, lupinum. Urbanum autem, & syluestre uocitare debemus, redigendo tum ad prædicta illa, tum uel maxime ad id, quod omnium urbanissimum esse constat. Homo autem aut solus, aut maxime omnium urbana species est.

*Formatum differentia, quo d alie terrestres, alie aquatiles, alie in paludibus, alie in lacubus, alie in fluuijs, alie in mari. Cap. VII*



Ormis quoq; in ipsis differentiæ totorum, atq; partium patent, ceu magnitudo, paruitas, duritia, mollitia, leuitas, asperitas corticis, foliorum, reliquorumq;: deniq; pulchritudo, & deformitas quædam, item bonitas, & prauitas fructuum: quippe cum plura syluestres ferre uideantur, ut pinaſter, & oleaster: urbanae autem meliora: succos quoq; ipsos dulciores, suauiores, atq; in totum dixerim, temperatiores præſtent. Igitur hæ naturales quædam (ut dictum est) differentiæ sunt, ac longe magis steriliū, fructiferarum, folia deperdentium, perpetuō uiuentium, quæq; alia huiusmodi sunt: omnium uero semper, omnesq; differentiæ pro locis accipi debent, quippe cum aliter forsitan capi nequeant. Tales autem differentiæ generalem quandam facere distinctionem posse uidentur, ut terrestrium, atque aquatiliū, sicuti in animalium genere. Sunt enim plantarū quædā, quæ non nisi in aqua uiuere possunt. Namq; alie secundum aliud genus humorū discernunt, ut alie in paludibus, alie in lacubus, alie in fluuijs: quædā etiā in ipso mari nascant, minores in nostro, maiores uero in Rubro: nonnullæ præmadidæ quasi, atq; palustres omnino spectant, ut salix, platanus: quædam degere in aquis minime queūt, sed arida loca persequunt: ex minoribus quædam etiā littora utiq; desiderāt. Ceterū inter eas quoq; si quis arctius inquirere uelit, alias cōmunes, & quasi uitā ancipitem agētes inueniet, ut myrrū, salicem, alnū: alias uel ex ipsis, quæ terrestres proculdubio sunt, mari nō nunq; uiuentes, ut palmā, scyllā, albucū. Sedem eiusmodi omnia, & in totū hoc modo pensitare minus accomodata contēplatio est: nec em̄ natura hoc modo, neq; in eiusmodi reb. necessitate iniecit: ergo diuisiones, atq; in totū historiā plantarū accipere hūc in modū debemus. Omnia itaq; tam hæc q̄ cetera differūt, ut diximus, tum ceterorū forma, tū partiū discriminē: uel qd quædā habet, quædā nō habeāt: uel qd quædā plura habeāt, quædā pauciora: uel

uel quod non simili modo habeant, uel quemadmodum superius situs diuissimus. Nam loca quoque assumpsisse fortasse non ab re est, quibus locis singula apta, aut non apta sint procreari: nam id etiam differentia magna, & maxime propria plantarum esse percipitur, quando quidem terrae adhaereant, & nunquam ea absolui, sicut animalia possunt.

Differentia plantarum à figura, caudice, à cortice & ligno etiam. Cap. V III

**N**unc particulatim differentias explicare conandum, quo primum in uniuersum, atque ratione communi, deinde sigillatim differētes, plus quoque agnoscere progressu orationis uideamur. Sunt igitur plantarum aliae procerae, & longo caudice, ut abies, pinus, cupressus: aliae contortiores, & caudice breui, ut salix, ficus, punica: simili modo & crassitudine, tenuitateque distāt: quaedam rursus caudice uno, quaedam pluribus. Ab his proximum uel illud quodammodo est, alias procreandae sobolis uim retinere, alias carere, & alias ramos multos gestare, alias paucos, ceu palmam: item robore, & crassitudine, aut aliquibus huiusmodi differentiis discernendū: rursus quaedam cortice tenui, ut laurus, tilia: quaedam crasso, ut robur: item quaedam cortice leui, ut malus, ficus: quaedam scabro, ut robur, suber, palma: haec dum adolescunt leuiori cortice sunt: cum senescunt, crassiores, scabriorique. Nonnullis cortex radicis specimen gerit, ceu uiti: quibusdam etiam cadit, ut portulacae, unedoni, arbuto. Ad haec alijs cortex carnosus, ut suberi, robori, populo: alijs neruosus, macilentusque, pariter arboribus, fruticibus, annuisque, ut uiti, arundini, tritico: & alijs multiplex tunicis, ut tiliae, abieti, uiti, lino geniste, cepist: alijs simplex, ut fico, arundini, lolio. Corticis ratione ita differentie colligunt. Lignorum autem ipsorum, atque in torum caulium, alij carnosus, ut roboris, ut fici, & ex minoribus glandis, betae, cicutae: alij macilentus, ut cedri, ut celtis, ut cupressi: & alij neruosi, abietis enim palmarumque huiusmodi sunt: alij enerues, ut fici: simili modo alij uenosi, alij uenis priuati. Sed in fruticum, & suffruticum, & ad summam sarmentorum genere, aliae quoque differentiae comperiri possunt: quippe cum arundo geniculata: rubus, & paliurus spinosa: rhipha, & palustris, aut lacustris nonnulla, in septa pariter, atque aequalia conspiciantur, ut iuncus. Gladioli uero, & butomi caulis aequalitatem quaedam peculiarem sortitus est, & longe magis fungi fortasse pediculus eo in genere poni debeat. Igitur haec differentiae rerum illarum esse appareant, quibus fieri compositio potest. Illae uero ad effectiones, uiresque referuntur, ut durities, mollietates, lentitas, fragilitas, densitas, raritas, leuitas, grauitas, quaeque alia eiusmodi sint. Saxilix enim sicca tantummodo leuis, suber etiam uiride leue est: buxus & ebenus ne arefactae quidem leues redduntur: & aliae flexiles, ceu abies: aliae frangi celeriores, ut olea: aliae item enodes, ut sambucus: aliae nodosae, ut pinus, abies. Nec huiusmodi differentiae denegandae naturae sunt, nam fissilis abies certa meatuum rectitudine, fragilis olea obliquitate atque duritia, flexibilis tilia, & quaecumque alia huiusmodi sunt humoris sui lentitia: grauis buxus, & ebenus, quia densa: robur, quia terrenum: parimodo & reliqua omnia quodammodo ad naturam redigi possunt.

Differentia medullarum, discrimen radicum, differentia radicum in summa. Cap. I X

**M**edullae praeterea ratione inter se discrepant. Primum si aliae habeant, aliae careant, ut nonnulli tam alias quasdam, quam sambucum medulla carere asseuerant: nam & inter eas quae certo habent, alijs carnosae, alijs lignosae, alijs membranaceae similes. Carnosae, uiti, fico, punice, sambuco, ferulae: lignosae, larici, abieti, pino, & quidem huic praecipue, quod tecta plurimum ingerat: his durior atque spissior, corno, ilici, robori, cytiso, moro, ebeno, celti: quae quidem coloribus inter se distant: omnes enim nigrae inspeciantur.

quasi flexibiles

Quinetiam robori talis, quod nigrū cognominant, omnesq; lignis duriores: quam obrem flexum nullum recipiunt: aliae tamen alijs solutiores, membranis similes, arboribus nullae, aut raro. In fruticosis uero, atq; materia humili, ceu arundine, ferula, reliquisq; eiusmodi tales nimirum habentur. Quaedam medullam ipsam magnam, atq; peripicuam continent, ut ilex, robor ceteraq; praedictae: quaedam paruam, incertioresq; gerunt, ut olea, buxus: haud enim ita in his distincta spectatur. Quam obrem sunt, qui non in medio, sed per totum lignum dispersam esse affirmant, ut nullus sit certus locus medullae: nec desunt, quae nullam omnino medullam habere uideantur, nam palmae nullum penitus discrimen colligi potest. Radicibus praeterea distant: alijs enim multae, longaeq; radices, ut fico, robori, platano, quippe cum istae, si locum habeant expeditum, subire quantumuis facile possint: alijs paucae, ut puniceae, malo: alijs una tantummodo data est, ut abieti, pino, ita scilicet ut una, & praegrans in ima descenderet, paruae autem complures ab illa exirent. Item earū, quae unica radice firmantur, quaedam praegrans, alteq; infixam illam demittunt, quae ex medio tendit, ceu amygdala: sed olea paruam illam, ceteras grandiores, contortioresq; gerit: & alijs crassiores, alijs inaequales, ut lauro, oleae: alijs tenues omnes, ut uiti. Differunt praeterea leuitate, asperitate, spissitateq;: quamuis enim omnium radices, rariore corpore partibus superioribus sint, aliae tamen alijs spissiores, magisque furculosae constant: & aliae neruosae, ut abietis: aliae carnosae potius, ut roboris: quaedam uelut inodosae, uillosaeq; ceu oleae. Quod exinde euenit, quia breues, ac tenues illas permultas, atq; promiscuas mittunt: nam etsi omnibus paruae & grandibus exeunt, tamen non omnibus eodem modo congestae, frequentesq;. Sunt item aliae radicibus altis, ut robor: aliae summae adhaerentibus terrae, ut olea, punica, malus, cupressus: item alijs rectae, aequalesq;: alijs obliquae, inaequalesq;: id enim non solum loci ratione euenit, quod scilicet & recto tramite progredi non possunt, sed etiam naturae ipsius proprium est, ut in lauro & olea liquet. Fico, ceterisque huiusmodi radicibus obliqua propterea est, quod expedita, faciliq; semita carent. Medulla omnibus inest sicuti caudicibus, & ramis, qui certe non absq; ratione sua testantur principia. Item quaedam prolis sursum uersus procreandae uim obtinent, ut uitis, ut punica: quaedam nullam penitus proferre sobolem possunt, ut abietes, cupressi, pini. Suffruticum quoq; herbarum, reliquorumq;, has easdem differentias assignare licet, nisi quid radice penitus careat, ut tuber, fungus, cranium: nam alijs radix numerosa, ut tritico, ordeo, tiphæ, omnibusq; huiusmodi esse similitudine quadam cōcernuntur: alijs paucae, ut leguminibus. Olerum quoq; maior ferè pars radice cohaeret singulari, ut brassica, beta, apium, rumex: sed nonnulla propagines magnas subgerunt, ut apium, beta: quae quidem pro corporis sui ratione altius, quam arbores sanè radicantur. Sunt alijs carnosae, ut raphano, rapae, aro, croco: alijs lignosae, ut eruca, ocymus, & syluestribus magna ex parte: quibus non protinus plures, & fissae exeant, sicut tritico, ordeo, & ei, quam specialiter herbam appellamus: haec enim in annuorū, herbarumq; genere differentia radicum, ut aliae protinus multiplices, atq; aequales praescindantur: aliae simplices promantur, aut binae, scilicet quae maxime constant: nam aliae plerq; ex ijs proueniunt.

Radix gladioli, & ari, radix scillarum, ceparum, & bulborum.

Cap. X



D summam, radicum differentiae in olerum genere, atq; materia humili complures accipi possunt: sunt enim aliae lignosae, ut ocymi: aliae carnosae, ut betae, multoq; magis, ari, hastulae regiae, croci: quaedam quasi ex carne, & cortice constant, ut raphanorum, raporum: aliae geniculatae, ceu harundinum, graminum, & quicquid harundinaceum: quae quidem sola uel maxime

maxime ijs, quæ super terram emineant, similes formari cernuntur: etenim tanq̃ harundines fibris innixæ corradicantur. Aliæ tunicis multiplicibus, corticosæq̃ porriguntur, ut scyllæ, bulbi, atq̃ etiam cepe, hisq̃ similiū: semper enim his aliquid circa eximipoteſt: quæ quidem omnia, duplex quodammodo genus radicis exhibet: e uidentur. Nonnullis hoc idem de omnibus capitatis, terræq̃ conditis, placet: habent enim & carnosam illam, & corticosam, ut scylla, & eas, quæ ex illa proueniunt: non enim crassitudine, tenuitateq̃ tantum discrepant, sicut olerum, arborūq̃, sed etiam genus diuersum habere uidentur. Euidētissima gladioli est, atq̃ ari, quippe cum altera crassa, leuis, carnosæ: altera tenuis atq̃ neruosa sit. Quamobrem dubitauerit  
 10 sanè quispiam an inter radices hæc poni debeant: etenim quod subter telluri cohæret, radix esse appareat: quod uero cæteris è diuerso promitur, nihil obtinere radicis dixeris: radix em̃ parte postrema tenuior est, inq̃ acutius assidue tendit. Radix uero scyllarum, bulborū, arorumq̃, e contrario creſcit: item cæteræ, radículas de suo latere mittunt: scyllarum uero, & item ceparum, nihil penitus mittunt. In totum, quæ de capite per medium pendent, radices esse uidentur, atq̃ coalescunt. Pars uero illa extuberans, ad cymæ, aut fructus modū consistit: sed cum natura eorum plus esse  
 20 q̃ radix debeat, idcirco oriri ambiguitas potest, quippe cum totū illud radicem esse asseuerasse, haudquaq̃ recte actum intelligatur: radix enim bulbi, & gethyi, caule omnino carebit, & in totum omnia, quæ natura sub terram distendi uoluit, caulis nimirum expertem fortientur naturam, si totum radice consumari placuerit: ac proinde tuber, quod nonnulli aschium uocant, & uingum, & quicquid sub terram aliud latitat, radices proculdubio erunt, quorū nullum forma constar radicis: hæc enim natura uiribus, non locis, discerni oportet: sed fortè recte id quidem dicitur, illud tamē radix nihilominus est. Sed illa quoq̃ radicis differentia reddi debet, ut alia tanta, alia talis sit, alteraq̃ alimentū ab altera capessat: quanq̃ & ipsæ, & earum carnosæ illæ alimentum sibi attrahere uidentur. Arorum itaq̃ radices rustici alunt anteq̃ germis  
 30 na ædere inceperint, redduntq̃ ampliores, dum germinandi impetum cohibent: omnium enim eiusmodi naturam deorsum uersus potius uergere, manifestum est. Caules enim atq̃ in totum partes supernæ, breues, imbecillesq̃ sunt: inferæ autem, grandes, frequentes, ualidæ: nec solum in prædictis, uerum etiam in harundine, gramine, deniq̃ omnibus quæ harundinacea, ijsq̃ similia sunt: quæq̃ ferulacea, horum quoq̃ radices grandes, atq̃ carnosæ.

De Croco, perdicio, uingio, laſerpicio, maguſeri, & platano in Lycio.

Cap. XI



Leraq̃ etiam herbariorū radicibus eiusmodi continentur, ut aspalax, crocum, quodq̃ perdicium uocatur, quod perdices se ad id uolūtē, terramq̃ suffodiant. Pari modo, quod Aegyptij uingum appellant: etenim folia eius ampla, & germen pusillū, sed radix longa, & in modū fructus, & cibo idonea. Colligunt id, cum amnis effusus fuerit, eoq̃ deorum aras exornant. Euidētissimā & maximam præ cæteris differentia laſerpiciū obrinet, & quæ Magydaris nominata est: harum enim utriq̃, omnibusq̃ huiusmodi natura radicibus potius constare tota uidetur: igitur hoc ita sumendum est. Quædā autem ex radicibus plures differentias præter prædictas fortiri apparent, ceu Arachidnæ radix, eiusq̃, quod simile est araco: ambæ nanq̃ fructū non minorem superno afferunt. Pars ipsa carnosæ radicem simplicem, crassam, altius infundendam mittit: cæteras uero quibus insidet fructus, tenues, ac summo cespere cohærentes agit: loca arenosa potissimū amant: neutrum folia gerit, neq̃ folijs quicq̃ simile, sed quasi binorum fructuum, partibus inter se oppositis, fecunda potius extant, quod mirum profectò est. Naturæ, uirēq̃ plantarum tot differentijs uariant:

Radices omnium prius, quam partes supernae augescunt: nulla tamen subire altius potest, quam solis calor attingat: calor enim est, qui uim habet gignendi. Ceterum uel natura humi ad radicis altitudinem, longeque magis ad longitudinem plurimum conferre uidetur, si leuis, rara, transeatuque facilis sit: nam in eiusmodi locis ulterius producit, & maiora incrementa sequuntur. Constat id maxime in genere urbanissimorum: haec enim, si aquae copiam habent, in quantum libeat progredi possunt: praesertim si locus inanis sit, nec aliquid obstat, ceu puteus, aut aliquis aqua ductus, quemadmodum in Lycio platanus, apud aqueductum nouella adhuc, circiter tria ac triginta cubita misit: cum simul & copiam alimenti, & loci liberale spacium adepta fuisset. Ficum (ut ita loquar) longissimam radicem habere putaueris: ad summam, quae raro corpore sint, rectamque agant radicem, longius mittunt: & nouae, si ad uigorem aetatis suae peruenierint, magis quam ueteres, longitudine, altitudineque radicis fulciantur: quippe cum etiam radices una cum reliquo corpore diminui soleant. Succipariter omnium radicum insuauiores, quam fructus sui habent: quarundam etiam penitus ferè insuaues: quamobrem sunt, quae radicem fortitanè amaram, quamquam fructus ipsa praedulces pariant.

Qualitas radicis iridis, & ficus Indicae, & lupini uis.

Cap. XII



Edicatae nonnullae, odoratae aliae, ceu iridis: natura, uisque peculiaris radicis fico Indicae. Illa enim à germinibus mittitur, quatenus se fico parenti coniunxerit, tellurique tunc inhaerescit. Fit itaque circum arborē frequens radicum concursus, qui caudicem nequaquam attingit, sed ab eo paulò distat: huic simile, uel potius quodammodo mirabilius, si quid ex folijs radicem dimittat, qualem circa Opuntem herbulam esse quandam enarrant, cui datum est, ut & mandisua uitate possit. Quod enim lupinis inspicit, minus mirum, ut si sub alta serantur materia, radices obstitentes summum uersus terrae perferant, ualenterque germina edant. Radicum differentias istis conspiciari ipsi debemus.

Quae arbores enodes, quae nodosae, qualitas nodorum, cecili, rodi, ceradae, gongri.

Cap. XIII



Rborum autem uel tales differentiae capi possunt: sunt enim aliae nodosae, aliae enodes, tam natura quam loco, pius minus uel: enodes inquam, non ut nodo omnino careant (talis enim arbor nulla esse uidetur) sed si quid eiusmodi sit, locum inter alia obtinet, ceu iuncus, tippa, gladiolus: ad summam, si quid inter palustria sit: sed ita enodes accipi uolo, ut nodos paucos naturae ordine habeant, qualis sambucus, laurus, ficus: denique omnia quibus cortex leuis, quae uel concauo & laxo corpore surgunt: nodosa, olea, pinastrer, oleaster. Horum alia in umbrosis, & à uento silentibus, & dilutis locis: alia in apricis, & hybernis, & gelidis, & macris, & aridis: nam inter eas, quae genus idem fortituntur, quaedam minus nodosae: ad summam, montanae campestribus, & siccae palustribus nodosiores. Item ratione satus, etenim crebrae enodes, atque procerae, rariæ nodatiores, contortioresque assurgunt: sit enim ut alterae sint in umbrosis, alterae in apricis. Mares quoque foeminis nodosiores, ubi sexus haberi uterque potest, ut cupressus, abies, ostris cornus: genus enim quoddam, cornum foeminam uocant. Syluestres nodosiores urbanis, tam simpliciter, quam quae sub eodem genere statuuntur, ut oleaster, olea: caprificus, fico: pirus, pirastro: haec namque omnes nodosiores, omnes spissae, raris corpore magna ex parte nodosiores: mares enim, syluestresque spissiores, praeterquam si qua ob nimiam spissitatem omnino enodis sit, aut paucissimis nodis, ut buxus, ut celtis. Quibusdam nodi inordinati, utque forte euenit: quibusdam ordinati tam interuallo quam numero, ut retulimus: ob id eas egregias uocant: quibusdam enim paritas ferè undique seruatur: quibusdam assidue grandius, quod crassiori adiacet parti, idque pro ratione, quod in oleastris & harundinibus praecipue patet: geniculum enim, ueluti nodus

ti nodus est: quidam inuicem respondent, ut oleastrorū: quidā promiscui, utq; fors tulit, extant. Sunt quaedā binis, quaedā ternis, quaedā pluribus nodis, nonnullā quatinis. Abietis recti, & nodi, & rami quodammodo infixi, ceteris aut minime: quamobrem abies ualidissima est. Mālo profectō nodi peculiāres, faciebz enim belluarū similes extant: unus pregrandis, alij circa eum parui complures. Nodorū alij cēci, alij fecūdī. Cēcos appello, quibus nullū germen enasci potest: qui non solū natura, sed etiam lēfione fieri solent, cum pars arboris ictu aliquo disiecta, ad uulnus consolidandum enitens, oris undiq; plagā circumactis, callo cicatriceq; tumuerit: crassioribus ramis id potissimū euenit, nonnunq; etiam caudicibus: ad summā, quamcunq; partem caudicis, aut rami incideris, uel disieceris, nodus ibidem nascitur: tanq; si quod unum est dirimens, alterū principiū facias: siue ob eam ipsam lēfionē, siue ob aliam causam: ictus enim naturā contrarius est. Ramuli omnīū nodosiores semper uidentur, quia minimū ijs internodiū interiacer: quēadmodū ficulnei, qui nuper prouenerint, tactu asperrimi sunt, & uitis palmitū summitates: ut enim nodus in ceteris, ita gemma in uite, & geniculum in harundine. Quibusdā ueluti cradē gignuntur, ceu ulmo, robori, & præcipue platano: quæ si in asperis, aridis, uentosisq; locis stent, ita omnino fiat necesse est: deniq; qui proximus terræ, & quasi iuxta caudicis caput concreuerit, hic senescens, crassior redditur. Nonnullæ gongros à quibusdā uocatos habent, uel quod pro arboris natura respondeat, ut olea: quippe cum nomē id maxime oleæ conueniat, eoq; morbo plus, q; ceteræ laborare uideat: premnum id nonnulli appellant, alij crotonā, alij alio noie utuntur. Rectis unistripibus, minusq; ab imis plantigeris, id aut nullo pacto, aut minus accidere solet. Olea, & oleaster, uel caudicum concauitates peculiarem in modum habere uidentur.

*Quæ longe & ramosæ arbores.*

*Cap. XIII*



Vnt igitur aliæ ad longitudinē tantum aptæ potissime augeri, ut abies, palma, cupressus: ad summā, quæ simpliciore assurgunt caudice, quæq; haud multis radicibus, neq; ramis frequētibz patent: aliæ pro sua natura his ipsis respondent, tam longitudine, quam profunditate: nonnullæ illico in ramos spargunt, ceu mālus: quaedā ramosæ, molemq; superiorem grandiorē gestantes, ut punica. Veruntamen ad singula, & locus, & alimentum, & cultus, plurimū ualet: indicium, quod eadem, si crebræ serantur, excelsæ, gracilesq; reddent: si raræ, breuiiores atq; crassiores: & si confestim ramos succidas, purgesq;, excelsæ ut uitis: si relinquant, breues assurgent. Quinetiam illud fidē satis præstare potest, olerum enim nonnulla arboris figurā capeffunt, ceu malua betaq; (ut dictum iam est) omnia locis suis melius augescunt: nam & inter ea, quæ genus idem sortiunt, quæ suis in locis manent, enodiora, ampliora, pulchrioraq; extant, ut abies macedonica præstātor, quam parnasia, ceteraq; spectatur. Quæ quidem omnia, atq; in totum syluestris materies pulchrior, & cōmodior, & copiosior parte montis aquilonia, quam meridiana enascitur. Aliæ item perpetuō uiuent, aliæ folijs deciduis sunt.

*Quæ semper uiuant, & quibus folia decidant, ut platani in Creta, & quercus Sybari.*

*Cap. XV*



Irent ex urbanis perpetuō, olea, palma, laurus, myrtus, pini genus quoddam, cupressus: ex syluestribz, abies, pinafter, iuniperus, simlax, thuia, & ea, quā Arcades phellodryn appellant, ulia, cedrus, picea, myrica, buxus, ilex, aquifolia, celastrus, philyra, acuta spina, apharca, quæ monte Olympo proueniūt, potulaca, arbutus, terebinthus, laurus. Potulaca, atque unedo folia inferiora dimitunt, cacuminibus perpetuō uiuent, ramisq; assidue præ

postero gignunt. Hęc in arborum genere. Fruticum autē, edera, rubus, harundo, rhamnos, cedrula: est enim quiddā pusillum, quod nunq̄ arbore scit. Suffruticū, herbarumq̄, ruta, brassica, rosa, viola, abrotonum, sansucum, serpyllus, organū, apiū, equapium, papauer, & syluestriū genera complura. Ex his quoq̄ nōnulla cacumine perdurant, amissis reliquis, ut apium, equapiū, organum: nam & ruta affligitur, atq̄ mutatur. Omnia uero tam in his, q̄ in reliquis generibus, quā coma perpetua uirent, folijs angustioribus sunt, & pinguedinem quandā, suauemq̄ olentiam reddunt: nōnulla quanq̄ sua natura semper uiuere nequeant, tamen ex loci causa, folia nunq̄ dimittunt, ut dictū de his est, quā in agro elephantino, Memphicq̄ proueniunt. Atqui inferius ea parte, quam delta, à triquetra figura uocitant, parum intercipit temporis, quin perpetuō uiuant. In Creta insula, agro Cortynensi, platanum apud fontem quendā stare asseuerant, quā nunq̄ folia deperdit. Iouem sub ea cum Europa concubuisse fabulant. Quercus in agro Thurio est, ubi Sybaris perspicua, quā nunq̄ folia dimittit: eam non unā cum alijs germinare aiunt, sed post ortum canicule. Talem & in Cypro esse platanū fertur. Omibus autumno, & per autumnū folia decidunt: alijs tamen ocyus, alijs tardius, ut quādā etiam ab hyeme occupent. Foliorum iactura non ita germinationi respondet, ut quā prius germinauerint, prius folia dimittant: sed nōnullā germinant quidē prēmaturius, sed nihilo ante ceteras folia dimittunt. Quinimō quibusdam tardiores inceptant, ceu amygdala. Quādam serotinā germinare esse solent, sed nihilo (ut ita dixerim) tardius, q̄ ceterā, folia deperdunt, ut morus. Regio autē solumq̄ madidū plurimum ad perdurandū conferre uidetur: quā enim in siccis, atq̄ in totum tenuibus locis extant, prius folia dimittunt: & ueteres prius quā nouā: quādā & antē quā fructū præcoquant, folia deperdunt, ut serotinā fici, & piri syluestres. Illis, quā perpetuō uirent, occasus, ortusq̄ uicissim occurrunt. Non enim semper eadem durant, sed alia proueniunt, alia exarescunt: idq̄ circa æstiuum solstitiū maxime faciliari uidetur. An quibusdam etiam post Arcturi ortum, aut secus, in aliqua regione fiat, considerandum relinquo. Foliorum occasus ita se habet,

De foliorum differentia & figura: de lauro Alexandrina.

Cap. XVI



Olīa uero in ceteris omnibus arboribus sibi ipsa similia sunt: populi autem, atq̄ edera, eiusq̄ qui croton uocatur, dissimilia, figuraq̄ diuersa habentur: noua enim orbiculantur, ueterata in angulum exeunt; inq̄ id omniū mutatio definit. At edera contra: dum enim noua est, angulatiō folia gerit: cum autem ætate prouecta fuerit, rotunda: nam ea quoq̄ apta est folijs immutari. Illud sanē peculiare, quod olea, tilia, ulmo, populo euenire uidetur: uertunt enim partes supinas mox post solstitiū æstiuum: eoq̄ argumento rustici solstitiū confectū intelligunt. Omnia folia parte prona, supinaq̄ inter se distant: ac ceterorū pars supina uiridior, atq̄ leuior est: neruulos enim, & uenas in pronis habent, sicut manus. Oleaginosū uero pars ea ipsa candidior, minusq̄ leuis: edera quoq̄ frondes leues parte superna habet. Omnia, aut certe plurima parte supina, perspicua pendent, eaq̄ Soli exponunt, uertunturq̄ magna ex parte solem uersus: quapropter haud facile dixeris, utra pars potius ad ramulum uergat: quippe cum resupinatio quidē partem proximiorē pronam reddat, natura uero nō minus supinā uelle uideatur, præsertim cum reflexus Solis causa fiat. Facile id spectari in ijs potest, quā crebra, ordinataq̄ sunt, quemadmodū myrti. Nonnulli & alimētū parū supinā per pronā deferri existimāt, quia mādida semper, lanuginosaq̄ est. Sed non rectē, id enim absq̄ natura propria fortasse contigit, quia nō simili modo alterant. Alimētū uero per uenas aut neruos, æque ambabus deferri partibus.

Ex altera

Ex altera enim ad alteram deferri nulla ratio est, cum meatus non habeat, neque  
ima quæ subeat. Sed de alimento, quibus tandem ministrantibus offeratur, altera di-  
sputatio esse debet. Folia uero pluribus ipsa quoque differentijs inter se distare ui-  
dentur: quippe cum arborum alijs ampla sint, ut uiti, fico, platano: alijs angusta, ut  
oleæ, punicæ, myrto: alijs rara, ut pino, abieti, cedro: alijs ueluti carnosæ, scilicet quia  
pulpa constant, ut cupresso, myricæ, mælo: & in fruticum genere, cneoro, stibæ: &  
herbarum, semperuiuæ, polio, quod contra uermiculos noxios uestimentis inter-  
positum ualet: nam betarum folia, aut brassicarum, earumque, quas rutulas uocant,  
alio modo carnosæ sunt: caro enim in altitudinem distenditur, non in rotunditatem  
10 crassatur. Myricæ inter frutices, folium carnosum: nonnullis harundinaceæ, ut pal-  
mæ, coici, cæterisque similibus, quæ ( ut in uniuersum loquar ) folijs angularibus con-  
stant. Etenim harundo, gladiolus, butomus, cæteraque palustria, folijs eiusmodi sunt.  
Cuncta autem folia, quasi ex duobus constare uidentur, mediumque ueluti cari-  
nam habere, unde & cæteris meatus medius amplius porrigatur. Differunt item fi-  
gura: alia enim orbiculata, ut piri: alia oblonga, ut mæli: alia in acutum producta, &  
in angulum depressa, ut edere Ciliciæ. Ad hæc alia multifida, & quasi ferrata, ut abi-  
etis, filicis: uitis quoque aliquatenus fissæ, fici laciniata, & ( ut ita dixerim ) crucifor-  
mia: nonnulla infecta, ut ulmi, roboris, nucisque auellana: quædam cum extremo,  
20 tum lateribus sinuata concidunt, ut filicis, roboris, similacis, rubi, paliuri, aliorumque:  
pini quoque, laricis, abietis, atque etiam cedri, & cedriæ extremitate pungentia.  
Quod spinas omnino pro folijs habeat, nullum inter arbores est, quod nos quidem  
nouerimus: at in genere materiæ humilis, spinæ pro folijs, acorne, drypidi, acano,  
omni que penè generi spinoso: his enim omnibus loco folij, spina oritur. Quod si  
quis folia hæc esse negauerit, carere folijs ea omnino sequetur, ut quædam aculea-  
ta quidem sint, folium uero habeant nullum, ceu asparagus. Rursus alia pediculo  
carent, ut scyllæ, bulbi: alia habent. & alia longum, ceu uitis, edera: alia breuem, ut  
quasi infixæ cohæreant, ceu oleæ, non sicuti platani, & uitis propendentia, atque  
tremula. Illud quoque differentiam facit, quod non ex eisdem partibus pendeant,  
30 sed plurimis quidem ex germine, nonnullis uero ex ramo, robori etiam ex caudice.  
Oleribus ex maiore parte folia ilico ab radice exeunt, ut cepæ, allio, intubo errati-  
co: ad hæc hastulæ regiae, scyllæ, bulbo, isirinchio: atque in totum bulbosis, quorum  
non solum, quod primum oritur, uerum etiam caulis omnino sine folijs est. Quo-  
rundam enim folijs iam perfectis caulis conuenienter talis assurgit, ut lactuca, ocy-  
mi, apij, & frumentorum. Simili modo nonnulla ex his caulem primo mitem, post  
horridulum spinulis gerunt, ut lactuca, & cuncta folia spinosa redduntur: atque et  
am magis in fruticum genere, ut rubus paliurus. Omnium autem pariter arborum,  
atque reliquorum differentia publica, quod alia multis folijs, alia paucis constant:  
& alia latis, alia angustis: & alia ordinatis, ut myrtus, alia inordinatis, utque forte in-  
ciderit, ut maior penè pars cæterarum plantarum. Peculiare in oleribus, ceu cepa,  
40 gethyo, foliorum concauitas. Ad summam, foliorum discrimen, aut magnitudine,  
aut multitudine, aut figura, aut latitudine, aut angustia, aut cauitate, aut asperitate,  
aut leuitate, aut quod aculeis horrent, uel non. Ad hæc dependentia, unde, quo:  
unde, id est, ab radice, aut germine, aut caule, aut ramo: quo, id est, pediculo, aut si-  
ne ipso: cuius etiam generis complura spectantur: fructiferaque nonnul-  
la fructum folijs interceptu gerentia, ut laurus Alexandri-  
na, quæ fructum super folijs gignit. Foliorum  
differentias iam communius dixi-  
mus, hisque penè continentur.





Onstant autem foliorum alia ex neruo, & cortice, & carne: ut fici, & ut  
tis: alia quasi ex neruo tantum, ut harundinis, frumenti. Humor com-  
munis omnium est: omnibus enim inest, tam his, quam reliquis annu-  
is, ceu pediculo, flori, fructui, quicquid aliud ueniat: uel potius & ijs,  
quæ minus annua sunt: nihil enim est, quod careat humore. Pediculo-  
rum alij ex neruo constare tantum uidentur, ut harundinis, frumētī: alij ex eisdem,  
quibus caules. Florum alij ex cortice, & uena, & carne: alij ex carne tantum, ut qui  
inter lolia nascuntur. Fructus quoque simili modo: alij enim ex carne & neruo, alij  
ex carne tantum, nonnulli etiam cute constant. Humor hos quoque omnes comi-  
tatur: ex carne & neruo, ceu prunorum, cucumerum: ex humore & cute, mori, pu-  
nica. Alij secus distinguuntur. Omnium (ut sic dixerim) pars exterior, cortex: inter-  
rior, caro: quorundam etiam nucleus.

Semina arborum, & que semina congesta, & que discreta. De siliqua,  
hoc est ficu ægyptia. Cap. XVIII



Ostremum in omnibus semen est: hoc humorem, caloremque insitum  
in se habet: qui cum desierint, semen infecundū, sicuti urinum ouum  
relinquitur. Quorundam semen protinus post tegmen ambiens sub-  
est, ut palmæ, nucis, amygdalæ, quibus ambientia plura utique sunt, ceu  
palmæ: quibusdam caro & nucleus interiacent, ut oleæ, pruni, alio-  
rumque. Alia siliquis includuntur, alia folliculis uestiuntur, alia uasculis continentur:  
quædam etiam nuda patent in siliquis annua, ut legumina, & syluestrium pleraque.  
Quin & arborum quædam, ceu siliqua, quam ficum ægyptiam quidam appellant:  
& cercis, & coloetia circa Liparam: in folliculo ex annuis quædam, ut triticum, mili-  
um. Simili modo uasculo inclusa, & nuda: in uasculo, ut papauer, quæque papaueri  
similia: nam sesamæ modus quidam peculiaris. Nudo semine olerum pleraque, ut  
anetum, coriannifum, cuminum, feniculus, pleraque alia. Arborum nulla semine  
nudo, sed aut carne obducto, aut cute, aut crusta, ceu glans & euboicum: aut ligno,  
ceu amygdala & nux. Nullum in uasculo semen arboris est, nisi conum uasculum  
dixeris, quod absolui de fructibus potest. Semina ipsa quibusdam protinus carno-  
sa, ceu illa, quæ nucum, & glandium genere comprehenduntur. Quibusdam caro  
in nucleo est, ceu oliuæ, lauro, & alijs. Non desunt, quibus in nucleo tantū, uel nu-  
cleacea, & quasi retorrida constant, ceu cnico, & similibus: necnon & multis oleri-  
bus, palmæ profecto euidentissima: cavitatem enim nullam hæc habent, sed tota ple-  
na, atque persolida sunt: tamen his quoque humor quidam, calorque inest, ut di-  
ctum est. Differunt præterea, quod alia congesta, atque promiscua: alia discreta, at-  
que distantia, ut cucurbitæ, cucumeris: & in arborum genere, fici, mali. Quin & con-  
gestorum ipsorum quædam putamine aliquo, aut tunica continentur, ut punica,  
mali, piri, uitis, fici: quædam congesta quidem, sed nullo inclusa, ut eorum, quæ spi-  
cam inter annua gerunt: nisi quis spicam ipsam ambiens quoddam esse putauerit.  
Quod si ita sit, racemus quoque ita se habebit, ut reliqua, quæ racemata æduntur,  
quæque uniuersa ob fertilitatem, uirtutemque soli prodeant: quemadmodum Syriæ,  
alijsque locis oleas fructificare affirmant. Quinetiam illud pro differentia quadam ac-  
cipi posse uidetur, quod alia uno pediculo, singulariterque annexu congesta gignun-  
tur, ut de racemis, spicisque diximus, nullo ambiente communi tegmine proueni-  
re: alia secus. Nam unumquodque semen, aut ambiens, seorsum acceptum, princi-  
pium annexus proprium habere uidetur, ut acini, tum uitæ, tum punici. Item triti-  
cum, ordeum, malorum, pirorumque, ubinam coniungantur, comprehendanturque

que, uelut membrana quadam, quam caro fructus obducit, minus perceperis, tamē uel eorum quodque principium habet proprium, & naturam distinctam: sed punici idcirco euidentissima, quod expressius discernuntur: nucleus enim cuique adhæret: nec quemadmodum ficuum incerta, præ nimio suo humore conculcatur. Hoc enim inter se distant: quanquam utraque carne quadam, & eo, quod carnem cum cæteris comprehendit, continentur. Hæc enim circa nucleū unumquęq; carnosum illum habent humorem. Granum uero ficarium commune quasi omnibus est, sicuti & uinaceum, & quæ his similia. Sed eiusmodi differentias plures capere fortasse possumus, quarum præcipuas, maximęque naturales, haud ignorare oportet. Quæ autem pro saporibus, figuris, totisq; formis accipi possint, omnibus ferme explorata habentur, ut explanatione nulla indigeant, nisi tantum adusque quod fructus figura nulla rectilineus, neque angularis.

De succorum, odorumq; differentiis. Cap. XIX



Vccorum uero alij uinosi, ceu uitis, mori, myrti: alij pingues, ut oleæ, lauri, nucis, amygdalæ, pini, laricis, abietis: alij dulces, ut fici, palmæ, roboris, glandis: alij acres, ut origani, satureiæ, nasturtij, sinapis: alij amari, ut absinthij, fellis terræ. Odore præterea distant, ut aneti, cedrulæ. Quorundam dilutos putaueris, ut prunorum: alij acidi, ut puniceorum, & quorundā málorum. Sed omnes, qui uel huic generi contribuantur, uinosos putandum: alij alijs generibus assignantur, quorum singulos in libro de saporibus persequemur, tam genera ipsa numero amplectentes, quàm eorum inuicem differentias reddentes, quæ quæ uis cuiusque, naturæque sit. Arborum quoq; ipsarum humor, ut retulimus, uarijs generibus consummari uidetur: alius enim succo lacteo similis, ut fici, papaueris: alius resinaceus, ut abietis, pini, omniumque coniferarum: alius aquosus, ut uitis, piri, mális: & in olerum genere cucumeris, cucurbitæ, lactuæ. Nonnulli acrimoniam quandam fortiuntur, ceu thymi, satureiæ. Quædam etiam sua uolentiam præstant, ut apij, aneti, feniculi, reliquorumque similium. Omnes (ut absolute loquar) pro natura cuiusque arboris (utque in uniuersum transigam) plantæ, propriam differentiam sibi fortiuntur. Quippe unumquodque, temperamentum quoddam, missionemque obinet peculiarem, quæ scilicet fructibus subiectis conueniat: quorum pluribus quædā similitudo innotescit, quam incertior, sensuque dubia: scilicet ea de causa, quod saporis natura, puram, sinceramque confectionem, concoctionemque in carne fructus consequitur. Alterum enim, quasi materiam, alterum quasi formam, speciemque arbitremur oportet. Semina quoque ipsa, & tunica, quibus uestiuntur, saporum discrimine inter se distant. Vtq; simpliciter loquar, uniuersæ arborū, plantarumq; partes, ut radix, caulis, ramus, folium, fructus, cognationem quandam habere tota cum natura uidentur: quanquam odore, saporeq; differant: ut partium plantæ eiusdem, aliæ odoratæ, & bene sapidæ sint: aliæ inodoratæ, insipidæq; omnino.

De odoribus florum, & foliorum, & radicum, quotq; genera humor arborum habeat, deq; folijs, & fructu tilie.

Cap. XX



Vibudā enim flores inodorati, folia uero odorata: quibusdā ē ditterso folia magis & rami, ut coronario generi: quibusdā fructus: alijs neutrum, alijs radix, alijs pars aliqua. Similis & saporis ratio est: alia etenim mandique uent, alia nequeūt. Neq; folijs, neq; fructibus peculiare præcipue, quod in tilia cernimus: nam huius folia prædulcia, & plerisq; ani

maliū pabulo: fructus uero mandia nullo potest: e contrario nanq; nil mirū, ut folia non mandant. Fructus uero non tantū a nobis, sed etiam ab alijs animalibus mandipossint. Sed huius, ceterorumq; similium causas postea contemplari conabimur.

*Florum genera & differentia.*

*Cap. XXI*



Vnc exploratū illud habeamus, per omnes partes differentias plures uario modo exultare: nam & florū, alij lanuginei, ut uitis, mori, edere; alij foliati, ut amygdalæ, mali, piri, pruni. Item alij grandes habent: oleaginei uero foliati quidē, sed pusilli: pari modo & annuorū, herbaceorūq; genere, alij foliati, alij lanuginei. Cunctorū, alij bicolores, alij unicolores, ijdemq; candidi: quippe cum tantū ferē punicæ phoeniceus, & quarundā amygdalarū subrufus exeat. Nulla inter urbanas alia est flore uel bicolore, uel pleno: sed si qua sit, syluestris profectō est, ceu abies: flos enim eius croceus, & illi, quos in mari externo, rosis colore similes tradūt. At in annuorum ex maiori penē parte tales exeunt, & bicolores, & bini: bini inquam, quod in flore alterum florem insidentem mediū gerunt, ut rosa, uiola nigra, liliū: nonnulli etiam folio uno emergunt, descriptionem tantum plurium ostendentes, ut flos iasionæ: in hoc enim haudquāq; folium unumquodq; discernitur: nec conceptaculo pars infima eget, sed postremo in angulos exeunt. Oleæ quoq; flos penē talis esse uidetur.

20

*Qualis flore scens uitis, olea, rosa, mali medicæ, & punicæ flos.*

*Cap. XXII*



Ifferunt etiam ortu & positu: alia nanq; florem circa fructū ipsū producant, ut uitis, olea: cuius prostrati flosculi perforati spectant, idq; argumento capitur propē arborē defloruisse: nam si exaruerint, aut madefacti fuerint, unā cum fructibus defluent, atq; ita nullatenus perforabuntur. Maior ferē pars, fructum in medio floris tenet. Sed non defunt, quæ uel super fructū ipsū florem insidentē emittant, ut punica, mālus, amerina, prunus, myrtus: & in fructū genere, rosa, maiorq; pars coronariarum: semen enim sub floribus habent: sed conspicuū id in rosa, quia extuberat. Nonnulla etiam cum seminibus ipsīs flores ædunt, ut ueneria, cnicū, atq; omnia quæ florem folio numero so producant: singulis enim seminibus, singulos flores annexos gerunt. Simili modo & herbaceorū nonnulla, ut gith: & in olerū genere, pepo, cucurbita, cucumis: quippe omnibus flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus, flos diū infixus seruatur: alia secus, modo quodā peculiari, ceu edera, morus: etenim florē hæc in totis fructibus habent: sed neq; postremis insidentē, neq; in singulas partes ambientem, in medijs inculcatū: nisi fortē concerni nequeat propter lanuginē. Sunt & simplices quidam flores, ceu cucumerum, qui postremis sarmentorum emergunt: ob id eos auferunt: cucumeris enim prohibent incrementum. Inter flores mali medicæ, qui ueluti colum quandam erectam in medio habeant, fecundos hos fore affirmant: qui uero non habeant, hos fore infecundos. An alijs quoque floriferis eueniat, ut florem sterilem gignant, siue separatum, siue non separatum, prætermitti non debet. Etenim genus quoddam, & uitis, & punicæ, fructum perficere nequit, sed ad florem usque generatio tantum peruenit. Flos quoque punicæ copiosus, crebërque est. Denique amplitudinem sui quodammodo pomi æmulatur: parum se subius attollens colligit, & ambitu congruo sinuatim reddit. Plantarum, quibus genus comune, alias florere, alias nullo flore exhilarari quidam affirmant, ut palmarum marem florere, sceminam minime, sed protinus fructum promere: igitur quæ  
genus

genus idem sortiunt, id differētię obtinent: sicuti & omnia, quę fructū perficere nequeunt. Floris naturam pleraq; differentias habere, satis his liquet.

*Quomodo distent in fructificando arbores.* Cap. XXIII



Arbores autē uel hisce in fructificādo distare uident: namq; alię fructū ex nouellis surculis gignunt, alię ex annotinis, alię de utrisq;. Ex nouellis, ficus & uitis: ex annotinis, olea, punica, mālus, amygdala, pirus, myrtus, omnesq; ferē similes: omnes enim ex annotinis. At si contingat ut aliquid concipiant atq; floreat (euenit enim id quoq; nonnullis, ceu myrto, ut sic dixerim: præcipue cum germinat post Arcturi exortū) id perficere nequeunt, sed semiconditū perit. Ex utrisq;, tam nouellis q̃ annotinis, si quę māli biferę sint, aut si aliquid bis fructificet. Item caprificus, quę maturat, ficusq; profert ex nouellis. Peculiaris maxime ortus, si quis fructus caudici prosiliat, ut moro ægyptię. Hanc em̃ ex caudice ferre nonnulli affirmāt: alij grandibus ex ramis eam fructificare, sicuti & siliquam dicūt. Hęc enim fructū uel ex his producit, nō tamē copiosum. Vocant enim siliquā, quę ficus ægyptias appellatas, producit. Arborū item alię cacuminibus fructificāt, alię lateribus, alię parte utraq;: sed plura ex alijs fructū cacumine ferunt, q̃ ex arboribus, ut frumentorū, quę spicam pariunt. Fructū, erica, pira, amerina. Olerū, quibus radix capitata. Parte autē utraq;, tam arborū quędā, q̃ olerum, blitum, atriplex, brassica: nam & olea idem quodāmodo facit. Cumq; cacumina ferunt, copię indicū esse dicitur. Palma quoq; fructū quodāmodo cacumine gignit: sed hęc & folia, & germina, cacumine gerit: quippe uis eius genitalis parte superiori tota consistit. Igitur differētijs quas particulatim capere decet, his contemplari conemur. Illę uero naturę totius esse uident, scilicet quod plantarū alię urbanę, alię syluestres, & alię fructifere, alię steriles & perpetuo uiuentes, & folia deperdētes, quemadmodū diximus. Quędā etiam in totū folijs carent, & alię florū succidę, alię insuccidę: & alię germine uel fructu præcoces, alię serotinę. Pari modo & reliqua his similia persequendū, & hęc quidē in partibus, aut nō sine partibus esse cōstat. Illa uero propria maxime, & quodāmodo maxima differētia, quę uel in animalium genere patet, quod alię aquatiles, alię terrenę. Plantarū enim genus quoddā eiusmodi est, ut nisi in solo madente nasci minime possit. Quędā nascunt quidē, sed non similes, sed longe deteriores. Cunctarū autē arborū plantarūq;, ut rem absolute contingamus, species in quoq; genere plures: quippe cum nihil ferē simplex sit.

*Replicantur differentię plantarum.* Cap. XXIII



Ed quę urbanę aut syluestres dicunt, hanc ipsam euidentissimā, summamq; differentia habeant, ut ficus, caprificus: olea, oleaster: pirus, piraster: pinus, pinafter. Quę uero in alterutro illorū genere collocent, harum differētia fructibus, folijs, cæterisq; formis, partibusq; percipitur. Sed syluestriū plurimę noie carent, expertiq; perpauci sunt: urbanarum aut plurimę noie suo noscunt, sensusq; earū cōmuniōr: Exempli gratia, uitis, fici, punice, māli, piri, lauri, myrti, reliquarūq;. Facit em̃ usus cōmunis, ut explorata differētię habeant. Illud quoq; utroq; in genere propriū: syluestres em̃ mare, aut foemina, uel solis, uel præcipue discernunt: sed urbanę generibus certe pluribus constant: quorū alia inuentu, numeroq; facilia: alia difficilia, scilicet causa uarietatis. Sed partū, reliquarūq; naturarū differētijs hisce cōtēplari tērandū. De generationibus aut post hęc referre cōgruū est: id em̃ prædicta quasi de cetero consuetari uident.

## 22 THEOPHRASTI DE HISTORIA PLAN

TARVM, LIBER SECVNDVS.

De modo generationis, stationisq; in arboribus.

CAPVT I



ARBORVM, & summatim plantarum generationes, aut sponte, aut semine, aut radice, aut auulsione, aut ramo, aut furculo, aut ipso trunco faciunt, aut etiam ligno minutatim conciso: nam eo quoque modo planta exoritur. Sed principatum in his spontanea obtinent. Quæ uero semine, radiceq; fieri solent, naturales maxime, inter reliquas esse appareat: nam ipsæ quoq; spontaneæ quodammodo sunt, & syluestrium ob id generi accommodantur. Reliquæ autem hominū arti, aut electui pertinent. Singula igitur modo ex prædictis aliquo erumpunt, sed pars maior pluribus sanè modis procreatur. Olea enim omnibus prouenit rationibus, præterq; furculo: defixa enim nequit germen citare, ut ficus ex crada, & punica ex uirga. Quancq; nonnulli adminiculo quoq; defixam ad ederam, uitam egisse communem, factamq; arborem affirmant. Sed id raro: illud uero ex maiore parte à natura facitari uidemus. Ficus quoque omnibus modis emergit, præterq; ex ramo & furculo. Mâlus & pirus, raro ex ramis. Cæterū cuncta magna ex parte, his quoq; enasci contingit, modo leues, non uelli, facileq; auciles petantur. Verū illi prouentus magis naturæ conueniunt. Cōtingens autem pro possibili accipi ratio est: quippe cum in totum, quæ ex supernis potius enascantur, paucissima sint: quemadmodū quæ ex palmitibus uitis proueniunt: ista enim nec ex prora, sed ex palmitibus exit, & si quid aliud eiusmodi annotetur, seu arbor, seu suffrutex: ut ruta, uiola, sisymbrium, serpyllus, elenium. Omniū itaq; communis maxime generatio, quæ auulsione, atq; semine fiat. Omnia uero, quæ semen ferunt, semine quoque gignuntur. Nasci & laurum ex auulsione affirmant, si quis sublatiis furculis ferat: sed quod auellitur, radicis, aut stipitis aliquid habeat oportet. Fieri tamen potest, ut & absq; eo, tam punica, quàm mâlus uerna exoriatur. Amygdala quoq; sata exurgere potest. Sed plurimis ferè modis uenire olea uidetur: nam ex trunco, ramo conciso, radice, ligno, uirga, item adminiculo, quemadmodū diximus. Myrtus inter cætera huic maxime similis: nam & ligno, & ramo prouenit. Ligna tam eius, q̃ oleæ, palmo minora diuidi haudquaq; oportet, neq; cortex detrahi debet. Arbores modis prædictis exeunt, atq; concalescunt: infusiones enim aut inoculationes, misturæ quædam, aut alio pacto generationes esse uidentur: de quibus postea dicemus.

Quomodo suffrutices herbæ iterumq; arbores nascantur.

Cap. II



Vffruticum autem, atq; herbarum pars maior semine, radiceq; nascitur, quædam etiam utroq;: nonnulla tamen ex germinibus, ut dictum iam est. Rosa & lilium, caulibus concisis, ut etiam gramen exeunt: caule quoq; toto propagato, rosa & lilium nascitur. Peculiaris maxime generatio, quæ ex lachryma fit: quippe lilium ita exire uidetur, cum id quod defluxit, sole exaruerit. Lachrymam quoque equapj uim eandem fortiri uolunt: etenim lachrymam id quoque emittit. Prouenit & quoddam harundinis genus, si quis in obliquum colos præcisas, fimo, terræq; abscondat. Peculiare quoque in ijs, quæ radice capitata coherant, ut ex radice proueniant. Cum autem uis genitalis tot modis comprehendatur, arborum pars utique maior, quemadmodū paulo antè retulimus, pluribus modis apta est exoriri. Sunt tamen, quæ ex semine tantum nascantur.

nascantur, ut abies, pinus, larix, summatim omnes coniferae, item palma: ni forte apud Babylonem ē uirgis quoque proueniat, sicut nonnulli asseuerant. Cupressus ceteris quidē in locis semine prouenit, in Creta autem insula etiam trunco, ut montosa in Tarra. Apud hos enim cupressus caedua est, quae ex caesura germinat, modis omnibus praecisa: nam & ab terra, & parte media, & superna: nonnuscūque loci uel ex radicibus germinat, sed raro. De robore diuersa sententia est, quidā enim ex semine tantum eam produci statuunt, alij ex radice quoque, sed lente: nonnulli etiam ipso caudice detruncato, aut uisione, aut radice, nihil ex ijs, quae ab imis plantigera nō sint exoriri posse arbitrant. Cunctorū autē, quorū generatio numerosior est, quae auulsiōne, atque etiam magis quae sobole perfici potest, ocyssima, & auctu perfacilis est, si ab radice soboles accipiantur: & quae sic, aut ullo pacto plantis serantur, haec omnia fructus similes afferre uidentur.

*Quamobrem degenerent interim sata, & quae non degenerent, seque meliores  
sunt quoque, & hoc in arboribus. Cap. III*



Vae autem fructibus eorū, quae sic quoque proueniunt, sata sint, haec (ut ita loquar) omnia deteriora reddunt. Quaedā etiam omnino degenerant, ut uitis, mālus, ficus, punica, pirus: quippe cum ex grano ficario nullum penitus genus procreetur, sed caprificus tantū, aut ficus syluestris erūgitur: colore etiam saepe numero discrepans, ex nigra enim candida, & ex candida nigra gignitur: ex uite quoque nobili, ignobilis, & saepe diuersa genere exit. Nonnunquā nil penitus urbanū, sed planē syluestre prouenit: & adeo quandoque, ut fructū persicere minime queat. Quaedā fructū ne compilare quidem ualent, sed ad florem usque tantūmodo ueniūt. Nascitur ex nucleo quoque olea, syluestris olea: ex acinis māi putnici glaucis ulia exeunt, & ex enucleatis dura, & plerumque acida: eodē modo ex piro uitiatum pirastrū: ex mālo tum deterius genere, tum acida ex dulci: & cotonea ex struthaea. Amygdala quoque degenerat, tum sapore, tum quod dura ex molli reddit. Idcirco adultam inserere, aut plantā saepius transferre praecipit. Quercus quoque deterior exit: itaque cum plerique ex ea, quae in Epyro nascitur, seruissent, nullo pacto prouenire similis potuit. Laurū, atque myrtum praestare interdū inquit, sed magna ex parte eas quoque degenerare, ne colorem quidē seruare, sed ex fructu rubro fieri nigrum, ut in Antandro. Plerumque cupressum quoque ex femina, marem prouenire affirmant. Palma inter ea, quae semine exeunt, & pinus conifera, & picea, tineosa maxime (ut sic loquar) persistere in totum uident. Haec igitur inter ea, quae mansuescere patiunt. Inter feroces autem plures genus suū seruare possunt, scilicet uirium portione, ut pore cum natura ualidiores sint: contrariū enim haud probe putaueris, nullā scilicet posse in illo ordine degenerare, atque omnino inter eas, quae semine tantummodo exeunt, nisi quod cultura ualeat immutari. Loca quoque a locis differūt, et aer ab aere: quibusdā enim in locis regio similia proferre uidetur, ut etiam in Philippi: picea contrario uero pauca, paucisque in locis mutant, ut ex semine syluestri urbanū, aut ex deteriori absolute gignat melius: id enim de punica tantū in Aegypto Ciliciaque euenire accepimus. Namque in Aegypto acidam tum semine, tum planta in dulcem quodāmodo, aut uinolentā conuertit. Cilicie uero circa Solos, iuxta amnem Pinarū, quā contra Darium dimicātū est, omnes sine nucleo surgūt. Quod si quis etiā palmā nostratē in Babylone serat, reddi fructiferā, & loci illius domesticis similem, consentaneū est. Eodē modo, & si qua alia rellus ad aliū fructū ita se habet: etenim omni cura, culturaque exuberantior iste persistit: indicit quod ea quae aliorum inde transferunt, pinus steriles cū: quaedā etiā germinis infœcunda omnino reddunt: quin & alimento, ac reliqua opera permutant: & ut syluestres mitescāt, & urbanarū ipsarum

THEOPHRASTI DE HISTORIA

quædam neglectæ immiteſcant, ceu punica, amygdala. Quidā etiam ex ordeo, tritico: & ex tritico, ordeum gigni, eodemq; fundo id fieri aiunt: ſed hæc pro fabuloſis quibuſdā accipies. Quæ enim hunc in modum mutari poſſunt, ſponte ſanè mutari oportet. Diuerſitate autem regionis mutatio ſequitur, ut in Aegypto & Cilicia: de punica diximus nulla adhibita cultura. Eadem ratio ubi fructifera ſterileſcant, ceu perſicum Aegypti, & palma in Græcia: & ſi quis eam, quæ in Creta inſula populus nigra uocetur, tranſtulerit. Quidam & forbum ſterileſcere uolunt, ſi ad loca feruentia uenit: hæc enim ſua natura, frigida quærit. Vtrunq; ex contrarietatibus accidere ratio eſt, ſiquidem nonnulla ſolo mutato, naſci omnino reuſent. Mutationes, pro ſoli natura, tales proſectio accidunt: pro ſatu autē, quæ de ſemine diximus. 19  
Nam & eorū, quæ ſemine ſeri poſſunt, numeroſa notatur mutatio. Punica & amygdala, cultura mutantur: punica, ſi ſimum ſuillum, aquarūq; fluentium copiam adiſcatur: amygdala, ſi quis paxillum adigat, lachrymamq; deſluentem diutius auferat, reliquumq; cultum impendat. Pari modo, quæ ex ſylueſtribus manſueſcunt, aut ex urbanis tranſeunt in ſylueſtres, quædā cultu, quædā autem neglectu mutantur: niſi quis non mutationes quidem illas, ſed cōimenta, ſue acceſſiones in melius, deteriusue putauerit. Neq; enim oleaſter, olea: nec pyralter, pyrus: nec capriſicus, ſi cuſ fieri poteſt: quod enim oleaſtro accidere dicunt, ut ſi ſurculos decidas, aut in totum tranſferas, germen oleagineū proferat, magna quædam mutatio eſt. Sed hæc utro modo accipi debeant, nihil referat.

20

Oſtenta in arboribus. Cap. IIII



**A**D hæc fortuitam quoq; mutationē fieri aiunt interdū fructuum, nonnunq; arborum ſummatim ipſarum: quæ quidē aruſpices oſtenta eſſe exiſtimant: exempli gratia, puniçū acidum edere dulce, & dulce acidum: rurſus arbores ipſas, ut ex acida dulcis, & ex dulci acida ueniat: ſed deterius in acidam, q̃ in dulcem mutari. Item ex capriſico, ficum, & ex fico, capriſicum: ſed de fico in capriſicum deterius, & ex olea, oleaſtrum: & ex oleaſtro inuicem oleam, quod raro euenit. Rurſus ficum ex candida, nigram, & ex nigra candidam: pari etiam modo, ut ex uite. Ergo hæc tanq; prodigia, & præter naturæ normam accidere arbitrantur: ſolita uero, nullo pacto mirantur, ut quod in uite quam capneium uocant, cernitur: nam ex nigro racemo, candidū, & ex candido, nigrum, hæc præſtat. Neq; enim aruſpices iſta interpretant, quoniā ne illa quidem, quæ ratione regionis mutari ſoleant, quemadmodū punicam in Aegypto mutari propoſuimus: ſed hic ita fieri mirum, quoniā una tantum, aut duæ, & hæc raro per uniuerſum tempus mutantur. Et ſi aliquando ita ſit, in fructibus potiùs diſcrimen, q̃ in totis arboribus percipitur. Nam talis quoq; rei temeritas, fructibus nonnunq; contingit, ut ſicus poma auerſa ramulis ferat, & punica, uitisq; caudice ſuo fructificet: ad hæc uitis fructum abſq; folijs produxit: olea, folijs amiſſis fructificauit, quod & Theſſalo Piſiſtrati filio accidiffe proditū eſt. Nonnunq; ratione hyemis, aut alias 40 ob cauſas quædā accidunt, quæ normæ naturali incongrua iudicantur: cum tamen non ita ſit, ut olea penitus aliquando aduſta, reſurginauerat tota. Bœotie uero germinibus omnibus à locuſtis deroliſ, iterum germinauit. Sed hæc haudquaq; pro abſurdis animaduerti forſitan debent, quippe cum ad manifeſtas cauſas redigi poſſint. Sed potiùs, ſi non ex proprijs locis fructificent, aut non fructus proprios ferāt, natura tota immutatur, ut diximus. Mutationes arborum tales adnotantur.

Quæ herbe degenerent, meliores ſciantur: Si ſymbrium in mentam, triticum in lolium, legumina coſtibia, & incoſtibia, & quo pacto craſſeſcant. Cap. V

Ex re



reliquis autem plātis, sisymbrium, nisi cultura coerceatur, in mentam mutari uidetur. Quamobrem sapius id transferre cōsueuerunt. Triticum in lolium transit. Sed hæc in arborum genere, si ita sit, sponte, fortuitoq̃ eueniunt. Annuis autem paratu quodam, & opera contingunt, ut tīpha, semenq̃ mutari in triticum solent, si pista serantur: idq̃ non protinus, sed anno tertio. Quod similiter ferē sit, atq̃ cum semina ratione locorum permutantur. Nam ea quoque singulis in locis temporis spacio pari ferē, atque tīpha mutantur. Triticum quoq̃ syluestre, & ordeum, culta & mirigata per temporis tantundem mutantur, & hæc fieri mutatione loci, culturaq̃ uidentur, Nonnulla etiā utroq̃ modo. Quædam cultura tantum, ut legumina: ne incoctibilia fiant, nitro pridie macerata ferere in sicca tellure, præcipiunt: lentem, ut crasse scar, paxillo demittunt: cicer, ut grandescat cum putaminibus madefactū obseritur. Temporum quoque ratione semina immutantur, ut leuiora, facilioraq̃ reddantur: ut si seruum quis Vere serat, facile, gratumq̃ exit, non graue, quemadmodum si autumno seratur. Fit & in oleribus cultura causa mutatio, ut apium, si satum conculetur, cylindroq̃ spissetur, coæqueturq̃, crispum inquirunt provenire. Mutantur item, regione, tellureq̃ mutata, ut etiā cætera. Hæc esse omnium communia constat. An uero ob aliquam offensam, aut demptionem partis, arbor reddi infœcūda possit, quemadmodum animalia, prætermittendum non est. Ergo secundum red-  
ditam illam diuisionem, nihil ad plus minus ue ferēdum causa detrimenti notatur, sed aut totum perit, aut incolume perdurans fructificat. Senectū uero communis quædam corruptio generibus omnibus accidit: absurdum uero plantas sponte ori-  
ri, mutariq̃ appareat.

*In animalium genere mutationes.*

Cap. VI



Am in animalium genere potius huiusmodi fieri mutationes naturales, pluresq̃ profecto cernuntur. Quædam enim temporis ratione mutari uidētur, ut accipiter, upupa, & similes uolucres. Item pro locorum mutatione, ut coluber stagnis exiccatis marcescit. Euidētissima uero non-  
nulla cum in generatione consistunt: mutantur enim per animalia plura, ut cum ex tineæ eruca, tum ex ea papilio gignitur: inq̃ alijs pluribus hoc euenire notatum est: sed forte id non absurdum, nec simile huic quod quærimus est.

*De satū, & scrobibus, & radice, & positu arborū, & satione ficus.*

Cap. VII



Erum ita arboribus summamq̃ omnibus terræ stirpibus euenit, ut antē iam dictū est, quod sponte germinetur facta mutatione quadam, ex ui aspectus cœlestis, generationes, mutationesq̃ hisce cōtemplandum. Cum uero cultus, operaq̃ plurimum ualeat, atq̃ etiā magis satus magnas differētiās faciant, de his quoq̃ referre condecet, & primo de satū. Ergo tempora antē exposuimus, quibus plantas quamprimum petere conueniat, & a solo simili eius quo ferendum statueris, aut etiā deteriore: scrobes uero tempore antē longissimo, atq̃ altius semper defodiendum, etiā ijs, quæ telluri summæ adherent. Radicem autem nullam altius descendere ternis semipedibus quidam uolunt: itaq̃ illorum cōsiliū improbant, qui altius ferunt, sed haudqua-  
recte id affirmasse in pleriq̃ uidentur. Nam si aut solum altum, aut regionem commodam, aut etiā terram facilem nanciscātur, multo longiorem radicem impellunt, quæ scilicet apta sint stirpe alta adherere. Pinum itaq̃ uectē sollicitatū, quod transferretur, longiorem quā octo cubita radicē habere quidam uidisse retulit, quanquam non totam resōssam, sed abruptam, Plantas, si fieri possit, corpore fibrato capi oportet.



ret: sin minus, ex parte potius inferiore, quàm superiore assumes, præterq̃ in uite. Et fibratas in recto demittendum: at infibres, aut ad palmi magnitudinē, aut plus paulò sternendum. Quidam etiam fibratas ipsas sternendas præcipiunt. Positum quoq; obseruandum ex æquo, quem arbores nonnullæ haberent, aut in aquilonem uersæ, aut in orientem, aut in meridiem. Plantas etiam ipsas uiuiradices faciendum, quæ scilicet pati hoc ualeant: alias apud arbores ipsas, ut oleas, piro, malos, ficus: alias ex emptas, ut uites: quippe cum istæ apud parentem uiuiradices minime effici possint. Si autem plantæ fibratæ, aut particula stipitis suffultæ, accipi nequeant, ut oleæ lignum subtus scindendum, & lapide interiecto ferendum. Pari modo & fici, & reliquarum. Seritur ficus, & si quis ramū uastiore, ex acutū percutiat malleo, quoad 10 super terram exiguum relinquat, ac deinde arena superinsecta operiat, easq; plantas meliores effici uolunt, quandiu nouellæ extant. Vitis quoq; satio similis cū palo seritur: palus enim ratione infirmitatis palmitem antecedit. Serūt hoc modo & punice, & alias arbores. Ficus, si iuxta scyllam seratur, ocyus crescit, minusq; a uermibus infestatur. Summatim, omne scyllæ appositum, facilius germinat, celeriusq; augetur. Quæ autem ex trunco, præcisæq; serantur, deorsum uersus sectura inuersa ferere oportet, nec palmo minora præcidere, ut retulimus, corticemq; minime detrahare. Seruntur autem ex his rami, quibus germinantibus, terram semper assidue 20 accumulandum, quoad satis corroboretur. Hic oleæ, myrtiæq; satus proprius est: cæteri autē communius omnibus competunt. Ficus in radican-do præcipua & satio 20 qualibet maxime inter omnes arbores est. Punice, myrtos, lauros, crebras ferere, non plus, quàm nouenos pedes distantes, præcipiunt: malos distantes paulò, piro amplius, & prunos: amygdalas, & ficos, multo amplius. Simili modo & punice. Pro loci quoq; ratione interualla relinquendum: in montanis enim minora, quàm in campestribus: omnium autem (ut sic dicam) maximum, ut solum commodum, conueniensq; cuiq; tribuatur: tunc enim præcipue quodq; uiget. Ut autem absolute loquamur, oleæ, fico, uitæq; solum campestre maxime competere statuunt: nucum autem, pomorumq; generi, radices montium. Nec inter ea, quibus genus cōmune est, solum accommodandum ignorare oportet. Vitium solo differentia maxime numerosa est. Quot enim genera telluris, totidē & uitium esse quidam affirmant. Quæ 30 cum secundū naturam seruntur, frugifere prodeunt: cum præter naturam, facile sterilesunt. Igitur hæc omnium quodammodo communia sunt.

*Satus ex cultura palmarum: genera palmarum. Satio cæterarū arborum, cultus & opera. De forma, & finorū generibus. De puluere. Amygdalam ex amara dulcē fieri. Cap. VIII*



Almarum autem satus, cultusq; sequens, præter cæteros, peculiaris esse uidetur: Serunt enim ligna, quæ in fructibus insunt, bina iuxta, composita subter, binaq; superne colligantes: omnia prona: germen enim non de supinis, cauisq; partibus mittunt, ut quidam uolunt, sed 40 ē supernis. Quapropter in eorū coniunctione, quæ superponuntur, minime est operiendum principia, unde germen. Plura autem simul seruntur, quoniam satio uenios infirma est. Horum radices amplexu mutuo connectuntur: atq; ilico primi ortus promiscui coalescunt, ut unus ex cunctis caudex cōficiatur. Satus ex seminibus talis fieri solet. Ex trunco autē palmæ ipsius, cum partem abstulerunt supernam, qua cerebrum includitur (auferunt autem cubitorum duorum longitudine) quam fissuris humore ipso detractio, defodiunt, solum arenosum, saluginosumq; concupiscit. Idcirco ubi tale non sit, agricolæ salem aspergunt: quod quidem circum radices facere haud quaquam oportet, sed longius amando accu- mulare quantū semisextarius. Quod talem appetat locum, illud quoq; argumento capiunt

capunt. Nam ubi palmarum copia sit, humus arenosa cōcernitur; quippe apud Babylonem qua palmarum nascuntur, sic esse aiunt. Quin & in Africa, & Aegypto, & Phoenice, Syria quoque cauae cognominatae, tribus tantum in locis arenaceis eas gigni, quae condi, reſeruarique poſſint: reliquas autem, quae ceteris in locis proueniunt, minime durare, ſed protinus putreſcere. Virides tamē ſuaues eſſe, guſtuque gratas, atque ita conſumi amant, & crebram rigationem. De ſimo diuerſa ſententia eſt: Quidam enim has ſimo delectari negāt, ſed abhorrere omnino ſtatuunt. Alij uſum ſimi concedunt, clementumque magnū capere eo affirmāt. Riuis tamen ſimum miſceri oportere inſiunt: quemadmodum Rhodij facere ſolent. De hoc ita quaerendum amplius eſt: forſitan enim alij hoc modo, alij illo colere conſueuere. Et ſimū ipſum cum aqua utilem, ſine aqua non eſſe cōtingit. Cum autē anniculae ſunt, eas transferunt, & ſalem adijciunt, & bimas iterum transferunt: etenim mutatione ſedis uehementiſſime gaudēt. Transferūt quidam Vere, ſed Babylonij circa ſyduſ. Ad ſummam, pars maior eo tempore ſerit, ut & proueniat, & creſcat celerius. Nouellam minime tangunt, ſed comas duntaxat religant, ut procera aſſurgat, nec uirgae torqueantur. Poſt haec deputāt, cum iam maiuſcula ſit, & craſſitudinem habeat: tantū uirgae relinquant, quantum magnitudo palmi: quandiu nouella ſit, fructum nullo intus ligno producit: poſtea cum ligno quidam Syrios nullam adhibere culturam, ſed purgare tantū, atque irrorare affirmant. Aquam ſcaturientē, potius quam pluuiā eas quaerere aiunt. Tale autē in conualle, qua palmaria ſunt, exuberare. Conuallem iſtam, per Arabiam uſque ad rubrum tēdere mare, Syrios affirmare, ac pleroſque, qui inde ueniſſent, reſerunt. Eius itaque conuallis parte cauiffima, palmas exoriri enarrant. Sed haec utroque modo forſitan fieri poſſunt: nā pro regionibus, ſicut & arbores ipſae uariant. Culturas quoque inter ſe diſtare, haud pro abſurdo intelligi debet. Genera autem palmarū plura. Primū enim & quaſi diſcrimine maximo, quod aliud fructiferum, aliud ſterile, quo Babylonij lectos, & uafa conficiūt. Fructiferarum aliae mares, aliae foeminae. Inter eſt autē, quod mas primū ſuper ſpacham floret, foemina fructum oblongum ilico praestat. Fructuum ipſorum diſcretiā plures: alij nancque ſine ligno intus, alij cum ligno: & alij duro ligno, alij molli. Colore quoque inter ſe diſcrepāt: alij enim candidi, alij nigri, alij flauit: ad ſummam, nō pauciores, quam ficorum colores, aut abſolute genera ſtatuunt. Ad haec diſferre magnitudine figuraque uolunt: quorūdam enim in modum eſſe maiorum, magnitudineque tantos, ut quatuor tantum in ſpicam teneantur, alios minutos cicerum magnitudine. Saporibus plurimū diſferre inſiunt, ſed optimū tam inter nigros, quam inter cādidos, genus quod regium uocant, cum magnitudine, tum uirtute: ſed rarū id eſſe: nam tantū ferme in hortis anti qui Batoni apud Babylonem cōperiri affirmāt. In Cypro genus quoddā peculiare palmarum eſt, cuius fructus nuncque maturēſcit, crudus tamen ſuauiſ apprime, dulciſque eſt, dulcedinemque ipſam peculiarē ſortitur. Quaedam nō fructu modo, uerum & arbore ipſa, longitudine, formaque reliqua diſtant. Non enim magna, excellaque, ſed breues, foecundiores quam ceterae, trimae protinus fructificantes. Tales etiam in Cypro, in Syria quoque, Aegyptoque palmarum proueniūt, quae quadrimae, aut cum plurimum quiqueſnes fructificāt, hominis altitudine aſſurgētes. Genus aliud eſt in Cypro, quod & foliū amplius habet, & fructū multo ampliorē, diſcrimineque peculiari diſcretū, magnitudine māli punici, figura oblongum: non tamen ſapidum tanque ceterae, ſed radicibus ſimilem, ut nō deuoretur, ſed ſucco tantū expreſſo expuatur. Igitur palmarum generibus (ut dictū eſt) pluribus conſtat. Recondi autē ex iſis fructibus, qui Syriae naſcūtur, illos tantū poſſe, quos palmaria conualliſ parturit, narrāt. Qui uero in Aegypto, & Cypro, & alibi gignūtur, hos recentes coſumi. Eſt autē palma, quoad ſimpliciter exprimi poſſit caudice uno, atque ſimplici corpore. Quaedā

tamen uel bifida exeunt, ut in Aegypto, quasi bifurca statura caudicis a parte, qua finditur, uel quina cubita, partesque inter sese prope partes ipsae assurgunt. In Creta quoque plures bifidas prouenire affirmant, quasdam trifidas. In Lapaea uel quino cerebro genus quoddam enasci tradunt. Fertilibus itaque locis plura eiusmodi, atque in totum genera, differentiasque, amplius facitari consentaneum est. Genus aliud est, quod plurimum gigni in Aethiopia fertur, Cyce uocatum, fruticosum, non uno caudice, sed pluribus, & interdum aliquatenus coniunctis: uirga minime longa, sed cubitali tantum, leui tamen coma cacumini adnexa: folio amplo, & quasi ex duobus minutis compacto forma eximia: fructum figura, magnitudine, saporeque diuersum, quam cetera praestant, quippe rotundior, gustuque gravior, sed minus dulcem. Triennio maturant, ut fructum ueterem habeat nouo subnascere. Panes quoque ex his conficiunt. De his igitur uel amplius considerare oportet. Palmae autem, quas humiles uocant, genus aliud est, quasi aequiuoce dictum. Nam excepto cerebro uiuunt, & ab radicibus succisae repullulant. Fructu quoque, & folijs distat. Sunt enim lato, molliorque folio: ob id sportulas, tegetes, & capitulis umbracula eo contextunt. Quin & in Creta insula multa, atque etiam multo plures in Sicilia tales proueniunt. Sed haec prolixius, quam proposita res exigeret, diximus. In ceterorum autem satum plantas in contrarium multi permutant. Quamquam sint, qui referre nihilo uelint, minimeque in genere uitium. Alij pampinum lasciuior, & qui amplius fructum protegeret, ita exire, minusque amitti acinos putant, atque hoc idem effici in fico. Nam si in contrarium permutata feratur, fructum non amittere, scansilemque ita fieri censent: fructum praeterea seruare, si quis, dum nascitur, caulem statim defringat. Satus, generationesque, quo pacto se habeant, dictum fere est, prout scilicet formula, notaque subsignandi amplecti singula licuit. In cultu & opera omnium, alia communia, alia singulorum propria esse constat. Communia, fossio, rigatio, stercoreatio, item purgatio, & aridorum exemptio. Quamquam secundum plus, minus uel differant. Aliae namque magis simum, & aquam diligunt, aliae minus: & cupressus, quae nullo pacto simum, nec aquam concupiscit, sed etiam emori dicitur, si copiose nouella adaquetur. Punica & uitis aquam diligunt. Ficus cum rigatur, magis germine uiget, sed fructum deteriore parit: praeterquam laconica, quae riguis uehementissime gaudet. Purgari omnia quaerunt, melioraque redduntur exemptis aridis, tanquam alienis, quae tamen incrementa, tamen alimenta impediunt. Ob id cum arbor annosa est, eam totam decidunt, germinare namque denuo incipit. Maxime purgatione myrtum & oleam egere Androtion auctor est. Etenim quo pauciora reliqueris, melius germinat, fructumque copiosius praestant, uite excepta. In hac enim plura relinquere ad germinationem, quam ad fructificationem, satius est. Ad summam, & haec, & reliqua omnis cultura, pro natura cuiusque propria impendenda est. Fimo quoque acerrimo, & rigatione copiosissima, ut & purgatione, oleam, myrtum, punicamque egere Androtion inquit. Nec enim medulla eas habere, nec ullo morbo sub terra infestari. Sed cum arbor uetusta est, ramos decidere, & truncum deinde colere, tanquam denuo satum oportere. Sunt qui diuturnissimam & ualidissimam myrtum, & oleam esse affirmant. Haec igitur praescrutari quispiam diligentius uelit: & si non omnia, tamen quod de medulla putatur. Fimus autem nec pariter omnibus, nec idem omnibus conuenit. Aliae namque acriorē uelle uidentur, aliae minus acrem, aliae penitus leuem. Acerrimus hominis est, ut & Chartodras, omnium optimum eum esse asseuerat. Secundum suillum. Tertium carprum. Quartum ouium. Quintum bouum. Sextum iumentorum. Stipularius diuersus, diuersoque modo addit. Quidam enim illo debilius, quidam efficacior est. Omnibus fossionem prodesse existimant, sicut etiam farculationem minoribus. Melius enim ita coalescere aiunt. Puluis quoque, ut nonnulla crescant uiuantque, facere uidetur, ut uua: quae obrem inferius saepe excitant. Nonnulli & ficos suffodiunt, ubi puluere opus sit. Megarenses etiam peponibus, cucumeribus, atque cucurbitis, cum uenti anniuerfarij perflant, puluerem farculo

sarculo excitat, atq; ita dulciores, mollioresq; reddunt absq; rigatione. Hoc igitur concessum indubie habet. Sed uitē puluere cōspargere, aut ullo pacto tangere, cū uua nigrēscere incipit, haud quāq; oportere existimār. Sed si unq; ita agendū sit, cum nigra omnino reddetur, agendū censent. Alij neq; tunc oportere aiūt, nisi quoad runcandū sit. De his ergo ambigitur. Si quid autē fructū non fert, sed se totū in germina uertit, partē caudicis infimam scindūt, atq; lapidē interponūt, ut cunq; dissecit, itaq; fructificare posse asseuerāt. Pari modo & si quam radicis partē secueris, fructū creatum iri. Quamobrem radices uitium summas, quum farmētis luxuriāt, euellunt. Ficorum non solum radices amputāt, uerum etiā obducto cinere obstruūt, & passim caudicem scindunt, itaq; fructū copiosius dari affirmant. Amygdalæ uel palo ferreo infixo, cum penetratū sit, aliū quernū foramini facto adigūt, terraq; occultāt: quod punire nonnulli uocitāt, perinde ac si arbor iniuria lasciuiet. Hoc idē & in piro fieri solet. Amygdalam uel ex amara dulcē effici uolūt, si quis caudice circumfosso, præforatoq; mēsurā dodrantali, undiq; lachrymā effluentē in idē defluere sinat. Sed hoc tam ad fructificandum, q̃ ad bene fructificandū conferre creditū est.

*Quæ fructus amittant antequam percoquant. De caprificatione. De conditione statuum.*  
De culicibus ficarijs. De remedio ad culices. Caput IX

**R**uctum autē anteq̃ coquāt, amittere possunt, amygdala, mālus, pumica, pirus. Omnium maxime ficus, & palma, qbus uel auxiliū magnopere quærit, unde & caprificatio cōperta habetur: nā ex pomis annexis culices egrediētes corrodunt, & per uia reddūt ficū cacumina. Regiones quoq; ad iacturā fructuū differūt: quippe cū in Italia iacturā fieri negent: quāobrem caprificandi usus terræ illius incolis nullus penitus est. Nec in aquilonis, & macrofis locis id desiderat, ut in Phalico Megarēsis agri, & partibus quibusdā agri Corinthij. Flatuū quoq; cōditio pari ratione referre uidet. Aquilonijs enim potius q̃ australibus fructus decidunt: & si crebriores, uehementioresq; fuere, maior iactura sequatur necesse est. Itē natura ipsarū arborū refert. Præcoques enim amittūt, serotinae haud quāq; amittūt, ut laconica, & alia quædā: quamobrem eas caprificare minime assolent. Hæc igitur locis, generibus, cœliq; ratione discrimen recipiūt. Culices uero ficarij, pomis caprifici egrediūtur, ut dictū est. Sed ex putrescētibus eorundē granis gignūtur, cuius indicitū asserūt, quod postq̃ euolauerūt, grana ficibus nulla penitus insunt. Euolat magna ex parte, pedē, aut pennā relinquētes in pomo. Est uel alterū culicū genus, cētinae uocātū, quod ociose uiuit, quēadmodū fuci inter apes, & quos ex altero genere sua poma ingressos adspexerit, protinus necat: id uero suis mori operculis. Laudant caprifici potissimū nigrae, ex locis orta saxosis: ob rationē, quod permulta ista grana cōtineant. Noscit quæ apte culicibus emerferint, quod rubrae, & uersicolores, & robustæ constant: contrā, quæ minus apte, albæ, imbecillesq; cernunt. Apponūtur ficis, quæ scilicet eam operā desiderāt, cum pluerit: ubi uero plurimus sit puluis, ibi plurimæ, ualidissimæq; caprificus exeunt. Quin & postū culices gignit, cū copiose fructificat. Et ulmis foliiculis genus quoddā bestiolarū innascitur, quod cnipes appellāt: qui cum in ficis gignūtur, ficarios illos culices deuorāt. Huius remedium cācros statuūt alligādos: in eos enim uertere sese culices inquit, sed ficis quidē auxilia istiusmodi cōperta habētur. Palmis autē mascularū coitū referūt: hoc enim & perdurare, & maturefcere fructus potest. Caprificationē ob similitudinem quidā rem appellarūt, quæ sic fieri solet: Dum mascula floret, spatham abscondētes, qua flores emergūt, protinus, ut lanuginē, & florē, & puluerem cōtinet, super fructum foeminā decutūt. Illa sic eo aspersu afficit, ut suos fructus nullo pacto amittat, sed cūctos cōseruet. Vnde fit, ut bifario adiūmēto mas esse foeminæ ualeat. Fructifera enim foeminā uocāt. Sed alterū uelut coitus, alterū ratione alia cōtingit.

## THEOPHRASTI DE HISTORIA

### PLANTARVM LIBER TERTIVS.

#### De genitu syluestrium arborum.

#### Caput I



VONIAM de urbanis arboribus dictū est superiori uolumine: nunc de syluestribus simili ratione indicare debemus: seu ali- quid idē cum urbanis, diuersum ue habeāt, seu in totū sui gene- ris existāt. Ergo generationes earū simplices quādā esse intelli- guntur, omnes enim semine, uel radice proueniūt: quod ita sit, nō quia uel aliter fieri nequeat, sed forsitan, quod serere quicq; nemo conef. Nanc; enasci potuissent, si locū idoneū, cultumq; congruum adipiscerētur: quemadmodū illae, quae lucos, aquasq; desiderāt, ceu pla- tanus, salix, populus, ulmus. Hae em̄ omnia & similia, fata germināt, & celerrime, pulcherrimeq; ex auulsione. Quae etiā si quis praegrandē, eamq; cū arbore se exae- quantē transtulit, perdurare optime potest. Harū maior sanē pars defixa quoq; feri nunc; recusat, ut populus tam alba, q̄ nigra. Igitur earum nō solū semine, radiceq; generationē, uerum etiā hanc assignare ualemus. Reliquarū autē supradictā notan- tur, praeterq; earum quae semine tantū proueniūt, ut abietis, pini, piccae. Quae uero semen, fructumq; ferāt, tam ex radice, q̄ ex ijs ipsis prodire nimirū possunt. Nanc; eas quae steriles esse arbitrantur, generare quidā affirmāt, ut ulmū, salicem: argumen- tumq; capiunt, non solū quod pleraq; procul radicibus suis erumpāt, uerum etiā in contemplatu eorū, quae interdū euenisse notantur: ut in Phineo Arcadiae, cū aqua quae in plano obstruis faucibus extumuit, demū erupisset, ubi propē a loco inun- dato salices steterant, hic anno secundo, solo resiccato salices iterum surrexisse affir- mant: ubi autē ulmi, iterum ulmos: & ubi pinastra, & abietes, ibidem pinastra, atq; abietes: quasi istae quoq; illas aemularentur.

De salice quae frugifera dicitur, deq; platano quae in tripode euenisse narratur. Item aërem rerum omnium semina habere, amniumq; inundationem semen afferre.

#### Cap. II



Aeterum salicē celeriter fructum anteq; in plenū crassetur, percoqua- turq; dimittere asseuerant: quamobrem Homerū haud improbe fru- giperdā hanc appellasse inquit. De ulmo uel illud indicium afferunt: cum enim flatibus delatū semen in loca proxima fuerit, nasci arborem aiunt. Itaq; simile in his euenire percipitur, atq; in suffruticum, & her- barum nonnullis. Quamuis enim semen nullum conspectū habeāt, sed aliae uelut la- nuginē, aliae florē, ut thymum, tamen ex his germen emittūt. Iam platanus quidem manifestum semen producit, eoq; gignitur, quod tam alijs q̄ illo praecipue indicio constat: etenim in tripode aëneo, platanus aliquando prouenisse narratur. Has igitur generationes syluestrium statuendū, atq; etiā spontaneas illas, quas uel naturae interpretes reddunt. Anaxagoras enim aërem semina omniū habere, quibus cum aqua unā delatis omnia gigni asseuerauit. Diogenes ex aqua putrescente, mistu- ramq; quandā cum terra capeffente, plantas nasci existimat. Cleodemos ex eisdem quidē atq; animalia, plantas quoq; cōstare putauit. Sed quanto ē turbidioribus, algentioribusq; tanto amplius animalū priuari constantia & natura. Quin & alij quidam de generatione referunt: sed haec a sensu quodammodo remota esse uiden- tur. Quaedam uero confesse, conspecteq; annotantur, ut cum amnis exundauerit, aut riuo digressus, aut tota unda effusus, ut Nessus in Abderensi agro alueum sa- penumero mutat: & simul ut mutauerit tantū syluae locis cōgenerat, ut intra trien- nium opaca undiq; reddat: rursus cū imbres crebriores diutius occupauerint, nam his quoq; generationes plantarum fieri solēt. Ergo amnium inundatio, semina, fru- ctusq;

cusq; afferre uidetur, & aquæductus, herbacearum semina præbere creduntur. Imbres autem cum hoc idem faciunt, & (semina enim secum pleraq; deferunt) tum etiam putredinem quædam aquæ, terræq; committunt: nam & ipsa terræ ægyptiæ mistura materiam quandā gignere uidetur. Nonnuscq; modò subegeris, mouerisq; solum, familiaria protinus terræ illius emergant, ut in Creta insula cupressi. Fit certe & in minoribus simile: simul enim quæcunq; fuerint mota, herba exit. In semina defæctis autē segetibus, si subnouentur, tribulum emergere aiunt. Igitur hæc quidem mutationem consequuntur telluris, siue seminibus præiacentibus, siue etiam ipsa terra modo quodā affecta, præparataq; ad gignendū. Quod haud absurde forsitan credi potest, humoribus simul interclusis, quorū uis magna est: alibi autē uel ex pluuijs, peculiarem frequentia syluæ exortam prodidere, ut in Cyrena factio quodā piceo, crassoq; humore. Ita enim proxima sylua surrexit, nunq; antea uisa. Læserpitium quoq; quod superiori tempore deerat, causa quadam eiusmodi extitisse tradunt. Modigitur generationum huiusmodi, tales adnotantur.

Differentiæ inter urbanas arbores, & syluestres: fructificatio arborum. Quid cultus, incultusq; faciant. De cedro, & terēbintho. Caput. III



Væque autem aut frugifera, aut sterilia intelligantur necesse est, & aut perpetuò uirentia, aut folia deperdentia, & aut florentia, aut flore caretia: quippe cum in omnibus, tam urbanis quàm syluestribus, publice quædam istæ diuisiones habeantur: priuata autem fera fructificatio atq; corroboratio. Item copiosa fructificatio, prima species syluestriū: namq; serius fructus suos perficiunt, atq; in totum florescunt, germinantq; ferè semper serius, naturaq; ualidiora sentiuntur, & plus fructus præmonstrant, minus uero maturant. Ni forte id & reliqua omnia facere soleant, quæq; cōmune genus sortuntur, ut oleaster, pirasterq; minus quàm olea, & pirus. Sic enim omnia, præterquam si quid inuentu rarum proueniat, ut in cornis & forbis: horū enim syluestria urbanis maturiora, suauioraq; tradunt: & si quid aliud culturā non patitur, seu arbor, seu ex minoribus aliquid, ut læserpitium, capparis, & in leguminum genere lupinum, quæ quidē uel natura esse syluestria dixeris. Quod enim mitigari recusat, ut etiam inter animalia est, id natura syluestre iudicandum appareat: quanq; Hippon syluestre, urbanumq; esse unumquodq; putat: & cultu quidē urbanum, incultu reddi syluestre: quod partim recte, partim non recte putat. Etenim quodq; neglectum degenerat, immutescitq;. Sed haud quodq; cultum melius redditur, ut retulimus. Quapropter discernendum diligentius, & quædam syluestria, quædam urbana dicendum: ut animalium, quæ non nisi cum hominibus uiuunt, quæq; manifeste esse possint. Sed hoc nil forsitan differt, utro tandem modo proponatur. Omne autem immutescens, tum fructu deterius, tum ipsum breuius, & folijs, & ramis, & corticibus, & tota forma efficitur: quippe spissiora, contortiora, durioraq;, tam ipsa fieri solent, quàm uniuersa natura, utpote cum ijs potissimū urbanorum, atq; syluestrium discrimen intelligatur. Quamobrem quæcunq; ex mansuescentibus eiusmodi constent, hæc syluestria nuncupantur, ceu pinus, & cupressus, aut in totū, aut masculat: quinetiā nux iuglans, atq; castanea. Item eo quod frigoris cupida, montanaq; potius sint. Etenim id quoq; ad arborem, & summatim platarum immanfuetudinem assumi oportet, seu per se, seu etiā per accidens. Verum syluestrium determinatio, siue hunc in modum, siue aliter accipi debeat, nil ad rem præsentem fortassis referat. Illud autē uerum, ut nota, absoluteq; subsignemus, syluestria montana potius esse, pluraq; eorum locis eiusmodi magis uigere, nisi quis aquas concupiscentia, secusq; fluuios degentia, & in lucos assurgere solita accipiat. Hæc enim & similia campestribus potius cōnumerantur. Caterum montibus quidem magnis, ut Par-

nafo, Cyllene, Olympo, Perico, Mysioq, & si unq locus alius huiuscemodi, nasci omnia certū est, scilicet ratione uarietatis locorum. Habēt enim stagnantia, madetia, sicca, crassa, saxosa, prataq, media omnia penē telluris discrimina. Ad hæc alia concaua atq trāquilla, alia sublimia & uentis exposita, ita ut permulta, & uaria gignere possint: quæq planis proueniūt, isti quoq præstare ualeāt: nil tamen absurdū si qui ex mōtibus nō æque omnia ferāt, sed propria quadā sylua, aut in totū, aut ex maiore parte scatant: ut in Creta insula circa agrū Idæum, cupressus enim ibi exuberat: & in Cilicia, Syriaq cedrus, nonnustq Syriæ terebinthus. Fit enim proprietas ex locorum discrimine, sed propriū iam in uniuersum penē exposuimus.

*Quæ arbores nō nisi mōtibus nascūtur, quæq; perpetuō uiuant.*

Cap. IIII

10



Montibus autē propria, quæ nasci in planis nequeūt. Macedonia abies, pinastrū, picea, aquifolia, tilia, caprinus, buxus, portulaca, taxus, iuniperus, terebinthus, caprificus, philycā, apharca, nux iuglās, castanea, ilex. Quæ uel in plana descendūt, tamarix, ulmus, populus, salix, cornus, alnus, robur, lacra, pirus, pomus, ostrya, celastrus, fraxinus, pahirus, spina acuta, acer, quam in mōte caprinū, uel in plano gallicā uocāt. Quancq alij aliter distinguūt, & genus diuersum aceris, & caprini faciunt. Omnia uero, quæ cōmunia mōtibus, planisq habentur, ampliora, uisūq pulchriora in planis proueniunt, sed usu meliora, tam materie q fructu in mōtibus: piris, malisq exceptis: hancq planis præstāiores nō solū fructū, uerū & materie inspectātur: quippe cum mōtibus breues, nodosæ, spinosæq assurgāt. Omnes autē etiā in mōtibus, cū adeptæ loca propria fuerint, & pulchriores certe proueniūt, & copiosius ferūt. Sed (ut absolute atq simplicia agā ratione) quæ æqualibus montiū tractibus emigrēt, primatum obtinēt: ex reliquis uero, quæ infimis, cauisq, præstāiores: omniū deterrimæ, quæ cacumine, nisi quid sua natura frigus adamer. Sed hæ quoq situ inter se dissimili distant: quæ de re postea dicendū. Nunc singula secundū prædictas differētiās diuidemus. Ergo inter syluestria perpetuō uiuent, quæ primo uolumine retulimus, abies, pinastrū, picea agrestis, buxus, portulaca, taxus, iuniperus, terebinthus, aquifolia, apharca, laurus, suber, quercus, celastrus, spina acuta, ilex, tamarix. Reliqua omnia folia amittūt, præterq si quid aliq loco supfluat, quēadmodū de quercu, & platano, quæ in Creta est, indicauimus, aut si q̄s oīno locus alimēto exuberet. Fructū reliqua quidē omnia ferūt: de salice uero, & populo, & ulmo (ut diximus) uaria sentētia est.

*Differentia quæ de locis proueniunt: tum de persica & palma.*

Caput V



Quidam & populū solā sterile putant, ut Arcades: ceteras autē omnes, quæ mōtibus proueniūt, fructū parere. At uero in Creta, & populū nigra complures fructificāt. Vna apud adytū spelūcæ Idææ, qua munerā deo dicata conseruātur: altera parua ab ea proxima stat: & ulterius duodecim plurimū stadia ad fontē quēdam Sauri dictū, pleræq sunt, & in monte proximo ab Ida, cui Cedrio nomen: necnon & circa Tiresiam. In montibus aliq ulmum tantū ex his fructiferam aiunt, ut Macedones. Discrimen autē ad foecunditatem, sterilitatemq summū, uel locorū natura facere potest, ceu in persica, palmisq patet. Persica enim in Aegypto, & locis proximis fructificat, quancq in Rhodo usq florē dātaxat deuenit. Palma apud Babylonē fructū mirū in modum largit: in Cræcia uero ne fructū quidē maturat, apudq nōnullos nec fructū ullum ostēdit. Simili modo etiā alia pleræq huiusmodi percipiūtur: nā & inter minora herbarum, ac reliquæ stirpis humilis, quædam in eadem contermina tellure fructifera, quædā sterilia gignuntur, quēadmodū centauriū in Eliō agro foecundū: quod montuosis æditur, infœcundum: quod planis, flosculo tantū gaudens: quod concauis, ne floret quidē, nisi improbe. Itaq & reliquorū, quæ unigena cōstent, unamq appellauionem

pellationem fortiatur, aliud fecundū, aliud esse infecundū uidetur, ut ilex. Quædam fructifera, quædā sterilis, & alnus uero similiter, ambæ tamen florescunt.

De siluestrium arborum floribus. De germinatione. De florum, fructuumq; prouentu.  
De galla.

Caput VI



10 Erē autē omnes, quas inter unigenas masculas uocant, steriles magna uidebūtur ex parte, earumq; alias abūde florere, alias parū, alias nullo pacto florere affirmāt. Contrā inter alias, mares tantū fructificare putātur, uerum ē floribus arbores generari, sicut ex earū fructibus, quæ  
15 utrinq; ut nisi facta semita, nullus trāsitus sit. Quin & de floribus quar undā sententia uaria est, ut retulimus: quidā enim robur, & nucē auellanam, & castaneā florere existimāt, item pinū & piceam; alij nullā earum, sed uillum nucis, & muscū roboris, & nucamentum piceæ proportionē grossis præciduis respōdere existimāt. At Macedoniæ incolæ ne illas quidē florere arbitrantur, iuniperum, scissimā agrestem, acce-  
20 rem: nonnulli binas iuniperos esse dicūt, & alterā florere quidem, sed fructum non ferre: alterā nō florere, sed protinus fructū ostendere, ut ficos, poma præcidua. Itaq; penē fieri, ut sola hæc arbor fructū in biennū habeat. de his igitur amplius cogitandum. Germinatio uero alijs simul, atq; urbanis: alijs mox, alijs tā tardius, omnibus  
25 certo tēpore uerno: sed fructuū diuersitas numerosior est, quod uel antea diximus. Non enim maturitates pro germinationū ratione sequuntur, sed plurimū interest: nam & earū, quæ serius fructificāt, quas nonnulli anno reddere uolūt, ut iuniperi, ut ilicis, germinationes in Vere proueniunt. Unigenæ autē ipsæ pro locorū natura, præposito inter se discrepant. Etenim quæ paludibus astant, primæ germinant, ut Macedones uolūt: secundæ, quæ planis: nouissimæ, quæ montibus. Ipsarum autē singularum arborū, aliæ cum urbanis germinare incipiūt. ut potulaca, apharca, pirus: post urbanā paulō, aliæ ante fauoniū, & statim post afflatus fauoniij. Ante fauoniū cornus, tā mas, q̄; foemina: post fauoniū, laurus, alnus: paulō ante æquinoctiū, tilia, caprinus, fagus, ficus. Quin & nux iuglans, quercus, sambucus mature germināt,  
30 atq; etiā magis quæ steriles, lucosæq; sunt, populus, ulmus, salix: paulō ab his serius platanus. Reliquæ ineūte Vere, ut caprificus, philyca, spina acuta, paliurus, terebinthus, nux iuglans, castanea. Serotino germine mālus est, tardissimo ferē omniū suber, aria, quadratoria, thuia, taxus, germinationes ita se habēt. Florū prouetus (ut ita loquar) pro ratione germinationis sequūtur: differūt tamen, multoq; magis fructus consecutio uariatur: quippe cornus ferē circa æstiuā solstitia reddit, præcox scilicet: nam ferotina, quam quidā foeminā dicunt, post ipsum autumnū fructificat, huic fructus ingustabilis: lignū infirmū, fungosumq; tanta est inter ambas differētia, cū mari firmissimū sit. Terebinthus circa tritici messē, aut paulō serius semē reddit: fraxinus atq; acer, æstate: alnus, nux iuglans, pisorumq; genus quoddā, autumnō: robur &  
40 castanea ferius, nam circa Vergiliarū occasum: eodē modo & philyca, & ilex, & paliurus, & spina acuta, post occasum Vergiliarū. Aria hyemis initio: mālus primis frigoribus: pirus ferotina est, quippe quæ hyeme sua perficit poma: potulaca, & apharca fructū primū, cum uua dulcescit, maturant: posteriore, cum floret: bis enim istæ fructifera hyeme ineunte uidentur. Abies & taxus, paulō ante solstitiū florent. Est abietis flos croci colore, aliasq; pulcher: fructū post Vergiliarum occasum dimittūt. Pinafer, & picea paulō germinatione præueniūt, diebus scilicet circiter quindecim post uergilias: istæ quoq; ratione uidelicet reddūt, sed hæc mediocrius. Omnium autem tardissime iuniperus, celsitrus, ilexq;, suos fructus perficiunt. Iuniperus enim anniculum habere uidetur, quippe cum nouus anni exacti fructū occupet: utq; ali



qui uolunt, nec maturari solet, quapropter decerpitur, & aliquantū temporis referuatur. Quod si in arbore relinquatur, marcescit. Licem quoque semen anno perficere Arcades aiunt: simul enim fructum antecedentem maturat, & nouum demonstrat: quamobrem in his euenit, ut assidue fructum habeant. Celastrus quoque ob hyemem fructū amittere proditur, serotina admodum, & tilia, & buxus. Fructum ingustabilem cunctis animalibus tilia, cornus femina buxusque gignunt. Quin & edera, iuniperus, pinus, potulaca serotinæ habentur. At uero (ut Arcades uolunt) & in his, & omnibus ferè seriores quadratoria, thuia, taxus. Fructuum iacturæ maturitatesque syluestrium arborum tales differentias fortiuntur, non solum si ad urbanas spectantur, uerum etiam si inter se ipsas cōferuntur. Euenit autem, ut cum primum inceptum, reliqua germinationem continuent: pinus uero, abies, roburque, intermittat, terque turgeant, ternaque germina adant: ideo & ter squamosæ dicuntur: omnis enim arbor cum germinat squamas corticum spargit. Fit germinatio prima statim mense Februario ineunte: quanquam in Ida monte die maxime xv mensis eiusdem. Tum circiter triginta intermissis diebus, aut paulo pluribus, iterum germinare incipiunt, ab extremo surculi, usque proximum germinis antecedentis. Et quædam sursum, quædam in latera circumquaque emittunt, ueluti geniculo facto, surculo primi germinis, quo modo scilicet & prima fieri germinatio solet: idque agitur circa Martium desinētem. Huius germinationis tempore galla quoque omnis gignitur, tam nigra, quam candida: nascitur magna ex parte noctu uniuersa: incipit diem 25 aucta, excepta resinacea, si ab æstu occupetur, inarescit, augeri que amplius nequit: alias enim magnitudine ampliore grandesceret: qua de causa, earum aliqua non maiores fabis euadunt: nigra uero pluribus diebus uirer, & magnitudinē mali nonnullæ capessunt. Postea diebus circiter quindecim intermissis, rursum germina tertio mittunt mense Aprili, diebus longe paucioribus quam prius, forteque id sex, aut septem diebus summum absoluitur. Sed germinatio similis, eodemque modo efficitur. Quod cum uentum sit, non amplius in longitudinē, sed in crassitudinē, incrementa uertuntur. Omnium itaque arborum germinationes conspicuæ, sed abietis, pini que maxime, quoniam genicula in uersus rectos porrigantur, rami que conditi ex æquo spectentur. Ad materiam quoque cadendam tempus nunc potissimum intelligitur, propter 30 amplitudinē corticis. Cæteris enim temporibus cortex facile detrahi nequit, detractoque nigrescit materies, aspectuque deformior redditur: nam ad usum quidem non refert, quinimo robustior est, si post fructuum maturitatem cadatur. Hæc prædictorum fructuum propria.

*Germinationes in arcturo. Quid amentum, & iulus auellanae. Qui auctus faciles, & difficiles.*

*De radicibus syluestrium.*

Cap. VII



Germinationes a uitem, quæ ad ortum arcturi post uernum fieri solent, omnibus ferè communes esse putantur, manifestiores tamen in urbanis, atque earum præcipue, fico, uiti, punice: denique omnibus, quæ uberius coalescunt, & ubi tellus pinguis, laraque sit: ob id eam, quæ sub arcturum fieri solet, plurimam in Thessalia, Macedoniaque fieri dicunt. Simul enim contingit, ut etiam autumnus placidus, longusque sit. Ita & cœli quoque proposit mollities. Nam & in Aegypto ea de causa, semper ferè arbores germinant, aut certe parum temporis intermittunt. Sed germinationes (ut diximus) communes omnium sunt: intermissiones autē, prædictorum tantū esse intelliguntur: proprium uero nonnullis, & quod amentū appellat, scilicet prædictis: habet enim, & abies, & pinus, & robur, ac etiā tilia, nux iuglans, castanea, picea. Id robori ante germinationem uerni temporis initio gignitur: sit ueluti foliorū conceptus inter antecedentem obstru-

obstruſionem, & ſequentem exortum, medius. At ex proprietate autumnī, poſtq̃ ſolia decidere, peculiarīa eius cōfeſtim gignuntur, quaſi grauida intumeſcat, ut germina pariat, duretq̃ per hyemem uſque ad uer. Nuci auellanae, poſtquam fructus decidit, racematum quiddam, uermis prægrandis, magnitudine ſingulari, pediculo pingue, emergit: quod nonnulli ſolum appellant. Hoc ex minutulis ſquamis innu-  
 10 meris ordine nucis pineae conſtat, ut ſpeciem non abſimilem nuci pineae nouellae, ac uiridi gerat: niſi quod oblongius, & per totum ſerè pariter craſſum tendat. Hyeme hoc augetur: ineunte Vere dehifcit, & ſquamata illa flauelſcunt, & in longitudi-  
 nem uel tripollicarem increſcunt. Cum autem Vere folium exiſtit, iſta decidunt, &  
 20 nucis caliculacea tegmina totidem quot flores ſuper pediculum contracta gignun-  
 tur, eorumq̃ ſingulis nuces ſingulae inſunt. De tilia, & an quicquam aliud amentife-  
 rum ſit, cogitandum. Sunt præterea quædam auctu faciles, quædam difficiles: faci-  
 les, quæ apud aquas aſurgunt, ut ulmus, platanus, populus, ſalix: quanquam de  
 hac nonnulli ambigunt, utpote difficili auctu: & e fructiferis, abies, pinus, robur:  
 omnium ſaciliſima taxus, lacara, fagus, iuniperus, acer, caprinus, oſtrea, fraxinus, al-  
 nus, picea, porulaca, cornus, buxus, pirus. Fructificant protinus, abies, pirus, picea,  
 etiam ſi in quantumlibet magnitudinis creuerint. Auctio uero, ac germinatio reli-  
 quis incerta eſt tum modo, tum germine. Sed abieti certa, & continua, atq̃ præpo-  
 ſita. Cum enim primum ſciſſum de caudice fuerit, rursus de eo alterum ſinditur,  
 30 idq̃ aſſidue faciatur, poſt quæq̃ germinationis ſuperuentum: at cæteris ne rami  
 quidem aduerſe conditi inter ſe conſtant, paucis quibuſdam exceptis. Illud quoq̃  
 differentia incrementum communiter omnium pariter urbanarum, atque ſylue-  
 ſtrium habere uidetur: quædam enim ex cacumine, & latere germinant, ut pinus,  
 pumica, ſicus, myrtus pars ſermè maxima: quædam non cacumine, ſed latere tantu,  
 & ipſum, quod præſtit, propellitur, ſicut etiam caudex totus, ramiq̃ prægrandes au-  
 geri conſueuerunt. Fit hoc in nuce iuglande, & auellana, & quibuſdā alijs, quarum  
 omnium germina in folium unum finiuntur. Qua de cauſa ratione optima nullum  
 germen ſuperuenit, quo creſcere poſſint, cum deſit augendi principium. Frumen-  
 35 tis quoq̃ incrementum quodammodo ſimile: hæc enim protruſu corporis ſui præ-  
 ſentis aſſidue creſcunt, etiam ſi folijs diminuantur, ut in depaſtis ſegetibus pateſcit:  
 nec de latere quicquam emittunt, ut legumina aliqua faciunt. Igitur hoc pro germi-  
 nationis, ſimulq̃ auctiois differentia capi poteſt. Sylueſtria uero alta eſſe radice  
 quidam negarunt, quod ſemine omnia proueniant, ſed nõ recte. Nam fieri poteſt,  
 ut cum diutius uixerunt, radices procul demittant: nam & olerum plura hoc idem  
 faciunt, licet hæc imbecilliora ſint, atque indubie ſemine terræ ſummiſſo oriantur.  
 Omnium itaq̃ ſylueſtrium alta radice deſcendere illex uidetur: abies, pinusq̃ mo-  
 dica: thraupalus, & prunus, & ſpodias, quæ uelut ſylueſtris prunus habetur, ſu-  
 perſicie uiuacior: ſed hæ uel paucis adhærent radicibus, thraupalus autem mul-  
 40 tis. Et accidit cæteris, quæ non in profundum radicem agunt, præcipueq̃ abieti,  
 pinoq̃, ut radicitus ſtatu euertantur. Arcades ita referunt. Idæi abietem altius,  
 quam robur radice deſcendere uolunt, uerum ſimpliciore, meatuq̃ rectiori: pru-  
 numq̃, nucemq̃ auellanam, altiffimam radicem habere inquit: ſed auellanam  
 tenuem, atq̃ robuſtam, prunum numeroſam. Ambæ tamen diutius uiuant opus  
 eſſe: prunum etiam emori contumacem referunt. Acerem ſuperficie aliquatenus  
 gaudere. Fraxinum numeroſiorem, denſam, altamq̃ fortiri. Iuniperum quoq̃, ce-  
 drumq̃, per ſumma inniti, & alnum tenuem agere. Item ſciſſimam: nam ea quoq̃  
 ſummorenus, pauciſq̃ radicibus degit. Sorbo radix per ſumma ceſpitum, ſed uali-  
 da, craſſa, moriq̃ contumax, multiplex tamen modice. Hæc alta radice deſcendere,  
 ſuperficieq̃ gaudere notatur.

Quid quibus caudice præciso contingat. Crateres ex eo, quod abietis circumagnationem uocant.  
De multiplicitate fructuum eiusdem arboris. De ulmo, & galla duplici. Cap. VIII



Audice præciso, reliquæ quidem omnes penè recrescunt, nisi radices antea morbo infestatæ fuere: pinus uero, & abies radicitus omnino, anno eodē inarescunt, etiam deciso cacumine. Euenit peculiare quidam abieti: cum enim præcisa, uel aliquo pacto diminuta afflatu fuerit, circa leuem partem sui caudicis (habet enim quadantenus leuem, enodem, similem, ac etiam æquiparandam nauiculæ) mox circumnascitur paulò excellitate inferius, quod quidam circumauctionem, alij circumagnationem appellant, colore nigrum, duritiâ ultra modum, ex quo crateres Arcades cōficiunt. Crassitudo talis, qualem arborem esse cōtigerit, quo scilicet robustior, uegetiorq; uel plenior, eo crassior. Illud quoq; peculiare hæceadē in re abieti accidit: cum enim ramis omnibus ablatis, cacumen decideris, mox emoritur: cum uero inferiora proxima leui illi parti præcideris, quod restat, uiuit, & agnatio, quam modo dixi, circū id fieri assolet: scilicet quia uegetius, ac uiridius est. Si quidem ē latere, nunq̃ recrescit, neq; ab imis plantigera abies surgit. Sedenim proprium id abietis est. Ferunt reliquæ sui generis fructum, & quæ annuatim renascuntur, illa folium, florem, germen: nonnullæ etiā muscum, aut clauiculam. Quibusdā datum à natura est, ut plura producant. Vlmus enim uuas affert, & folliculos quosdam. Ficus grossos præcidiuos, & caprificos, si quæ inter ficos caprificare consueuere, ni fortè pro genere fructuū hæcepiisse oporteat. Nux auellana iulum callo compactili, illex granū puniceum, Laurus uiuam, & fructifera: quanquam non omnis, sed genus quoddam: uerum sterilis copiosius, quam masculam nonnulli appellant. Pinus nucamentum præciduum. Robur omnium copiosissime, præter fructum, alia gignit. Nam gallam paruulam, atq; alteram resinofam, & nigram: quin & aliud specie ueluti morum, sed durum, & fractū admodum difficile: id tamen rarum. Ad hæc aliud, effigiem colis repræsentans. Cum uero perficitur, durum quid parte emicante, & perforatum, & tauri caput quodammodo æmulans profert, quod præruptum, nuciei oleæ speciem intus ostendit. Fert & quod quidā pilum appellāt. Id pilula est, comam gerens lanaceam, mollem, nucleo durior, qua in lucernarum luminibus utuntur, flagrat etenim probe, ut galla nigra. Fert & alteram comigeram pilulam, cæterum quidem inutilem, uerno autem tempore, succo melligeno inficientem tum tactu, tum gustatur: inq; ramorum alis pilulam aliam gignit sine pediculo, concauoq; sessilem, peculiarem certe, uersicoloremq;. Nam eminentes quosdam umbilicos candicantes, uel passim uariantes nigris maculis habent. Partem mediā grani tinctura infectam, splendidamq; ostendit, aperta, nigra, & putricans cernitur. Lapillum quoq; puniceum magna ex parte gignit, quanq; raro. Item aliam eo rariorem pilulam ē folijs conuolutam, compressam, atque oblongam. Super folijs uero tergo adherentem pilulam fert candidam, aquosam, dum tenera est: hæc etiam muscas interdū intus continet, ueniensq; ad incrementum iustum, in modum leuis paruulæ gallæ indurefcit. Robur tot, præter fructum producit.

Fungi ē robore, uiscum, humor melleus. Mas & fœmina in arboribus. De fago. De roboris generibus. Differentiæ in glandibus. De cerro. De gallis. Cap. IX



Vngos enim omitto, qui ē radicibus, & iuxta radices erumpunt: communes enim eos cum cæteris habēt arboribus. Quinetiam uiscum taceo, quippe cū in alijs quoq; proueniat, sed nihilominus (ut dictū est) ferax hæc arbor habetur plurimarū. Sin autē, autore Hesiodo, mella, apesq; ferat, magis quoq; illud confirmatur. Ergo nascitur uel hic mel leus

leus humor celo cadens, nec alijs magis insidens frondibus. Quin & cremati roboris nitrosum cinerem esse affirmant, hæc roboris propria. Arborum uniuersarū, ut dictum est, quo ad genera sigillatim accipi possint, plures sanè differentie intelliguntur: publica tamen, qua fœmina, masq; distinguuntur: quorum alterum fructiferū, alterum sterile in alijs est: ubi uero ambo fructifera, fructū meliorem fœmina præstat, nisi fortè mares eas libeat uocitari: sunt enim qui ita uocant. Proxima huic differentia, qua urbanū à syluestri discernitur. Aliæ uero per species unigenarū ipsorum redduntur, de quibus nunc indicare debemus: proprias quoq; formas simul persequendo illarum, quæ minus conspectæ, notæq; habentur. Roboris genera, id enim potissimo diuidunt. & quidam obiter, aliud urbanum, aliud syluestre appellant: nō dulcedine fructus distinguendo: nam dulcissimus fago, quam reddunt syluestrem: sed quoniam cultis magis proueniat, lignumq; leuius habeat: fagus autem scabra, montuosisq; nascens. Ergo genera, alijs quaterna, alijs quina assignant. Cæterū nonnulla nomine discrepant: ut eam, quæ glandem dulcissimam fert, alijs quercum, alijs placidam uocant. Quod idem etiam in cæteris faciunt. At ut Idæi diuidere consueuerent, genera hæc roboris habentur: placida, cerrus, latifolia, fagus, falsicortex, quam alijs recticorticem uocant, omnia fructifera: sed dulcissima glans fago, uti retulimus: secunda placidæ, tertia latifoliæ, quarta falsicortici, ultima & amarissima cerro: sed non singulis cuiusq; generis dulcis, sed etiam amara nonnullis, ut in genere fagi uidere licet. Distant etiam magnitudine, figura, coloreq; glandium. Peculiare fago, & falsicortici, quod ambæ in genere dicto uirili, glandes parte postrema utrinq; lapide scunt: alijs in putamine, alijs in carne ipsa: ideoq; detractis lapillis, concaua perinde, atq; in animalibus relinquuntur. Folio quoq; caudice, materie, totaq; specie distat: nanq; placida non erecta, nec leuis, nec excelsa est: quippe quæ corpore in orbem comoso, contorto, sinuosoq; stet, ut nodosa, alofaq; assurgat. Materies robusta, uerū infirmior, quàm fago: hæc enim robustissima, putredinē nulli obnoxia est: sed nec ipsa erecta, quanq; minus torta quàm quercus. Caudice uero crassissimo constat, ut tota quoque breuis species reddatur. Nam eius etiam corpus in orbem comosum, minimeq; erectum est. Cerrus rectissima, excelsissima, leuissima & materie per longitudinē robustissima, nuncq; in cultis, aut rarenter nascens. Latifolia secunda tum rectitudine, tum excelsitate, at ad ædificiorū usus post falsicorticem deterrima. Ad cremandum quoq; carbonemq; faciendum utrius obnoxia, sicut & falsicortex: quin & maxime, post illam tamen putrescit. Salsicortex enim crasso quidem caudice, sed fungoso & cauato: si crassus sit, magna ex parte cernitur: quapropter ædificijs minus hæc utilis habetur. Item breui putrescit, quod ex natura eius arboris accidit: quæ de causa concaua & inanis reddit. Sunt qui & corde hanc solam carere uolunt, & fulmine solam iaci, quamuis non altitudine excellat. Aeolum quidam nec ad sacrificia lignis eius utuntur. Hæc pro materie uniuersæ speciei modo discrimina intelliguntur. Gallas singula ferunt genera, sed quercus tantum ad coria utilis, cerri, latifoliæ, uisū quidem haud absimilis quernæ, nisi quod leuior, sed ad rem nullam utilis: fert & alteram, nigram, qua lanæ inficiuntur. Quod autem penem quidā appellant branchijs simile cerrus sola producit, canum, mucosumq; cubitali longitudine pendens, ceu uillus lintei prolixus: nascitur id ē cortice, non ē surculo, unde glans: nec ē gemma, sed à latere supernorum nodorum. At uero falsicortex id nigricans, pusillumq; gignit. Idæi hunc in modum distinguere solent.

Alia glandiferarum distinctio. Quæ arbor improba ad carbonem faciendum. De pinorum generibus. De picca, abiete, taxo, ostrea, tilia: deq; flore, & fructu tilie. Cap. X



Acedones quaterna genera faciunt: Veriquecum, quæ glandem dulcem producit: æsculum, quæ amaram: fagum, quæ rotundam: cerrum, quam alij sterilem dicunt: alij fructū uitiatum ad eodē ferre, ut eum animalium nullum mandere possit, præterq̃ fues: & hos, cum aliam nullam habent: magnaq̃ ex parte caput tentari. Materies quoq̃ improba, & laborata quidem, omnino inutilis: rumpitur enim, & cadit: rudis autem melior, ob id sic ea utuntur. Improba etiam ad cremandum, & ad carbonem faciendū: quippe cum carbo eius omnino inutilis, quod transiliat scintilletq̃, præterq̃ in ararijs officinis. His enim utilior cæteris hic habetur. Quod enim flatu desinente protinus extinguitur, paucus absumi potest. Salsicorticis materies ad axes, similiaq̃ tantum commoda est, roboris genera hæc assignant. Sed cæterarum pauciora sanè adnotant: partemq̃ ferè plurimam mare, ac fœmina discernunt, ut indicauimus: præterquam in paucis, inter quæ & pinus habita est. Pinorum enim aliam urbanam, aliam syluestrem assignant. Syluestris binum statuunt genus, quorum alterum idæam, alterum maritimam uocant. Harum rectior, celsior, materieq̃ crassior idæa: folio tenuiori, imbecilliori q̃ maritima, & cortice leuiori, utili q̃ ad coria: quod alteri minus. Nux maritimæ rotunda, breuiq̃ dehiscens: idæa oblongior, uiridis, minusq̃ dehiscens, tanquā syluestrior. Lignum maritimæ ualidius, nam eas quoque terrenorum differentias sumi par est: haud enim incognitæ sunt usus causa: idæa ramosior crassiorq̃ stat, ut retulimus. Ad hæc picem ipsa omnino copiosius præbet. Pix nigrior, dulcior, tenuior, odoratiq̃ gratior sentitur, dum cruda est: decocta uero deterior euadit, quoniam multum habeat serum. Sed quæ isti nominibus proprijs distinguunt, alij mare, fœminaq̃ diuidere solent. Macedones uero etiam genus quoddam pini sterilem dicunt, & marem breuiorem, folioq̃ duriorē, fœminam proceriorem, folijs pinguem, mollem, procliuioremq̃. Mari lignum circuncincta medulla durum, & operi fabrilī uersuale: fœminæ tractatu omnino facile atque mollius. Quod quidem omnium ferè marium, fœminarumq̃ publica differentia est, ut cæsores materię asseuerant. Quippe omnis mas securi breuior, & contortior, operiq̃ difficilior est, coloreq̃ nigrior: fœmina procerior atque facilior. Nam & quod ægidem appellant, pinus fœmina gignit. Id autem est cor eius. Ratio, quod minus pinosa, minusq̃ tedam ingerens, & leuior, cursuq̃ uenarum probior est. Fit in arboribus magnis, cum prostratæ parte candida, & circumstante putruerint. His enim detractis, medullæ relictæ securis adigitur. Est decolor omnino, neruoq̃ tenui compacta, quam idæi tedarij ficum appellant. Quod uero pinis subnascitur, colore tedarubidius maribus potius inest, odoris grauissimū, nec tedam redolens, nec flagrans, sed ab igne dissiliens. Igitur genera pini hæc assignant, urbanum, atq̃ syluestre: syluestrisq̃ marem, & fœminam, ac tertiam sterilem. At Arcadię incolę, nec sterilem, nec urbanam pinum appellant, sed piceam. Etenim caudicem euidentiorē esse piceę, utpote, qui gracilitate non careat, & operibus ipsam materiam ineptam: nam pini materies & crassior, & leuior, & excelsior est. Folia quoq̃ pinū multa, pinguiā, alta, flexaq̃ habere: piceam autē etiam coniferam ipsam, pauca, squalidiora, horrentioraq̃. Piceā item euidentiorē: pauca enim, atq̃ amaram, ut etiam coniferam: pino autē copiosam, boniq̃ odoris. Nascit̃ picea in Arcadia pauca, sed circa Elium agrū multa. Igitur in genere toto discrepare uidentur. Picea uero ea quoq̃ ratione distare a pino uidetur, quod pinguior, folio tenuior, magnitudine minor, erectaq̃ minus affurgit: præterea, quod conum minorē, horridiorēq̃ nucleū, resina solidiorē ferat. Ambabus folia capillata, & materies candidior, similioresq̃ abietij, atq̃ in totum minus pinosa. Magnā & hanc ad pinū differentia habet: pinū em̃ adustis radicibus nunq̃ regerminare, piceam regerminare quidem affirmant, ut in Lesbo accidit in-

censo monte Pyrrhæo, qui piceis scatet. Morbum pinis accidere talem Idæi incolæ narrant: cum non solum cor, sed etiam pars externa caudicis in tedam transuerit, tunc strangulari quodammodo: quod spõte accidit ubertate arboris largissima, quoad quisq; coniectare possit. Teda enim totum efficitur. Ergo hæc pini propria affectio est. Abies quædā mascula, quædā fœmina est. Distant inter se folijs: mari enim acutiora, magisq; pungentia, flexaq; magis: quamobrem aspectu crispior tota arbor uidetur. Quin & materia differunt: nam fœminæ candidior, mollior, operibusq; facilior, atq; totus caudex procerior: mari autem uariator, latior, durior: medulla refertior, atq; in totum aspectu deterior. Nuci maris pauci nucleis parte priore insunt: fœminæ nulli omnino, ut Macedones referunt. Folium pinnatum, atq; in angustis tendens, ut tota species concameratum sanè imitetur, simileq; potissimo cyathis Bœotorum appareat: densum adeo est, ut nec niuem, nec imbrem transmittat. In summam, arbor forma decora est, quippe germinatio quædam peculiaris nunc præter alias agitur (ut retulimus) solaq; ordinem seruat. Est magnitudine excelsa, longeq; pino procerior. Distat etiam ligno, non paulum: nam abieti neruosum, molle, leueq; pino autem tedaceum, ponderosum, atq; carnosius: nodi plures pino, sed duriores abieti. Quin & reliquis omnibus ferè duriores, quanq; mollius lignū est. Ad summam, nodi densissimi, solidissimi, patentioresq; abieti atq; pino: coloreq; tædæ proximi, & maxime sui generis, pinoq; magis, quam abieti: habet ut pinus ægidem, ita abies album, dictum Iussion, ueluti ægidi respondens, nisi quod id habet album. Aegis uero, gratius colorata est, quoniam tedam gerit. Spissum hoc & candidum, pulchrumq;, ex arboribus iam uetustioribus gignitur, sed frugi, inuentu rarum, uile, copiosum. Faciunt ex eo tabellas pictorias, atq; codicillos plures, lautioresq;, & materie præstantiores. Arcades ambo ægidem uocitant tam pini, quam abietis, & copiosorem esse abietis uolunt, sed meliorem pini. Abietis enim totam commodam, leuem, spissamq; pini uero exiguam & crispiorē, robustiorem, in totumq; meliorem. Sed hi nomine inter se dissentire uidentur: abies uero differentijs illis à pino distinguitur, ac etiam circumuersione, siue agnatione, quam superius diximus. Scissima nullas penitus differentias habet, sed ferè æquiparatur abieti: simplex genere est, erecta, leuis, enodis, crassitudine, altitudineq; æqualis ferè abieti. Quin & cætera non ab similibus est: lignū coloratum, robustum, neruatūq;: cortex leuis, folium crassum, bifidum, oblongius, quam pino, extremo aculeatum: radices, nec multæ, nec alte descendentes: fructus leuis, glandeus in calice echinata, placida tamen, & leui, non hispida, ut castanæ, similis tamen illi dulcedine, atq; succo. Nascitur etiam montibus candida materie, quæ ad multa perutilis: etenim ad carpenta, lectos, subsellia, menfas, nauigiaq;: campestris nigra, & ad hæc minus utilis, fructum tamen similem ferunt. Taxus quoq; genere simplex, procera, auctu insignis, similisq; abieti, nisi quod non pariter excelsa, magisq; alis sinuata est: folio quoque abieti similis, sed pinguior, molliorq; ligno. Quæ in Arcadia nascitur, nigro, aut punico constat: quæ autē in Ida, flauo, & cedro simili: propter quod uendentes, fraudare dicuntur: tanq; cedrum uenundent. Totū enim cor esse cortice detractio. Corticem similē cedro habere, tum scabricia, tum colore: radices breues, graciles, per summaq; cespitum: rara hæc circa Idam. At in Macedonia, Arcadiaq;, uel fructū abunde proferre, rotundū, faba paulo maiore, colore rufum, tactu mollem aiunt: quod si iumenta folia comederint, emoriuntur: si ruminantia, nihil patiuntur: fructus & ab aliquibus hoibus manditur, suauisq; est, atq; innoxius. Est & ostrys species simplex, quā nonnulli ostryam uocant: tam corpore, q; cortice scissimæ uicina, folio piri, præterq; quod id multo oblongius, inq; acutū depressius, atq; maius, neruo multiplici de medio constans. Reliquis autē rectis in modum costarum tum prolixius,

tum crassius porrectis: item per nervos rugatum, & ambitu leuiter ferratum: materies dura, decolor, exalbida: fructus pusillus, oblongus, ordeo similis, colore flauus: radices sublimes: aquas conualescens arbor hac gessit. Domum inferri minime idoneam tradunt: quippe mortiferam esse, & partus quacumque fuerit, difficiles reddere. Tilia quædam mas, quædam foemina: distant inter se tum materie, tum totius corporis forma, & quod altera fructifera, altera sterilis. Nam materies mari, dura, flaua, nodosior, spinosiorque: foemine candidior: & cortex mari crassior, detractusque inflexibilis propter duritiā est: foeminae candidior, flexibiliorque, ex quo cunas faciunt. Item foeminae odorator, & mas sterilis, nulloque flore est: foemina, & florem, & fructum gignit. Flos caliculi interfectus præter folij pediculum, amentumque futurum, pediculo altero annexus, uiridis, dum in calicula est: detectus autem leuiter flauus: floret cum urbanis: fructus oblongus, orbiculatus, magnitudine fabæ, similis ederae acino, quinque angulis, ueluti neruis eminentibus, inque acutum, cum se contrahebentibus partitus, qui scilicet maiusculus est, minutiusculus autem confusior constat. Cum ille maiusculus scabitur, paruula quædam, ac prætenuia semina, quantā atriplicis emitit, folium & cortex dulcia, suauique: folium forma ederaceum, nisi quod in angulum acutius rotundatur. Et quanquam iuxta pediculum curuatius, tamen de medio in acutius coactum prætendit, seque prolixius protrahit, crispum in orbem leuiter atque ferratum. Medullam exigua materies continet: nec multo reliquo molliorem corpore, nam & reliquum ligni molle est.

Aceris, &amp; fraxini genera.


Cap. XI



Ceris (ut retulimus) alij bina, alij terna genera statuunt. Vnum, quod communi generis nomine acere uocant: secundum caprinum, tertium lectirotariam, uidelicet, ut Stagiritæ distinguere solent. Caprinus uero ab acere distat, quod aceri candida, atque neruata materia, caprino autem flaua crispasque, ampla ambabus: platano in fidendo similis. Venis enim in longum fluctuat, sed gracilior, macilentior, mollior, longior. Omnia eius fissā in acutum compressa, absconduntur. Nec ita semifissa, sed summum potius pressissā multineruia minus sunt, quam pro sua magnitudine esse debeant. Cortice paulo scabriore, quam tilia uestitur, subliuido, crasso, spissiorique picea, inflectique contumaci. Radices paucas & sublimes, crispasque ferè magna ex parte tam flaua, quam candida gerit. Riguis potissimo nascitur, ut Idæi uolunt, inueteraque rara est. De flore nasci aiunt fructum haud ualde oblongum, & paliuro similem, uerum oblongiorem assignant. At uero Olympi incolæ caprinum montanam potius esse uolunt. Acerem planis etiam nasci, atque nascentē in monte flauam grate coloratam, crispam, & solidā esse, quā ad opera lautiora utuntur: campestem uero candidam, rariorem corpore, minusque crispam, quam nonnulli gallicam, non acerem uocant: marisque materiem crispiorē esse, atque cōtortam, & planis eam potius nasci, germinareque maturius. Duo & fraxini genera, quorum alterum excelsum, procerumque est, lignum candidum, cras-  
siuenum, neruarum, mollius, enodius, crispiusque habens. Alterum humilius, minus  
auctile, scabrius, durius, flauius. Folia laurinis, lauri latifoliae similia, in acutius tamē  
coacta, & ambitu leuiter ferrata, ac subsidentia. Ramulus totus, quē folium unum  
putaueris, quoniam simul cuncta folia ferat, singulari pediculo, & singulis folijs con-  
iugatum, ueluti per genicula pendentibus constat: amplo interuallo coniugationibus  
distinctis, similiter atque in sorbo. Sunt alij breuiores internodia, coniugationesque  
pauciores: alij utputa candidis longæ, pluresque, & singula folia oblongiora, angustiora,  
coloreque porracea: cortice leui, spisso, tenui, coloreque rubro integitur: radicibus  
crebris, crassis, sublimibusque adheret. Fructum Idæi nullum hanc habere existimant,

mant, atq; etiam flore carere. Fert tamen in siliqua fructum minutum nucis modo, qualis amygdalæ, gustu subamarum. Fert & alia quædam uelut muscos, quemadmodum laurus, uerum magis adstringentia gustum, singulaq; per se in orbem circumacta platani pilorum specie. Horum alia circa fructum, alia multo semota exerunt. Quin & implicamina quædam eodem modo nascuntur. Leuis illa locis potissimum concauis, madidisq; emigrat: scabra, siccis, atq; saxosis. Quidam alteram fraxinum, alteram bubulam. Fraxinū uocant, uidelicet Macedones. Maior, & ferior corpore bubula est, ob id minus crispa. Est enim omne campestre leue: montanū autem omne, scabrum. Quæ montibus nascitur, colorata, leuis, robusta, lentaq; est: quæ in planis, decolor, rara corpore, scabraq; assurgit. Ad summam, arbores ferè omnes, quæ tam montibus, quàm planis eadem proueniunt, monte coloratæ ualde, candidæq; assurgunt, ut scissima, ulmus, reliqueq;: plano autem rariores corpore, pallidiores, deterioresq;, præterq; pirus & fraxinus, ut Olympi incolæ uolunt. Hæ nanq; in planis cum fructu, tum materie præstant, quippe montibus scabræ, spinosæ, nodosæq; proueniunt: planis autem leuiore, fructumq; dulciorem, carnosioresq; ferunt: uerum magnitudine campestres semper excediunt.

Quod cornus mascula, & femina. De cedro. Quotq; iuniperorū,  
& sorborum genera. Cap. XII

 Ornus quædā mascula, quædam femina, quam & minicornū uocant: habet foliū amygdalæ, nisi quod pinguius, crassiusq; corticē neruosum, & tenuem: caudicem non nimis crassum. Cæterū femina uirgas paruas, sicut amerina, suo latere profert, & fruticosior est: nodos ambe, perinde ac amerina tum geminatos, tum inuicem congruos habent. Materies maris excors, totaq; solida, cornibus spissitate, firmitateq; summis: femine uero medullā continet, & mollior est, atq; cauatur: od id ad uenabulorū usum inutilis. Maris longitudo duodenorum maxime cubitorum, quanta uenabulorū macedonicorū longissimorum est. Caudex enim totus nulla excellentia extat. Qui Idam Troianam incolunt, marem sterilem dicunt, femina autem fructuosam. Nucleum fructus oliuæ similem habet, gustu dulcis, odoratuq; gratus. Olea: & floret, fructificatq; eodem modo, ut singulari pedicula plura proferat. Tempore quoque ferme conueniunt. At Macedones ambas fructificare affirmant, sed femina fructū ingustabilem esse: radices autem modo amerinarum habere ualidas, & nulli pernicio obnoxias. Nascitur etiā in humidis locis, nec tantum in siccis: prouenit semine, atq; auulsione. Cedrum quidam binam esse affirmant, alteram lyciam, alterā punicam: alij simplicem dicunt, scilicet qui Idam incolunt: est iunipero non absimilis: sed folio maxime distat, quippe cedro durum, acutum, spinosumq;: iunipero mollius: excellior quoq; iuniperus nasci uidetur. Cæterū alij nominibus minime diuidunt, sed ambas cedros appellant: cedrum tamen cum additione, cedrum acutū nuncupant: ambæ nodosæ, alosæ, & materie tortuosæ: uel potius iunipero parua, spissaq; materies, breuiq; putrescens, cum cæsa fuerit, cedro maxima ex parte corde deferta & putredinem nullam sentiens: fructus cedro odoratus, pulcher, gustatuq; suauis, iunipero cætera quidem similis, sed niger, gustuq; astringens, ut præ nimia acerbitate, propè ingustabilis sit: durat in annum, tum cum alter subnatus fuerit, præcedens decidit. At ut Arcades uolunt, fructus simul retinet ternos, id est, anni proxime exacti nondum maturum, & tertij ante præsentem iam maturum, atq; gustabilem, & tertium nouum ipsum demonstrant. Satyrus ambas sine flore sibi rusticos attulisse inquit: cortice cupresso similes uidebantur, uerum scabriore. Radices raræ corpore ambabus, atq; per summa telluris dispersæ. Nascuntur saxosis, &



frigidis locis, & solum eiusmodi quærūt. Mespili tria genera, anthedon, satanea, galatica, ut Idæi diuidere consueuerunt. Fert satanea fructum grandiorē, candidiorē, foliū tiorē, lignūq; intus mollius habentē; reliquæ minorem, sed odore præstantiorē, magisq; gustu astringentē, ita ut seruari diutius possit. Lignū quoq; his spissius, flauiusq; cætera autem simile. Flos amygdalæ omnibus, uerum non rufus, ut illi, sed propē uiridis: magnitudine arbor ista excellit, gyroq; comatur: folium magna ex parte infissum, quæ uel apium parte postrema imitantur, ampliore figura: quodq; promissum neruosum, apio tenuius, oblongius, totumq; circumtissum est, & pediculo tenui, ac longo dependet, anteq̃ decidat, uehementer rubet: radice numerosa, altaq; arbos cohaeret, ob id diuturna, & inextirpabilis est; lignum quoq; spissum, foliū 10 lidum, nullamq; sentiens putredinem habet. Nascitur & semine, & auulsione. Morbus earum, ut senescentes uermibus erodantur. Vermes isti grandes, & alij, quā qui in reliquis cernuntur arboribus. Sorborum duo genera dicunt, fœminam fructiferam, & masculam sterilem. Cæterum fructibus differunt, quod aliæ orbiculatæ, aliæ ouatum ferant: distant & succis, nam omni quasi ex parte odoratiores, dulcioresq; orbiculati sentiuntur: ouati sæpè numero acidi, minusq; odorati: foliū am- 20 habus totum prolixo, neruaceoq; pediculo constans. Singula uero in uersum condita, modo aliæ lateribus exeunt, tanq; ex omnibus unum exultet, ad neruum usq; laciniatum, uerum inter se ampliusculo singula distant. Decidunt non paulatim, sed simul tota illa alata facies. Sunt in uerustioribus, breuioribusq; pauciora. Omnibus 20 in postremo pediculi foliū impar prominet, ut etiam cuncta numero impari abfoluant. Figura laurum tenuifoliam imitantur, uerum ambitu serrata, breuioraq; sunt, nec in extremum acutum mucronata, sed in rotundius orbiculata. Flos racematim singulari pedicelo, ē multis minutis, & candidis constans. Fructus quoq; cum large fructificatur, racemi modo aceruatus producit. Quippe multa eidem cohaerent pedicelo, ita ut faui quodammodo speciem gerat. Eroditur a uermibus super arborem, crudus adhuc, magis quā mespila, pyraq; quamuis hic maxime omnium sit acerbus. Ipsa quoq; arbor uermibus obnoxia est, atq; ita senescens exarescit. Et uermis eius peculiaris, rufus, pilosus. Noua admodū fructificat: etenim trima continuo parit. Autumnino cum foliū amiserit, protinus amentaceum gerit pediculum, 30 pinguem, ac turgidum, quasi iam parturiat: germina itaq; hyeme perdurant. Aculeis tam foribus, quā mespilus caret: cortice leui, pinguiusculo: colore ad flauum albicante, nouæ uestiuntur: annosæ autem scabro, nigroq;. Præstat hæc arbos magnitudine, rectitudineq; coma concinna ornatur, quippe magna ferme ex parte nucis pineæ figuram suo uertice capit, nisi aliquid impediat. Materies solida, spissa, colorata, ualida. Radices haud multas, nec alte descendentes, ualidas tamen, & crassas, & incorruptibiles agit. Nascitur radice, auulsione, semine: solum gelidū, atq; humectū querit, quo tamedī uiuacior, aboleriq; contumacior, tamen montibus etiam nascit.

De ceraso, flamma Iouis, sambuco, salice, & eius generibus.

Cap. XIII

40



*filia corticis*

Arbor natura peculiaris cerasus est, magnitudine excellens, quippe, quæ ad uiginti quatuor cubita crescat: recta, admodum crassa, ut & bicubitalem ambitum ē radice compleat. Foliū mespili, sed admodum durum, latiusq;, ut ē longinquo arbos colore sit manifesta: corticis leuitate, colore, crassitudineq; tiliæ similis: quapropter cunas ex eo faciunt, sicut etiam ē corticibus tiliæ. Hic neque recto meatu ascendit, neque gyro pariter obducit, sed mucronatim ambit, ab inferius sursum uersus se, ad minusq; contrahens, quemadmodū foliorum descriptio. Cumq; desquamatur, hoc eodem modo de

do decorticatur, alioquin præscinditur, nec pars aliqua eodem filo detrahi potest. Quin & per crassitudinem prætenuis modo folij scinditur, reliquumq; durare, arborémque tueri potest, simili modo ambiendo: reliquo autem cortice ablato, humor tunc quoque defluit: & cum externa tunica tantum detracta sit, reliqua pituitaceo quodam humore nigrescit, rursusque anno secundo, alia, uice illius subnascitur, uerum tenuior. Materies in neruo cortici suo similis, se in anfractum conuoluenti. Virgæ quoque eodem modo ilico enascuntur. Ramis crescentibus euenit, ut alij deorsum assidue pereant, alij sursum uersus increcant: omnino arbos minus ramosa est, sed multo enodior, quàm populus: radice multiplici perquam summa, sed non crassa innititur, & conuolutio eadem radice, & corticis radicem regentis est: flos candidus, piro ex mespilo proximus, ex paruulis floribus constans, forma fauaceus: fructus ruber, figura Iouis flammæ persimilis, magnitudine fabæ, uerum Iouis flammæ nucleus durus, cerafo autem mollis: nascitur ubi alia, in plenum, ubi amnes, & rigua. Sambucus quoque iuxta aquam potissimum, locisq; umbrosis emicat, cæterum & in minus eiusmodi solo nasci non recusat: est fruticosa uirgis: quæ anniculæ, donec folia decidant, in longitudinem crescunt, tum in crassitudinem se distendunt: uirgis excelsio non nimis magna, sed sena maxime cubita: caudici crassitudo modo galeæ: cortex leuis, tenuis, spissus: materies fungosa, & siccata, leuis, medulla præmolli constans, ut uirgæ totæ concantentur: quamobrem ex his baculos faciunt præleues. Siccata ualida est, & inoffensa aquis, etiam disquamata si sit: disquamatur sua sponte, cum exaruerit. Radices per summam cespitum non multas, nec grandes agit: folium, quod particulatim exeat, molle, atque oblongum, sicut lauro latifoliæ, uerum maius, latius, rotundiusq; de medio, subtriusque: extremo in acutum compressius, ambitu serratum, totum autem circa unum pediculum, crassum, neruosumque, tanquam ramulus constat: & foliorum alia hinc, alia inde geniculatim, coniugatimq; adherent, ac inter sese spacio distant, unumque exit in cacumen: subrussa admodum folia, fungosâque sunt: defluit id totum simul, & hinc unum folium totum esse ratione putaueris. Rami quoque nouelli quædam ad geniculorum speciem habent: flos candidus è minutis permultis candidis constans, specie faui super fissuras pediculi. Redolet litrium, grauiter enim: fructum uero non secus singulo pediculo crasso annexum, racematum profert. Hic maturefcens nigrescit, immaturus omphaceus est: magnitudine eruo paulo maior: humore, aspectu uinaceus, & interna uisu sessamea continet. Salix quoque aquatica, & multigena est. Nam alia nigra dicta, quod cortice nigro, aut puniceo tegatur: alia candida, quod candido: uirgas pulchriores, & ad texendum commodiores nigra profert, candida spissiores. Est tam nigra, quàm candidæ genus quoddam paruum, & incremento in excelsum orbatum, sicut uel in cæteris arboribus idem intelligi potest, ut in cedro, & palma. Hoc Arcades non salicem, sed hellicam uocant, existimantq; (ut retulimus) fructum fecundum eam parere.

Vlmi genera quot sint. De populo, alno, betula, colytica. Cap. XIII



Vnt & ulmi genera duo, alterum montium, alterum ulmus uocatur: inter est, quod ulmus fruticosior est, montium auctior: folium indiuiduum, leuiter circumserratum, oblongius quàm piro, scabrum, non leue. Præstat hæc arbos, & amplitudine, & altitudine: non crebra circa Idam, sed rara prouenit: amat rigua: materies flaua, robusta, neruata, deformis: quippe tota cor est. Vtuntur ea, uel ad lauiore flores: & uiridis castus facilis, sicca difficilis est: sterilis denique putatur, gummam in

peciolis gignit, & animalia quædam culicea, & amenta peculiariter gerit. Autumno multa, minuta, nigra: cæteris uero temporibus quid ferat, minus animaduersum est. Populus alba, nigraque, uniformes habentur: corpore ambe erecto, sed excelsior, leuiorque nigra: figura foliorum similis, & lignum cum ceditur, albedine simile est: utranque ne florem quidem habere existimant. Alpina, populo albæ non absimilis est, cum magnitudine, tum uero quod ramis albicantibus spargitur: folio ederæ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, inque angulum exeunte acutum: colore parte resupina, pronaque ferme simili: pediculo prolixo, tenuique annexo, quamobrem non erecto, sed inflexo: cortice asperiori, quam populus alba, scabriorique, ut pinus sylvestris. Alnus quoque sterilis, & unigena est natura, corpore recto, ligno molli, medullaque molli, ut uirgæ graciliores totæ concauentur: folio piri, nisi quod ampliori, neruosisque: cortice scabro, rufoque intus, qua de causa coria tingit: radice summa, nec maiore quam laurus: nascitur in aquosis, alio nullo pacto. Betula folio caryæ dictæ conditur, præterque quod paulo angustiori, cortice autem uersicolore, & materie leui, non nisi ad baculos utili. Colytea folio salici uicina est, ramosa, foliosaque, in totum ampla: fructum in siliqua sicuti legumina gignit, eaque lata, non angusta: semen inclusum paruum, non magnū: durum modice, non nimis, nec abunde pro magnitudine sua fructificat. Sed quæ fructum in siliquis ferant, rara inuentur: quippe inter arbores, pauca huiusmodi habentur.

De nucæ auellana, terebintho, buxo, cratægo.

Cap. XV



Vx auellana (etenim hæc quoque natura sylvestris est) quoniam sylvestris, nullo, aut non multo deterius, quam urbana, fructificet: & hyemes quacunque perire possit, montibusque magna ex parte proueniat, & quidē fecundissima tempora ubertate. Ad hæc quod non caudicosa, sed fruticosa, uirgis sine alis enodibus, uerum breuibus, crassisque nonnullis assurgit. Cæterum & mansuescere potest: differt tamen, quod fructum meliorem, foliumque amplius habet: at circumferratū foliū ambabus, similitimū alno, sed latius: atque arbor ipsa amplior, fecundior assidue redditur, uirgis præcisis. Ambæ bino genere constant, quædam enim rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur. Sed urbanarum fructus candidior est, locis aquosis potissimo fructificat melius. Sylvestres translatae mansuescunt, corticē summū habet tenuem, pingue, maculis albidis, peculiariter uariatū. Materies admodum lenta, ut pregraciles uirgæ, desquamate, crassæ, derasæ renouentur. Habet medullam tenuem, flauam, qua cōcauant: peculiare his iulus callo cōpactus, ut retulimus. Terebinthorum alia mascula, alia foemina: mascula sterilis est, ob id sexui maris adopratur: foeminarum, alia fructum protinus rufum promit magnitudine lentis, qui concoqui nequit: alia uiridem editum, rufum postmodum tingit, & cum uite maturescentem nigrum nouissimo facit, magnitudine fabæ, resinofum, & sulfurosum. Circa Idam & Macedoniam breuis, fruticosa, contortaque nascitur: at apud Damascum Syriæ, magna, copiosa, decoraque: montem enim quendam terebinthis refertū, ut nisi aliud habeat, referunt. Materies ei lenta, radices ualidae in profundo, atque in totum incorrupta hæc arbor habetur: flos oleæ, uerum colore rufus: folia circa unum pediculū, pleraque speciei laurinoꝝ coniugata, quemadmodum sorbo, quodque parte postrema acuminet, impar exit: uerum minus angulata, quam sorbo, ambituque laurino similia, & pinigula cum uniuerso fructu. Fert & ad nucis similitudinē quædam concaua, ut ulmus: quibus bestiole, tanquam culices innascuntur. Fit in his resinofum quid, lentumque, sed resina tamē non hinc legitur, sed a ligno: fructus resinæ copiam non mittit, sed manibus tantum adheret: & si non lauetur, postquam collectus est, inter se coherescit: cum uero lauatur, candidus, præbeque maturus supnatar, niger subsidit, Buxus magnitudine non ex cellit, folio

myrto

myrto similis, nascitur locis algentibus atq; asperis. Quippe Cytora talis est, qua plurima provenit. Olympus quoq; macedonicus, frigidus est; nam & in eo gignitur, quanquam non magna: maxima autem, pulcherrimaq; in Cyrena est. Procera enim crassitudineq; ceteris longe praestantior, ideo uel insuaue est buxum olens. Crataegus, quam alij crataegonem uocant, folio mespilae promisso scilicet est, uerum maiori, latiori, oblongioriq; nec serrato, quemadmodum illa sit. Haec nec admodum magna, neq; crassa. Materies ei uersicolor, ualida, flaua: cortex leuis, mespilo similis: radix singularis, acta in profundum. Magna ex parte fructus rotundus, qui maturefcens siccatur, nigrescitq; gustu, & succo, mespilaceus: quapropter uelut syluestris mespilus apparuerit: est specie simplex, & sine ullo discrimine.

*Illicem praeter glandem, granum quoddam ferre puniceum: necnon uiscum habere, & hyphear, atq; ideo quaternos habere fructus. De smilace, phellodry. Item phellodrys, atq; ilicis fructum uocari acylum, Roboris uero glandem. Dein de arbuto, potulaca, pruno, ac subere. Cap. XVI*

**I**lex folio roboris est, uerum minori, aculeatoq; cortice leuiori, quam robur. Arbor ipsa magna assurgit, modo roboris, si locū, solumq; adipsificatur idoneum: materies spissa, robustaq; radix alta admodum atq; multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: ueterem nouus occupat, nam sero maturefcit, quamobrem bisera haec a nonnullis exstimata est. Fert praeter glandem, granum quoddam puniceum, & uiscum, atq; hyphear habet. Quapropter ut fructus quaternos habeat nonnunq; contingit, binos proprios, binosq; alienos, uisci scilicet atq; hyphearis: fert a septentrione uiscum, a meridie hyphear. Smilacem Arcades uocant arborem ilici similem, folio tamen non aculeato, sed molliori, profundiori, differentijsq; pluribus distinguendum: nec materies, ut illa, folida spissaq; sed soluta, molliq; in opere: quod phellodryn iude Arcades nuncupant. Natura huiusmodi est: simplici quidem ratione inter ilicem, & robur hanc esse putaueris: & quidam foeminam ilicem esse putarunt, ideoq; ubi illex nō provenit, hac ad plaustra, similiaq; utuntur opera, ut Lacedaemonij, & Elij. <sup>30</sup> Doreis quidem uel agrestem eam appellant: est mollior, ac solutior ilice, durior ac spissior quercu, colore ligni decorticati, candidior ilice, fuluor quercu, folio similis ambabus: uerum maiori, quam illex, minori, quam quercus: & fructum pro magnitudine minorem, quam illex habet: maiorem, q̄ quercus. Fructum ilicis, huiusq; nonnulli acylum uocāt, roboris autem glandem: est & medulla manifestior, quam illex. Phellodrys natura huiusmodi est. Arbutus, quae pomum cibo idoneum ferat magnitudine non nimium praestat: corticem tenuem tamarici similem habet, foliū inter ilicem & laurum: floret mense Iulio: flores singulari appendice parte postrema racemati coherent, specie quicq; myrto oblongo similis, & magnitudine tantus, non foliatus, concavus tanquam ouum ex caltrium ore aperto: cum autem defloruerit, retinaculum perforatur: quodq; defloruerit, tenue, sicut uerticillis circa fūsum, uel carniis doricis extare apparet. Fructus anno integro maturefcit, ut simul hunc haberi, atq; alterum flore sponderi contingat. Potulaca quoq; folio arbuti similis est, magnitudine non nimium praestans, cortice albo circumrumpi solito, fructum arbuti similem parit. Prunus his folio similis, corpore parua. Peculiare in hac, fructum lanugine pappo dicta, perire: id enim de nulla alia arbore accepimus. Haec regionibus, locisq; pluribus assignantur communia. Quaedam uero propria locis certis redduntur, ut suber arbor Pyrrheni familiaris, caudicosa, parumq; ramigera, admodum tamen procera, auctuq; insignis, ligno robusta, cortice unice crasso, distrumpi solito, quemadmodum picea, uerum fragmentis grandioribus: folio fra-

xini, crasso, oblongiori, nō perpetuo, sed deciduo: fructum glandosum assidue fert, aquifoliae similem: detrahunt corticem, uniuersumq; diuidendū censent: alioquin arborem deteriore effici uolunt: rursum uero intra triennium repletur.

*De colutea, colyteaq; & lauru alexandrina, ficoq; & uiti: deq; ea uite, quam uocant phalacras: quociq; rhamnorum genera. Item de equo, & paliuro.*

Cap. XVII



Olutea quoq; Liparæ propria traditur, arbos magnitudine præstans, fructū in siliqua ferens, magnitudine lentis, qui oues mirū in modum pinguefacit. Nascitur semine, & fimo præcipue ouillo. Tempus serendi, cum Arcturus occidit: serendū semine præmadefacto, cum iam in aqua pullulare inceperit. Habet foliū non ab simile scēnogræco: germinat primo unicaulis, triennio maxime: quo quidem tempore baculos decidunt: tunc enim præstantiores esse uidentur: & si ita quis decurtauerit, mox arbor emoriatur, haud enim latere plantigera constat: spargitur deinde in ramos, quartoq; anno arborefcit. Arbor circa Idam proueniens, quam colyteam uocant, genus aliud est fruticosum, ramosum, alosum, inuentu rarum, nō crebrum: folio laurino, lauri, latifoliæ, sed rotundiori, ampliori, ut uel ulmeo simile appareat, oblongius tamen: colore parte altera herbido, tergo autem albido, neruofoq;: tum ibidem neruulis prætenibus fibrisq;, tum inter eas propagines, quæ de medio callo, in costarū speciem adducuntur: cortice non leui, sed quasi uitis uestitur: ligno duro, spissoq; constat: radices per summa graciles, atq; solutas gerit, sed uibratas, flauasq; maiorem in modum: fructu, flore, carere putatur. Amentum autē, surculum, gemmasq; circa folia, admodum leues, pingues, candidasq;, facie amentacea fundit: præcisa, uel igne deusta, ab imis subnascitur, atq; refurgit. Illa quoq; propria esse circa Idam feruntur, laurus alexandrina cognominata, & ficus quædā, uitisq;. Lauri proprietates, quod fructū super folia gignit, quemadmodū myrtus syluestris: quippe fructū ambæ super dorsum folij ferunt. Ficus fruticosa est, nec excelsa, sed crassa, ut uel cubitali ambitu sit, ligno contorto, lento, inferius leui, nulloq; ramo superius, gyro comato, colore tam folij, quàm corticis liuido, figura folijs tilia: similis: mollia quoq;, lataq; sunt, magnitudine similia: flos mespili, & cum mespilo fleret: fructus, quem ficum appellant, rufus, magnitudine oliuæ, sed rotundior, gustu mespilaceus: crassas radices agit, ut ficus urbana, lentasq;: nunq; hæc putret, & cor solidū, non mollem medullam continet. Vitis nascitur ea parte Idæ, quā uocant Phalacras: est fruticosa, uirgis paruulis, & ramulis cubitalibus penè exporrigitur: quibus acini laterales nigri adherent, magnitudine fabæ, dulces, qui lignū uinacei modo intus continent: foliū rotundum, indiuiduum, paruumq;. Cæteris quoq; montibus propria quædā natura dederat, alijs arbores, alijs frutices, alijs reliquæ materiæ aliquid. Sed proprietatē singulis locis inesse, dictum sæpius est: discrimen autē quod in prædictis unigenis, tam arboribus, quàm fruticibus præcipitur, in reliquis quoq; plurimis pari modo, ut exposuimus, intelligi potest. Exempli gratia: in rhamno, paliuro, equo, oëto, fluida, edera, rubo, multisq; alijs. Rhamnorum enim, alia nigra, alia candida, fructusq; diuersus, ambæ uero aculeigeræ: æquorū quoq; alia candida, alia nigra: & flos, fructusq; utriq; pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam medijs quodammodo sunt, quibus flos in purpuram candicans, nec enim fuluus, nec exalbidus est: folia quoque tenuiora, leuioraq; candida, ut uirgæ, similiter graciles, & leues. Paliurus quoque differentias nonnullas habet: omnes autem fructiferæ sunt. Et paliurus quidem in siliqua fert, in qua terna, aut quaterna semina gignit, quibus medici contra tussim contusis utuntur: habent enim lentitiā quandam, atq; pin-

guedinem, ut semen lini. Nascitur locis dilutis, & aridis, sicut rubus: sed non minus diluta quærit: folijs deciduis est, non perpetuis, quemadmodum rhamnus.

Rubi genera quot: ac de canirubo, fluidarumq; generibus, & medicamento ossæ, quod fluida dicitur. Item de edera, similæ: deq; arbore appellata Euo-  
nimo. Cap. XXVIII

**R**ubi genera plura, sed maximo inter se discrimine distant: quod quædam erecta excelsaq; quædam propè à terra, protinusq; deorsum uergens: cumq; se terræ coniunxerit, radicans rursus, quæ humirubum quidam appellant. Canirubus autem fructum subrutulum parit, malo punice simile: est inter fruticem, atque arborem punicæ, non ab similibus folio amerinæ. Fluidarum, aliam masculam, aliam foeminam dicit, quod alia sterilis, alia fructifera sit: nec uirgas longas gerit, neq; crassas: folium ulmeo simile, nisi quod parum oblongius, densumq; aliquantulum: ramulorum nouellorum folia paribus internodijs coniugatim condita adhærent, & planè è lateribus ordo uersus conspicitur. In ficiunt his cortarij alba coria. Flos candidus, racematim enascens. Hic ubi defluxit, fructus cum labrusca rubescit: fiuntq; ceu lentes tenues congestæ: figura his quoq; in modum uuæ. Medicamentum fluida dictum, ossæum in his continetur: radix per summa, & simplex, ut facile auelli possit radicitus: lignum sine medulla, & cæsum quoq; in corruptum perdurat. Nascitur omnibus locis, sed in argillaceis potissimum præstat. Edera quoq; multigena est: quædam enim humi repens, quædam se in excelsum attollens. Et excelsarum genera plura, sed trina summa patefcunt, candida, nigra, tertiâq; clauicula. Horum item species plures: quippe alia fructu tantum candida, alia etiam folijs: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia mascululum, densum, & uelut in globum circumactum fructum profert, quæ corymbiam quidam uocant. Athenienses acharnicam riguam eam appellant. Alia minorem, sparsioremq; modò nigre. Habet nigra differentias, sed non hunc in modum conspicuas. Sed clauicula differentijs maximis discernitur, etenim folijs plurimum distat, cum paruitate, tum quod angulata, concinnioraq; sint, cum edera rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atq; etiam sterilitate, quoniam fructum quædam non ferant: quod non in edera transfigurent, ut quidam uolunt: at uero si omnes ederefcant, ut alijs placet, ætatis certe, dispositio nisq; nō generis erit discrimen: quemadmodum piri ad pirastrum. Tamen eius quoq; folium multū ab edera distat, uerum id rarum, & in paucis euenit, ut uetustate permuetetur, ceu in populo alba, & crotone. Ergo clauiculæ plura genera: sed quæ conspectiora, summaq; occurrant, tria sunt: herbacea, ac uirens, quæ plurima est: secunda candida: tertia uersicolor, quam thraciam quidam appellant. Et harum quæq; distare uidentur: quippe herbaceæ quædam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam densiori: quædam minus hæc omnia habens: & in uersicoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumq; habitu diuersa: pari modo & magnitudine, coloreq; distant. Auctu perfacilis herbacea, incipit plurimum uenit: manifestam, quæ ederefcant affirmant, nō tantū folijs, quæ maiora, latioraq; habet, uerum etiā germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea uero crassiora, breuioraq;: ac edera, ut semen proferre inceptit, germen sublime, rectūq; edit. Est quidē uniuersa edera radice numerosa, dēsa, flexuosa, furculosa, crassa, nec nimis alta, sed præcipue nigra, & inter candidas, quæ asperrima, immittissimaq; habetur: quāobrem eius amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat & exiccat, ablato alimēto. Crassatur hæc maiorē in modū, atq; arborefcit in tantū, ut per se ipsa edera arbor fiat. Attamen ex maiore parte semper super aliud uitam degere solet,

atq; (ut ita dixerim) amplexicaulis est, ita pro sua natura, uel quiddam eiusmodi silico gerit. Nam ē germinibus radículas assidue inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à natura exhibitis: atq; ita humorem auferens, exhauriensq; arefacit: & si inferius succidatur, nihilominus uiuere durareq; potest. Habet uel aliud discrimen non mediocre in fructu: nam aliis dulcis, alius uehementer amarus, tam in candida, quam in nigra: indicium, quod alium aues mandunt, alium minime attingunt. Edera ita se habet. Smilax, id est, edera cilicia, amplexicaulis ipsa quoq; assurgit: fructus aculeatus, & uelut prae horridus. Folium edere, parum, sine angulo, iuxta pediculi retinaculum humectum: peculiare, quod mediū illum callum, qui instar spinæ animantium secat, prætenuem habet, & interualla 13 staminea, non ex eo porrecta, ut cætera, sed circa eum in orbem circumacta, ab an nexu pediculi ducit, ad caulem uero foliorū internodia consummantem: uillus ab eisdem pediculis, atq; folia tenuis, seq; conuoluens dependet. Flos candidus, suauiter olens, uerno proueniens tempore: fructus proximus herbæ folano atq; melothro, & maxime uuae labruscæ uocitatur: racemi peniles ut ederae sunt, uerum ad la bruscam potius accedunt: nam de eodem puncto pediculi acinorum exeunt. Colore fructus rutilus est: nucleos in uniuersum quidem binos continet, quantū gran dior ternos, & paruulus unum. Nucleus durus admodum est, & colore forinsecus niger. Peculiare racemis, quod per latera caulium sepiunt: postremoq; caulis, race mus omnium maximus propendet, sicut in rhamno, & rubo: unde fit, ut extremo 23 fructifera, latere large fructifera ista spectetur. Arbor Euonymus dicta, nascitur cū alibi, tum in Lesbo insula, monte Orcynio, cui nomen Ordyno: magnitudine māli punice, atq; folio eiusdem maiori, quam Vincaperuincia: & molli, ut punica. Germinare mense Septembri incipit, floret in uere: flos colore albæ uiolæ similis, odore in festus, uelut cruorem inferens: fructus cum putamine siliquæ sesame proximus, in rus solidus, præterq; quod in uersus diuiditur quaternos: hic pecus enecat gustatus: quinetiam folium idem facit, & potissimo capras, nisi purgentur, interimit. Purgan tur autem anecho. Et de arboribus quidem, atque fruticibus dictum iam est: reli qua de cætero indicandum.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI  
TERTII FINIS.

39

THEOPHRASTI DE HISTORIA PLAN  
TARVM LIBER QVARTVS.

Quibus locis quæque arbores gaudeant.

Cap. I



EXPOSITAE superius sunt differentiae unigenorum: omnia 49 uero suis locis meliora proueniunt, magisq; uigent: nec sylue sribus loca propria defunt, sed singula sibi accommodata sortis untur, quemadmodū urbana. Quædam enim aquosa, & palu sria adamant, ut populus, ut salix: deniq; omnia, quæ secus fluui os nasci solent: quædam ædita quærunt, atq; aprica: alia potius umbrosa. Pinalstrum enim pulcherrimū, amplissimumq; apri cis emigrat, umbrosis autem nasci omnino nequit: contrā abies umbrosis pulcherri ma, apricis haud similis sibi assurgit. Itaq; in Arcadia circa Cranam uocatam, loco quodam cōcauo, & silente à uentis, quem nunq; solem attingere aiunt, abietes plu rimum

rimum tum longitudine tū crassitudine ceteris præstant: nō tamen pariter frequen-  
tes, neque pulchre cernuntur, sicut etiam pinaltri, quæ locis umbrosis enascantur.  
Quamobrem ad lautiora operū, ut fores, cæteraq; magnificēda hūc minus utun-  
tur, sed ad nauigia, domosq; duntaxat: quippe trabes & antennas ex his optimas fa-  
ciunt, atq; etiam malos præstantissima longitudine, sed non similiter ualidas, atq;  
ex ijs, quæ Soli expositæ statēt: sed ex breuitate dēfiores illis, robustioresq;. Taxus  
quoq; & padus, & thraupalus gaudēt uehementer umbrosis. Montium cacumini-  
bus, locisq; argenteis thuiā enascitur, & excelsa quidē. Abies & iuniperus nascun-  
tur quidem, sed non in excelsum, sicut etiam circa Cyllenium promontorium eue-  
nit. Celastrus quoq; summis, gelidissimisq; provenit locis. Igitur hæc frigidorum lo-  
corū auida, ratione posueris: reliqua uero (ut ita dixerim) omnia apricis potius gau-  
dent. Verū id quoq; pro modo suæ cuiq; telluris euenit. Itaq; in Creta insula mon-  
tibus Idæis, Leucisq; uocatis, super summa, quibus nix nunquam deest, cupressum  
comperiri affirmant. Nam id genus syluæ plurimum, & in mōtibus, & omnino in  
insula est. Sunt autem (ut dictum superius est) tam ē syluestribus, quā ex urbanis,  
alia campestria, alia potius montana. Inq; montibus ipsis ad portionem alia in imis,  
alia in summis proueniunt, ita ut & pulchriora, & fertilia exurgāt. Vbiq; autem  
uniuersæq; syluæ pars ad septētrionem spectans, ligna spissiora, pulchrioraq; pro-  
fert, & summatis meliora: atq; omnino robustiora in aquilonijs exeunt, augentur,  
atq; proficiunt: densa in longitudinem potius, ideoq; enodes, rectæ, proceræq; fi-  
unt, remiq; ex his optimi sumuntur. Potius autem in profunditatem, & crassitudi-  
nem distenduntur: propterea obliquiores, nodosiores, atque in totum solidiores,  
spissioresq; assurgunt. Has easdem fere differentias habent & quæ opacis, afflatuq;  
permotis nascuntur: nodaciore enim, breuiore, minusq; rectæ, quæ apricis, quā  
quæ flatribus expositis locis extant. Quod autem singula terram propriam, coeliq;  
accommodatam temperiem quærūt, eo sanē manifestum, quod quædam loca ali-  
qua ferunt, quædam nec sponte ipsa nascentia, nec sata facile ferunt: & quanquam  
apprehēderint, fructum nullatenus pariunt, ut de palma, & moro ægyptia, alijsq;  
quibusdam retulimus. Sunt enim plura, locisq; pluribus, quæ tamen ierūt, non  
tamen augeri, fructificareq; possunt, sed uitata in totum assurgunt: de quibus for-  
tasse dicendum est, in quantum habeamus historiar.

De moro ægyptia, & ficu cypria, & filiqua, & persea, glandeq; & cuciofera.

## Caput II



Vnt enim pleræq; in Aegypto arbores, ut morus, & persea dicta, &  
glans, & spina, & alia quædam, quæ peregrinari omnino nequeunt.  
Morus similis quodammodo moro nostrati est: quippe folio, magni-  
tudine, aspectuq; proxima. Fructum præter cæteras peculiariter gi-  
gnit, ut uolumine primo differuimus. Non enim germinibus, non ra-  
mis, sed caudice pomum parit magnitudine ficus, & uisu proximum: succo, atq; sa-  
pore caprificis sanē simile, uerum longe dulcius, granisq; internis omnino carens;  
multitudine numerosius maturefcere nequit, nisi scalpum: quod unguibus ferreis  
scalpitur: quæ cum scalptra sint, ad quartum die maturefcūt: hūc ablatis, alia & alia  
ex eodē loco subnascuntur, nullo diuersa: idq; alij ter, alij sæpius factitari affirmant.  
Lactuosa arbor admodū est, & ligno ad multa percommodo. Proprium id præter  
cætera habere uidetur, quod cæsum continuo uiride est. Siccatur autem in profun-  
do aquæ: mergitur enim in profundas fodinas stagnaq; protinus, atq; conditur, ma-  
defactumq; in profundo siccatur: cumq; siccum omnino fuerit, superfluit, atque  
innatat: itaq; probe cōditum esse uideatur, fit enim leue, atq; solutum. Morus pro-



prietates hasce sortita est. Proxima natura eius uidetur, quæ in Creta ficus cypria nuncupatur: nam illa quoque fructum caudice, ramisque crassissimis fert, nisi quod germen quoddam sine ullo folio, tanquam radicula mittit, cui fructus præpiatur. Caudex magnus & populo albæ similis, folium ulmo in fructus quaternos perficit, totiesque germinat, sed nullum ad maturitatem perducit, nisi pomo ipso immaturo inciso, emissisque lacte. Dulcedo ficibus non absimilis, & interna grossis planè conueniunt: magnitudo autem pruni est. Similis etiam siliqua, quam Iones Ceroniam uocant. Nam & ipsa caudice maximam fructus partem expellit, ramis autem (ut diximus) paucum fert. Siliqua, quam ægyptiam fici quidam appellant, errore scilicet (nulla enim omnino in Aegypto, sed in Syria nascitur, & in Ionia circa Cnidum, Rhodumque) folijs semper comatibus, flore candido, & olente grauissime, radice leuiter sublimi, atque omnino plantigera imis partibus est, superius tamen subarescens: fructum anniculi simul, & nouum habet: altero namque detractio post Canis ortum, protinus alterum gigni patescit, gignitur enim uua modo indiscretus atque uniformis: tum autem circa arcturum, & æquinoctium floret: dehinc hyeme exacta, durat usque ad Canis ortum. Ergo similitudo quidem, quoniam hæc etiam fructum caudice fert, differentijs autem prædictis à more utique distinguuntur. Est in Aegypto alia quoque arbor perseæ dicta, aspectu magna, formosaque: folio, flore, ramo, totaque figura potissimum piro uicina: nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructum abunde parit, omnisque tempore perficit, quippe nouus anniculi semper occupat. Maturitas annuæ etiam arborum afflatu cõfiscitur: reliquum crudiorum auferunt atque recondunt. Est magnitudine piri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidus, nucem intus quemadmodum prunus continet, uerum longe minorem, mollioremque: carnem uehementer dulcem, suauem, concoctumque facilem: nil enim eos, qui nimium comedierint, tentat. Radice arbor exuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine, multitudineque materiem robustam, & uisu gerit decoram, atram, ut faba græca. Ex hac etiam simulacra, & lectos, & mēsas, & reliqua similia faciunt. Glans à fructu nomen accepit: folium ei simile atque myrto, oblongius tamen: illa scilicet, magnaque arbor est, uerum non recta, sed contorta. Fructus putamine cõtuso unguetarij uti solent: est enim boni odoris, sed fructus ipse inutilis, magnitudine, uisuque inturi proximus: materies ualida, & tam ad alia quam ad nauigia percommoda. Cuciofera quæ appellatur, palma similis est, similitudinem in caudice, & folijs representans: sed differt, quod palma indiuidua, simplexque assurgit: hæc cum aliquatenus increuerit, scinditur, fitque bifida, iterumque horum utrunque pari modo diuiditur. Item uirgas breues, nec multas profert: cortice sicuti palmæ ad utensilium nexus utuntur. Fructum peculiarem parit, nam & magnitudine, & figura, & succo singularem: quippe magnitudine ferme, qua manum impleat: rotundum, non oblongum, colore flauicantem, succo dulcem, & ori gratissimum: non cõgestum, ut palma, sed per singula discretum: nucleo magno, uehementerque duro, ex quo annulos uersicolores detornant, quibus in singulis uinculis utuntur. Materies à palma plurimum distat, altera enim rara corpore, neruosa, & uiridis: altera spissa, grauis, carnosaque, & cæsa, crispa admodum atque dura. Persæ quidem maiorem in modum eam præferebant, sed lectorum pedes ea cõfisciebant.

De spina, quodque eius genera. Itē de primo, et arboris magnitudine circa Memphim. Cap. III



Pina ex eo nomē accepit, quod tota arbor aculeis horret, excepto caudice: nam & super germina, foliaque aculeos gerit: magnitudine excellit, materies quippe duodenorum cubitorum. Tectis idonea caditur. Eius duo genera sunt, quadam enim candida, quadam nigra: & altera imbecillis, facileque putrescens: nigra autem robustior atque incorruptior ob id

ob id in nauū fabrica ad costas, uentrisq; compagine ea utuntur: erecta non ualde  
 affurgit. Fructus in filiqua modo leguminū, quo incolæ coria perficiunt uice gallæ.  
 Flos & pulcher aspectu, ut coronas ex eo facerent: & medicamētis perutilis, qua de  
 causa colligi à medicis solet. Fit & gumma ex ea, manat tum arbore percussa, tum  
 sponte, sine ulla fissura: cum autē cæsa fuerit, anno tertio protinus resurgit. Copia  
 huius arboris large habetur, & sylua ingēs circa agrum Thebanū est, ubi & robur,  
 & perseæ, & olea quoq; eo loco emigrat: non aquis fluuij riguo (distat enim plus q̃  
 trecentis stadij) sed suis fontibus, qui circa eum tractū permulti exiliunt. Oleum ni  
 hilo deterius hoc nostrate habetur, nisi quod deterius olet, quoniā natura sole raro  
 10 utatur. Materies arboris dura: & cæsa, colorē celtis utiq; repræsentat. Alia quædam  
 arbor prunus habetur insignis magnitudine, fructū ferens natura, & magnitudine  
 mespilis proximus, nisi quod rotundū nucleum habet. Florere incipit mēse Iulio,  
 fructum circa brumam perficit, nec folia dimittit. Qui circa agrum Thebanū colūt,  
 propter arboris copiam, fructum siccant, lignoq; exempto tundūt, offasq; faciunt.  
 Nascitur peculiaris quædam materia circa Memphim: non folijs uel ramis, uel tota  
 forma proprietatem sortita, sed affectione, quæ accidit: quippe facies eius spinosa,  
 foliumq; silicibus non absimile: sed cum ramulos quicquam tetigerit, folia quasi he-  
 betata concidere, tum tempore aliquo post reuiuiscere, rursusq; uirere assurant.  
 Atq; propria quidem eius regionis, tanq; si quis arbores, aut frutices dicat, insignia  
 20 hæc assignantur. Nā de ijs quæ in fluuijs atq; paludibus exeant, postea differemus,  
 cum de reliquis etiā aquatilibus uerba faciemus. Omnes autē huiusmodi arbores  
 suis locis magnæ, tum lōgitudine, tum crassitudine affurgūt. Itaq; circa Memphim,  
 arborem tanta magnitudine esse ferūt, ut tres homines nequeat eius amplecti cau-  
 dicem, cuius etiam materie cæsa commoda operibus est: admodum enim spissa, co-  
 loreq; celtis arboris est. In Africa uero celtis plurima, optimaq; gignitur, necnō &  
 paliurus: quin & quibusdā partibus, ut Nassāmenico agro, & apud Ammonem,  
 aliosq; existit. In Cyrenensi autē cupressus, oleaq; optime prodeunt: oleumq; plu-  
 rimum fit. Sed omnium maxime peculiare laserpitium est: nam id quoq; copiosum  
 ea regio profert, odoreq; suauissimum.

30 De Celte, & Paliuro, & palmis Africæ sitientis: & Mero monte, ubi Liberum patrem natum  
 fabulantur, deq; mælo medica, & persica. Caput IIII



Eltis propriū genus præstat, magnitudine quanta pirus, aut paulo  
 minore: incifuras foliū habet, ac ilicis esse uideatur: materies nigra. Ge-  
 nera eius plura, fructibus inter se discreta prodūtur: fructus magnitu-  
 dine fabæ, maturefcit uuarum modo, uarie colores immutās: nascitur  
 quemadmodū myrta aduersa inter se, densus super germina, gustatur  
 inter Lotophagos dictos prædulcis, suauis, innocuus, atq; etiā bonæ frugis. Ven-  
 40 tribus est suauior, qui sine ligno interiori est: nam uel genus huiusmodi redditur, &  
 uinū eo exprimitur. Multa hæc arbor, fructuq; copiosa est. Exercitū itaq; Ophelli,  
 cum in Carthaginē proficisceretur, uel eo fructu diebus pluribus pastū cōmeatum  
 defectu, accepimus. Est igitur in insula Lotophagia Pharide uocata larga copia, cæ-  
 terum nō minor in continenti, sed longe largior est: plurima enim hæc omnino in  
 Africa, & paliurus, ut retulimus: quippe apud Hesperides hīce ad urendū utūtur.  
 Sed hæc celtis distat ab ea, quæ Lotophagorum. Paliurus certe fruticosior est, folio  
 huic nostrati similis: fructu diuerso, nō enim lato, sed rotūdo, rubroq; magnitudi-  
 ne, quæ cedri, aut paulo minore: nucleū nō mandēdū, modo acinorū punici habet:  
 fructum uero iucūdum per se, atq; si quis uinū infundat, tum ipsum suauiorē, tum  
 uinū suauius reddi asseuerant. Nonnulli celtim arbore fruticosam, ramosalēq; tra-

dunt, caudice firmo, uel fideli, fructu nuce obducto, parte externa minime carnosâ, sed potius pelliculari: cibo nō tam dulci, q̄ gustatu aliās grato, & uinū quod eo exprimitur, non nisi binos, aut ternos dies durare, dein acescere: suauiore itaq; fructum apud Lotophagos esse, materiem autē optimam in Cyrenæa prouincia, tractumq; Lotophagorum feruidiorem cōfirmant. Radicem autē esse quidem multo nigriorem, q̄ lignum, sed minus spissam, & ad pauciora commodam: quippe tantū ad pugiones, glutinamētaq; usui est. Lignum, tibijs, & alijs pleriq; expetitur. Parte autē Africā, qua nūq; pluit, pleraq; alia, & palmas magnas atq; optimas, puenire aiunt. Cæterū ubi palma, falsilaginem, & rigutū esse locū, nec admodū in profundo aquam cōperiri, & dulcē & ibi salsam inuicē propinquas. At ubi reliqua oriūtur, solū siccū, & omni aqua orbatū esse: alibi uero puteos etiā esse centū passuū, ut non nisi iumentis per uertiginē haurire possint. Quamobrem mirum quo tandē pacto effosæ sint altitudines tam profundæ. Igitur aquas subditas palmis uel ad Ammonis delubrum esse ferūt: uerum differentiā, quam diximus, obtinet. Thymū quoq; parte pluuiā carēte, plurimū nasci, & alia peculiaris naturæ complura, atq; etiam leporem isthic gigni, & damam, & struthum, & alia ex genere bestiarum. Sed hæc an locū aliquē bibendi gratia petant, incertū est: præsertim cū post dies aliquot bibant, ut nonnulla ex urbanis tertio, uel quarto die portū ducūt. Serpentes autē, lacertæ & similia, quod sine potu uiuere possunt, nulli dubiū est. Afros hæc onum mādere affirmare aiunt, qui uel apud nos uermis quidā multipes, aterq; gignitur, sese in orbes conuoluēs: hunc autē locis illis multū admodum nasci, naturaq; esse humidum narrant: rore uero partē carentem pluuiā, semper abundare: quapropter palmam, & si quid aliud humectis proueniat, partim eo quod de terra alcēdit, partim ratione cœli cōstat nutriri. Satis enim humoris est, pro magnitudine, & natura eorū, ut potes sicca, & c̄ siccis constante: & pro desiderio arborū, quæ cum plurimæ nō sunt, tum peculiare nascuntur. De aserpitio qualem naturā sortiat, postea indicandum. In Asia uero apud singulos peculiaris quædā proueniūt: quædā nanq; proferūt terræ, quædam nullo modo producūt, ut in Asia ederam, & abietem parte superiore Syriæ, itinere à mari quinq; dierū, enasci negāt: sed in India uisam in monte, cui Mero nomen, affirmāt, quo Liberum patrē ortum fabulæ aiunt. Qua de causâ Alexander cum aliquādo ex India descēderet, coronatus & ipse, & exercitus ibat. Harpalus uero in Mediā tantū locare eam cōtendit, serēdo sæpe in hortis Babylonij, & curiose colēdo, sed nihil efficere potuit. Hæc enim nullo pacto uiuere ualebat, sicut reliqua, quæ aduecta de Græciā sunt, hospitari patiebantur. Hoc igitur ob cœli cōditionem regio recusat. Et buxum uero, & tiliam uix summo conatu recipit: nam his & cultores hortorū uehementer laborant. Alia uero tum in arborū genere, tum in stirpe humili, peculiaris gignit. Et omnino plaga ad exortū, atq; meridiem spectās, ut animalia, ita etiā plantas præter cætera loca peculiare ferre uidetur, ut Mediā prouincia, & Persis tam alia plura, q̄ mālum, quam medicā & persicam uocāt. Habet hæc arbor foliū simile, & penē æquale, atq; potulaca: aculeos quales pirus, aut spina acuta, sed leues, acutosq; uehemētē & ualidos. Pomum eius non manditur, sed odore præcellit, necnon & foliū arboris odoratissimū est. Et si inter uestes pomū ponatur, inoffensas conseruat. Vtile & cum medicinam mortiferam quis biberit, uel ad oris suauem olētiā: quippe si quis interna pomi in iure, aut aliquo humore cōcocta in os expresserit, digesseritq; suauē halitū reddet. Semen detractū Vere sulcis feritur diligētissime cultis, rigatur deinde quarto, aut quinto die: cum autē maiuscula fuerit, transfertur Vere iterū ad molle, riguumq; solū, nec ualde tenue, tale enim desiderat. Fert poma omnibus horis, alijs decidentibus, alijs subnascētib, alijs maturescētib. Floribus his tantū fructus enascitur, qui (ut diximus) ueluti colū quandam extantem,

extantem, in futo medio gerunt: qui enim ea careant, infœcundi labuntur. Seritur etiam ficilibus in uasis perforatis, quemadmodũ palma. Hæc itaq; (ut dictum est) Perfidi, Mediæq; familiaris habetur.

De ficu Indica, alijsq; multis Indię arboribus, quorũq; hebeni sunt genera. De Terebintho Indica: deq; lanigeris arboribus, necnon seminibus, & herbis Indię. De oriza. De spina cãdida, que herculacea dicta est. Caput V

**I**ndica autẽ regio, arborem ficũ uocatam sortitur, quæ è ramis radices dimittit singulis annis, ut primo uolumine retulimus: dimittit aut non ex nouellis, sed ex anniculis, atq; etiã uetustioribus. Illæ se terræ cõiungentes, ceu sepem circũ arborem faciũt, ita ut ueluti tabernaculũ condatur, quo etiã morari homines solent. Radices autẽ nascẽtes euidentissime à ramis discernũtur: sunt enim albiores, hirtæ, tortuosæq; binaq; fronde foliata. Item arbos comam supernã lasciuã gerit, totaq; fornicato ambitu pulchre orbiculatur, & magnitudine uehemẽter excellit: quippe umbrã bino stadio facere fertur: & crassitudine caudicis, pleraq; ultrã q; sexaginta graduum orbẽ colligere, magna uero ex parte quadraginta. Foliũ pelta nõ minus habet: fructum admodũ paruum, magnitudine ciceris, ficui similẽ: quamobrẽ Græci ficum eam arborẽ appellabant. Parũ mirum in modũ fructificat, nõ tantũ pro magnitudinis desiderio, uerum etiã omnibus rebus. Nascit arbos hæc circa Acesinam amnem. Est & alia arbor & magnitudine insignis, & suauitate fructus, amplitudineq; mirũ in modũ præcellẽs: hoc sapiẽtes Indorum, qui nudi degũt, cibo utũtur. Alia cui foliũ specie prælõgum, simile pẽnis frustiorũ, quæ super galeis imponũtur, lõgitudine duorũ cubitorum: alia cui fructus longus, nec rectus, sed cõtortus, cibo dulcis, sed morsus in aluo, diffi cultatesq; facit intestinorũ: ob id Alexãder ne quis manderet, interdixit: alia cui fructus similis cornis. Sunt & alia plura ijs diuersa, quæ Græcia gignit, sed nomine carent: nec mirum quicq; ex eorũ proprietate putandũ. Nam (ut quidã referũt) nulla omnino arbor, nullus frutex, nulla herba similis ijs cõperitur, quæ in Græcia proueniũt, paucis exceptis. Hebenus quoq; eius regionis uernacula est. Huius duo ge  
nera cõstant, alterum materie laudatũ, pulchrumq; alterũ uile, uitiatumq;. Rarum, quod præstãtius: reliquũ permultũ habetur: colorem commẽdatum, non re cõdita, sed statim sua natura capefcit: fruticosa est cyuili modo. Ferũt & terebinthũ haberi, ut alijs similem terebintho: cui folia, & rami, & reliqua omnia terebintho similia: fructus autẽ diuersus, similis enim amygdalis. Nam & in Bactris terebinthũ hanc esse, ferre q; nuces amygdalarum magnitudine: quoniã non magnas, sed uisu similes, & suauitate amygdalis præstantiores, & ideo loci illius homines his potius uti. Plantæ autẽ ex quibus uestes conficiunt, foliũ moro simile habet, corpore autẽ toto rosli caninis proximæ cernũtur: ferũtur ordinatim, quapropter è longinquo aspiciẽti, uites apparẽt. Palmas quoq; nonnullæ partes pleraq; habet. Hæc in arborũ genere. Fert  
& semina propria, alia leguminibus similia, alia tritico, alia ordeo. Cicer enĩ & lens, & reliqua nostræ regionis ibi haudqua q; habetũr, sed alia quædã nascũtur, quibus eduliã proxima cõficiuntũr: nec discerni queunt, ut ferũt, nisi quis audierit. Est & ordeũ, & triticum, & genus quoddã aliud ordeĩ syluestris, quo & panẽ suauem conficiũt, atq; alicam bonã. Id Græcorũ equi cum principio manderẽt, interibãt: deinde paulatim, cũ paleis assueri, nihil penitus lædebantũr. Serũt potissimò quod orizam uocat, id semini nũcupato simile est, pistumq; tanq; alica, redditur cõcoctu perfacile, aspectu lolijs simile: statq; magna parte tẽporis in aqua: effundit nõ spicam, sed ueluti iubam modo miliĩ, atq; panici. Est enim aliud quod Græci *φάρυγ*, id est lentẽ uocabant, hoc uisũ sceno græco simile est: metiuntũr circa uergiliarum occasum. Interest

etiam terræ ipsius ratione, quod quædā omnia ferat, quædā nō ferat. Quippe mon-  
tuosa & uitē, & oleam, & nucū pomorūq; uniuersum possidet genus: uerū oleam  
sterile, & natura penē inter oleastrū, atq; oleam. Item specie tota distat, & foliū latius  
hoc, angustius illo. Hæc in India. In regione autē Aria dicta, sp̄na est, ex qua lachry-  
ma gignitur, illyriæ similis tam uisu, q̄ olfactu: hæc ubi sol illuxerit, defluit. Quin &  
alia multa præter hæc nostratia tum agris, tum omnibus proueniunt. Alijs locis spi-  
na candida nascitur ramis ternis, ex qua regulas, atq; baculos faciūt: succosa, humo-  
ris lactei, fungosaq; est: herculaceam hanc appellant. Est etiam aliud, stirpis humilis,  
magnitudine quidē raphani, folio uero tam magnitudine, quam forma lauro simili:  
id qui comederit protinus moritur. Quocirca ubi equi adessent, nunq̄ eos à mani-  
bus laxabant. Codrosiæ prouinciæ nasci quiddam folio laurino referūt, cuius quan-  
tulumcunq; iumenta comedisent, mox interibant: similiter affecta distentaq; atq;  
illi, qui morbo comitali uexantur. Aliam autem esse spinam, folio nullo, radice sin-  
gulari: aculeum acutissimū quoq; in nodo gerentem, quo fracto, aut attrito, succū la-  
cteum multum effluere, qui cæteris omnibus animalibus cæcitatem infert. Homi-  
nes autem

Quibusdam item locis herbam quandā exire sub qua serpētes minutos admodum  
connatos manere: quorum ictu, moriendum protinus esset, cum herbā quisquam  
aggressus fuerit. Quin & à palmis incoctis sirangulari, qui comederit, idq; postea  
perspectum. Sed huiusmodi uires, tam animalium, quam plātarum, uel apud alios  
forſitan comperiri possint.

*Arbores odoratæ ubi nascantur, & quæ sint. Quid ferat septentrio. Item quid quoque loco proueniat.  
Quid in Creta, Rhodo, Lycia, Ponto, Propontide. Quid Thmolus, Olympus, Ida, quidq; multi  
alii montes ferant. Quæ in toto orbe loca ad naualem materiam.*

Caput VI



Nter plantas autē omnium maxime superfluit, plurimumq; à reliquis  
distant, quæ in Arabia, Syria, Indiaq; odoratæ nascuntur: ut thus, myr-  
rha, casta, laser, cinnamomū: quotquot alia huiusmodi, de quibus alio  
uolumine plene retulimus. Ergo plagis ad exortum, meridiemq; uer-  
gentibus, & hæc ipsa peculiaria, & alia his plura proueniūt. At uero se-  
ptentrionem uersus nō ita est: nihil enim effatu dignū narratur, præter communes  
has arbores, quæ & loca frigida amant, & apud nos quoq; reperiuntur: ut pinus, ro-  
bur, abies, burxus, castanea, ulia, reliquæ similes. Nihil enim præter hæc aliud habet,  
sed potius ex humilibus quædam, loca argentia quærunt, ut febrisfuga, absinthium.  
Item quæ radice, succo uē medētur, ut ueratrum, agitatorium, scammonia: cuncta  
serē quorū radix expetitur. Quædā enim in Ponto, ac Thracia gignūtur: quædā cir-  
ca Oetam, Parnasum, Pelium, Oſsam, Parthenium. Multa etiā in Arcadia, & agro  
Iaconico exeūt: nam ea quoq; regio medicaminibus scatet. At odoratorum nihil in  
his penitus, cōsecratice excepta, quæ in Illyridæ, & circa Adriā prouenit: & laudata  
quidem, cæterisq; longe præstātor. Verū in feruidis, meridianisq; locis, uelut ex op-  
posito, copia odoratorum habetur. Cupressum quoq; loca feruida magis habet, ut  
Creta, Lycia, Rhodus. At ex ijs quæ mansuescere possunt, laurū, myrtum, quæ mi-  
nime in frigidis durare affirmāt, minusq; myrtum: argumentoq; capiunt, quod in  
Olympo laurus multa, myrtus nulla omnino, in Ponto autē toto neutra est: quanq;  
summo studio, omnīq; solertia ferere conātur ad usus religionis. Fici tamen multæ,  
magnæq; & puniceæ, amplæ opacitatis habentur: quin & piri, & mālī permultæ, ac  
uarij generis, maiorem in modū: bonæq; frugis, & uernæ, præterq; si quæ serotinæ.  
Ex syluestribus uero robur, ulmus, mālus, & similes: sed pinastrū, abies, atq; picea  
defunt, & omnino quæ tedam in se gerunt. Humida hæc autem, & multo deterior  
Sinopenſi: quapropter non multus est eius usus, nisi ad ea, quæ sub diuo. Hæc circa  
Pontum,

Pontum, aut certe locis quidem eius quibusdā haberi nouimus. In Propōtide uero & myrtus & laurus montibus multis in locis prouenit: sed fortasse sunt etiam quæ locorū propria poni debeant, quippe cum singula (uti retulimus) diuersa secundū materiam habeāt: non solum quod eandē meliorem, deteriolem ue possideant, ue rumentā quod ferant, nec ne: ut Thmolus, Olympusq; mysius nucē, & castaneam plurimā ferūt: item uitē, mālum, punicā. At Ida, quibusdā earū caret, quibusdā perraras habet. Et circa Macedoniam, & Olympū piericum, quādā earum comperiuntur, quādā minime: in Euboea uero, & circa Magnesiā euboicā multæ quidē habētur, ē reliquis autē nulla: nec circa Pelium, nec reliquis montibus tractus isti. Quin & ad naualē materiem locus ibidē exiguus est, & omnino in uniuerso terrarum orbe: quippe cum Europe, Macedonia, & Thracia, & Italia tantū habere uideatur. Asia uero, Cilicia, Sinope, Amysus, adhuc Olympus & Ida, uerum non multum. Cedrū enim Syria gignit, eaq; ad triremes utuntur. Et ea uero, quæ aquas adamant, ac secus fluuios degunt, parimodo intelliguntur.

De platano, & Algarum generibus, ac bryo: item de marinis, quercu, & abiete, & uite,  
& ficu, & palma.

Caput VII

**P**latanum enim esse in Adria negant, præterq; circa Diomedis delu-  
brum: inq; uniuersa Italia raram esse affirmāt: quanq; multū, magniq;  
fluuij utrobq; diluant: sed locus planē recusare uidetur. Dionysius ty-  
rannus maior, ambitiosius cōtendens in Rhegio cōseuit in hortis eas,  
quæ nunc in gymnasio stant, nec ullā magnitudinem capere possunt.  
Contrā, alia loca plantanum habēt plurimā, alia ulmo & salice scatent, alia tamarice, ut Hamus. Hæc igitur quemadmodū diximus, locorum propria poni debent pariter in syluestribus atq; urbanis. Cæterum in quibusdā fieri foritan potest, ut ager cultu diligentissimo adhibito ferre queat, quot uel nunc, & animalium, & plantarum quibusdā euenire uidemus. Summam uero differētiā naturæ arborum, & ad summam plantarum existimandum, ut inter prima retulimus, quod alia terrena, alia aquatilia ex plantis quoq; ut ex animalibus constant. Etenim non solum in paludibus, lacubus, fluuijsq; uerumetia in mari materiæ quædam proueniūt huiusmodi, & in extero etiam arbores. Quippe in hoc nostro exigua omnia nascuntur, & nihil ferē super mare emicat: at in illo, & hæc eadē excedunt, & alia de arboribus maiora longe assurgunt. Nostri itaq; tractus euidentissima communissimaq; algarum genera sunt: ignotiora uero, & maxime propria ratione locorum, abies, ficus, quercus, uitis, palma. Hortū alia iuxta terram, alia pelagica, alia ambobus locis communia: & quædam multigena, ut alga, quædam unicum genus sortita. Nam algæ quoddam genus, folio lato, colore herbido est, quod porrum quidam appellant, alij cingulum: radice hirta, extrinsecus squamata, intrinsecus longa admodū, crassaq; plene cepigethys non absimili: aliud folio crinito, terræ ipsi adhærens, sæpeq; a mari tantū alluitur: alterum altius degit, nascitur quidem in mari extero circa Herculis columnas, mira magnitudine, latitudineq; ut ferunt, amplius, quā ut manu apprehendi possit. Fertur hoc ad mare internum fluxu extrinsecus, porrumq; id appellant: annuū esse aiunt, & nasci Vere definēte, uigere æstate, minui autumno, interire atq; decidere hyeme. Quin & reliqua omnia nascētia deteriora, obscurioraq; hyeme fieri. Hæc itaq; ceu terrena circa mare deprehendunt. Alga uero proueniens in alto, quam spōgiarū pelagicam deferūt, in Creta insula iuxta terrā, super saxa, plurima, optimaq; prouenit: qua nō solū uitas, sed etiā lanæ, uestesq; inficiūt, & quandiu recēs in seculo sit, color longe purpurā præstat. Gignit parte aquilonia tum copiosius, tū melius, ut etiā spōgiæ, reliquaq; similia. Sūt alia graminibus proxima,

quippe folio simili, & radice geniculata, longa, oblique adhaerente, modo graminis, & caule calamaceo, ut gramen, magnitudine alga multo minora. Est aliud bryum dictum, folio coloris herbidi, amplo, nec lactucis dissimile, rugosiore tamē, & uelut contracto: caret caule. Sed ab uno initio plura folia huiusmodi exeunt, & rursus ab alio. Nascitur super lapides, siciliaeque iuxta terrā. Et minora quidē hac ferme traduntur. Quercus autē, & abies terrenae quidē ambae spectantur: nascitur uero super lapides atque siciliae: caret radicibus, sed modo patellarū adharēt. Folium ambabus uelut carnosum, oblongius, crassumque: & abietis crassius, frequēs, nec leguminū filiquis absimile: cōcauum intus, nec quicquid intra se cōtinens: quercui tenue, ac potius tamaricis: color ambobus accedēs ad purpurā: forma tota abietis erecta, quercus flexuosior, atque in latitudine magis ampliata: ambae uel multicaules fiūt, sed simplicior abies: ramus abietis, longi, recti, soluti: quercui breuiores, cōtortiores, spissioresque: magnitudo tota ambabus cubitalis, parum uel altior, uerū maior (ut simpliciter dicā) abietis. Quercus uel ad lanas inficiēdas utilis mulieribus: ramis adnexa pendēt pleraque animalium refugiorum, subter alia quaedā cauli ipsi adharēt: ad quaedā tota obesa ingrediuntur milipedae, & aliae quaedam generis eiusdem bestiolae, quodque polypi specimen gerit. Haec itaque terrena, contemplaturque cōstant facilia. Quidam autē uel alterā quercum nascentē in alto referūt, quae etiā fructum fert, & glans eius comoda est. Quin & alias magnitudine insignes quaedā compertas, homines nantes seque summergebant referre, traditur. Vitis utroque nascitur loco: nam & terrae proxima, & pelagica est, & maiora fert folia, sarmēta, fructumque. Ficus folio caret, nec magnitudine praestat, color cortici puniceus. Palma pelagica est, caudice admodū breui, uirgis rectis fere, quae subtus exeunt: nec in ambitu, sicut rami uirgarū, sed uelut in latitudinē sigillatim cōtinuatae, nonnunquam etiā inter sese differētes. Virgarum autē, seu furculorum ipsorum similis natura quodāmodo est, folijs spinarū acanicarum, ut sōncis, atque similibus. Hi tamen erecti, nec quemadmodum illa, circumflexi, & folijs a mari corrosi: nam eo quod medius caulis trāsmear per totū, reliquū quoque aspectus proximū est: color his & caulibus, atque uniuersae plantae ruber intese, atque puniceus. Et ea quidem, quae hoc in mari proueniūt, tot esse uidētur. Spongia namque, quae & plysiae uocantur, & quicquid eiusmodi, naturā alteram planē sortiuntur. In extero autē circa Gaditanum fretum, porrum (ut retulimus) nascitur, & ea quae in lapidem transfiguntur, ut thymum, & quae lauriformia sunt, & reliqua.

*Apud mare rubrum in Arabia nullam arborē prouenire praeter spinam sitientē: idemque mare belluis plenū, plurimasque habere caniculas. De plantis, & arbusculis mirae naturae: deque magnis arboribus in insulis, quas aestus operit. Item circa Persidem magnas esse arbores.* Caput VIII



Ari autē rubro uocato in Arabia paulō a Copto superius, arbor nulla in terra prouenit, praeter spinā, quae diplas uocatur, & haec rara, propter feruores, & aquae penuriā: quippe nō nisi quarto, quintoque anno pluit, & tunc impetuose, & breui tempore. At in mari nimirū exeūt, easque laurum & oleam appellant. Laurus ariae similis ex toto est, olea folio tantū: fructum olea proximum his nostris oliuis parit, & lachrymam emittit, ex qua medici sustendo sanguini medicamentum componunt, quod fieri laudatissimum solet. Cum autem aquae plures inceserint, fungi iuxta mare quodam in loco erumpūt, qui sole tacti in lapidē cōmutantur. Mare hoc belluis refertum, plurimasque caniculas habet, in tantū, ut nare tutū non sit. In sinu autē Heroo cognominato, ad quem descendūt Aegyptij, laurus est, & olea, & thymū: uerum nō uiridia, sed lapidis specie parte a mari eminente, similia tamen uiridibus tam folijs, quam germinibus. Colos quoque floris in thymo, tanquam nondū perfectie floruerit, liquidō deprehēditur.

Longitudo

Longitudo arbuscularum cubitorum ternorū est. Qui uero ex India missi ab Alexandro nauigarūt, plātas marinas, quoad in aqua sint, colorē algæ minutæ habere: cum uero exemptæ ad solem ponuntur, mox sali similes fieri narrauerunt. luncos quoq; lapideos apud mare id prouenire, quos nemo uisu à ueris potuit discernere. Eo mirabilius referūt nasci arbusculas quasdā, colore cornu bubuli, ramis asperas, & cacuminibus rubentes, quas cum cōpressius tractātur, frangi, & igni iniectas, ut ferrum exardescere: restinctas tamen trāquillari, ac eundē colorem seruare. Insulis autem quas operit æstus, arbores nasci ingentes, magnitudine platanorum, populorumq; altissimarū: & contingere, ut cū æstus inuasit, reliquæ omnes totæ integantur, maximarū uero cacumina extent, ad quæ naues religuntur: cumq; æstus recesserit, ad radices æquo modo annecti possunt. Folia arboribus laurea dicunt: florem uiolæ, & colore, & odore: fructū magnitudine oliuæ, & hunc odoris admodū boni: folia nunq; decidere, florem & fructum primo autumno nasci, uere defluere. Alias quoq; uisas in eodem mari semper folia retinētes, & fructū lupino similem ferentes retulerāt. Circa Persidem Carmanix cōterminam, qua maris æstus fieri solet, arbores magnæ similes potulacæ tam forma, q̃p folijs spectātur, fructum plurimū ferentes, amygdalis similem extrinsecus, interna uero singulis quasi connexa inuolutantur. Subroditur istæ arbores omnes à mari parte media, stantq; radicibus polyporum modo: cū enim æstus recesserit, omnia inspicere possunt. A qua uero nulla omnis no eo in loco est. Riui nanq; aliqui relinquuntur, quibus nauigant, qui & ipsi maris particulae sunt. Quamobrem constare quidā existimāt, quod ipso mari alit̃ur, non aqua: præterq; si quid ē terra stirpibus attrahant. Quod tamen & ipsum falsum esse haud dubie intelligi potest, quippe cum ne in profundum quidem radices descendunt. In totum genus idem mari, atq; terra nascentium esse uolunt: & marina quidē pusilla, & ficus specie prouenire: terrena uero magna, atq; uiridia, flore q; odorato, & fructu modo lupini.

De arboribus quæ in Tylo insula, quarum nonnullæ lanigeræ sunt. De plantis, quæ in amnibus, paludibus, stagnisq; proueniūt: atq; Papyro, Savi, Mnasio. Caput IX

**I**N Tylo autem insula, quæ in sinu Arabico est, parte ad oriētē spectante, tantā arborum multitudinē esse affirmant ubi æstus recesserit, ut locus frequentissimo uallo munitus relinquatur: atq; his omnibus magnitudo, quæ fico: flos odore excellēs, fructus inguitabilis, & uisu lupino similis. Lanigeras quoq; arbores multas eandē insulam ferre proditum est: has folia uirigena gerere, uerū minora, fructum nullum. Id in quo lana cōtinetur mālī amplitudine cerni, uerū nascens compressum, cum tempestiua maturitatis sit, aperiri, & lanā excipi, qua telas textūt, alias uiles, alias preciosas. Hoc idem & in India (sicut dictū est) & in Arabia fieri asseuerant. Esse etiā alias arbores flore uiolæ maronalis affirmāt, uerū sine odore, magnitudine uel quadruplo uiolæ maiore. Est & alia quædam arbor foliosa rosæ modo, florisq; rosei: hunc noctu comprimi, solis exortu aperiri, meridie in plenum expādi, uesperiterū colligi paulatim noctuq; concludi: incolæ cum dormire tunc dicere assolent. Quin & palmas & uiares, & genera nucum, pomorumq; & ficos, quibus folia nunquam decidunt, nasci eadem in insula affirmans. Aquam cœlestem fieri quidem, sed non ad fructus usui esse, sed fontes in insula esse permultos, quibus omnia rigentur: & eam aquam frumentis, arboribusq; magis prodesse: qua de causa, post pluuiam protinus hāc perfundunt, quasi illam abluere, atq; abstergere uelint. Et arbores quidē maris exteri, quæ hactenus exploratæ habētur, tot ferē esse constat. De ijs autem, quæ in amnibus, paludibus, stagnisq; proueniūt, deinceps dicendū est. Quæ locis huiuscemodi



degant, tribus generibus consummari omnino uidetur. Sunt enim alia arbores, alia ueluti herbacea, alia fruticosa. Harundinem, gladiolum, fleum, iuncum, butomū, quæ omnibus ferè fluuijs, locisq; eiusmodi communia sunt: nonnulq; & rubi, & paliuri: & arbores, ut salix, populus, platanus: quædā usque adeo, ut aqua occultentur, quædam ut parū excedat: quorūdam radices, & caudicis aliquid tantū in aqua, reliquū totū corpus extrā patescit. Hoc enim salici, alno, platano, uliæ, deniq; omnibus aquarum auidis euenit: quæ & ipsæ omnibus ferè fluuijs cōmunes certò intelliguntur. Nam & in Nilo platanus prouenit, non tamen multa, atq; etiā populus est rarior: at fraxinus, & quæ bubula fraxinus cognominatur, plurima est. Quæ itaq; in Aegypto nascitur, in totum quidem numerosiora utiq; sunt, q̃ ut membratim enumerari queant. Cæterum (ut simplici, ac absoluta ratione agamus) omnia cibo idonea, succosq; dulces habētia percipiuntur: sed præstare dulcedine, copiaq; alimentæ tria illa uidetur, Papyrus, & quod uocatur Sari, & tertium, quod Mnasium appellant. Nascitur papyrus non in altitudine gurgitum, sed propè intra duo cubita, nonnulq; etiam minus: crassitudine radices qua uola uiri robusti, longitudine super dena cubita prouenit: super terrā ipsam radices obliquas, tenues, dēasq; in limum demittens fursū, quos papyros dixere, profert, triquetros, angulatos, magnitudine quaternorū fermè cubitorum, coma inutili, exiliq; fastigiatos: fructus nullius fecundos, hosq; ex multis partibus mittit. Radicibus pro ligno utuntur, non tantū ignis gratia, sed ad uasa quocq; plurifariam faciēda: quippe materiem amplam, probamq; præstat. Papyrus ipse ad plurima utilis, etenim ex eo nauigia faciūt, & e libro uela, tegetesq; texunt, & uestem quandam, atq; stragula, ac funes, aliāq; plura: & quidem externis hominibus chartæ euidentissimæ habentur: sed summam, frequentissimamq; opem, & in re cibaria præstat. Omnes enim incolæ, & crudū, & elixum, & assū manducāt, & succum deuorāt: manducamentum autē expuunt. Talis papyrus est, talesq; usus præbet. Nascitur & in Syria circa lacum, quo & calamus odoratus: unde & Antigonus in re nauali fumes fecisse proditur. Sari in aqua prouenit, circa paludes, plana q; ubi amnis recesserit: habet radicē prædurā, flexuosamq; ex qua, quæ saria uocant, exeunt: his longitudo duū cubitorum, crassitudo pollicaris. Triangulū id quocq; papyri modo, & comam similē gerit: qui manducāt, eius quocq; manducamentū expuunt. Radice fabri ferrarij utūtur: carbonem enim optimum facit, propter ligni duritiā. Mnasium herbaceis annumerandum, itaq; usum nullum exhibet, præterq; in re cibaria. Dulcedine quidē præstare tradita hæc sunt. Nascitur etiam aliud in paludibus, stagnisq;, quod terram minime attingit: natura lilij simile, sed foliosis, & folia inter sese quasi uno condita uersu: color uiridis admodum: usus eius medicis ad mulierum profluvia.

De faba, loto, & corfio loti radice, & malinathalla.

Caput X



Aba in paludibus, stagnisq; exit. Caulis eius, q̃ longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, nō genicu-  
lato, rimas intrinsecus habet tendētes per totū lilij modo: caput super hunc fauo orbiculato uesparum non absimile: in q̃ singulis cellis singulæ fabæ continentur paululo super id eminentes, multitudine plurimū terdenæ: flos duplex, q̃ papaueris: color roseus in plenū caput: super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeūt: fabam quancq; cōterenti amarū illud, ex quo pilula fit, inflexū patescit. Fructus ita se habet. Radix crassissima, harūidine plenior, rimas similiter, atque caulis habens: manditur, & cruda, & elixa, & assa, eoq; cibo qui incolunt paludes, utuntur. Nascitur itaq; sponte uel plurima: cæterum, & feritur in limo, paleis large admistis, ut descendat, incorruptaq; maneat, sicq; fabeta faciunt,

faciunt. Sin autem semel apprehenderit, perpetuò manet: radix enim ualida est, nec procul harundinum stirpibus, uerū spinis subhorrēs: quamobrem crocodilus eam refugit, ne occurrens oculo offendatur, quoniā acute nō uidet. Nascitur hæc etiam in Syria, Ciciaq̃, sed tractus ipsi nō plene cōficiunt. Et circa Toranam agri calcidici quodam in lacu exit, magnitudine mediocri, ubi & percoquitur, & perficitur, & in plenū fructificat. Qui lotus uocatur, planis parte maxima prouenit, cū rura inundantur: huic natura caulis similis fabæ, & fructus eodē modo, uerum minores, gracilioresq̃. Nascitur fructus in capite, modo quo in faba: flos cādidus, lilijs foliorum angustia proximus: multi, ac densi promiscui exeunt: sole occidēte se comprimunt, caputq̃ integunt: ad ortum aperiuntur, & super aquam assurgūt: idq̃ facit dum caput perficiatur, floresq̃ defluant: capitis magnitudo quanta papaueris maximi, & percingitur incisuris nō alio modo, quā papauer: nisi quod in his fructus frequentior habetur, qui milio nō absimilis est. In Euphrate caput, floresq̃ mergi referunt, atq̃ descendere usq̃ in medias noctes: tantumq̃ abire in altum, ut ne demissa quidam manu capere sit: diluculo deinde redire, & ad diē magis: sole oriente iam extrundas emergere, floremq̃ patefacere: quo patefacto amplius insurgere, ut planē ab aqua ablit alte. Aegyptij capita ipsa aceruis putrefaciunt, cumq̃ tegumenta putruerint, in flumine lauando separant fructum, & siccantes, pincentesq̃ panem faciunt, eoq̃ cibo utuntur. Radix loti corium appellata, rotūda est, cotonei māli amplitudine, cortice nigro, quali nux castanea tegitur: corpus internum: candidum, elixum, assumq̃ in specimen albuminis uertitur, gratū cibus: māditur etiam crudum, sed gratius decoctum, seu aqua, seu pruna. Quæ non nisi in aquis cōperiri queant, tot ferē explorata habentur. Locis autē arenosis, haud procul à fluuio nascitur terrenum, quod malinathallam appellant, figura rotūdum, magnitudine mespiti, sine nucleo, sine cortice, folia ut gladiolus mittit. Hæc incolæ legentes in brito ordeaceo decoquunt, dulcia admodum efficiūt, hisq̃ pro bellarijs utuntur. Omnia nascētia inibi bobus, pecoribq̃ cibo idonea sunt. Sed inter omnia genus quoddā præstantius stagnis, paludibusq̃ exoritur, quod & uiride pascit, & siccatum bobus hyeme præbetur. Est etiam aliud frumētis sponte internascens, quod cum syncerum à frumento secreuerint, leuiter pincentes, hyeme, solo humefcente serunt: æditum merunt, & siccant, atq̃ ita bobus, equis, iumentisq̃, id quoq̃ cum fructu subnascēte, pabulo præbent: fructus magnitudine sesamæ, rotundus, colore uiridis, bonæ frugis maiorem in modum. Hæc ferē superuacua in Aegypto notari possunt.

Fluuiorum singuli quid priuatim ferant. De tribulo, ac plantis lacus Orchomenij, quæ sunt salix, oleagnus, sida, harundo tibialis, gladiolus, phleum, tipha, mentiflora, icma, ipnum.

## Caput XI



Luuiorum singuli priuatim aliquid ferre uidentur, ut & loca terrenat. Nec enim tribulus in omnibus, nec ubiq̃ erumpit, sed palustribus fluuium tantū: altitudine cum profundissima quinquorū cubitorum, aut paulō profundiore, ut in Strymone fluuio. Tanta penē & harundo, & reliqua prodeunt: nihil autē eius excedit, præterquam ipsa folia inflexa quodāmodo, & occultātia tribulum. Tribulus ipsemersus in aquā, pronus ad inum uergit: folio amplo ad effigē ulmei, pediculo admodū longo, caule parte summa quidē crassiori, unde folia, fructusq̃ dependēt: inferna autē graciliori, continue usq̃ ad radicē capillamenta quædā indidem exorta gerente, quæ maxima ex parte aduersa inter se congruunt: nonnulla etiā discrepant, subtus ab radice ampla exeunt, superiora assidue ad minus, minusq̃ procedunt, ut postrema omnino exigua sint, & differentia magna ab radice ad caulem exulter: pleraque lateraliter gers-

mina infurgant, quippe terna, quaternaq; quorum maximum assidue, quod ab radice propius absit, tum quod post id sequitur, & reliqua deinceps pro ratione. Germen ipsum, quod latere promitur, uelut caulis alter est: primo quidē gracilior, sed folio, fructuq; similis: fructus niger, durusq; uehementer: radicem quantam, qualemq; habeat, quærendum. Talis natura tribuli est: nascitur semine decedente, germenq; in Vere suum emittit. Radicem alij annuam, alij diuturniorem affirmat, & caulem ex ea oriri. Hoc igitur quærendū proprium, præter ea, quæ reliquis insunt. Capillamenta illa cauli adnascencia intelliguntur: hæc enim nec folia, nec caules esse uidentur; nam lateralis quidem ipsa germinatio communis harundine, alijsq; habetur. Propria itaq; priuata, communia publice contemplari congruum est. Quin & secundum loca diuidendum, ut si alia palustria, alia lacustria, alia fluuialia potius sint, aut etiam omnium locorum cōmunia: & quænam in humido, ac sicco eadem nascantur, & quæ in humido tantū: utq; simpliciter agam, ad ea quæ uolumine primo exposuimus communissime digerendum est. Lacu itaq; Orchomenio arbores, materiaq; humiles illæ proueniunt, salix, oleagnusq;. Oleæ, amerinaq; specie præfert, sida, harundo tibialis, & reliqua, gladiolus, phleum, tipha: ad hæc mensiflora, icma, & quod ipsum appellant. Quod enim lemna uocat, altius mergitur in aqua. Horum reliqua quidem explorata habentur. De oleagno, sida, mensiflora, icma, ipnoq; quæ alijs quoq; locis forsitan proueniūt, alijs appellata nominibus, referre debemus. Est oleagnus natura fruticosa, nec cæteris amerinis absimilis folio: figura quidē proximo cæteris, sed molli, ut mālus, lanuginosq; flore populi albæ, uerum minori, fructu nullo. Nascitur plurima super intulas fluitantes. Sunt enim & in eo quædam fluitantes, ut in Aegypto circa paludes, & in Thesprotide, alijsq; stagnis: sed illæ minus aqua implentur. Talis est oleagnus. Sida specie papaueri similis est: tale etenim caput gerit, nisi quod amplius: ad portionem magnitudine mālī tota amplitudo: nec nudum, sed cādidis membranis intectum: hisq; forinfecus folia herbescentia proxima rosis adhuc in calice contentis, quaterna se applicant: apertum grana rubra ostendit, figura non modo papaueris, sed orbiculata, exigua, nec multo milio maiora. Saporem dilutum quendā ut triticū, reddit: crassatur æstate, pediculo paruo annectitur: flos calici rosæ similis, sed maior, & ferē duplex magnitudine. Hunc itaq; & foliū super undas emicare affirmat: mox cum desloruerit, fructusq; compilatus sit, magis in aquam declinari, demum terram attingere, fructumq; fundere. Fructificare autē in lacu tria: hoc, & butomum, & phleum, proditum est. Fructum butomi nigrum dicunt, magnitudine sida proximum. Phlei antheallam uocant, quo ad lixiuū utuntur, id placentaceum quoddam est, molle, rubidum. Et phlei uero, & butomi femina sterilis est, ad nexus utilis, mas inutilis. De icma & mensiflora, & ipno quærendum. Peculiare inter hæc maxime tipha est, partim quia folio caret, partim quia non ut reliqua radice numerosa adharet: nam illa deorsum uersus non minus turgent, uiresq; intendunt: potissimo gladiolus, sicut etiam gramen: qua de causa difficile hæc intereunt, & omnino genus eiusmodi uniuersum diuturnius est. Radix gladioli plurimum inæqualitate à cæteris distat, quod pars quædam crassa carnosaq; sit, quædam gracilis, & lignosa. Quin & germinatione, generationeq; refert: nascitur enim de ramaceo illo radix altera tenuis, iuxta latius: deinde caro rursus in eo cōglobatur, ex qua sese caulis promit, in quo positum germen est. In profundum quoq; radices eodē modo demittit: quamobrem omnium maxime mori cōtumax, euelliq; difficilis est. Proxime ferē gramen ē geniculis ortur: radices enim geniculatæ, atq; ē singulis germen sursum, radix subtus erumpit. Pari modo & spina quæ ceanothos appellatur germinat: uerum huius radix non harundinosa, neq; geniculata est. Hæc prolixius propter suam affinitatem placuit explicari.

explicari. Vtroq; autem loco, id est, & terra, & aqua, salix, harundo (excepta tibiali) gladiolus, tipha, phleum, butomū exeunt: sida in aqua tantū: de tipha ambigitur. Maiora autem melioraq; semper inter utroq; loco nascētia, quæ in aqua exeunt esse affirmant. Insulis quoq; fluitantibus nonnulla eorum provenire, ut gladiolum, butomū, phleum, ita ut partes easdem omnino seruent. Cibo idonea ex nascētib; lacu, sida, & ipsa & folia ouibus, germen suisibus, fructus hominibus: phlei, tiphæ, butomīq; pars tenera ab radicibus proxima est, ut quā pueri paruuli potissimo mandunt. Radix sola phlei pecudibus pabulo est: cum autē squalor uiget, nec humor, qui perlueret cacumina, incessit, omnia squalent, quæ stagnis degunt: sed præcipue  
 10 harundo, de qua utiq; indicandū restat, nam de cæteris ferē oibus satis iam dictū est.

De harundinibus, quarum genera duo, dēq; sagittaria, quæ appellatur à quibusdā cretica. Cap. XII



Arundinis duo genera tradunt, tibialē, & reliquā: quippe unum genus reliquæ deprehendi, sed inter se inuicē firmitate, crassitate, tenuitate, exilitateq;. Crassā & ualidā, uallatoriā uocant: alteram autē textilem. Nasci textilem super insulas fluitantes, uallatoriā in comythibus. Comythes uocant ubi acruata harundo, implexaq; murō radicum raptu sit: quod fit locis stagnorū, ubi tellus pinguis, lætaq; est. Nonnunq; etiam ubi tibialis, uallatoriā gignit: longiorē quidē, quā reliqua uallatoria, sed uermibus erodendam. Huius differentias eis tradunt. Tibialium quandā nonno anno provenire nonnulli uolunt. Hunc quoq; ordinē generandi statuunt: quod error est. In torum enim aucto lacu nascitur. Sed quoniā id superiori tempore nonno anno potissimū euenire uideretur, ortum quoq; harundinis talem esse credidēre, euentū fortuitum pro ordine certo capientes. Gignitur uero copiosior, meliorq;, cum post imbres frequentes biennio, cum minimū aqua permanlit: quod maxime posteriori tempore factū meminēre, cum infaustū illud Cherontæ accidit: quippe ante hoc annis pluribus lacum altitudinē extendisse, post, ubi uehemens pestis inuasit, impletum quidē affirmant: sed cum inundatio nō permansisset, sed hyeme decreuisset, sic & harundinem provenisse. Fertur enim, uideturq; aucta altitudine lacus, duranteq; inundatione crassari harundinē, & fieri crassatam quidē armamentariā: bombyciā uero, cum nō aqua permanferit. Generationē itaq; talem tradidēre. Distare autem à reliquis harundinibus armamentariā (ut in uniuersum capiamus) præstantia quadam nutritionis naturalis confirmant: quippe pleniorē, carnosiorē, in torumq; facie semine læsciuorē spectari: etenim folium amplius, candidiusq; habere, & minus lauginis quā ceteræ: quasdā etiam omnino nihil habere, quas & noie spadonū appellant. Hinc paria optima fieri quidā affirmant, sed pauca ramen in opere bene succedere: cædi tempestiue solitas, usq; ad Antigenidē, cū adhuc simplicius tibia uterentur sub Arciuro, mense septembri: quippe sic cætas plerisq; quidem post annis  
 40 utiles esse incipere, multaq; interim exercitatione sonandi indigere, sed ora linguarum comprimi, quod erat illis theatrorū moribus utilius: sed postq; uarietas, fictioq; accessit, cæsurā mutata est. Cædunt enim nostra ætate, mense Maio, & Iunio, quasi paulo ante solstitiū, uel sub ipso solstitio: & fieri utiles in trimatu referunt, & breui exercitatione egere, linguasq; disiectū defleat: quod his necessariū est, qui sonos fingant, & multifariā flectant. Hæc armamentariæ cadendæ tempora tradūt. Preparatio uero, & confectio hunc in modū fieri solet: Cum collegerint, hyeme sub diuo exponūt suis uestitum tunicis: Vere autē disfoliatam, attrituq; expurgatā, Soli exponunt, æstate posthac concisam in internodia, rursum sub diuo, ad tempus quoddā exponunt, relicto internodijs superiori geniculo. His longitudo palmo nunq; mi-

nor: optima ex internodijs ad parium constructum, media totius harundinis mol-  
 lissima paria gerunt, quæ aduersum germina exeunt: durissima, quæ proxima radi-  
 ci habentur. Linguas eodem internodio exemptas congruere, cæteras esse discor-  
 des: proximā ab radice læuam poni, dextramq; germina uersus pateat, incitio duas  
 in partes internodio. Os linguæ utriusq; secundum calami inciluram faciunt: & si  
 quo alio modo linguæ conficiantur, non satis eas congruere. Talis præparatio, atq;  
 confectio est. Nascitur plurima inter Cephisum, & Melanam. Pelecania locus hic  
 nominat. Huius quædā partes Chytri uocati, lacus altitudines sunt, quibus harun-  
 dinem laudatissimam prouenire affirmant. Quin & quo Probauia dicta deferunt. Is  
 autē amnis est ex Lebadea perfluens. Sed omnium optima nasci creditur circa Oxæā,  
 Campen uocitatem. Locus hic Cephisi ostium est: uicinus ei campus pinguis, & hi-  
 laris, quem Hippiam uocant. Est etiam alius locus aquilonius Oxææ Campæ Boë-  
 drias noie, quo etiam ipso nobilem harundinē nasci asseuerant. In totumq; ubi cras-  
 sum, lætum, sæcosumq; solum sit, Cephisusq; se permisceat, atq; etiam altitudo la-  
 cus ampliatur, harundinē optimā oriri. Nam circa Oxeam Campen, & Boëdriam,  
 hæc omnia comperiuntur. Quod autē Cephisus uim magnā ad faciendā harundi-  
 nem laudabilem fortiat, argumento capiunt, quod eo loco, ad quē Melas, qui uo-  
 catur, influit: quanq; locus profundus, solumq; crassum, atq; sæcosum est, tamen  
 aut omnino nulla, aut uitiosa exurgit. Generationē harundinis tibialis, naturā, con-  
 fectionē, quibusq; differentijs à reliquis distet, satis dixisse arbitramur. Genera non  
 hæc solum, sed plura harundinis etiam intelliguntur, quæ differentijs uel sensui ma-  
 nifestis discernuntur: quædā enim densa, tam carne, quā geniculis: quædā rara,  
 paucisq; geniculis: & alia caua tota, quam fistulariā quidā appellant (nihil enim ferē  
 ligni, carnis ue habet) alia solida, & tota penē intus repleta. Item alia breuis, alia pro-  
 cera, excelsa, crassaq;: & alia gracilis foliosaq;, alia paucis folijs omnino: multæ quæ-  
 dam differentiæ pro natura, usuq; intelligunt, singulæ nanq; ad singula utiles. No-  
 minibus alij alijs appellant, sed canna cōmunissima quodāmodo est, quā & fruteti-  
 tiam maxime omnium referunt, & apud flumina, lacusq; potissimo nasci: plurimum  
 tamen in quoq; genere distare inter sese aquaticas, & sicco nascentes perhibet. Sa-  
 gittaria quoq;, quā ceticam quidā appellant, sui generis est, nodis paucis, genicula-  
 ta, carnosior omnibus, maximeq; flexū recipiens, atq; omnino obsequēs, quo libe-  
 at flecti calefacta. Magnas & folia differentiās reddunt, quemadmodū diximus, non  
 multitudine, magnitudineq; tantū, sed etiam colore: quippe quæ laconica cognomi-  
 natur, uersicolor est. Item positu ipso, atq; annexu: quædā enim ab ima parte folio-  
 rum plurima ferunt, ipsaq; perinde atq; ē frutice se attollunt. Quidā uel discernen-  
 dum penē lacustris esse uolunt, scilicet multa habere folia, & gladioli, phlei, algæ,  
 butomiq; folijs similia: uerum hoc amplius scrutari oportet. Genus autē quoddā ha-  
 rundinis uel terrenū emigrat, quod nō erigit caulem, sed super terrā spargitur gra-  
 minis modo, atq; ita se ampliat: mascula solida est, femina inanis: quippe ad hanc  
 tant: folio nō longo, sed salici simile: magnitudine præstantes, atq; robustæ, ut uicem  
 bastarum præbeant. Hæ circa Acesinam amnem oriunt. Omnis autem harundo  
 uiuax est, atq; adusta melius resurgit: itemq; stirpe crassa, numerosaq;  
 est, ob id mori pericax. Radix ipsa geniculata, quæadmo-  
 dum graminis: uerū non omēs simili modo infor-  
 mantur. Sed de harundinibus hæcenus.

De iunco & insulis fluitantibus in lacu Orchomenio.

Cap. XIII



Est ut de iunco dicamus, utpote generi eidem annumerando: nam hic etiam inter aquatica poni debet. Tria huius genera sunt, ut nonnulli distinguunt: acutus, & sterilis, quæ marem appellant: frugifer, quæ atriferum uocamus, quoniam semen nigrum ferat: crassior hic, atque carnosior: tertius, magnitudine, crassitate, carnositateque insignis, qui mariscus uocatus est. Ex his atrifer per se suo genere provenit: acutus, atque mariscus eodem cespite exeunt, quod absurdum apparet, uisumque mirabile fuit, toto cespite iunci deportato: quippe pars maior steriles erant eodem exorti, frugiferi autem pauci. Igitur de hoc cogitandum. Fructus omnino minor habetur: commodior autem ad texendum mariscus, quia mollis, carnosusque est. Omnino frugifer in callum de regulari furculo ipso tumescens, mox ueluti oua parit, circumdantes enim spicatum pediculos iunco lineari affixos initio gerit, quorum summitatibus paululo laterales orbes uasculorum leuiter hiscentes inducit. His semen exiguum effigie cuspidis sagittarum ingerit, nigrum, non ab simile semini herbarum inguinalis, uerum exilius, radice longa adhaeret, multoque crassiore, quam acutus. Hæc omnibus annis moritur, dein altera rursus à iunci cacumine defigitur: quod uel usu percipi facile potest: quippe alia sicca, alia uirides demissa cernuntur. Caput cepis, & gethyis simile, utpote quod in unum ex pluribus conglobatum prælatumque inferius, tegumentisque subrubris interiectum confert. Ergo propriis his radicibus eueniat, si quidem per annos exarescant, ac desuper denuo generentur. Talis iuncorum natura intelligitur. Sin autem, & rubus, & paliurus in aquis uiuere possint, aut propè, ut quibusdam in locis percipitur, eorum quoque differentia iam explorata habentur: quippe cum de ambobus uolumine superiori dixerimus. Insulis autem fluitantibus, quæ in Orchomeno sunt, magnitudo utique multifaria, sed quæ amplissima ad ternorum ambitum stadiorum spectatur: at in Aegypto magnæ admodum coagmentantur, ut & fues permulti in eis nascantur, quos incolæ transeuntes uenari consueuerunt. Atque de aquaticis hæc tenus.

Vitam plantarum aquaticarum, quam terrestrium breuiorem, sicut & in animalium genere. In quibusdam tum urbanis, tum syluestribus uitæ longitudinem uel famæ à fabularum autoribus traditæ testimonio patere, ut oleæ Athenis, in Delo palmæ, oleastri in Olympia, phagorum in Troia super tumulum Ili, platani in Delphis, atque alterius in Caphyis Arcadiæ, quas fuisse dicunt Agamemnonem. Quæstio pulcherrima, an arbor eadem maneat cum caudex paulatim præciditur, mutaturque uniuersus.

Cap. XIII



E breuitate uitæ plantarum aquaticarum in tantum usque sanctum habemus, uidelicet, quoad aliquatenus in uniuersum possumus exprimere. Vita aquaticis breuior, quam terrestribus est: sicut etiam in animalium genere manifestum sentimus: sed singulatim terrestrium enarrare uitas nimis durum decet. Ergo syluestres nullam habere differentiam rustici putant, sed omnes longæuas, nullamque esse breuem uolunt. Sed hoc quidem ipsum uere forsitan putent (omnes enim uitam reliquarum longe superant) ueruntamen inter se distant: quædam enim magis, quædam minus longæuæ, ut in genere urbanarum etiam deprehenditur: sed quænam sint istæ, querendum. Urbanæ aperte differunt, eo quod alia longæ uitæ, alia breuis sunt. Sed quoad simpliciter dici potest, uita syluestribus longior, quam urbanis: atque omnino ijs, quæ in oppositum generatim distinguui possunt, ut oleastro, quam oleæ: & pirastro, quam piro: & caprifico, quam fico: quippe robustiores, spissiores, fructuque infecundiores existunt. Vitæ autem longitudo in quibusdam tum urbanis, tum syluestribus, uel famæ à fabularum autoribus tradita testimonio patet.

ter. Nam oleam Athenis referunt, palmam Deli, oleastrum Olympiæ, fagos Troiæ super tumulum Ili. Sunt qui & Delphicam platanum, & alteram in Caphyis Arce diæ stantem, fatas Agamemnonis manu dicant. Sed hæc quo pacto se habeant, indagatōis alterius forsitan interest explorare. Quod autem summa arborum differētia sit, plene intelligi potest: uiuunt enim prædictæ, aliæq; complures longo tempore. Breui profectō punica, ficus, mālus, præcipue uerna: & dulcis minus, quā acida, ut inter punicas, quæ nucleo caret interiori. Genera quoq; uitium nonnulla uitæ breuis habentur: potissimò, quæ fecundissima sunt. Videntur & quæ aquis propinquæ proueniunt, minus durare, quā quæ in siccis, ut salix, populus, sambucus. Quædam senescunt quidem, putrescuntq; uelocius, sed ex eisdem rursus latere suo germinant, ut lauri, māli, punicæ, & auidarum aquæ pars maior. De quibus etiam rationē quispiam quærat, eadē ne dici debeant, an diuersæ: & quemadmodum si præcisō caudice, ut agricolæ faciunt, rursus germina assidue, recteq; colendo inuies, aut si in radicem usq; decideris, uel deusseris (Nam hoc etiam facere solent, nonnunquam & sponte accidunt) utrum inquam ita arborem eandem dici oporteat, an alteram. Etenim si partes incrementis, & minutionibus, atq; etiam purgamentis naturalibus distare assidue uideantur, sic arborem eandem esse appareat: cur enim in his potius, quā in illis referat? Sin autem caudex potissimo ueluti essentia, naturaq; arboris esse credatur, cum hic permutatur, totam quoq; arborem alteram esse ratione putaueris. Nisi fortē quia eadem utriq; initia sunt, idem esse posueris. Atqui sæpenumero euenit, ut & radices alteræ sint, permutanturq; primis putrefactis, alijs denuo enascentibus. Nam eo modo quo uites omnium maxime longæuas putant, quoniam non alias creent, sed ex se repleantur, irridenda comparatio fortassis appareat: modo caudex non perduret. Hic enim sicut fundamentum, naturaq; arborum constat. Sed hæc utro tandem modo dici debeat, nihil ad præsens referat opus.

*De uita oleæ, ac uitium, quoq; modo colendæ uites.*

Cap. XV



Llud autem diuturnissimum forsitan sit, quod omnibus rebus durare queat, ut olea, & caudice, & germine laterali, nepotumq; procreatione, atq; etiam stirpe incorrupta: uitam uero unius in qua posito caudice, pro principio temporis agi mensura debeat, annis maxime ducentis consummari uidemus: sin autem credimus (quod quidā de uitibus referunt) quod radicibus particularim detractis caudex, naturaq; tota similis, ac similifera quantum uis temporis permanere queat, hæc prorsus longæua omnium præcipue constat. Colendum autem hunc in modum censent: Cum uitis iam delabi uideatur, palmites admittendum, fructumq; anno capiendum: deinde altera ex parte uitis suffodiendū radices omnes purgandum, post festucis implendum, terramq; accumulandum. Isto itaq; anno male admodum ferre aiunt, postero melius, tertio & quarto stabili: ferreq; multas bonasq; uuas, ut non alio modo se habeat, quā cum uigebat. Cum iterum languescere incipit, partem alteram suffodiendum, colendumq; simili ablaqueationis ratione, atq; ita semper durare posse affirmant. Id autem anno maxime decimo fieri. Qua de causa, nec præcidere unquam eos debere, qui ita faciunt, sed per multas grates caudices eosdem durare, ut ne minime quidem sit, qui seuerint. Hoc igitur expertis accipientes credere fortasse debemus. Quæ autem uitæ longæ, breuis ue sint, ijs quæ retulimus contemplari oportet.

Demore

De morbis arborum: quique communes, & qui priuati sint. Quid syderatio, uermis, radicatione, clauus, fungus, olla, scabies, cochleæ, cradatio, ceraſta: quid in uite hirculatio, quid roratio.

## Cap. XVI



Orbos syluestribus accidere negant, quibus intereant: tamē eas quæque male affici dicunt: perſpicuoq; præcipue, cum uel paulò post germinaturæ, uel germinare incipientes, uel florentes, grandine uexantur: cumq; flatus frigidus, feruidus ue, his eiſdem temporibus ſuccesſerit: tempeſtiuis autem hyemibus, nec ſi excedant, quicquam offendi. Quinimmo omnibus algorem prodeſſe uolunt: quippe niſi alſerint, deterius germinare. Urbanis morbi plures eueniunt: alij omnibus quaſi communes, aut pluribus: alij priuati per genera. Communes, uermiculatio, ſyderatio, radicatione: omnes enim ſerē uermes etiam gignunt, ſed quædam pauciores, quædam plures, ut ficus, mālus, pirus. Minime autem (ut ſimplici ratione dicam) acres, & ſucco humentes lacteo uermiculantur, eodemq; modo ſyderantur. Magis autem nouellis, quàm uigentibus id accidere ſolet: & omnium maxime fico, & uiti. Olea præter uermes, qui & ficum interimunt foetificantes in ea, clauum patitur: quidā fungum appellant, alij ollam, hoc eſt ueluti ſolis exuſtio: nonnunquam etiam nouellæ, propter nimiam fertilitatem intereunt. Scabies, & cochleæ adnaſci ſoliti, ficorum pecuniaria ſunt. Non tamen id accidit eis ubiq; ſed morbi his quoq; ratione locorum euenire uidetur, quemadmodum animalibus. Nam apud aliquos ſcabies nullo modo infeſtat, ut nec circa Aeneam. Ficus maxime radicationem, cradationemq; ſentit. Vocant radicationem, cum radices inareſcunt, marceſcuntq;: Cradationem, cum rami: crados enim ramos ficulnos quidam appellant, unde & morbo nomen. Caprificus neq; radicatione, neq; cradatione, uel ſcabe infeſtatur, neq; radicibus uermiculatur. Quædam nec ſuos groſſos amittunt, etiam ſi fico inferantur. Scabies poſtiſſimo gignitur, cum aquæ parum poſt uergilias inceſſerit. Nam ſi multum fuerit, cauſa contrahendæ ſcabeiei omnis abluitur: & accidit tunc, ut & caprificus, & groſſi decidant. Vermium autem qui ficorum proprij ſunt, alij ex ipſis naſcuntur arboribus: alios parit, qui ceraſta uocatur: omnes tamen in ceraſtam figurantur. Sonum ædunt ceu paruuli ſtridoris. Ficus laborat, & ſi ſimbres nimij fueſſent, ſic enim ad radiceſ ſonum quaſi glabratur: quod quidem uitium aulam appellant. Vitis hirculatur, quod eius præter ſyderationem poſtiſſimum eſt, aut cum germina à ſtatibus fueſſent abſciſa, aut cum imperitia culturæ fueſſent læſa, aut tertio cum in ſupinum fueſſent exciſa. Roratio, quod quidam *ſiue dicitur* dicunt, cum uitis defloſcens irrorat, aut cum fieri ſolet genus affectionis, hoc eſt, ut acini defluant, & remanentes paruuli conſent. Quædam & cum alſere ægrotant, ut uitis: oculi nanq; primo putatæ hebetantur: ruruſq; ex calore nimio idem euenit: etenim eorum quoq; temperamentum poſcunt, ſicut etiam alimentum omnino. Omne quod præter naturam fit, periculolum occurrit: uulnera quoq; icuſq; circumſodientium magnopere faciunt, ut mutatio nes æſtuum, aut frigorum non tolerentur. Cum enim per luxationem laboremq; debile fit, faciliſſime à teporis exceſſu deuincitur. Porro, ut quidam exiſtimant, maxima ſerē pars morborum icu inuſorio contrahitur. Quippe, quæ ſyderata appellant, quæq; radice inareſcant, hac eadem de cauſa laborant. Credunt & hos duos eſſe morbos duntaxat, ſed id quidē haud conſeſſum ſatis habetur. Ex omnibus uero inſirmiſſima eſt uerna mālus, & earum poſtiſſimo dulcis. Quibuſdam læſiones, nonnullæ ſterilitatem, non necem inferunt: ut ſi quis larici cacumen auſerat, uel palmæ, ſterileſcere ambæ uidentur, nec penitus interire. Ægrotant aliquando & fructus ipſi, cum aſſatus, imbreſq; tempeſtiue nō fueſſent. Accidit enim arboribus, ut aliâs fructus amittant, factis, aut non factis pluuijs, ut ficis: aliâs deteriores reddant



tur, putrefactæ, strangulatæq; humoris nimietate, aut contrâ exiccatae penuria ultra modum. Pessimum cum deflorescentibus quibusdâ, imber incessit, ut oleæ, uiticq; : simul enim defluit fructus propter exilitatē. In Miletō oleas cum florent, erucæ erodunt, aliæ frondem, aliæ florem: genere diuersæ: itaq; arbores dispoliant. Nascentur tempore austrino: & uento, si sol acrior insecutus fuerit, rumpuntur. Circa Tarentum fructum uberem oleæ semper præmonstrant, sed sub flore pars magna perditur. Hæc ergo propria locorum.

De Arachinio morbo oleæ, deq; tabe, uredine: quæq; morbis præcipue infestentur.

Cap. XVII



Ritur & alius morbus oleis, qui Arachiniū appellatur. Nascitur enim hoc, & fructum absūmit. Adurunt & æstus quidā & oliuas, & uuas, & alios fructus. Sentiūt & uermiculationē fructus quorundā, ut oleæ, piri, māli, mēspili, punicæ. Vermis oleæ natus sub cute fructū adimit: at si in ipso nucleo erodens, prodest: sub cute gigni prohibent pluuijs, quæ post Arcturū sequant. Et in drupis quoq; oleis uermes nascuntur, qui ad lacturam peiores certe deprehendunt, & maridi, putresq; omnino uident. Hinc & austrinis nascunt, & riguis magis. Gignuntur & culices in aliquibus arborum, ut in robore, & fico, & consistere ex humore uidentur, corticibus subdito gustu dulci. Gignunt ijdem & in quibusdam oleribus: alibi uero erucæ, diuerso scilicet ortus principio. Et morbi quidem hi ferē, atq; in his sunt. Affectiones autem quædam temporariæ, aut aliās per se euenientes, necare assolent, quas nullus dixerit morbos, ut tabes, & quod uredinem quidam appellāt. Alij uero apud alios flatus interimere, ac exure re noti sunt: ut in Calcide Eubœæ olympias cum flauerit frigidus ante solstitia, aut post solstitia hyberna: arbores enim exurit, atq; adeo aridas, siccascq; facit, ut ne sol quidem tempusq; longum reddere ita possint: quocirca uredinem uocant. Hæc sæpe aliās, & Archippo Athenis magistratu anno quadragesimo facta uehementissima proditur. Laborant maxime loca concaua, & inter ualles, & uicina fluminibus, atq; in summam, quæ ab omni afflatu penitus silent. Ex arboribus uero ficus præcipue infestatur, secundo loco olea: oleaster magis laborauit, quantq; robustior, quod mirum fuit. Amygdalæ penitus, māli, piri, punicæ sine noxa extiterunt: quamobrem id quoq; mirum: exuruntur statim à caudice, atq; in totum magis, priusq; (ut ita dixerim) sentiunt partes inferiores. Deprehenduntur quædam statim in germinatione. Olea uero quoniam semper uireat, tardius. Quæ itaq; frondes amiserint, reuiuiscunt: quæ minus, penitus pereunt. Nonnunq; quædam exustæ, folijsq; arefactis regerminarunt sine ulla iactura, foliaq; reuixere. Id quibusdam in locis uel sæpenumero euenit, ut in Philippis. Quæ autem tabuere, modò non penitus perierint, citissime possunt regerminare, ita ut uitis statim fructificet, sicut in Thessalia fit. Ponto autem circa Pantocapæum tabes bifariam inuadit: aliquando frigore, cum annus frigidus est: aliquando gelu, si diu durauit: ambo post brumam, diebus maxime quadraginta peractis, fieri solent. Fit gelu sereno tempore: frigus, quo tabes, præcipue cum in sereno squamulæ quædam deferuntur, patent: cassæ uero non durāt, quantq; circa Thraciam concreuant. Sedenim morbi, quot, qualesq; sint, ac rursum interitus, qui excessu hyemis, aut æstus eueniant, quicq; ab afflatuum frigore, calore ue proficiantur, hisce contemplandi: quando nil prohibet nonnullos etiam cum syluestribus communes haberi, tum uniuersa arborum nece, tum etiam magis fructuum lue: quod aperte euenire uidemus, quippe cum sæpe nec illæ probe fructificent: sed credo æque id obseruatum habetur.

*Quæ arbores, quibus detractis partibus aut ægrefcant, aut interimantur. Cap. XVIII*

**R**estat, ut exponamus, quæ partibus quibusdam ablatiis, enecentur. Communis itaque omnibus mors cortice in orbem detracto. Omnes enim ferè hoc modo necari uidentur, excepta potulaca, quæ tamen & ipsa si quis carnem uehementer prefferit, germenq; futurum luxauerit, morietur. Itaq; uerius fortè, excepta subere, dixerim: hanc enim & iuuari potius cortice detracto, affirmât, scilicet tam extero, quàm interno carni propinquo, sicut etiam potulacam. Nam & ceraso detrahitur, & uiti, & tilia, ex quo fuit: & ex minoribus malua, sed non uitalis, neq; princeps, sed summus, quiplerunq; subnascente alio decidit: corticis enim disrumpcio communis arborum est, ut potulacæ, ut platani. Cum uero nonnulli arbitrantur, nouo iterum subnascente, exterum inarescere, disrumpiq; multisq; decidere sponte, sed non æque in omnibus rem esse conspicuam: ergo omnes (ut creditur) cortice detracto intereunt: sed refert, quoniam celerius, tardius ue, & magis, minus ue. Quippe aliquæ plus temporis permanent, sicut ficus, tilia, robur. Quidam eas & uiuere interdum, nec interire affirmant, & corticem ueluti pumicis specie concalescere, atq; naturam pecuiliarem quandam haurire. His itaq; mederi conantur, luto fouentes obstruentesq;: & harundinibus, atq; id genus stramentis opertas, diligantes ne frigeant, uel subarescant: etiam nonnullisquam restitui, regenerinareq; potuisse proditum est, ut apud Heracliam trachianam ficus: sed præter uirtutem soli, temperamentumq; cœli superuenientes quoq; respondeant opus est. Frigoribus enim, aut etiam caloribus nimis consecutis, statim intereunt. Refert & tempus anni: quippe in germinatione abietis, pinicq; cum etiam cortice turgido sunt mense Februario, uel Martio, si quis detraxit, statim moriunt: hyeme diutius tolerant, & magis quæ robustissimæ sunt, ut ilex, robur. Harum enim interitus diuturnior est. Latitudinem quoq; aliquam decorticatio habeat oportet, omnium quidem, sed maxime robustissimarum. Nam si angustam admodum feceris, nihil absurdum, si non interierint. Quancq; sint, qui etiam si quantumlibet auferatur, necari penitus dicant. Sed hoc de infirmioribus quidem consentaneum dixerint. Quasdam enim & si in orbem non excorticentur, interire affirmant, quæ uel solum tenuæ, ieiunumq; tenent. Igitur hæc, ut diiudicauimus, mors communis omnium est.

*De decacuminatione, deq; salice, platano, populo, quæ resurrexerunt. Cap. XIX*

**Q**uam uero decacuminationē appellât, tantū inter arbores, pino, abietis, piceæ, palmaeq; assignat: quidā & cedro, & cupressio referūt. Hæc em detracta coma, deciloq; cacumine, tota intereūt, nec quicq; germinat, sicut nec si adusta, aut rota, aut parte aliqua fuerint: reliqua aut omnia & præcisa germinat, & nonnulla meliora reddunt, ut olea. Intereunt maxima ex parte uel fisco caudice. Nulla enim tolerare uidetur, præterq; uitis, ficus, punica, mālus. Quædam uel ab ulcere ampliori, altiorq; intereunt: aliæ nihil offenduntur, ut pinus, cum teda descindit, & omnia ex quibus resina colligi potest, ut abies, terebinthus. Harū enim uulneratio, ulceratioq; in profundo: quippe ex infocculis, foecundis: & ex pauciferis, multiferæ reddunt. Quædam etiam securim ita tolerāt, tam stantes, q̄ a statu prostrate, ut resurgāt, uiuant, germinētq; ut salix & platanus: quod & in Antandro, & Philippis euenerat. Cum enim platanus procidisset ramis amputatis, truncoq; securi luxato, resurrexit noctu leuata onere, atque reuixit, & cortex iterū circumtexit. Erat duobus lateribus circūdolata, lōgitudine decē cubitis maior: crassitudine, ut quatuor uiri nō facile amplecterent. Salix aut, quæ in Philippis resurrexit, fuit quidē detracta, sed nō circūdolata. Aruspex tunc quidā persuasit, ut sacrificarent, custodirentq; arborē, utpote factam ostento fausto. Resurrexit

& Stagiris in museo populus alba procidua. Medulla exempta nulla ferè arbor moritur: argumentū, quod multæ arbores magnitudine excellentes cauantur, inanesq; fiunt. Arcades quadantenus si eximatur, uiuere dicunt: tota uero ex uniuersa arbore exempta, & pinum, & abietem, & reliquas omnes interire.

*Quæ mors communis omnibus: oleumq; necare omnia. Item de cytis, & edera, atq; aurone perniciosi. Quodq; brassica temulentiam propulset.* Cap. XX



Omnis omnibus mors, & si radices amputentur, uel omnes, uel plurimæ, & quæ maximæ sint, uitalesq; in primis: igitur hos interitus ex demptione dicendum. Qui autem oleo consequitur, adiectione uerius quadam, quàm demptione incurrit: quippe oleum omnia necat. Qua de causa radicum extirpandarū reliquijs oleum infundunt. Valer oleum magis in nouellis, & in præsens nascentibus, sunt nanq; debiliores: quapropter & tangi eas agricolæ prohibent. Necantur & inuicem inter sese alimentis rapina, & ceteris in rebus impedimento. Molesta & edera adnascens, ac uinciens: molestus & cytisus, nam omnia ferè necat: sed eo ualentior auro est, hic enim uel cytisum ipsum interimit. Quædam non necant, sed fucci, odorisq; uiribus reddunt deteriora, ut brassica, & laurus uitem offendunt: olfacere quippe eam, & attrahere dicunt: quam obrem germen cum illis propinquum fuerit recedere, atq; auerti, utpote inimicum fugiens odorem. Androcides exemplo hoc usus est: de medela contra uinum confecta, ex brassica uidelicet, temulentiam posse propulsare: quippe cum uitis etiam uiua, odorem brassicæ fugiat. Interitus itaq; quo pacto fiant, quot sint, quorq; modis eueniant, ijs, quæ explanauimus, patet.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI  
QVARTI FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER QVINTVS.

30

*De cædenda materie tum rotunda tum quadrata, quandoq; cædendum robur.* Cap. I



DE MATERIE, cuiusmodi unaquæq; sit, & quo tēpore tempestiue cædat, & quibus cōmoda operibus cōstet, & quæ tractatu difficilis, facilis ue, & quicquid eiusmodi cōmentationē contingit, æque atq; superiora, explicare tentandū nunc est. Cædit itaq; tempestiuū, rotundā quidē materiem, & oēm quæ decorticanda accipit, cū germinare incipit: tunc em̄ cortex extricatu perfacilis est: quod turgere appellant, scilicet ratione humoris, qui sub eo cortice fieri solet: postea inextricabilis reddit, materiesq; nigrescit, informisq; fit. Quadrandā autē post turgorem, securis autē deformitatē auferit. Deniq; omne, quod pro ualido capi oporteat, tempestiuus cædit, nō solum cū germinare desierit, sed etiam cū fructū percoxerit. Verū decorticationis causa fit, ut rotunda, quanq; intempestiua, pro tempestiuis ad usum ueniant. Quā obrem tēpora per euentū dici contraria debent. Abietis materies primo turgore coloratior reddit: nam & corticem abietis tamē, & pinī, & laricis potissimo detrahunt. Igitur istæ Vere cæduntur, tunc em̄ germinant: reliquæ aliquādo post messē, aliquādo post uindemiā, & Arcturum, ut aria, ulmus, acer, fraxinus, carpinus, scissima, tilia: ad summā, quæ aptæ obui sunt. Robur ferissime cædendū, uidelicet hyeme post autumnū: qd si sub turgore

gore cædatur, citissime omnium ferè computrescit, seu cum cortice, seu sine cortice capiatur: potissimum, quæ primo turgore: proxima, quæ secundo: tertia, quæ tertio: quæ autem post fructuum maturitatem cædantur, quamuis non turgida sint, incorrupta perdurant, præterquam quod sub cortice uermiculi quidam nascuntur, caudicem per summa inscribunt. Quibus signis pro sigillis nonnulli utuntur. Robur profecto cæsum tempestiue, neque putredinem sentit, & prædurū, spissumque ad similitudinem cornu perdurat: totum enim cordis specimen gerit. Salsicortex tamen uel eo tempore cæsa uincitur. Quin & illud è contrario euenit, cum in germinatione cæduntur, cumque post fructus æditos: tunc enim exiccantur caudices, & arbores radicitus regerminare minime possunt, sed post fructus regerminant: quamquam eo tempore cædi difficilius possint. Duriæ causa cædi etiam post lunæ occasum præcipiunt, quasi duriora, & computrescere perniciosa forent. Sed cum maturitates fructuum inter se differant, constat quod etiam uigores arborum referre ad cædendum est necesse: semper enim serotinarum magis cæsuræ serior. Quæ de causa particulatim quidam expedire conantur, ut pinum, & abietem cædi oportere cum germinare incipiunt: scissimā, tiliam, acerem, carpinum autumno: robur (ut diximus) post autumnum. Sunt tamen qui etiam id tempestiuum in Vere existimant, cum amentum, quod uocant, gerit: & piceam, cum uia eius florere incipit. Quæ igitur tempestiua omnibus annis cæso sit, hunc ferme in modum denotatur.

20 Certo autem constat, quod uigentium arborum melior, quam nouellarum, uel arborum materies est: quippe cum earum alteræ plus terræ, alteræ plus aquæ contineant. Vnus uero plurimos, maximosque, pinus atque abies præstant: harumque materies amplissima, & pulcherrima constat.

*De differentiâ, quæ inter abietem, atque pinum. Tum quæ quadripartitæ, bipartitæque, ac simplices dicantur. Quæ fabri lignarii breuia appellant.*      Cap. II

30 **I**stant istæ inter se multifariâ. Pinus enim carnosior, neruisque paucis est: Abies neruaciore, atque rigidior, ita ut utrumque è contrario habeat neruos ualidos, carnem mollem & raram: quæ de causa altera grauis, altera leuis est: altera enim teda referta est, altera nullam ingerit tedam: ob id etiam albior est. Ad hæc pino rami plures, abieti longe duriores, uel potius & omnium ramorum durissimi: ambabus spissi, & cornu sanè imitantes, colore flauo, & tedæ similes, qui cum abscissi fuerint tam pino, quam abieti, humor defluit, sed abieti largior est. Præterea tunica multiplici abies, modo cepæ: assiduæ namque tunica conspectæ subditam aliam gerit, atque ex his tota constat. Quapropter qui remos dolant, singulatim, pleneque auferre conantur. Nam si ita auferant, remus ualidus relinquetur: sin autem permutauerint, nec pariter dempserint, infirmus reddetur: hunc enim in modum ictus, illo demptio fit. Est etiam excelsior, atque procerior abies: ideoque antennas, malosque ex ea facere assolent. Habet & uenas, neruosque omnium nobilissimos: crescit

40 hæc primū in excelsum quoad libere solem accipiat. Neque ramus ullus, neque germinatio lateris, neque crassitudo interim facitatur: post in profundum latumque incrementum capessit, atque ita ramorum exortus, & laterales germinationes sequuntur. Hæc abietis propria: illa uero & pino, & abieti, & alijs communia constant: alia enim quadripartita, alia bipartita, alia simplex. Quadripartitas appellant, quibus in utranque partem medullæ, bini uenarum cursus naturæ contrariæ pertendunt: atque per utrumque cursum adigunt ictus, cursibus contrarios inferentes, dum in utranque partem medullæ securis remeat. Ita enim eueniat necesse est, naturæ uenarum ratione. Ergo tales abietes, pinosque quadripartitas appellant, & easdem ad opera uehementer probant. Materiem enim spississimam præstant, & ægidem gignere istæ solent.

Bipartitæ illæ cursum uenarū unum tantum in utraq; partem medullæ gerunt, eisdemq; inuicem contrarios habent, ut & securis duplex adigi debeat, simplex per utrunque cursum icu contrario: mollem hanc materiem refert, sed in opere pessimam, quoniā maiorem in modū peruertitur. Simples uocant quæ unū dumtaxat uenarū habent cursum. His itidem securis utraq; ex parte medullæ adigitur: laxiorem natura materiem hanc esse affirmant, sed à peruersione tutissimā. Discrimen arbores suis corticibus ostendunt: quāobrem ubi primum arborem uiderunt, cuiusmodi sit, discernere queunt. Quibus enim uenæ egregie perfluunt, quæq; in opere obediunt, his cortex leuis, rectusq; est: quibus autē e contrario, his scaber, contortusq;. Atq; de reliquis eadē ratio est. Sed quadripartitæ paucae, simplices, plures, 13 quā reliquæ comperiunt. Omnis autē materies amplior, procerior, obediens, solidior, atq; in totū melior, & copiosior, quæ partibus aquilonijs exit, ut etiam prius retulimus. Et ipsius arboris partes, quæ aquilonē aspiciunt, spissiores, adulescentioresq; constant: quæ uero ab latere, aut in orbe perflant, hæ uertunt, cōtorquenturq; aquilone, ut medulla earum contorta sit, nec in rectum porrecta. Hæc integra quidē ualida esse credunt, cæsa autem imbecilla, quod pleraq; habent diuersitates. Breui hæc fabri lignarij uocant, quoniam ita pro usu cadere consueuerunt.

*Quæ neq; ad fabrilem, neq; ad ignarium commoda. Quæq; fabrilis usu materia, quibusq; in terris præstantissima sit. Tum quid orbes in ligno. Deq; stimulo in lapide, & oleastro, in quo præcisso inueniuntur ocreæ.*

Cap. III

20



Ad summā, quæ humidis, tranquillis, umbris, cunctisq; locis affurgunt, deteriora tam ad fabrilem, quā ad ignariū usum ueniunt. Ergo huiusmodi differētiæ, pro locis (ut simpliciter loquar) unigenorum ipsorū adnotant. Quidā enim per tractus diuidunt, adiungēq; materiem optimā omnī quæ in Græciam aduehunt, macedonicā ad usum ædificatorū esse: leuis enim est, obediens, & tyium nimirū continens: secundā ponticā tradunt, tertiam rhyndacicam, quartā æanicam: deterrimā parnasicam, atq; euboicam: nodosa enim & aspera, & citō putrescens. De Arcadia animaduertendum est. Robustissima, quæ enodis, leuisq;, eademq; uisu pulcherrima est. Nodosa certe, aut 30 male adulta, aut hyeme oppressa, aut aliqua similitudine efficitur: in totū enim nodositas probæ nutritionis indigentia est. Sed postq; nutrita improbe fuit, si commodo nutrimento potita se recreet, atq; ita proficiat, fit ut nodi absorbeantur incrementis to obducto. Probe etenim coalescēs, gliscensq; superne obducitur, & sæpe quæ de foris leuis cerneret, scissā nodatissima exiit: qua de causa medullas conspiciari scissilium solent. Nam si nodis istæ transfixæ sint, extrā quoq; habeant nodos necesse est. Fiunt & orbes, hyemis, improbaq; nutritionis causa. Orbes autē uocant, cum facta conuolutio quædā ampla, circulis pluribus circumacta sit, quā neq; nodum omnino dixerim, neq; ipsius crispitudinē ligni: hæc enim per totū serē, atq; equaliter 40 ampliatur. Longe id iniquius, tractatuq; difficilior, q̄ nodus artifice obstat: proxime, atq; in lapide, qui stimulus uocatur, nasci omnino uidetur. Nodos autē obducto incremento occupari, atq; in plenū integri, sensus ipse percipere euidentissime potest. Cæterū uel ex alijs perquam similibus rebus, id ita fieri constat: sæpe enim pars arboris comprehensa ab altera proxima est, atq; in eiusdē corporis magnitudinē coaugmentata: & si lapidem, aut aliquid simile arboris alæ inculcaueris, demū insinuatbitur, atq; occultabitur amplexu auctioris obductæ: quod etiam in oleastro, qui Megaris in foro stabat, euenisse accepimus, quo succiso, urbem capi, ac diripi oraculum erat, sicuti actū est. In hoc em̄ percisso, repertæ ocreæ sunt, & alia quædā Attici ritus: parte qua primū affixa fuere, ad ramorū ambitum concauata. Huius oleastri, quod 50 adhuc

adhuc superest, parum admodum extat. Alijs quoque locis permultis complura eiusmodi facta produntur. Sed hæc ( ut dictum est ) pluribus publica habentur.

*De arborum qualitatibus, & quæ spississima, ac durissima, mollissimaue: quæq; calidissima, frigidissimaue, necnon quæ lenta, & rigida sint materie.*

Cap. IIII



Ro natura autem singularum arborum propria discrimina assignantur, spissitas, raritas: grauitas, leuitas: duritia, mollitia, & si quid eiusmodi aliud perspicitur potest. Quæ cum omnium urbanarum pariter, & syluestrium communia sint, de omnibus uerba faciamus oportet. Ergo spississima, grauissimaq; buxus tota: ebenus sua tantum medulla, in qua & coloris nigredo constat. Ex reliquis celi primatus indubie datur. Spissa & roboris medulla, quod atrum cognominant, atq; etiam magis caryfi, quippe cum hæc proxima ad ebum accedere uideatur. Nigra admodum, spissaq; terebinthus est, & quidem Syriæ uel ebena nigriorem ipsam esse affirmant: & capulos quoque pugnorum ex ea fieri, & pocula thericea tornari, quæ à fictilibus secerni non possint: uerum cor tantum accipi, & perungi materiem oportere uolunt. Sic enim & meliorem, & nigriorem effici posse. Quin & aliam arborem reddunt, quæ cum nigredine uarietatem quandam præ se fert subrutillam, ut aspectus ebeni uersicoloris appareat, fieri ex hac lectos, & subellia, & reliqua lautiora opera narrant. Amplam maiorem in modum, & frondibus conditam pulchris, similemq; piris eam assignant. Sed hæc spissitatem quoque unâ cum nigrore fortiuntur. Spissæ autem acer, & carpinus, atque in totum omnes crispæ: ad hæc olea, & oleaster. Raræ corpore inter syluestres, rectisq; idoneæ, abies maxime: inter reliquas autem sambucus, ficus, mâlus, laurus. Durissima roboris, carpinus, aricæq; materies: hanc enim antequam terebrent, madefaciunt, quò scilicet molliorem reddant. Molles in uniuersum, quæ raræ corpore, ac solutæ consent. Tilia inter carnosas præcipue mollis, necnon & calidissima eadem esse uidetur, indicium quod aciem ferri maxime hebetat: tincturam enim ui sui caloris per laxat. Edera quoque calida est, & laurus, atque in totum omnes, quibus facere ignaria solent. Menestor, & morum addidit. Frigidissima, quæ aquatiles, aquosæq; sint. Lenta salix, uitisq; qua de causa scuta ex his facere solent: iceta enim protinus plagam contrahunt: sed leuior salix: rarior enim, & ob id ea magis utuntur. Platanus lentore non caret, sed hæc natura humilior est, sicut etiam ulmus: indicium, quod post cæsuras, erecta materies multum humoris emitit. Morus spissa, simulq; lenta est. Rigorem quoque fortissime ulmus seruat, ob id ulmeos cardines ualuarum adiungunt. Nam si ipsi firmi permaneant, ualuarum quoque stare intortæ possint: alioquin torqueantur necesse est. Faciunt eos ligna permutantes, quod rardicem uersus, quodq; in cacumine fuit. Sic enim inter se coarctata, utrunque impetum alterius prohibet, cum suapte natura aduersetur. Nam si alterum per naturam eodem tendat, quò momentum est, ruina utique eodem sequi facile possit. Valuas autem non statim apponunt, sed compactas statuunt. Nonnulli anno tertio consecere, lautioris operis desiderio: nanque æstatis calore exiccate dehiscunt, hyemis uero humore oppletæ coherent: ratio, quod rara, carnosæq; facile autem attrahant humectum. Palma leuis, tractatu facilis, mollisq; est, quemadmodum suber: sed melior subere, quia lenta: suber enim rigidum est. Quapropter simulacra nunc ex palmis condere inceperunt, sprete suberis materie, ut incommoda. Neros non per totum corpus expandit, neque prolixos extendit, neque eodem posituræ modo cunctos porrigit, sed multifario. Siccarum hæc materies potest, & cum dolatur, & serratur.

*filia molis et calida*

*Thuium, quod & Thuis dicitur, nasci apud sanum Ammonis. Ex quibus item simulacra deorum fieri solita. Quæ ponderosa simul ac dura, quæq; discordent. De nuce euboica, ipsiq; quæ perpetua sunt natura: tum quæ cariem, ac tinea sentiant, aut non sentiant: deq; teredine, tinea, & uermibus, qui in materie nascuntur.*

Cap. V



Huium, quod thuia ab alijs appellatur, nascitur apud Ammonis sanū, atq; in Cyrenensi agro, forma cupressi similis, cum ramis, tum folijs, caudice, fructuq; uel potius ceu cupressus syluestris. Copiosam uel ubi urbs hoc tempore est, comperiri affirmant: atq; etiam memorant contignationes quasdam uetustissimas thuia. Perdurat enim materies hæc incorrupta omnino. Radice huius arboris nihil crispus, eaq; preciosa opera cōficiunt. Simulacra ex his sculpere solent, cedro, cupressi, loto, buxo: minora etiam ex olearū radicibus: rimas enim istæ non capiunt, & carnis æqualitate quodāmodo constare uidentur. Hæc igitur proprietatē quandā locorum naturæ, uisq; ostendunt. Ponderosa autem, leuiaq; ex spissitate, raritate, humilitate, lentitate, siccitate, rigiditate, duritate, mollitudineq; accepisse oportet: quædam itaq; simul, & dura, & ponderosa sunt, ut buxus, ut robur. Quæ autē rigida, atq; durissima sint, hæc pondere carent. Omnes syluestres urbanis, & masculæ fœminis, spissiores, duriores, ponderosiores, in totumq; robustiores, quod etiam antè retulimus. Quin & minus fœcundæq; fœcundioribus, & deterius fructificantes, probius fructificantibus, tota quasi ex parte firmiores, nisi usquā mas fructuosior esse soleat, ut alias quasdā affirmant, & cupressum, cornuq;. Verum inter uices quidem, quæ minus fructificant, gemmis crebrioribus constant, solidioresq; sunt: idem etiam in malorum, reliquarumq; urbanarū genere pater. Natura perpetua, cupressus, cedrus, ebenus, celtis, buxus, olea, oleaster, pinus, quæ redam gerit, aria, robur, nux euboica. Sed diuturnior inter has cupressus uidetur: itaq; in Epheso cupressina materies, ex qua ualux templi Dianæ, quatuor ætates referuata durauit. Sola hæc nitorem etiam recipit, ideoq; ex hac condere operum lautiora consueuere. Ex reliquis post cupressum, ac thuiam, morum æternam potissimū esse arbitrantur, simulq; ualidam, & in operibus facile, atq; uetustate nigrescere modo celtis. Item alia in aliud, & in alio perpetua: exempli gratia, ulmus in præfatu. Robur defossum, atq; in aquis demersum, putredine quippe immune hoc omnino uidetur, ob id fluuijs, lacubusq; naues hac etiam materie condunt: sed mari putrescit: quanq; reliquæ magis durare ualeant: quod quidem & ratio uult, utpote cum sale macerata, conditaq; sint. Fagus quoq;, siue scissima in aqua permanere posse incorrupta uidet, madefactaq; melior reddi. Quin & nux euboica nequaquā putrescit. Dicunt & pinum plusq; abietem corrodi à teredine posse: hanc enim esse amaram, pinum uero dulcedinis nonnihil habere, eoq; magis, quo fuerit teda refertior. Omnes teredinem sentire affirmant, præterq; oleastrum, atque oleam, quas amaritudinis causa neq; teredo, neq; tinea rodit. Quæ mari putrescere aptæ sunt, erodi & teredine solent: quæ autem terra, uermiculis, tineisq;. Teredo enim non nisi in mari enasci potest. Est autem ipsa teredo, corpore parua, capite magno, & dentibus. Tineæ uermiculis similes constant, quibus paulatim materies perforatur: sed hæc curari facile possunt. Nam si offensa materies trahatur in mare, durare nimirum ualet. Quæ uero teredinem senserit, curari hæc nihil potest. Vermium autem, qui nasci in materie solent, alijs putrescente ipsa materie generantur, alijs parientibus alijs uermibus: pariunt enim uel in cæsa materie uermes, quemadmodum in arboribus, qui cerasæ uocantur: cum scilicet tam eroderint, atq; excauuerint, ut se circumagere possint. Fugiant ligna colorata, amara, duraq;: quoniam hæc erodere

erodere nequeant, ceu buxum. Tradunt etiā abietis cum germinat decorticatā materiam aquis inoffensam durare nimirum posse. Patuit id apud Phneum Arcadiae, cum obstruſis faucibus campus in lacum redundauit: tum enim ductis pōtibus ex abiete, cum amplius extumesceret aqua, alijs super alijs fabricatis, postea extruſis obturamentis unda erupit, discessitq; uniuersa materies incorrupta comperta. Sed forte hoc, casuq; innotuit.

*In Tylo insula Arabiae materiem esse, ex qua fabricatae naues incorruptae penē in mari perdurent: tum de materijs cōdiendis, inueteradijsq; et quae materiae faciles in opere, et quae difficiles, et cur cerdones ex piro syluestri tabulas faciāt, ac quomodo circi intortii permaneant. Caput VI*

**I**N Tylo autem Arabiae insula materiem esse affirmant, ex qua naues aedificant, quae mari incorrupta penē perduret: quippe cum annos plusquam ducētos demersa immunis ab omni offensa seruetur. Extra aquam diuturna quidē eadem est, sed nō tantundem: ocyus enim putrere incipit. Quin & illud tractus eiusdem mirādum referūt, quanq; nil ad putredinem spectans: arborem enim constare ex qua baculos cadunt, pulchrosq; admodum faciūt, nec sine uarietate quadā coloris, pellibus tigris proxima: ponderosam unice materiam hanc affirmant, cumq; in solidiora quisq; proiecerit, modo fictiliū fragilem. Addunt etiā tamaricis lignum, nō ut apud nos, imbecillum, sed ualidū, sicut iligneū, aut aliquid ferme materiae huiusmodi, ibidē cōperiri. Id igitur loci coeliq; discrimina, uiresq; indicat. Materiem autē unigenam, ceu roboream pineamq; cum conditū (cōdire nanq; consueuerūt) nō pari altitudine maris uniuersam demittunt, sed aliam iuxta terrā, aliam paulō superius, aliā altitudine ampliorem: sed quae radici proximiora sunt, citius descendūt: uel si fluitet, plus deorsum uersus sanē inclinant. Materierū item alię in opere faciles, alię difficiles: faciles, quae molles, & omnium praecipue tilia: difficiles, quae durae, nodosae, crispae, conuolutionibusq; perplexae. Aria, roburq; omniū difficilima. Sed quoad particulatim reddere liceat, pini, & abietis nodus difficilissimus constat. Semper autē inter unigenas mollior durior praestantior: carnosior enim: & quidem fabri hac de iudicādis asseribus ratione utūtur. Ferrū uitiatam, duramq; materiā magis, q̄ mollem cadere ualet, etenim in molli obtunditur, ut de tilia dictū est: contrā in dura acuitur: qua de causa cerdones ex piro syluestri suas tabulas faciūt. Medullam (ut fabri aiūt) omnis habet materies, sed conspecta potissimū in abiete. Eius nanq; orbiculorū compositio corticea inspicatur, quod nō aequē in olea, buxo, atq; similibus: quamobrem quidā buxum atq; oleam medulla omnino carere existimant: has enim minime omniū distrahi posse. Est autē distrahi, ut mora medulla, cōtorqueatur materies: uiuere enim diu uidetur. Quamobrem quidā undiq; simul demere solent, sed praecipue ex circis, quod intortii permanēat, ideoq; scindūt. At uero absurdū putaueris, rotūdā materiei medullam illaefam atq; immortā posse edurare. Immutatē uero, nisi tota extrahatur, cōmouere materiem atq; peruertere: dispoliatā enim mori facilius posse cōsentaneum potius dixeris. Māli tamen atq; antēnā medulla exempta incōmode relinquūtur: sed hoc per accidēs, quoniam pleriq; uestitur tunicis: sed fortissima, tenuissimaq; postrema pars est, siccissima enim: atq; ita ex reliquis quaeq; ad portionem existimari utiq; debet: ergo scissa materie, siccissimis illis tunicis medulla dispoliatur. An uero sicci ratione medulla cōflet, quārendū. Materiam autē dum trahitur tam fissam, q̄ sectam peruerteret, si id nō ut oporteat, secetur: rectā enim fore sectionē oportet, nec ullo pacto obliquam. Exempli gratia: Si medulla per A lineā conflet, haud quāq; per BC secandū, sed per BD: hoc enim modo medullā perire, illo uiuere posse arbitratū. Sed nullā materiem medulla carere hac existimant ratione.

*hinc duo pini in  
quos motus est*



In omni ligno suam esse medullam; ac lignorum alia esse fissilia, alia dolatilia, alia rotunda: quæq; ponderi cedant, quæ non.

Caput VII



Onstat enim uel eas medullam habere, quas carere putaueris, ut buxum, celtim, ilicem. Argumentum, quod ualuarum sumptuosarum cardines facere ex his artifices solent, cumq; architecti faciundos ex medulla præcipiât: quod item, uel omnem medullam distrahi posse, etiam durissimarum materierum, quas nonnulli corda appellant, argumentum sane accipi potest. Materiei autem (ut sic loquar) uniuersa pars durissima, rarissima medulla est, atq; etiam ipsius abietis: rarissima quidem, quoniam neruis amplo inter se distantibus interuallo, carneq; media copiosiore constat: durissima uero, quod & nerui durissimi, & caro durissima est, qua de causa architecti partes medullæ proximiores auferendas præcipiunt, ut quod spississimum, mollissimumq; materiei sit, tantum relinquatur. Lignorum alia fissilia, alia dolatilia, alia rotunda: fissilia, quæ diuidentes per medium secant: dolatilia, quorum partes exteræ circumdolant: rotunda, quæ scilicet intacta omnino relinquunt. Ex his fissilia nullam penitus rimam patiuntur, quoniam enudata medulla exiccatur atq; emoritur: dolatilia & rotunda, rimas admittunt, longeq; magis rotunda, quod medulla in his lateribus plenioribus circumdatur. Haud enim quicq; ex cunctis est, quod fissura immune possit euadere. Itaq; loteis, reliquisq; quorum usus ad cardines, ne findatur, fimo illinunt bubulo, ut siccetur, sensimq; diffusetur, atque euaporetur humor medullæ. Vis medullæ huiusmodi est. Ponderus sustinere abietem ualide, & pinum (nihil enim ponderi cedunt, ut robur, & reliquæ terrenæ, sed renituntur) argumentum, quod nunq; rumpuntur, sicut olea, & robur: sed prius quam uiribus, carie, aliâsue deficiunt. Palma quoq; præualida est, & in diuersum, quam ceteræ incuruat: quippe cum reliquæ omnes in inferiora flectantur, palma è contrario fornicatim se flectit. Quin & pinum, atq; abietem reniti affirmant. Iuglans frangit se sonitu prænunciat: est enim uel eius materies ampla, usq; ad opus rectorum, ita ut præsentire homines possint: quod & in Antandro accidisse, omnesq; è balneis terrefactos profugisse traditum est. Valida etiâ ficus, sed in rectum pertendens. Pinus omnium ferè maxime uiribus ualet, & ad usum ædificatorium spectabilis eadem potissimum est, laxitatis, rectitudinisq; meauum causa. Hanc enim ne findi quidem ullo pacto posse affirmant, si glutine minuiatur. Obedientissima philycæ est, candorq; ei celastri modo. Tilia inter reliquas præcipue talis est. In totum enim præfacilis operibus est, præ sua mollitia, ut retulimus. Flecti facile possunt (quoad simpliciter reddere rationem licet) omnes, quæ lentæ sunt: sed moro, atq; caprisico primatus indubie datur. Quamobrè furculas, circos, deniq; ornamento quæcunq; fieri soleant, hisce conficiunt.

Quæ facile, difficileq; secantur, terebrenturq;: quæq; torno sculpturæq; conueniant: quæ humidissima, quæ nauibus aptissima sint: quæ tectis, et plerisq; alijs commodissima, ut abies, pinus, cedrus, picea, robur, tilia, acer, carpinus, taxus, ilex, scissima, ulmus, buxus, potulaca, iuglans, terebinthus, philycæ, apharce, celastrius, laurus, salix.

Caput VIII

40



Ecantur, findunturq; facilius, quæ humidiora capiuntur, quam ut scississima sint: altera enim cessant, altera constant. Quæ uero nimis uiridia sunt, hæc admodum coeunt, segmentaq; inter dentes ferrarum admittunt, implentq;. Qua de causa dentes alterna inclinatione fabri permutant, ut sponte educi possint. Sunt & terebratu difficiliora, quæ nimis uiridia: Terebramenta enim, ut ponderosa expui haudquaq; celeriter possunt, siccorum è diuerso celeriter. Aer enim seruefactus confestim expuit. Rursus difficile leuia, & sicca secantur: euenit namq; ut ueluti fictili sectio inferatur. Quamobrem

obrem lignis perforandis aquam infundunt. Securi, torno, sculpturaeque faciliora, quae uiridia: quippe cum ferrum magis insidat, hareatque, nec quicquam resiliat: securis quoque molliorum, sculpturaque expeditior, leniorque. Quin & cornus ualidissima est: reliquas ulmus uiribus suis facile uincit: quae de causa cardines (ut dictum est) foribus ulmeos addunt. Humidissima fraxinus, scissimaque: lectulos enim cadere aptos ex his conficiunt. Ad summam, quibus quaeque materies commoda, & quae nauibus, ædibus uel idonea (nam huiusmodi usus plurimus, summisque operibus adhibendus est) explicare tætabimus. Quantum commoditatis singula fortiantur, pro uiribus aperiemus. Abies, pinus, cedrus (ut summam contingam) constat apertissima nauibus: 10 triremes enim atque longa nauigia, ex abiete, leuitatis gratia faciunt. Rotunda uero ex pino, quoniam non putrescat. Nonnulli etiam triremes ex eadem condunt, quod abiete carent. Qui Syriam, Phœnicemque incolunt, cedro utuntur, quia pino etiam egent. Cyprii picea: hanc enim illa insula habet, uideturque pino præstantior, & cætera quidem ex his: carinam uero triremibus quernam subiiciunt, ut cum in terram attrahitur, resistere possit. Nauibus onerarijs, pineam, atque etiam quernam subiungunt, cum extrahendas ædificant: minoribus uero scissima deputata est: atque in totum ex hac testudinem condere assolent. Nec pino, atque abieti quercus cōglutinari ualet, altera enim spissa, altera rara: & altera similis, altera minus. Affectus autem similis ea esse oportet, quæ sociari, consarique debeant, non contrarij, ceu siligno lapidem 20 coniungere uelis. Tornatus nauibus rotundis ex moro, fraxino, ulmo, platano: lentitiam enim, firmitatemque adesse oportet: sed deterrimus, qui ex platano fuerit, celeriter enim putrescit. Sunt qui triremibus uel ex picea leuitatis causa tornandum statuunt firmamentum: testudinem, & aurículas ex fraxino, moro, ulmoque fabricant: ualida enim hæc esse oportet. Hæc ferè naualis annotatur materies. Sed tectis commoda, copiosior est: abies enim, pinus, cedrus, iuniperus, utque in plenum referam, commoda unaqueque materies est, præterque si qua firmissima penitus constet. Non enim quaeque operi eidem accommodatur, quemadmodum nec in nauium fabrica. Reliqua materies artium proprijs redditur: exempli gratia, uasis ac instrumentis, & si quid aliud eiusmodi habeant. Sed ad plurima penè usum abies præstat, quippe 30 quæ ad tabellas etiam accommodari pictorias possit. Aedificijs itaque optima, quæ uetustissima, modò immunis carie sit. Operibus enim (ut ita dixerim) omnibus ædificatorijs aptissima est, sed nauibus propter flexum humidior capiatur necesse est: Nam ad conglutinationem quidè siccior aptior est. Nauis enim compacta, ut extra mare fidelior constat: & in mare protracta humore inbibito, se undique protinus committit, atque rimis coniunctis omnibus continuat: nisi quicquam penitus exaruerit, tunc enim gluten aut omnino aspernatur, aut non æque recipit. Sed iam particulatim materiem, quæ comoda sit capiamus oportet. Abies & pinus (ut proposuimus) & domibus, & nauibus, & alijs plerisque commodissima sunt: sed plura abies expedit. Piceæ usus quidè ad utrumque opus, & maxime ad nauale, sed putrere celeriter 40 incipit. Robur tam nauibus, quam domibus commodum: nec non & in terra obrutum durat. Tilia foris nauium longarum, & arcarum, mensurarumque fabricæ expendenda est. Habet etiam corticem funibus cuiusque per commodum. Acer, & carpinus, lectis, iugisque iumentorum, atque in totum operum sumptuosioribus caditur. Taxus tenuis ciliā conglutinamēta capsis, scrinijs, subsellijs, atque in totum similibus præstat. Illici honos ad axes plaustrorum uerticis simplicis, & iuga lyrarum, psalteriorumque. Scissima ad plaustrorum, uectabulorumque uilem fabricam. Vtilis ulmus ad fores, præla, & torcularia: quin & ad carpentarij opus, sed mediocriter. Buxus ad axem plaustris, & ad burem aratris. Potulaca mulieribus ad opus textorium. Iuniperus ad rem ædificatoriam tum subdiualem, tum obruendam sub terram. Durat enim im-

munis putredine: pari modo & iuglans. Quinimò omnium præcipua operi subterraneo redditur. Est & buxi usus ad nonnulla: quæ tamen monte Olympo prouenit, ob suam breuitatem, nodositatemq; extat inutilis. Terebinthus non nisi fructu, resinaq; utilis. Neq; philycæ honor, præterquam in alêdo pecore: semper enim fronde abundat. Apharca uallis expetitur, & ad urendum commoda est. Celastri usus ad baculos. Quidam etiam laurum addunt: seniles enim, & pulchros, & præles baculos ex hac faciunt. Salicis ad scuta, cistellas, canistra, & eiusmodi reliqua. Reliquas quoq; arbores singulatim persequi pari modo possumus.

*Quæ quibus instrumentis conueniant. Cedrosq; in Syria præstantissimas, ac tredecim passuum longitudine fuisse earum, quæ ad undecimem Demetrii regis cæse. In Corsica arbores amplissimas, magnosq; discrimine ceteras excedentes. Romanos in Corsicam profectos condendi oppidi gratia, & destituisse ob uastarum arborum multitudinem, ex ijsq; ratem edificasse quinquaginta uelis ducentam. Item de Latino agro, & monte Circæo.*

10

Caput IX



Ecnon ad instrumenta fabrilia digestio singulis fieri potest: ut, malleolus, & terebra ex oleastro optime fiunt: quanquam & buxeis, ulmeis, fra & ineisq; utuntur. Malleos magnos ex picea faciunt: simili modo & reliquarum cuiq; opus quoddam tribuitur: sed hæc pro usu discerni desiderant. Materies autem unaquæq; pro loci natura (ut etiam prius retulimus) suam obinet differentiam. Nam alibi celtis, alibi cedrus miranda assurgit, ut uidere in Syria licet. Illic enim cedri in montibus, cum longitudine, tum crassitudine præstantissimæ exeunt: quippe adeo crassescunt, ut sint, quas ulnæ hominū quatuor nequeant amplecti: addit his ampliores pulchrioresq; comperiri in hortis. Quod si quis sinat nec cædat, mirum in modum quodq; arborum genus, modò sibi proprium habeat solum, excrescere posse uidetur. Itaq; quod in Cypro reges cum ex imperitiâ, tum ex transuehendi difficultate, nunquam materiem cæciderint, longitudo ijs, quæ ad undecimem Demetrii regis cæsa sunt, passuum tredecim. Ligna autem mirifice procera, enodia, leuia, sed amplissima magnitudine arbores, magnosq; discrimine ceteras excedentes nasci in Corsica produnt. Quamuis enim in Latino agro, pini, & abietes tum magnitudine, tum pulchritudine, inter omnes Italicas præstent, tamen ad earum rationem, quas Corsica gignit, pro nullo certe habentur. Romanos enim aliquando cõdendi causa oppidi in eam insulam nauibus quinque & uiginti profectos, tam uastis arboribus locus dicitur excepisse, ut nauigâtes per sinus quosdam, & portus, nexus, densaq; malos percinderent: & omnino insula tota confertissima, & quasi efferata immani arborū turba spectaretur. Quamobrè Romanos à condendo oppido destituisse aiunt. Sed nonnullos ingressos, breui ex loco tam largam cæcidisse materiem, ut ratem perconderet quinquaginta uelis ducendam, quam in pelago perijisse addunt. Corsica igitur seu ratione laxationis, seu etiam telluris, celiq; uirtute locis plurimū ceteris præcellit. Latinus autem ager aquis totus abundat, & plana laurum, myrtumq; habent, scissimamq; mirabilem: tanta enim longitudo cæditur, ut pro carina Hetruscis nauibus possit sufficere. Montuosa pinum, & abietem ferunt. Circæum uero, quod uocant, excelsum quoddam promontorium tradunt frequentissimum arborum, & robore, lauro, myrtoq; maiore ex parte scatens. Circen in eo habitasse incolæ referunt, & tumulum Elpenoris monstrant, apud quem myrti proueniunt modo coronarij generis, cum ceteræ ampla exeant magnitudine. Insulam antea Circæum istud fuisse notatur: nunc enim à fluuijs quibusdam exaggeratum, factumq; litus est. Magnitudo insulæ circiter octoginta stadia. Sed pro locorum proprijs, permulta magnaq; exultant discrimina, ut sæpius diximus.

40

Quæ

*Que ad usum ignarium, adq; carbones conficiendos commodæ: quæq; fumosæ sint, & quarum summus acerbissimus. Item quo modo fumo immunes euadant, flammamq; mollissimam faciant. De atragena, & cur statua e cedro sudent. Materiem item oleagineam, uel sepe laboratâ germinare.*

Caput X



Vo autem pacto sese ad usum ignarium quæq; materies habeat, dicendum nunc est, exploratumq; habere conandum. Ergo carbones optimos spississimæ materies faciunt, ut aria, robur, arbutus: solidissimos enim ita, ut diuturniores, efficacioresq; sint. Qua de causa in metallis argenteis hisce ad decoctionem primam utuntur. Sed deterrimi inter eos, roboris, quod terrestriores. Vetusioris arboris, & potissimum annosæ, deteriores, quàm nouellæ eadem de causa sunt: summa etenim siccitate constant, ideoq; cum ardent, dissiliunt: humoris nanque aliquid habeant, oportet. Optimi, quos ætate uigens materies fecerit. Sunt enim spissæ, terrenæ, humidæq; naturæ temperatores: commodiores etiam, qui ex apricis, siccis, aquilonijsq; quàm qui ex umbrosis, humectis, austrinisq;. Generis item siccioris quantum spissius est, carbonem præstat commodiorem: quo spissius enim, humidius est: atque in totum, ordinis uel natura, uel loco siccioris pars spissior, commodior eadem de causa est: usus uero diuersorum diuersus. Quibusdam enim operibus molliores expeti solent, ceu ferreis metallis, iuglans, cum iam exarserit: & argenteis, qui confecti ex picea sunt. Quinetiam artes carbones suos desiderant. Et quidem excusores pineos potius quærunnt quàm quernos, quanquam infirmiores sint: ad statum enim respondent commodius, quoniam minus marcescant, extinguanturq;. Est autem flamma eorum celerior. Deniq; rarorum, & leuium, & aridorum tam carbonum, quàm lignorum acutior est: contra spissiorum, & humidorum, lentior atque crassior. Omnium acutissimam humilis reddit materia, sed carbones nullos relinquit, eo quod copulencia caret. Cædunt, componuntq; ad carbonem conficiendum, quæ recta & leuia sunt: enim uero quamdensissime componi ad concremationem oportet. Cum uero fornacæ circum accenderint ignem, uerubus interpungentes transmittunt, flammamq; penitus excitant omnibus corripendis. Hæc quærere ad carbones solent. Fumosa genere quidem uniuerso, quæ humida sunt. Et utridia quoq; fumosa eadem de causa experimur. Humida inquam, quæ palustria, ut platanus, salix, populus: nam & uitis fumosa dū humida est. Palma supæ natura fumosa est. Ex quo illud Cheremonis carmen: Palmæq; uenas usq; fumosissimæ radice natas. Fumus acerbissimus, sici, caprifici, & cuiusq; lacteo succo humentis: causa humor est. Hæc tamen decorticata, & aqua superinfusa madefacta, deinde siccata, omnia um maxime immunia fumo euadūt, flammamq; mollissimam faciunt: utpote cum proprius quoque, innatusq; humor exemptus sit. Quinetiam cinerem eorum, lixiuiamq; acrem sentimus, ac præcipue amygdalæ: quanquam ad fornaces, artesq; reliquas commoda percipiatur. Ad ignem excipiendum apussima ficus, oleaq;. Ficus, quia lenta, & rara corpore: sit enim exinde ut facile attrahat, nec quicquam dimittat. Olea, quia spissa & pinguis. Fomites tamen si ex multis fieri possint, tamen optimi, qui ex nuce, ut Menestor est autor: celerrime nanque, largissimeq; respirant. Ignaria commodissime capi ex atragena uocata existimant. Arbor hæc uitis, & labruscæ similis surgit: modo enim silarum arbores scandere solita est: sed conceptaculum ex hac, terebrum uero ex lauro faciundum censent. Non enim ex eodem quod agat, quodq; patiatur, sed è diuersis accipiantur: & alterum efficiendi, alterum patiendi uim obtineat, natura protinus exigit. Carterum uel ex eodem nonnunquam cōficiunt: nec desunt, qui nihil referre arbitrentur: commoda etiam ex rhamno, quæ quidem uel conceptaculum præbere idoneum potest. Non enim

tantum humore exinanitum, arefactumq̃, sed etiam rarum esse oportet, ut attritus efficacior esse possit. Terebrum pati pertinacius esse debet: qua de causa laurum faciunt: id enim pro sua acrimonia ualētius resistens, opus commodius expedit. Quin & ex rhamno, ilice, tilia, & ferē plurimis id fieri solet, praterquam ex olea: quod certe absurdum putaueris: oleam enim duriores, pinguioremq̃ esse constat. Sed hæc ob immodicum scilicet humorem inepta redditur ad ignitionem. Quodq̃ autem genus ignariorum aquilonijs flatibus ignem ocyus, magisq̃ concipit, austrinis minus: & locis æditis, atque sublimibus magis, quam concauis. Cedri materies nata est humorem emittere, & in plenum omnes quibus oleosus est humor. Quamobrem deorum statuarū uisæ sunt aliquando sudasse: ex his enim condere eas consuevere. Quod autem Lucinam appellant, & sacrificijs obseruandum aruspices iubent, concreto quodam humore, extruberat, magnitudine piri, aut paulo maius, minusue. Germen potissimo citat materies oleaginea cum rudis, tum sæpe laborata in opus, si quem humorem sentiat, locumq̃ habeat humectum: ut iam cardo quidam ualuarū prodatur germinasse, & poculum limo iniectum.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI  
QVINTI FINIS.

29

THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER SEXTVS.

*De suffruticibus, herbisq̃, ac frugibus: tum quæ maxima omnium generū differentia, deq̃ aculeatis herbis, & quod tribuli proprium: item quibus desu aculeus.*

Caput I



DE ARBORIBVS atq̃ fruticibus dictum iam est, nunc de suffruticibus, & herbis doceamus, cōsequitur: & si qua in hisce alia genera comprehenduntur, illa quoque adnotemus oportet, ut fruges: nam hæc quoq̃ inter herbas deputari desiderant. Sed primum uerba de suffruticibus faciamus: id enim genus propius ad prædicta accedit: quod nimirum surculosum assurgat. In omnibus fortē plantarum generibus, syluestre semper urbano copiosius est, uel si id minus cæteris constet: in natura quidem suffruticum ita proculdubio esse fateri conuenit. Pars enim exigua hoc in genere urbana notatur, quæ coronarijs penē consumetur: ut rosa, uiola, Iouis flos, sansucum, elium: item serpyllum, silymbrium, helenium, abrotonum: hæc enim omnia surculosa, minutisq̃ condita folijs constant, fruticesq̃ proinde redduntur. Item etiam in olerum genere simili ratione sentitur: exempli gratia: Radix, ruta, quæq̃ similia, de quibus haud minus fortē secundū propriam appellationem dixisse conueniet, cum mentionem coronamentorum, atque olerum faciemus. Nunc de syluestribus primum dicendum est. Horum igitur species, partesq̃ plures, cum singulis generibus, tum totis speciebus existunt, quas utique discernamus oportet. Sed maximam cunctorum generum acceperis differentiam, quod alia sine aculeo, alia aculeata. Etrunsum in eorum utroq̃ permulta generum, specierumq̃ discrimina constant, de quibus iam referre tentandum est. Ergo aculeatorum alia ex toto aculei sunt, ceu corruda, & nepa: hæc enim nullum iuxta aculeum folium gerunt. Alia folijs constant aculeatis, ut acanum, eringium, cnecum: hæc enim atque similia in folijs aculeum gerunt,

runt, quamobrem folijs aculeigera dixeris. Quædam etiam iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conduntur, ut ononis, tribulus, phleus, quam nonnulli *strobam* appellant. Tribulus uel semine aculeigerum constar: habet enim in semine aculeum. Qua de causa id quoque proprium ei (ut sic loquar) præ omnibus licet utique adnotare. Nam ramis quidem aculeigera, uel inter arbores, fruticesque multa comperire poteris, ut pirum syluestrem, málum punicam, paliurum, rubum, rosam, capparim. Hæc in aculeatorum genere discrimina senseris, quoad notatim liceat subsignare. At eorum quibus aculeus deest, digestio nulla penitus generatim fieri potest: quippe cum foliorum diuersitas, amplitudine, paruitate, figuraque immensa incertaque sit. Quamobrem alio modo diuidere illa tentandum profectò est. Sunt autem genera eorum complura, summisque differentiis discreta, ut edera, melothrum, rubæia, smerea, casia, origanum, satireia, lens, saluia, marrubium, pulicaria, apiastrum, cæteraque similia. Atque etiam quæ minus similia sunt, scilicet quæ ferulacea, & neruicaulia consent, ceu fœniculum, equifœniculum, ferulago, ferulaque, herba muralis, siue muricida à quibusdã uocata, cæteraque similia. Hæc enim omnia, atque in totum, ferulaceum suffruticum naturæ addixeris. Genera uero atque discrimina, singulis hisce indicatis habentur, alijs euidentiora, alijs occultiora.

*Edera, & casia duo esse genera. De origano, thymo, sphacelo, saluia, marrubio, pulicaria, ferula, ferulagine, mandragora, cicuta, eleboro, albuco, fœniculo, muricida.*

## Caput II

**E**dera namque duo genera, mas, & foemina. Quoniam altera maius, durius, pinguiusque folium habeat, floremque ad purpuram inclinatum: ambabus tamen flores rosas syluestribus proximi, uerum minores & sine odore. Casia quoque duo genera, alia enim candida, alia nigra: candida folium modo cutis oblongum, figura quodammodo oleagineo simile: nigra quale tamarici carnosum. Candida magis se humi spargit, odorataque est: nigra odore caret. Radix ambabus, quæ alte descendit, grandis, ramique permulti, crassi, furculosique ab ipsa protinus tellure, aut paulò superius sparsi, lenti admodum constant: quamobrem hisce ad colligandum modo iunci utuntur. Germinant, florentque post æquinoctium autumnum, & multum denique temporis florent. Et origani uero genus nigrum, sterile constar: candidum, fructuosum est. Quin & thymum candidum, nigrumque reddunt: serò id admodum florer: nam circa æstiuum solstitium incipit. Mel apes hinc capiunt, & hoc augurio apiarum constare affirmant, an probe mellatur, nec ne: etenim si aliter desfloruerit, mellario minus probe succeder: destruitur, peritque flos, si imber incessit. Semen fœcundum satireiæ, atque etiam magis origani manifesto sentitur. Thymum nullum ostendi potest, sed floribus quodam permiscetur modo: flores enim ferunt, itaque oritur thymum. Qui tamen Athenis deportare desiderant, quærunt atque inueniunt. Peculiare tam præ ijs ipsis, quam præ reliquis omnibus, uel ex locis fortiri thymum autmant: nam quò flatus è mari nequeat peruenire, illic nasci durareque posse omnino negant. Qua de causa nec in Arcadia satireia, & origanum prouenire possunt. Quanquam similia multa, multisque in locis gignuntur. Proximum sanè, quod etiam in olea euenire notatum est. Nec enim ea trecentis à mari stadijs prouenire posse uidetur. Sphacelus, & saluia inter sese distant, quasi alterum urbanum, alterum genus syluestre dixeris. Sphacelo folium leuius, contractius, minusque squalens: saluiæ scabrius. Sunt & marrubij duo genera, aliud enim folio herbido, serratori, incisurisque profundioribus, & proinde conspectioribus discreto constar, quo unguentarij uel ad nonnulla consueuerunt: alterum rotundius, squallensque

uehementer, sicut sphaceli, incisurasque habens obscuriores, minusque ferratum. Pularia mascula, & foemina constat: distant quemadmodum cetera, quae sic discerni desiderant: foemina enim tenuiori folio conditur, & compressior est, atque in totum minor: mas amplior, crassiorque caule atque ramosior, & folium amplius, pinguisque habens: necnon & flore splendidior est. Ambo fructifera sunt: in totum serotina germine, floreque constant: quippe cum circa arcturum, & post arcturum incipiant. Mari grauior odor, foeminae acrior, ideoque contra bestiarum morsus commodior est. Haec igitur & similia discrepare quasi inter se sentiuntur. Sed adsunt alia facie uniformi, tum in ijs quae ante enumerauimus, tum in ceteris: plura nanque 10  
proveniunt. Ferulaceum autem genus (nam id quoque inter suffrutices est) in plures species spargitur. Sed primum de eo quod commune omnium constat, dicendum est, scilicet de ferula atque ferulagine: seu idem genus ambabus differens magnitudine tantum, seu etiam alterum sit, ut nonnulli putarunt. Ergo natura earum quae conspici possit, consimilis certe sentitur, praeterquam ratione magnitudinis: ferula enim grandis admodum surgit, ferulago autem humilis. Sed unicaules ambae geniculatae sunt. Folia & caliculi quidam geniculis erumpunt, ac alternatim exeunt: folia alternatim inquam, quod non ex eadem parte geniculorum, sed permutatim caulem magna ex parte amplexa, sicuti harundinea proveniunt, nisi quod 20  
deflexa haec magis molliue, magnitudinisque causa: folium enim grande, molle, multifidum, ut capillamenti modo fere inspicitur, maximaque terrae proxima, & reliqua subinde ad portionem: flos mellinus, semen obscurum, anetho simile, sed maius, finditur cacumine, inque stipites quosdam haud magnos dispergitur, quibus flos, semenque insidit: nec flore fructu uel laterales caules carent, sed modo anethi ferunt: annuo caule constat. Et germinatio in Vere primum foliorum, tum caulis, ut etiam in ceteris fieri solet: radice alte descendit, eademque singulari innititur. Talis ferula est. Ex reliquis autem quaedam huic proximiora caule constant, ceu mandragora, cicuta, elaeborum, albucum: quaedam ueluti neruicaulia sunt, ut sceniculum, muricida, & eiusmodi reliqua. Fructus mandragorae peculiaris, quod niger, racematus, uinosusque suo sapore sentiat. Sed praecleara summeque peculiaris natura laeplitij, & papyri Aegyptij: nam haec ferulacea constant, & de papyro inter 30  
aquatiles prius retulimus.

De laeplitio, magydari, quidque differant inter se: item de nepa, corruda, siue asparago, & quae aca nacea sint: de herba lanaria, sonco, enteco, acarna, spina candida, eraria, aculcosa, suso agrestis, buxo asinino, carduo pinea, uernilagine.

## Caput III



**L**aeplitio nunc indicandum est. Laeplitio radix multa, crassaque: caulibus quantus ferulae, & crassitudine fere proximus: folium quod maspetum uocant, apio simile est: semen latum, foliaceum, scilicet quod folium appellatur: caulis annuus sicut ferulae. Ergo Vere ineunte maspetum 40  
hoc exit, & pecus eo purgatur, pinguescitque uehementer, & carnes mirabile in modum suaves redduntur. Post hac caulem addit hominum cibo idoneum omnibus modis, elixum, assumque: corpora eo quoque purgari ferunt. Quadraginta diebus succus capitur duplex, alter ex caule, alter ex radice: qua de causa alterum scaparium, alterum radicularium uocant. Radix nigro cortice tegitur, eumque detrahare solent. Sunt ueluti certae mensurae caedendae radices, quibus quantum conferre putetur ad futuram caesuram referuantes, reliquum abscindunt. Nec enim deuie, neque plus constituto cadere licet: corrumpitur enim putrescitque, si diu mansit. Praeparant id, conficiuntque in Pyraeum portum aduectum hoc modo: Cum in uasis coeecerint, farinamque admiscuerint, quantum longo spatio temporis: hinc etiam colorem capeffit, & coditum iam incorruptum perdurat.

perdurat. Præparatio, cæsuraq; ita se habet. Locum Africæ amplum occupat, ampliore, quàm quatuor stadiorum millia in hortis Hesperidum ferūt: sed maiorem partem colligi apud Syrtis. Peculiare huius culta fugere loca proditur, quāobrem si colatur, mitescatq; solum, deuiat, atq; omnino degenerat, utpote natura culturæ aspernās, ferocitatisq; constans uernaculum. Cyrenēses annis septem prius, quàm ipsi urbem habitarent, laserpitium extitisse affirmant: habitant uero annos maxime trecentos usq; ad Simonidæ Athenis magistratum. Illi sic referunt. Alij radicem laserpitij cubitalem fieri tradunt, aut paulo maiorem: hanc in medio extuberare in caput, quod lac appellāt, erumpit, dein caulis assurgit, ex quo magydaris, & quod folium dicitur, exeunt. Folium id semen est, quod cum aufter ingenue post caniculam flauerit, discutitur, atq; ita laserpitium nascitur, eodemq; anno radix consummat, & caulis. Sed hoc haud quicquam peculiare notetur, nam alijs quoq; idem tribuitur: ni dixeris, quod discussum id protinus nasci potest, ortum peculiarem fortiri, suæ prædictisq; propterea diuersum accipi posse. Ad hæc circumfodiendum id annum censent: nam si relinquatur semen omne, caulemq; totum proferri, & deteriora tam hæc, quàm radicem reddi existimant: defossa autem fieri meliora scilicet solo subactis, beneq; gluto. Sed huius contrarium illi uolunt, qui culta recusare id iniquiunt. Mandi quoq; radices in aceto recens decisas referūt. Folium colore aurum æmulatur. Contrarium etiam quod pecora folio esitato purgari minime indicant. Nam & Vere, & hyeme, pecus ad montem dimitti affirmant: cibus nō solum hoc, sed etiam altero quodam abrotono simili administratur. Vim ambo calefactoriam fortiri planè uidentur, & purgare quidem nequaquam ualere: exiccare autem, & concoquere unice posse. Quod si qua pecus ægrescens, aut aliās minus bene se habens ingressa sit, mox eam sanari, aut emori aiunt, sed magna ex parte posse seruari. Hæc igitur utro tandem sint modo, quærendum. Quod uero magydaram uocant, nimirum à laserpitio differt: tenerius enim, minusq; uehemens id sentire, & sine lasere est. Necnon & aspectu manifesta experto homini cōstat. Nascitur in Syria: nam apud Cyrenam, & monte Parnaso large prouenire eandem affirmant.

30 Sed quidam laserpitium id appellant. An culta id quoque modo laserpitij fugiat, quærendum. Quin & si quid simile, aut proximum habeat, ad folij, caulisq; rationem, & si quam ullo pacto emittat lachrymam, id inuestigandum. Ergo naturam ferulaceam, hisce cōtemplari oportet. Aculeatæ uero sequitur, ut hoc exponamus, quoniam distinctum superius sit, aliud totum esse spinosum, aliud spinosum foliatum, seorsum de utroq; dicendum: atq; tertium illud addendum, quod iuxta aculeum folium gerit. Phleus enim, tribulus, capparisq; peculiare nimirum obtinent, ut non solum caulem aculeatum, sed etiam folium habeant hispdatum. Inter ea uero distincta genera, plurimum quod aculeato folio cōstat, nimirum dixerim: quod ex toto spinosum inspicitur, exiguo, id est numero, quemadmodum diximus. Et dis-

40 ficile quicquam fermè inuenieris, præter corrudam & nepam, quæ post æquinoctium autumni florescunt. Nepa enim florem in carne extuberante sub extremo aculei profert initio candidum, postea leuiter accedentem ad purpuram. Corru-da propter aculeos pusillum quendam producit peciolum, ex quo flosculus tandem ipse erumpit. Nepa radice singulari, eademq; breui adhæret. Corru-da radice large alta, numerosa, eademq; tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota connexa, & continua reddatur, ex qua uel ipforum caulium facitatur prouentus. Exit caulis de corrudagine Vere, ciboq; idoneus est: deinde durescit, florescitq; in dies: flos non solum ex hoc, uerum etiam de primoribus emergit caulibus. Hæc annuo consistat caule. Igitur quæ spinosa in totum sunt, naturam eius-



modi obtinuerunt. Illorum uero quæ folio constant aculeato, genus (ut sic loquar) magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam conceptus, & id cui flos inhaeret, aut etiã fructus, spina, uel spinaceum quicquam sit. Sed differunt inter se magnitudine, figura, colore, multitudine, paucitateq; spinarum, reliquarumq; rerum, exceptis tantũ admodum paucis, ceu herba lanaria, sonco, & si qua sint alia. Reliqua (ut ita loquar) omnia eiusmodi fortiuntur naturam. Nam & cnecum natura spinosa est, quanquam discrepat semine. Verum hæc omnia eiusmodi sunt, acarna, spina candida, æraria, cnecum, aculeosa, fufus agrestis, buxus asininus, carduus pinea, uernilago: hæc tamen non aculeatis folijs constat. Carduus etiã nimirum eiusmodi folijs est, & beta syluestris, & alia plura huiusmodi percipiuntur. Sed præter ea prædicta discrimina, distant inter sese, quod alia multis constant caulibus, ramosq; fundunt, ut cnecum: alia superne cacumine tantũ sparguntur, quemadmodum rhytrum: & alia protinus primis imbribus germinant, alia possunt nonnulla etiã æstate, ut quæ tetralix à quibusdã uocata est: & carduus pinea pari modo, & flores differentia faciunt. Carduus enim pulchre, diuq; floret. Acarnis differentia nō sunt,

De cneco syluestri, eiusq; generibus, ac de acarna iterũ, & fuso agresti, carduoq; & carduo pinea: de cæto etiã, quæ tantũ in Sicilia nascitur. Tum eorũ quæ spinosis folijs constant, iuxta aculeum quædam folium gerere.

Caput IIII



Necum syluestri, urbanoq; discernitur: syluestris genera duo notantur, alterum urbanum admodum simile, recticaulius tamen, quamobrem ex eo mulierum priscarum nonnullæ colu utebantur: fructum nigrum, maiusculum, amarumq; parit. Alterũ genus densum constat, caulesq; sonceos profert, & quodammodo humicaule fit. Nam propter foliorum molliam declinatur, procumbitq; ad arua. Fructum amarum, frequentem, barbaq; modo hirsutum gignit. Sunt ambo seminosa, uerum syluestre copiosius fert: eius peculiare præ alijs syluestribus est, quod illa duriora, spinosioraq; urbanis proueniunt: hoc autem, mollius, ac leuius constat. Acarna quoad simpliciter ratione exprimi licet, aspectu cneco urbano similis est, colore flauicans, succo pinguis. Fufus agrestis his candidior est, habetq; peculiare, quod in folijs euenit: de cerpra enim, carniq; allata, succum sanguineum effundunt: qua de causa id est, cruor à quibusdã spina est hæc nominata: grauis etiã odore, cruoremq; representans, serò perficit fructum. Autumno enim & quidem in totum (ut summatim proponam) uniuersa spinaceorum natura fructus, serotina existit. Hæc autem omnia tam semine, q; radice proueniunt, ita ut breue quoddam, inter ortum, & seminum perfectionem labatur spacium temporis. Cardui non solum peculiare illud notatur, quod radicem uescendam tum decoctam, tum crudam obtinuit, sed etiã quod eandem optimam habet cum florescit, quodq; radix durefcens lacteum succum emittit. Floris quoq; prouentum peculiarem putaueris: etenim circa solstitium incipit: carnosam, ciboq; idoneam partem crassescere fortitur. Ortus autem eius non spinosus, sed oblongus fieri assolet: quod propriũ habent tantũ, in eorum genere, quæ folijs constant aculeatis: è diuerso, quam uernilaginem, habere uidemus. Illa enim tamen non aculeato folio constat, tamen acarni speciem gerit: fenscensq; flos, in lanuginem, papum uocatam, conuertitur, modo laurini, myrtini, & cæterorum generis eiusdem. Pergit hæc ad ætatem usque, aliud parturiens, aliud florescens. Semen illud humoris aliquantulum continet, aculeoq; armatur. Folium cum arefcit, remittitur, nec quicquam amplius pungit. Carduus pinea haud multis prouenire in locis potest: est ab radice foligera, qua de media seminalis acanus, ueluti málum exuberat: folijs nimirum occultatus. Hic lachrymam iucundi

iucundi saporis parte profert postrema, quam spinalem masticham uocāt. Hæc igitur eiusmodi genera omnibus ferè terris possunt comperiri. Quæ autem Cactius nuncupata est, in Sicilia tantū nascitur, Græciæ nusquam habetur sui generis planta: hæc enim statim ab radice caules repētes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso. Caules hos cactos appellāt: desquamati cibo idonei sunt, paulò amaricātes, & reseruare eos aqua falsa conditos cōsueuerunt. Alium uero caulem erectum producit, quem pternicem uocant, is quoq; cibo aptus excrescit, sed reseruari nō patitur: fructus in quo semen, spinata specie est, uerū exemptis lanuginosis seminibus, is quoq; uescēdus relinquitur, & cerebro palmæ similis est, Scaliā eum appellāt. Ergo quæ spinosis folijs constant, differentijs eiusmodi persequi congruum est. Quædam uero folium iuxta aculeum gerunt, ut phleum, inturis, ononis, tribulus, lapago, spinamurilis, alia pleraq;.

De phleo, inturi, id est cappari: de tribulo, eiusq; duobus generibus: deq; ononi, herba aculeigera.

## Caput V

**P**hleum folio cōstat carnosum, multifidum, multistirpisq; est, nō tamen alte descēdit: germinat cum uergilijs, primoq; aratro unā, nec folia id dimittit. Nō enim annuū, sed diuturnius est. Inturis præter prædicta, peculiare (ut retulimus) habet, quod & folium, & caulem gerit subhispidum, nec phleum, & lappaginem æmulat, quæ folijs mitibus constant: unistirs, humile, humicaule est: germinat, floretq; æstate, & folium usq; uergilijs uiride perdurat. Gaudet locis arenaceis atq; tenuibus: cultis haud quicquam exire dicitur, cum apud oppida, & loca plana proueniat, non laserpitij modo apud montuosa: hoc igitur minus uere putarunt. Tribulus uero peculiare fortitur, quod fructu aculeigero constat. Eius duo genera sunt: unus enim folio ciceris exit, alter spinosus, foliatus constat: ambo terreni, atq; multifidi sunt: serius germinat, qui spinosus folijs est, & apud septa uillarū is solet erumpere. Semen præcoquis, sesamæ uicinum: serotini rotūdum, nigricans, septum in siliqua. Atq; ea quidem, quæ folio quasi orbantur, spinamq; gerunt, hisce ferè constare animaduertimus. Ononis ramis aculeigerum est, anno tantū perdurans: folio rutæ similis, sed per totum appositum caulem, ut ueluti coronam ex interuallis tota species repræsentat: florem minutulum, & in siliqua non undiq; septum ædit. Nascitur lento, plenoq; solo, & præcipue in segetibus, atq; cultis: qua de causa agricolis inimica exit. Viuax admodū est: cum enim altam nacta tellurem fuerit, protinus sua infima pellit, & singulis annis, surculis in latus emissis, rursus anno postero deorsum uersus pellere solita est. Effodienda tota, extirpandaq; penitus est, quod solo madefacto agendum: sic enim facilius interit: nam si uel paruulum relinquatur, ex hoc assurgere iterum potest. Incipit germinare æstate, perficitur autumno. Ergo syluestre genus suffruticum intelligere ex his licet.

De suffruticibus urbanis, & coronarijs: de uiola nigra, & rosis, & earum differentijs.

Deq; lilio, narcisso, croco.

## Caput VI



**V**rbana uero angustam quādam obseruationem obtinere, siquidem numero tantū consummentur coronariorum. Quamobrē in uniuersum de coronis indicare tentandum est, ut genus amplecti totū possimus. Enim uero ratio coronariæ naturæ ordinem quandam sortitur propriū, sed ita ut partim suffruticibus sit, partim herbaceis permixta: quapropter comprehendere illa quoq; debemus, mentionem utiq; faciendo, quoad opportune fieri possit, sumpto à suffruticibus initio. Diuidi autem hæc bifariam exiunt, ratione scilicet usus: aliorum enim flores tantū u sui sunt, & eorum alius odo-

ratus, ut uiola: alius sine odore, ut Iouis flos, flamma. Aliorum etiā rami, folia, & in-  
 totum uniuersa natura odorata sentiuntur, ut serpylli, helenij, sisymbrij, & aliorū quo-  
 rundam: sed utrunq; genus annumerandum suis utricibus constat: necnon & illo-  
 rum florigerorum natura magna ex parte suffruticea est, alia annua tantū, alia diu-  
 turnior, uiola nigra excepta. Hæc enim ramulis caret, sed ab radice foliata cōstat, &  
 perpetuō uiuet: utiq; aliqui ferūt, etiā florem semper promere potest, si modo quo-  
 dam colatur. Id igitur propriū ista fortiantur. Reliquorum autē uel potius omnium  
 totæ quidem formæ ferē omnes perspicuæ sunt: quamobrem si quas alias habeant  
 proprietates, hæc exponamus, oportet. Quippe alia simplici specie constare, alia  
 differentijs uariari uidemus. Simplicia quæ lignosa, ut serpyllum, sisymbrium, he-  
 lenium: præterq; si alia syluestria, alia urbana, & alia odorata, alia minus odorata exis-  
 tiant, quorum quidem & cultura, & terra diuersa est, atq; etiam cœlum diuersum,  
 Quidam uero ex floribus nulla parte discerni possunt, ceu uiolæ nigra: hæc nanq;  
 differentiam nullam habere uidetur, quanquam albæ nimirum habeant: colorem  
 enim earum uariari liquidō patet, atq; etiam magis liliorum: siquidem (ut aiunt) ne  
 purpurea quidem lilia desint. Rosarum autē differentia permulta, foliorum mul-  
 titudine, paucitate, asperitate, leuitate, colore, odore. Quippe cum plurimis quina  
 folia sunt, quibusdam duodena, uicenaq; alijs longē plura: sunt enim quas centifo-  
 lias uocant quæ circa Philippos plurimæ exeunt, easq; incolæ ex Pangæo transferen-  
 tes ferunt: illic enim multæ eiusmodi fiunt. Sed folia interna parua admodum sunt,  
 ita etenim oriuntur, ut alia intus, alia extrā emicent, non tamen iucundi odoris, nec  
 amplæ magnitudinis sunt: odoratiores inter amplas, quibus pars ima scabra. Ad  
 summam (ut dictum est) & odoris, & coloris præstantia, locorum ratione contingit:  
 nam & quæ in eadem tellure proueniūt, diuersitatem bonæ, exilis uel olentiæ, nul-  
 lam ostendunt. Odoratissimæ, quæ apud Cyrenam gignūtur, & proinde unguen-  
 tum iucundissimū illic faciūt. In plenum uero, & uiolarum, & reliquorum florum  
 odores ibidem sinceri præcipue sentiūtur. Nascitur rosa etiā ex semine, quod flori  
 subditum suo in malo contentū cneceum, uel acanaceum lanugine quadam obdu-  
 ctum gerit, ut primis seminibus proximum sit. Cæterum quoniam tarde perficitur  
 semine, fata caule cōciso (ut dictum est) ferūt. Vtā, recisæ uel florem melius profert:  
 relicta nanque excrescit, syluestitq;. Sæpius transferre eam satius est: sic enim pul-  
 chriorem effundit rosam affirmant. Syluestres, asperiores tum uirgis, tum folijs con-  
 stant, & florem minus odoratum, minusq; coloratum, nec tantundem magnitudi-  
 ne ferunt. Viola nigra distat ab alba tum aliorum quorundam, tum plantæ ratione  
 ipsius, quod latifolia, humilifolia, carnifolia extet, & radice multa cohæreat. Lilia co-  
 loribus prædicta differentia inter se distant: unicaulia in uniuersum ferē assurgunt,  
 bicaulia raro: quod cœli, terræq; rationi fortassis attribuendum est. Singulis caulibus  
 aliās unum lilium, aliās plura exeunt: pars enim postrema effundit: sed hæc rariora.  
 radice copiosa, carnosā, orbiculataq; adhæret: fructus detractus germinat, & lilium  
 reddit, uerum minus: facit & lachryma cæcum quoddam confluuium, quod etiam  
 ferunt, ut dictum est. Narcissus, uel lirinum (alijs enim hoc, alijs illo nomine uocant) fo-  
 lium albu cuius terræ proximum gerit, sed longē latius, modo lilij: habet caulem sine fo-  
 lio herbaceum, florem suo ferentem cacumine, in membrana ueluti uasculo inclu-  
 sum, large amplum, coloreq; nigrum, figura oblongum: hic decidens sponte ger-  
 minat: cæterum & qui legūt defigere eum solent. Quin & radicem ferunt, quæ car-  
 nosa, rotunda, amplaq; constat. Serotinus admodum: post arcturum enim & circa  
 æquinoctium floret. Crocum natura herbaceum modo prædictorum erumpit, sed  
 folio angusto ferē, nanq; in capillamenti modum foliatur: serō floret, seroq; germi-  
 nat, aut præmature, utro scilicet modo tēpus acceperis: floret quippe uergiliarum  
 occasu,

occafus, paucisq; diebus, confestim uero cum folio florem quoq; expellit, quinimò prius. Radix multa, carnosa, in totumq; uiuax: gaudet calcari, & melius ita euadit, radice attrita pede inferius, ideo iuxta semitas, fontesq; pulcherrimum exit: satis ra-  
dice fieri affolet. Hæc in hunc modum proueniunt. Reliqui autem omnes prædicti flores semine exeunt, ut uiola, Iouis flos, iphyum, flammula, elium: nam & ipsa, & eorum radices ligno nimirum constant.

*De cenantha, abrotono, sampfuo, serpyllo, sisymbrio: tum qui flores uerni, qui æstiu, qui autumnales: et de uiola, ac rose uita: tum de myrto ægyptia miri odoris.* Caput VII



**E**nantha quoq; semine obserēda est, nec enim hæc excludi à floribus debet. Ergo quæ dicata floribus sunt, hisce atq; similibus penè accipi debent, reliqua & florem & semen omnia ferunt: quanq̃ non omnia ferre putantur, quod fructus quorundam haudquaq; manifestus existat. Nam & flos nonnullorum incertior est. Quinetiam quod: entius, difficiliusq; seminata perficiuntur. Planta propterea uti potius cōsueuerunt, quod uel inter initia proposuimus. Quanquam sunt qui ea omnino fructu carere assēuerent. Sæpe enim exiccata, tritaq; seruissē se inquit, sed nūquam germen erupissē, nec serpylli, nec helenij, nec sisymbrij, nec mentæ: nam huius quoq; periculum se fecissē affirmat: attamen illud uerius est. Neq; defunt qui uel hæc experti fuerūt, & natura ipsa syluestrium planē attestari uidetur: serpylli etenim syluestre etiam genus est, quod deferēs ex montibus ferunt, ut apud Sycionem fieri solet, atq; etiam Athenis ex monte Hymetto: apud alios uero, ut in Thracia, mōtes & plana omnia serpyllo scatent. Sed sisymbrio, reliquisq; odor acrior est. Serpyllus apud nonnullos etiam thymum penitus redolet. Cōstat ergo quod omnia sui ortus primordium ex semine capiūt. Sed abrotonū radice, aut auulsione potius quā semine germinat, semine enim difficulter exit, & hoc testis antea uiuicadicis causa intīmato, quemadmodum Adonidis hortulos emoliuntur. Seritur æstate: friget enim uehementissime atq; in totum morbo obnoxium est, etiam ubi sol uehementer illucet. Sed cum conualuerit, creueritq; magnum, robustum, atq; arboraceum cōstat, quemadmodum ruta, nisi quod hoc lignosius, & siccus, & squallidus est. Sanfucum utroq; modo emigrat, uidelicet & semine, & auulsione: præstat feminis copia, & iucundi odoris semen est, & quidem mollioris odoris: necnon & planta eius trāsferri potest. Abrotonum quoq; semine abundat, nec sine odore est, sed id radices rectas, altasq; agit: est ueluti unistrips, crassa scilicet illa radice: reliquis uero de ea exetibus spargitur, quod non sanfucum, nec serpyllo, nec sisymbrio, nec helenio datum est: hæc enim in summo terræ adhærēt, radice multifida torridaq;. Radices omnes lignosæ sunt, sed longe magis abrotoni, magnitudinis, siccitatisq; causa. Serpyllo peculiaris auctio germinum: quippe cum in quantum uis longitudinis procedere ualeat, nascū scilicet adminiculū, aut iuxta sepes aliquas sarum: crescit præcipue in puteis. Genera urbana reddere nō est, ut retulimus: ferocia esse affirmant: hunc enim in montibus tum saturiatum quendā atq; uehementissimum, tum gratum odore, mollioremq; comperiri. Tempus ferendi plurimum autumnus: hoc enim primum serere nimium properāt. Caterum & Vere nonnulla ferūtur. Omnia autē umbram, aquam, simumq; unice amant. Serpyllum squallorem patitur, atq; in totum aquæ paucae indigum est: sed simo præcipue gaudet, & iumentorum potissimum. Transferendum quoq; id sæpius censet: melius enim sic redditur. Sisymbrium uero & degenarat facile, nisi transferatur, ut dictum est. Florum prima uiola alba se ostēdit: emicat ubi cælum clemētius statim, etiam nondum hyeme exacta: ubi uero immittius, postea. Vere nonnunquam cum uiola alba, aut paulo post lilium exit, & quæ uiola

flammea uocatur, syluestris dūtaxat. Hæc cæteris omnibus, quibus coronarij utuntur, longe præcurrūt. Post hæc narcissus, & lirim exeunt. Ad hæc bulbi flos, quidam enim coronis hunc etiā inferunt. Sequitur uiti flora, & nigra uiola, & syluestribus aurelia, & genus fremij, quod limonium uocant, & pugio, & hyacinthus: & quibuscumq; ferè alijs montanis utuntur. Rosa ferior hiſce est, & nouissima quidam erumpit: prima autem inter uernos definit flores, parum enim temporis durat eius prouentus. Nam & reliqua in syluestrium genere parum durant, excepta hyacintho, tam syluestri quàm urbana: hæc enim plurimum durat. Adde uiolam albam, atq; etiam magis flammeam. Nigra (ut dictum est) per annum durat, si cultus adhibeatur. Eodem modo uiti flora: nam ea quoq; addicta floribus est, naturaq; herbacea cōstat. Si florem atteras, auferasq;, nec semineſcere ſinas, nec solum delit aprium, durare plurimum potest: flos specie constat racemi, candidusq; est, ut la-bruſcæ. Hæc igitur uerna potius eſſe uidetur. Aestiua autem, lucernula, louis flos, cerinthus, iphyum, ſanſucum, phrygium. Item quod deſyderium uocant, cuius genera duo ſunt: unum cui flos hyacintho ſimilis, alterum decolor, album, quo in ſepulchris uti mos eſt, & diurnius uero id ipſum eſt. Floret & conſecratrix æſtate, & ſanaria dicta, flos aſpectu pulcher, ſed caret odore. Lirij alterū genus, & crocum tam montanum, quod exors odoris eſt, quàm ſatiuum, autumnō florere incipiunt: ſtatim enim primis imbribus florent. Quin & ſylueſtrium genere ſpinæ acutæ fructu, & edera ciliæ flore utuntur. Temporum quidem ratione, ordinem hunc ſingulorum ortus fortiri animaduerſum eſt, ſed quoad plenius dici liceat, nullum intermittitur tempus, nec ipſa hyems flore uidua eſt. Sed hæc etiā, quanquam gelu inſœcūda apparet, ſoſculos tamen habet ſcilicet autumnalibus prorogatis. Quod ſi hybernū tempus clementius fuerit, longe magis ita continger: etenim quoad abſolute liceat loqui, maior pars florum uel ultra tempus ſibi accommodatum protrahi poteſt, & ſi loca aprica ſint, magis id euenit: ex quo fit, ut perpetua florum continuatio agatur. Tempora hæc generationum notantur. Vitæ uiolæ albæ anni maxime tres: ſeneſcens diminuitur, candidioresq; aſſidue flores fert. Roſæ quinquenium ad uigorem ſcilicet, non aduſtæ, neq; recitæ. Sed eius quoq; flores ſeneſcentis deteriores redduntur. Ad iucundam autem olentiam, & roſarum, & uiolarum, & reliquorū florum, ſolum cœlumq; ſingulis accommodatū plurimum cōfert. Nam in Aegypto cætera quidem omnia ſine odore floreſq; etiā aromata dicta ſentiuntur: myrti uero mirum in modum odorata aſſurgunt. Prouenire ante hæc noſtra, & roſas, & uiolas, & reliquos flores tractus illius, etiā binis menſibus pluſq; durare haud hoc breuiori tempore aiunt. Videtur & annus (ut diximus) ad bonā olentiam referre, cum ſcilicet talis, aut talis inceſſerit: non imbrum ſqualorumq; tantū ratione, ſed etiam quum tempus certum, & aquæ, & ſtatus, & in totum cœli commodæ mutationes acceſſere. Montibus autem (ut ſimplici tranſigam ratione) & roſæ, & uiolæ, & reliqui omnes flores, odore longe deteriores emergunt. Atque coronariorum, & in totum ſuffrutice generis commentatio, hiſce ſimilibusq; abſoluitur.

# THEOPHRASTI DE HISTORIA

## PLANTARVM LIBER SEPTIMVS.

87

De herbaceis & oleribus: treisq; esse sementes hortensium: & quid quoq; tempore seratur:  
necnon quæ serò, quæ uelociter ex oleribus emicent. Caput I



**S**EQUITVR ut de herbaceis doceamus: id enim reliquum ē  
generibus est, in quæ principio plātas omnes digessimus: quo  
in genere olera etiam, & frumenta quodammodo compre-  
hendi uidentur. At primum de oleribus indicandum, sumpto  
ab urbanis principio: sunt enim hæc syluestribus longe notio-  
ra. Sementes hortensium, quibus feri singula solent, tres certe  
notantur, una hyberna, alia æstiuæ, tertia quæ inter eas cadit,  
post hybernū solstitium: quas ita appellant, non ratione satus, sed ortus, usq;  
cuiusq;. Satus enim in contrarijs ferme consistit temporibus, quippe cum hybernū  
principium post æstiuū solstitium sit, mense Iulio, quo brassicam, radiculam, ra-  
pam, & quæ semētis postera uocant, ceu betam, lactucam, erucam, rumicem, sina-  
pi, coriannum, anethum, nasturtium serere assolent: primamq; semētem istam ap-  
pellant. Secunda post brumam Ianuario incipit mense, qua seminant, desiguntq;  
porrum, apium, gethyum, atriplicem. Tertia, quam æstiuam appellant, mense Mar-  
tio agitur, qua cucumis, cucurbita, blitum, ocimum, portulaca, satureia seruntur.  
Quin & alias plures sementes similiū singulis temporibus faciunt, ut radices, ocimi,  
& aliorum quorundam, sed omnibus sementibus, quæ postera uocitant, feri opti-  
me possunt. Omnia pari tempore nequaquam proueniunt, sed alia celerius, alia  
serius, quæ scilicet prouentu cōtumaciōra consistunt. Celerrime ocimum, blitum,  
eruca: & de hybernis radix, die namq; (ut ita loquar) tertio erumpit, lactuca quarto,  
aut quinto: cucumis, & cucurbita circa quintum, aut sexto, uel, ut alij uolunt, septi-  
mo: sed prius, celeriusq; cucumis. Portulaca serior hiñce exit. Anethum quarto. Na-  
sturtium, & sinapi, quinto. Beta æstate, sexto: hyeme, decimo. Atriplex, octauo.  
Brassica, decimo. Porrum & gethyum nō conueniunt, sed porrum decimonono,  
nonnunquam etiam uicesimo die prouenit: gethyum decimo, aut duodecimo.  
Coriannum prouentu contumax est, quippe quod si nouum sit, nasci recuset, nisi  
conuoluatur. Satureiæ, atq; origano dies plus quam triginta dātur. Omnium diffi-  
cillime apium nascitur: quadragesimo enim die affirmant, qui celerrimum eius pro-  
uentum tradidere: sed sunt, qui quinquagesimo uelint, quod etiā omnibus semen-  
tibus feri potest: quidam enim omnibus id adiungunt. Ad summam, quæ locis plu-  
ribus feri patiuntur, hæc nihilo celerius ex maiore parte proueniunt: quod mirum,  
si tempus, aer ue, nihil cōferat ad celeritatem. At si improba, frigida, cœloq; tristi cir-  
cundata sunt, serius prodeunt: nam & tempestas, serenitas ue sementi succedens,  
facit ut aliās serius, aliās maturius germinetur. Discrimen illud quoq; in sementibus  
singulis, quod locis apricis, temperatisq;, maturissime prouentus fieri solet: causas  
enim eorum (ut simplicius loquar) in pluribus consistere credendum est: exempli gra-  
tia, in seminibus ipsis, in cœlo, in tempore, quo singula fieri placuerit: adde tempe-  
states, serenitatesq;. Sed hoc amplius inspectandum, in quibus tempora differant,  
atq; in quibus cōueniant: radicem enim tertio die tam æstate quā hyeme quidam  
prouenire affirmāt. Ad hæc temporum (ut retulimus) diuersitate plurimum diffi-  
dent. Ergo tempora germinandi hæc & sunt, & singulis addicuntur. Refert ad cele-  
riorem, serio rem ue prouentum, & feminum ætas: quædam enim maturius ex re-  
centioribus exeunt, ut porrū, gethyum, cucumis, cucurbita: quamobrem nonnulli  
semen cucumeris lacte, aut aqua præmaceratū serunt, quo celerius exeat. Con-

trā quādam ex uetere celerius, ut apium, beta, nasturtium, satireia, coriannum, origanum; haud enim omnia oriri melius ē recentiori possunt, quemadmodum dictum est. Peculiare in beta inquit euenire, quod non semen omne continuo pullulat, sed longo tempore post, anno scilicet sequente, & tertio: qua de causa ex larga copia feminis exiguum prodire solere. Quodq; autem seminum si auctum in plenum deciderit, ad tempus usque suum in humo perdurat: nec prius germen ullum emittit, ut ratio est: sic enim in syluestrium genere euenire uidemus, nisi semen intereat. Perfectiones autem fructuum omnium ætate contingunt, sed prius, celeriusq; (ut simplicius agam) illa perficiuntur, quæ prius fata fuerunt. Refert enim & tempus: fata enim diebus calidis, celerius caulescunt, semenq; ocyus red-  
dunt, ut radix, ut rapa: quædam non anno tantum fructificant, uerum etiam bi-  
matu, ceu apium, porrum, gethium, quæ quidem uel plus temporis edurare  
queunt. Nec annua dici debent: maior enim eorum pars simulatque semen perfe-  
ctum sit, exarescit. Omnibus penē, quæ caule emisso fructum perficiunt, facies eo  
perficifoliet, quod ex caulibus laterales furculos adunt: exceptis quæ unicaulia  
constant, ut porrum, gethium, cepe, allium. Omnia autem aquam, simumq; cu-  
piunt: sed magis quæ infirmiora sint, curaque egeant maiore, aut etiam alimen-  
to copiosiori.

Quæ olera ē quibus nascantur: nasci uero ē semine, auulsione, ramo atq; radice. Quæ caule  
receso regerminant: quæq; radices perdurent: & quæ regerminant, & quæ non.

Caput II



Afcuntur omnia ē semine: nonnulla etiam auulsione, ramo, radiceq;. Auulsione, brassica: semper enim uel aliquid radices eius accipitur. Ger-  
mine, ruta, & origanum desiguntur, nec non & ocimum: nam id quo-  
que transferitur cum ad palmum, aut plus altitudinis uenerit, dimidio  
absciso. Radice allium feritur, & cepe, & bulbus, & arrus: & in plenum, quæ in ca-  
pitarum genere eiusmodi sint. Nasci etiam ea possunt, quorum radices plus tem-  
poris durant, quanquam annuo consent caule: sed quod omnia prouenire semi-  
ne possunt, manifestum hinc est. Ruta enim sic nascitur, quod quidam negant: ue-  
rum tarde, qua de causa furculo serere eam solent. Illorum uero, quæ radice proue-  
niunt, radix quidem diuturna est, ipsa autem annicaulia consistunt: itaque radices  
rallum suo latere germinant, pluresq; redduntur, non tantū in urbanis, atq; hortens-  
ibus, uerum etiam in syluestribus (ut dictū iam est) ceu in bulbis, gethiis, scyllis, alijsq;  
quibusdam. Quædam etiam non capitata, uerum diuturniora germinare posse cer-  
nuntur, ut apium, beta: mittunt enim radices, quibus folia, caulesq; proueniunt.  
Gethium quoque latere germinat, & porrum subtus suo latere promit, ueluti  
quoddam caput bulbaceum, ex quo foliorum ortus: caule tamen arefacto, semi-  
neq; sublato. Sed quoniam eorum capita minus usui sint, idcirco siccanda minime  
leguntur, ac proinde nunquam seruntur: sed hæc forsitan, & similia genere, &  
proxima quodam modo naturæ ceparum consistunt: quamobrem mirum est. Ve-  
runtamen & in omnibus tam urbanis, quam syluestribus, quæcunq; diuturniora,  
simulq; terræ propiora consent, horum radices regerminare facile possunt, ut uel  
in fruticum, atque suffruticum genere fieri nouimus. Verum in cepis, alijs, bul-  
bisq;, uel numero hæc quodammodo amplecti potueris. Prouentus autem (ut re-  
tulimus) trifarius est: semine, qui communis omnium est: caule, radiceq;, qui præ-  
dictis tribuitur. Caule uero reciso (ut ita loquar) omnia regerminant, exceptis quæ  
secaulia uocant. Sed euidētissima quasi & usitata, ocimum, lactuca, brassica: &  
quidem lactuæ regerminatos caules suauiores affirmant. Primos enim lactuosos  
esse

esse atque amarus, utpote minus concoctos: alij è contrario uolunt secundos scilicet lacte refertiores constare, sed dulciores sentiri, quandiu teneri sint. Verum in brassica ceteris esse suauiores caules regerminatos cōfessum habetur, si antequam excaulescat, folia detrahantur: radices plurimum certe perdurant, & aliæ regerminant, aliæ non. Radix & rapa, si terra cooperiantur, usque ad æstatem durare, & crescere possunt: quod olitorum nonnulli de industria faciunt: non enim regerminant, neque folium mittunt, nisi accumulata humum femoueas, quod uel in reliquis deprehendi facile potest. Maxima olerum pars unistirps, ea scilicet radice, quæ agit in profundum. Etenim quæ illas æque crassas latere suo mittunt, ut apium, betacq; de media quodammodo spargunt: nec à principio continuo findunt, sed ad ipsam unicam stirpem fissiōem eiusdem illius lateralisq; agunt. Et eas quidem manifestas ex usu reddi affirmāt. Betis autem radix unica, sed longa, crassa, rectaq; sicut raphano: crassas hæc laterales gerit, & aliās binas, aliās ternas, aliās etiā unam, quibus exortæ fibræ coherent, & alligant. Carnosa radix hæc est, & gustatu suauis, quamobrem crudam nonnulli mandunt: cortex non crassus, neque extricabilis est modo raphani, sed potius equapio proximam dixeris. Eodem modo & atriplicis radix una akte descendens, aliæ uero ex ea se depromunt. Omnium maxime unistirpem rumicem esse putaueris: laterales enim crassas nullas penitus agit, sed tantum prætenues: nititur altissima omnium radice, maiore nanque semipedibus ternis: syluestris breuiorem agit, multicaulis atque ramosus consistit, & tota forma, cum perfecta est, betæ proxima sanè cernitur. Diuturnitate quoq; syluestrem, & in totum (ut ita loquar) omnia olera uincit. Perdurat quantumuis temporis, ut aiunt: carne plena, atq; humecta consistit: qua de causa effossa diu uiuere potest. Ocimo quoq; radix unica data est, quæ crassa esset, alteq; descenderet. Cæteræ uero, quæ de latere prætenues orientur, admodum proluxæ adherent. Quædam singulari illa in rectum tendente carent, ut blitum. Sed continuo ab extrema multas crassas proluxiores, quàm atriplex agunt.

*Quibus lignosæ, & quibus carnosæ, & quibus breues radices: deq; diuersis seminum figuris, & eorum differentijs: item quæ feraciora semina.*

Caput III



Mnium radicum lignosissima ocimo data est, sicuti etiam caulis: bliti enim atque atriplicis minus lignosæ. Ut enim in plenum loquar, aliæ carnosæ, aliæ lignosæ: carnosæ, ut betæ, apij, equapij, rumicis, raphani, & omnium maxime capitatorum: istæ nanque ne siccatae quidem omnino durescunt: lignosæ, ocimi, bliti, atriplicis, erucæ, anethi, rumicis, corianni, atq; in summam omnium multicaulium: habet enim & anethum, & coriannum, quæ unistirpia sunt, radicem lignosam, & non prolixam, neq; fibris multis subnixam. Ambo multis caulibus, multisq; ramis consistunt: quapropter nulli pars eorum superior, pro ratione inferioris extat. Breui radice illa constare notantur, lactuca, portulaca: breui in quantum ea recta, quæ deorsum mittenda est, tum ipsæ quæ in latius porrigi solent. Lactuca ea ipsa multiplici radice quasi omnino caret, sed fibris tantum coheret, quamobrem unistirpem hanc (ut ita dixerim) maxime omnium esse putaueris. Ad summam, omnia æstiuæ breuem radicem sortiuntur: etenim pepo, cucurbita, cucumis ita se habent, tum propter tempus, tum & forsitan magis ratione naturæ, quæ tempus secuta est. Lactuca translata radice est breuioris, quàm sata: illa enim ex lateribus magis mittit. Breuior etiam syluestris, quàm urbana, & superne multicaulior est: quodq; ex cæterorum numero florem uniuersum citare utiq; constat: ocimum uero particulatim primum inferius, deinde



cum ea defloruerit parte, florere superius incipit. Vnde fit, ut diutius istud floreat, quemadmodum faba, & inter herbas quæ solaris nominata est, & quædam de syluestribus alia. Floret etiam cucumer eum in modum, qui pepo cognominatus est: etenim huic præpostero germinet, sanè accidit. Flores alijs candidi, alijs lutei, alijs ad purpuram leuiter accedentes, rubri nullis emergunt. Semina figuris etiam inter se distant: etenim maiore quidem ex parte rotunda sunt. Sed non defunt oblonga, neq; lata, neque foliata, ut atriplicis: hæc enim similia, atq; in laserpitio consistunt. Adde quædam angusta & canaliculata, ut cumino. Color quoque differentiam facit: sunt enim alia nigra, alia candida, alia ligno proxima. Publica differentia, quod alia inclusa siliqua constant, alia nuda adhærent: ut quod alia cortice, alia pappo lanugine obducuntur: radici nanque, & sinapi, & rapo, semen in siliqua: corianno, foeniculo, anetho, cuminoq; nudum adhæret: blero, betæ, atriplici, ocimoq; cortice continetur: lactuca lanugine obducitur. Omnia feminis, germinisq; large fecundata: sed fecundissimū omnium cuminum est. Peculiare etiam quod de hoc dicunt: imprecari nanq; & maledicere serendo oportere affirmāt, quò lætius, copiosiusq; proueniat. Difficile (ut ita loquar) omnia exiccantur, cumino excepto: nec modo frumenti consistunt, quod cum primum in plenum creuerit, mox exiccatur & decidit: sed quæ cortice continentur, difficilius exiccantur, & inter ea maxime ocimum. Omnia siccata fecundiora redduntur: qua de causa detracta antea exiccare consueuerunt. Omnia feracia, largeq; fecunda consistunt: sed fecundissimum ocimum, porrum, & cepæ sunt, quæ latere potius apta sint fructum parere, ut radix, rapa, & reliqua generis eiusdem: quædam parte utraq; ferunt, ut blitum, atriplex, hæc enim fructificare, uel ex suo latere possunt: sicq; copiosius, protinus enim nodis singulis semen incidēs racematim nimirum gerunt. Quæ feminibus uetustioribus sata sint, celerius excaulescunt. Celerrime uero quæ uigentibus: est enim uel eorum uigor quidam, quo prouenire, cōsummariq; optime possunt. Pulchritudo quoq; ad portionem sequitur: quin & si acruatim serantur, melius quæda nasci, augeriq; posse uidentur: sic enim porrum, & apium serunt in lacinijs colligatum, atq; ita ampliora redduntur. Locus quoq; ad incrementum aliquid conferre uidetur: quamobrem cum apium transfertur, palum tantū adigere, quantum apium facere uolueris, iubeant: necnon & semen eius colligatum in lacinijs palo adactō, & fimo, terraq; ingesta serendum censent. Quædam etiam figuram subditi loci imitātur: cucumis enim formam accipit loci, in quo sata fuerit. Quin & saporum differentiam quædam semina capiūt præparata, ut cucumeris, si lacte maceratum seratur: sed hæc fortè cultui accommodari potius debent.

*Quæ olera plura genera habeant, quæ pauciora, ut radix, id est raphanus, rapa, brassica, betæ, cucumis, cucurbita, cuminum, lactuca, apium, cepa, ascalonia, gethyum, allium.*

Caput IIII



Enera autem alijs plura, alijs minime. Plura ut ocimi, rumicis, bliti, nasturtij, erucæ, atriplicis, corianni, anethi, rutæ: his enim diuersitatem generis deesse omnino uolunt. Quædam è contrario pluribus constant generibus, ut radix, brassica, betæ, cucumis, cucurbita, cuminum, allium, lactuca. Diuidunt hæc folijs, radicibus, coloribus, saporibus, reliquisq; eiusmodi. Vt radicis genera corinthium, cleonæum, liothalassium, boeotium. Amplissime corinthia adolefcit, quæ uel stirpe constat detecta: hæc enim sursum uersus protruditur, nō ut cætera in terram ampliari solita est. Liothalassia, quam thraciam uocāt, ualidissima aduersus frigora traditur. Boeotia dulcissima est, & figura rotunda, nec ut cleonæa, prælonga. Quibus folia leuia, dulciores, suauioresq; sunt: quibus autē scabra, acriores. Genus præterea redditur, quod folijs eru-

eæ simile constet. Radicis genera hæc notauerūt. Rapæ aliq̃ esse, aliq̃ nō esse diuersita-  
 tem generis putant, sed mare tantum, fœminaq̃ differre, nasciq̃ ambas ex eodem  
 semine: sed ut effoeminentur, raras deponere oportere: nam si densæ positæ sunt,  
 omnes mascullescere aiunt. Quod idem futurū etiā si in terra uitiosa seueris, qua de  
 causa semine satas plantatim transferentes deponunt. Semen quoq̃ deterius, me-  
 lius uē uisū percipi potest: quod enim probū sit, tenue senties: quod uitiosum, cras-  
 sum. Gaudet frigoribus & rapa, & radix: & sic eas dulcescere putant, simulq̃ incre-  
 mentum in radicem, non in folia uerti. Austrinis atq̃ serenis temporibus celeriter  
 caulescunt. Hoc igitur rationē sanē exigit, quatenus in ambobus differētiæ similitu-  
 10 dimis consistit. Brassicæ autē trifariam datur digestio: aliā enim crispam, aliā leuem,  
 aliam syluestrem notarunt. Syluestri foliū leue, sed paruum atq̃ rotūdum, & ramis  
 folijsq̃ permultis condita est: ad hæc succum asperum, & instar medicamēti habet,  
 quamobrem eo medici ad aluum purgandā sæpe utūtur. Quin & illud differētiā  
 facit: genus enim quoddā earum est, quod nullum aut prauum semen producat. In  
 rotum crispā succi bonitate & folij amplitudine, leui præstātor est. Inter betas uero  
 candida, sapore nigra præstantior, pauciorumq̃ seminū est, quam siculam quidā ap-  
 pellarunt. Pari modo in genere lactucarum, cādida dulcior atq̃ tenerior: cuius tria  
 genera addūt, laticaulē, rotūdicaulē, & laconicum: huic foliū carduo simile, & recta,  
 20 ampla, & à caule minime brachiata hæc est. Inter latas adeo quādā laticaulēs fiunt,  
 ut pro ualuis hortorū hisce nonnulli utātur: quæ uero lactis admodū copiosa, & folio  
 pusillo, & caule candidiori consistit, syluestri similis est. Apiorū cum in folijs, tum in  
 caulibus discrimen utiq̃ constat: aliud enim folio spisso, crispo, dēfoq̃: aliud rarior,  
 latiorq̃, cauleq̃ maiori. Horum iterū aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut uer-  
 30 ficoloris: uerū ad summam, eiusmodi omne syluestri proximū est. Cucumeris atq̃  
 cucurbitæ partim genera esse existimāt, partim negant, quemadmodū & in radicis  
 ac rapæ generibus, sed in uno eodemq̃ genere alias meliores, alias esse deteriores  
 affirmant. Cucumeris genera tria notant, laconicum, scytalium, bœotium: ex his la-  
 conicum melius rigatū euadit, reliqua nō rigata præstātiora sunt. Differūt & cepæ,  
 & allia genere: sed ceparū genera plura, ut quæ à locis nomina accepēre, gardiæ,  
 40 cnidiæ, famothraciæ: item setanica, & fissiles, & ascaloniæ. Ex his setanica minimæ,  
 sed largæ, dulces: fissiles uero & ascaloniæ, tum cultu, tum natura inter se differūt: fissi-  
 lem etenim hyeme sua cum coma inertē relinquūt, Vere externa folia detrahūt, &  
 reliqua colūt: detractis his folijs, altero germināt, simulq̃ inferius finditur: unde fissi-  
 les appellatæ sunt. Quidam uel omnibus detrahēda folia censent, ut uim suā imo-  
 contineant, neq̃ effusa seminefcāt. Ascaloniarum peculiaris quādā natura notata  
 est: etenim foliæ fissiles, & quasi steriles ab radice consistunt, nec ea parte crescere, ac  
 proficere possunt: quamobrem non eas deponunt, sed semine ferunt: cum deinde  
 germinatum sit, transferunt. Perficiuntur adeo celeriter, ut cum cæteris, aut etiā  
 prius euelli possint. Plus temporis dimissæ in terra, putrescunt. Plantatæ caulem  
 40 ædunt, semenq̃ tantummodo fundunt: tum exinaniuntur atque inarescunt. Ha-  
 rum igitur talis natura est. Differunt & colore nonnullæ: etenim apud lsum cætera  
 quidem candidis similes constant, sed colore candidæ admodum proueniunt, sar-  
 dianisq̃ similiter ferē affirmant. Cretensium peculiaris maxime natura notatur, sed  
 ascalonijs quodammodo proxima, ni fortē uel eadem dici debeat: est enim in Cre-  
 ta genus quoddam, quod semine quidem satum in radice crassatur: depositum ue-  
 ro in caulem, semenq̃ totum funditur: sine capite, saporeq̃ dulce est: id enim qua-  
 si ē contrario cæteris habet: omnes nanque depositæ melius, celeriusq̃ perficiun-  
 tur. Omnes post arcturum proueniunt, tepido adhuc solo, ut depositas imbres  
 occupent. Seruntur & toto capite, & circunciso, sed germinationes haud similes

fieri solent: parte nanque inferiore cepæ nascuntur, superiore herba tantum erumpit: sectæ in rectum germinare omnino nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, & quasi longa ceruice cõsistens, ob id germinatio tota in fronde: sæpiusq; retondetur, ut porrum, qua de causa semine feritur id nec deponitur. Cepas huicere ferè differentijs discernere licet. Allium ante solstitia, aut paulò post solstitia feritur nucleatim diuisum. Discrimen eorum, quod aliud præcox, aliud ferotinum: est enim genus quoddam eiusmodi, ut sexaginta diebus perfici possit. Differunt præterea magnitudine singulæ: Cyprium uocatum maxime tale est, quod nõ decoquunt, sed in myrtotis utuntur: & cum runditur, mirum quàm spuma increscar. Quid & illud differetiam facit, quod quædam non nucleis coagmentatur. Dulcedo autem, 10 & odor, & crassitudo, eorumq; causa, tempore cultuq; penè uidentur contingere, ut etiam aliorum. Perfici etiã semine potest, sed tarde: primo etenim anno caput accipit porri, sequente discerni in nucleos incipit, tertio redditur perfectum: nec quicquam deterius, sed etiam quidam uel deposito melius id existimant. Radicis autem allij, aut cepæ, haud similis ortus fieri solet: allij nanq; cum nucleus extumuerit, tota intorquetur: & hinc aucta in nucleos rursus discernitur, atq; ex uno plura efficiuntur, dum caput consummatur. At cepe continuo ab radice aliud atq; aliud obducit, ut & bulbus, & scylla, & eiusmodi omnia. Etenim allia & cepæ, si nõ euellantur, plura indies fiunt. Super fistula quoque, & allium capitari posse, & cepe affirmant, Satis de generibus dictum est.

*Quæ qua cura, culturaq; gaudeant. Quæ aquæ oleribus prosint, & quæ obsint.*

*Translatione olera meliorescere. Quæ bestiolæ oleribus innascuntur.*

Caput V



Quas, fimumq; omnia olera sanè diligunt, ruta excepta, hæc enim simi aspermatrice penitus est: sed hyberna magis quàm æstiuæ desident, & imbecillia magis, quàm ualida. Fimum stipularium maxime laudant: iumentorum uitiosum putant, quoniam maxime inarescat: fimum unã cum satu intermistum potissimum disponunt. Quidam etiam inter ferendum superiaciunt: quin & stercore humano inconcocto ad succum probe conficiendum utuntur. Hyberna aquæ cupidiore sunt, quàm æstiuæ: 30 & infirma, quàm ualida: item quæ alimento plurimo egeat. Diligit aquam & cepe & gethyum: quanquam nonnulli negant, si principio bis, aut ter imber incescit. Aquarum optima, quæ dulces, & frigida sunt: pessima, quæ salsa, & rarefactu difficiles notantur: ob id, quæ ductu feruntur, peritiles: herbarum enim semina inuehunt: sed omnium optima, quas Iupiter dedit: his enim uel animalia noxia interim creditur. Sed non defunt, qui cucumeribus & cepis eas prodesse minime putent. Riganur cætera quidem hora matutina, aut ad uesperam, ne aqua feruens sole officiat. Ocimo etiam meridie aqua datur, germinare nanque celerius id existimant, si inter initia feruenti aqua rigeretur. Aqua admodum multa cõferre creditur, præsertim si finus non adsit: sæpe enim olera esurire dicuntur, idq; olitores perit: 40 tos haud difficile posse intelligere. Omnia translata, meliora, grandioraq; fiunt: porrorum enim radicumq; magnitudo ex translatione. Potissimum autem transferunt ad & cætera quidem tolerant, ceu gethyum, porrum, brassica, cucumis, apium, rapa, lactuca. Omnia auctu faciliora, grandioraq; ueniunt seminibus depositis, quàm fuissem fatis. Bestiolæ innascuntur radicibus, pulices: brassicæ, erucæ atque uermiculi: & lactucis, porris, alijsq; pluribus porricidæ appellata. Has igitur humor collectus interimit, & finus acruatim infectus: industria enim bestiola condens sese, ut in stramento quiescit in stercore. Quamobrem uenari facile est, aliter nulla uenandi datur facultas. Radicibus contra pulices ne nocent

ceant remedium, interserere eruum: sed ne nascantur, nullum medicamen com-  
pertum referunt. Ocimum sub canis ortum pallefcit, coriannum falefcit. Ergo quæ  
accidere solent, ex his liceat cogitare.

*Quæ firmiora semina, quæ imbecilliora. Item de aruensibus, syluestribusq; ut rumice,  
brassica, rapa, lactuca, equapio, paludapio, montapio, cucumere.*

Caput VI



Eminum alia firmiora ad perdurandum constant, alia infirmiora: fir-  
miora, coriannum, beta, porrū, nasturtium, sinapi, eruca, satureia, ad  
summam omnia ferè acris saporis: infirmiora uero gethyum, id enim  
durare nequit, atriplex ocimum, cucurbita, cucumis: in plenū æstiu-  
magis, quàm hyberna: sed inter ea quæ fortissima consent, nullum  
ultra quadrimatium durare potest, ita scilicet ut ad sementem adhuc utile sit. Sed bi-  
ma sanè meliora, trima nihil ferè deteriora, quadrima iam deteriora: uerū ad usum  
cibarium diutius permanēt: quanquam inualidius alant necesse est, ut quæ partim  
respirarint, partim læsa à bestiolis sint. Interitus maxime ex bestiolis fieri solet: na-  
scuntur enim in omnibus etiā acribus atque acerbis: cæterum uel humore exhau-  
sio amara redduntur, & ideo ad usum deteriora. De seminibus, & ad summam de  
hortensibus sit satis dictum. Nunc de syluestribus & ijs quæ aruensia nūcupamus,  
pariter indicare tentandum est. Sunt igitur quædam nomine supradictorum uo-  
cata: genera enim illa syluestria quoq; omnia esse cernūtur, & maior ferè pars aspe-  
ctu uicina urbanis est, præterquam quod folijs ista minoribus, caulibusq; scabrio-  
ribus constant, & succo potissimum acriori, uehementiori; conduntur, ut satureia,  
origanum, brassica, ruta: nam & rumex syluestris est, & quāquam gustatu gratio-  
r, quàm urbana, tamen succu acutior, quo præcipue differant. Omnia autem uel sic-  
ciora urbanis sentiuntur, & fortè ob id ipsum magna ex parte acriora, uehemen-  
tiora; sunt. Brassica præter alia modo peculiari caules sortitur, rotundiores enim  
leuiioresq; gerit, quàm satiuæ: & foliorum appendicem illa latum, hæc habet rotun-  
diorem, & folium ipsum minus angulatum: nam cætera quidem scabrior tum cau-  
libus, tum folijs cōstat. Rapa uel radice longa, & modo raphani, breuiq; caule con-  
sistit. Lactuca folio breuior, quàm satiuæ est, idq; cōsummatum aculeatur, & caule  
simili modo breuiori perficitur: succum acrem, ac medicatum habet. Nascitur inter  
arua, liquatur per messem tritici, & purgare aquā intercutem dicitur, & caliginem  
arcere ab oculis, & argemam auferre, cum lacte mulieris. Equapium, paludapium,  
montapium, tam inter se distant, quàm ab urbano plurimum differunt. Paludapi-  
um enim, quod apud aquæductus, & in paludibus prouenit, folio raro, nec hirsu-  
to consistit, sed simile quodammodo apio est, odore, sapore, figuraq;. Equapium fo-  
lijs uicinum paludapio est, sed hirsutum, & grandicaule cōstat, & radicem crassam  
modo raphani agit, sed nigram: fructum quoque nigrum producit, magnitudine  
eruo ampliorem: ambo utilia referunt ad urinæ difficultates ex uino dulci albo, &  
ad pellendos calculos. Nascitur omnibus locis, & lachryma ex eo myrrhæ similis  
defluit. Quidam in totum myrrham id esse affirmāt. Montapium maioribus etiā  
differentijs distat: folio nanque cicutæ simile constat: radice tenui, caule anethi: mi-  
nutori tamen datur in uino austero gratia menstruorum. Quædam cum supradic-  
tis nullatenus succo, aut uiribus conueniunt: ut cucumis syluestris urbano peni-  
tus incomparabilis est, sed aspectus tantū similitudinem gerit: quemadmodum in  
coronarijs uiolæ accidit, folium enim habet consimile. Florum igitur differentias  
ex prædictis hisce accipies.

De arvensum differentijs, quodq; ea uocentur olera, quæ nobis usui sint cibario, ut sunt intubum, aphaca, andryala, porcellia, senecio, & intubacea omnia: item pes gallinaceus, entusicum, mentastrum, hircibarbulum, corchorus.

Caput VII



Ruensium aut appellatorum post hæc discrimina, atq; in totū cuiusq; herbacei minus cibo idonei generis, exponemus. Olera enim uocamus, quæ nobis usui cibario sint, quæ quidē in summa uniuersorum contineantur necesse est: quamobrem nec ea dimittamus, oportet. Ergo olera appellantur, intubum, aphaca, andryala, porcellia, senecio, atq; in totū quæcūq; intubacea constant, propter foliorū similitudinem: eiusmodi enim omnia folijs intubo quodāmodo proximis conduntur: item pes gallinaceus, entusicum, mentastrum. Quidam uel alia innumerabilia nomināt, inter quæ illud, quod hircibarbulum uocant, cui radix longa, & dulcis: folia croco similia, nisi quod longiora: caulis breuis, super quem calyx amplius, & barba de summo uertice canapendēs proluxa, unde nomen accepit. Pari modo & alia specie quidē eiusmodi constant, succis uero cibo idonea, uel cruda, uel cocta oriuntur: quædā enim coqui exi-  
gūt, ut malua, beta, rumex, urtica, muraleum, uescicaria, quæ cruda etiā manditur, & alia plura: inter quæ & corchorus, qui ob amaritudinē in proverbio est: folium eius ocimum sanē æmulatur. Ex cunctis autē alia annua, alia annicaulia extant: nec defunt, quæ radice diutius durēt, quanq̃ ipsa arescāt. Quinimō eiusmodi haud pauciora ferē adnotantur. Nascuntur alia radice, & semine: alia semine tantū, nisi quod  
sponte etiam proueniant.

Germinatio quibus temporibus in oleribus, arvensibus uel fieri soleat: deq; florum differentia, & quæ differentie in caulibus publicæ.

Caput VIII



Erminatio uero tam eorum q̃ reliquorū, partim cū primis imbribus post æq̃nociū fieri solet, ut aphacæ, canariæ, & eius quam buprestim quidam appellant: partim post uergiliās, ut intubi, & omniū ferē intubaceorū: & alia cū germine florē adunt, ut aphia: alia nō longe post, ut fremium. Quædā ineunte Vere, tam caulem, q̃ florem emittunt, ut intubum, & omnia intubacei generis: & ē spinosis, quæcūq; generi olerū attribui debeāt. Florum autē differentia magna, de qua primo uolumine retulimus: communis ferē omniū constat: sed nō defunt, quæ flore penitus careāt, ut epimetrum. Euenit uero, ut quæ unā cum fructu florem dimittūt, celeriter deflorescant: cum tamen primus senuerit, alius atq; alius subnascitur, idq; per totā hyemem, uerq; assidue usq; æstatē facitatur. Senecio quoq; diutius floret, quanq̃ reliqua minus, ut & crocum tam odoratū q̃ candidū, & spinosum, quæ carēt odore. Omnium autē herbarum discrimen publicū, quod alia recticaules, & neruicaules sunt: alia annicaules, ut malua, scandix, cucumis syluestris, solaris, quæ porro tali natura est: nam inter omnes (ut ita loquar) magisq; tali natura est ut inter spinosas tribulus, atq; inturis, & alia plura: nā illorū etiā differentia numerosior est. Quædā uero amplexicaulia planē exeūt: sed si nō habeant, quibus accumbāt, humi serpunt, & humicaulia dici possunt, ceu petina & lappa, & summatim quibus caulis gracilis, mollis, prælongusq;. Qua de causa semper ferē sup̃ alijs hæc proueniūt: quæ quidē differentia publica est omniū, nō tantū herbarū atq; suffruticū, uerum etiā fruticū: clauicula enim atq; etiā magis edera cilicia amplexicaulis cōstat. Item herbaceorum alia multis caulibus, alia uno tantū condunt: & unicaulū ipsorū alijs germine caulibus brachiatur, alijs ē diuerso: sicut etiā inter satiuā, radix, & alia quædā. Multis caulibus cōstāt (ut summatim dixerim) quæ humicaulia exeunt: Vnicaulia uero & paucicaulia, quæ recticaulia sunt. Ex his caule minime brachiato illa creant, quæ leuicaulia sunt, ut cepe, porrū, allium: quemadmodū etiā inter satiuā animaduertere licet.

Differen

*Differentia herbarum in positi locoq; foliorum, necnon fertilitate, sterilitateq; tum quæ differentia foliorum maxima, quidq; inter herbarū, arborumq; flores intersit, atq; de syluestrium herbarum, olerumue radicibus, & quid distent inter se.*

## Caput IX



Differentia illa quoq; herbaceis datur, quod alia ab radice tantū foliata, alia in caule tantum foliata, alia utrinq; foliata. Ab radice tantū foliata silago, nigella, anchusa, herba, fremium, frondiflora, apargia, planarago, fraus. In caule tantum foliata, crepis, nigella, foliosa, lotus, uiola alba. Vtrinq; foliata, intubum, siue ampulla: id enim in caulibus, cum ramulorum prouentu unā flosculus quoq; quidam emergit: & ex spinosis foliatis nonnulla, ceu soncus. Sunt etiam alia frugifera, alia sterilia: atque in totum ex herbaceis alia usq; folia tantum ueniunt, alia & caulem, & florem ædunt, sed fructum nullum: quædam etiam fructum pariunt, ueluti naturæ perfectissimæ munus: nihil fortè & sine flore frugiferum aliquid sit, sicuti in arborum genere. Quinetiam folia eorum non paucioribus, sed pluribus ferè differentijs, quàm arborum, inter se distant, nec differentijs carent, quibus planè ab illis possint secerni: sed maximam ferè fortiuntur, quod pediculo illa dependet, hæc autem (quoad absolute liceat loqui) se ipsis adherent. Verum non desunt, quæ cauliculaceo quodam appendice annexantur. Sunt quibus antè quàm folia, protrudi caulis soleat: maximæ tamen parti folia prærupunt, amplissimaq; penè inter initia fiunt, & maxime ad cibum idonea.

Arboribus uero omnibus cauliculus quidam antè propellitur, frons deinde emergit. Differunt etiam floribus plurimum, quippe cum in arboribus pars maxima florum candeat, & quædam paulò ad purpuram uergat: nec desint qui herbidi, atq; pallidi sint, nulli uero colore ardentiori habeantur. In herbarum autem genere per multi & uarij, tum synceri, tum misti, tum odorati, tum hebetes sentiantur. Item arbores florem, sed non particulatim uniuersum profundit. Herbarum uero quædam per partes florescunt, ut de ocimo diximus: unde fit, ut diutius floreat, sicut alia multa, & in primis solaris, atque cichorea. Quinetiam radicum multæ differentia, atq; prædictis patentes consistunt. Sunt enim alia lignosa, alia carnosa, neruosaq; sicut etiam in genere satiuorum conspici licet, ceu frumenti & herbæ specialiter nuncupatæ maiore ex parte. Earum autè ipsarum singulæ plurimis inter se differentijs distant, colore, odore, sapore, magnitudine: alia nanque candidæ, alia nigra, alia rubicundæ, ut anchusæ, atq; rubiæ: alia quasi flaua, & surculi speciem gerentes: adde dulces, amaras, acres, odoratas, maleq; olentes: nec desunt quæ uim habeant medicam, ut aliàs dictum est. Carnosis quoq; differentia insunt: nam alia rotundæ, alia oblongæ, glandosæq; ut astula regia, atq; croci: & alia multis tunicis constât, ut bulbi, uel cuiusuis generis bulbofi: adde cepæ, & gethyi, & similitum: alia æquales, fungosæ, mollesq; toto corpore, & quasi corticis omnis exortes, ut aris uel corticem carni adherentem habent, ut mæli terræ, & rapæ. Non autem omnes odorata, aut dulces, cibo idoneæ constant, nec omnes amaræ ingustabiles sunt, sed quæ posteaquam in cibo assumptæ fuere, nihil nocuerint corpori, eas tantū esculentas statuimus. Quædam enim quamuis dulces, mortifera tamen, atq; morbosæ constitunt: alia quamuis amara, aut male olentes, utiles planè sentiuntur. Pari modo & folia, caulesq; se habent, ceu absinthij, & fellis terræ. Discrimen etiam in germinando, & in florèdo, ut hyeme incipere, aut mediata, aut æstate, aut autumno. Quin & in fructibus ratio gustadi eadem est, & in caulibus, & folijs, & seminibus, & radicibus: atq; in ijs ipsis pro ratione saporū differentia constant, ut acidi, acris, dulcis, austeri, & reliquorū eiusmodi, tum simpliciter, tum ratione qualitatis remissionis, intensioris ue. Ergo differentias colligi hinc omnino oportet.

*Differre herbas temporibus germinatus, & floris historia singulorū olerum. Spicosa esse, oculum canis, caudam uulpis, linguam agni. Quæ & plātago, & coturnix, à quibusdā dicta est bibinella.*

Caput X



Ed cum singula distincta superius pro temporibus tam ad germinationem, quàm ad florum prouentum, cōsummauonemq; fructuum sint, addendū nunc illud occurrit, quod nec ijs quæ radice proueniāt, nec ijs quæ semine erumpant, germinare quicquam ante tempus sibi accommodatum solet: sed suū unumquodq; tempus expectat, nec ab imbris quicquam infestatur. Quædā serotina admodum tam germine, quàm flore percipiuntur: ut carduus, ut cucumis syluestris: quod etiam in suffruticum genere de pollicaria, & inturi, & alijs quibusdam retulimus: nec enim aliquid eorum floret, aut germinat ante proprium tempus. Quamobrem hoc etiam in arboribus differre appareant, quippe cum illorum simul quodammodo omnium germinatio fiat: aut si ita minus, uno quidē, eodemq; dixerim tempore anni germina omnium citari: his autem multis, uel potius omnibus temporibus germinant, atq; etiam magis flos exeat. Quapropter si animaduertere uolueris, assiduam penē per totū annum germinationem, & floris productionem uidebis. Semper enim alterum alteri succedēs tempora omnia occupat. Exempli gratia: Aphacam crocum erumper, & fremium, & senecio, cæteraq; hyberna, tum uerna sequentur, dein autumnalia accedent. Multi uero ex singulis floribus prouētus prorogant suos ut dictum est. Sunt enim quæ ita florent, ceu aphaca, & turdaria, & cichorea, & plantago, & alia quædam: uerum propter assiduam continentiam, occupandiq; uicissitudinem haud facile percipi in aliquibus potest. Nec est determinare quæ prima germinent, quæ uero, nec eorum ipsorum generationes, ac tempora recenseri queunt. Quibus fructibus consummatis, alia initia denuō generādi insituāt, quod post autumnū æquinoctium euenire potissimo solet. Tunc enim semina ex maiore parte perfecta habentur, & fructus arborum magna ex parte consummatam extant: simulq; mutatio quædam eius ipsius, atq; temporis sequitur. Quæ autem imperfecta immaturaq; occupentur, his & germinatio, & floris prouentus, & fructus perfectio, ex circuitu ad portionem contingit. Quamobrem euenit, ut alia sub solstitijs florent, alia sub canicula, alia post ærcturum, & autumnū æquinoctium. Sed hæc communiorē contemplationem, ad determinandam principij rationem desiderare uidentur. Quod autem differentiæ plures, aut nullo pauciores sunt, his ipsis planē iam exploratum habetur. Quandoquidem & perpetuō quædam ex his uiuant, ut polium, ut solaris atque capillus Veneris. His ergo differentijs, quibus in rebus, quòque modo fiant, determinatis, nunc singulorum historias exponere cōgruum est, quæ scilicet non pro cuiusq; propria natura consistant, ut quæ spicosa, scandiosaq; consent: & si quid aliud tam commune capi de omnibus liceat, quod familiare sensui sit, aut folio, aut flore, aut radice, aut fructu: ex manifestis enim partitiō fiat eorum necesse est, quemadmodum etiam radicū. Spicosa igitur oculus canis, & cauda uulpina, & plantago, quæ agnina lingua à quibusdam uocata est, & ab alijs coturnix, huic quodammodo similis bibinella est. Verum hæc simplicia, & quodammodo uniformia creantur, & spicam nec acutam, nec aristatam gerunt. Cauda uero uulpina hirsutior, & lanuginosior est, quamobrem similis uulpium caudis cernitur, unde & nomen accepit: huic plantago similis constat, nisi quod florem non quemadmodum illa particulatim ædit, sed per totam spicam tritici modo. Ambobus tamen flosculus lanugineus exit, sicut etiam frumento: similis tota specie tritico est, uerum folio latiori. His proxima reliqua quoque spicati generis, non temere dixeris,

*Cichoracea omnia annuo folio constare. Item de caule cichoreæ, id est, intubi: de Porcellia, Aphaca, Amaragine: hinc repetitio differentiarum radicum. De Astula regia, Epimenideæ, Scilla, Aro, Dracuntulo, Ense, Thefeo. Cap. XI*



Ichoracea uero omnia folio annuo, & ab radice foliata consistunt: germinant post uergilias, fraude excepta. Sed caulibus, atq; radicibus differentias magnas sortiunt, quippe cum cæterorū caules simpliciores, minoresq; exurgāt. Cichoreæ, id est, intubi, magnus, multisq; ramulis brachiatus, lentus item, & diuidi cōtumax est: qua de causā pro uinculo eo utuntur. Radice quoq; germen laterale mittere potest, & alioquin radice prolixū est, ideoq; emori cōtumax: decerptis enim quæ ad usum cibariū capi soleāt, reliquū generationis rursus capescit principitū. Euenit autē ut pars eius alia, atq; alia floreāt, idq; assidue fiat usq; ad autumnū, quanq; durus caulis esse uideatur. Fert & siliquā, in qua semen circa postremas caulitū partes. Porcellia leuior, & aspectu mitior, & dulcior est: nec ut candralia, quæ omnino ingustabilis est, & in radice succū lacteū acrem, eodemq; copiosum habet. Aphaca ingustabilis, & amara est: festinanter hæc floret, sed celeriter flos senescit, atq; lanugine pappo dicta marcescit. Tum alius iterū prouenit, atq; iterū alius, idq; tota hyeme, Vereq; toto usq; estatē facit: flos melini speciem gerit. Simili modo uel amarago se habet: nam ea quoq; Vere florere incipit, nec secus hyeme tota, Vereq; toto perseverat: gustu amara est, unde & nomē accepit. Horū igitur differentia tales annotant. Sed tentandū (ut dictū est) reliquorū etiam pari modo colligere differentias. Genus autē uel eorū, quæ radice carnosa; aut capitata creant, amplū certe sentiūt, quod & inter se, & ad cæteras differentias (uti retulimus) pleraq; sortiūt, radice, folio, caule, atq; reliqua forma. Radicū em̄ (ut dictū est) aliæ squamis constāt, alię carne: & alię cortice uestiunt, alię nudæ adhærent: item alię rotundæ, alię oblongæ: & alię uescendæ, alię ingustabiles. Vescendæ nō tantū bulborū, atq; eiusmodi, uerumetā astulę regię, atq; scillæ: nō tamen om̄s, sed Epimenideę uocatæ, quę ab usu nuncupationē sortita est: hæc angustiori folio, leuioriq; q; reliquę constāt. Ari quoq; radix cibo idonea est: & folia eiusdē decocta in aceto mandī nimirū possunt, sua uis profecto, & ad fracta utilis est. Hæc, ut incrementū capiat, cū folijs luxuriatur, quæ admodū ampla spargunt: folia deflescentes ipsa circū obruere solent, quō planta nō in germina excrescat, sed totū alimentū in suū attrahat caput: quod uel in bulbis nōnulli in cōponendo facere assolent. Dracuntuli autē radix (sunt enim, qui genus quoddā dracuntulorum appellēt, quod eius caulis uarietate habeat quandā) cibo inepta penitus est, & medicis tantū cōmoda. Ac ensis appellati radix dulcis decocta est, & trita farinæ admixta panē dulcem atq; innoxii reddit: rotūda hæc est, & sine cortice, capillamentis gethyi modo fibrata. Permultas iuxta eam scolopendras reperiūt: gaudent enim ea herba, frequentesq; congregant in eam. Thefei radix gustu amara est, tusa aluum purgat. Sunt & aliæ quædam medicæ. Verum pars maior radicum neq; medica, neq; cibo idonea constat. Et differentias quidem radicum has liceat adnotari.

*Discrimen herbarum per folia, per caules. Scillam ante portas satam contra ueneficia esse. Deq; narcisso, & scilla: peculiare de amygdala. Cap. XII*



Olorū uero discrimen, magnitudine, figuraq; accipi debet. Etenim alibuco foliū prælongū, angustū, lentumq; leuiter: scillæ latū: ensi uel pugioni (ut quidā uocant) ad ensis effigiem exit, unde & nomē herbæ impositū est. Consecratici harundinaceū potius constāt. Aro cū latitudine cauum, atq; cucumeraceū est. Narcisso angustū, frequens & pingue. Bulbis, omnibusq; bulbosis ualde angustum, sed croco angustius. Caulis alijs omnino nullus, ut aro, quod mandī potest. Nonnulla caulem tantū floris sortiunt,



ut narcissus, & crocum. Alijs nimirū caulis affurgit, ut scilla, bulbo, omnibusq; bulbosis: item consecratici, & pugioni: sed omnium maxime astula regia. Caulis enim dictus albucum unice inter omnes excellit: consecratici minor quidē, sed durior, in totumq; albucum amulans. Semen quoq; abunde astula regia profert, lignosum semen id est, figura triquetra, colore atro: gignitur in orbiculato quodā, quod flori subest, decidit aestate. Cum orbiculatū illud dehiscit, floret per partes, ut & scilla: incipiunt ab imis. Vermis in albucō gignitur, qui in aliud animal uolatile, floridumq; transfigurat. Quod cū herba florere incipit, eroso statim operculo euolat: peculiare is præ cæteris leuibus caulium generibus fortiri uidetur, quoniā cum angusto corpore sit, in ramulos superne spargat. Per multa ad cibū affert utilia: quippe albucū totum in cinere mandit, & semen torrefactū usui est: sed radix tusa cū ficu in usu maxime omnium uenit, & utilitatis plurimū autore Hesiodo præbet. Omnia igitur capitata, radice utuacia maiore in modū sentiunt: sed præcipue scilla, utpote quæ suspensa uiuere possit, & quidē plurimū temporis. Potest etiam fructus recondendos seruare, ut poma punica, detractio pediculo. Et satorū nonnulla celerius apud eam germinant. Tradit, & ante portas satam, remedio esse contra ueneficiorū noxā. Omnia hæc uniue sim proueniunt, ut etiam cepæ, & allia. Germen etenim ab radice laterale produciunt. Nonnulla etiam ē semine idem hoc euidētissime faciunt, ut astula regia, lirium, pugio, bulbus. Sed bulbo peculiare datur, quod nō simul ex omnibus seminibus exit, sed partim anno primo, partim secundo: ut etiam de auena, & loto traditum est. Id ergo, si uerū sit, cōmune cū alijs habetur. Necnō & illud fortasse commune est, quantū non multis, mirū tamen quod in scilla, narcissoq; euenit: cæterorum enim tam recens satorū, q̄ regerminantiū, suo tempore primo foliū oritur, deinde caulis exit: in his uero caulis prius, & narcissi quidē floris tantū caulis protinus exit: flos enim eius plurimum festinat. Scillæ autē caulis per se prius, tum flos ex eo emergens insidit, eademq; floriū prouentus ternos ostendit: quorū primus tempus arandi primū significare uidetur, secundus mediū, tertius nouissimū: quot enim fuerint isti, totidē & arandi tēpora ferme occurrūt: sed cū ita senuerit, tunc foliorū exortus multis postea diebus inceptat. Idem uel in narcisso fieri solet, nisi quod nec aliū caulem præterq; floris propriū habet, ut diximus. Neq; fructū conspicuū parit, sed ipse flos unā cū caule desinit, & cū reflorescit, tunc folia exeunt. Ergo præ cæteris quidem plantis, hæc ambo peculiaria dixeris. Præ illis uero, quæ ante foliorū, & caulium ortum florere incipiūt, quod iphyum, & alia quædā ex coronarijs facere putantur: atq; etiam inter arbores amygdala potissimū, aut sola, peculiare hoc sit, quod ea quidem, uel cū flore foliū quoq; promūt, uel paulo post, ut de quibusdā ambiguum sit, queri solet. In his autē ex altero quasi principio prodire uidet, cum propter dierum multitudinē, tum quod anteq; flos, aut etiam caulis totus senuerit, germinare incipiant. Germinatio uero prior scillæ, posterior narcissi, & foliū is large emittit, & radix ipsa parua nequaquā est, quantū non magna: figura nō absimilis bulbo, uerum non squamata. Hæc igitur quo pacto se habeant, contemplari non ab re est.

*Bulborū genera, & differentie. Genus quoddā bulborū lanigerum esse, unde toga, & alia uestimenta texantur. Quod peculiare datū silyrinchio. Adiantū, id est, capilli Veneris folium in aqua nunquā madescere, eiusq; duo esse genera, atq; ambo ad desuuium capillorū utilia oleo trita. Fadiculam ad urine destillationes utilem. Quid anthemo peculiare. Cap. XIII*



Lura autē genera esse bulborū nimirū constat. Differunt namq; inter sese, magnitudine, colore, figura, sapore: quippe cum ad eodē dulces quibusdā in locis exeant, ut uel crudi mandi facillime possint, ut in Chersoneso taurica. Sed maxima, peculiarisq; præcipue differentia lanigerarum herbarum adnotatur: est enim genus quoddā eiusmodi litoribus

nascens,

nascens, lanamq; sub primis tunicis habens, ut inter internum quod manditur, & externum media ista conculcet. Texuntur ex ea & togæ, & alia uestimenta: quæ de causa lanatum id constare putaueris, nō modo illius indici crinitū. Quin & bulbosa plura, nec ipsa pauciora notare licet: exempli gratia: uiolam albam, bulbinam, opitionem, cyicem, & sisyinchium quodammodo, quæ quidē redigi ad bulborum genus desiderant, quod radice orbiculentur. Nam colore quidē penitus discrepāt: candent enim, nec squamis constant. Peculiare sisyinchio datū est, ut una radix primo augeatur hyeme, tum ineunte Vere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumq; crescat, quod manditur. Atq; hæc differentias sortiri eiusmodi constat. 10 Propria uero herbaceis uel illa tribui solent: A danti, id est capilli Veneris folium in aqua nunq; madescit, nec quicq; adhæsisse humoris constat: unde & nomen herba accepit. Genera eius duo, candidū, atq; nigrum: ambo ad destilum capillum utilia, oleo trita. Nascuntur maxime locis humidis. Fidicula uel ad destillationes urine unice facit, ut quidā existimant: caulem hæc capillo Veneris nigro similem gerit: folia admodū parua, densa, aduersa, inter sese condita: radicem minimā: loca amat opaca. Inter ea uero, quæ florere particulatim notant, peculiare, quod in anthermo fieri solet: cū enim cæteris omnibus propriū sit, ab ima sui parte deflorere incipere, id a summo incipit florere: candidus flos circumdat, mediū uiridis tenet, & semini color idē. Decidit id uti & spinosorum conceptaculo inani relicto. Genera eius plura.

20 De lappa, solari, carduo, hirundinaria, semperuiuo, loto, melfrugo, uesticaria, quodq; eius tria sint genera. Cap. XIII



Orabile & in lappa, quæ suæ asperitatis causa uestibus adherescit, ut difficile auferri possit. Nascitur enim flos in eo ipso hirsuto & aspero nō exiens, nec euadens, sed intus maturescens, & semen pariens, ut illis simile sit, quod in galeis, ac uiperis euenit. Illa enim ubi intra se ota pepererūt, mox animalia gignunt: & hæc florem in se continens, concoquensq; fructū deinde parit. Quæ autem ita uel florent, uel germinant, ut aliqua sequi uideantur, uelut solaris uocata, & carduus (nam ea quoq; cum solstitiū agitur, floret) item hirundinaria, quæ aduentu hirundinis suum excitat florem: hæc partim naturalem, partim fortuitam habere causam apparuerit. Quin etiam in reliquis propria eiusmodi per multa intelligi possunt, ut semperuiuo datū a natura est, quod humidū, uirideq; semper durare ualeat: folio carnosio, leui, atq; oblongo id constat: planis parietinis nascitur, nec nō & in tegulis, cum terræ confluuium quoddā arenaceum factū est. Ad hæc alia per multa naturæ superuacua nosse forsitan possis: sed (ut sæpe retulimus) differentias comparatione cæterorū semper contemplari oportet. Quædam enim formis pluribus constant, quanq; nomē unum sortiant, ut ita ferme æquiuoca sint, ceu lotus: huius enim genera plura redundant, folio, caule, flore, fructuq; discreta: inter quæ uel illud redditur, quod melfrugum appellant, diuersum tum uiribus in 40 usu cibario, tum quod nō eadem loca desideret. Alia quoq; plura hunc in modum facile assignari possunt. Quædā uero quibus generibus existunt paucioribus, tamen nō minus discriminis sortiri uident, ut uesticaria, quæ cognomine nois tantum, & quadā planè æquiuocatione accipitur: Vna enim cibo idonea est, & fructū quasi urbanum acinosum præstat: duæ uero, quarū altera somnū, altera insaniam infert: & si copiosior detur, interimere sanè potest. Pari modo & in reliquis, quæ plurimū inter se differunt, accipi idem licet. Sed de cæteris herbaceis satis dictum. De frumento, uerisq; frumentaceis, de cætero indicandum: hoc enim reliquum adhuc est.

## THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER OCTAVVS.

De frumento, & frumentaceis, esseq; frumenti tria genera: sementis uero duo tem-  
pora. Quæ mature serere, quæ serò oportet: de tercio serendi tempore.  
Quoto quæq; die à satù erumpant. Cap. I



**S**ATIS DE cæteris herbaceis diximus: nunc de frumento, uni-  
uersisq; frumentaceis agamus, modo quo superiora tradidi-  
mus: hoc enim reliquum in herbaceis generibus est. Frumenti  
prima, & maxima genera duo constant: sunt enim alia fru-  
mentacea, ut triticum, ordeum, tipha, semen, & reliqua quæ  
tritici, ordeie specimen quodammodo gerant: alia chedropa  
appellata, ut faba, cicer, pisum: atq; in totum, quæ legumina uo-  
citare solemus: adde tertium genus, milium, panicum, sesamum: & ad summam,  
quæ in æstiuis sementibus communi careant appellatione. Horum omnium gene-  
ratio simplex, & una est: quippe semine tantum omnia exeunt, nisi quid rareriter,  
parceq; radice proliat. Sementis autem duo plurimum tempora notantur, sed pri-  
mum, atq; potissimum, quod circa uergiliarum occasum accipitur, quod & Hesio-  
dus, & maxima serè pars autorum secuta est: quamobrem tempus id per excellen-  
tiam satum appellant. Secundū, quod Vere incipit post brumam. Sed nō eisdem  
datur utrunq; alia enim mature feri desiderant, alia serò, quod hyemem nequeant  
tolerare: non tamen defunt, quæ tempus utrunq; satis apte contingant, hyemem  
scilicet, atq; uer. Mature seruntur triticum, ordeum, quod etiam maturius seritur:  
item semen, tipha, siligo, & si quid aliud tritico simile consistat: his etenim omnibus  
idem penè tempus serendi statuitur. Ex leguminibus uero faba (ut ita loquar) ma-  
xime mature feri exposcit: hæc enim suæ debilitatis gratia, radicationem hyeme an-  
tipicare desiderat. Lupinum quoq; mature seritur: post aream enim serendū pro-  
tinus censent. Sera illorum satio est, quæ in genere discrepant, ut tritici genus quod-  
dam, & ordei quod trimestre appellant, quoniam per tantum temporis perfici pos-  
sit: & in leguminum genere lens, aphaca, pisum. Tempori utriq; dantur ex legumi-  
nibus eruum, cicer. Sunt & qui etiam fabam serò audeant serere, si minus primis sa-  
tibus expedire potuerint. Simplici tamen ratione dicendum, alia sui roboris causa  
feri maturius poscere, ut quæ hyemem tolerare facile possunt: alia ob debilitatem  
idem requirere, ut clementia temporis incrementum præsumere queant. Igitur  
tempora duo illa in primis notantur. Tertium uero additur, quod æstiuis attribu-  
tum retulimus, quo milium seritur, & panicū, & sesamum, item trionum, gemina  
hisq;. Hæc serendi tempora singulis statuuntur. Erumpit autem aliud celerius, aliud  
tardius: ordeum atq; triticum die plurimum septimo, sed magis ordeum festinat.  
Legumina quarto die, aut quinto proueniunt, fabis exceptis: faba enim intra dies  
plures etiam, quàm frumentacea, exit: quibusdam enim in locis uel in die quinto-  
decimo, aliàs etiam uigesimo: hæc enim difficilime omnium prouenit, & si cum sa-  
ta fuerit, imber plus æquo successerit, uel prouentu omnino difficilis reddetur. Sed  
anea, quæ tempore uerno serantur, celerius exeant, cogitandū. Prouentus autem  
exortusq; dictos, quoad id uniuersim dixisse liceat, ita facitari putandū. Nonnunq;  
enim, & quibusdam in locis uel intra pauciores dies confici possint, ut in Aegypto  
tertio, quarto uel die prouenire affirmant. At apud alios uel pluribus, quàm retuli-  
mus, opus sit: nec temere ita eueniat, cum & tellus, & cælum discrepat: cumq; ma-  
turius, serius ue, aratum est, quæque superuenerint dissimilia constant. Tellus enim

rara, & leuis, & benigno cœlo subiecta, celeriter, ac facile reddit: lenta uero, & ponderosa, tarde: & quæ squalleat, tardius. Item si hyems, aut squalliores, serenitatesq; nimix superuenerint, uel ecôtra imbres immodici inceserint, res longè tardius agitur: his enim discrimen summum exultat. Pari modo, & si solum sit cultum fimoq; refertum, uel si nihil eiusmodi actum sit: Nam & ad mature, sero uel ferendū quoduis, loca differunt. Qua de causa nonnulli Græciæ incolæ mature omnia serere solent, uidelicet propter sui tractus algorem, ut Phocenses: ne scilicet hyemes herbas paruulas occupent.

Quemadmodū nascantur in frugibus folia, germinaq; & radices. Quo modo ordeum, & triticum, & pisum, & faba, & cicer exeant: quoq; radices legumina omnia habeant. De frumentagine, & ordeagine, atq; frumenti ortu, leguminumq;.

Cap. II



Erminant alia ex eodem, radicem, foliumq; fundentia: alia utrunq; ex utroq; extremo. Triticū, ordeum, tripha, ad summā omnia, quæ frumētacea consent specie, ex utroq; effundunt: quippe quæ parte ima, crassaq; radicem: tenui superna, herbam propellant: sit tamen unum, atq; continuum ex ambobus, radice & caule. At faba, cæteraq; legumina non eodem modo mittere consueuerunt, sed eadem ex parte radicem fundunt, & caulem, qua etiam nexus siliquarū consistit, inq; ea uelut principii quoddam germinandi haudquaq; obscurum. Quod in quibusdam uel ad mentulæ formam effigiatum sanè inspicere possis, ceu in faba, & cicere, sed maxime in lupino: his enim radix deorsum uersus, folium uero & caulis sursum tendunt. Hoc igitur differunt: sed illo planè conueniunt, quod omnia per annexum siliquæ, atq; spicæ radicem capiunt: nec ut in quibusdam arboribus, è diuerso fieri solet, ceu in amygdala, nuce, glande, atq; similibus. Omnibus autem radix paulò ante caulem exit: & quidem in frumentaceis euenit, ut radix protinus extra pellatur: germen autem in ipso semine augeri primū incipiat, auctoq; subinde semina disiungantur. Nam & hæc omnia bipartita quodammodo constant, quod in leguminibus manifestum est: Illa namq; bino claudi corpore, atq; ita componi penitus liquet: uerum in eo genere, quia per seipsum sit, illud quidem minus contingit. Radix tamen paulò prius isti quoq; prope pellitur. Exit ordeum, & triticum uno folio: pisum, & faba, & cicer multis: legumina omnia singulas habent radices, easdemq; lignosas, & ramulis prætenuibus modo capillamentorum fibratas. Omnium (ut ita dixerim) altissimam cicer agit, quod nōnunq; uel ex latere mittit. At uero triticum, ordeum, reliquaq; frumētacea per multis, prætenuibusq; innituntur radicibus: qua de causa numerofo ramo, numerosoq; caule omnia eiusmodi se attollunt. Quamobrem uel contrarietas quædam inter hæc genera fermè intelligi potest: etenim legumina radice singulari subnixa, multos superne ramos ex caulibus gerunt, fabis tantum exceptis: frumenta uero è diuerso multis subnixa radicibus, multa quidem effundunt germina, sed quæ ramis brachiari omnino nequeant, præterq; genus, quod frumentaginem, quodq; ordeaginem uocant. Hyeme in herba, frumentacea manent. Omnia tempore mitescente, caulem de medio mittunt: at quæ geniculantur, euenit, ut protinus in tertio genu, quædam in quarto gerere spicam incipiant, sed nondum aliqua mole conceperint. Et quidem per torum culmum spica digeritur, ut fermè cum culmari inceperint, mox eam conspici sit: sed latet, anteq; adulta in folliculo fuerit: tum enim foetus suæ crassitudine molis euidēs extrat. Mox folliculo absoluta, quarto, aut quinto die florere tam tritici, quàm ordeï incipit, totidemq; diebus ferè floret: qui uero plus temporis referunt, septimo die deflorescere notat. Sed leguminum floris diu-

tina productio est, atque inter cætera erui, cicerisq; diuturnissima. Inter omnia uero faba quidem summo discrimine redditur: quadraginta nanque diebus florere prodita est: sed alij, subinde alio & alio emergente, florere assignant: particulatim enim florere aiunt, alij simpliciter referunt, flos enim spicatis uniuersim leguminibus omnibus particulatim emergit. His enim primum pars infera floret quæ cum desierit, proxima incipit, atq; ita ad supernā itur successu assiduo: qua de causa multa ex eruis euulsa parte ima defluxisse cernuntur, superna uero penitus esse uiridia.

*Quot diebus frumenta, quot item legumina maturentur. Terram à terra, & coelum à coelo ad fructuū differre perfectionem. Quibus filijs frumenta, quibus legumina consent. De siliqua, legumine, florumq; differentia. Quæ spicam, quæ iubam, quæ siliquam gerant.*

Cap. III



Riticum, atque ordeum postea quàm defloruere, crassantur, perficiunturq; cum plurimum intra dies quadraginta: pari modo & titha, & reliqua huiuscemodi, item fabam diebus totidem perfici uolunt: ita tamen, ut intra tantundem spacium temporis hæc florere, atque perfici nata sit, cum cætera intra dies pauciores consummentur. Sed cicer paucissimis perfici potest, siquidē post sementem diebus quadraginta absolui possit, ut quidam affirmant: Nam in totum celerrime genus id leguminis consummari nulli dubium est. Milium, & sesamum, & panicum, & ad summam omnia estiuæ, dies quadraginta fortiri inter omnes ferè constat: non tamen desunt, qui uel pauciores prodiderint. Differt & terra à terra, & coelum à coelo ad fructuum perfectio nem: quædam etenim loca proferre intra pauciores dies uidentur: ut cum alia, tum & maiorem in modum conspicue Aegyptus: illic enim ordeum sexto à satū mense, triticum septimo metitur, quod apud plurimos octauo. Cæterum nec illo tractu sic multitudine tota fieri solet, sed quoad religionis primitijs tantum statutum est. Por tatur enim ad sacrorum quorundam usum farina noua sexto mense, & hæc à locis superioribus super Memphim. Quin & Sicilia apud Milas uocatas agri Mesani ce lerem quandam fieri consummationem serorum affirmant: esse nanque semen tem eorum menses sex: sed tamen cum primis unā metere posse, qui mense nouis simo seuerit. Regionem istam adeo fertilem produnt, ut triginta choēs reddere ua leat, pascua mirifice habeat ubique. Sed mirabilius, quod in Melio fieri aiunt: sata enim intra triginta, aut quadraginta dies metere incipiunt: quamobrem eius loci incolæ sari consueuissent: Eatenus ferendum, quatenus manipulum uideris. Sed hæc nec coctu facilia, nec multa apud eos fieri traditur. Locum istum in exhibendis ali mentis mancum affirmant: frumenta enim, oleasq; ingenue ferre, uites autem mo dice. Sed omnibus mirabilius, quod in Chalcia Rhodiorū insula fieri solet: illic enim locum quandam præcoquem, fertilemq; adeo narrant, ut ordeum satum in eo, cū cæteris fereretur in locis, metere iterumq; ferere, atque cum reliquis unā frugibus rursus metere possint. Maximam igitur hanc differentiam, si uera sit, arbitrari debe mus: Quod enim translatus in alium tractum distulerit, ut è Cilicia in Cappado ciam, atque in totum trans Taurum aiunt, minus incongruum sit. Locorum enim discrimen summum longi causa interualli exultet necesse est: conterminum uero, eundemq; loco, tantum differre à reliquis, mirabile admodum est. Hic ergo summa cum differentia notatur: cætera autem tractus haud multum inter sese tempore distant, sata enim in Attica prius, quàm in Hellesponto ueniunt ad maturitatē die bus triginta, aut aliquo plus. Quod si satus quoque præcesserit, loci mutatio sit: sin autem simul satum sit, plus temporis certe accedat necesse est. Nec & loca differen tiam haudquaquam mediocrem faciunt, nonnulla proxima sint: segetes enim Sa laminis

laminis longe prius, quàm cæteræ Atticæ regionis perficiuntur: Atque in totum loca maritima, tam ad hæc ipsa, quàm ad reliquos fructus festinatora intelliguntur: ut circa Aetnam uocatam Peloponnessi, & in Phaleco agri Megarensis, nisi iustitiam uel humi tenuitatem, atque laxitatem offerre quicquam putaueris. Generatio, & perfectio ita se habent. Differunt autem & tota discreta genera inter sese, frumenta, legumina, æstiuæq; & generatim, quæ eiusdem generis consortia sunt. Frumenta etenim folio harundinaceo constant. Leguminum alia rotundo, ut faba, & maxima ferè pars: alia oblongiori, ut pisum, cicercula, cicera, & reliqua huiusmodi: alia item neruata, alia sine neruo, & uena. Sesamum, & trionum discerni ab his sua proprietate cernuntur. Item caulibus alijs geniculatus, atque inanis, ut faba: quamobrem culmus uocatus est cæteris leguminibus lignosior. Sed ciceri lignosissimus, milio æstiuus, & panico harundinaceus: sesama, & triono potius ferulaceus: & alijs caulibus erectis, ut tritico, ordeo: & in totum frumentaceis, atque æstiuus, alijs tendens in latus potius, ut ciceri, eruo, lenti: alijs humi procidens, ut erualæ, piso, cicerculæ. Si aliqua nomine appellata speciali, si ligna longa affixeris, ascendet, & frugifera fiet: alioqui uitiosa, atque eruginosa reddetur. Faba inter legumina sola potissimum erecto caule constat. Quin & floribus differentia tum natura, tum posita data est: de quibus ferè in ijs, quæ in uniuersum digessimus, satis dictum existimamus: scilicet quod alijs lanuginei, ut omnium ferè gerentium spicam: alijs folijs constant, ut leguminum, & plurimis quidem minutis: maior etenim pars florem sessilem ædit. Flos lanugineus & milio, & panico: sed sesama, atque triono folijs constans, & alia circa ipsum semen sterculium habent, ut quæque frumentacea, & miliacea circa spicam. Legumina uero ex eo quodammodo flore, aut ex eodem quidem initio proueniunt: & florem alia uniuersim, alia particulatim producant: & reliqua hisce proxima, satis iam exposuisse putamus. Ad hæc quæ fructuum ratio exigit, addimus: quod alia spicam gerunt, ut frumentacea: alia siliquam, ut legumina: alia iubam, ut miliacea: effusam enim illam harundinaceam comam, iubam appello. Ad summam, alijs semen uasculis includitur, alijs membranis continetur, alijs nudum insidet: alijs item fructus in extremo, alijs in latere: & reliqua, quæ hanc ipsam contemplationem contingunt, diximus. In totum uero genus leguminum fructu copiosius, fecundiusq; perfectio sentitur. Sed his feraciora perfectio æstiuæ sunt, ut milium, sesama. Lens maxime inter legumina fertilis est: & summatim quæ semen ferunt pusillum, copiosius ferè fructificant, ut etiam inter olera cuminum: quanquam hæc omnia copiose ferant. Validiora contra hyemem, atque in totum cæli mutationes frumentacea constant: legumina uero cibi ratione putentur ualentiora, nisi forte id quidem nobis ita responderet, cum cæteris animantibus è diuerso occurrat.

De frumentaceorum inter se differentia, & generibus ordeæ, ac tritici, & eorum differentijs: quantumq; nascatur in Asia frumentum. Cap. IIII

40 **R**go genera tota tales inter se differentias sortiunt. Quæ uero generis eiusdem consortia sint, his pro partium sanè inæqualitate differentia datur: ut inter frumentacea triticum angustiori folio, quàm ordeum conditur, & caulem leuiorem, ruptuq; difficiliorem id habet. Ad hæc triticum tunicis integritur multis: ordeum nudum consistit: id enim omnium maxime caret tegumento. Tiphæ quoque, & siligo, & omnia huiusmodi multiplici folliculo includuntur. Ac omnium (ut ita loquar) maxime auenam, natura operuit. Quin etiam culmus altior tritico, quàm ordeo est, & spica plus discreta à folijs emicat. Palea quoque suauior, quæ ex tritico, quàm quæ ex ordeo: utpote quæ plus succi retineat, & mollior sit. Ad hæc ordeum à tritico differt, quod ordeum in uersus

spicatur, triticum nullo uersu conditū est, sed æquale undiq; constat. Genus totum ad genus tales ingerit differentias. Rursus eorū utrunq; in plura genera ipsis etiam fructibus, & spicis, & reliquis formis, atq; etiam uiribus, affectionibusq; discreta, diuidi sanē potest. Est enim in ordei genere aliud binis uersibus, aliud ternis quaternisq; cumq; plurimum, senis: est enim uel huiusmodi quoddam genus. Quod uero pluribus constituitur uersibus, hoc semper fere spissius, posituq; arcūius constat. Magnam & Indicum differentiam facit, quandoquidem ramis natum sit brachiatum, ut proposui. Et spicæ uero alijs grandiores, rarioresq; constant: alijs minores, frequentioresq; & alijs distantiores a folijs, alijs proximiores, ut achilleis cognomine. Et ordeorum ipsorum aliud rotundius, minusq;: aliud oblongius, maiusq;, atq; in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & flatus, & in totū contra cœli mutationes candido ualidius esse uidetur. Tritici quoque genera plura notantur, cognomina ex locis sortita, ut africanum, ponticum, thracium, assyrium, ægyptium, siculum: quæ & colore, & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differūt. Quædam uel aliunde cognomina sortiuntur pro suis uiribus, tum alijs, tum uel maxime quæ ad cibum pertineant, ut cachrydias, stlengis, alexandrinus: quorū omnium differentias in supradictis colligere licet. Nec uero ab re fuerit, si illa quoq; pro differentijs capies: & aliud præcox, aliud serum: & aliud auctu amplū multumq; reddens, aliud ieiunum quoddam parumq; ferens: & aliud spicam grandiore effundens, aliud paruam: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui absolui, ut africanū: & aliud culmo tenui constans, aliud crasso: quod etiam ipsum africo datū est. Crasso tamen, & cachrydias dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis uestitur, ut thracium: & aliud unicalamum, aliud multicalamum, & magis, minusq;. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis ratione uirium proximum sit: eiusmodi namq; differentie naturaliores profectio appareant, quibus & trimestrium annuum rarigenus par est, & bimestrium, & si quid intra pauciores dies ualeat consummari. Et in Eubœa genus quoddam intra quadraginta dies crassari, perficiq; posse affirmant, idemq; firmum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue: quamobrem famulis id præberi inquirunt, etenim nec multum in hoc furfuris esse uolunt. Igitur genus id celerimum quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria uero quædam habentur, quæ ex Sicilia, & in Achaïam aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumq; fecunda habentur: quantq; cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quædam genera in Eubœa, & præcipue apud Caristum. Trimestria uero permulta, & ubiq; habentur: leuia hæc & parum fecunda, & unicalama sunt, atq; in totum infirma. Leuissimū igitur triticum, quoad simplicitate agere licet, ponticum est: ponderosius ex ijs, quæ in Græciam aduehi solent, siculum datur. Sed eo ponderosius, quod Boeotia fert. Indicum asserunt, quod athletæ, qui Boeotiæ ternos semisextarios uix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt: leue satis, & quod in laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris, cœloq; intelligi debet. Nam & Asiæ ultra Bactra quodam in loco adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis oliuæ sua æquiparent magnitudine grana singula. In Pissoris autem dictis adeo firmum nasci affirmant, ut si quis plus comederit, distrumpatur necesse sit: & Macedonū ita plerosq; interijisse aiunt.

Abfurdum sanē, & leuitati trimestrium absonum, quod in pontico eue-

nit: Venum enim durum admodum est: hybernium autem molle est: leuitate enim molle plurimum differt.

Duo uniuersi frumenti esse arandi tempora: deq; ciceris differentijs, siliquarumq; in figura. Cap. V

**I**T quidem arandi tempora uniuersi frumenti duo uidentur statuere: alterum hybernū, alterum uernum, quo etiam legumina ferunt. Ad hæc in genere frumentorum aliud purum lolij nascitur, ut ponticū, atq; ægyptium: purum & siculum satis, & præcipue agrigentinum sine lolio exit. Siculo proprium datur, quod melampyrum uocant: res innocens, nec sicut lolij graue, & caput tentans. Sed hæc quidē (ut dictū est) loco rum naturæ adscribi decet, idq; agere quoad singulis generibus attinere uideat. In leguminū autē genere, pari modo differētijs eiusmodi capere nō est: aut quod non idem scrutandū studiū adhibeat, aut etiam quod illa uniformia cōsistunt: etenim præter cicer, & lentem, & aliquatenus fabam, & eruū, quoad colorū, saporūq; ratio differētiā faciat, cætera nullis generibus discernere solent. Ergo cicer, & magnitudine, & sapore, & odore, & forma, pleraq; differētijs ostendit, ut arietinum, & columbinū. Candida inter omnia dulcedine præstant: etenim eruū, & lens, & cicer, & faba, & sesama: Nam & sesamæ genus quoddā candidum datur. Sed differētijs hinc potius accipere licet, uidelicet ex his omnibus, quæ siliquis inclusa proueniunt. Eorū enim alia nō intersepta, sed quasi inuicem cōtingentia constant, ut eruū, pisum, & pars penē maxima: alia magnopere circūsepta, ut lupinū, atq; etiam magis, & peculiarē in modū sesama: item alia in siliquis longis, alia in rotundis, ut cicer. Et quidē seminū multitudi, pro magnitudinis ratione sequit: pauciora em̄ minor siliqua continet, ut ciceris, & lentis. Quæ quidē differētijs similes fortasse, ac illæ habentur, quas generi frumentaceorū, tum spicarū, tum ipsorum fructuū ratione tribuimus: nam & quæ siliquæ appellant, seminū ferē rationem sequunt: alia nancq; leuiter lata, ut lentis, & aphacæ: alia cylindraceæ potius, ut erui, & pisi: figurā enim huiusmodi ista sortiunt. Sed huiusmodi differētijs multas per singula comperire poteris, quarū alia cōmunes omnibus, alia generatim propriæ habent. Quod autē omnia siliquis adhærent, & ueluti quoddā principii inde obtinent, alia eminens, ut faba, & cicer: alia concauū, ut lupinū, & alia quædā: alia nō æque expressum, sed minus, ac ueluti indicii principij tantū, constat tum ex ipso aspectu: cernitur em̄ principium quo & fata germinant, atq; radicanter (ut inter initia diximus) & annexa siliquis nutriti, dum consummentur, aptissime possunt tum ex ijs, quæ nunc, & ante satis differuisse putamus. Sed de differentijs hæcenus.

De leguminū, & frumentorū sature tum de stercoratione. Quæ cuiq; agro conueniant semina. Quana do imbres profint, quādo noceant frugibus. Quod solum quid præstare possit. Cap. VI

**E**rrere autē quæq; potissimū tempestiuus semētib; præstat: ceterū & sic co solo quidā cōmittunt, ac præcipue triticū, ac ordeū, utpote quæ maxime ualeat perdurare, ubi nō a uibus, aut alijs bestijs tellus obnoxia sit. Haud em̄ commodū semina defactū solū putat: quippe cū semina in eo facile lateat, atq; intereant: simul accidat, ut frequēs herba nascat. Imbrem post stationē superuenire omnibus prodest, exceptis quæ officii potius apta sint, ut faba inter æstiuā, sesama, & cumīno, & triono. Densum autē, rarum uel sparse semē terrarū etiā ratione cōuenit: plus enim crassa, laraq; tolerare potest, quæ nō oia, & tenuis. Quamq; dici soleat, aliās plus, aliās minus seminis eandē recipere segetem, in faustūq; augurio capiant cū plus receperit: terrā em̄ esurire, esitareq; protinus semen existimāt. Sed hæc ratio stulte fortasse assert. Semina uero si cōtemplaris, & præcipue loca ipsa scrutaris unā cum solo, positionē quoq; animaduertendo, quæ ad statum, solesq; sit, accommodatius sanē differētijs colliges. Stercoratio quoq;



pro natura terrarum fieri debet. Nouale hybernum uerno praefertur. Nonnusquam alte inarare non expedit, ut in Syria: qua de causa pusillis aratris Syri utuntur. Apud alios cultus nimius obest, ut in Sicilia: unde fit, ut multi ex peregrinis facile aberrare possint. Haec quo ad terrarum naturam satis sit. Discernere autem & semina solent, quid scilicet cuique competat agro. Hybernus etenim locis triticum potius datur, quam ordeum, atque in totum frumentum potius, quam legumen. Ad plenum inculta, & longo tempore post proscissa, tritico deputantur: id enim melius, quam ordeum illa ferunt. Tolerat & frequentiam imbrium triticum magis, quam ordeum, & fertilis segete minus stercoreta perficitur. Pari modo & tritici ratio, quod cui conueniat, habetur: exempli gratia, quod frugali, & pingui: quod ieiuno, 10 & gracili, & de reliquis pari ratione animaduertere solent. Aqua, cum sata conceperint, atque adulta sint, omnibus prodest. Tritico, ordeo, reliquisque frumentaceis floribus obest: facit enim, ut cuncta intereant. Leguminibus nihil officit, cicere excepto: id enim abluta falsilagine, radice tabescens, interit, & ab erucis erosum protinus perit. Cicer nigrum, atque etiam rufum, firmitus est, quam album. Locis dilutionibus sero ferendum id censent. Faba florens praecipue madefieri cupit: ob id sero etiam ferere uolunt (ut dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam defloruerit, parum omnino aquae desiderari affirmant: consummatio enim iam in uicino est. Frumentaceis in plenum crassatis aqua noxia esse putatur, & ordeo magis, quam tritico. In Aegypto uero, & apud Babylonem, & Bactra, ubi terra nullis, aut raris 20 imbribus madet, roribus omnia coalescunt. Adde Cyrenam, & Hesperidem: idem enim uel in his ipsis fieri solet. Omnium (ut simplicius loquar) opportunissima quae uerna: quam obrem Sicilia frumenti perfertilis est: large namque, & molliter Vere fructificatur, e diuerso autem hyeme solum tenue multa paulatim recipere possit. Crassum uel seminum copiam, & aquarum inopiam tolerare facile potest: locis autem sitientibus omnes afflatus, auraeque prodesse putantur. Sed alij apud alios eiusmodi remedia praestant, quod uel antea diximus. Sed omni quasi ex parte squallor potius, quam crebri imbres, frumento expedit: imbres enim cum alias contrarij sunt, tum semina ipsa saepe corrumpunt. Quod si minus herbae quidem luxuriam mouent, ut sata strangulentur, atque omne alimentum amittant, nullum ex seminibus 30 corruptum, mutari in aliud aptum est, praeterquam triticum, atque ordeum, quae mutari in lolium asserunt, magisque triticum. Idque imbribus frequentantibus fieri, & praecipue locis humidis, & imbre longe dilutis.

*De lolio, auena, & uicicris. Quod leguminibus solum conueniat. Sesamam uiridem nullum animal mandere, nec etiam lupinum. Item remedium ne luxurient fruges. Quid Thessali, quid Babylonij in tondendis segetibus faciant.*

Cap. VII



**L**olium autem uernum nequaquam esse, quemadmodum reliqua herba, quod quida affirmare conantur, rationibus illis constat: confestim enim hyeme ineunte id exortum patescit, multisque differt: habet namque angustum folium, & pilosum, & pingue, eiusque peculiare pinguitudo notatur: pilositas enim auenae etiam datur. Hoc igitur proprium eorum 40 animaduersum est, atque etiam lini: nam uel ex hoc ipso lolium fieri uolunt. Cicer autem a ceteris leguminibus propria illa distinguunt, quod de floris prouentu retulimus, & quod fructu celerrime perficit, quonia firmissimum, & lignosissimum constat: atque in totum noualibus ineptum praesua edacitate est. Herbam enecat omnem, & maxime, ac celerrime tribulum. Ad summam, nec solum quodlibet ferre id legumen potest, sed nigro quodam, crassoque opus est. Fabam ex ceteris nouale optimum praestat, quous frequenteratur, fructumque ferat copiose. Aquas quoque fluentes his magis prodesse, quam

quàm coelestes affirmant. Panicum, & milium minus aquarum indigent: nam cum plus habent, folia dimittunt: sed ualidius milium, dulcius panicū, quanq̃ infirmius est. Sesamam uiridem nullū animal mandit, neq̃ lupinū. An uero neq̃ trionum, neque geminalem, quærendū: nam ea quoq̃ amara sunt. Trionū sesamæ simi e constat, & pinguiusculū est. Geminale cumineum quoddam est, atq̃ nigrum: seritur cum sesama. Sed de his scrutari arctius sanè conuenit. Terris autē frugalibus ne luxurient, folijs depascere, atq̃ tondere agricolæ solent: quod uel in Thessalia factitur quotannis. Euenit autē ut depasta quidē etiam quoties libeat, fructū nihilo mutant: retonsum uero etiam semel triticū degeneret, & longum sine ulla crassitudine surgat, quod camatiā uocant. Nec satum id ad naturā pristinā redire posse autumant: sed hoc perq̃ paucis euenire Thessali aiunt. At apud Babylonem semper, & quasi ordinate bis tondent, tertio pecus admittunt. Sic enim caulem mitit, alioqui folijs tantū lasciuir. Et negligentius quidē colentibus, quinquagesimo cum scenore messes reddunt: diligentius uero cum centesimo quinquagesimo. Cultus aut̃ probus, cum quādiutissime aqua intermāserit, quō scilicet multū materiæ producat. Cum enim ea terra crassa, spissaq̃ sit, raram atq̃ solutā reddere opus est. Sed materiam, herbamq̃, quā Aegyptus gignere nata est, illa minime fundit. Igitur hæc uiruti tractus attribues. Multis autē locis uel ex radibus triticū, atq̃ ordeū anno postero exit. Quin & eodē primo anno, ex ijs, quæ gratia uenundandi secant, altero cultu mo adnācente prosiliit. Simili modo & si cōcreuerit hyeme, pluuijs enim secutis seges restitilis redditur. Verū talium spica imperfecta, pusillaq̃ extat. Exeūt anno sequenti etiam, seminibus depressis, conculcatisq̃, ut nihil quali appareat: uidelicet cum transeunte exercitu, semina concussa in terram corruerint. Necnō & eorum, quos agnos uocitant. At in leguminum genere, aut nullis uis faciendi quicq̃ eius modi datur, aut certe non æque. Et germinationes quidem tot modis fieri solent,

*Quid ad incrementū frugum plurimū iuuat: inde prouerbiū, Annus fructificare, non tellurem: frumentis, & reliquis herbis præterquam filici uilem esse stercoreationē. Quid enecet medicam. Semina item peregrina in uernacula transire, atq̃ tum cultura, tum natura terre meliora, deterioraue fieri: quod genus aptum sit transire in aliud, atq̃ nasci inter alia gaudeat.*

Cap. VIII



**A**D incrementū autem, alimentumq̃, plurimum quidem cœli temperies, atq̃ in totū anni conditio iuuat. Imbribus enim, serenitatibus, hyemibusq̃ opportune secutis, omnia feracia, permultisq̃ fecunda redduntur: etiam si fata sint salis, ac tenuibus solis. Quamobr̃ non perperam prouerbio dicitur, Annus fructificat, nō tellus. Verū & terræ ratio multū refert, non solum quod crassa, uel tenuis, & rosida, uel squallida consistet, sed etiam cœli ambientis, & flatuum causa: quædā enim q̃uis tenues, uitiosaq̃ sint, probe tamen fructificant: quoniā cōmode ad maritimos iaceant flatus. Sed alijs alijs cōmodi occurrunt (ut sæpe iam dictum est) quippe cum alijs fauonius, alijs aquilo, alijs auster proffit. Cultura quoq̃ haudquaq̃ parum conferre percipitur, præcipue sementis. Excolta etenim terra facile profert. Quin & fimo magnopere adiuuat: calefacit enim & concoquit. Quæ nanq̃ stercorentur, festinantius, quàm stercoreis indiga, uel uiginti dies erumpunt. Sed nō omnibus stercoreatio prodest. Vtilis nō solum frumentis, uerumetiam reliquis herbis, præterq̃ filici est: hanc enim fimo superiniecto interire affirmant: interit & pecore incumbente. Quin & medica quæ uocatur, stercoreis, & urinæ causa perit, ut quidā dixerunt. Quodq̃ aut̃ semen naturæ temporis certe cōuenit, atq̃ in totū generi, genus certū responderet, etiam inter ipsa unigena, quæ discernere autores conant. Semina peregrina intra annos tres, cum

plurimū transeunt ad uernacula: expeditq; ex apricis ad paulò minus aprica, & ex frigidis pari ratione transferre. Translata ex locis hybernis, eruptionē in præcoquibus prorogant. Quapropter squallore intereunt, nisi pluuia serotina seruauit. Ob id cauendū censent, peregrina uernaculis permisceri, nisi ex solo simili migrarint. Nam ut loca in serendo, oriendoq; inuicem discrepāt, ita cultura egeant diuersa necesse est. Ad hæc differētiās telluris, ac uires seminū, atq; etiam singulorum tempora obseruandū. Cū uero prospere tempora anni succedere, semina uel grauiora, suauioraq; reddunt. Athenis itaq; ordeū, quod farinae partem maiorē conficit (is enim ager ordeū eximie fert) nō cum plurimū fuerit, sed cum quandā temperiem obtinuerit, commendandū euadit. In Phocide uero circa Elatiam non solum ordeū, sed etiam triticum optime reddit. Et apud alios alia, ad quæ soli cuiusq; natura ualeat. Ergo semina meliora, deterioraue tum cultura, tum terræ natura fieri possunt. Syluestrescunt enim, mansuescuntq; modo arborū, atq; in totū permulta tellure protinus uti arbores deterius ueniunt. Genus aut, quod totū transire in aliud aptum sit, nullū præterq; tīpham, & semen cōperies, sicuti inter primas disputationes proposui. Necnō & lolū ex tritico, & ordeo corruptis enascitur. Vel si id minus, nasci quidem inter triticū solitum esse, nulli dubio est: ut etiam Ponticū illud triticū atrum cognominatum, & semen bulborū, & cætera quæ nasci inter alia semina solent. Nam & auena magis in ordeo exire uidetur, & in lente aracus res scabra, & dura. In aphacis autem securina securi similis. Atq; in omnibus ferē inest, quod simul alatur intermiscaturq; seu ratione telluris, quod non inepte putaueris, seu ob aliquā aliam causam. Nonnulla etiam manifeste communia plurimū erumpunt. Sed quoniam plus inter aliqua ualeant, propria eorum putantur: exempli gratia, eruanga erui, & lappa lentis: quod altera eruum potissimo uincat causa imbecillitatis, altera inter lentem maxime coalescat, quæ quidem eruangæ proxima est: etenim pari modo aggreditur, & herbam totam ueluti brachijs capessit: nec secus angit, atq; obstrangulat. Quod autem statim ab radice cumino, & sceno græco subnascitur, & hæmodorum uocatur, unicaule constat, nec absimili caule surgit: uerum longe breuior, & modo capitis superne quiddā gerente: radice autem subrotunda innititur. Nullum, sceno græco excepto, inarescit solo tenui, nec ullo pacto pingui hæc prodeū. Vt in Eubœa apud Lelantum quiddā nasci omnino nequeunt, apud autem Canethum, & si quis alius eiusmodi locus sit, nimirū queunt. Igitur ea tametsi communia plurimū exeant, tamen inter prædicta infirmitatis causa dominari facile possunt.

De coctibili legumine, & incoctibili. Triticum bonam terram exposcere, ordeum uel in graciliore solo proficere. Cur stercoreari terram à faba putetur: item de semine quam spelta nunc dicimus: necnon de bromo, siligine, tīpha, auena, lolio, sesama. Cap. IX



Coctibile autem dici quidem de leguminibus tantummodo solet. Verruntamen & in frumentaceis idem, aut proximum euenire nō absq; ratione putaueris. Sed quoniam usus non idem sit, non æque percipi potest, neque in omnibus leguminibus ex æquo sentitur, sed præcipue in faba, & lente: seu quod hæc maiorem in modum affici apta sint, seu etiam, quod propter frequentiore usum magis appareant: largius itaq; fieri solet. Sunt enim loca permulta, quæ semper coctibilia ferant, & alia quæ incoctibilia. Sed omni quasi ex parte loca tenuia coctibilia potius reddunt. Cœli quoque conditio mutationem eiusmodi afferre nimirum potest: argumentum, quod eadem segetes aliàs coctibilia, aliàs incoctibilia reddant. Faba apud Philippos cum uentilatur, si ab afflatu incola perflatur, si coctibilis est, fit incoctibilis. Hæc igitur multifariam rem istam posse fieri monstrant, quandoquidem & segetum nonnullæ

contermina inter se, situmq; similem obtinentes, nec ullam telluris differētiā for-  
 tientes, non pari modo fructificant, sed hæc coctibilia, illa incoctibilia parit. Idq; agi-  
 tur etiam sulco tantū non nusquam segetes discernente. Fruitur potissimum terra  
 triticum, tum ordeum: quamobrem triticum terram bonæ frugis exposcit, ordeum  
 uel in graciliori solo proficere satis potest. Cicer inter legumina maxime terra potis-  
 tur, quamquam in ea minus temporis maneat. Faba (ut dictum est) cum aliâs mole-  
 sta minime est, tum etiam tellurem raritatis suæ, ac putredinis causa stercoreare pu-  
 tatur. Ob id qui circa Macedoniam atq; Thessaliam colunt, cum fabæ florent, arua  
 inuertere consueverunt. Inter ea quæ tritico, & ordeo similia constant ceu semen,  
 10 tiphā, siliginem, bromum, auenam, robustissimum, & maxime terram extenuās  
 semen redditur: quippe cū radix ei multiplex atq; alta, culmusq; numerosus cōstet:  
 sed fructus facilis, omnibusq; animalibus gratissimus est. Inter reliquas bromus  
 radice numerosiore consistit: is enim multis dispergitur culmis. Siligo prædictis mol-  
 lior atq; infirmior est. Tiphā omnium leuissima cōstat: nam & in simplici culmo assur-  
 git, & solo proinde tenui contenta est: nec ut semen, pingue, & latum desiderat.  
 Sunt illa duo, semen & tiphā perquam similia tritico: auena uero, & bromus ueluti  
 syluestria quædam, & immitia constant. Auena quoque terram uehementer exte-  
 nuat, & multiplici tum radice, tum calamo conditur. Lolium syluestre penitus est.  
 Omnium autē quæ æstiuis sementibus ager recipit, sesama terræ molestissima esse,  
 20 plurimumq; posse extenuare putatur, utpote quæ multipliciori, crassioriq; cala-  
 mo, & numerosiore consistet radice, quā milium. Sed quæ terræ, quæq; homini ra-  
 tione cibi facilia sentiamus, differre inter sese planē uidentur: quædam enim ē con-  
 trario facilia ueniūt, ut legumen, ut milium: adde si quid pro usu hominū facilitatem  
 ē diuerso, quā pro usu cæterorum animantium sortiri appareat.

De uitijis frugum, & bestiolis nocentibus: tum quæ fruges plurimum, & quæ minimum durent.  
 Item à rure rus, & cœlum à cœlo differre. Caput X



30 Eminum autem uitia quædam omnibus cōmunia ueniūt, ut rubigo:  
 quædam propria dantur quibusdam, ut tabitudo radices ciceri, & uri-  
 carum infestatio: alijs etiam pulicum bestiolearum erosio, nonnulla  
 etiā scabiæ, atq; salſugine pereunt, ut cuminum. Animalia uero si non  
 in ijs ipsis gignantur, sed extrinsecus ueniant, non æque officiunt. Na-  
 scitur enim in tritico cantharis, & in eruo phalangium, & in alijs alia genera. Rubi-  
 gines (ut simplicius loquar) in frumentaceis magis, quā leguminibus: inter fru-  
 mentacea ordeum magis, quā triticum sentit: & inter ordea aliud plus, aliud mi-  
 nus, sed præcipue dixerim achilleis. Nec segetum sitis, naturaq; parum refert: tra-  
 ctus enim excelsi, perflatq; rubiginem nullam, aut minimam sentiunt. Concaui  
 & flatibus nullis exposti contrā frequentissimam habent: gignitur hæc plenilunio.  
 Maxime intereunt uel afflatibus triticum atq; ordeum, cum aut florentia perflan-  
 40 tur, aut flore dimisso protinus infirma concutuntur: sed ordeum magis ita perire  
 certum est: sæpe etiam concrassescunt. Si uehementius, diutiusq; flatus inuaserunt,  
 exiccantur, & penitus inarescunt, quod quidam euentari dixerunt. Sol quoque ex  
 nube ambo ista interimit, sed triticum magis, quā ordeum: & ita ut quanquam  
 spica exinanita sit, usui tamen percipi minime possit. Triticū uel uermiculi enecant,  
 alijs protinus nascens erodentes radicitus, alijs cum squallentes absolui nequeunt:  
 tunc enim uermiculus culmum usque ad spicam erodit: dein alimēto consumpto,  
 emoritur. Et si totum erosif, triticum ipsum omnino interit: si uero alteram tantum-  
 modo culmi partem, frugemq; fundendā eatenus uiolauit, id quidem spica pereat  
 necesse est: reliquum autem incolume extat. Euenit hoc in tritico non omnibus lo-

cis, ut in Thessalia, sed paucis quibusdam, ut in Africa, & in Lelanto Euboeae. Verum miculi uel in ciceris, & cicerulis ipsis gignuntur, cum securis imbris calor repentinus humorem incluserit, quemadmodum in ciceribus nasci uricae solent. Qui autem alimenta sua consumpserint, tam in herbis quam in fructibus pereunt, ut imapes: & qui fabis, reliquisque innascuntur, ut de arboribus, & lignis retulimus: exceptis qui cerasae uocantur. Igitur ad haec omnia tractuum natura plurimum refert, nec temere: iam enim coelum diuersum caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate consistit: hoc autem fructus reddere, consummareque potissimo patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper fiunt. Seminibus autem non uis eadem ad germinandum, ac reseruandum utique datur. Quaedam enim germinant, consummaturque celerrime, & reseruari egregie possunt, ut panicum, & milium; quaedam germinant quidem, sed non celeriter, ceu faba, & praecipue quae coctibilibus. Pereunt celeriter aphaca, atque siliqua: ordeum celerius, quam triticum: & puluerulentum celerius, quam purgatum: & quod in horreis calce leuigatis conditum est, quam quod in non ita leuigatis. Corruptis itaque animalia propria gignuntur (ut dictum est) cicere excepto: id enim solum gignere animal nullum potest. Et putrescentibus quidem omnibus uermis consistit. Contusis autem sponte ut sit, singulatum proprium quiddam gignitur. Cicer, & eruum omnium maxime durat. Lupinum longe ipsi diuturnius est: sed hoc quodammodo pro syluestri habetur. Differt etiam rus a rure, & coelum a coelo ad seminum corruptionem, conseruationem uel: itaque apud Appolloniam maris Ionij fabam nullo pacto corrodiunt, ideoque reseruandam reponi. Quin & circa Cizicum diu durare potest. Metere quoque tosta plurimum ad diuturnitatem sane facit: sic enim humoris minus relinquitur. Metunt uetigiora legumina quidem, quod plus faciliusque legere possint: celeriter enim defluunt, & arefacta franguntur. Triticum uero, & quoddam ordeus genus non penitus exiccari patiuntur, quod ad reddendam farinam, meliora minus arefacta putantur. Qua de causa in acruos, tam triticum, quam ordeum componere assolent: uidetur enim in acruo crassescere potius, quam attenuari. Frumentum nequaquam corrodi potest, cum admissio imbre prouenerit. Triticum in spica nondum messum durare maxime potest: atque etiam magis lupinum: nec enim id metunt priusquam imber incesserit: quoniam inter metendum exiliat, atque ita pereat semen.

*Anniculum semen optimum ad sementem: de quo, lupino, & auena.*

*Caput XI*



De exortu autem, uniuersamque sementem, semen anniculum optimum putatur: bimum deterius, & trimum: quod autem ultra acceperis, sterile ferme est, quanquam ad usum cibarium idoneum consistet. Omnibus enim ad generandum uita data est definita: licet ea quoque uiribus inter sese differant, locorum scilicet causa, quibus condantur. Quamobrem Cappadociae loco quodam Petra uocato, uel quadragenos annos foecunda, & ad sementem percommoda durare proditum est: sexagenos autem & septuagenos ad usum cibarium seruari posse idonea. In totum enim corrupta ea nunquam referunt, quamuis uestem, reliquamque gazam, corrumpi posse concedant: locum etenim istum cum aliis excelsum, tum flatibus esse apertum: & auris ab exortu, occasu, meridieque auditum. Feruntque & in Media, reliquisque excelsis tractibus condita diu perdurare ualere. Sed cicer, lupinum, eruum, milium, & reliqua id genus longe diutius: quod etiam locis Graeciae fieri potest. Sed haec locorum propria sunt, ut supra iam diximus. Creditur & terram apud quosdam haberi, qua illud triticum seruari unice potest: ut quae apud Olynthum, & Euboeae apud Cerinthum effoditur. Reddit haec triticum deterius quidem ad usum cibarium, sed aspectu

aspectu crassius facit: sextarium ad modium illinire solitū est. Quodq; autē semen  
 feruefactum perit, ac sterile redditur: quāquam sunt, qui ordeum, & triticum apud  
 Babylonem resiliere in area, modo eorum quæ friguntur, enarrēt. Sedenim calor  
 differētia quādā profectō intelligi debet: & communia quidē hæc quasi omnium,  
 aut plurimorū appareant. Quædam uero ex ijs quæ syluestria quasi putātur, pro-  
 prietatem quandā tum in generatione tum in germinatione fortiri planē uidētur,  
 ut lupinum, atq; auena. Lupinum enim licet robustissimū sit, tamen nisi protinus  
 ab area terræ mandaueris, male proueniet, quemadmodum dictum est. Atq; in to-  
 tum condit hoc legumen subter terram recusat: qua de causā ne subarantes quidem  
 id serunt, & sæpe si in materiem, aut herbam prædensam quampiam incidat, eam  
 ui summa impellendo diducit, radiceq; terram contingit, & germinat. Solum are-  
 nosum & uitiosum potius poscit, atque in totum cultis prouenire non uult. Auena  
 ē diuerso: cultis enim melius hæc erumpit. Et non nusquam quæ prius germinis  
 infœcūda esset, si diligenter colatur, germinat, copiosaq; redditur. In totum, solum  
 hæc frugale desiderat. Peculiari uel illo à cæteris frumētaceis hæc discerni putatur,  
 quod annis alternis utrunque semen aptum sit prouenire. Quamobrem qui eam  
 delere penitus uolunt (deleri enim percontumax est) segetes annos duos laxant à  
 fatu: cumq; plene diffusa in herbam est, pecus sæpe impellunt, usq; dum penitus  
 depascatur. Idq; planissimum eius exitium sit, quod simul & alternatam eius gera-  
 minationem testatur.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI  
 OCTAVI FINIS.

THEOPHRASTI DE HISTORIA  
 PLANTARVM LIBER NONVS.

De humore & sapore plantarū: deq; gumma & lachryma: quodq; lachrymis & thus, & myrrha,  
 & balsamum, & mastica annumerētur: tum de cardui, pineæ, equatij, laserpitij, uitis lachryma.

Caput I



VMOR plantæ, quem nonnulli succum nomine publico ap-  
 pellāt, uires pro cuiusq; plantæ ratione fortitur. Sapor humo-  
 rem alium magis, alium minus cōsequitur: nec omnibus inesse  
 appareat, ita exilis, & dilutus quidam in plerisq; sentitur. Hu-  
 mor igitur plurimus omnibus, cum germinare incipiunt: sed  
 ualidissimus, maximeq; suam naturam ostendens, cum iam &  
 à germinatione, & à fructificatione cessarunt. Accidit uero, ut  
 uel proprium succi colorem plantæ nonnullæ fortiantur: alijs enim albus, ut la-  
 ctuosis: alijs sanguineus, ut ceuteriæ, & spinæ, quam agrestem fusum appellant:  
 alijs uiridis, alijs alius color: sed planius hoc in annuis, & anniculis, quā in ar-  
 borum genere. Humor autem ipse quibusdam crassitudine tantum consistit, ut la-  
 ctuosis: quibusdam etiam in lachrymæ modum gignitur, ut abieti, pino, terebin-  
 tho, larici, piceæ, amygdalæ, cerafo, pruno, iunipero, ulmo, spinæ ægyptiæ: nam ea  
 quoq; fert gummam, uerum non ex cortice, sed in uase. Adde illas, quæ thus, quæ  
 myrrham præstant: lachrymis enim hæc quoq; annumerātur. Ad hæc balsamum,  
 & chalbanam, & si quid aliud simile sit. Qualem etiam spinam Indicam reddunt, ex  
 qua illud myrrhæ simile gignitur. Consistit & in lentisco, & in spina ixina dicta la-  
 chryma, quæ mastica reddit. Hæc autē omnia & ferē quæcunq; aliqua pinguedi-  
 ne consent, odorata esse notantur: quæ contrā pinguedine carent, hæc sine odore

proueniunt, ut gummi, & amygdalæ lachryma. Quin & pinea carduus, quæ in Creta insula exit, habere lachrymam dicitur: & hirci spinam appellatam addunt. Hæc antea nasci tantum in Creta putabatur, nunc uero in Achaia etiam Peloponnesi, & alijs locis, & Asia circa Mediam comperiri certum est. Et eorum quidem omnium lachryma in caulibus, caudicibus, ramisq; consistit: quorundam autem in radicibus, ut equapij, & scammonia, & aliorum multorum uim medicam generant. Nec desunt quæ tum in radice, tum in caule habeant: caulem enim & radicem nonnullorum liquare cōsueuere, ut etiam laseris. Ergo equapij lachryma myrrhæ similis constat: quamobrem cum quidā hinc nasci myrrham audiuisent, equapium apud se prouenire putarunt. Seritur equapium etiam sua lachryma, ut lilium, & alia quædam. Laserpitij lachryma gustu uehemens modo ipsius laserpitij constat. Quod enim laser uocant, lachryma est. Scammonia & reliqua huiusmodi, uim medicam (ut retulimus) sortiuntur. Ex prædictis autem omnibus, alia sponte consistunt, alia incisura, alia modo utroq;. Cæsura scilicet capiuntur quæ utilia, magisq; operapreciū sunt. Quapropter amygdalæ lachrymam nullus extrahit, nulla enim in re utilis esse potest. Quibus concretio sponte consistit, his fluxus humoris largior prodit. Non eodem tempore omnium incisuræ atque concretiones notantur. Sed uitis lachrymam consistere potissimo aiunt, si paulo ante germinationem cadatur. Autumno uero & hyeme incipiente, minus. Quanquam ad fructificandū, & tempestiue quidem, maiore ex parte tempora illa statuuntur.

20

De cæsura ad resinam, quoq; modo resina fiat. Item de pice.

## Caput II



Erebinthum & pinum, & si quæ resinam aliæ faciant, cadendas post germinationem affirmant. Ad summam, cæsura earum, non annua, sed post plus temporis fieri solet. Thus atq; myrrham sub Cane, feruentissimisq; diebus incidi referunt. Sic & balsamum quod in Syria nascitur. Sed diligentior, parcioreq; cæsura eorum infertur. Humoris enim confluuium parcius accedit. Quorum autem & caulis, & radix inciditur, horum caulis antea ferrum recipit, ceu laseris. Eorum deniq; succum alterū cauliam, alterū radiciam uocant: præstantior radicias est: purus enim, translucidus, & ficior, caulias uero humidior, & ideo farinam ei inspergunt, ut satis coagulari possit. Incisura tempus idoneum Pœni nouere. Laser enim illis legendum natura largita est. Quin & radicem cæsores, & qui succos medicos legunt, caules liquare antea solent. Ad plenum uero, & qui radices, & qui succos legant, omnes tempus suum cuiq; obseruant: ergo commune id esse omnium constat. Resina uero in hunc modum fieri solita est. In pino quidem ubi iam uulnerata arbore, teda detracta est, resinam hauriunt, sicut enim in uulnus inuectum, humor copiosior confluit: in abiete uero, & picea cum lignis degustatis uulnus intulerint: haud enim quanq; secretionē modo eodem agi mos est. Vulnerant enim & terebinthos parte utraq;, caudice scilicet & ramo, sed copiosior & melior, quæ in caudicem defluit. Differunt etiam arborum ratione. Optima enim quæ ex terebintho, spissa nanq; & leuissima, & odore gratissima est, uerum pauca: secunda quæ ex abiete & larice, & picea, leuior enim, quam quæ ex pino. Copiosissima, & ponderosissima, & picosissima, quæ ex pino: teda enim pinus referta est. Portatur utribus liquida, dein sponte, quo nūc cernitur modo, spissatur. Quanquam terebinthum etiam picem apud Syros largiri affirmant. Est enim mons (ut inter superiora retulimus) ingens, terebinthis amplissimis totus repletus. Quidam & piceam, & cedrum, & palmam addunt. Sed hoc quia rarum, pro contingente potius accipi debet: nam qui Macedoniam colunt, ne pinum quidem picis gratia urunt, præterquam marem. Sterilem enim marem nuncupant. For-

minæ

minæ uero radicem tantū accipiunt. Omnis etenim pinus tedam radice ingerit. Pix optima purissimaq̃, quam loca admodū aprica, & aquilonia præbent: cōtrā quam opaca, horridior limumq̃ referens: locis enim admodum depressis atq̃ opacis, nec ullo quidem pacto pinus exire potest. Est præterea sterilitas quædā fertilitasq̃ tum copiarum tum bonitatis: quippe cum mediocri hyeme copiosa, & bona, & colore candidior reddatur, aspera uero pauca atque deteriori: quæ quidem copiam & bonitatem picis definiunt. Non larga fructificatio pinorum. Idæi qui pinos discernunt, & aliam idæam, aliam marinam cognominant, picem fieri aiunt ex idæa largiorem, nigriorem, dulciorem, in totumq̃ faciliorem, & odore gratiorem, dum cruda sit, de-  
 10 cocta enim in minus contrahi, quoniā plus habeat seri: quam obrem etiā tenuiorem hanc esse addunt. Ex marina autem flauiores & crassiores, scilicet crudam, ita ut decoctio minus auferat. Sed tedatiorem idæam tradunt (utq̃ simplicius loquar) tantundem tedæ, plus dilutius picis imbribus frequentatis, quam squaloribus reddere uolunt: & ex hybernis, opacisq̃ locis plusquam ex apricis, serenisq̃. Hæc igitur ita Idæi atq̃ Macedones asserunt. Repletur caua plagarum, uidelicet in tantum, ut iterum pix extrahi possit. Frugalis pini, anno proximo, mediocris: secundo, uitiosior: tertio, repletio non coitu ligni, sed incremento picis conficitur: lignum enim in hac  
 20 arbore coire, iterumq̃ unum refici nequit, sed cōfectio quidem picis reddi post tantum temporis solet: necesse autē ligni quoq̃ agnationem fieri quandam. Siquidem detracta, deustaq̃ teda, effluuium euenire picis solitum est. Id igitur accipi ita decet. Idæi ubi arboris caudicem cortice dispoliarint, quod parte solari, binis aut ternis a terra cubitis facere consueuerunt, confluxum istuc fieri non sine teda uno cum plurimum anno affirmant. Idq̃ cum securi detraxerint, secundo iterum anno teda locum expleri, & tertio pari modo. Posthac ob eam paulatim incisuram arborem extenuatam, putrefactamq̃, humi facile a flatu prosterni, tum eius cor extrahi (hoc enim tedam maxime præfert) necnon & radicē effodi: hanc enim omnibus tedam consistare, ut diximus, sed hac in re probas quidem (ut dictum est) crebrius uulnus accipere, deteriores uero longiori tempore possit, & parte aliqua reseruata, plus temporis resistere posse. Tota uero detracta minus cōsentaneum prorsus est, ternas  
 30 men detractioes eiusmodi maxime arbores tolerare posse uidentur: non simul & fructificat & tedificat pinus, sed protinus nouella fructificat, multo autem post facta uetustior tedificat.

Quemadmodum pix uratur, fiantq̃ carbones. Item de thure & myrrha. Caput III



Item urere hunc in modum consueuerunt: cum locum æqualem præparauerint, & ueluti area facta concursum habente, in medium diligenter pauimentarint, truncos persillos componunt: proxime sanē compositioni carbonem faciendum, præterquam quod sine fossa opus perficiunt, lignis erectis, & inter se coherentibus, ita ut altitudinem  
 40 assidue pro multitudine capiant. Quos fieri aiunt cum compositionem descripserunt circuitu centenorum octuagenorum cubitorum: altitudine uero cum plurimum sexagenorum, aut centenorum & quinquagenorum ambabus, si teda pinguis sit. Cum igitur tedam ita construxerint, & materiam pertexerint, aliqua terra superinfusa undiq̃, summa cum diligentia occultant, ut ignis nulla ex parte emicare possit. Pix enim peribit, si id acciderit. Succedunt autē per aditū relictum: dein eam quoque partem stipant materie, & obstruunt terra: reliquasq̃ omnes obseruant, & quacuncq̃ sumum protrudi uiderint, scalis scandentes, terram assidue infundunt, quo nullo pacto flamma erumpere possit. Canalis uero per medium structus acruum, picem fluentem in foueam ducit, cubitis circiter quindecim ab



aceruo. Pix effluēs tactu frigida fit. Vritur duos dies, & totidem noctes cum plurimum: sæpe enim postridie ante solis occasum exusta iam est, rogusq; cessit. Id enim euenit cum nihil reliquum est, quod amplius fluat. Totum autē tempus, quo teda uritur, uigilantes obseruāt, ne quid ignis erumpat, & sacrificant atq; concelebrant precantes, ut pix sibi copiosa, bonaq; benignitate fiat deorum. Macedones hoc modo urere assolent. In Asia uero Syros non detrudere tedam aiunt, sed in arbore ipsa adurere instrumento inuecto quodam industrie fabricato: hoc enim partem unam accendi, qua liquefacta, aliam atq; aliam uice pari successione ignem recipere. Finis autem operis, & cessandi indicium, cum scilicet nihil defluit. Terebinthos illi (ut superius exposuimus) urunt: pinum enim nequaquam Syria fert. Refina & pix hoc modo fieri solēt. De thure, & myrrha, & balsamo, & si quid aliud simile cōfiter, tam incisura quam sponte prodire posse, dictum iam est. Nunc quæ in ortu, collectur, reliquisq; propria eorum possint intelligi, explicare tentabimus: & reliqua quoq; odorata quoad fieri possit, persequemur: quæ omnia uel maxima quidem ex parte locis meridiei orientiq; datis, proueniunt.

*Vbi thus, myrrha, casia, cinamomum gignantur. Item arborem thuris omnem penitus aspersari cultum.*

*Caput IIII*



Ignitur ergo thus, & myrrha, & casia, & cinamomum regione Arabi media, circa Saba & Adramyta, & Citibana, & Mamali: & exeūt 25  
thuris, myrrhaq; arbores, aliæ super mōtem, aliæ in pede montis culturis proprijs: quamobrem aliæ coluntur, aliæ uitam agunt incultæ. Montem istum præaltum affirmant, & ningi solitum: amnes quoque de eo in plana fluere. Arborem thuris non magnam, sed quinis ferē cubitis attolli, permultosq; ramos gerere ferunt: folium piri, nisi quod multo minus, & colore plenè herbidum modo rutæ, corticem leuem omni ex parte, lauri modo. Myrrham minorem etiam altitudine, fruticosioremq; narrant, caudice duro, contortoq; iuxta terrā, crassiori q; sura hominis, cortice leui, similiq; porulacæ: alij uero qui se uidisse affirmant, de magnitudine fermè cōsentiunt. Neutram earum arborum magnam referūt, & minorem myrrhæ, humidiorēq;. Sed thuris folium laurinum, leueq; 35  
Myrrhæ aculeatum, non leue, ulmeo simile: crispum tamen, extremò spina horridulum, ilignei modo. Idem ea navigatione, qua ex sinu Heroum uehemēter egresfos sese aquam in monte quæsisse dixere, atq; ita uidisse has arbores, & lectionem notasse hoc modo ambarum: & caudices, & ramos incisos quidem, sed alios ueluti securi percussos uideri, alios tenuiores incisuras habere: & lachrymam aliam decidere, aliam arbori inhaerere: nonnunquam etiam subiectas tegetes ex palmis contextas, alibi solum tantūmodo circumpauimētatum & purum. Thus quod tegete exciperetur purum esse atque perlucidum: quod terra, minus: quod arboribus inhaereret ferro depecti, & corticem ideo nonnullis adiungi. Montem autem uniuersum Sabæis diuisum dixere: hos enim loci illius dominos esse, iustitiaq; mutua de 49  
gere, quamobrem nullum suas arbores custodire: unde & thus, myrrhamq; sese lar ge ad naues solitudine deportasse narrant. Illud quoque iisdem se audiuisse dixere, myrrham, thusq; collectum undique ad Solis delubrum conuehi, quod Sabæorum esse sanctissimum inter omnia regionis illius: custodesq; Arabes armatos habere, quibus singulos suum thus aceruatum, & myrrham eodē modo relinquere, posita super aceruum tabella, literis significante numerum mensurarum & precium, quod pro singulis mensuris ponendum sit. Mercatores uero qui uenerint tabellas aduertere, eiusq; quod placuerit acta mensura precium in eodem ponere loco, unde merces acceperint: sacerdotem deinde uenire, parteq; tertia precij deo accepta,

accepta, reliquum ibidē relinquere: idēq; seruari tutissime dominis, donec acceptum uenerint. Alij thuris arborem lentisco similem prodidere, & fructum quoque lentisci, folium subrutilum. Thus recentium arborum candidius esse, minusq; odoratum: ueterum flauius, odoratiusq;. Myrrhæ autem arborem terebintho similem reddidere, sed scabriorem, spinosioyemq;: folium paulò rotundius, gustatu proximum terebintho. Earum quoq; ueteres præstantiores haberi. Ambas uero nasci in eodem loco terra subargilia & sabulosa, & aquas fonte fluentes raras admodū comperiri. Hæc ergo illis repugnant, uidelicet ningi, & imbribus perui, & amnibus locum illum exhilarari. Arborum tamen istam similem terebintho constare quidam alij tradunt: nec desunt qui terebinthum eam esse omnino putēt. Arabes enim qui thus aduexere, ligna huius arboris Antigono attulisse aiunt, quæ nihil à terebintho differrent. Sed hi quidem altera quoq; ignorantia quidem longe maiore laborarunt: thus enim & myrrham nasci ex eadem arbore putauerunt. Quamobrem uerisimilius illi narrarūt, quos ex Heroum oppido profectos nauiretulimus. Nam & arbos thuris, quæ super Sardes, apud delubrum quoddam surrexit, fronde lauri constar. Siquidem ex eadem ducere argumentum conueniat, quoniam eius thus tam quod caudice, quàm quod ramis excerpitur, proximum & uisu, & odoratu, cum ardet, aduectio thuri percipitur. Sola hæc arbos omnē penitus cultum apta est aspernari: ac suauius quidē thus in Arabia nasci referunt, sed melius in uicinis insulis, in his enim & figurari in arbore posse, qua forma uolueris: & fortasse id quidem haud quicquam incredibile sit. Siquidem pro incisura facta, figura thuris sequatur necesse est. Quoddam adeò magna gleba consistit, ut mole sua manū implere, ponere uero plusquam tertiam partem minæ æquare possit. Thus omne iners aduehitur, & aspectu cortici simile est. Myrrhæ, aliud stillatitium, aliud fictitium constar. Probatior melior gustu, eiusq; norma concolorem accipiunt. De thure & myrrhæ hæc ferē ad hoc usq; tempus accepimus.

De cinamomo & casia: tum quid de cinamomo colligendo fabulenur.

Caput V

**D**E cinamomo & casia illa narrant: fruticem esse utrunq; non amplum, sed magnitudine amerinæ: uerum permultis, furculosisq; ramis consistare. Cinamomum decerptū in quinas partes discerni, & esse præcipue bonitatis, quod germinibus proximum fuerit, idēq; ad palmi longitudinem cedi, aut paulò maius: secundū quod sequitur, quod etiam minus cæsura est: tertium deinde, & quartum notatur: ultimum uero, quod deterimum proximumq; radici: hoc enim minimum corticis habet, in quo summa gratia est, nō in ligno. Qua de causa præferri cacumina solent, quod corticis plurimum habeant. Quidam sic aiunt. Alij uero cinamomum fruticosum enarrant, eiusq; genera duo: alterum nigrum, alterum candidum. Fertur & fabula quadam. Conualibus enim exire id aiunt, in ijsq; serpentes plurimos cōuersari morsum hominibus mortiferum inferentes, aduersum quos incolas septis manibus pedibusq; descendere, atq; ita legere cinamomum, quod cum deportauerint, toto in ternas partes diuiso, quodq; ad solem forte illi cesserit, id solum relinquere, abeuntesq; flagrans sponte illud confestim cernere. Sed hoc planē fabula est. Casiam uero sarmento crassiori constare, neruosamq; admodum esse uolunt, nec ullo pacto posse decorificari, ac eius etiam corticem esse utilem. Cum itaque uirgas secant, longitudine binum digitorū, aut paulò ampliores abscindere, recentēq; bouis corio eas persuere, tum ex eo lignis putrescentibus uermiculos nasci, qui lignum erodant: corticem uero nullatenus tangant ob amaritudinem, acrimoniamq; odoris. De casia, cinamomoq; hæc referunt.

De balsamo, quodq; non nisi uitiatum ad nos perferatur.

Caput VI



Balsamum in ualle Syriæ prouenit. Eius arbutta duo tantū affirmant, alterum uiginti iugerum, alterum multo minus. Arboris magnitudo, quæ mælo punica magnæ: rami multi, folium rutæ simile, candidum tamen, perpetuò uiuens: fructus similis terebintho tam magnitudine quàm colore. Is quoq; admodum odoratus est, & magis quàm lachryma. Colligi lachrymam in caudice, & parte superna tradunt: facta incisura unguibus ferreis, sub sydere, cum æstus maxime angit: collectum uero æstate fieri tota, sed quod manat multum nō esse: uix enim in toto die concham posse impleri. Odo-  
rem tamen inferri eximium & copiosum, adeò ut ex paruo spaciū perlongum  
odor ualeat permeare: uerum syncerum ad nos nullum aduehi, sed quod mistum  
colligitur: pluribus enim mitionibus uitari, quodq; Græciæ uenditur, sæpe adulte-  
rari. Quin & uirgas eiusdem arboris odorem suauissimum præstare affirmant. Et  
quidem eas quoq; amputari quotannis: partim ut reliqua ualentiora seruetur, par-  
tim ut emolumentū pius comparetur: uendī nanque uel eas magno precio posse.  
Quinetiam ad imbrem cultus eiusmodi causam referunt, quem crebrò incidere as-  
seuerant: necnon & amputationem uirgarum causam nōnullam adijciunt, ne ma-  
gnæ arbores fiant: sequi enim ex crebra tonsura, ut uirgæ tantummodo mittātur,  
nec intendi ad unum uires arboris possint. Syluestre balsamū nullum usquam com-  
pertum accepimus. Impleri ex maiori orto uasa semichœa duodecim aut, ex altero  
uero duo tantū: uendi syncerum argento ad drachmam, reliquum pro modo adul-  
terationis. Et balsamum quidem præcipuam quandam in odore naturā protulit.

De calamo odorato, & iūco, & chalbano, comaco, cardamomo, amomo, quodq; hæc ferè sint quibus  
utuntur ad unguenta, casia, cinamomum, cardamomum, nardus, nerum, balsamum, aspalathus,  
styrax, consecratrix, narta, costus, ligusticum, crocum, myrrha, gladiolus, iuncus, calamus, san-  
sucum, lotus, anethum. Item de Iride illlyrica.

Caput VII



Calamus uero & iuncus trans Libanum montem, inter ipsum Liba-  
num, & alium quendam montem parū ualle minima exeunt. Non  
ut quidā dixere inter Libanū atq; Antilibanum, inter quos campus  
amplissimus, & pulcherrimus est, quem Aulonem appellāt. Qua ue-  
ro calamus, & iuncus proueniūt, lacus in amplum spaciatur, iuxtaq;  
eum palustribus siccatis isti assurgūt. Occupāt locum plusquam triginta stadia. Vi-  
rides nequaquam esse uidetur, sed sicci: forma uero nihil ab alijs differunt. Locum  
ingredienti protinus odor aspirat, non tamen longius spirat, ut quidam referunt:  
hic enim locus à mari plus est, quàm stadia centū quinquaginta. Sed in Arabia spi-  
rationē agri odoratissimā esse inter omnes cōstat. Quæ in Syria odore superuacuo  
sunt, hæc ferè notata habemus. Chalbani enim grauius olet, & medicina potius  
conuenit. Id nanq; in Syria nascitur ex Paco uocato. Cætera autē odorata, quorum  
in unguentis usus, partim ex India Syris aduehūtur, ac inde mittūtur ad mare: par-  
tim ex Arabia deportantur, ut cinamomū & casia: atq; etiā comacum: fructum hoc  
aliū esse, quem unguētis permiscere sumptuosissimis solent. Cardamomum atq;  
amomum alijs ex Mediā, alijs ex Indiā, cum nardo, & reliquis omnibus, aut plurimis  
aduehi narrāt. Quibus ad unguēta utuntur hæc ferè sunt: Casia, cinamomū, carda-  
momum, nardus, nerū, balsamū, aspalathus, styrax, consecratrix, narta, costus, ligu-  
sticum, crocum, myrrha, gladiolus, iuncus, calamus, sanfucū, lotus, anethū. Horum  
alia radices, alia cortices, alia rami, alia ligna, alia semina, alia lachrymæ, alia flores. Et  
quædam multis in locis proueniūt, quædā in Asia tantū, & locis apricis, quæ scilicet  
supuacua maxime atq; odoratissima sunt, quippe cum in Europa nihil præter con-  
secraticem

fecraticem inueneris, quæ optima apud Illyrios exit, nō tamen parte maritima, sed mediterranea, magisq; ad septentrionē sita. Verū loci à locis differunt, ita ut producere meliorē possint. Cultus nullus ei accommodatur, nisi quod ablaqueatam soleant resiccare: radiculæ enim quas Thracia fert, uidelicet, quæ odoris nardo similis est, & aliæ quædā paruum, exilemq; odoris gratiam habēt. Atq; de odoratis hæc tenus.

De succis, & quando, & quomodo fiat succatio, & radicidium, necnon lactisuccatio, & liquatio.

## Caput VIII

**D**E succis quæ superius non diximus, uidelicet .. qui medicī, aut alias quasdā vires sortiatur, nunc pari modo explicare conabimur, simulq; de radicibus differemus. Succorū enim nonnullos premi ex radicibus certū est, & seorsum ipsæ per se multas, atq; cōtrarias vires possident. Ad summam, de omnibus medicamentis, seu fructu, succo, folio, radice, herba (nam herbas quoq; ex medicamētis quædā, herbarij nominant) uerba, quoad satis sit, faciemus. Radicum autē plures potentia, & ad plura sunt. Quæritur autem m... potissimum, ut utilissimæ: differētes, & quod non ad eadem, & quod nō in eisdem uim habeāt. In uniuersum uero & in se habent, & in fructibus, & succis, nōnullæ & in folijs: foliorum quippe vires plurimas, herbas ferē herbarij dictum est) uocant. Radicū lactuosarum succatio æstate semper ferē agitur, parum ineunte, parim prorecta: sed radicidium quāquam etiā fieri per mensem tritici aliqua ex parte non negent, tamen large autumno post arcturū facitari affirmant, scilicet postquam folia defluerunt, & quorū fructus utilis sit prius, quā fructum amiserint. Fieri autē lactisuccatio solet, aut ē caulibus, ut lactariæ, & lactuæ, & partis ferē maximæ: aut ē radicibus, aut ē tertio capite, ut papaueris: huic enim soli peculiaris: quoq; datur. Ergo quibusdam sponte succus consilit, spissaturq; lachrymæ modus, ut in hirci spina appellata: hanc enim cedere opus nequaquam est. At plurimorum succi per incisuram manent necesse est: quorum nōnullos statim in uasa colligit, sicut lactariæ, siue lactuæ caprinæ: uocatur hoc enim etiam nomine. Atq; in totum, quibus lactis copia sit, quibus autē minus, lana eorum succus excipitur, ut lactuæ. Quorūdam non lactisuccatio, sed uelunliquatio fieri solet, ut quæ urentes, aut torrentes, aquamq; infundentes exprimunt, atq; ita stillamentum accipiūt. Enim uero minus liquoris, idq; siccum hæc habēt. Est cæterarum quidem radicum liquamentum fructu infirmius, ac cicuta ualidius, & obitum facile, breuiq; affert, etiam si exiguum admodum porui detur. Quin & ad alios usus efficax isdem est, thapsiæ quoq; ualidius. Reliqua autem omnia debiliora longe deprehenduntur. Succatio tot ferē modis fieri solet. Radicidij uero differētia nulla eiusmodi redditur præterquam temporis ratione, ut æstate, aut autumno, & quod has aut illas succidi oporteat: exempli gratia: Ellebori imas, atq; tenuiores, supernā enim in caput extruberantem, inutilem asserūt, & canibus dandam cum purgandum est. Et in alijs uero quibusdam differētijs tales assignant.

Quid herbarij præcipiāt secādis, colligēdisq; herbis: tum secando precandū deos: quidq; in precatōne absurdū atq; in sectione adiectitium, ut de cauēda aquila, quod periculū secātibus imminet.

## Caput IX

**A**DDE quæ medicamētarij & herbarij partim forsitan recte, partim quod rem suam ostentent ac prædicent, adiungunt: præcipiunt enim alias uento auerso secare sicuti & alias quasdā & thapsiam, corpore oleo peruncto: nam si aduerso, corpus tumescere aiunt. Fructū quoq; caninæ sentis, flatu auerso colligendum censent, alioqui periculum oculis imminere. Alias noctu accipere iubent, alias interdū, nonnullas priusquam sol irradiet, ut quod uolucrum appellant. Et hæc quidem, hisq; similia, nō ab re didi

fortasse putaueris. Sunt enim quæ uires nocuas fortirentur, quemadmodum & ueratrum incendere, & ignis modo urere aiunt. Mox caput aggrauat, nec diu effodere illud possunt. Qua de causa priusquam fodere adorsi sint, allia comedere, & uinum subinde forbere consueuerunt. At illa ueluti adiectitia, & è longinquo ducta appareant: castam enim, quam alij dulcisidam uocant, noctu effodiendam præcipiunt: nam si interdiu, & à pico martio uisus quispiam sit fructum quidem legēs, oculis periclitabitur, radicem autem secans sedem procideret. Febrifugiam quoque secantes accipitrem tritescigerum nuncupatum cauere, ut sine uulnere possint discedere, & alia huiusmodi quibusdam alijs notant. Precari autem in secādo haud quicquam absurdum fortasse sit. Sed quæ addūt, absurda potius dixeris. Panacem enim æsculapieam cognominatam effodientes uarium genus frugum uicissim terræ iniungere aiunt, & placentas ueluti mercedem quandam exoluere, & ense bina adacto acie ter circumscribentes succidere: quodq; primum inciderint, sublime tenere: deinde alterum cedere, & eiusmodi alia complura enarrant. Mandragoram quoque ense ter circumscribere iubent: & alterum succidere ad occasum spectando, alterum circumsaltare, plurimaq; de re uenerea dicere, quod maledictis, & execrationibus sanè proximum est, quas fatui cumini necessarias putant. Quin & elleborum nigrum circumscribere spectando exortum, precandoq; cauereq; aquilam tam à dextra, quam à sinistra: periculum enim secantibus imminere aiunt: & si aquila propè aduolauerit, moriturum illo anno, qui succidit, augurium esse. Sed hæc planè adiectitia quædam uidentur, ut dictum est. Modus autem radicidij præter prædictos nullus alius datur.

De medicinis ellebori, panacis, tuberis terræ, cucumeris syluestris, trisaginis, caricæ sue piri, & aliorum quorundam.

Caput X



Vnt uero (uti retulimus) quorundam omnia commoda, & radix, & fructus, ut scamoniæ, & tuberis terræ, & thapsiæ, & aliorum quorundam. Nam & mādragoræ folium utile ad ulcera cum farina tradunt. Radicem ad erysipelas rasam & aceto subactam, & ad morbos podagricos, & ad somnum, atq; amores datur ex uino, aut aceto. Consecant eius quoque orbiculos sicuti radiculæ, quos transfixos in fumo suspendunt. Elleborum ad hæc eadem non solum radice, sed etiam fructu utile est. Siquidem in Anticyra (ut fertur) fructu eius purgantur, quem sesamaceum fert. Panacis quoq; pleraq; assignantur commoda, nec omnia ad idem fructus, sed ad abortus, & distentiones, & eiusmodi genera dolorum, item ad aures, & uocis languorem. Radix ad partus, & mulierum profluvia, & ad iumentorum morbos, necnon ad irinum uentum utilis, addit enim suauem olentiā, sed fructus radice ualidior est. Nascitur circa Syriam, fecatur per messē tritici. Tuberis terræ radix ad exhalationes inflammationum ualeat, & ad menstrua, & ad ulcera ex melle: succus ad caput purgandum illitus, & ad ebrietatem, si sparsus in uino potus des. Radix etiam ad partuum celeritatem appensa benefica est, & ad amores cum eam suffoderint, uino deinde subigunt, inq; passillos digerunt, sicuti fecis uini, qua maculæ absterguntur. Cucumeris syluestris radix utiliginem, & scabiem pecudum tollit: semen uero liquidum, medicamen elaterium uocatum, id est agitatoriu facit. Legitur autumno, tunc enim optimum est. Trisaginis folia ad rupta & uulnera in oleo trita ualent, & ad depascentia ulcera: fructus bilem extrahit, & oculis quoq; beneficus est: folium ad albugines tritum in oleo prodest: habet hæc herba folia quercus, & statura uix palmum excedit, & odorata atq; suauis est, sed partes quidē omnes herbe eiusdem nime ad idem utiles fore, haud quicquam absurdū fortasse appareat. Radicis uero eiusdem

eiusdem partem unam superius, alteram inferius purgare profectò mirabilis sit, ut thapsiæ, & carica, quam alij pirum appellant, & roris marini: idem tam inferius, quam superius extrahere posse, ceu elaterium, nequaquam absolum dixeris. Habet thapsia folium fœniculo simile, latius tamen: caulem ferulaceum: radicem candidam. Carica siue pirus folio constat rutaceo breui, caulibus ternis, aut quaternis humi prostratis: radice, qua albucum, uerum squamosa. Legitur Vere. Id igitur prædictis datur peculiare.

Elleborum nigrum, & candidum esse: deq; eius ui, & natura.

Caput XI

**E**lleborus uero niger, & candidus, ueluti æquiuoce dici apparet, sed de facie uaria sententia est: alij enim similes esse aiunt, præterquam quod radices colore inter se differant: esse namq; alterius candidam, alterius nigram: alij folium nigri laureum, candidi porraceum reddunt: radices autem similes, colore excepto. Qui similes dicunt, formam huiusmodi tradunt. Caulem modo propè albuci, sed longe breuiorem: folia continuo radice annexa, sparsaq; humi: radicem large multiplicè, quæ scilicet prætenues consent, atque utiles sint: nigrum equos, boues, suesq; necare affirmant, & idcirco eum cauere: candido pecudes nimirum uesti. Atq; hinc primo uim deprehensam, cum illo pecudes purgaretur: tempestiuus autumno, Vere autem in tempestiuus. Verum Oetæ montis incolæ prope Pilæam eo tempore legunt plurimum enim, optimusq; eo prouenit loco: non tamen ubique, sed parte una tantummodo Oetæ, quam pyram uocant: miscetur in potione, ut uomitio bene succedat elleborinæ semen: hæc herbuia quædam est. Niger ubique nascitur: nam & in Bœotia, & Eubœa, & multis alijs locis: sed optimus Helicone, ac in totum is mons medicaminibus laudatur: at candidus locis paucissimis exit. Optimi uero & usitatissimi quatuor sunt, cætæus, ponticus, eleaticus, massalioticus: nasci eleaticum inter uites aiunt, & uinum usq; adeò reddere prouocans urinam, ut omnes qui bibunt graciles admodum uentre adducto efficiantur. Omnium tam eorum, quam reliquorum optimus est cætæus. Parnasius uero & ætolicus, eo quoque in loco proueniunt, & quidē multi & emunt & uendunt ignari duritatis, summæq; difficultatis eorum. Hæc igitur quanquam forma conueniant, uires tamen proprias sortiuntur. Nigrum uero ab eo qui comperit, & primo succidit, melampodium quidā appellant, quo & domos lustrant, & pecora purgāt, quadam cum incantatione, atq; ad alia complura utuntur.

Panacis plura esse genera, uesticariarum uero duo: deq; lactariarum, & roris marini generibus, & medicinis eorum.

Caput XII

**P**anacis quoq; & lactariæ, & aliorum quorundam genus multiplex redditur. Panacem enim appellant primam, quæ in Syria nascitur, de qua paulò ante retulimus: secundam chironiam, tertiam æsculapiæam, quartam herculanam. Chironia folium habet simile rumici, florem auri specie, radicem longam. Amat loca pinguis: utuntur ea aduersus uiperas & phalangias, & tineas uestium, & cætera reptilia data ex uino, & uncta oleo: uiperæ autē morfui aspergitur ex acido uino, & potui datur: ualere aiunt & ad ulcera ex uino, & oleo, & ad nascētia ex melle. Aesculapieum radice constat magnitudine palmi, candida & crassa uehementer, cortice crasso & falso, caule geniculato undiq; folio thapsiæ simili, sed crassiori: ualere aiunt aduersus serpentes, si bibatur erasum, & ad lienem, cum sanguis circa eam cōstitit ex mulso, & capiti tritum ex oleo, & unctum, & si qua alia parte obscura laboret quis, & uentris

doloribus ex uino rasum: posse etiam & longas ægritudines depellere. Insuper & ulcerosis humidis quidem siccum aspersum, prælotumq; uino calido: siccis autem ex uino subactum, & aspersum. Herculana uero constat folio magno, & amplo, ut quoquo uersus tres palmos perficiat, radice crassitudine propè digiti, bifida, aut trifida, gustu subamara, odoratu syncerum thus redolente, utili contra morbum committalem pota, coagulo uituli marini admisto, ad quartā partem: & contra tormina ē uino dulci: commoda etiam ad uulnera sicca, ex melle ad madida. Igitur hæc differentias illas fortuitur. Sunt autem uel aliæ quædam panaces, una folio tenui, altera non tenui, sed uires hisce ambabus eadem ad mulierum profluuia, & ulcera tam cetera, quàm putria, & pascencia. Quin & uesticarias, atq; lactarias nominis tantum 10 confortes uidere licet. Vescicariarum enim genera duo: alterum somnificum radice rubra, sanguinis modo, sed candida cum siccescit, fructu rubriore, grano iligneo, folio lactariæ simili, aut maiō dulci, sed piloso: huius corticem radice tundentes admodum, & in uino meraculo madefacientes dant, atq; ita dormire faciunt: nascitur rupibus, & faucibus, atq; sepulchris. Alterum genus insanire facit, id alijs bryorem uocant, alijs perissum: constat radice candida, & longa ad cubitum, atq; caua. Dabitur eius radice drachmæ pondus, si ut quis ludat, scq; pulcherrimum putet, placuerit. At si magis insaniat uis, drachmis duabus opus est: sin autem nūquam insania solui malueris, tres dabis: & quatuor, si interimēdum sit. Habet foliū erucæ proximum, maius tamen: caulem longitudine ferè quatuor cubitorum: caput gethyi, sed maius, atq; pilosius: nec fructui plantani ab simile constat. Lactariarum, quod maritimum granum appellant, folio est rotundo, caule, totaq; magnitudine ad palmum, fructu candido: demittitur cum uua nigrescere incipit, & siccatus fructus tritus potui datur acerbuli tertia parte: mascula autem uocitata, oleæ folio constat, & magnitudine cubitum æquat: huius lac cum uindemia incipit, exprimunt, & præparato utitur: purgat inferius. Myrtaria uero cognominata candida, lactaria est, folijs myrti condita, uerum aculeatis parte postrema, farmētula in terram demittens longitudine palmi, quæ non simul, sed alternatis annis fructificant, alia hoc anno, alia postero, quanquam omnia eadem radice exorta: loca montuosa desiderat: fructus nux appellatur, demittitur cum ordeum turgescit, & exiccatus, purgatusq; datur 15 elotus cum papaueris nigri duabus partibus, ita ut totū modo acerbuli sit. Trahit pituitam per aluum: at uero si nucē ipsam placeat dare, trita dabitur ex uino dulci, aut cum sesama tosta, torrefactaq; comedēda. Ergo hæc folijs, succis, fructibus utilia cōstant. Roris autē marini genera duo, alterum sterile, alterū fertile: & alterum tam fructu, quàm folio utile, alterum tantum radice: fructus canchris uocatur. Habet id fructiferum genus folium palustri apio simile, sed multo maius: caulem ad magnitudinem cubiti, aut maiorem: radicem magnam, crassam, candidam, & ueluti thus redolentem, fructum candidum, scabrum, oblongum: nascitur potissimum solo 20 fqualido, atq; saxoso: radix medicamento ulcerum utilis, & mensibus pota in uino nigro austerio: fructus ad urinæ stillicidia, & aures, & argemam, & ad oculorum morbum, lippitudinem nuncuparum, & lactis uberratem mulieribus facit: sterile illud folio lactucæ amaræ constat, sed scabriore, candidiori: & radice breui: nascitur id quoque prædicto solo uberrime: radix partim superius, partim inferius purgat: quod enim germen uersus cōstitit, superius purgat: quod terram uersus, inferius. Prohibet & uersibus interposita uermiculos noxios, Colligitur per messē tritici, 40

*Vernilaginum. & papaueris genera. Tum radicum differētiās unde liceat accipere. De nymphæa, scythica, & malo terræ: quoq; Pandius statuarius mente alienatus sit. Item de Thraciæ radicibus.*

## Caput XIII



Ernilaginum una candida, altera nigra: uires radicum inter se distant, & ipsæ radices specie differunt, candida enim crassa, & grauius olens, utilis traditur ad alui profluuiam, cum cōsecta orbiculatim modo radices decocta est, iūco transfixa in seriem: ualet & ad interaneorū animalia iara: cum passa uua comeſa acetabuli mensura ē uino bibitur austeror: occidit & canes, & fues: canes in farina ordeacea subacta cum aqua, & oleo: fues cum brassica. Et si hominem ægredientem experiri uolueris an uiuere possit, lauandum ea radice triduo iubent. Hoc enim si tolerauerit, moriturū nequaquam existimant. Nascitur æque omnibus locis, folio cardui, uerum ampliori, & terræ proximio, capite magno acano simili, unde quidam acanum eam uocarunt. Nigra folio constat modo cardui, præterquam quod minori, leuioriq;. Tota autem herba umbraculi speciem repræsentat, radice crassa & nigra extrinsecus, subflaua intrinsecus nititur, loca gelida, humidaq; amat. Lepram & uiriliginem trita in aceto, & ramētis illita expellit: necnon & canes occidere potest. Papaueris quoq; syluestris genera plura notantur: quoddam enim cornicularium appellatū, quoddam autē nigrum est, folio confans uerbasci nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis, radix breuis, per summaq; cespitum: fructus inflexi, ut cornicula figurantur: legitur circa messes, & aluum purgare potest: folium albuginem oculis aufert: nascitur iuxta mare locis saxosis. Aliud erraticum uocatum non absimile intubo erratico constat: quamobrem in usum uenit cibarium: nascitur in aruis, potissimum inter ordeas: florem rufum producit: caput unguis pollicalis magnitudine auget: legitur ante ordeas messes, atq; uiridius etiam purgat inferius. Aliud herculanum nuncupatum, folio constat struthi, quo splendorem linteis tribuunt: radice in summa terræ eunte: fructu albo: huius radix purgare superius nata est. Non desunt qui contra comitialē morbum ea utūtur in uino mulso. Hæc igitur ueluti æqui uoca quædā subiungere placuit. Radicū autē differētiās, tum fuccis, tū odoribus accipere licet. Sūt enim aliæ acres, aliæ amaræ, aliæ dulces, & aliæ suauis olentiæ, aliæ grauis. Dulcis nymphææ uocatur, quæ nasci in lacustribus solet, ut in Orcomeniensi agro, & Marathone, & in Crera insula. Bæoti Madonaim hanc appellāt, fructumq; mandūt: gerit folia super aquam ampla: plagæ trita imposita sanguinē sistere traditur: utilis & ad difficultates intestinorū pora. Dulcis & scythica, & quidē nonnulli dulcē eam appellāt: nascitur apud Mæotim: utilis ad anhelitus & ad tussim siccam, atq; in totū thoracis laborantis medicamento commoda redditur: ad hæc mederi ulceribus potest in melle: sitim quoq; extinguit, si teneat in ore. Qua de causā, tum ea, tū equestri uocata, Scythas undecim, & duodecim dies, sitim tolerare affirmāt. Mālum terræ olfactu odoratū, gustatu uehementer amarum est: colore nigrū: nascitur montibus optimum quodq; folio constat muris auriculæ simili, tamen rotundiori: perutile ad caput, & reliqua ulcera, & ad serpētes, & ad somnū, & ad alia multa: ulceribus capitis adhibere præcipiunt in aqua subactum, reliquis rasum in melle & oleo: contra ictus serpētium ex uino acido bibi debet, atq; inspergi morsui: ad somnū in uino nigro austero pertritū datur. Si uulua prociderit decocto abluisse iuuabit. Dulces igitur illæ, amaræ autem aliæ, & grauis aliæ gustatus. Quædā ex dulcibus mentis alienādæ uim sortiūtur, ut quæ carduo similis apud Tegeam gignit, quam cū Pandius statuariū artifex in templo, suo fungens officio comedisset, mente alienatus est. Quædam item mortiferæ deprehensæ sunt, ut quæ apud Thraciæ metalla comperiūtur, gustu faciles, iucundæq; admodū. Coloris quoq; discrimine radices large inter sese differūt: nec solum albæ, & nigrae, & flauæ, sunt etiā ceruleæ, & rubrae, ut rubiæ radix.



De quinquefolia siue quinquepeta: necnon de rubia, fidicula: quæq; & quot annos seruetur illæse.  
Elaterium medicamentorum omnium diuturnissimum. Quo modo radices deteriores fiant.

## Caput XIII



Quinquefolia, siue quinquepeta (nā hoc etiā nomine appellatur) cum effoditur, rubra est, inarescens uero nigrescit atq; quadratur: habet foliū uitis, sed pusillū, & colore simile uirgineo est, & augetur, & definit cum uite: folia omnia quinque, unde & nomen: caules prætenues mitat, & crebris internodijs cōstat. Rubia folio edera, rotundiori tamen consistit: nascitur humi: caulis modo graminis: loca amat umbrosa, cit urinam, quæ de causa ad lumborū, & coxæ dolores ea utitur: nō desunt quæ forma quadā peculiari spectentur, ut nepæ uocata: radix atq; fidicula: altera enim speciem scorpionis repræsentat, & utilis ad eius ictum, & ad alia quædā habet: fidicula uero hirsuta, & acetabulis cauernosa, ceu polyporū cirri: purgare inferius apta est: ubi quis eā contigerit, polypum innasci affirmant: foliū filicis magnæ proximū est: nascitur in petris. Publica uero radicū omnium, quod alia plus, alia minus tēporis durēt. Elleborus enim uel annis triginta utilis est. Mālum terræ, quinque aut sex. Vermilago nigra quadraginta. Fel terræ decē uel duodecim: pinguis hæc, spissāq; admodū est. Peucedanum quinque aut sex. Viuis syluestris anno, si in umbra, & sine ictu reseruet, alioquin putrescit, & inanis, fungosaq; redditur. Et alijs alia tēpora tribuuntur. Sed omnium medicamentorū diuturnissimū elateriū est, opportunumq; quod uetustissimū. Itaq; medicus quidā, uir haud infolēs neq; mēdax, elaterium ducentorū annorū uirtute mirabili seruare apud se retulit: eo ā quodam munere donatus. Causa quamobrē tam longo seruari tēpore possit, humoris copia est, ea de causa uel cum præciderint in cinere humidū ponit, & tamen ne ita quidē sicari potest, sed usq; quinquagesimum annū lucernis admotū lumen extinguit. Hæc igitur uis peculiaris isti tribuitur. Radices autē quæ aliquā dulcedinē habet, ubi diu manserūt, uermiculis eroduntur: quæ uero acerbæ, acres uel sunt, id nō sentiunt: uerū rarefactæ, exinanitæq; uiribus, tandē hebetantur. E bestiis externis nulla radicem aliquā tangit excepta sphondilia, quæ nullā intactā relinquit. Hoc ergo naturæ animalis istius propriū depurandū sit. Radicem autē unamquamq; fore deteriore, si fructū perfici, crassescereq; reliqueris, manifestū est: quod idem uel de fructu asserere licet, si radicis succū detraxeris. Sed magna tamen ex parte radicis medicæ succus nunq; extrahit. Cuius uero semen usum medicaminis præstat, huius succum accipi operæ precii est. Vt radicibus potius iubeant, quoniam fructus fortior sit, q̃ ut corpus ualeat tolerare: sed hoc in uniuersum haudquaquam uerū esse apparet. Anticyrenses enim fructum sesamacei ellebori dare solent, qui sesamæ similis est.

Quæ loca medicamentis fertilia sint, ut Etruria, & latinus ager, ubi Circe. Item carmina Homeri quibus ostēdit Aegyptū uenenorū feracem. Quæ loca Græciæ medicis scateat herbis maxime omnium consistēt. Quādo lac sordere utile. Tum de moly, cicuta, hirci spina, pastinaca. Caput XV



Ractus medicamentorū fertiles potissimo tradūt, extra Græciā, Etruriam, & latinum agrum, qua Ciren habitasse affirmat: atq; etiā magis Aegyptum autore Homero: hic enim Helenā inde accepisse inquit. Prospera quæ quondam Thonis dulcissima coniux, Aegypti Polydamna dedit, qua plurima gignit,

Noxia terra ferax, & multa probata uenena.  
Inter quæ uel illud medicamen lucius, & moeroris esse autumnat, omnium ita ut malorum obliuionem, atq; indolentiā facere possit: & hi quidē ractus prodiit a poetis ferē folijs uidetur. Aeschylus enim in elegis, copiam medicaminum, uenenorumq; Etruriæ tribuit. Gens Tyrrhena suis clara ueneficijs. Quæq; autē loca nōnihil medicaminum possidere uidetur, sed differunt, quod alia plus habet, alia minus: etenim quæ

quæ ad septentrionē, meridiem, exortumq; pertinet, mirabiles vires fortiuntur; nam in Aethiopia, qua sagittas ungūt, radix mortifera est. Apud autē Scythas nō solum ea radix, sed etiā aliæ plures comperiuntur, quarum aliæ cōfestum eo interimunt tempore, quo gustatæ sint, aliæ pōst. Et harum aliæ celerius, aliæ tardius, ita ut nōnullos tæbe quadam paulatina possint cōsumere. Apud Indos uel alia plura proueniūt generā: sed superuacuum, si uere narratur, quod sanguinē diffundere, & quasi fugare potest, quodq; ē diuerso eundē colligit & ad se trahit, quæ cōtra mortiferos serpentium morsus cōperta referūt. Quin & regio Thracum pleraq; fert, sed ualidissimam ferē illam herbā, quæ sanguinē sūstinet: hanc enim alij puncta uena, alij etiā uehementius secta retinere, ac penitus prohibere sanguinis profusionē affirmāt. Hæc igitur quod cōmune omnium diximus, satis demonstrare uidetur. Locorum autē omnium Græciæ, maxime Pelium mons Thessaliæ, & Telethrium mons Eubœæ, & Parnassus medicamina ferūt, item Arcadia & Laconia tellus, nam eas quoq; herbis scatere medicis cōstat. Et quidē Arcades pro medicamēto quod aluum purget, lac sorbere consueuerūt in Vere, cum succi huiusmodi foliorū maxime uigent. Tunc enim potissimo lac uim medicaminis habet. Bibunt bubulū, quod bos inter animalia omnia permulta pascere, uarioq; herbarū genere uesci uidetur. Nascitur apud eos uterq; elleborus, uidelicet & albus, & niger: item pastinaca specie lauri, colore croci, & eam, quam illi brasocam syluestre appellāt, medici autē quidam ceran; & quam illi maluam syluestre uocant, medici hibiſcum: & mālum terræ, & fefeli, & equapiū, & peucedanum, & herculana, & utrunq; uescicariæ genus, quod fructū puniceū fert, & quod nigrū oritur: & syluestris cucumis, ex quo componi elateriū solet. Ad hæc lactaria ex qua hippophaës, quod optimum confici apud Tegeam nouimus, maxima meq; haberi in precio. Nascitur circa Clitoriā panacea, & perræa circa Psophidem plurima, & optima prouenit. Moly apud Pheneum exit, atq; apud Cyllenam esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmāt: radice rotunda, nō absimili cepæ: folio scillæ: usum eius contra ueneficia summa, nō tamen effodi difficulter, ut ait Homerus. Cicuta optima circa Susam, & in totum locis prægelidis. Quin & in Laconico agro bona pars prædictorū exit: nam is quoq; medicaminibus scatet. Hircispina lar ge in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etiā uisu pulchrior. Et pastinaca in Patrensi agro præstantior cæteris: huic uis calefactoria est, radix nigra. Necnon & in Parnaso multa ex his proueniūt, & in Telethrio monte. Sed hæc pluribus locis dantur communia.

*Dictamnū Cretæ propriū, uiq; mirabile, & ad plura utile: omnia etiā quæ se minus à terra attollūt præstantiora esse, quæ Creta ferat: ubi optimū aconitum, & quo modo cōficiatur ad nocendum, nullumq; contrā compertum remedium.*

Caput XVI

**D**ictamnū Cretæ insulæ propriū est, uim mirabile, & ad plura perutile. Sed ad partus mulierū potissimū pollet: folio glechoni simile constat, nec sapore absimile est: ramulis tenuioribus cōditur: usus foliorū, non ramorum, nec fructus est: ualent ad multa, sed præcipue ad difficiles partus mulierū, ut dictū est. Aut enim facile posse parere faciūt, aut certe dolores penitus sedant. Dantur bibēda ex aqua. Rara hæc herba, locus enim qui fert, exiguus admodū est, eumq; capræ depascūt capeſſendæ causa uoluptatis. Verum etiā quod de telis fertur, affirmant. Capras enim sagitta transfixas, dictamo deuorato telū eijcere. Dictamnū tale est, viresq; eiusmodi possidet. Falsum dictamnū, folio quidē simile cōstat, sed ramulis minus, & uiribus longe inferius. Quamq; enim eisdē in rebus proſit, tamen multo deterius atq; debilius. Vis dictami in ore percipi continuo potest: excaleſcit enī ex paulo uehementer: manipulos in ferula, aut canna intercludere solēt, ne expiret: imbecillius enim cū expirauerit. Nō defunt qui naturam dictami & falsi dictami, eandē esse existimēt. Sed quod locis lætioribus exeat

degenerare, falsumq; cognominari, sicuti etiā alijs pluribus euenit, ut uiribus deterioribus ex loco reddatur. Dictamū enim solū asperū uehemēter amare inquit. Est etiā aliud dictamū ueluti æquiuoce appellatū, nec enim speciem nec uim habet eandem, quippe qd folio simili sisymbrio cōstet, & ramis cōdatur maioribus. Vfus item & uis nō eisde conueniūt. Hoc igitur (ut dictum est) mirum, simulq; propriū Cretæ insulæ datur. Quidā omnino in herbarum & fruticum genere, & ad summa inter omnia quæ se à terra minus attollunt, præstantiora, quæ Creta ferat, affirmāt. Inter reliqua uero magna quidē ex parte quæ in Parnaso monte proueniāt, anteponūt. Aconitum nascitur in Creta atq; Zacyntho, sed plurimū, optimumq; in Heraclea Pontica; cōstat id folio intubaceo, radice tum specie tum colore nuci proxima; uim illā mortiferā in hac esse, foliū & fructū nihil nocere affirmāt. fructus herbæ est, non humilis materiæ: herba ea breuis est, & nihil superuacui habēs, sed frumēto similis; semen nō spicuum; nascitur ubiq; & non in Aconis solum, à quibus habet appellationem (is autē uicus est Periandinorū) amar autē loca potissimū saxosa: pascitur eo neq; pecus, neq; ullū animal: confici ad officiendū modo quodā enarrāt, nec nosse queng; quamobrē medicos quoniā cōponere nesciāt, pro putrefactorio uti, alijsq; quibuscū de causis eporū nihil penitus posse officere, neq; ex uino, neq; ex mulso. Cōponi autē ita ferūt, ut certis occidere tēporibus possit, uidelicet bimestri, trimestri, semestri, anno cōpleto, nonnullū etiā biennio: pessime illos de uita discedere uolūt, qui plurimū temporis resistere possint: paulatim enim tabescat corpus, & languore pereat diuturno esse necesse: facillime illos, qui cōfestim obeūt. Remediū nūq; esse comperūt, sed falso dici quoddā aliud resistēs illi haberi. Non enim herba, sed melle & mero, & quibuscū eiufmodi seruari aliquos potuisse: atq; id raro factum, summaq; difficultate. Aliud quoq; uenenū uim diurnariam enecādi sortiēns cōpertum affirmāt: esse nanq; radiculam quandā, quæ eodē die possit occidere: foliū hanc habere ellebori, notamq; omnibus esse, & quidē famulos iratos hac uti solere, deinde mederi in hoc uenietes, neq; enim celerē facere interitum, aut leuem, sed difficilē & tardum, nisi fortē quod facile curatu, cōfectuq; sit, ut oportet: aiunt igitur, & confestim interimi, & aliquo post tēpore: nonnullos & ad annū peruenire, & cū sumitur, facile iuuari: hac autē diligentius seruari apud Tyrrenos in Heraclea, neq; id absurdum si modo quoddā iuuari possit, alio autē minime: quæadmodū & alia ex letalibus. Aconitum uero (ut dictū est) inutile ijs qui præparare ignorēt, nec licitū possidere, sed capitalē poenam institutā. Temporis differentia pro collectus ratione sequi autumant, mortes collectuū temporibus compares euenire.

*Thrasym Mantinensem quoddā comperisse uenenū, quo sine dolore inferre obitū posset: quodq; Alexias eius discipulus fuerit nō indoctior. Item quo modo Chij cicuta præparent, ut celeriter enecet.*

Caput XVII



Thrasym Mantinensis tale se comperisse aiebat, ut facile & absq; ullo dolore inferre obitū posset. Nec alio quā succo cicutæ, & papaueris, & aliorū eiufmodi. Idq; admodum contractum, exiguumq; uidelicet ad drachmæ pōdus, & irremediabile penitus, & tam ualidū, ut quantumuis temporis perdurare posset, nec quicq; sentiret immutationis. Sed sumendā is cicutā censebat nō unde libuerit, sed ex Susis, & si qua alia loca prægelida, & opaca constāt. Nec secus de reliqs quæ debeāt addi, cēsebat. Quin & alia multa, & ex multis is componēda excogitauit. Alexias quoq; eius discipulus ingenij plurimū ualuit acrimonia, nec infra illū bonis artibus fuit instructus: nam & reliquas medicinæ partes, quas ille nō tenuit, is egregie cōsecutus est. Hæc igitur comperita hoc nostræ aratis tēpore amplius, quā superiori & prisco uidētur. Sedenim uti hoc, an illo modo, plurimum referre omnibus manifestū profectō ex multis est. Nam & Chij nō in hūc modū ante cicuta utebant, sed trita, ut scilicet uti ceteri solebant.

bant. At nunc terere nemo uelit, sed detractio tegmine (id enim rem difficile facit, quoniā confici cōtumax sit) pistam subinde in mortario rundūt, & prætenui cribro transmissam aqua inspersam bibūt, atq; ita obitus celer, facilisq; occurrit.

*Consuetudine uenenorū uires fieri debiliores & inertes, atq; ita quibuscūq; non nocere potuisse elleborum. Quo remedio usus fuerit Eudemus post uiginti duas portiones ellebori: deq; mira ui pumicis, ac quantum ualeat cōsuetudo, quod & absinthii depastum ostēdit. Caput XVIII*



Mnium uero medicaminum uires debiliores in assuetis porro dēprehendūtur, in nōnullis etiā omnino inertes. Quidā enim tantū ellebori esitantes, ut manipulos rotos cōsumant, nihil afficiūtur. Quod etiam Thrasys sapius fecit, qui radicum peritissimus habitus est. Faciūt hoc idem pastores nonnulli. Itaq; cum ad medicaminū uenditorē, de quo admiratio omnes teneret, quod radicē unā aut duas mādere posset, pastor quidā uenisset, absumpsissetq; integrū manipulū, fecit ut nūq; amplius ille pharmacopola laudaret. Idq; singulis diebus, non tantū illū, sed etiā alios piosq; facere dicebatur: sit enim, ut pleraq; ex medicamētis, propter hominis cōsuetudinē, uim suā amittāt, nec amplius medicamina esse possint. Cū enim ab natura acceptātur, deuincūtur, cōficiunt, nō amplius poni inter medicamina debēt, ut & Thrasys dicere solebat. Naturas enim singulatim ille discernēs, idem alijs medicamen, alijs nō medicamen esse aiebat. Enim uero rationē haberi penitus oportere putabat. Et quidē plurimū ad id iudiciū uir ille ualebat. Verū unā cum natura etiā cōsuetudinem posse aliqd efficere cōstat. Quamobrem Eudemus medicamētarius hac in arte facie princeps, cum se nihil affectū iri pepigisset, quiddā admodū mediocre ante solis occasum deuorauit, quod neq; cōtinere, neq; deuincere potuit. At uero Chius Eudemus arte minime laudatus elleborū bibēs, nō purgabatur, & uiginti duas aliquādo portiones uno die sumpsisse se retulit, fori apud uasa sedētem, nec surrexisse priusq; esset meridies, tunc uero domo petita, balneas ingressum, cōnatūq; more solito, nec quicq; euomuisse. Hic tamen auxilio quodā prap̄parato cohibuit: aceto enim acrispersam pumicem bibisse se retulit post septimā ellebori portione, rursusq; ex mero eodem modo egisse. Pumicis autē uim magnā adeo esse, ut si in urceū bullientē eam inieceris, feruorē extinguas non solū parte aliqua tēporis, sed etiā ex toto: pumicem enim exiccare uehementissime, atq; ad se spumā totā recipere uoluit, idq; extinguedi causam esse. Hic ergo largitatē potus, tali retinere iuuamine potuit. Quod autē consuetudo plurimū ualeat, multis sanē rationibus constat. Nam & absinthii pecora huius tractus pascere quidam negant. Pontica autē nimirū pascunt, ut pinguiora atq; pulchriora reddātur, & ut quidā uolūt, sine felle. Sed hæc nō ad præsente disputacionē, sed ad aliā quandam spectare potius iudico. Radices uero & uniuersum genus materię humilis, permultis ac uarijs uiribus (ut dictū est) natura condiderat, nec solum ad corpora inanimata, sed & ad animata.

De spina quæ aquā congelet iniecta: deq; hibisco & telyphono, & ui eius. Item de testiculo, & quibus herbis magis coire quis ualeat, quibus nil penitus: necnon quæ ad marem procreandū, quæ ad feminā ualere tradantur, atq; ideo alterā mariscam, seminificam alterā appellatam. Quo item semen prolificū, quo infecundū reddatur: tum de herbis uulcro & mulla. Caput XIX



Pinam enim quandā enarrāt, quæ aquam iniecta cōgelet. Et radicem hibisci posse addenfere aiūt, si tritam inieceris, sub diuoq; humorē posueris. Constat hibiscum folio maluæ, maiori tamen, pilosioriq; caule molli: flore mellino: fructu maluæ, caulibus proxima. Vsus eius ad rupta, & tussē ē uino dulci, & ad ulcera in oleo. Aliam si carnibus concoquas in idē aggregare, ac ueluti conglutinare posse affirmāt, aliās uim attractoriā possidere, modo magnetis lapidis atq; succini. Hæc in inanilibus. Thelyphonū ue-

ro, quod alij scorpionē appellant, quia radicē scorpioni similē habet, admotum scorpionem occidere tradūt, & eum reuiuiscere posse, si elleboro cādido linatur. Enecat idem & boues, & oues, & iumēta, & ad summā omnes quadrupedes. Eodem die, si genitalibus uel radícula imponatur, proficit potū contra scorpionum ictus: habet folium tuberis terræ radicem (ut dictū est) similem scorpioni: nascitur graminis modo, & geniculis cōstat: loca amat umbrosa. Quod si uera sint, quæ de scorpione narrantur, iam & reliqua eiusmodi haudquaquē incredibilia dici debeant: nec fabulosa quæ attribuuntur plantarum uiribus brute componi uideātur. Humanis uero corporibus ultra illa, quæ sanitatem, morbos, mortemq; spectent, alia quoque herbas afferre suis uiribus posse affirmant, ut puta, generandi seminis facultatem atq; sterilitatem: & quasdā ex eodē facere utrūq; ualere, sicut qui testiculus appellatus est. Cum enim gemini sint, alter magnus, alter autē paruus, magnū efficacē ad coitum datum ē lacte caprino tradūt, minorem uero obesse ac inhibere: habet folium laseris, uerum leuius atq; minus: caulem similimū spinæ, quam pirum uocant: mirum ergo (ut dictum est) ab una eademq; natura, diuersitatem tantā uirium proficisci. Nam uim eiusmodi esse duplicem, absurdum putari minime debet. Tum enim alij quidam, tum Aristophilus pharmacopola plaraicus, uires quasdā compertas se habere dicebat, partim ut quis magis coire ualeat, partim ut nihil penitus ualeat. Id quoque prorogare plus, minus uē temporis posse, ceu bimenſe, aut trimenſe, quæ quidem herba uel ad temperandos, caſtigandosq; aduleſcētes aliquādo uti aiebat. Quædam ad procreandū marem, aut ſceminā ualere traduntur: quam obrem herbam quandā marificam, & aliam ſceminificam uocant, ambæ inter ſe ſimiles, & oculi ſpeciem gerētes: fructus ſceminificæ modo muſci oleaginei, uerum pallidior: marificæ uero, ſicut oliua cum primum ex muſco emergit, geminus, modo teſticuli hominis. Ne ſemen ſcetiſicum ſit, fructū edere candidæ facere aiunt: contrā ut proliſicum ſit, fructū cratei ex aqua notāt: naſcitur id lini modo ruſſum, & fructum tanq; milium fert. Gignere nequaquē poſſe putatur, & qui ſemen uolucris collectū modo ſextarij triginta aſſidue diebus portionibus æquis biberit ex uino albo. Sic enim penitus ſterileſcere hominē aiunt. Folij herbæ mulæ uocatæ ſterilitatē mulieribus facere uolunt, & aliquid ungulæ, ac ſeminis muli animalis miſcendū præcipiunt: conſtat hæc folio linguæ ceruinæ appellatæ, radice numeroſa & tenui, montanas planicies, & ſaxoſas amat: mulas hac herba plurimum delectari affirmāt. Vſus eius uel ad lienes, quemadmodum uolucris.

*De filice ſceminā, & quid diſtet à maſcula. De herba ab Indo quodam allata, qua, qui uſi fuerint, ſemagies coire ualeant: tum quæ aquæ ſterilitatem, quæ ſecunditatem afferant, inſaniam uē: deq; mira natura uini regionum quarundam.*

Caput XX



Illic ſceminā utilis cōtra interaneorum animalia lata melle ſubacta: & cōtra tenuia in uino dulci cum farina ordeacea data: ſi mulieribus grauidis detur, abortum facere: ſi cæteris, ſteriles in totum reddere aiunt. Diſfert ſceminā filix à maſcula, quod foliū unico artu porrectum hac habeat, & radicem craſſam, & logam, & nigram. Harum igitur uires ſterilitati addiſſe natura putatur. Ad rem autē ueneream mirum in modū herba pollebat, quam Indus attulerat. Non enim ſolum edentibus, ſed etiam tangētibus tantū genitalibus uim dixere uehementem adeo fieri, ut quoties uellent coire ualerent. Et quidem qui uſi fuerūt, duodecies egiſſe dixerunt. Indum autē ipſum, qui uel magno, atq; robuſto corpore erat, ſeptuagies aliquando coiuſſe fatentē licuit audire: uerū emissionem ſeminis guttatim fuiſſe, demumq; in ſanguinē deueniſſe. Mulieris uero uehementer etiā citari libidinē, cum eo medicamine uſæ fuerint, dicebatur. Hæc igit uis, ſi uere narraſ, mirifice omnes excedit naturas: tamen quasdam conſiare quæ citationes ad coitum facerēt, haudquaquē inepte putaueris. Nam & in alimentis

alimentis ipsi tam siccis q̄ humidis uires eiusmodi, atq; etiam aliarum plerarunq; affectionū efficaces manifeste sentimus. Aquam enim nonnusq; esse, quæ prolem mulieribus largiatur, affirmant: ut apud Thespias. Contrā aliam apud Pyram esse, quæ sterilitatem eisdem inferre possit. Causam enim sterilitatis mulierum loci illius talem medici reddiderunt. Apud Heracliam Arcadiæ, uinum, ut ferunt, fit, quod potū uiros insanos agit, mulieres steriles reddit. Achaia apud Cabyniam maxime, uitis quoddam genus habetur, cuius uinū abortum facit. Et ubi canes uuam comederint, eas quoq; abortu periclitari necesse est. In gustu nec uua sensum aliū, q̄ cæteræ uuæ facit, nec uinum à cæteris uinis distare percipitur. In Troezenensi agro uinum sterile, qui biberint, facit: apud Thasum uinū somnificū arte quadā cōficitur, & aliud quod potū uigilantissimos facit. Sed eiusmodi uires ad corpus spectare, inq; generibus corporeis percipi manifestum est.

*De herbis quæ ad animum, & mores faciant, ut uesficaria, cenothera, polio, antirrhizo, flore aureliæ: quodq; homines hæc commenti fuerint, suas artes magnificare & celebrare cupientes.*

Caput XXI

**A** Nimo uero uesficariam adnotant. Hanc enim ueluti dimouere, alie nareq; mentem affirmāt, ut superius comprehensum est. Contrā radix cenotheræ data ē uino, mitiores, hilarioresq; mores reddit. Constat cenothera folio amygdalæ, uerum maiori: flore rosaceo: loca adamat montuosa. Id tamen absurdum nequaq; appareat: fit enim quasi re-  
 20 creatio quædam ex uiribus, quas radix ista uinaceas possidet: sed potius absurda illa putentur, quæ alligata, & ueneficiorū aduersantia uocitatur, & tū corporibus, tum domibus unice opitulari creditur. Adde polium, quod Hesiodo & Musæo auctoribus ad omnē rem seriam, magniq; faciendā perutiē prædicatur. Quamobrē id no-  
 30 cū effoditū tabernaculo structo, & ad famam, existimationemq; bonā nō minus, quinimō magis ualere putatū est. Necnon & antirrhizum appellatū utilem ad gloriam tradidere: hic lappæ similis est, radice minima, & ferē nulla subnitiur: fructum tanquam nares uituli parit. Hoc peruncios gratiā, uitæq; gloriā consequi creditur. Quinetiā qui aureliæ flore coronatur, unguēto ex auro ignis experte insperso, glo-  
 35 riam atq; existimationē bonā consequitur. Habet aurelia florē auro similem, folium candidū, fructū tenuem, durumq;: radicē per summa cespitiū, atq; tenuē. Vfus eius ad serpentū morsus ē uino. Valer etiā ad ambusta, cremata, & mista melli. Sed hæc (ut superius dictū est) commenta hominū esse planē uidetur, qui suas artes magnifi-  
 care, celebrareq; cuperent. Nos reliquorū naturas, uiresq; persequemur.

*De pipere & eius generibus, & grano gnidio, pastinaca, uite syluestri, dracunculo, thapsia, scindula, ebena, malo terræ, scammonia, silice: tum quæ quibus locis præstantiora medicamenta.*

Caput XXII

**P** Iper fructus est: eius genera duo: unum enim rotundum, erui modo, tegmine, carneq; constans, sicut laurina bacca, subrutilū: iterū oblongum, nigrū, semina papaueris continēs: longe hoc ualidius altero: am-  
 40 bo uim calefactoriā obtinent: quamobrem contra cicutam auxiliatur, & etiam thus. Granum cnidii rotundum, colore rubrum, maiusq; pipere est: sed caliditate multo ualidius. Qua de causā cum deuorādum datur (dari enim cōtra alui solutionē solet) in pane, aut adipe obductū sumitur: aliter enim gu-  
 lam adurit. Peucedani quoq; radix uim calefactoriā habet: quamobrē unguentum quidā uel ex ea sudatoriū faciūt. Datur & ad lienes radix peucedani: semen inutile est, nec succus ulla in re prodest. Pastinacam agro Spartensi Achaia laudatissimam referūt: natura calefactoriā, radice nigram. Radix quoq; uitis syluestris, calefactoria acrisq; est: quamobrem ad psilothri usum idonea, & uitia cutis in facie emūdat: fru-

cti eius defoliare arbores solent: succiditur omni tempore, sed præcipue autumno. Dracūculi radix data ex melle, utilis quæ tusses sanare possit: caulem uersicolore  
 serpētis speciem præsentantē gerit. Eius semine nulla in re uti solēt. Thapsiæ radix  
 uomitoria est, & si quis continuit tam superius q̄ inferius purgat. Ad hæc liuida tol  
 lere potest. Suppurationes tamen alias exalbidas facit: succus eius ualidior est, &  
 quidē tam superius q̄ inferius purgat. Nullus feminis usus: nascitur tum alibi, tum  
 in terra Attica: in qua pecudes incolæ eam nō tangunt, peregrinæ uero depascunt:  
 & aut alius soluitur, aut intereunt. Fidicula semper post imbres erumpit, & semen  
 nullum producit. Ebeni lignum aspectu buxo simile constat: sed decorticatum ni  
 gerrimum redditur. Vtile oculis ad cotem tritum. Mālum terræ crassum, & gustatu  
 amarum est. Nigrum, odoratumq̄, folio rotundo: quod super terrā spectetur, non  
 multum est. Nascitur potissimum mōtibus, idq̄ pro optimo effoditur. Vsum eius  
 ad multa enumerant: sed optimum ad capitis rupiōnes, & ad reliqua tamen ulcera  
 satis uale: & contra serpentum morsus, & ad somnum, & ad secūdas modo pelli,  
 partim aqua subactō & illito, partim in melle, oleoq̄ deraſum: sed contra serpentes  
 ē uino acēscēte potō, & morſo inſperſo. Ad somnum uero in uīno nigro austero  
 attrito. At si uulue prociderint, ex aqua colluere conueniet. Id igitur numeroſo re  
 ferre usu uidetur. At scammoniæ ueluti ē cōtrario succus tantū usui est, & nil aliud.  
 Filicis radix colliquata tantum in usum euenit: gustum astringit non sine aliqua dul  
 cedine, lumbricum latū expellit: semen filici nullum est, nec succum quem emittat,  
 hæc habet: autumno succidi tempeſtiue affirmāt. Lumbricum autē gentium non  
 nullis natura inesse percipitur. Habent enim omni quasi ex parte Aegyptij, Ara  
 bes, Armenij, Syri, Ciiēs: ē diuerso Thracibus & Phrygibus nullo pacto enasci  
 enarrāt. Inter Græcos Thebanis, scilicet uersari in gymnasijs solitis. Et ad summam  
 Boeotij innaſci lumbricum nouimus: Atheniensibus nullo pacto. Omnium uero  
 medicamentorum, quoad simplicius explicari liceat, præstantiora, quæ locis gelidis,  
 aquilonijs, siccisq̄ proueniūt. Quamobrē inter ea quæ in Eubœa oriūtur, meliora  
 quæ ferant Aegæ: deteriora, quæ Telethrium reddat, asseuerant: sunt etenim illa  
 sicciora. Telethrium autem locum esse opacum atq̄ subriguum, certum est.

HISTORIAE PLANTARVM LIBRI  
 NONI FINIS.

30

## THEOPHRASTI DE HISTORIA

PLANTARVM LIBER DECIMVS,



**D**E radicibus quæ medicæ sint, quasq̄ uirtutes uel in se, uel in  
 succis, uel etiā aliqua parte habeāt: & in torū, si quid ē fruticibus,  
 aut herbis uires eiufmodi fortiūtur, explicādum hoc uolumine  
 arbitramur: nec differentias omittendū, quibus liquores atq̄  
 odores discerni desiderent. Radicum uires permultas, multisq̄  
 usibus accommodandas, naturam dedisse, facile intelligi potest.  
 Sed quæ maxime uim medēdi obtineāt, has ut puta utilissimas  
 hominum conquirit ingeniū. Differūt istæ (ut uolumine superiori retulimus) quod  
 nō ad eadē, nec in eisdē suas uires possideāt. Radices ergo plurimas penē uires in se  
 & in frutibus, & in succis gestare uidemus. Sed non defunt quæ in folijs quoq̄ ha  
 beāt: & quidē folijs insitas uires, herbas magna ex parte uocare herbarij solēt.

*Paucula hæc in libro decimo tranſtulit Theodorus,  
 nec plura etiam apud Græcos extant.*

# THEOPHRASTI <sup>129</sup>

DE CAUSIS PLANTARVM LIB. PRIMVS.

*Ex suo semine plantas omnes prodire: curq; agricolæ aliquando semine non utantur. Item esse, quæ  
& semine, & sponte, ut in animalibus, procreentur.* Caput I



PLANTARVM complures esse generationes, & quot,  
& quæ sint, inter historias antea exposuimus. Sed cum  
nō omnes omnibus conueniant, apte profectō agetur,  
si nunc, quæ quibusq; tribui debeant, quasq; ob causas,  
explanemus. Ergo generatio quæ semine administre-  
tur, communis omnium plantarum semen producens  
tium est: omnes etenim illæ creari semine queūt: quod  
ita fieri, & sensu exploratum certe habemus, & ratione  
fortassis necessarium. Natura enim cum nihil frustra  
agere solita est, tum uel maxime in ijs quæ prima, po-  
tissimæq; cōsistunt, finis rationem inspeciat. Primum autem, & potissimum semen  
est: igitur semen nisi generare queat, frustra sit, necesse est. Siquidem semper gene-  
rationis causa semen proueniat, atq; ad id officiū natum penitus sit: quod uel ex cæ-  
teris quoq; omnibus haud dubie intelligi licet. Sed quod in plerisq; agricolæ semine  
ut non consueuerint, quia scilicet sponte celerius prodeunt, adulescuntq;: uel quia  
non facile in quibusdam tam arboribus, quàm herbis semen accipi possit: idcirco  
nōnulli semine creari omnia posse negarūt, quanq; id in ficis (ut inter historias dictū  
est) latissime pateat. Sed sit certe illorū germinatio aliter, nisi quid ex ijs quæ sponte  
proueniunt alimenti confluuiō, aut putredine, uel potius immutatione naturali  
creatū exiterit. Constat igitur generationē, quæ semine agatur, plantarū omnium  
esse communem. Sin autem pleraq; non desint, quæ modo utroq; uidelicet & se-  
mine, & sponte ualeāt procreari, absurdū id haudquaquam putari oportet: quan-  
doquidem & animalia quædam tam ex coitu uenero, q̃ ex terra creatur. Itaq; sit,  
ut generationes pro singulorum propria natura sequantur. Quæ enim sicca, sim-  
plicia, minusq; plantigera extant, hæc (ut ita loquar) nullum ferendi genus admit-  
tunt: neq; enim auulsionis, neq; rami. Auulsionis inquam, quoniam quæ simplicia  
exeunt, carēt eo quod auellere possis. Rami uero & surculi, quia sint siccissima, sem-  
per enim quod germinaturū est, aliquem humorē habere ingentum, eūdemq; ser-  
uare posse oportet. Quod quidem à natura siccis negatum penitus est. Hæc enim  
ubi dempta ex arbore sint, quamprimū dissilantur, euaporāturq; simul omnem ca-  
lorem sibi innatū amittūt. Hæc ob eiusmodi causas nequeunt germinare, cætera ni-  
mirum queunt, utpote quæ mediā quadā temperie caloris, humorisq; consent, ua-  
leantq; humorem, caloremq; sibi insitum diutius cōseruare. Quapropter nō modo  
auulsione, uerumetiā summis ramulis pleraq; pullulare facile queūt, ut ficus, uitis:  
& inter steriles, & aquarum præauidas salix, sambucus, populus. Igitur in uniuersa  
sum, ac formula subsignandi hunc in modum ea determinasse abunde sit.

*Palma quibus modis nasci possit.*

Caput II



Aeterum inter sicca, simplicia, & nepotum exortia, palma sola, præ-  
ter seminis ortū, alia quoq; proueniendi genera patitur. Virgas enim  
tenerrimas babylonios uiuadices efficere, adultasq; transferre acce-  
cepimus. Quin & Græciæ si quis ramos superne decisos serat, radix  
demittitur: & germen nō solum cerebro enasci, uerumetiā subtris ra-  
dicari largius asserūt. Item si trūcus inuersus deponatur, sitq; solū humectū, multis



partibus radices demitti, & germina dari exploratū habemus. Id tamen ampliore magnitudinem capere nequit. At pino, & abieti, & cuius generis eiusdē, nihil tale contingere posse notatum est: neq; cupressō, prāterq; si usquam genus aliquod sit, quod ab imis plātigerum exurgat, ut in Creta insula circa Dryitas uocatos esse affirmant. Illic enim sic fieri posse ratio est, quod cetera quoq; proles, dūmodo radice aliqua cōsistatur, humoremq; habeat, germinare facile potest. Nam si radicē nullam obtineat difficile, uel potius impossibile est. Sed hoc per suppositionē sit dictum. Palma autem uirgis utiq; procreari potest, frugalitate humi, habilitateq; ad celerius germinandū: tenerrimā uero uirgā petūtur, quia tales humidissimae sunt. Sed ex cerebro potius, q̄ imis partibus germen prodire ratio est: hinc enim & uirgarū exortus, & omnino uelut principii quoddā uitale hoc est. Qua de causā cerebro exempto, aut morbo aliquo laborāte, mox palma emoritur. Nam & nepotum illa procreatio non nisi cerebri copia fieri assolet, dempto etenim cerebro exarefcit, ut ratio est. Si quidem & cum palma integerrima fiat, & radicibus plene adhāret: hoc idem eueniat, cerebro sublato, necesse sit. Ortus autē undiq; propterea sequit̄, quia humor, calorq; naturalis ubiq; aliquandiu ualeat permanere: scilicet ea de causā, quod ob densitatē meatuum materies hac exiccari haud facile potest. Vnde fit, ut exhalatu difficilis quoq; cōsistat. Palma his de causis multifario prouētu notatur. Ex reliquis autē quae simplici corpore ueniūt, nihil diuersis prouenire modis asseritur, quia nulum natura huiusmodi est.

*Cur quae auulsione, surculo, radice proueniūt, ligno & ramo praeegradi nō possint: & cur contrā.*

Caput III



Vae autē pluribus exeūt modis, differentiā in his quoq; ipsis habere late uidētur. Non enim quod auulsione, & radice, & ramulo prouenit, ligno etiam, praegrandiq; ramo exurgere potest, ut uitis & ficus: neq; quod contrā his ipsis proueniat, ramulis etiā potest, ceu olea. Causa uero quamobrem sic in ambobus fieri generibus solet, una & eadē reddi potest. Vitis enim & fici, & reliquorū generis eiusdē partes mediā, siccae, lignosaeq; sunt. Nōnullorum etiā alpera, quae quidē difficile germinare admodum possunt. Contrā facile, quae summā, tenerā, humectāq; sunt, ceu palmes & crada. Et salicis uero, ceterorumq; partes nō secus se habent. At olea cōtinue rami praeegrades humore nō uacāt, scilicet pinguedinis, spissitatisq; causa: & exiccato proinde difficiles sunt. Extrema uero eiusdē sicca ex tenuitate, nec ad edurandū ualida superexrant. Pari modo de piro, amygdala, mālo, lauro, reliquisq; asserere licet. Harū enim extrema pullulare ob eandē causam nequeūt: prāterq; si quid raro, contrāq; naturā ritū eueniat. Quin & rami praeegradis germen in quibuscūq; raro erūpit, ut in amygdala. In lauro autē nunq̄, ne auulsione quidē, nisi difficile. Causa eius quoq; siccitas est atq; raritas. Quod enī raro, laxoq; corpore cōstat, infirmus est, q̄ ut humorē, caloremq; seruare diutius possit. Quae autē ligno conualescere, germinareq; pollent, ut olea, myrtus, oleaster, hac etiā spissitate sui corporis, uitale illud, genitaleq; cōseruāt principii: nō tamē sine adiūmēto naturalis humoris. Haud enim satis spissitas illa facit, si admodū sicca sit, & ad nepotū procreationē inhabilis. Nā & talis eorū procreandi facultas radice detorta, scrupulosa, flexuosaq; datur: quēadmodū etiā lauri. Sūt enim robustiora quidē mori hac eadem de causā cōtumacia. Quantū enim reliqueris germinare facillime potest. At uero illorū, quae longa innitūtur radice, ut piri, pruni, ac ceterorū, ex radicis copia orit̄. Sed fortasse de oībus ad hūc modū in uniuersum dicendū est. Primo quod p̄ summa cespitū hāreāt, neq; radice alte descēdāt: aut si quae alte demittāt, hac tamen nōnullas etiā radices summotenus agūt. Tum quod radix facta al mēti cōfluxu, solis sufferuescat ardore, excoctaq; uelut praeagnas partū educat.

cat. Nam & ramis ac cæteris partibus hac ratione germen erumpit. Quæ cum ita sint, germinatio stirpium non sine ratione fieri iam latissime patet. Radix enim quæ per summa adhæret confluuium excipiens succi, idq; ipsum sufferuefaciens, atque concoquens, germen emittit. Plurima igitur proles iuxta caudicē exurgit: hinc enim partes sublimiores radice coherent: & olea quidē uel stipite suo germen emittere apta est. Pirus uero & punica, & quæ non solum ē proximo, sed etiam ē longinquo prolificent, utpote quæ proluxa radice subeant, quacumq; radix per summa sit, illic germen suum profundunt. Confluxus enim, atq; excoctio ibidem solis opera facitatur. Quamobrem locus prolificandi incertus. Radix enim quamam sua parte  
 10 summa telluris petat, confluxumq; alimenti capeffat, constat nemini. Quæ autem uiuaces ac steriles sunt, ceu populo, & alba, & nigra, facile possunt. Quod quidem nulli ex reliquis pariter datum est: quanq; in herbis quibusdā, atq; submisso genere ita fieri certū est: ad quæ iam uenire debemus. Satis enim de arboribus diximus.

De generationibus herbarum, & quæ radicibus, & quæ per auulsione, & quæ sit ē lachryma.

Caput IIII

**R**go generationes eorum in eisdem atq; superiorum intueri par est: posita omnium scilicet communissima illa generatione, quæ semine prodeat. Cæterum plures eorum quoq; reddere exortus licebit. Quæ uero ratione singula prædictis conueniant, ea prorsus diuidere decet: exempli gratia, radice ipso prouentu, de quo hac in parte differimus. Sunt enim quæ tam sponte, quam radice fata proueniūt, ut quæ capitata consistunt radice, atq; omnino quibus crassa, carnosaq; radix est. Sed nulla & tenui, & diluto cortice integeretur ad modū rapæ, ac raphani, opus est. Id enim genus radice facile excidatur, imbecilleq; ad perdurandū penitus est: sed tunicas habeant plures oportet, & simul lentitiam quandam, ut bulbus, ut scilla. Deniq; carnis, succiq; bonitate uacare minime debet: ceu amaracum recens, & liriū, & cætera generis eiusdem. Has enim tantummodo radices feri, transferriq; posse uidetur: ac earum aliæ plus temporis durāt, aliæ minus scilicet pro sua quæq; natura. Nec desunt quæ dum suis  
 30 in locis manent, germen possint citare, ut quæ anno tantū caulem gerūt: translata autem siccitatis causa nequeant: rationē enim eandem in ijs quoq; arbitrari, quam in cæteris conuenit. Nonnullorum generatio, & auulsione, extremisq; ramis fieri potest. Braffica enim auulsione, & ruta exoritur. Adde ex coronarijs abrotonum, sisymbrium, serpyllum. Hæ enim radices ē germinibus suis quamprimū dimittunt, nō secus ac edera. Illa tamen omniū maxime uiuax est, siue arbores scādens amplexu suo perstringat, seu in terra abdita ima subeat. Proximū inter olera ocimum est: hoc etenim feri pro parte superna optime potest, quanq; lignosum admodū sit: sed qua difficilius exsicari possit, ea prouenit. Quamobrem tempus longū perdurat, & tonsū, & diminutū regerminat. Abrotonū item lignosum est: uerum spissitate,  
 40 acoreq; suo seruari aliquantulum temporis potest, modo edera. Nam hæc defixa quoq; nimis erumpere ualer. Has igitur generationes pluriū communes notasse par est. Illæ uero cum pauciores sunt, tum raro eueniunt, uidelicet lilij atq; rosæ. At hæc harundo persilla stirpe nasci, germinariq; potest. Proxima ijs olea, & si quid aliud ligno suo ualeat germinare. Quapropter eadē causa redditur, quod ea quoq; suum humorem, caloremq; fecundū seruare utiq; possunt, nec procul argumēto præcidi solent: quippe cum de minori, apertoq; celerius, faciliusq; germinādī exhibeatur initium. Magnum contrā atq; compressum non æque passibile est, neq; ad germinādum propēsum sit: qua de causa diuidere allia in nucleos solēt, & ceparum fibras, tegumenta q; detrahunt. Deniq; omne nō uiuum a uitalibus semouendum

centent: ut etiam arboribus partes, quæ obarescunt, abscindere assolent. Hinc oleæ ac myrti corticem detrahendum nequaquam existimant: obsepit enim conseruatque arboris uitam. At ceparum, aliorumque tunicas eximunt, quoniam istæ neque uiuunt, neque primarum causæ obtinent. Nam si eiusmodi quicquam detraxeris, germen nullum poterit miti. Sed peculiaris maxime germinatio quam lachrymæ præbent: ut equapij, & lilij, & aliorum quorundam: nec ratio abest, sed caulibus planè respōdet. Nihil etenim aliud, quàm quod illarum quoque fecundum principium coactum esse oportet. Non enim sine calore, humoreque generatio talis consequitur. Cur autem non omnium succi, lachrymæque generandi uim obtinent, causam ad superiores, prioresque rationes reduci par est: id est, quod neque caules, neque radices uim eiusmodi fortiantur. Necnon & quod antè retulimus, plures etiam cæterorum esse generationes, ratione non uacat: quippe cum ea facilius, atque ex minori principio ualeant generari, quæ imperfectiora sunt. Ergo generationes, quas partes fortuntur plantarum, quænam sint, quasque ob causas fiant, considerandum in his est. Si quid enim prætermisum à nobis est, hoc addi, concernique ab alijs facile.

De generatione herbarum spontanea, & fructu cupressi.

Caput V



Ponte autè illa exeunt (ut simplicius loquar) quæ minora consistunt: & maxime quæ annua herbaceaque natura sunt. Cæterum euenit, ut etiam maiora interdum ita gignantur, cum aut imbres frequentare, aut proprietas aliqua in cælo, terra ue consistit. Sic enim lassæ exoritur in Africa ferunt, imbre picoso quodam, crassoque. Et syluam quæ nunc ibidè est, alia quadam eiusmodi ratione profutuisse affirmant, nulla enim antea erat. Imbres putredines etiam quasdam, mutationesque humi committunt, cum alte humor descendit, & plantas ea genitas ratione nutrire, augereque possunt, sole feruefaciente ac exiccante: quemadmodum & animalium generationem confici maior ferè pars autorum confirmat. Quod si & aer semina præbeat secum afferens illa, ut Anaxagoras autor est, longe magis sic facilius, necesse est. Sic enim principia & alimenta nimirum adijci possunt. Item fluij & concursus, præruptionesque aquarum multis de locis semina arborum, herbarumque aduehunt. Itaque amnium digressionem loca permulta syluarum impleta sunt, quæ sylua prius omnino uacabāt. Verum hæc minus sponte prouenire appareant, sed uelut semine, atque planta potius generari. Sterilia uero sponte potius creari putaueris: hæc enim neque semine, neque planta gigni existimantur. Sed forte id de maioribus uere indicari non possit, latitareque naturas feminum potius sit arbitrandum, ut inter historias de salice, & ulmo retulimus. Nam & inter minora non desunt herbæ, quarum natura facile oblescat, ceu thymi, & reliquorum quæ subiunximus. Sensu namque ea percipi nequeunt, quanquam ui sua nimirum patent. Thymum enim satis suis flosculis nascitur, & arborum quoque quarundam semina paruula, uixque uisu percipienda sunt, ceu cupressi. Huius enim fructus non id totum est, quod pilæ speciem gerit, sed quod cono innascitur prætenue, exile, & quasi laricis semini proximum: quod pilula sua dehiscente dilabitur, & legi proinde non nisi ab experto homine potest. Ergo in multis solitum id quoque habetur, & præcipue in ijs quæ continua in montibus, syluisque agrestibus exeant. Cum enim sponte consistant, haud facile suam conseruare continentiam possunt. Sed alterutrum fiat, necesse est: aut radice, aut semine germinet. Pauca interea quæ generis habent societatem, sterilia rustici esse affirmant: quæ & ipsa aut latere consentaneum est, aut quod alimentum ad alia absumant. Idcirco fructu uacua ueniunt, quemadmodum uites, quæ uel hirculantur: & reliqua, quibus id ipsum ueniât. Nam si in fructiferis ita sit, cur non idem in alijs quoque omnibus fiat, quasi ad fructum

fructificandum naturæ ratione referuent. Verum id loco opinionis cuiusdam adiecitæ dictum potius uelim. Cogitare autem diligentius, cōmentariq; spontaneas generationes prorsus debemus. Itaq; quantū in uniuersum exprimi liceat, generationes eiusmodi fieri necesse est, terra sufferuefacta, coactōq; humore admisso, commutatioq; ex Solis ardore: quemadmodum & animalia progenerari uidemus.

*De insitu, inoculatuq; stirpium, & temporibus inoculationum: tum quæ apta, ineptæue inoculationibus habeantur: quæq; nocent inoculatis, & quibus tuta reddantur. Caput VI*



Equitur ut rationem generationū, quæ subditis alijs fierent, explanemus: hoc est, quæ insitione, inoculationeq; ueniant. Est autem earum explanatio simplex, & exposita ferè inter ea, quæ suprà docuimus. Quæ enim inferunt, perinde ut terra subdito trunco utuntur. Et quidem non solum appositio, sed etiam satio quædā, inoculatio quoq; ipsa dici iure optimo potest. Sed hic tam id, quod germinat, quàm illud, quod generat, humor fecundus proculdubio est, quem habens oculus, oculo apuissime se coniungit: iamq; alimenti obtinens facultatem, germinationem propriam reddere incipit. Cuncta autem eius generis illa de causâ facile augescere possunt, quod alimenti copiam præparatam, confectamq; secum attulerint: sed omnium maxime inoculationes. Hæ namq; alimento purissimo fulciuntur: & simile præterea coire cum simili semper facillime potest. Oculi autem generis quasi societate coniungitur. Nec sine ratione mutuus apprehensus eorum, quibus eadem corticis est natura, facillime sequitur. Discrimen enim inter ea, quæ genus idem sortiunt, minimum est, & quasi translatio tantū facta uidetur. Euenit namq; ut simul & succi & tota arbor ad germinandum turgescat. Quamobrè cum simile aliquid est, & simili fructu ratione afficitur, iure incrementi celeritas utraq; de causâ contingit. Cætera quo minus discrepent, eo celerius coalescunt: nec non & generis, succi, atq; temporis ratione discrimen occurrit. Nam & temporis conditio plurimū ualeat, uel potius omnino necessaria est. Siquidè germinatio germinū per autumnum, & uer, & ortum caniculæ fieri solet: quippe cum ferre nō nisi turgida ualeant. Rationes quoq; de singulis inoculationibus similes atq; de satione produntur. Alij enim uernam potius probant, dum æquinoctium agitur, arboribus adhuc fœtu grauidis. Vnâ em cum partu germinationeq; cortex quoq; adnascitur atq; obtegat. Alij eam præferunt, quæ ex oriente arcturo fieri solet: tum enim inoculata protinus quasi radicari, maioremq; in modum coire posse affirmant: atq; ita densata compage germen ineunte Vere uniuersum erumpere, utpote ex robustiori principio. Alas quoq; nitidissimas nouissimasq; inoculare non sine ratione præcipiunt. Apprehenditur enim facilius leuitatis ætatisq; causa. Sunt enim arbores uiuaces, propēsaq; ad germinandū, dum iuuenescunt: sed præcipue apta inoculationi, quibus humor lentescit. Item quæ cortice molli, ac simili uestiunt, & pariter affici apta sunt, melius coalescunt. Quapropter in ijs, quæ natura & ætate inuicem conueniunt, perbelle inoculatur. Lentor enim apprehendendi uiam obtinet: & cortex mollem pariter & benignum se exhibens haud magnam facit mutationem. Cæteris parum temporis datum propterea est, quia germen celeriter exit. Oleæ plus temporis destinatum est, cum diutius suos parturiat oculos. Ad hæc humidij, tenelliq; petendi furculi sunt, ipsumq; locum per totam æstatē humescere conuenit. Sic enim potissimum fit, ut germen profiliat. Quamobrem nonnulli quatuor & quinque mensium spacio, insitionem rigari oportere existimarunt. A qua inoculationi uehementissime officit: putrefacit enim, & admissa facile destruit ratione infirmitatis: quamobrè sub ortum caniculæ tutissime agi uidetur, & quidam corticibus ita præligāt, ut aqua admitti nō queat. At insitio-

ni perutilis est, nisi arbor humida natura constet: itaq; alij limum obducunt, alij ol-  
 lam aqua plenam apponunt, qua assidue instillet: sit enim præ magnitudine uulne-  
 ris, ut citissime resiccat, nisi humorem extrinsecus habeat illibare. luvat & oculum,  
 corticemq; sine ulla rima servasse, & surculum sic exacuere, ut medullam nullate-  
 nus exacutio nudet: rupto etenim oculo, cortice ue aut medulla nudata, & siccari,  
 perireq; necesse est. Quamobrem folijs & corticibus insuper obtegunt, atq; alli-  
 gant, limoq; crinito oblinunt, ut succus persistere possit, ne sol, aut imber, aut frigus  
 officiat. Cumq; trunco leuiter fissio inferendum iam sit, surculum cuspidatim deci-  
 sum malleo adigunt, ut quammaxime deprimatur, lecticaq; committatur. Sed hu-  
 moris quoq; eorum modum obseruari quendam oportet: qua de causa uitem ali-  
 quot antea diebus præsecant ut lachryma effluat, neq; putrescat, neq; uermiculet.  
 Punicam & ficum, quaq; his sicciora sunt, protinus inferere solent.

*Pro natura locorum, insitus, inoculatusq; uariari. Item melius urbana syluestribus inferi, quam  
 contrâ. Quodq; in omni semine alimentum aliquod contineatur.*

Caput VII



Vin & pro ratione locorum, naturaq; arborum temporis proprieta-  
 tem cepisse ratio est: quippe cum alia solo uliginoso, alia sitienti, & gra-  
 cili melius degant. Ver illis sicciscentibus rectius profectio accommo-  
 detur, quoniam minus succi obtineant. Quæ pinguta, limosaq; sunt,  
 hæc autumnale tempus desiderant: humor etenim uerno tempore lar-  
 gior est, quam qui ad cõseruandum sufficiat. Quandiu lachrymatio duret, tempus  
 id tricenis diebus à quibusdam statuitur: necnon & melius ea posse fructificare ra-  
 tio docet, & præcipue si urbana syluestribus inferueris: plus enim alimenti uires sub-  
 ditæ arboris subministrant. Quamobrem satis oleastris inferere postmodum uel ino-  
 culare præcipiunt: coeunt enim, & apprehendunt ualidius, & radix plus attrahens  
 nutrimenti, probe fructificare arborem facit. Nam si e contrario syluestre in urbano  
 seruëris, tamen si differentia quædam erit, tamen bonæ frugis arbor nunquam pro-  
 fectio reddetur. Atq; de consitionibus, & insitionibus hæc enus. Semina omnia ali-  
 quid in se alimenti continent, quod unâ cum generandi principio natura profun-  
 dit, sicut in ouis. Qua de causa non inepte Empedocles, oua solent excelsis gigne-  
 re ramis, inquit. Enim uero natura seminum ouis proxima est. Differere tamen ille  
 non tantum de arboribus, sed etiam de omnibus debuit: habet enim unumquodq;  
 alimentum in se, quo & durare temporis aliquantum ualeat, nec quemadmodum  
 animalium semen, exceptis quæ oua pariunt, protinus perit, ubi seorsum fuerit:  
 hæc enim alimento sulcata (ut dictum est) munitaq; ad suum cõseruandum prin-  
 cipium, durare nimium ualent. Sed alia diuturniora alijs: maxime uero diuturna,  
 quæ spissa, sicca, lignosaq; sunt, ceu palmæ. His enim nullus extrinsecus aditus pa-  
 ter, nec humor ullus includitur, qui putrescere possit. Quapropter neque bestiolis  
 infestantur, sicut frumenta: neque resiccantur, ut semina olerum: sed mira solidita-  
 te munita, suum tutantur illud genitale principium. Omnibus autem seminibus  
 aliquid pabuli ineffe, hinc etiam constat: quæ em arida, & ueluti putaminea omni-  
 no cernuntur, ut olerum, hæc suis temporibus ad germinandum mouentur, etiam  
 si humoris quantumlibet senserint. Quamobrem hæc in coenaculis reponunt, sit-  
 spenduntq; eminentius: nec ullam in eo domicilio aquam conspergunt, aut affe-  
 runt. Eo uerius in reliquis sensu etiam percipi alimentum facile potest, quod quidē  
 in carnis lactescere quodammodo solet. Confessum hoc idem fere & in animali-  
 um genere est: neq; enim quod ab his emittitur, totum semen purum, syncerumq;  
 arbitrandum.

De cura naturæ in feminibus conuestiendis, communiendisq; uario genere: ac de blechro planta,  
 & quæ facile germinet augeanturq;.

Caput VIII



Væ autem lignosa, nucleosaq; ambiunt, hæc custodiæ gratia naturam obduxisse putandū est: quemadmodū & quæ pelle, membrana ue cōstent: hæc enim omnia conseruandorū seminū causa supersunt: principium namq; omniū, potentia humidū est. Sed sunt quorū radices, rami, ligna, caulesq; plantis abscessi seruare suū uitale principiū possunt (sicut dictū iam est) ita ut ad germen etiam excitandū mouere se ualeant, ceu scilla, ceteraq; huiusmodi. Adde ligna oleæ, & caules liliorū, & blechri ramulos: nam ea quocq; solstitijs floret, quod permirū est. Cetera enim succum quendā leuem, lentumq; habere uident. Nec desunt, quæ pinguiuscula sint: & alia tunicis pluribus obtegunt, alia sua spissitate resistūt, quo minus possint sicari, tum aëre loco ue proprio mutato afficiunt, & germinant. At blechrus sicca omnino sentitur. Verum quamuis ita sit, principiū tamen quoddā eiusmodi habeat necesse est, quod unā cū aëris mutatione, alterationeq; moueatur. Mirū præterea quod nō remissa, sed potius intenta sæuitia temporis germinare incipiat: nisi forte dies halcyonides suffecturas putaueris: nam ad imbecillorū, exiguorūq; mutationē, uel quantumlibet temporis satis sit. Igitur generationes quot sint, quotq; modis fieri possint, quæq; singulis competāt, ex supradictis abunde patescit. Germinant aut, augecuntq; facilius quæ planta sint sata, quā quæ semine, præsertim si radice aliqua fibrata petantur: sic em partes pleraq; adultas iam haberi contingeret, quæ tantummodo alimentū desiderent. At in feminis sata omnia generari necesse est prius, quā incrementū incipiāt. Eadem ratione & quæ radice proueniunt, facilius augentur, ut quæ radice capitata creantur. In his enim nō nihil naturæ prægenitū est, quo plus impetus ad germinandum infertur, quā semina ualeant eniti. Hæc enim, ut prius radices capiant, opus est. Quæ aut naturæ suæ ratione præualent, ijs quoad genus generi cōparandum sit, causam meatuū rectitudinem assignasse par est, ut Democritus facit. Agi namq; in his perlationem facillime, & sine ullo impedimento, inquit, uel potius corporis raritatem, humiditatēq; pro causa reddidisse dignius sit: Quippe cum ea, quæ spissa & sicca natura sunt, difficile augecere possint. Quod enim spissum, siccū, amarūq; est, natura ignis consistit, & hinc lenta huius accessio est. Contrā quod rarum, laxū, & humidū est, id celeriter crescit. Ad summā, humiditas natura fertili germina, incrementūq; præstat. Argumento illud etiam est, quod pro locorū, consitutioneq; natura euenire uidemus. Locis enim serenis, & a uento silentibus, consitutioneq; breui interuallo disposita, arbores magnæ quidē exurgūt, sed raræ corpore, atq; humide. At uentosis, & frigidis, & rara consitione, minores quidē, sed spissiores, siccioresq; ueniunt. Afflatus em, & frigora, & omnino aër ipse occurrens constipat materiem, atq; coagit: unde cōtractiores q; reddunt arbores, neq; molem eandē possunt capessere. Idem etiā sequit cū consitio amplo disposita interuallo est: sic em spissiores, & in profundū auctiores consistunt. Contrā uero, cum breui interuallo consitū sit.

Cur femine magis, quā masculi augeantur. Tum quæ sata semine, deteriora, melioraq; oriatur. Item Thasios adultas amygdalis inoculare.

Caput IX



Idere hoc idem & in animalium genere licet, & præcipue in homine: facilius enim, quā mares, femine augeantur: quas quidem natura humidior, solutioreq; creari nullum dubium est. Idem idem etiam in ipsis arboribus latissime patet: punica enim, & ficus, & uitis, auctu faciles: palma, & cupressus, & laurus, & pinus, & olea, difficiles: quam ex ijs quædam meatuum rectitudinem habeant, uerum aut densitas, aut

utrunq; impedimento est: facit enim & siccitas, ne satis augescere possint. Ad hæc imbecillitas plerisque in causa est: nam quæ debilia sunt, difficile augeri, nutrita-  
 riq; possunt: deuinci enim, aut impe diri ramos à coelo ambiente, haudquaquam  
 oportet: nam & meatus, qui in directum pertendant, uim tam conficiendi nutri-  
 menti, quàm resistendi iniuriæ temporis exigunt. Quæ igitur facilia, difficiliaq;  
 auctu sint, his determinasse oportet. Ferè autem omnia, quæ semine inter satia  
 proueniant, deteriora exurgunt, ceu punica, uitis, amygdala: degenerant enim,  
 & sæpe pappo dicta lanugine, uitiuntur: ut inter historias diximus. Cuius rei cau-  
 sa, feminis profectò infirmitas est. Deuincitur enim ab influxu copiosioris alimen-  
 ti: & quemadmodum infœcunda, copia alimenti redduntur, quoniam digerere  
 nequeunt, sic & deteriora euadunt, quia uiribus carent: quamobrem Thasiq; amy-  
 gdalas adultas inoculant. Ex mollibus enim præduræ post satum redduntur: quod  
 idem uel in reliquis fieri potest. Sed quæ robusta inter ea sunt, quæ serisemine pos-  
 sunt, hæc diutius permanent, ut palma, & pinus conifera nuncupata, & picea  
 pediculifera. Pari modo de syluestribus etiam differendum est, ni fortè nulla ijs in  
 deterius mutatio possit accedere: ferocitas enim ultimum est. At uero bonitas suc-  
 ci carnisq; eorum, aëris & omnino loci ratione sequatur, necesse est: nam & ur-  
 bana ea ipsa inter se differunt ratione. Possunt etenim regiones quædam naturam  
 arboris susceptam seruare, aliæ statuto tempore, aliæ semper: nonnulla solo mu-  
 tato meliora redduntur, ut de punicis Aegypti, & Ciliciæ diximus. Euadunt enim  
 alteræ dulces, uinosæq;: alteræ sine nucleo, magnosq; cum acino apud Pinarum  
 amnem fructificant. Omnino cum fructus loca idonea nacti sunt, melius seruare  
 sua genera possunt, præcipue si arbores uigent, fructumq; laudatum præstare su-  
 apte natura pollent. Semen autem annuum pro terræ subditæ ratione ubique mu-  
 tatur, non protinus anno primo (parum enim id temporis est) sed tertio. Tum  
 enim ultima mutatio consummandi accedit, ut etiam in animalis genere: hæc enim  
 post tertium partum similitudinem perfectæ representare incipiunt. Cæterum pri-  
 mus etiam annus non nihil indicij affert. Quæ semine exeunt, his de causis dete-  
 riora redduntur.

De temporibus germinandi.

Caput

X

30



Nnua germinatio (hæc enim secunda quasi generatio est) non simul  
 omnibus fieri solet, sed tempore discrepat ita, ut quibusdam contra-  
 rijs ferè temporibus agi uideatur. Alia enim per æstatem, alia per  
 hyemem germinare incipiunt. Sic & fructificatio, nam ea quoque  
 temporibus dissidet. Igitur quoad simplicius differere licet, quæ sin-  
 gulis temporibus commode temperata sese exhibuerint, hæc & germinationes,  
 & fructuum consummationes nimirum singulis temporibus reddunt. Cæterum  
 particulatim quoque discernere ea tentandum est. Quædam facile germinant,  
 quia uiribus ualent, alimentoq; abundant, ut amygdala, punica, & ad summam,  
 syluestria magis, quàm satia: quædam suæ debilitatis causa germina facile agunt,  
 ut quæ natura herbacea, & annua sunt. Complura enim ex ijs uerno tempo-  
 re florent, ut fremoris. Nec malus roboris sui ratione præflorere apparet, sed  
 ob aliam potius causam. Festinant autem tam robusta, quàm debilia, ratione: al-  
 tera enim sua potentia, copiaq; propellunt: altera uel à minimo aëris momento  
 moueri facile possunt. Quin & humiditas, atque mollities ad emittendum plu-  
 rimum confert: ut etiam de primo exortu retulimus. Siccum enim, & spissum,  
 neque transmeatu facile est, neque copiam habet materiæ. Quæ autem contrarijs  
 temporibus germinant, his nonnulli causam humiditate, caliditateq; assignant.  
 Frigida

Frigida enim æstate, calida hyeme germinare autumant: ut utraq; natura conuenienter temperata utriq; tempori sit. Ita enim & Clidemus censet, haud igitur male id quoq; asseritur. Sed paucitatem, & debilitatem, & si quid aliud in causa sit, adijcere decet, sicut etiam in olerum genere: portulaca enim, & cucumis, & cætera huiusmodi, præhumida & frigida sunt: ocimum siccum, atque lignosum est. At tamen hoc ante feruentes dies germinare ita, ut perdurare, atque perfici possit, minime ualeat: causa uero debilitas est, quemadmodum & cucumeris. Hæc enim quæuis arboris altitudinē capiat, in ramosq; sese modo uitis arbutusq; diffundat, tamen uitæ admodum fragilis est. Itaque ante æstatem germinare non potest, sed autumnum usque prorogare etiam cupit. Adde quæ aculeis constant, quæq; radice in caput excrescunt, ceu nepa quæ appellatur, & tifyum, & spina regia, & lirim. Aliqua & post arcturum incipiunt. Siue igitur posteriora, ferioraq; hæc indicare conueniat, seu cæteris festinantiora, utpote cum primi imbres antecedant (nihil enim ad rem propositam refert) illud profecto latissime patet, quod neq; magnitudine, paruitate uel maturum proeunt, ferotinum uel germinis statuere iustum est: neque fortasse caliditate, aut humiditate, aut siccitate tantummodo, sed modum quandam tempori congruentem habeat unumquodq; opus est, ut tenerissima effici possint. Singula enim expectare suam perfectionem uidentur, nec prius germen ullo effundunt, sed penitus sibi immorta pariter arbores, frutices, herbæq; constant: quod manifestum præcipue in syluestribus est, quorum generatio sponte, sineq; ullo paratu fieri assolet. Omnia penè autumnalia, aut certe plurima generi fruticis, suffruticis, herbæq; attribuiamus. Arbos enim nulla penitus autumnum desiderat, præterquam si germinandum secundo cuiuspiam sit: quadam enim post arcturum sua germina geminant.

Quando arbores perpetua fronde germinent. Item quamobrem aliqua semper germinent,  
floreant, fructificent. Tum de uite insana. Caput XI

**A** summā (ut in uniuersum exponam) Arbores, quæ perpetua fronde conduntur, tum germen, tum fructū serius proferunt, scilicet ipsi tatis, siccitatisq; causa: paulatim enim in his affluit alimentum. Adde eam partem alimenti, quæ solijs assidue uenit. Hinc enim collectus, quo arbores oculus cogantur turgescere, nullus fieri potest: sed suo tantummodo tempore, quoad liceat, commouentur. Rara enim admodum sunt, quæ in genere semper uiuentium germine fructū ue præueniant, ut edera, ut rhamnus, & quicquid eiusmodi. Proprietas autem caliditate ne eorum, an raritate, humiditateq; uel etiam omnibus his de causis eueniat, querendum sanè est. Illo tamen prius non ab re fortasse exposito, quæ calida, quæq; frigida sunt, quibusq; rebus debeant iudicari. Sed de his postea. Quamobrem autem alia celerius, alia serius germinet, causas prædictas reddere possis. De his uero, quæ omnibus temporibus germināt, florent, fructumq; pariunt, ceu maloperfica, & quicquid eiusdem generis sit, ambigere quispiam possit, non solum, quoniam earum temperamentum temporibus singulis non respondeat, sed etiam, quod nec ipsa generantur sese germinis, aut fructus ratione conueniant. Id enim dissidium esse in his tantummodo uolumus, & euenire uidemus, quia nulla generis coniunguntur societate. Igitur affectionē hanc proximam dixerim animalium foetibus, qui preposterò concipiunt. Sed causa in illis patet, in his quæritur: illi enim quia non simul sua principia cœperint, nec forte in eodem loco, idcirco simul concipi nequeunt. Florū autem germinatio quamobrem simul non fiat, haud facile dictū est. Quod enim radices non ubique uersus, neque similiter habeantur, aut quod rami non recipiant succum, neque co-



quant, quibus prima germinatio provenire possit, illud ita fiat, necesse est. Sed quā obrem hæc ita sint, cuius ue rei causa, facile dici non potest. Vitem enim quam insanam uocamus, non procul argumento fortassis concepisse rursus existimaueris: hæc enim, quod minus suum excoquit fructum, pleraque sæcundi humoris residua continet, quæ aëre mitigato mox in lucem emittit. Sicut cæteris quoque arboribus prima germinatio erumpere solet. Fraxinus uero, & reliqua generis eiusdem periecte pariunt, atque excoquunt. Quæ cum ita sint, partus diuidi, & alias alium reddi, absurdum certe appareat, præsertim cum unico naturæ impetu agatur. Ambiguitates hæc ferè sunt.

*Solutio questionis, quare semper aliqua generent.*

Caput XII

10



AD causam autem reddendam pro facultate, quæ in his rebus suppetat, primo quod supra retulimus, accipi decet: id est, quanque arborum rem permulta habere principia, tam ad germinandum, quam ad fructificandum. Quod (ut dictum est) naturæ arboris propterea dāmus, quia & permultis sui corporis partibus uiuit, & uim proinde germinandi non paucioribus obtinet. His uero ipsis principiis germina neque cuncta similia inter se, neque paria, neque simul proueniunt. Sed eo uelocius, uberiorisque singula coalescunt, quo plus pabuli, ualidiusque influxerit. Etenim quodque germen, quasi planta quædam in arbore, perinde ut in terra consistit. Cum autem germinatio simul non fiat, neque uires pares concurrant, recte nec fructuum concoctio simul omnium agitur. Nam & partium situs differentiam sanè faciet, uidelicet cum aut ortum, aut occasum, aut septentrionem, aut meridiem spectant, quemadmodum & totarum arborum situs, asserre differentiam potest, aut si loca tenent serena, & placida: has enim tum germine, tum fructu præuenire notatur. Sed cum communis omnium natura huiuscemodi sit, ubi cœlum placidum, serenumque est, breue admodum tempus arbores sua germina differunt, ut in Aegypto: at ubi frigidum, atque immite, plus prætereatur temporis necesse est. In totum enim brevis quædam intermissio fiet, si tellus copiosum præbeat alimentum, & cœlum se temperatum apte exhibeat. Nam & ea, quæ nonnullis in locis folia nunquam amittunt, ut ficus, & uitis: propterea non amittunt (ut dictum est) quia nunquam his nutrimentum, quantum sufficiat, deest. Hoc ergo commune plurimum est: alia enim propter suam naturam, alia propter locum, idem aliquid fortiuntur. Sed cum omnia ita diuisa sint, ut alia fronde perpetua, alia decidua capi debeant, causas illis semper uiuentibus sit alimenti ubertas assidua: eorundemque, alia propter suam naturam, alia propter locum, talia consent. Tertiū iam, & quasi deinceps consequens perpetuam germinationem ponere decet. Quod enim semper frondeat, non semper germinet est necesse, sed illud seruare tantūmodo eadem germina potest: quod autem germinare perpetue natū sit, alia semper aggenerat, etiam germina, ut scilicet suæ peculiaris naturæ, quod idem uel in alijs fieri aliquatenus patet: germinat enim germinationē alia sub ortum syderū, alia nullo tempore certo, ut etiam uitis. Quod igitur his aliquatenus natura concessit, illis perpetua dote largita est, ut semper germinent, semperque fructificent. Cum autem natura talis eorum sit, nihil iam absurdū appareat, si alia perficiunt, alia flore promittunt, alia pariunt, alia superfoetant, atque parturiunt: nec enim in cæteris arboribus omnes partes simul esse sentimus. Sed quærendum potius sit, quænam, aut unde sit eorum temperies, atque coagmētatio. Quod simile esse uidebitur, ut si quæram, quæ temperies semper frondentium sit, præter quod hoc aliam quoque rationem desideret. Addere namque oportet, cur tantum aliamenu haurire, atque incoquere possint, ut nunquam generandi desit facultas. Enimue-

ro illa addita ratione, germinatio non nisi fructus generatio est. Nam simul quidem fructus plures gestare, alium perfectum, alium imperfectum, alium subnaicentē, uel iunipero, alijsq; obtingit, quorum concoctio lenta, & fructus absolui difficile potest. Horum igitur causa sic haecenus in praesentia exposita.

An germinet simul suprema, & inferna plantarum.

Caput

XIII

**V**trum autem germinatio, & auctio partium superiorū, ac inferiorum, quæ in terra condunt, simul fieri soleant, an distinctæ sint tempore, ut inter auctores nonnullos conuenit: scilicet radices per autumnum, hyememq; auferescere: caudices, & ramos per uer, atq; æstatem, & præcipue sub sydus: idq; ratione sic fieri, siquidē & in prima generatione se qui identidē soleat. Radicē enim prius semper, quā germen produci: antecedere nanq; id, quo alimentū inferatur, esse necesse: quod idem uel in consuetudinibus autumni liquere: tunc enim plantas consitas, radices capessere, nō germinare nisi paululum. Nam si radice carerent, mox patrescerent, atq; perirent. Sed idcirco eum satū cōmendant, quod plantarū primordia efficit firmiora, quibus utiq; & caudex, & reliqua generatio prodit. Etenim quæ protinus ad germinandum excurrunt, debilia, & inæcunda redduntur, quemadmodum in seminum genere hortos Adonidis dictos licet prospicere. Probabilis hæc eadem ratio uel hinc uideri utiq; potest: partes enim supernæ aëre frigido impediuntur: infernæ autem obrutæ, obfessæq; undique terra, & simul sufferuefactæ calore, qui fugatus iniuria frigoris se ad ima recipit, atque etiam humoris, alimentiq; copia refertæ facile auferescere possunt. Nihil enim his deest, quod auctiōnem, generationemq; facere ualeat. Ad hæc argumentum illud accipi potest, quod frumentis euenire uidemus. Hæc enim hyberno tempore obstitata, perfrictaq; , magis radices capessunt, quod rustici carciationem appellant, utpote cum uires, alimenta q; de partibus superis ad ima uertantur, regressusq; fiat modo iueneris cancri. His igitur rationibus auctiōnem distingui tempore dixerim. At illis hoc idem negauerim. In prima enim generatione prouenit quidem radix prius, quā germina: sed non adeo, ut spaciū quoddam temporis amplum procedat: sed ita, ut breue admodum intelligi possit, quemadmodum in animalium genere cor, quæq; circa cor ipsum consistant. Natura enim (ut ita loquar) nullam penitus rem particulatim, ut ars, facere solet, sed omnia uniuersa, simulq; procreat: quanquam alia prius, quā alia conficit. Sin autem in prima generatione necessarium illud credideris, at in alendo, augendoq; non alia prius, alia posterius aliter requiritur, sicut neque in animalium genere, sed simul quodammodo omnia tota sua mole aluntur, ita, ut non alio modo quā per continuationem cuncta alii, augeriq; ualeant: quod præcipue in incremento patescit. Ad hæc absurdum, si uis illa alendi dirigat per tam multas partes suū officium, dum format, imperitq; alimenta, uel si quod extrinsecus agit, ut flatus, aut ignis, id rem particulatim periciat. Neque enim hæc ita agere uerisimile est, sed potius cum una cum temporibus mota sunt, tunc per totas plantas transmeare credendum. Quod enim generat, unum est: non quemadmodū Empedocles diuidit terram radicibus, ætherem germinibus: tanquam alterum seiungi ab altero, tribuq; uni tantummodo posset, nec ex una materia, & a causa una generationē fieri oporteret. Locis autem si diuiseris, magnum admodum temporis spaciū sequetur. Germinationis uero impedimentū, quod frigus inferre potest, uerē quidem asseritur: sed partitionem id naturalem facere nequit. Accidit enim ut radices aliquorum increcant: quod uel tempore omnibus debito nunquam proculdubio euenit, cum frigus reterferit: sic enim germinatio inhibetur. Radicis autem incrementum nihilo impediri potest,



nes, & aggerminationes pluribus fieri temporibus solent: quæ quidem tempora contraria inter se quodammodo esse uidentur, id est autumnus, & uer & ortus caniculæ: quod enim aggerminetur solstitijs, minimum est: sed post æstivum, & sub caniculam longe copiosius germen adijcitur. Ver igitur nullam sui efficit admirationem: est enim id tempus omnium uiuacissimum, fecundissimumq̃, utpote quod humidū, calidumq̃ natura sit. Aestas contraria quasi Veri accedit: sicca enim, & feruentissima est, præcipue cum sydus exoritur. Item autumnus non solum siccus, sed etiam frigidus sequitur, aëre iam immutato temporis hyberni accessu. Est autem & frigiditas, & siccitas, germinationi omnino contraria. Igitur temeritas quædam naturæ in ijs ipsis appareat. Verum neq̃ ad germinandum contraria tempora illa consistunt, neq̃ hercle inter se dissident aliqua suarum uirium ratione, sed similitudinem profectio aliquam sortiuntur. Tempus enim quod germi accommodetur, humorem aliquem, caloremq̃ habeat opus est, ut uernum: & quidem id ad germinandum aptissimum proculdubio uenit.

*Cur sicca, & feruenti æstate fructus nascantur: atq̃ autumnus siccus,  
& humido uidem. Caput XV*

**R**eliquis autem ambobus hoc idem ortu caniculæ, & post arcti ur̃i obtinere solet: etenim sub ipso sydere quanq̃ plurimū ferueat, tamē & autūtrī afluant, & nubes consistunt, & ipsæ arbores manifeste humescunt, & sub cortice humor quidā expandit̃: quamobrē eo quoq̃ tempore consuetū alimentū citatur, siue humore cōpulsio, & facta circū obliuiscit̃ quadam, seu ob aliam causam. Id tamen hominibus etiam accidit, & hinc alui uehementer soluunt̃, & febres per multæ præ nimia corporū humiditate inuadunt. Terra quoq̃ per idem temporis amplius humescere planē uidetur, & aquæ proinde emergunt, & aliæ per multæ mutationes eueniunt. Sed quam ob causam hæc sequant̃, aiās disputabimus. Quod aut̃ plantis humefactis, & aëre nullo extrinsecus obliuiscit̃ germinū germinatio non absq̃ ratione accedit ijs, quæ suprà diximus, latissime patet. Autumnus uero, nō quemadmodū dictū est, siccus, & frigidus est, sed potius calidus: & simul ac syderis facta mutatio sit, aër humidus satis reddit̃. Quāobrem euenit, ut quasi mistio quædā humidi, & calidi fiat, sicut & tēpori uerno calor à sequente æstate obtingit: etenim autumnus caloris prægressæ æstatis aliquid extat. Humiditas autem recens accedit, scilicet ob densitatem, refrigerationemq̃ aëris. Recte & quæ sterilia sunt, & omnino quæ iuuenescunt, quā uetera, fertiliori pro uentu sua germina duplicant. Adde quæ locis humidis, hyberniscq̃ exeant. Sicciora enim quæ fructifera, uetustioraq̃ sunt: quoniam altera humores suos ad fructificandum absumunt: altera natura etiam sua nō nisi sicca constare necesse est. Sterilia uero, & noua, plus humoris, calorisq̃ possident. Rursus ubi hyberna loca, & humida sint, flatusq̃ cōmodi nō desint, ibi omnia autumnalia longa, humida, bonaq̃ redduntur. Sæpe etiam imbres æstiu plurimis eiusmodi locis descendunt. Itaq̃ aëris ea ipsa humiditate plenius germinant, augenturq̃ arbores. Nam & ea, quæ bifera esse uidemus, ut pomorū, pirorūq̃ genera quædā, his in locis potissimō exeunt, utpote cum tempus sese longius protrahat, fructusq̃ priores celeriter decerpantur, quod etiam fructus prouentū celerem dixeris. Veruntamē refert, quamprimū em̃ arbor repletur, qua de causa fructus eadē alios perfectos iam usui præstat, alios cōcipit, paratur ue. Caterū nihil ferē ex ijs, quæ secundo fructificant̃, simile primis perficitur. Sed quoniā unā cū plantæ impetu, solisq̃, & aëris opera nō adfuerit, idcirco omnia deteriora redduntur, quod in alijs longe latius patet. Ostendit enim & punica fructum secundū, & myrtus: sed augere nullatenus possunt. Igitur propensiora ad su-

pergerminandum (ut ita loquar) omnia, quæ suapte natura facile affici possint, nisi quid siccitatis causa nequeat, ut amygdala: aut nisi fructus decerptio proximior sit, quam ut tempus germinare germina ualeat. Igitur si autumnus prolixior fuerit, rofas quoque erumpere posse, & alia generis eiusdem ratio est, ut apud Dion. Macedoniam fieri aiunt. Quæ quoniam coctione uehementiore non egeant, tempus adepta quantum satis sit, florem emittunt. Denique (ut sæpius diximus) cum cœlum mite ac humidum, & in totum cōmode temperatum est, assidue germinare arbores possunt: quancumque non omnes, sed aliquæ: minora autem longe amplius possint: quod etiam nunc quibusdam ex coronariis euenit, quæ locis circumobseptis, apricisque continetur. Nam & œnantha, & uiola nigra, & alia quædam, assidue florere uidentur. Sin autem & cultus adhibeatur, longe amplius ita continget. Locum uero ualere plurimum, cum apricus circumobclususque est, uel arborum ipsarum testimonio patet. Locis enim eiusmodi pleraque exeunt, quæ nasci alibi nequeunt, & fructum eadem afferunt, cum cætera generis eiusdem alijs locis afferre non ualeant, & præfloreant, & prægerminant prius, quam reliqua. Sed de his satis.

*De ratione biferorum, tum de floribus, fructibusque.*

Caput XVI

**Q**UOD autem in biferis uidemus arboribus, simile quodammodo illi est, quod in pecore fieri solet. Illud enim, cum primi partus bene successerint, facultasque foetificandi denuo adest, rursum ad concipiendum citatur, dummodo tempus suppetat. Et arbores quoque decerptis fructibus primis, concipere possunt alios: sed solo pingui, culturaque plenioris opus forsitan sit, in primisque dixerim cœli temperiem pernecessariam, ut tempus, quantum partui satis sit, nascisci arbores ualeant. Id enim causæ est, ut etiam si quis fructum, aut florem decerperit, generari iterum alius non possit: quoniam tempus suffecturum partui nullum super sit: haud enim fieri potest, ut ante pariant, quam in utero ferant, cum primus humor consumptus iam totus sit. Accidit præterea, ut gignendi principium lædatur illati uulneris causa: ita ut nuncque nisi alio denuo effectio principio, germen emergere possit: quod quidem præfens tempus nequit efficere. horum igitur has esse causas opinandum. Flores autem rationi germinationis haudquaquam respondent. Arbores enim magna ex parte eodem ferè tempore sua germina adunt. Sed quæ obrem fructus longo post tempore maturefcant, causam illam reddemus: quod folia, et germina agilia, facilioraque sint, utpote cum ea crassiore, callosioreque consistant materia, fructus purgatior consistant, succisque ipsis præcipue perficiantur: quod quidem non aliud, quam maturitas fructuum est, ad quam certe ampliori paratur, confectusque opus est. Item fructus magnis inter se differentijs distant, eo quod aut lignosi, aut terrefacti, aut siccis, aut pingues natura sint: tales enim difficilius confici necesse est: quæ de causa sunt, quæ cum flore præueniant, fructum tamen diu retineant, ceu amygdala. Erui namque, qui ligno constat, difficile admodum potest. Flos celerius exit ob eam, quam supra diximus, causam: siquidem ea omnia modum conuenientem, ordinemque foriri debeant. Quinetiam florum ipsorum, qui mole aliqua corporis emergunt, serius se ostendunt, ut flos punice.


*Cur culta serius proueniant, quam inculta: sive sterilesque fructus non maturent cum sint urbanis ualidiores.*

Caput XVII

**I**Ncultis prius, quam culta germinare incipiunt, ut uitis, mælus, olea, ficus, & reliqua: quoniam calorem amplius ualeant retinere, cum non foedantur, neque radice nudentur. Calor etenim est, qui ad generandum mouere arbores potest. Adde quod nulla superioribus partibus plaga illata

illata est, dum aut rami deputarentur, aut fructus decerpere. Acceptum etenim  
vulnus facit, ut arbor laboret, frigeat, contrahaturque in exiguum. Ad hæc ratio illa,  
& (ut sic dixerim) præcipua, possit afferri, quod sylvestres arbores, quoniam ampu-  
ratae, purgataeque non sint, sua germinandi initia minoribus contineant furculis,  
quorum quisque pro exigui corporis sui ratione motum leuem desiderat, quo pro-  
tinus germinare incipiat: quod uel in piro sylvestri perspicere liceat. Hæc enim faci-  
lius quam urbana, eisdem prorsus de causis germen emittit. Cum enim pluribus,  
minutisque internodijs diuidatur, principia illa germinandi agilia, propensioraque  
ad germen, opera coeli ambientis redduntur. Necnon & siccitas non nihil conferre  
uideretur: sic enim minus humoris reînquitur. Quod autem minus sit, motu facilius  
extrahatur. Melior igitur, pleniorque germinatio & fructificatio cultarum arborum est: sed  
citior neglectarum. Cur sylvestres arbores, cum urbanis ualidiores sint, fructus ma-  
turare non ualeant, quaeres. Pro uirium enim ratione coctiones sequi consentaneum  
est. Vnam igitur causam fructuum copiam assignasse par est: non enim tantum suis  
præualent uiribus, quantum plus æquo fructificant. Ergo magna geritur copia  
cuius maturitatem uires arborum attingere nequeant. Quapropter agricolæ, par-  
tem auferre cum plures prodierint, solent. Altera causa est, quod arbores sylue-  
stres spissiores, siccioresque sint, & succum proinde ad se potius trahant. Alimentum  
autem & excoctio, non nisi humoris expansione perfici potest. Quod si humor ali-  
unde trahitur, nunquam ab alio capi facile possit. Ad summam, non quæ ualidiora,  
altioraque sunt, hæc amplius ad fructificandum ualent. Solutum enim, laxum,  
permeabile, & humidum id esse oportet, quod fructum large laturum sit. Spissitas  
uero contrarium est, quod etiam in mulieribus, reliquisque animantium generibus  
patet. Idque ipsum agricultura quoque adhibere contendit, cum superuacua quæ-  
dam plantis abscindit, alimenta que subministrat, & omnia patefacit, afflatibusque ex-  
ponit. Fructum igitur ratione prædicta copiose produciunt: sed percoquere ne-  
queunt, ob eas quas diximus causas.

De maturitate fructuum, & usu eorum. Item cur non, ut quæque ualidissima sunt,  
ita & semine præferantur. Caput XVIII

30  Oncoctio in pulpa fructus fieri solet, quam scilicet confici, & succum,  
saporemque capessere nostræ naturæ congruum, necesse est. Sed forte  
hoc ipsum prius distinxisse oportet: Concoctionem aliam pulparum,  
aliam seminum esse. Et earum alteram ad cibum hominis accommodatam,  
alteram ad generationem, perpetuitatemque arborum pertinere. Fructus  
enim & semina earum rerum causa, natura produxit. Vtrumque uero concoquendi ge-  
nus alteri quodammodo opponi uidetur. Cum enim pulpa humidior & plenior est,  
fructus minor includit: cumque is maior est, pulpa minor, durior, saporeque deterior  
ambit. Cuius etiam rei causa agriculturæ solers adinuenit ingenium, quæ fructus ali-  
40 mentum, incrementumque ualeat impedire. Omne enim ferè urbanum, nucleo minori  
fructificat, quam sylvestre: & cultum, quam incultum: & melius cultum, quam deterius:  
quoniam amplius humescunt, & alimentum uberius ad pulpam augendam deducunt:  
atque etiam succos pro modo nostro usui congruente, maturant. Igitur concoctiones mul-  
tum inter se differunt. Siquidem & minus solitum illud concoquendi genus addidisse  
conueniat. Sed forte dubitauerit quispiam, atque statuerit, quid ualidiora exuperat, idem  
etiam debiliora posse exuperare. Semen autem omnium esse potissimum, utpote cum hoc  
finis communis sit omnium plantarum. Reî namque similis generatio, finis proculdubio est:  
& quid in animalibus semen non nisi perfecta natura posse fieri patet: cumque ob se-  
nilem ætatem defecerit, generatio cessat. Recte igitur dubitaueris, atque ita statueris.

Seminis enim productio, perfectioni prorsus cuidam tribuit. Quo tandem modo ætas in singulis accipi generibus possit, nō tamen quæ uegetiora, robustiora quæ sint, hæc seminis producendi uim præcipue possidēt. Sed e contrario propemodū sequitur, cum in alterutram partem succi, uiresque perrexerint. Quamobrem in genere quoque plantarū idem euenire ratio est, atque ita portionē etiam illam accedere planū iam est: ad utram enim partem succus influxerit, reliqua ieiunior erit: ambabus enim satisfacere nō quit: hoc exploratū ferme in omnibus est. Plantarū autem genus, tres quasdam portiones succi sortitū est. Ducitur enim succus ad arborē ipsam, eiusque germinationem, quod quidem fructibus obest, si plus æquo incessit: hac enim de causa fructus plerumque nō prodeunt. Item ad fructū, & pulpam fructū ambientē: impletus enim factus ad alterum, ne quis ad reliquum fiat, impedimento est. Vi igitur in illis nō deest ratio, ita nec in his deest, sed portio planē sua seruat. Syluestres enim arbores, tum fructui, tum pulpæ humorē distribuunt, sed plus ad fructū deducunt, ita, ut is effici possit amplior. Ad hæc non inepte omnino fortasse dixeris syluestres amplius sua semina augere, quoniam masculæ quodam modo sint, & spissiores, siccioresque natura consistant. Cultura enim, alimentorumque copia plantas effoeminari uerisimile est. Sed hoc argumentū ē remoto deductū, itaque similitudine quadā dicatur id, uelim. Inter maturitates autem, ea quæ fructibus datur, primatū ad generationē obtinet: quæ pulpis, hæc ad hominum usum præualet. Vtra perfectior sit, alterius inter est disputationis indagare. Nam & in folijs, & in radicibus sic tantummodo uti sole-  
mus, ut olerum ea ipsa excoctio perfectior est, quamque eorum finis in seminibus sit, quibus ad pastum nonnunquam utimur.

*Vtrum calidiora sint syluestria, quam urbana: debeatque natura ratio de syluestribus colligi, an de urbanis.*

Caput XIX



**X**plodenda nec illa ratio est, quod ex frigidityte arbores syluestres con-  
coquere nequeant. Nuclei uero lignoso quodam, & purgamentatio  
alimento consistunt, quemadmodū animalium ossa. Ergo hoc ipsum nō  
inepte asseritur, nucleū ex lignoso, terrenoque confici alimento. Verū  
semen nō ex eadem, sed ex purissima compilatur materia. Quæ autē  
natura calida, hæc eo copiosius semen apta proferre sunt, quo plus caliditatis obti-  
neant. Et urbanorum calor indicium, uis ipsa succorum est. Succus enim siccorū, lac con-  
trahit: caprifici, minime aut prauæ. Sec huic rursus alia quadam repugnat generalis  
de caliditate opinio, quod syluestria durare amplius locis frigidis possunt, in totūque  
robur nō nisi caloris ratione obtingit. Sed de his post hæc forsitan differendū sit: pro  
lixiore namque opus est disputatione: & quaeratur oportet, quamnam calida, quæ ue-  
frigida sint, quibusque rebus determinari hæc deceat: atque etiam quamnam eorū cau-  
sa sit, siue sola, siue cum alijs: & quorū nam ratio coquendi diuisionē possit recipere  
tam simplici, absolutaque ratione, quam quod ad genus humanū attinet, ut quæ acri-  
monia, uel succo medico differrent, quæ quidem medica, & comedantur, & usui po-  
tissimo sunt. Hæc igitur quasi proprietas quadam naturæ animaduertit, ad quā sci-  
licet & alimenta, & cultura, aut contrā neglectus, fauitatesque pertinent, ut de lase-  
re, & Inturi ferunt, & si quid aliud cultionem aspernari aptum sit, aut ediuerso si  
quid siccam uel humidam, & hybernā tellurem persequi soleat. Ex hoc autem ipso  
quaeret fortassis iterum quispiam cōmuni quadam, ac generali cespitans ambigui-  
tate, utrum naturam ex ijs, quæ sponte proueniunt, contemplari potius deceat: an  
in ijs, quæ cultu hominis exeunt, atque adolescunt: Et utri generi potius ratio naturæ  
tribui debeat, quod idem ferē est, uel potius pars quæstionis illius, Vtrum in gene-  
re syluestri, an in urbano sit natura inuestiganda. Natura enim in se principia te-  
net:

ner: & id secundū naturam esse censemus, quod in se principium motus possidet, & quietis: cuius generis illud profectō est, quod sponte proueniat, non quod opera hominis, præsertim cum arte quicquā constiterit: namq; ab alienis principiis id producit. Et quidem in animalū genere, ea quæ fingantur, aut ad paruitatem, magnitudinem uē, in totumq; ad effigiem quandam formæ, ut perducantur, facta secundū naturam minime censere debemus. Natura enim semper id spectat, quod optimum sit, ut inter omnes conuenit autores. Cultus uero, & huiusmodi adhibita cura, naturæ auxiliatur, quod perfectius suum exequitur officiū. Dum igitur natura satis sibi non est, hæc per artem assumit, ceu copiam alimentī, pinguitudinēq;  
 10 & rerum impediētū exterminationem, quæ scilicet loca etiam apta, & ad singula accommodata ualeant adhibere: in quibus quidem naturam contemplari dignius esse putamus. Sed illa rerum externarū tantummodo ratione opitulantur, ceu aeris flatus, solis, alimentī. Agricolatio uero in ijs ipsis pleraque immutat, disponitq;. Quod si illa hæc exigat, quod melius succedere possint, hæc quoq; illa desiderent, ratio est: præsertim cum agricultura ab ijs ipsis dependeat, atq; in his sua fortiat principia. Nam illud quoq; ijs, quæ sponte nascuntur, absurde, & quasi præter naturam euenire uidemus, ut ex feminibus deteriora reddantur, atq; omnino degenerent. Neq; enim secundum naturam est, sed simile semper generari exposcitur. Igitur ambiguitates hæ, talesq; occurrunt.

*Solutio questionis, quemadmodum considerata sit in urbanis, & syluestribus natura ratio: ac de maturitate, & uaria fructuum concoctione*

Caput XX



Edhis quoq; naturas distinxisse, quemadmodū concoquendi genera, prius oportere, planum profectō est. Alijs enim natura ipsōanea coniunctior est: alijs cultura, solertiaq; accommodatior: nōnullis utraque ratio cōgruit. Quas ob res omnino considerandū est, quemadmodum natura syluestribus, & urbanis se distribuērit pariter in animalium, & plantarum generibus. Quippe tam syluestribus, quā urbanis, frondes aptissimas & ad conseruationem, & ad perennitatem, & ad auctiōem, & ad fructuū generationē, largita est. Fructuiferas item ipsas diuidere fortasse oporteat, ut aliæ sint, quæ sponte fructificēt: aliæ cultura tantum, & hominis opera ferant. Horum igitur determinatio petenda hinc est. De concoctione autem, unde digressi sumus, reliqua subiungamus. Omnia ferē, quibus fructus humidus, aut nudus, aut tenui intectus putamine, celeriter suos fructus perficiunt, ut ficus, uitis: sed præcipue morus. Hæc enim fructum nudum penitus gerit, ut quantumcūq; sol tepescerit, citissime fructus immutari possit, ut pote qui minimo egeat calore. Vna enim uis quadam præualida, uniuersaq; excurrere solia, fructū conficit atq; percoquit: sicuti & in germinādo fieri solet. Longa etenim prorogatio germinis, collectum maximum facit. Vnde & germina congesta magno cum impetu prorumpunt adeo, ut uel sonitum facerent, quod quidam affirmant: & concoctiones perfici celerrime possunt. Namque simile euenit, atque in frumentis, quæ hyems diu retinuit. Cum enim laxata sint, uelociter auferuntur adeo, ut non multo  
 30 ferius posteriora perfici possint. Adde, quod etiam morus non summatim, sed particulatim fructum percoquere soleat: unde & diutissime perseverat, nec humoris tenuitas, aut aquositas amittenda est.



*Cur morus citò percoquat, cum serò germinet: ficusq; & vitis serotinae sint. Cur item aliqua arbo-  
res sint praecoques: quodq; in Aegypto arbor quaedam centesimo anno  
fructificet.* Caput XXI



Rucus mori his de causis uelociter maturefcere potest: sed ut Me-  
nessior autor est, germinat serò hæc arbor, propter loci frigiditatem,  
excoquit citò propter suâ debilitatē. Vitis autē, ficiq; fructus, serio-  
res sunt, quoniam & putamine obtegentur, & succum ampliorem,  
crassioremq; gerant. Ad hæc ficus mole ampliore consistunt, et sum-  
matim quodammodo maturefcunt. Vuae autem, & numerosiores proueniunt, q̃  
ut breui excoqui possint, & congestis acinis coaceruantur: nec aliquo interuallo  
discernuntur. Item umbra opacant, nec subdiales dependent, atq; humore exu-  
berant: uitis enim aqua præuvida est. Deniq; omnia dulcia breuiori tempore ma-  
turefcunt. At si quis etiam pro nostro usu uelit decerpere, longe amplius festina-  
tiones appareant. Horum igitur causæ cur prius, cur ue posterius perficiantur, his  
ferè constant. Non tamen cunctæ arbores, generis cuiusq; praecoques sunt. Vites  
enim & fici, permultis inter se discriminibus distāt, ita ut nonnullis fructus serò ad-  
modum maturefcere queat: quapropter causas in uniuersum reddamus, fortasse  
dignius est. Ergo praecoques illæ arbores sunt, quæ nō præhumidæ, nec succo fri-  
gidæ constant: quæq; fructum nudum, aut membranis intectum prætenuibus  
gerunt, cocturamq; succorum aquosam, non crassam conficiunt. Serotinae uero,  
quæ modo contrario se habeant, hoc est, quæ præhumidæ, frigidæ, & fructu, aut  
pulpa fructus lignosæ, præduræq; quibusq; fructus lignoso sepro, numerososq;  
continentur putamine. Ad hæc quibus succi pingues, & aliquam eiusmodi for-  
tientes potentiam, aut quibus fructus sicci, parumq; humoris habentes, idq; pin-  
gue, uel eiusmodi aliquid. Hæc enim omnia coctionem uehementer impediunt,  
quod in singulis etiā percipi licet. Quæ enim perpetue uiuent, omnes propè frus-  
tum serò perficiunt: ligno autem tam fructus, quàm fructum ambientia, cōstant  
picæ, larici, cupressi sicci alij sunt, aut pingues, aut lentitia quadam gliscetes, ut  
cedro: unde quamuis non magni, confici tamen difficile possunt, quoniam tales  
sunt. Ad hæc spissitatis causa parū alimenti insui potest, totusq; accessus parcissi-  
me agitur. Inter eas uero quibus frons decidua data est, quæ perhumidæ, frigidæ,  
terræ, serò maturant. Frigiditas enim & siccitas, & multitudo, & terrena concre-  
tio, cōfici & maturefcere quam difficilime possunt, ut pirorū syluestrium, & glans-  
dium. Quæ autem media temperie constant, & satis calidæ, solutæq; sunt, hæc tam  
germine, quàm fructu præueniunt, utpote quæ admistionis ratione percongrua,  
cum sibi, tum etiam cælo ambienti consistent. Verū singula non nisi serotio omni  
impedimento sic accipiēda censemus. Nullus enim neq; maturus, neq; serotinus  
fructus attribui debet, si qua sint quæ aduersentur. Exempli gratia: quædam quan-  
quam nudum afferant fructum, serò maturant, ceu smilax, & quædam alia race-  
matim fructificantia: alia non solum serò, sed particulatim etiam maturefcunt, ut  
rubus. Hoc enim in genere, quod quædam natura frigida sint, serotina tam fructu  
quàm germine consistunt: quod alia nuda, & sine ullo putamine pateant, suffice-  
re sibi nequeunt, cum tempus occuparit incommodum. Alia quod siccam naturā  
fortiantur, diu immatura persistunt. Quodq; etenim siccum, humorem desiderat,  
quo & nutriri possit, & coqui. Germen autem prout temporis particeps utriusq;  
est, ita sese tueri longius, atque protelare potest. Verum quantum formula substi-  
gnare licitum est, has eorum causas dixerim. Nanque ratione ætatis serò, maturæ  
ue fructus pro tempore perficiuntur: ut plantæ nouellæ ex nimio humore, & in  
totum copia nutrimenti, tarde suos fructus perficiunt. Veteres autē cessant, quod  
efficitas

effoetas iam eas longa ætas reddiderit, quemadmodum arbor illa Aegypto tributa, quam anno centesimo fructificare narratur. Ficus autem regionis eiusdem nunquam nisi scalptis fructibus, oleoq; perunctis concoquere potest, ex humorum scilicet ubertate, nimiaq; alimentorū copia. Nec solum fructum sero reddi, sed etiam sterilefcere quædam, nutrimenti copia facit: quemadmodum de uitibus, amygdalis, denique omnibus quæ perforatu castigantur, retulimus. Omnia nanque illo nimio liberata humore, aut ex sterilibus in fructifera, aut in melioris, suauiorisq; fructus fertilia transeunt. Amygdalæ, si paxillo deciso, humorem influentem abstergas, idq; biennio aut triennio facias, dulcem ex amara efficies. Quin & ficum  
 10 resectis radicibus, & trunco præfixo fertilem ex sterili, longeq; feraciorem reddi affirmant. Simile ferè perspicitur in hirculatis uitibus licet: etenim earum quoque imperum reuocare, quantumq; uacans superfluat auferre oportet, ut fructum parere ualeant.

*Quare arbores melius proueniant solo non pingui: & quod solum aptum sit frumento: atq; in eodem genere aliqua mature, serò aliqua parere. Caput XXII*

**I**usdem propè generis uel illa causa est, quamobrem non pingue, altum, lætumq; solum arboribus commodum sit, sed quod deterius conficit, frumentis autem illud uehementer cōueniat. Radix etenim arboris alte in eo solo descendens, imaq; subiens succosa, æquo plus  
 20 alimentum attrahit, quod non in gracili, minusq; alta tellure facere potest. Hac enim radices per summa adherent, minusq; alimentum, & quantum competat, hauriunt. Nam & in arenaceis, sabulosis, saxosisq; terris quantum satis sit, capere arbores possunt: nituntur enim, & in dissecta tellure radices nimirum suas demittunt. Ad hæc, solo eiusmodi utpote saxoso radices amplius refrigerari consentaneum est, quod uehementer arbores quærunt. Frumentum autem radices  
 30 piures solo utique frugali capessit, quoniam alte descendit. Vitioso plerumq; etiam exarescit radicum inopia. Refrigerationem ergo desiderat, quia radix alte infixæ non est. Cum uero imbres crebri accesserint, deterius præ alimento nimio reddi credendum est. Nam & arborum fructus idcirco degenerant, quia alimentum  
 40 pia deuincantur, ut superius dictum est. Sed absurdum profectò putaueris, quod inter ea quæ generis societatem habent, animaduertimus: hoc est, alia matura, alia ferotina consistere, ut fici quædam, & uites, & pomi, & piri, & alia. Enim uero inter animalia genus nullum eiusmodi est, cane excepto, sed omnia pari tempore, & ferunt in utero, & alunt cum pepererunt: quanquam tempora pro loco-  
 rum natura sæpe permutant, & præcipue quæ cum hominibus uiuunt. Igitur germinationes quoque aliquorum posteriores forsitan ueniunt, atque ita portionem  
 absoluunt. Cæterum in quibus id desit, quæstio ista quasi per æquiocationem exultat. Est enim & animalibus, & plantis à natura exhibitum, ut alia urbana,  
 40 alia syluestria sint, quæ nullum fructum gignere ualeant. Nam ea quæ caprisici ferunt, sui generis sunt: quippe quæ nunquam maturefcere, neque perfectio-  
 nem ullam attingere possunt. Vites quoque insanæ uocatæ sui generis sunt, quæ non solum germinant, sed coquunt, & florent, & racemantur. Et si quid aliud ad  
 florem usque tantummodo ueniat: sua enim natura quodque differentiam ge-  
 rens, diuersi generis esse iure existimetur. Quæ autem percoquere, germinare,  
 florereq; simul, alijs tamen atq; alijs partibus ualeant, ut málus medica, hæc plenio-  
 rem quandam & peculiarem certe sortiuntur potentiam: siquidem id agere possint  
 perpetue. Simile enim obtingit atque in aëre placido, medioq; conflato tempore,  
 quo scilicet germinatio & fructificatio facitari assidue potest, ut suprà retulimus.

Ibi tamen aer causa est, & omnibus communis proinde occurrit: at hic natura visque arbori sua, utpote quæ se omnibus temporibus exhibere temperatâ ingenue possit.

*Differentia inter pulpam, fructus, & semen in pulpa inclusum, quò plus temporis perduret: ac de copia & bonitate olei.*

Caput XXIII



Ed cum pulpa quæ semen complectitur, diuersa per se consistat (hanc enim natura usui hominis accommodauit) terminum eius, tempusque statutum esse necesse est, quod ubi præterit, noxam utique possint imbres, tempestates, hyemesque inferre. Seminum uero ipsorum nullius terminus est: unâ enim cum pulpis hæc defluunt: profiliunt alia, ut pinipicosa, & ad summam omnium coniferarum. Conis enim adhuc pendentibus, hæc exiliunt, uasque ipsa relinquunt inania. Quod idem etiâ cupressis euenire nullum dubium est: sed illis semen nuceum, his membraneum, & exile adest. Quæ igitur putamine ligneo, aut pelliculari quoque ambiuntur, ut nuces & grandes: hæc suis munita tegminibus, ad germinandi usque tempora illæsa seruari nimirum posunt. Quibus autem corpus ambiens carne consistit, hæc externa illa mole putrefacta, labefactaque, per se ipsa sub lignea natura perdurant: ut uinaceum, & palmula nucleus. Alia membranæ ac tunicæ complures tuentur. Nonnulla inter sese modo quodam deuincta, & uasculo communi circumobclusa, uigore certe indomito permanent, ut pirorum, malorumque semina. Hæc enim omnia ferè pulpis plenioribus includuntur, quò plus temporis ualeant perdurare. Custodia & ad gerendum conseruatio fructuum hæc est. Carnis autem fructus ipsos ambientis terminus quidam statutus est ad hominis usum, ut dictum est. Nam & succi cum diu manserint atque maduerint, deteriores redduntur. Nonnullis quodam tempore post copia largior datur, ut oliuis post arcturi exortum. Ad id enim temporis usque oleum augetur creditur, postea carnis incrementum succedit: & si imbres copiose accessere, oleum in amurca deterius redditur: & sæpe fructu ob eandem causam putrescente, itidem accidit. Expectatur oliuarum maturitas, nec statim decerpuntur, quoniam sic confectio & decerptio difficilior fiat: atque etiam arbores, dum perticis percutiuntur, detrimentum nimirum capiant. Ergo si id uerum sit, caloris naturæ datum omnino est, ut oleum, ac succi pinguedinē large possit præstare, scilicet cum se congrue ad rem subiectam accommodauerit. Enimuero si calor uehementior sit, non eodem fungi officio potest, sed uelut alienus & adiectitius quidam deficit, uimque omnem succi impellens ad carnem corpus tantummodo incrementum facere cogit. Quod etiam æstate ac hyeme imbrium accessu, & aquis scaturientibus accidit, tempore incrementi. Caro enim excrescit, atque ita oleum alimenti nimietate absumentur, nisi secuta serenitas corpus exiccet atque attenuet. Sic enim seruari, ampliusque exuberare potest. Quod cum aliàs sæpe, tum magistratui Nicodori obtrigisse memoriæ proditum est. Quamobrem olei profluuium longe melius extitit. Tandem enim ex dimidiatis portionibus fluxerat. Sed modos coquendi destinatos esse à natura, hominum usui, ex his cæterisque supradictis, quibus de syluestribus discimus, dilucide intelligi potest.

*Quæ germine annotino, quæ nouello fructificent: tum palma in spica ad frumenti similitudinem parere, & cur ita: necnon cur arbores aliquæ alternis annis fructificent.*

Caput XXIII



Ruficant autem alia ex anniculis, alia ex nouellis germinibus. Quæ quidem naturarum discrimine pro ratione suorum temperamentorum planè inter se differunt. Etenim quæ sicca, densa, lignosaque sunt, hæc germine annotino fructificant, utpote cum in his parce influat, & germen adeò debile sit, ut neque transducere, neque retinere humorem

rem

rem ualeat tanquam germen oleæ. Quæ autem humidæ, solutæ, plenæq; sint, hæc fructum nouellis germinibus pariunt. His enim in uniuersum uehementerq; im-  
 perus agitur: quamobrem simul & germen, & fructum effundere queunt. Cæ-  
 terum & cum ex annotinis fructificant, pusillo quodam emissio germine ferient,  
 nec protinus ex lignoso illo antecedente fructus emergit: quoniam nec ullo pa-  
 cio aptum id sit fructum parere, nisi temere quicquam fiat. Sed peculiaris maxi-  
 me, tum præ cæteris generibus seminum, tum præ ijs ipsis quæ ligno constant,  
 palmæ generatio est. Non enim annotinis quibuscumque, aut nouellis hæc ferre so-  
 let, sed ijs quæ prægnans gestat, modo spicati seminis fructum condit. Virga enim  
 10 quæ fructum gerit, quemadmodum spica erumpit. Causam uero siccitatem, for-  
 mamq; uniuersam arboris dixerim. Cum enim custodiam fructus desiderent, siue  
 extra consistant, siue intus formati demum erumpant, cæteris custodiam illam so-  
 cia præstant, ut retulimus. Palmæ quoniam fructus non apud folium hæreant,  
 concreuant intra arborem necesse est, ut ualidi, formatiq; tandem reddantur aëri.  
 Quapropter in utero parentis natura partum seruauit, quod similiter atq; frugi-  
 bus inspicandis agatur. Spicatio autem communis plurimum sit, causam quoque  
 communem quandam animaduerti necesse est. Sed mirum quod ex omni arbo-  
 rum genere, palmæ tantummodo frondibus id eueniat. Proprium enim si quid  
 in ijs sit, quæ generis societate iunguntur, iure admiratione dignetur. Verum de  
 20 hoc amplius cogitare par est. Arbores autem quæ alternis annis fructificent, nec  
 singulis possunt, quoad pingui minerua colligendum sit, omnes siccæ, præduræq;  
 sunt. Adde eas quæ fructum non ex nouellis, sed annotinis ferant germinibus.  
 Ut enim prius colligatur genereturq; opus est: quæ simul hæc facere, quemadmo-  
 dum quæ probe materiata altæq; sunt, minime queunt: quod maxime in olea pa-  
 rescit. Hæc enim infirmissima & fragilissima omnium est, & decussa perticis, aut  
 præcisa, uehementer laborat. Qui enim oliuas non ita legunt, sed aut sponte deci-  
 dentes, aut manu concussas, propius ad fructificandum annuatim oleas accedere  
 aiunt. Regiones quoque plurimum inter se differunt. Itaque in Alethea fructi-  
 ficari assidue ferunt, quanquam anno tertio discrimen pateat. Quæ ualidiores  
 30 sunt in earum genere, quæ ramis annotinis fructificant, hæc prout deus tempora  
 duxit, ita fructus reddere consueuerunt, quemadmodum quæ fructum suis no-  
 uellis depromunt ramulis. Nam eas quoque temporum rationem cœliq; statum  
 sectari certum est.

*Cur quæ bene germinauerint male fructificent: & quod prius, quod posterius gignatur:  
 præterea aërem, solem, & proprietatem arborum in fructuum generationumq;  
 ratione differentiis constituere. Caput XXV*



40 **R**enit ut cum oleæ bene germinant, male fructificent: cumq; bene  
 fructificant, male germinant: tanquam natura utrique satisfacere  
 parti non ualeat: sed necesse habeat absumere alteram, ut alteram fa-  
 ciat. Peculiare quod fico, & uitibus euenire quidam enarrant: hæc  
 enim cum egregie germinant, tum maxime fructificare dicuntur.  
 Quod si uerum sit, supradictum quoque uerum esse necesse est. Fructum enim  
 copiosa germinatio facile detrahare potest, quod uirtute loci, & bonis uiribus ar-  
 borum fieri potissimum solet. Telluris enim eiusmodi alimenti larga copia est: & ar-  
 bos quæ ualida sit, facile suo robore attrahere possit, ceu amygdala atque punica.  
 Quamobrem in arbores debiles germinū lasciuia minime cadit, sed modice apteq;  
 ad fructificandum his germina prodeunt. Quod enim satis fructum præstiturum  
 sit, id neque excedere, neque deficere in germinando oportet. Ficus autem uitibusq;

præcipue candida, modicè uliginem attrahunt, ratione suæ infirmitatis. Solum quoque ut minus frugale sit, opus fortasse est, ut ne soli quidem causa excessus possit ullus accedere. Quapropter in insulis hæc amplius euenire uidemus. Verum rationem illam communem de omnibus debilibus reddi melius est. Huius igitur causam hinc petere omnino debemus. In cunctis autem fructibus pulpa, & pars exterior prius quàm semen gignitur: quod ita fit, non solum quia semina magna ex parte lignosa, nucleosæque sint, lentiusque proinde cōsistant: uerum etiam quia semen finis fructificandi est, quemadmodum diximus. Quod autem alicuius gratia est, id prius quàm illud esse necesse est. Rerū enim eiusmodi generatio, nō nisi præcondito aliquo, & ueluti iactio quodam fundamento fieri potest. Qua de causa non desunt, quibus non singuli fructus semen gerant, ut in uuis acinos minutos prospicere licet, tanquam eos natura perficere minus potuerit: quanquam non minus dulcedinis his paruulis, quàm magnis illis concessit. Ex quo planè intelligi potest, quàm rara aptaque excoqui pulpa fructus consistat: siquidem à sole & aëre, & tempore ipso percoqui atque dulcescere possit: quamque semen opus naturæ proximum sit. Sed hominibus non æque omnia semina usui sunt, sed alia nulli, alia minimo. Quamobrem fructus qui nucleo uacant, præcipue quærimus, & quoad possumus, tales ut fiant, operam damus: ut cum uuas sine uinaceis nasci molimur. At natura tam pulpæ quàm semini modū præscribere proculdubio uult. Vtrum tamen exuberauerit, reliquum minus consistit. Quæ quidem res, partim humoris, & ad summum alimenti copia fit. Et hinc agriculturam quoque unice auxiliari diximus, partim siccitatis, spissitatisque. In totumque enim alimentorum inopiæ ratione accedit. Atque perfectionis, coctionisque eorum, ac fortè plantarum etiam omnium generationis, germinumque prouentus celeris causas illas reddidisse non deeret: uidelicet aëris solisque potentiam, & proprias rerum singularum naturas seu humiditate, siccitate, raritate, reliquisque generis eiusdem diuersas, seu etiam caliditate, frigiditateque (nam ea quoque natura sortita est) quarum rerum ceteræ prope sensui planè occurrunt. Calor autem & frigiditas, quia non sensu, sed ratione percipi possint, nimirum dubitantur, atque in crebra obloquutione uersantur: scilicet quemadmodum cetera quæ ratione solummodo diiudicare ualemus. De quibus alia quadam ratione determinasse bene est: quando etiam permultæ res sunt, quæ ad ea principia redigi exigant. Sed eiusmodi omnia ex ijs quæ accedant considerentur necesse est, his enim ipsis iudicare, contemplarique rerum potestates ualemus.

De quinque frigidorum, & calidorum causis.

Caput XXVI



Rgo causa calidorum frigidorumque prima redditur, quæ fructiferum sterileque genus attingat, quasi quæ calida sunt, fructifera esse possint: ut etiam in animalium genere, tam animantes quàm oua gignētium licet intelligi. Secunda pro regionum natura, hoc est ratione frigiditatis. Contraria enim locis contrarijs posse perdurare censetur, calida frigidis, frigida calidis: sic enim principio naturam etiam ipsam generasse omnia uolunt: quales res à suo simili, per excessum perire, à contrario seruari maxime possint: uelut medio quodam exultante temperamento, sicuti & Empedocles de animalibus inquit. Quæ enim calida sunt, hæc humidis in locis collocasse naturam asserit. Quam eandem opinionem Meneſtor quoque non solum in animalibus, sed etiam in plantis uniuersis secutus est. Iudicat enim calidiora quæ maxime sint aquatilia, ut iuncum, harundinem, gladiolum, à gelu proinde torpere hæc eadem minime posse. Et inter reliqua quæ locis argenteis ualeant perdurare, hæc plus caloris fortit:

fortiri: ut abietem, pinum, cedrum, iuniperum, ederam. Super his enim nec niuem posse durare autumat, scilicet ratione caloris. Item tortuosa hæc eadem esse, peruertitq; ob calorem medullæ asserit. Tertia causa celerem prouentum germinis, fructusq; declarat. Cum enim succus etiam ipse natura calidus sit, fit ut & germina reddi, & fructus concoqui celerius possint. Argumentum huius quoque ederam, & quædam alia capit. Quarta eorū est quæ fronde uirent perpetua: nam ea quoq; ratione caloris seruari existimat: quæ autem calorem desiderant, hæc frondem amittere. Ad hæc ignaria optime, celerrimeq; exardescere notat, quæ ex plantis aquatilibus fuerint, tanquam celerius ignem ædere illa possint, quorum natura plus in se caloris contineat. Hæc ferè de caloris ratione dicuntur.

*An calidiora, quæ fecundiora. Canem ac suem ex calidioribus partu numerofo notari. An contraria in contrarijs maneat. Tum quid inepte Empedocles. Item non uideri argumentum caloris quod mature aliqua proueniunt, aut perpetua fronde uireant. Non esse præterea indicium caliditatis ignaria: quæq; potissimum argumenta caloris intelligantur. Caput XXVII*



Ed protinus de primo ambigitur, an calidiora sint, quæ fecundiora. Etenim in arborum genere fœminas longe fœcundiores uidemus, quanquam minus calidæ, quàm masculæ constant: quod non cognitione nominis, sed similitudine animalium capere decet. Item animalia quamuis quæ fœcundiora sunt, calidiora intelligantur: tamen non è contrario quæ minus fœcunda, frigidiore, ut quæ carniuora, gulosaq; sunt. Sola enim ex omni calidorū genere canis & sus, partu numerofo notatur. Ipsorum autem unigenitum quæ speciem similem expressius gerunt, fœcundiora cernuntur, ut in auium genere: calor enim immodice augere, coarctare, indurareq; membra uidetur. Est autem opus tam ad animalium partum, quàm ad fructuum prouentum, excoctionemq; non excessu, sed mediocritate quadam caloris: siquidem calor nimis exiccat, maioremq; in modum condenset, necesse sit. Quamobrem hæc in ancipitem cadunt opinionem, ac determinatorem quampiam desiderare uidentur. De aquatilibus uero quæstio faciliore est: res enim contraria, neque alere, neque seruare apta est, sed similis. Vnde Empedocles inepte illud quoque asseruit, naturam scilicet ad locum humoris transfuisse quæ in arido generauit. Quo enim pacto animantes aquarum incolæ, uel quantumlibet temporis persistere in arido potuissent, si modo his nostri temporis similes fuerint? Item quod nostris temporibus in generatione euenire sentimus, rem plenè declarat. Nam uniuersum animalium plantarumq; genus, tum generari, tum permanere suo tantū in loco posse uidemus: quocirca suo quoq; loco affici nequeunt, contrario & aduerso affectibus nuntius patent, utpote cum distractio & permutatio magna ita accedat. Præterea opinioniones illæ minime inter se consentiunt. Aquatilia namq; calidiora simul & fœcundiora inquirunt esse, cum permulta in aquatiliū genere sterilia penitus esse constat. Rursus quæ germine, fructu ue præueniunt, quæq; semper fructificant, semperq; frondent, calida iudicant: cum maxime (ut ita dixerim) omnium serò ea fructificent, quæ frondē perpetuā gerunt, atq; in totū (ut supra retulimus) cum germinetur, fructificetur ue celerius ratione infirmitatis. Nonnulla etiā in germinando, florendoq; plus temporis protrahunt, ut & in annuorū genere senecio patet, ea scilicet de causa, quod mediocritatem quandā alimenti obtineat. Quod autē de ignarijs notat, id forsitan non caloris, sed uehementis conflictus potius indicium esse quispiam dixerit, attritus etenim est, qui ignē efficiat. Quod si in huiusmodi lignis humor magis extenuari, conuertiq; in aërem facilius possit, id cōtritus uehementiæ, non caloris in siti rationi tribui debeat. Illa uero potissimò calida tam sensu quàm ratione percipi possunt.

sunt, quæ pinguiâ, acriâ, odoratâq; sunt: hæc enim caliditatem proculdubio sortita uidentur. Quare cum sicca fuerint, spissâ, & putredine immunia, durant, & succum pinguem acremq; retinent: unde pinus quoque calida, & perfacilis ignitu accedit. Cæterum non solum hæc, sed etiam alia pleraque calida esse uidentur, ut tilia, & ad summam quæ ferri aciem heberant. Quin & eiusmodi uirium ratione scrutari calida iudicareq; decet, uidelicet cum admota corporibus, calorem cocturamq; aliquam, uel tabem induxerint: aut etiam tactu, gustu uel sensum caloris indiderint. Hæc enim nulla penitus egent ratione, quæ fidem amplius faciat, sed cum medicinæ usu, tum sensus testimonio latissime patent. Parte autem ferè tota, plura ex eo genere locis calidis quàm frigidis, aut certe non pauciora proueniunt: 10 quamobrem contrarijs generibus id quoque ambiguitatis adiungitur. Sequitur autem alimentum quoddam, quo nonnulla ex calidis, frigidis in locis ualeant educere, haud quisquam fortasse negauerit. Sed quæ ipsa sint, & quonam modo sic constent, determinandum sanè sit, nisi fortè uirium beneficio potius quodam, uel radicis, uel totius corporis polleat perdurare, ut pirus atq; amygdala: & hinc etiam rigori adeo resistere queant, ut minime concrefcere possint. Ac de caloris ratione ex his petenda determinatio est.

DE CAVSIS PLANTARVM LIB.  
PRI PRIMI FINIS.

10

THEOPHRASTI DE CAVSIS

PLANTARVM LIB. SECVNDVS.



VAE de germinatione fructificationeq; arborum, atq; ex toto plantarum, nondum exposuimus, reddere nunc pari ratione tentandum est: singula secernendo, tam ea quæ certis anni temporibus sponte proueniunt, quàm illa quæ agricultura parit & auget. Quippe duo illa genera intelligimus, quorum alterum uelut naturale atq; spontaneum cõstat: alterum 30 artem & paratum, quò esse possit, desiderat. Ratio amborum non eadem est, sed altera naturæ, altera ingenio redditur: nec enim natura frustra agere quicquam potest: & ingenium hominis naturæ auxiliari cõtendit. Sed cum ea priora sint quæ natura producat, de his differere prius iure debemus.

*Quemadmodum syluestria germinent, fructificentq;.*

CAPVT PRIMVM




ERGO (ut simplicius asseram) summum omnibus arboribus tam syluestribus quàm urbanis, & in totum omni plantarum generi ad prosperam germinationem, fructificationemq; designatur, cum tempestiuam probam que hyemem senserunt: sic enim germinationes fructificationes que fieri possunt egregiæ. Hyems illa probatur, quæ imbrum aquiloniorum copiam, & niuius frequentiam, & in totum frigora sine gelu obtineat. Cum enim arbores post partum fructuum, exinanitæ penitus sint, repleantur alimentis, id que retineant atque concoquant, opus omnino est: siquidem probe germinaturæ, fructificaturæ que iterum sint. Copiam igitur alimenti imbrum largitur frequentia. Retinere posse, ac percoqui, hyems sanè facit, cum diu oppresserit. Radices enim quæ alimentum uberius appetant, per totam arborem, 40

rem, quod ceperint, expandant, necesse est. Sed nō prius id expedit, quā ipsum alimentum coquatur, & quasi in utero gestetur spacio temporis quantum abunde sit: quod nunquam fieri possit, nisi frigus uehementius, diutiusq; adiuerit: mox enim aëris indulgentia germina euocat. Quamobrem aquilonios imbres, non austrinos accedere iuuat. Et multitudo niuis magnopere prodest, ut paulatim collis-  
 10 quescens subeat solum, nec uniuersus humor influxu corruēs unito dilabatur. Ita & terra fermentari optime potest calore circumobcluso atq; coërcito. Quod etiam enim seminibus uehementer conducit: fibris enim subnixæ, firmataq; consipatu compressuq; frigoris, simul ac mitescere tempus inceperit celeriter atque uniuersa  
 20 erumpunt. Verum semina imbres quoq; æstiuos, qui paulatim crebroq; accedant, magis requirūt, quia infirma sunt, per summamq; telluris adherent. Hac enim de causa mox siccari, moxq; madescere queunt. At arbores & ualidiores sunt, & radicem altius agunt, & alimento refertæ sunt: quapropter eam rem potius desiderare uidentur quæ ad percoquendum, germinandumq; ualeat auxiliari. Argumentum huius profectō illud potest deduci, quod nunquam ante uer datur germinandi facultas.

*Aquarum copiam prodesse arboribus.*

*Caput II*

 Opiam aquarum prodesse arboribus hinc etiam intelligi potest. Cum enim imbres copiose accesserint, omnes ferē melius uigent: uerum aut firmiter humescunt atque imbecilliores redduntur: aquilonijs ualidiores, & ad concoquendum aptiores euadunt, utpote quæ sibi consent & suum calorem inclusum retineant. Vbi enim cœlum perpetue placidum sit, arbores probe germinare fructificariq; ualent: ut in Aegypto, tum bonitate alimentorum, tum etiam quod extrinsecus nihil retorqueat. Cum enim alimentum adest ubertas, & cœli clementia, probe germinari fructificariq; ratio est. Ad rem tamen quæ omnia hæc uel aliqua ex his faciat, alia quadam conditione forsitan opus est. At apud nos, si non tempestiue germina exeant, sed copia alimentum, cœliq; indulgentia præcurrant, frigus subsequitur officit atque adurit. Quamobrem hyemes posteriores, arbores uehementē infestant: fructus etenim recens æditi, ætrem matrem atque benignum desiderant, quod adollescere possint, maximeq; inter sua initia, tunc enim infirmissimi sunt: quod autem est infirmum, tutelam, & quasi officium nutricis desiderat: quippe unaquæq; mutatio generatioq; temperiem huiusmodi omnino deposcit. Germinis autem florisque ipse prouentus, & quicquid eiusmodi, mutationes ac generationes quædam existunt. Et quidem plurimæ in his iacturæ eueniunt, cum fructus aut rubigine infestantur, aut perciduntur ac decidunt, aut ad summam hyeme tempestate uel pereunt. Nam & si uelut res tunc uehementer laborant, cum nuper germinibus æditi status uel frigidus, uel calidus nimis occurrit, enim uero uterque partus labefacit, atque interimit. Sed hæc  
 40 in singulis contemplari dignius est. Totum autem habitum, statumq; cœli ad arborum prosperitatem hunc in modum conducere ex prædictis patet.

*Qui imbres arboribus maxime tempestiui, intempestiuiq; accidunt.* *Caput III*



Equitur ut de imbribus tempestiuis dicamus. Tempestiui omnium maxime hyberni notantur: quas ob causas, exposuimus. Mox qui germinationem antecedunt, tempestiui habiti sunt: his enim plenius ac latius germinatio agitur, cum scilicet plene omnia suas formas receperint, alioquin uites probe nequeunt germinare. Tertiū obtinent locum, qui postquam arbores defloruerunt, accesserint: pabulum enim consum-



mationemq; fructibus præstare incipiunt, cum non confestim secuti sunt, sed ubi fructus conualuerunt: alioquin cæteri quidem fructus, aut defluunt, aut certe deteriores, infirmioresq; præ nimia humiditate redduntur. Oliuæ autem germi-  
nibus omnino intereunt, cum alimentum deducatur ad germen. Igitur intem-  
pestiui imbres sunt pessimi, atq; ex toto inopportuni, qui circa floris exortum ac-  
cesserint. Omnia nanque imbecillia redduntur, & omnia ferme aut certe plu-  
rima pereunt, deciduntq; partim rubigine, partim nimio humore. Quæ autem  
resistere potuerunt, deterius florent, paucis exceptis. Quod in fruticum, herba-  
rumq; genere non minus animaduertere licet, ut in ijs quæ coronaria uocita-  
mus, & ad summam in agrestibus, sponteq; exurgentibus flosculis. Item ex sati-  
uorum seminum numero in leguminibus quæ permanere alterutro ex his uti-  
que possunt. Aut enim soliditate tum sibiipsis, tum suo retinaculo indita, ut etiam  
rosa & lilium, & reliqua generis eiusdem. Aut quod siccitate totius naturæ hu-  
morem præcipiant atque absument, sic enim euincere possunt: quod autem uin-  
cit, id nunquam affici potest. Quibus uero fructus diuturniores, plusq; alimenti,  
coctionisq; desiderantes, his seriores etiam imbres tempestiui accedunt, ut uiti, pu-  
nicæ, oleæ, cæterisq; ad summam, singulis pro ratione perfectionis tempestiuitas  
data est. Quamobrem non idem omnibus tempus statuitur, ut hyems ad germi-  
nandum, sed aliud ferotinis, aliud præcoquibus, ut etiam in frugibus trimestrium  
generi, & ad summam omnibus ferotinis atque præcoquibus. Omnino imbres 20  
aquilonij semper austrinis commodiores sunt. Etenim frigidiores occurrunt, & fa-  
ciunt ut plantæ humore sibi oblato potiantur, cum & fructus, & plantæ  
ipsæ melius consent, ac ualeant omnes. Item superuacuum detrahunt atque as-  
sicant, neque diu id insidens humefacere patiuntur, neque æstus solis concoctum  
afficere sinunt. Quocirca status etiam consecuti iuuant, & maxime si aquilonij  
sint: detergant enim, & quo potiri amplius sit, efficere possunt. Quas ob causas  
nocturni quoque imbres præstant diurnis: sit enim ut plantæ humore potiri am-  
plius ualeant, cum sol non protinus illum consumat. Et tutius quoque sic agi nul-  
lum dubium est.

Qui uenti commodiores sint, & quando: tum qualis ager arboribus competat: hinc  
de persica ægyptia.

Caput IIIII

30



Ratio eadem, ut & status aquilonij commodiores sint austrinis, & pe-  
lagici terrenis, & occidui exortius, quia frigidiores. Ex toto enim  
propæ status frigidi, commodiores calidis sunt, nisi germina nuper  
ædita sint, aut flores prouenire inceperint, tunc enim frigidi adurunt,  
ut dictum est. Præstant item fauonij & solstitiales, & in torum, auræ  
duris flatibus atque intentis. Alteri enim alunt, alteri instipant, & incrementa  
impediunt, sed magis minus ue quisque pro situ regionis uires capeßit. Alij enim  
alijs tales occurrunt, ut antea dictum est, quamobrem ex toto ferè aquilonij com-  
modiores sunt austrinis. Cæterum cum uires agrorum quoque discrimina indere  
possint, & hyeme calidi, æstate frigidi ueniant, opus sit. Hoc enim modo con-  
tra temporum iniuriam subuenitur, ut diximus: nocent uero si temporum qua-  
litati similes sint, excessum enim sic sequi necesse est. Efficitur inde ratione sane opti-  
ma, ut non iidem omnibus utiles, noxij ue occurrant. Quapropter alijs auster  
officit, alijs prodest: pari ratione & fauorinus, & quisque ex reliquis. Omnia ue-  
ro uehementer infestant, qui cum germinatur, continuo calidi aut frigidi inces-  
serint. His enim germina facile suam ob debilitatem intereunt. Omnino locum  
comportem flatus commodi esse oportet: qui enim aut nullum sentit afflatum,  
aut

aut iniuriæ uentorum expositus est, hic certe incrementi laudem nullam assequi potest. Quinetiam cœli habitus ijs ipsis fermè responder: aër enim qui media constat temperie omnibus propè arboribus percommodus est: nam & ad germinandum, & ad fructificandum plurimū iuuat. Qui uero in alterutram partem excesserint, partim fructus interimunt, partim etiam totas arbores necant, præterquam si quæ sint, quibus aër talis conueniat: non enim defunt, quæ excessu latentur aëris, & aliæ caloris auidæ sint, ut palma: aliæ frigus potius adament, ut edera, ut pinus: has enim locis feruidis prouenire non posse nullum dubium est. Buxus quoq; & tilia locis eiusmodi difficilime prodeunt, ut inter historias dictum est. Ratio non nisi ex calore petenda est: ignis enim quodammodo igni adjicitur sine moderatione, quam simile etiam desiderat. Eadem ratione locis frigidis prouenire frigida quædam nequeunt. Contrariorum quoq; copulandorum modus statuitur ita, ut aliæ germinare queant, aliæ nequeant: semper enim conuenientiam quandam naturæ ad cœlum ambiens esse oportet: quod quidem & in animalium genere commune animaduertemus: etenim animalia natura loco utriq; propria delegauit: itaq; aliæ pati qualitatem aëris possunt, aliæ nequeunt. Interdum etiam pabuli conuenientis inopia deficiunt: nam id quoq; tam animalibus quàm plantis esse potest impedimento. Forsitan & alias complures causas assignare possumus, quæ diuersæ sint proprijs naturis. Sed summam differentiam in aquatilibus, atque terrestribus, tam animalibus, quàm plantis certe uidemus, de quibus nec rationem ferè ullam querimus, nisi utra nam sint calidiora frigidiora ue: hoc enim tantum ambigitur, cætera tanquam naturæ ratione concessa ponuntur: qua nquā perpetua communiacq; prius indagare congruum sit: his enim compertis, singula quoq; possint notescere. Sed hoc forsitan difficultas prohibeat, siue plures causæ sint, siue una. In singularibus autem plus facultatis differendi habetur: sensus enim in utranque partem principia præbet, & longe amplius in plantarum generibus: quæ nanque in his eueniunt latissime patent. Summam uero diuisionem eodem in loco syluestribus atq; satiuis animaduertimus: quod satiuæ semper humidiorē, mollioremq; aërem querant. Cæterum non defunt, quæ in hoc etiam genere locis calidis, frigidis ue nequeant germinare, nō modo propter suam debilitatem, uel habitum, sed etiam alijs quibuscūq; de causis, ut olea, quia per summa terræ radice cohaereat, facile nanque gelu concrescit. Pirus syluestris locis feruidis, ut in Aegypto, germen nequit emittere. Quin & piri satiuæ, & mali hoc eodem in agro paucae admodum, uitia: atq; sunt: cuius rei causa requirenda est, quippe cum eas calidas esse nullus existimet. Quædam igitur ne germinare quidem possunt locis quibusdam, quædā germinare quidem, sed fructum nullum parere queunt, ceu persica ægyptiā in Rhodo: & si per loca ita procedas, fructificare quidem eam comperies, sed parcissime, nec alibi, quàm in Aegypto large suauiterq; fructum progenerat. Pari modo & palmam animaduertere licet, atq; etiam magis circa Babylonem ac Syriam fructu præcellit. Cœlum enim suam ob frigiditatem aliā recipere penitus nequit: aliā eoque potest, ut germinādum tantummodo sit: quædam etiam ad fructificandum usque euenire patitur: sed fructum perfici, maturariq; nunquam finit. Hac eadem de causa fici in Aegypto, & omnino tractibus illis, frugis bonæ non sunt: æstus enim perurit, ut fieri percoctio nequeat, sed terra suo duntaxat alimentato crudo humefacit. Quamobrem nec iustam magnitudinem poma capiunt. Contra frigiditas partim tollit humorem, partim ad conuenientem cocturam perducere nequit, quod porro in oleis patescit: hinc enim aliæ fructū nulla carne, sed oleo refertū profundunt: aliæ carnosum sine oleo præstant, plus enim caloris ad oleum cōcoquendum requiritur. Cœli conditiones, qualitatesq; uires huiusmodi præbent.



Ed cum solum etiā magnas recipiat differentiās, de eo quoq; dicen-  
dum est. Enimuero soli ratio naturæ tribuitur. Et frequēter rei utrius-  
que tum cœli tum soli occasio, feliciter germen educit. Ergo quibusdā  
in locis, arborum pars ima, optime constat: superna uitiōsa est. Quod  
fieri solet, cum solum arenosum, uel tofosum, uel adustum quoddam subditū est:  
his enim radices modum excedunt, sed alimentum nullum ad superiora transmitti-  
tū. Et his fermē soli generibus, germen negatum est, & si quod uliginosum pe-  
nitus, limosum ue sit. Ea uero quæ uires quidem obtinent germinandi, sed fructifi-  
care non possunt, non improbe frugum atq; arborum ratione discernunt: ut pin-  
gue frumentis aptius sit, tenuē arboribus. Frumentum enim, & omnino quæ an-  
nua sunt, alimentum id capiunt, quod summa telluris ministrant, ut prius retulī-  
mus: quod neq; exiguum, neq; exiccato facile esse debet. Arbores contrā profici-  
ciunt tenui solo, quia radices magnas robustasq; agāt, quibus alimentum ex imis  
ualeant haurire. Quod etiam in solo pingui facere illæ possunt: tamen alimenti co-  
piā adeo largam attrahunt, ut optime germinare, magnitudinemq; amplissimā  
accipere possint: sed fructum parere nequeant, quoniam non coquunt, quantum  
abunde sit: quod in tenuiori non euenit, sed modice tam ad germinandum, quā  
ad fructificandum hauritur. Atq; ita arbores, utpote robustiores, quā ut oblata  
copia uinci possint, plene concoquunt, fructumq; gignunt. Solum tamen, quod  
pingue admodum est, nulli plantæ conducit: exiccatur enim plus, quā commodū  
sit, ut et Menestor autor est. Tale genus terræ illud affirmat, quod ad abstergendū  
maculas usus est, coloreq; albicat. Optimū scilicet, quod optimo constat tempera-  
mento: & ad summā, quod solutū, humectūq; sit, nec frigore torpeat: hoc enim ra-  
dicibus aditum facilem præstat, alimentumq; laudatissimū subministrat. Quam  
quidem rem & mitigationes, & agitationes, & stercorationes uolunt efficere. Sed  
aliud solum alijs arboribus conuenientius est: ut & diuidere solent. Argilaceum  
enim, atq; etiam magis candidum, fertile oleis notatur: id enim multum uaporis,  
flatusq; continet, quod natura olearum desiderat. Pratense, & arenaceum uiribus  
percommundum est: & ad summā, quod solutum, leue, tenue, atq; humidum, ita  
ut aqua cœlestis intestino humori ualeat permisceri. Vitis namq; largam copiam ali-  
menti desiderat, quia calida, laxa, humida, & fecundissima est: forsitan & ob hæc  
eadem fecundissima. Ad hæc radices humidarum plantarū haud facile putrescere  
possunt, quemadmodū illarū, quæ suapte natura siccescunt: itaq; & attrahere & re-  
sistere, & transmittere nimirū ualent. Eodem modo reliquis quoq; omnibus, solum  
pro naturæ ratione idoneū redditur. Idemq; alijs magis, alijs minus congruum.

Solum pingue parte plurima plantis nocere. Et quod solum optimum.

Caput VI



Erūm (ut simplicius loquar) parti maiori, solū pingue, incōmodum  
est: exiccatur enim supra modum, & hac de causā plantas offendi, atq;  
agrescere creditur: prodest tamen ijs, quæ macilentā, tristī, ieiunaq;  
constant natura. Argumentum quod olera, frugesq; solo rali exube-  
rent, quæ quidem naturæ eiusmodi sunt: ieiuna enim plus cibi desi-  
derant. Quod uel hominum naturam huiusmodi indicare abunde existimant.  
Homines enim macilentos, ieiunosq; pingui maxime delectari, eoq; in colore, ui-  
ribusq; proficere. Sicca etenim corpora largum, ac pingue alimentum deside-  
rant: sicco autem, macroq; nihil utilitatis accipiunt, quoniam humor nō adsit, quo  
perfrui ualeant: quinimō periculum est, ne morbi inuadant, cum alijs, tum maxime  
qui aluum infestant. Hoc & in arborum genere parī modo animaduertemus, nisi  
quod

quod arbores sibi similes cōstent; corpus autē recreatum ad plenum, incolumemq; habitum transeat. Hæc ergo generalis quædam determinatio redditur. Differentiæ uero tam agri quàm arborum per multæ intelliguntur, quod etiam in uitium genere patet. Alijs enim plana, alijs montana loca magis conueniūt, & in his ipsis aliud alijs competit. Quamuis enim exigua quædā diuersitas sit, tamen summis momentis potest immutare naturā. Verum simplex illud asserere facile est, ut & præcipere solent: solidas spissasq; locis sitientibus serere oportere, solutas uero & humidis mollioribus atq; humectioribus. Sic enim utriq; alimēta modice suggerētur, cum altera multum, altera parum desiderent. Et quod in uniuersum de arboribus diximus uerum fortasse est, uidelicet pro utrarumq; arborum natura, genus utrumq; arborum serere oportere: uerum in singulis exquisita animaduersio, sensus potius notionē desiderat. Enimuero ratione determinare in his haudquaquam facile est. Nam & differentias ratione solis uel ascendentis, uel occidētis, uel medium cœlum tenentis, uel aliquammodo se habentis, scire nimirum concedet, ut loca plantis apte distribuantur: tam ex toto quàm ijs quæ genus idem cōfortiuntur: quemadmodum uinitores distinguere tentant, cum in conualle aliqua serunt. Non enim eadem semina loco utroq; deponunt, sed diuidunt. Et quidem plurimum interest ad hunc modum deposuisse. Pari ratione de reliquis quoq; arbitrandum est. Quamobrem hæc (ut superius diximus) sensus diiudicationem desiderant. Verum (ut simplicius asseram) solum quod mediam obtinet confusionem contrariorum, id est soluti & spissi, siccus & humidus, leuis & pōderosus, atq; etiam superiora modice inferioribus respondentia, in his ipsis sortitur, hoc omnium optimum omnibus fermè arboribus atq; frugibus est. Id enim ad aëris habitum propius quodammodo quàm cætera uideretur accedere. Cæterum inter hæc ipsa, quod ad alterā partem uergit, melius est, quod & simpliciter quidam optimum asserunt, ut quod solutum, leue atq; humectum est. Id enim alimentum in se continet, & radicibus meatum faciem præbent: spissum, aut ponderosum, ac sitiens, esse incommodum constat. Discrimen uero ad singula pro diuersitate oppositionum recipiūt: uerbi gratia, solum rarum & tenue, si altum siccumq; sit, arboribus commodum, frumētis incommodum est: facit enim raritas, ut imbres hybérni possint alte descendere. Itaq; frumentū humorem attingere nequit, quoniā per summa suam agat radicem: arbores uero dimissis in profundum radicibus attingere atq; attrahere possunt. Pari modo & si qua differentia eiusmodi alia sit, reddet alicui generi commodum, quod alijs incommodum foret, ratione diuersitatis. Sed nec illi imperite diiudicant, qui solum esse optimū arbitrantur, quod calidum, humectumq; est: ambo enim obtinet ea quibus opus omnino est, id est alimentum, & quo alimentum potest cōficere. Recte etiam post primum imbrem id uaporem emittere aiunt. Sed huius generis aliud humectum esse, aliud siccum: humectū frumentis habile, humorē enim satis id ad alendas fruges habere, ad arbores autem minus: siccum uero frumentale, minime bonū constare, quia id quoq; pabulo careat quod sufficiat. Eiusdem fermè sententiæ sunt, & qui solum pingue, nec rigidū, neq; densum neq; salsum esse oportere autumant. Alimentū enim caloremq; adesse necessariū putant, atq; etiam facilem radicibus transitū exhiberi. Quæ quidem omnia ad incrementū, fructificationemq; aptissima sunt. Hoc idem illi etiā sentiunt, qui solum nigrum commendant, ut Leophanes. Causas enim continuo tēta reddere, quod & imbrē & iqualorē genus id certe tolerare facile possit, utpote quod capax tam caloris quàm humoris nimirū sit. Ergo uirtutē agri propē (ut antē iam diximus) per eadē quodammodo atq; in eisdē intelligere licet, quibus omnes exponere asolēt. Differentiæ uero cum plures sint tam agri q̄ generis plantarum, conueniēter singulis capere atq; contemplari tentandum est.

*Quæ aquæ è terrestribus probentur improbeniuræ ad plantarum usum:  
item quæ salſugine proficiant.*

Caput VII



Quarum autem terrestrium differentias (nam eas quoque non parum conferre ad incrementum alimentumque similiter arbitramur atque supradicta) decet statuere. Ergo in genere aquarum, quæ nitrum, uel alumen, uel aliquid eiusmodi sapiunt, plantas neque alere neque gignere possunt, scilicet quoad summatum sit explicare, præterquam si qua familiare quicquam ac sibi cognatū ualeat enutrire, quemadmodum mare: sed hoc minimum & propemodum nihil est. Quibusdam tamen in locis aquarum dulcium copia permixta plantas progenerat atque enutrit, ut in aquis Thraciæ feruidis licet perspicere. Per se autem nullius ferè stirpis, sicut nec animalis, fecundæ intelliguntur. Mare multa & uaria gignit, & est genus quoddam sicut animalium, ita etiam plantarum, quod nisi in mari uiuere nequit. Arbores tamen quæ locis æstuum magnæ frugiferæque exurgunt, alimentum ex mari capere fortasse quisquam negabit, dulcemque humorem radices posse ex terra trahere credet, mareque ipsum sine offensa circumuenire, quemadmodum aqua stirpes suas incolas tutissime ambit. Sed de his alia sanè habenda disputatio est, necnon de illis quæ iuxta mare ipsum nascentia salſugine quodammodo ad se nutrienda, corroborandaque utuntur: nam ea quoque sui generis esse animaduertimus, ut præter cætera supradicta quasi medium situm hæc adepta statuere ualeamus. Salſæ autem aquæ nutrire quidem plantas quoque terrenas queunt, sed deterius quam dulces: adurunt enim, augeri que prohibent. Minus uero his arbores infestari quam olera, quamque omnino annua (ut quidem affirmant) ratio est: arbores enim longæ robustiores consistunt. Et fortè non desunt quæ commodius ali eiusmodi humoribus possint, ut palmæ, siquidem his sal aggeratus unice proſit. Cæterum sunt etiam ia olerum genere, quæ ab humoribus salſis iuuantur, ut brassica, beta, ruta, eruca: hæc enim cum aquis salſis rignantur, longè meliora euadunt. Quamobrem nonnulli nitro aquæ permixto aspergunt brassicam, ut Aegyptij, atque ita multo dulcior teneriorque efficitur, sicut & si prius quam coquatur, sale commaceretur. Omnino salſugo commoda huic est: habet enim amaritudinem quandam, quam salſus humor subiens, ac ueluti ora aperiens educere potest: qua de causa locis salſis brassica optima est. Amaritudo quippe cum saporem, tum etiam alimentum peruertit. Itaque ea sublata dulcior, tenerior, altiorque brassica redditur, sed cæteris in rebus deterior, quoniam nihil educitur alienum, sed hoc aduritur, quod eius familiare nimirum est. Idem ergo uel in reliquis esse amaris ratio docet, ut in selagine atque uniuerſo genere intuborum. At acribus, ut allijs, cepis, ac reliquis generis eiusdem, nihil salſilago conducit: acrimoniam enim auferre non potest propter saporis similitudinem: quippe cum simile feratur ad simile, meatusque adeat omnis, ut in ijs fieri solet quæ maculas detergunt ac detrahunt. Aqua salſa ob eam causam amaris commoda est. Si uero Androsithenes uere de Tylo insula rubri maris narrauit, aquas salſas fluentes, plusquam cœlestes iuuare, tam arbores quam reliquum omne genus plantarum: & hinc agricolas loci illius statim post imbrem riuus eiusmodi ablueri fata solere, consuetudinem esse: Causam dixerim: hæc enim uelut natura facta in illis est: pluuia namque raro illic aqua descendit, sed defluens enutrit & arbores & fruges & reliqua: unde fit, ut & omnibus temporibus commode inferatur. Sed hæc per suppositionem sine dicta,

*De utilitate aquarum frigidarum in plantis : quodq; dulces aquæ, non dulcibus preferantur :  
& cur dulcis aqua & idonea potui alere uel omnino nequeat, uel non perfecte  
fungatur officio.* Caput VIII



Quæ autem quæ inter potari idoneas, frigida sunt, principatum non dubie obtinent. Percoquere enim hæc potissimò queunt propter caloris circūobstantiam atq; refrigerationem radicum, quam desiderant arbores. Tales uero aquas esse commodiores, argumentum est, quod olera, & radices, & fructus, & reliqua æque omnia frigidis adaquata meliora euadunt. Quod fieri ratione uidetur, quemadmodum & inter aquas cœlestes, nocturnæ, & aquiloniæ præstant : sicut etiam inter ipsos afflatus aquilonij, & omnino qui frigidi ueniant. Eandem enim utilitatem hæc omnia præbent. Et ob easdem causas aquæ flatus ue calidi diffundunt & humefaciunt, & insitum calorem debilitant. Sed forsitan frigidi quoq; excessus tam in alendo quàm in generando statui potest, ut etiam in animalium genere, siquidem alimentum, uiresq; caloris demat, sine quibus feruari uita non potest. Non tamen frequenter neq; in multis detrimentum id euenit, nisi alia quoq; causa damnosa accedat: neq; enim idem in his quod in animalibus agitur aquatilibus. Illa enim humore undique continentur, atq; in humore consistunt; plantæ in terra, & aëre stant: quamobrem cum his aqua sese miscet, nunquam terræ uel plantarum tollit calorem, præterquam sicubi aër etiam totus frigidus sit, sic enim germine uiduâ ac penitus sterilem terrâ esse necesse est. Aquas frigidas præstantiores esse his de causis iudicamus. Dulces autem cæteras quæ potari nequeant antecedunt, quia plus alere ualeant. Admissa enim falsugine, uel ali quo huiusmodi sapore contractio, non modo nutriri plantæ non possunt, uerum etiam alijs quoq; detrimentis afficiuntur, ut etiam in animalibus euenit. Aquarum mixtura utilis est, cum altera dura admodum & quasi incocta crudaq; est, altera molli & placida: uel etiam cum aliquem terrenum saporem secum alterutra affert, uti in turbulentis stercorosisq; uidemus humoribus. Genus enim plantarum tale alimentum omnino desiderat. Qua de causa sæpe tenuis puraq;, crassæ impuræq; congruere potest: & putealis mananti, & fluens pluuiæ aptissime confocietur. Sed mirabilius certe appareat, siqua dulcis & potari idonea, uel omnino alere nequeat, uel non perfecte hoc fungatur officio, ut in aqua Pyraei agri perspicitur, quod etiã inter historias dictum est. Causam uero ex duobus aliquis petet. Aut enim ex debilitate fieri ita credit, quod minus uerum uidetur, quando aër quoq; alere posse putatur: aut quod saporem aliquem noxium habeat, qui in gustatu hominem lateret, quod etiam in prædicta aqua potest intelligi. Homines enim qui ea lauãtur, leprosi efficiuntur. Et plantæ quoq; proximum quendam accipiunt habitum. Haud enim recte causam in illo esse credideris, quod genus id aquæ nimis alere possit, & proinde plantæ laborent ieiunio, reddanturq; deteriores, utpote quæ obductam pabuli copiam nequeant superare. Sed de his satis.

*Arbores suis quasq; locis gaudere.*

Caput IX



Oca autem sibi accommodata arbores quarunt non solum illæ quas operoso quodam peculiariq; habitu natura creauerit (ut antè iam diximus) sed etiam quæ communi uulgariq; prouentu habentur. Quippe cum aliæ sitientes adament tractus, aliæ humidos, aliæ hybernos cupiant, aliæ soli expositos, & aliæ opacis, aliæ apertis gaudeant, & aliæ in totum palustribus, aliæ montuosis latentur, ut & diuidere autores consueuere. Sed fortè non semper eadem appetunt loca, nec una de causa, sed uaria quadam ratione, ut superiori libro retulimus: quanq; naturæ cognatione quodq; ad locum

proprium ducitur, quemadmodum ea quæ sua sponte proueniunt. Spontaneus autem ortus expressius naturam ostendit, siquidem ex eisdem generationes & nutritiones, & singulorū diuisiones agantur necesse sit, uidelicet caliditate, frigiditate, siccitate, humiditate. Quærunt etenim omnia, quod sibi pro suo temperamento commodum foret. Item quæ infirma aut robusta sint, quæq; ima telluris radice subeunt, aut per summa augentur, aut aliqua differentia partium discrepent, hæc pro suo discrimine locum appetunt. Sape etiam plures ex his causæ in eadem planta intelliguntur, & plerunq; quod alia habeant, alia non habeant, in causa est. Adde etiam quod similes locum exigant similem, & dissimiles dissimilem, cum scilicet naturæ aliqua diuersitas adest. Quo in genere abies, pinusq; collocantur: altera enim opacis gaudet, altera, id est pinus, apricis. Opacis enim aut nullo modo, aut prauè exurgit. Ergo calidæ quidem ambæ, ut aiunt: sed abies sicca, pinus humida est. Argumentum uel ex generatione picis duci utiq; potest: tum etiam ubertati humoris locus soli expositus conuenit: sic enim excoctio confici amplius possit. Semper autem rei excellentis ratione appetitū sequitur. Ex quo illud etiam cōstat, quod inter congenera, quæ mutuo differre uidentur, discrimen eiusmodi quoddam quarendum sit. Nam quæ genere dissociata, locum tamen petunt eundē, ut edera, & quæ aquis apposita sunt, quæq; nemoribus gaudēt, facile suam rationē aperiunt: edera nanque sicca & calida est. Reliqua uero naturæ penitus cognatione loca eiusmodi concupiscunt. Nonnulla ex his causam uel in singulorum differentijs explicant, 20 Parimodo & quæ nisi frondibus obsepta possint seruari, tum in agresti, tum in urbano genere, ut punica & myrtus: quarum altera sicca, spissaq; est: altera, id est punica, raro nec siccis corpore constat. Fructū enim utraq; nucleosum nec humidum gerit, itaq; soli expositus mox obarescit: in umbra autē coalescens, & solem modice sentiens, humorem suum seruare, atq; coquere nimirum potest. Quamobrem & punicas, & myrtos breui interuallo conferere solent, ut se contactu operiant mutuo, atq; solis nimios æstus aufugere possint. Tum etiā quod radice numerosa non sint, nullo alimenti raptu mutuo infestantur. At si quæ his aduersa consent natura, hunc in modum seruēt, ceu uitē & ficum, nunq; certe fructificare tantundem ualeant. Hæc enim quia humida sint, cocturam certe ampliorem desiderāt. Loco- 30 rum diuersitatem causis hisce tribuimus, ubi nihil aliud impedimēto detrimentoq; acciderit: ut apud Tarentum oleæ accidere ferunt. Silens etenim spiritus, sensu conspicuus est: quippe pleraq; aduruntur, & conflatus ex mari talis occurrerit, ut inuenta salugine corrodantur flores ac pereant. Caligo quoque sine ullo flatu egredi quædam uidetur, quæ ubi flores tetigerit, exurit. Quamobrem uates ne caligo egrediatur, sacrificare consueuerūt, & uerari sæpe sacrificijs referunt. Eadē ratio est etiam si quid commodū uel incommodū ex aëre ueniat. Interdū enim quamuis solum sit uitiosum, aër tamen bonitate sui temperamenti suisq; flatibus nimirum aduersari potest, ut dictum est.

*Duabus ex causis fructus maturescere.*

*Caput X*

40



**R**uctuum autem cōcoctio, partim caliditate, partim frigiditate perfici creditur. Quæ tamen ex frigiditate sit, per euentum fiat necesse est. Calor enim ubiq; uim obtinet concoquendi. Et simplex quædam cocturæ ratio est, sed nō æque percipi potest, propter circūobstantiam caloris. Omnium enim eiusmodi rerum causas ab eisdem uiribus proficisci putandum est. Verum euenit, ut fructus qui serò perficiuntur, maturitatem hyberni temporis opera capere uideant: quoniam antequam perficiantur, hyems occupet. Serò autē fructus perfici quosdā multis de causis euenit, ut antè iam diximus.

ximus. Quæ enim natura humidæ sunt, frigiditatem uehementiorem desiderant, ceu uitis, sic enim longè melius coquitur. Quæ autem fructum pariūt sicciorem, ut myrtus (nam ea quoq; serò suum perficit fructum) leuiorem frigiditatē requirunt. Nimia enim exiccat, exacerbatq; media uero temperies & austrini ac humidi spiritus, cōmodissime alunt. Neq; enim fructus natura humidiores, excessus frigorū possunt percoquere, sed alios penitus resiccant, alios insipidos reddunt, ceu ficus. Resistere tamen illi maxime possunt, qui plus habent humoris, ut poma, arbuti: quicq; terreni, acerbi, solidiq; natura sunt, ut glans, pirum syluestre, sorbum. Hæc enim humorem, saporemq; suum serò recipiunt. Adde hoc in genere mespila, & mālā syluestria, & omnino quæ arboribus decerpta maturefcere possunt, ut pirum agreste, & sorbum: & si nō eadem maturitate, qua in arbore, tamen ita aliquid dulcedinis capiant, ciboq; reddantur idonea, siue putredinem genus hoc maturitatis deceat appellare, ut in drupis oliuis, seu etiam alium quempiam habitum naturalem. Cæterum nihil fortasse prohibeat, quo minus externo quoq; calore fructus coquatur, ut sorba, cum alimenti influxus cessauerit. Prius enim assidue aliquo influente humore fructus exuperare non poterat, præsertim cum frigora impedirent. Postea uero cum amplius nihil accedit, & calor in ipsis fructibus coërcetur, utraq; de causa cōctionem iam, immutationemq; capiunt. Nam & qui in arboribus maturefcere fructus solent, ut uuæ, decerpti dulciores efficiuntur, scilicet quod pars humoris diluta, sole absorpta est. Hoc idem in ipsis euenit uitibus, cum uuæ humorem haurire desierint, uel cum senescentes in passas mutantur. Quineriam in cæteris fructibus talis ferè quædam mutatio euenit, alijs magis alijs minus. Nonnulli e contrario maturitatē accipiunt. Etenim in ipsis arboribus, locis feruidis atq; aptissimis, immaturi persistunt: scalpti autem, & oleo illiti (ut dictum est) incipiunt maturefcere, ut ficus Aegyptiæ. Illis enim ad hunc modum tractatis, humoris, ac spiritus aliquid effluit, & calor admitti amplius potest. In olerum autem genere quædam uel ex toto immatura, atq; incōmutabilia permanēt, ut cucurbita. Ergo cōctionis, cruditatis ue, ad summam commutationum, quæ fieri assolent, ratio in his est.

De incrementō & proceritate arborum: tum quæ fructus amittant ante maturitatem.

Caput XI



Rborum autē iparum, semper quæ locis opacis & afflatu silentibus sunt, proceræ, leues, atque excelsiores exurgunt: nec non si breui sitæ sint interuallo, modo eodem adolescūt. Contrā quæ locis, flatibus ac uento expositis, atq; apricis, uel raris, solutisq; exeūt, minus tales euadunt. Incrementum enim profunditatis altitudinem uetat, & flatus exasperant, nodosq; faciunt (ut retulimus) retorsionis & consuetudinæ causa: quæ cum illis abdicata penitus sint, incrementum longitudinis tantummodo agitur. Quamobrē illa etiam quæ nō æque erecta, neq; excelsa surgere apta sint, eiusdem naturæ habitum profectō accipiunt, quo erecta excelsaq; constant, cum hospitata locis huiusmodi fuerint, ceu quercus. Læues etenim, rectaq; & propē abientibus æquales euadunt: ut apud Aemum montem fieri referunt. Tum etiam solutiora, humidiora, imbecillioraq; his locis conficiuntur, quia neq; ex sole, neq; ex flatibus, uel frigoribus densitatem possint suscipere. Amittunt maxime suos fructus anteq; maturauerint, ficus, palma, atque amygdala: quod accidit aut alicuius interclusi humoris causa, ut ficus amittit: aut quod nexu infirmo fructus dependeat, qui mole grandiuscula est, ut amygdalæ, mālā, pira: nā quodlibet humefacere atq; debilitare eos facile potest. Tum etiā flatus interdū uehementes inuadunt, ut nihil resistere ualeant. Punica flores facile amittit, quia nexus eorū debilissimus est. Itaq; cum guttæ, pluuia, aut rores in eos deciderint, subeuntes quoquoersus humectant, labefa-



ctantq̃. Qua de causa deducere arbores solēt, nec in excelsum eas excurrere sinūt, ne flores in erectum formati humorem suscipiant. Quidam etiā uirgas ē contrario feri prācipiūt, ad rationē, ut se subinde ualeant inclinare. Humorē iacturā causam esse, hinc etiā intelligi potest. Piri enim atq̃ amygdalæ etiā si non pluat, dummodo aer austrinus, nubilusq̃ sit, amittunt & flores & primos fructus, si continuo postq̃ defloruere, illud acciderit. Sed horū, cæterorumq̃ similiū ratio in nexu, moleq̃ est.

De caprificandi ratione, & culicibus: item arbores ferotinas fructus suos non perdere.

## Caput XII

**I**corum autem & palmarum non solum in his, sed etiam in interuallis animaduertitur. Quapropter ficos caprificāt, quod ea de causa faciūt, ut culices parui, qui ex caprificubus appensis nascuntur, poma fici aperiant. Generantur enim ex putrescentibus illis, sed simile alimentum quarētes euolant, atq̃ grauidæ grossis assident. Quod idem plerunq̃ euenit, & si nō caprificus appendatur, modo caprificus ipsa proxima sit, in qua culices fuerint procreati. Ideoq̃ caprificus in extremo ficis cōseritur maturis, maturat ferotinis, ferotina: medijs, media: ut pro suo tempore singulæ caprificationem obtineant. Atq̃ ita caprifici adiicitur satus, ut culicum aduolatus secundo uento effici possit. Cum autē morfu crebro culices ora ficuum aperuerint, humorem absumūt superuacuum, & aditum liberū auris prābēt, & omnino poma spirantia efficiunt. Euenit enim, ut cū calore illo conficiente, spiritus quoq̃ aliquid interserāt: ut in his euenit quæ igne coquūtur, quo spiritus semoto unā cum humore exactoq̃ fructus permanent. Causa namq̃ amittendi hæ sunt. Culices autē & gigni ex caprificubus, & rursus easdem subire, ratio est. Gignūtur enim, quia caprifici maturare atq̃ perficere nequeūt. Vt enim in cæteris putrescentibus genus aliquod animalis concreuit, ita etiā in his uiuifica quædā natura est. Sed cum alimēto careant, quarantq̃ quod sibi cōueniat, ferūtur ad id auidæ quod simile est. Omnibus enim rei cognatæ desiderium natura iniicit, quemadmodū & pediculis sanguinis, ex quo putrefactio nascuntur. At solo macro, & aquilonio caprificatio haudquaq̃ desideratur: quia propter alimenti exiguitatem sponte poma siccantur. Nec ubi solū ita sit temperatum, ut modice alere possit, usus caprificandi est (lactura enim non nisi ex cruditate sequitur, cum uis coquēdi superare nō potest) nec ubi multus puluis, nam uis siccādi pulueri quoq̃ posita est. Sed absurdū appareat quod flantibus aquilonijs potius, q̃ austrinis, fici fructus amittunt, cum longe sicciores sint aquilonij. Ratio uero quod ficus plus condensatæ nequeant exhalare, tum etiā succus fortasse intus concreuit, hanc enim & foliorū profluuiū causam nonnulli assignant, ut dictum est. Quæ autem ferotinae admodum sunt, fructus nunq̃ amittunt, quia serō germinare incipiunt. Fit etenim temporis ratione, ut spiritus non amplius intercludi, coerceriq̃ possit. Calor enim se colligens atq̃ resistens exuperat, tum etiā genus id siccum natura quodammodo est, seroq̃ proinde humescit, quamobrem & adaquari hoc exigit, & aquam sustinet magis. Quod si reseratio faciat, ut spiritu exacto, admissio ue, & humore assumpto poma ualeant perdurare, similiter atq̃ in ægyptia fico euenire quodammodo dixerim.

Vtrum caprificatio inuenta sit, ut ficus se comprimat, an ut reseretur: item esse ficus quæ caprificatione non egeant.

## Caput XIII

**E**rum id apud nonnullos ambigitur, quasi culices cum grossos subierint, non reserent, sed potius comprimant. Itaque causam ē contrario inferendam existimāt, tanquam ea ipsa de causa caprificare oporteat. Nam si comprimātur, neq̃ rores, neq̃ ullæ pluuiæ guttæ possint admitti, quibus seruefactis iactura sequetur, sicut & flores punice decidunt.

dunt. Causam hanc esse uel inde significari abunde credūt, amittunt etenim magis cum imbres senserunt. Argumentū uero quod caprificatio cōprimendi gratia adhi-  
 beatur, inde accipi potest. Enim uero si caprificubus carēt, quas arboribus iniiciant,  
 arena inspergunt, ut se fructus comprimere ualeant. Puluis etiam idcirco iuuat ad  
 perdurandum, quia puluere asperso, protinus comprimantur. Quæ autē serō fru-  
 ctificentur, non illo eodem tempore aperiūtur, sed se comprimunt atq; possunt du-  
 rare, nec ullo modo caprificationē desiderant, cum iam uires conceperint, tum etiā  
 temporis immutatione sese aperiunt, nec amplius decidere possunt. Causa igitur  
 utroq; modo accipi potest, sed hæc nihil inter se inuicem repugnare quispiam for-  
 tasse putauerit. Cum enim imbres accesserint, grossi infirmiores redduntur, plusq;  
 humoris contrahunt: quo tandē inflato, iactura continuo sequitur, & arena inspar-  
 gunt, ut humorem possint absorbere. Ob id & puluerem iuuare existimant, hoc  
 enim humorem posse absorbere qui causa est, ut grossi decidant. Ergo si nulla in his  
 contraditio sit, causa in illo proculdubio est. Si uero contraria hæc inter se sint, eue-  
 niet porro ut altera quidē ratione rei principium intrinsecus sit, altera autē extrin-  
 secus, scilicet illa humore quo ea maxime decidunt, quæ non prona, sed erecta con-  
 sistunt, ut flores puniceæ. Quinetiā ex his ipsis causas oriri aliquas laborantibus mor-  
 bo uerisimile est. Sed morbus cōmune fortasse uitium omnium fructuum est. Com-  
 primendi autem causam cum subeant culices, aliquam reddamus necesse est: nam  
 humorem intestinum depasci à culicibus, utpote pabulū aptissimum illis, uerum est.  
 Quamobrem ad perdurandum plurimum iuuat, quanquam ficus reddat deterio-  
 res: quippe cum pastu culicum illo exinanitæ, humore lacteum amplius trahant.  
 Quapropter sunt qui caprificandum non censent, imò uero cum uendunt, clami-  
 rant, ficus se uenundare non caprificatas: & plurimum id referre putatur. Item fla-  
 ribus aquilonijs minus posse decidere oporteret, his enim magis se comprimunt, nisi  
 forte quod his siccetur, dehiscere arbitradum sit. Plures igitur obiectiones primum  
 illud recipere posse apparet, nisi forte ratione utraq; res fieri possit. Esse autem quæ  
 caprificatione non egeant, absurdum non est (ut antè iam diximus) cum modus  
 aeris, alimentiq; adsit. Nam humorem per totum hoc genus nimium esse, uel ex  
 ipsis erraticis constat. Cruditas enim illa non nisi ea de causa fieri intelligitur, & eas  
 quoque solent caprificare, ut ualeant permanere. His eisdem de causis, & his terq;  
 nonnullæ fructificant, scilicet alimentii nimietate. Primis enim decerptis ficibus,  
 aliæ facile prodeunt: & his rursus detractis, aliæ subnascuntur, quia humoris non  
 destit ubertas, atq; eatenus facultas procreandi accedit. Vt uero non præua-  
 let propter excessum. Solum enim hoc genus ex syluestrium numero aut certe  
 cum paucissimis fructum suum nequit perficere, nisi forte finem eius hætenus na-  
 tura descriperat. Sponte quoque naturæ id potest consistere. Sponte autem na-  
 scentium generatio non semine modo agitur, sed aliqua etiam putrefactione, uel  
 potius terræ alteratione: quamobrem id etiam genus frugiperdæ quis nuncupa-  
 40 uerit, ut salicem Homerus cognominat. Nam cætera tamen fructum uisu inco-  
 gnitum gerunt, tamen perficiunt & maturant, prout natura sua pergere apta sit.  
 Sed enim hæc proprietates quædam dirimens illa à reliquis possit intelligi. Quod au-  
 tem palmarum generi euenit, non idem est. Gerit tamen huius rei similitudinem  
 quandam: quapropter caprificari illas quoq; fieri consueuere. Flore enim à mascu-  
 lo, & puluere, & lanugine cum fructus insperguntur, siccitatem ex caliditate, ac  
 reliqua potestate concipiunt, atque spirantiores redduntur: quibus causis uis per-  
 durandi acquiritur. Huic quodammodo simile in piscium quoque genere euenit,  
 cum mas aditis ouis, uitale suum uirus aspergit. Verum similitudines uel ex remo-  
 tis generibus petere possumus.

*Cur in syluestribus eiusdem generis alie steriles, alie fructiferae habeantur: deq;  
uitis & ficus amplitudine.*

Caput XIII



Quamobrem autem inter congeneres agrestis ordinis alie steriles, alie fructiferae sint, quae quidem foeminae maris uel sexu appellantur, illa profecto causa redditur, quam prius de sterilibus expoluimus, quod propter spissitatem & uirium bonitatem, & molis totius largam nutritionem, infœcundae reddantur. Euenit namque ut eiusmodi arbores omne alimentum ad se nutriendas absumant. Cum enim fructificatio partem suam per uacuam alimenti desideret (hac enim fructus exoritur, sicut in animalium genere semen effici solet) si se aliorum assidue pars illa conuertat absumaturq; tolli generationem necesse est. Haud enim natura utriq; parti satisfacere potest, cum alimentum quantum suffecturum sit capere nequeat. Quibus igitur hoc interdum eueniat, haec tantisper infœcunda redduntur. Quibus autem natura protinus ad fructificandum pertenderit, haec fructum egregie pariunt. Quamobrem & inter agrestes non desunt, quae quamuis eodem in genere contineantur, tamen modo supradicto se habent; quae scilicet robustiores, spissiores, atq; maiores ferè semper alimentum ubertate efficiuntur. Omnes enim penè quae ampliore magnitudine se attollunt, minorem generant fructum, ut ficus Indica uocitata. Haec enim cum mira quadam magnitudine sit, fructum exiguum admodum, eundemq; paucum fert, ut quae ad germinandum totum absumat alimentum: etenim folio amplissimo est, & radice cum uero ab eius folijs demissarum generatio nutrimenti copia uidetur accedere. Sed fortè ediuerso, ut quoniam in ea quoq; pabulum dispensatur, idcirco fructus exilius atq; parcius proueniat. De radicibus abunde alibi disseruimus. Inter eas uero quae solum fructum progenerant, sola uitis & ficus incrementum amplissime capiunt. Vitis enim porrecta materia in quancumq; partem deuenire facile potest, modo solum obtineat probum ac fertile. Ficus autem se in altum attollit, & ramoso admodum corpore amplissimum occupat locum.

*De uitae longitudine, breuitateq; & fructuum ratione.*

Caput XV



Itam quoq; longiorem arbores infœcundas, quam foecundas, & pauciferas, quam multiferas sortiri ratio est, scilicet cum non imbecillitate aut humiditate, aut aliqua eiusmodi causa steriles, uel pauciferae sunt, ut quae aquis appositae uiuere consueuerunt, quaeq; nemorosa uel solitaria, proximèq; putredini constant, ceu laurus. Haec enim, & quicquid eiusmodi, redigi ad praedictas rationes oportet. Fructificatio uero magnam atque potissimam partem naturae detrahit: quod etiam in animalium genere patet. Enimvero quae plurima pariunt, celerrime consenescent ac pereunt. Porro uel in his ipsis arboribus latissime identidem liquet. Quae namque feracissimae atque foecundissimae sunt, citius omnino senescunt: nec secus inter congeneres, ut uites, ficos, & reliquas euenire sentimus. Quae autem steriles, uel paucis fertiles sunt, haec ferè omnes perenniores notantur. Fit ergo interdum uel potius frequenter, ut arbores ex uberrima fructificatione languescunt arefiant, quod uitis potissimum accidit. Quanquam & reliquae omnes multiferae idem sentiunt, quoniam uis tota naturae consumpta in fructibus sit & frugibus. Et omnino annuis hoc idem euenire uidemus: & causa haec est, ut annua consistat natura. Cum enim fructus perficiuntur, radices protinus exarescunt, quoniam uis naturae tota consumpta eisdem de causis sit. Arbores autem aut non tam citò flaccescunt, aut certe non ita, ut uitium deprendi possit. At cum tempus uernum extiterit, res conspicua sit, & celerius certe si quid ex aëre tale accesserit, ut opprimantur, affliganturq; arbores.

res. Nec solum quæ ad hunc modum exuberauerint, sed etiam quæ large fructificauerint, laborant sæpe atque intereunt. Quodque enim exinanitum effectumque imbecille est. Imbecilli autem etiam quod minus ualidum sit, officere potest. Quamobrem culta celerius, quam inculta senescunt, & meliora quam deteriora, & ad summam urbana, quam syluestria. Quanquam absurdum fortasse appareat, si quæ magis coluntur, celerius occidant. Verum cultura non uires auget, sed partum fructuum qui arbores necat. Vitæ autem longitudo uirium ratione consistit. Valet autem uiribus quod spissum atque sterile est. Quapropter Thasij cum agros mercede sibi conducunt, de cæteris quidem annis minime curant, imò fraudare conantur: de ultimo uero diligentissime literis notant, ut dominus agrum recipere debeat. Idem uel in animalium genere patet: quæ enim fecundissima sunt, his uita spacio breui describitur: quæque plura quam solent pepererunt, sæpe intereunt: & potissimum gallinæ, scilicet inter ea, quæ cum hominibus uiuunt. Igitur breuitatis uitæ ratio hæc est. Contraria uero longitudini uidelicet dantur, ut dictum est. Adde quæ quamuis non large fructificent, imò pleraque infœcunda penitus sint, tamen sua imbecillitate facile pereunt, quemadmodum in annuis patet, ceu cucumis, de qua prius quoque retulimus: hæc enim ne ad naturæ quidem suæ perfectionem accedere possunt. Porro etiam in arborum genere non desunt quæ ob raritatem infirmitatemque facile pereant, quamuis non copiose fructificent, ceu laurus: hoc enim in genere, illa quoque musci fertilis est, fructu uidua.

*Quæ in arboribus partes primum intereant: item Democriti opinio de arborum ætate: atque de earum uita contra eundem.* Caput XVI



Erum non simul cunctis suis partibus occidit, sed particulatim tam corruptio, quam senectia occurrit. Pars enim propemodum quæ maxime crassescat, putrescit ac perit: nepotes tamen complures exurgunt, ut res quodammodo proxima sit ramis arborum qui exarescunt. Sed interest quod his pars principalis intereat, illis uero ex istis aliquid quæ dependent. Verum quoniam regerminatio ab eadem ducatur origine, idcirco arbor quoque eandem esse censemus, qua de re ante iam differuimus. Arboribus uero inualidis, corruptionis initia, uel iniuria ictus, & flatuum uehementia, & alijs eiusmodi causis reddere licet. Quod enim debile est, ex multis commoueri facile potest. Et si super debilitatem fertilissima quoque natura sit arbor, ut punica, & malus uerna, magis quoque ita fiat necesse est: quippe cum ex utraque ratione noxæ oriuntur principia. Et malos quidem uermiculari etiam celerrime constat: & celerius dulces hanc offensam accipiunt, & omnino senescunt. Nec solum mali, sed etiam punice: absumitur enim pabulum, quod natura commodissimum præstat: tum etiam alteræ earum uelut agrestes, alteræ urbanæ consistunt. Nucleo quoque uacantes celerius quam nucleatæ, & quæ molli nucleo sunt, celerius quam quæ duro. Et in myrtis uero cæterisque pari ratione intelligendum, plus enim naturæ detrahatur. Et in totum istæ debiliores, solutioresque sunt: unde fit, ut & fructificare maturius ualeant: quod enim debile est, ocyus, ampliusque moribus cœli obtemperat. At quod Democrito placet, recta & minus uiuere, quam tortili corpore uibrata, & maturius germinare eisdeque posse de causis (Alteris enim celeriter alimentum transmitti, quo germina fructusque proueniunt: alteris uero pigre, quoniam per partem eminentem expedire non possit, sed ab radicibus nutrimenti omnis consumatur copia: hæc enim radice proluxa, crassaque inherere) haud recte placere appareat. Radices enim rectarum arborum imbecilles affirmat, atque ratione utraque fieri ut celerius pereant: de super enim ad radices, cum frigus, tum calor causa recti tramitis sine mora descendere, easdemque radices

neutrum posse sufferre ratione suæ infirmitatis, omnino arbores huiusmodi magna ex parte subtus senectam sentire incipere, propter radicū imbecillitatem. Item partes quæ super terrā extant, cum afflatibus debilitate flectuntur, radices funditus commouere, quo factio disrumpi atq; feruescere, ita arborē totā perire. Hæc Democritus. Sed minus recte asseruisse appareat, ut dictū iam est. Neq; enim quod de radicibus inquit, uerū est, ut superius proposuimus, uidelicet arbores uitæ perennis prolixa crassaq; firmari radice; nec enim ficus, nec cæteræ quæ prolixa crassaq; innituntur, uitam obtinent longam; neq; directæ erectæq; breuem habēt uitam, ceu abies, palma, cupressus, nec amplius augetur, maturius uē fructificare has cōstat easdem. Atqui hæc etiam sequi protinus oporteret, cum sint tales meatus, & radice non prolixe agantur. Quicquid enim ab eadem dependet causa, easdem res sequi necesse est. Igitur nescio an id causæ sit, nec potius quæ antē iam diximus: quibus etiam difficultas nascendi, & exiguitas atq; paucitas fructuum, & omnino firmitas plantarum dignoscitur. Densitatem, siccitatem, soliditatē atq; pinguitudinē causas dixerim, quibus & uitæ perennitas, & reliqua omnia generis eiusdem debeant assignari. Aduersa uero his ipsis, ex aduersis oriri necesse est. Quæ autem cum ubere fructificēt, nō tamen breui tempore uiuūt, nec citō senescūt, ceu pirus, amygdala, quercus, hæc uel in grandiore ætate fecundiora redduntur, ut dictum est. Viribus enim detractis, alimēti quoq; nimia ubertas detrahitur, atq; ita reliquum pabulum percoqui dispensariq; facile potest. Tum etiam intermissio fortasse aliquid confert, aut omnibus, aut certe aliquibus. Pirus enim atq; etiā magis amygdala, prima quidem specie fructum gerunt abunde, sed sæpenumero educare quæ progenerauerint nequeunt: quippe cum in perficiendo sit potissimō labor ac difficultas. Morus autem leuem quandam dilutumq; fructum, & minime pro sua magnitudine amplum creat. Sed uitæ arborum diuturnæ hæc pro causis habeant. De fertilitate dictum iam est, quod calidæ, solutæ, humidæq; fertiliores.

*Cur semina, quo minora, eo feraciora inueniantur.*

XVII



Emina uero (ut simplici transigam ratione) quo minora, eo fertiliores. Etenim quæ minima sunt, maxime fructificare uidemus, ceu milium, erysimum, papauer, cuminum. Ratio (ut in uniuersum dicamus) quod facilius minora effici possunt. Copia autem facilitati adiudicanda est, uel (ut è propiori sumatur) quod eiusmodi omnia facilius auget, celeriusq; aëris qualitati obtemperent. Argumento temporis quoque breue perficendi accipi potest. Nam & semina ipsa (ut summatim asseram) hæc eadem de causa fertiliores, q̃ arbores sunt, & inter ea magis legumina q̃ frumētā: ocyus enim crassantur, perficiunturq;. Item eorū caules magna ex parte ualidi sunt, nec ligno constant, nec simplices prosiliunt, sed plusculi, atq; in ramos diffusi. Quas ob res ratio est, ut & fructus large sequatur, præsertim si radices non succum auocent, ut in genere ferulaceo capitato ue agitur, sed assidue quod ceperint, fursum transmittant. Quod & in leguminibus, & in alijs plurimis fieri solet. Hæc enim radice singula figuntur, nec deorsum lateſcūt, sed superiora uiribus omnibus petunt. Verum maxime (ut ita dixerim) omnium cuminum, huic enim radix exigua penitus est. Quæ tamen ex his radicem ualidā agant (non enim desunt quæ ita se habeant, ceu milium, panicum) hæc pro suæ radicis modo caules reddunt, uidelicet à ualidis ualidos atq; multiplices. Quapropter cum à principio exiguo multi prouenerint caules, fructum quoq; abunde profundior ratio est: sicut & in hordei atq; tritici genere, cum ex uno plures culmi prodierint, sic enim plures spicas emergi necesse est. Hoc idem uel in oleribus patet cum seminis copia ferant, & radice ualida sint. Alia enim caules

caules plurimos edunt, alia caule uno edito in ramos sparguntur: omnia enim possunt ubi suos emisierint caules, in arboris speciem transeunt. Undique uero atque ex multis multum colligi fructum ratio est. Cum ergo ita contigerit ut & cœlum placidum sit, & natura sursum nitatur, nec radices euocet quicquam, sed iuuent, atque solum rarum, solutumque adsit, hæc cæteris fecundiora euadant, ratio est.

*Fabam imbecillissimam leguminum esse: item purgationes arborum & tonsuras conferre ad facilitatem: & cur mutatio contingat in fructibus.* Caput XVIII



10 I uero faba & aliud quicquid in leguminibus minus fructificet, imbecillitati certe tribuendum hoc est. Qua de causa maturius hæc ferere solent, ut priusquam hyems sit radices concipere ualeant. Faba tamen adeo detrimentis multis frequenterque obnoxia, ut quamuis mature prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitas enim eius uel sensu percipere licet: est enim corpore soluto, eualido, nec radice numerosa subninitur: quas ob res a quauis causa offensa transigi facile potest. Causas copiosæ fructificationis tam annuis quam diuturnioribus plantis his rebus determinasse par est. Nam & purgationes præcisionesque arborum, fructus copiam præparant, cum superuacua & excrescentia illa partim fructum prohibeant, partim alimenta absument. Itaque his detractis libere ad fructificandum natura suum impetum facit. Qua de causa nuces  
20 auellanas tondentes refecantesque fructiferas efficiunt: alimentum enim totum ad incrementa consumunt cum arborefcunt. Mutationes autem fructuum cœli solique ratione fieri constat, enim uero per hæc atque ex his alimenta omnibus suppeditantur. Alimentum uero plurimum ad conficiendam similitudinem ualet, siquidem & in animalium genere, partus foeminae similis hac ratione reddatur. Nec solum semina plantarumque mutari uidentur, sed etiam animalia: & quodammodo magis hæc quam genus plantarum, quandoquidem formas pro locorum habitu capiant. In fructibus tamen non æque id percipi potest. Cæterum hi quoque mutantur & maxime in colore, magnitudine atque sapore. In colore, ut semina: nigra enim in candida transeunt, & candida in nigra. In sapore, ut arborum fructus: coloris enim mutatio uel  
30 nulla conspicua, uel certe non æque his euenit, nisi tota arbor mutata sit, ut ex nigra in candidam transeat, quod interdum his euenit, quæ semine prodierunt. Sed cum defectio ista communis æque animalium plantarumque sit, causam quoque communem aliquam queramus oportet. Nam illud etiam commune animalia cum seminibus habent, ut non protinus, sed tertio partu mutantur. Etenim omnia paulatim sensumque alterantur, a suaque natura discedunt. At in arborum genere ediuerso agatur ratio est. Hæc namque principio infirmissima sunt, & præcipue quæ prouenerint semine. Sed absurdissima mirandaque omnium maxime in arboribus mutatio in melius esse appareat, ut in Aegypto atque etiam magis in Cilicia punice meliorescunt, & myrtus suauem odorem circa Aegyptum acquirit. Mutatio enim in partem deteriorem numerosa & ubique gentium perspicua est, quocirca illud uehementer miramur. Fit ergo uel in seminum genere, ut in melius transeant, cum melius ipsum quasi simile est. In hoc enim discrimen exultat, quod alias idem permaneat semper, alias uarie immutetur. Nam quod euenit idem est. Detrahitur enim aliquid naturæ assidue aui quæ genus utrumque pari ratione deuincit. Hoc enim animalium generi etiam euenit, quippe cum ex candidis transeat in nigra, & ex asperis mollia reddatur. Sed cum in his causam partim aqua habeat partim cœlum, & ad summam qualitates alimentum, in illis quoque & ubicunque aliquid tale eueniat, proximam eandemque necessitatem arbitrari par est. Singula uero tunc magis & forte tantummodo nosse aliquis ualeat, cum & agros & loca expertus studio commentandi peragrandaque fuerit.

*Cultura immutari uim naturamq; plantarum: deq; mutatione arborum, quæ radicibus  
occasione uitio ue contingat. Caput XXI*



Roximum sanè huic uidetur, quod ex cultura mutari potest. In primis quidem, & quoad uniuersim exponi licet, cum mitescit, mox uero cum eodem in loco meliorescit. Quippe cultura lætantur, cum minori nucleo reddantur (ut dictum est) & omnino meliora euadant. Prorsus granata dulciora, mollioraq; aquatio facit. Acerbitas enim atq; duritia tale desiderat auxilium. Quod enim indigum est, iuuari desiderat, atq; id solum bisarie agitur. Aut enim per additionem quandam, aut per detractionem alterius, sicuti dictum de amygdalis est, quæ castigantur ablaqueanturq; & de ficis quæ perfisso caudice meliorescunt. Sublata enim nimia alimenti copia, calor insitus amplius in residuo ualet. Sed peculiaris in primis mollitio quæ radicibus exhibetur, appareat. Stercus enim suillum, uel quod uim proximam illi obtinet, radicibus punicarum superiniectum dulcem efficit succum. Quinetiam copia & frigidityte aquæ mutatione afferri aliquam dicitur: sed omnium maxime euidentissimeq; locorum quorundam, atq; cœli natura mutationis causam habere notantur, ut in Aegypto atq; Cilicia. Nā & illis certe in rebus alterationes mutationesq; perquirendæ omnino sunt, solo, aqua, cœlo, cultura. Deniq; agricolatio arbores fructusq; mitigans, mutare mirum ualet. Ergo de reliquis alias quasdam reddere rationes oportet. De mutatione autem quam radix impertiat, cuius gratia hoc in loco differimus, accipiendum illud censemus, radices tanquam elementa quasdam esse arborum, elementorum autem conditionem cætera omnia sectari necessarium esse. Quamobrem de cucumeribus dictum est, quod seminibus in lacte, melle uel maceratis, dulciores redduntur. Adde etiam alimentum coctius à radicibus accipi, mutatisq; ipsis fieri, ut tota quoq; arbor mutetur. Ab his enim alimentum omne transmittitur, dispensaturq;. Nam & aquæ copia, & solum, & culturæ, radices primum attingunt, atq; hinc initio principio cætera subinde immutant. Fieri tamen potest, ut alia ualeant alijs auxiliari, ut discessio ficis, & amputatio uitibus, & diminutio amygdalis, uel ictus paxillo ad actio. Humore namq; superuacuo defluente, reliquis facilius coqui atq; dulcescere potest. Inoculatas autem arbores mutari nō dicimus, quoniā aliud illæ principium habent, quod deuinicare nequeunt. Sarculus enim, qui uel inseritur, uel inoculatur, truncum subditum loco telluris usurpat, ut antè iam diximus. Atq; ita duplex mutationis ratio intelligi potest, id est quæ radicibus, quæq; inoculatis, insitis uel truncis tribuitur. Altera per alterationem partis subditæ, altera per aliquorum adiectionem. Quamobrem hæc minus miranda est. Sed cur punica maxime immutatur, causam raritatis imbecillitatisq; recte dederis: quæ namq; huiusmodi sunt, facillime mutationem accipiunt. Cogitandum tamen, an aliam quoq; naturæ aliquam proprietatem licet assignari.

*Primam causam mutationis in deteriore partem esse negligentiam: tum  
quæ diminuta meliorescant. Caput XX*



Mutationum autem in partem deteriore causas prædictis esse contrarias constat. Sed euidentissima & communissima omnium negligentia est. Omnia namq; ferè neglecta immutescunt. Interdum etiam fit ut quasi manca læsaq; fuerint, in deterius transeant, cum scilicet principio nascens quicquam diminuitur, ceu amygdala. Hæc enim amara ex dulci, & dura ex molli sic redditur. Cætera mutatione manifestam nullam suscipiunt, quanquam plantæ quidem uitium adeo interdum laborant, ut omnino perire undum sit. Quocirca mutari quoq; illas magis debere uerisimilius esse uidetur.

Amygdalam

Amygdalam enim posse mutari uel ex toto, procul abesse à ratione appareat: est enim arbor satis robusta. Non tamen defunt, quæ diminuta posse meliorescere dicant, ut de piro Phocide Chij referunt. Amygdalæ igitur uires non in eadem arbo-  
re accipi debent. Diminuta etenim ualida, nascens inualida est: præsertim si semine prodeat: quippe cum sæpe etiam non diminutæ, amaræ duræq; efficiantur, ut antè iam diximus. Omnino enim omne, quod prouenerit semine, degenerat, deteriore-  
scitq;: & si eius impetus naturalis motu aliquo immutatus sit, magis magisque ita fiat uerisimile est: quippe alius quasi, atque imbecillior redditur. Nam & quæ in aqua co-  
quuntur, si importune moueantur, quo minus percoqui possint, impediuntur. Et  
10 terra quoq; eadem de causa ægre madescit: quod enim inter initia agitur, summū,  
& ad rei perfectionem spectatissimū est. Nec absurdum sola in ea maxime muta-  
tionem parere, tum propter rationes prædictas, tum quia neq; uitis, neq; alicuius  
ex cæteris fructus dum perficitur, amarus, uel acidus fit: sed aut dulcis, aut nondum  
percoctus est. At eius fructus talis non est, quanq; lare, perfecteq; consistat. Sed for-  
tè non deest, qui etiam inter cæteros ad sapore æcerbum, uel dilutum, uel nō æque  
dulcem perueniat, dum perfectionē suam acquirit, quanq; nostrum lareat sensum:  
quippe unigenitum ipsorū alia magis, alia minus esse huiusmodi certum est. Eue-  
nit ijs, quæ fuerint diminutæ, ut si arate confectæ iam recidantur, purganturq; dul-  
ciores euadant, demumq; ad naturam pristinam redeant. Ratio, præter id quod re-  
20 tulimus, est, quod diminutio facultate germinandi prohibita, humorem permiscet,  
deterioremq; ad fructificandum efficit, qui cum æquo largior sit, percoqui nequit,  
itaq; amarus relinquitur: & præcisæ uero facultatem quandā spirandi, leuationeq;  
recipit, sicuti cum adaçti cunei fuerint. Ergo castigato humore, facta iam arbor ualid-  
ior, utpote onere leuata, concoquere melius, & redire ad naturam pristinā potest.  
Huius igitur naturam uelut restituibilem dixerim. Quædam uero nisi diminuant,  
fructum percoquere nequeunt, ut uitis, quam cantharam uocitant. Qua de causa,  
summa uuarum detrahente solent, alioquin putrescunt, & pereunt. Constat igitur  
(ut simplicius loquar) quod genus id uitis humoris diminutionem desiderat. Pho-  
cis autem appellata, si diminuat, melius arboris speciem capeit: sed non probè  
30 fructificat, quippe quæ diminuta nimium generet, & simplex, infirmæq; exurgat:  
non diminuta uero, spargat sese in ramos, ac transeat in arboris speciem. Quod for-  
tè non nihil ad probe fructificandum conferre ualeat. Vires enim adeptæ meliores,  
melius concoquere potest. Olera, & herbæ, quæ diminutæ, tonsæq; meliores red-  
duntur, ceu porrum, brassica, medica, lactuca, ocimum, hæc omnia teneritatis, ali-  
menti q; probi ratione, meliora, sapidioraq; euadunt. Tollitur etenim acredo, & sic-  
citas, & si qua humoris lactuosi qualitas sit, eadem molliora, uegetioraq; fiunt, quia  
radices ualidiores redduntur: & omnino quo amplius diminuantur, eo magis uires  
conciunt. Quædam etiam plus pabuli trahunt, & melius possunt concoquere. Du-  
ris item, atq; lignosis sublati, proficiunt amplius, utpote cum nihil impediat, quip-  
40 pe germinatio prima ex debiliori pergens, origine deterior est. Mutationes saporū  
has reddere possumus.

Quamobrem odores fructuum immutantur. Quæ præterea plante ab una  
specie in aliam commeant. Caput XXI



Ed oritur odoris quoq; immutatio, & quidem præcipue cœli, agriq; sta-  
tu. Loca enim tota ferè parte sicca, & cœlum eiusmodi, odoratiora effi-  
ciunt: quamobrem agrestia odoratiora sentimus. Sed fortè nō in uni-  
uersum, nec plenius odorata sunt: etenim acriora: quapropter solum,  
cœlumq;, quod mediâ constat temperie, optimū esse censendū. Nam



quæ terra uliginosa proveniunt, aquam sapiunt, atq; inolida sunt. Sed de odore, atq; sapore, seorsum posthac latius disserere convenit. Nunc mutationes uel in his fieri posse, tam natura, quam cultu, late ex prædictis patescit. Quædam totius arboris, plantæ uel mutationes sponte exoriri uidentur, ut populū candidam transire in nigram, tum fronde, tum etiam tota specie aiunt: & sisymbrium in mentam mutari, nisi cultu retineatur, sapeq; transferat: triticum item, linumq; lolij capessere speciem. Hæc ergo mutatio, si uerè aiunt, corruptio quædam propter humoris nimietatem esse appareat. Fit enim, cum imbres inceserunt: mutato autem principio, diuersum fit, quod inde erumpit, necesse est. Lolium uero aquam uehementissime amat. Populi si eiusmodi mutatio fiet, tunc foret profectio, cum amplius crassescere arbor inceperit, quod euenire ætatis causa solet: augetur enim arbor in profundum in senectâ, itaq; frons crassior, & rami ampliores, pluresq; conficiuntur.

*Folia cur in eadem arbore immutentur. Deq; sisymbrio in mentam mutato. Atq; agri duplicem intelligi debere commoditatem. Caput XXII*



Oliorum transfiguratio cõmunis uel aliorum percipitur. Nam & crotonis nonnulla, cum rotunda principio prouenerint, in angulum deinde se colligunt: quasi formam istam suæ perfectionis demum capessere debeat. Quod ita fit, quia res simplex facilius est, quam multiforis: & principium rem difficilem peragere nequit, quia debile est. Si sisymbrium, si transit in mentam, odorem tantūmodo mentē recipit, proprio amisso, quia cultura caruerit: speciem uero non recipit, sed quasi nepitæ redditur simile. Omnia nanque in simile sibi quicquam mutantur, non in remotum penitus transiunt. Cultus autem & translatio naturam propriam retinet, atque seruat. Argumentum, quod & agreste sisymbrium talem reddit odorem. Etenim illud quoque naturæ aduersum est, mentam radice alta firmari, sisymbrium per summa cespitum coherere, nec tam numerosam radicem fortiri. Quamobrem in his quidem mutationem potius imaginariam quandam fieri dixerim: & urbanum quasi in agreste transire: nec absurde sic agi, quādoquidem loca etiam ipsa immutantur. Sin autem in animalium quoq; genere id euenit ipsum, ut auium immutari & colorem, & figuram, & uires aiunt: id quoque non longi temporis spacio, sed annis singulis fieri, mirari quispiam potius debeat, si non his quoque possit eiusmodi quicquam accidere. Neque enim minus conditam, minusq; distinctam naturam hanc esse, consentaneum esse, sed ualidiorem etiam esse credendum forsitan est: atq; proinde mutari posse sine ulla coloris uel alicuius corruptione, idē in paucis fieri, ut in plantā aliam transeant: quippe cum neque in generatione suā aliquid formam amittat, sicut animalia quædam: sed omnium plantarum simplex quædam natura sit. Mutationes uero (ut supra diximus) in sapore maxime, & odore, & magnitudine, tam ipsarum plantarum, quam fructuum, foliorumq; fieri solet. Folia enim angustiora, latiora redduntur: & ad summam plantæ ipsæ ad hunc modum diuersæ efficiuntur. Quapropter locum unumquodque sibi conuenientem querat. Conuenit autem is, quo uigere maxime ualeat. Quamobrem non omnibus solum idem aptissimum est, sed alia gracile, macrumq; amant: alia arenaceum: quædam etiam sabulosum, ut brassica. Sed agri commoditas duplex certe intelligi debet: aut enim, quæ naturæ conueniat, aut quæ uiribus, roboriq; congrua sit, ut amygdalis solum gracile commodum est: quoniam si altum sit atque pingue, nimia pabuli ubertate fasciuites, sterilitate afficiuntur, ut in uniuersum de arboribus antè retulimus. Sed de alteratione, mutationeq; hæcenus.

Quod

Quod quedam non in terra, sed in arbore pullulant, ut uiscum, stelis, hyphear: quidq; hæc inter se differant. Item de spina Babylonica, cadyta, edera, uisa in cerui cornibus: deq; terebintho in olea, & polypodio in arboribus: idq; ostentum interpretari. Caput XXIII



Irandum autem, atq; absurdum maxime omnium appareat, quod quædam ex seminum, plantarumq; numero, pullulare in terra nequeunt, ut uiscum, stelis, atq; hyphear. Stelis Euboensium uocabulum est: hyphear Arcadum: uiscum commune. Hæc naturam eandem omnia sortiri quidam affirmant, sed ea de causa differre uideri, quia in diuersis plantis proueniant. Hyphear enim, & stelis in abiete, pinoq; nascuntur: uiscum in quercu, terebintho, atq; alijs pluribus. Alij differre ista inter se uolunt, argumentumq; non inepte illud adducunt, quidem uere narrant, quod non solum in congeneribus quodq; illorum erumpat, exempli gratia, in abiete, pinoq; uerum etiam in eadem arbore plura diuersis partibus exeant, ut hinc stelis, uel uiscum, inde hyphear. Item non modo formas, sed etiam fructus dissimiles hæc ferre confirmant. Atqui id quidem obseruari ubiq; par est, etiam in agris, qui inter sese plurimum discrepant. Viscum enim aliud folio esse perpetuo, aliud deciduo, haudquaquam absurdum est: siquidem aliud uiuentibus semper arboribus, aliud frondem amittentibus insidet. Fit enim, ut in his careat alimento, in illis habeat quantum abunde sit.

20 Causa enim perpetuæ, deciduæ ue frondis hæc est, quemadmodum diximus: sed hoc utro tandem modo se habeat, nil refert ad id, quod in præsentia quærimus. Nasci autem humi nulla penitus ratione ualere absurdum certe apparet, præsertim cum tam multum, ac ualidum fructum pariat. Si uero semina quoq; aliqua eiusmodi sint, ut quod apud Babylonem spinæ iniectum, sub ortum syderis, eodem die enasci, atque etiam spinam posse complecti celeriter, asserunt: & Syriaca illa herbula Cadytas uocata, quæ arboribus, ue pribus, atq; alijs quibusdā innasci: hinc porro anceps admiratio reddi, ut ratione alterutra magis, minus ue miranda sit res, quippe utrumq; in ijs euenit, quæ cum admirabilia, contraq; opinionem hominum sint, amplo tamē numero ualeant cõperiri. Alias enim minus miramur, ut de re ita fieri solita: alias uehementer

30 miramur, multitudinis causa. Nam quod humi gignitur, arboribus etiam, plantisq; alijs idem posse ingigni absurdum non est: imò uero solitum planè habetur, ut edera in multis creari, & quod mirabilius, uisam esse in cornibus etiam cerui aliquando: & terebinthum in olea, & polypodium uocitarum in quibusdā arboribus. Et quæ rariora, & pro ostentis potius capienda uidentur: ut laurum aliquando ortam in platano, & quercu: & reliqua, quæ tanquam ostenta interpretantur. Cum enim in partem arboris conuersam penè in terrâ putredine semen deciderit, pullulat, uiuitq; subinde alimentum ex subiecta capiens arbore. Quod etiam de edera, quam in cornibus prouenisse aiunt, si uerum sit, non temere dixeris. Sed in alijs tantummodo posse creari, humi autem nulla penitus posse ratione, id profectò absurdum recte

40 appareat. Enim uero plantas quoq; more animalium amicas inter se, atq; socias esse credi forsitan potest. At humi nullo pacto posse progenerari, mirandum omnino est: præsertim cum & fructum ferat, quod ita prouenit, & semen quo possit creari. Etenim si qua corruptione alicuius, quod in arbore est, talis generatio fieret, ut in animalibus quædam ingigni animalia possunt, rationem nonnullam assignare possemus: sed putredo nulla penitus est, nec prouenit nisi semine, ubi aues, quæ fructum deuorauerint, excrementum in arbore egresserunt. Tum enim semen ipsum tunc in arbore situm, tempusq; generationis adeptum, pullulat. Igitur hoc uehementer, multisq; de causis mirum. Proximum tamen quoddam insitionibus, atque inoculationibus euenire apparet. Alimento enim paratius, & quasi confectum,

percoctumq; propemodum capitur : quod etiam uiscum uidetur exigere : at quod eiusmodi alimentum desideret, imbecille natura est : hoc autem neque de uisco, neque de stelde, neque de hypheare dicendum uidetur. Hæc enim ualida, & nutrire idonea esse putant. Nam & boues, & iumenta hoc pabulo post messem aluntur, atque pinguescunt. Ad hæc ipse fructus uisci, quam bonis sit uiribus, sua planaria latissime indicat. Quod si non infirma, sed tam ualida sint, cur non per se pullulant, atque proueniunt? Quippe quæ uiribus ualent, terram ui sua disjungere, seque abscondere possunt, quod lupinum etiam facit. Sin autem semen frigidum, & concoctu perdifficile habeant, at diuturniorem sequi oporteret exortum, ut & alia ferius hac de causa exeunt. Nam & betarum aliquas anno postero erumpere, germinareq; asserunt: neque enim periculum esse, ut putrescant, intelligi potest. Nam & ea ipsa, & alia longe his infirmiora tute perurere posse uidemus. Hæc igitur questionem non soluunt, sed potius nodum arctius alligant.

*Solutio questionis: Quamobrem uiscum, & similia non nisi in arbore aliena nascantur. Tum de conchis, cancro, & coccyce aue.*

Caput XXIIII



Rgo principium, normam naturalem sectantes, capere quemadmodum res fieri solet, debemus : id est datum ijs à natura esse, ut non nisi in alijs ualeant prouenire : sicut & animalia quadam non nisi in animalibus possunt creari, ceu quæ in conchis nascuntur, neque in cæteris aptis præstare animalibus pabulum. Verum origo latet eorum. Plantarum autem eiusmodi generatio patet. Initium uero à pastu auium exoriri, uelut accidens ad generationem animaduertimus, quod uel in alijs euenit. Pica enim, & alia quadam aues, glandes reponentes, obruunt terra : quippe uisco detractio, confectioq; in aluis, quod frigidissimum est, semen cum excremento purum demittitur, & facta mutatione aliqua in arbore stercoreis causa, pullulat, atq; erumpit. Vis res autem bonas concipi ratio est, cum pabuli copia, tum uel maxime ratione fortassis naturæ propriæ. Validiora tamen illa esse, quæ in abiete uel pino nascantur, consentaneum est. Plus enim alimenti, & idem pinguius eiusmodi arbores subministrant. Porro uel in animalium genere permulta eiusmodi facere natura uidetur, ut alijs alia ad generationem, salutem uel utilia sint : ut inter historias animalium expressum est. Quamobrem nec in hac parte admirari fortasse debemus, siue de industria pastus, egestusq; auium fiat, seu fortuito incidat, neque dicendum, generationem non nisi auium opere confici potuisse. Neq; enim uita fortasse conchis possit feruari, nisi opera cancri : neque apium natura constaret, nisi à sua prole adiuuaretur, ut quidam affirmant : neque coccyis genus extaret, nisi sua oua alieno in nido supponeret. Sed quemadmodum perire, aut feruari, mutua opera euenit, tam in generando, quam in uiuendo, sic etiam plantarum generi operam ab animalibus ipsis præstari, res nulla est quæ prohibeat. Causam ergo hanc uel huiusmodi aliquam esse putandum. In his autem, quibus semen imponi retulimus, nec fori uita illa, & euentitia ratio locum possit habere (agitur enim ex uoluntate) uerum tempus superferendi capiunt, cum subiacens planta turgescere incipit, ut spina illa dum sydus ortur, intumescere planè uidetur : humecta enim & agilem esse ad generandum oportet. Ortus uero illa celeritas, non solum ob

eam rem, qualitatemq; temporis, uerum etiam naturæ propriæ ratione contingit. Atque de his satis.

*Plantis plantis presidio esse. Item de ijs, quæ aliquid querunt, cui incumbant, ut edera, smilax, cucumis, serpyllum, uolucrum.* Caput XXV

**E**ste autem uel inter plantas, quæ ad salutem generationem uel mutuò auxiliantur, hinc etiam potest intelligi. Enim uero in syluestri genere, quæ fronde decidua sunt, semper uiribus profunt: cum folijs putrescentibus eueniat, ut humus propemodum stercoreus: quod cum ad pastum fecundum, tum ad germinationem perutile est. In parte uero urbana, quæ plantis uitium interferere solent, quod humorē nimium detrahant, quæque oleribus interponunt, uel eadem de causa, uel propter bestiolas, quæ in plerisque nascuntur, ut eruum serere inter radices, consueuere, contra papiliones, & quicquid eiusmodi alijs presidio adhibere. Nam & in ijs, quæ sua sponte natura progenerat, pleraque huiusmodi contineri credendum est, præsertim cum ars rationem imitetur naturæ. Adde quæ arboribus sustinentur, atque amplexu caulia constant. Hæc enim aliquid, cui incumbant, querunt, ceu edera, smilax, cucumis, & alia quædam: & inter minora, serpyllum, & uolucrum. Hæc enim omnia uitam apud aliud agunt: quod si obtinere non ualeant, humi sese proiciunt, atque humicaulia fiunt: præterque illa, quæ arborefcere possunt, ut edera. Vitis quoque in hoc enumerari genere debet: nunquam enim materia, germinaque sufferre, aut certe non eque ualeret, nisi quo se sustentaret, haberet. Quippe & cum clauicula ea de causa fortiri putetur, ut protinus apprehendere, copularique possit: sicut etiam edera germinibus undique profolientes radículas gerit. Quæ autem corpore leui, atque gracili constant, facile arborescunt, offendantque, ut uolucrum, lupinum, filiqua. Hæc omnia noxam arboribus inferunt, perfringendo, obumbrandoque, pabulum auferunt, cætera prohibendo. Edera uero infixæ etiam rapit: quæ obrem omnium molestissima hæc arboribus hæret. Accedit enim ut fronde perpetua sit, & uiribus admodum ualeat, alimentumque proinde multum, semperque desideret. Exiccatur penitus cum arboris summa complexa concreuerit: tunc enim undique alimentum aufert, atque percoquit. Nec difficile forsitan sit, pleraque etiam alia plantis comperire damnosa. Sunt etenim hæc longe plura, quam utilia, sicut etiam animalibus: nam ex odore noxam capiunt quædam, ceu uitis odore lauri, atque brassicæ: quod protinus in germinatione liquefit. Cum enim germen propinquum lauro, uel brassicæ est, retrorsus parte sua postrema flectitur, & quasi odoris uehementiam fugit. Vitis namque olfatrix est, sicut & uinum odores rerum appositum trahere aptissimum est: & magis, atque celerius, quod amphoris continetur: quoniam id neque multum, neque crasse obiectum sit. Sed multa esse, quæ possint offendere, facile percipi potest, ut dictum est.

*Cur folia circumagantur æstiuo solstitio: curque in aliquibus per uices se comprimant flores, aperiantque. Præterea cur quedam se uicibus mergant, emergantque. Item uim magnam à syderibus nasci in plantis.* Caput XXVI

**Q**uæ autem alicuius generis, uel etiam plurium, diuersorum communia sunt, ut tiliam, & oleam, & ulmum uertere sua folia æstiuo solstitijs: & quosdam flores noctu comprimi, interdum aperiri: & quod in Eufrate aiunt, non modo flores Loti aperiri, & claudī, sed etiam caulem alias ascendere, alias occidere, & emergere à solis occasu ad mediā noctem: & quicquid eiusmodi, hæc omnia communem quandam habere rationem putandum est: quantum in congeneribus res deprehendi facilius possit. Ergo folia circumagantur æstiuo solstitio, quia illo potissimum tempore folia decidunt: causam uero ante iam de omnibus diximus. Cum igitur foliorum agatur profluuium, cuncta aliquantulum affici necesse est, & quæ infirma, & quasi confecta senio sunt, exarescunt, ac decidunt: reliqua circumaguntur tantummodo. Omnibus igitur illud euenit uel magis, uel minus: sed conspe-

ctius in ijs est, quia summo coloris discrimine pars prona discrepet cum supina: hæc enim uiridis, illa aquina, & humida. Quod latius in tilia patet: hæc enim ampliora, candidiora; folia gerit. Quibus uero e numero semper uiuentiū, nō idem eueniat, causam assignauerim, quod eo tempore amplius uigeant, ualentiora; consent ad germinandū: quod enim ualidū est, affici nō facile potest. Horū compressio, ac patefactio facilius intelligi potest. Fieri em̄ frigoris caloris ue causa, cum genus illud plantarum frigidū, imbecille; sit. Comprimit enim flos, humore coacto, & quasi concreto. Sic enim ui quoque destituit sui caloris. Aperit se utiq; calore diffuso, laxante; quod opera efficitur solis. Quæ aut̄ altius descendunt, frigidiora hæc esse, imbecilliora; constant, cum magis mutationē temporis sentiant. Nec temere tam citō hæc sentiunt, quæ undis degunt, immersa præsertim locis feruidis, astuosis; . Nam & in ijs, quæ non tali habitu sunt, celeriter à sole, atque syderibus transmitti quæque intelliguntur. Itaque non modo aquæ per summa terræ uagantes, sed etiam quæ subtrās absconditæ sunt, solstitijs, atq; oribus syderum affici, mutari; sentiuntur. Necnon & terra ipsa, & mare mutatur quorundam ui syderum. Flores quoque permultos proxime his interdum affici constat. Assidue nanque circumaguntur cum sole, scēq; eodem inclinant, quō sol perferatur: quod quidem latius in minoribus perspicilicet. Quorundam etiam folia, hoc idem pati animaduertimus, ut maluar, atque eiusmodi. Causa uero in detractiōe humoris est. Eodem nanque inclinantur, quō sol humorem feruefaciens prouocauerit. Igitur hoc fidei faciendæ gratia dictum ad illud superius sit. De cæteris autem, quæ arboribus, plantis ue ad summam eueniant, ex arborum genere petere rationes, atque contemplari tentandum: propria quoque uniuscuiusq; assumpta natura, statu; agri adiecto. His enim communes affectiones, diuersitates; generum, & quæ conueniant, apta; singulis sint, percipi nimirum possunt. Simile quoque, uel idem, an possit contemplari oportet. Multa enim cum inter se differant, haud quicquam differre uidentur. Sed hæc finem hic habeant: quæ autem in agriculturae eueniant, cuiusq; rei gratia fiant singula, deinceps pari modo indicandū iam est.

THEOPHRASTI DE CAUSIS PLANTARVM  
LIBRI SECVNDI FINIS.

THEOPHRASTI DE CAUSIS  
PLANTARVM LIBER TERTIVS.

Ex satuiis, urbanisq; multa esse, quæ coli non patiuntur.

Caput I



AT I O plantarum bifariam agitur, ac duplici omnino genere consummar: Aut enim quæ sponte proueniunt, contemplatur: quod genus naturæ initium est: Aut quæ hominis ingenio, paratu; fiunt, consideramus: quæ quidē auxiliari naturæ ad finem destinatū retulimus. Itaq; cum de ijs, quæ sponte proueniunt, superioribus libris dictum abunde sit, nunc de reliquis modo simili differemus, si prius id explicauerimus, pleraque tam in arborum genere, quam in submissa materia esse, quæ culturam minime patiuntur. Hoc enim alterius generis ueluti finis, alterius initium patet, cum scilicet de ijs

de ijs quæ sponte prodeunt ad ea, quæ ars efficit, indaganti ratio *tenerit*. Sed absurdum fortassis id ipsum appareat: siquidem quod cultum assumpserit, tanq[ue] sortem sibi accommodatam, nō magis uigeat, latiusq[ue] fructificet, cum ars naturæ auxilietur: absurdum tamen nō est, neq[ue] alienum. Principium uero illud capiamus oportet, naturam cuiusq[ue] rei non ex eisdem constare, neq[ue] ē singula materia perfici. Non uero omnibus finem eundem coctionis potestatisq[ue] fructuum esse, sed singulis pro eius rei ratione, ad quam genita sint, sapore, odore: cæterisq[ue] finem utiq[ue] statui, sed præcipue sapore, odoreq[ue], fructus cocturam determinare solemus. Et hæc certe ad hominis usum redigimus, ut antè iam dictum est. Sed cum quibus quodq[ue] cōsistit, his etiā  
 10 nutriatur, commoditatisq[ue] rationi non solum genus, uerum etiam modus adscribitur: non idem prorsus utriq[ue] stirpium conueniet rationi. Agricoltatio uero, tum copiam, tum genus cōmodum alimentum molitur. Ager enim agitur, consecutusq[ue] & plus pabuli præstat, & sapores immutat. Ergo ratione optima, cultus quibusdam commode adhiberi, quibusdam minime possit, ceu illis quæ siccæ, acriæ, amari, atq[ue] ad summum uenenosæ sunt, usumq[ue] medicaminis præstant. Hæc enim sublati uiribus hebetantur, atq[ue] effœminantur, ut aliæ fructum omnino parere nequeant, aliæ humidiores, deterioresq[ue] pariant: quæ etiā aquosæ reddantur, ceu absinthium, & fel terre. Et omnino uis omnis medica, uel radice, uel fructu, uel ramo, respondent  
 20 ijs, quæ in gustatu quandam uehementiā monstrāt. Quo in genere caparis quodque enumeratur, & lassæ, & rumex, & satireia, & cunela, & thymum. Quædam enim ex his, aut nullo pacto locis cultis proueniunt, aut uitiose. Quædam multo deteriora efficiuntur, ceu rumex, satireia, inuris: nōnulla dulcescunt, cum humefcere, atq[ue] succo abscondere inceperint, ut corni fructus: hic enim mitescens, deterior redditur, atq[ue] in totum arbor ipsa humida, soluta, imbecillisq[ue] fit. Sorbum dulcius quidem redditur, sed minus odoratū: uires enim succi, boniq[ue] odoris deficiūt. Eadē ratio de lassæ est, & de lupino, & quicquid eiusmodi. Lassæ enim non æque uehemens est, quia copiosiori, humidioriq[ue] alimento uescatur. Lupinum syluescens, atq[ue] luxurians, redditur infœcundum. Enimuero copia quoque nutrimenti aduersatur terræ molitio, quemadmodum diximus. Quodq[ue] autem pro sui principij ratione  
 30 modum sibi pabuli seruat, solumq[ue] capessit idoneum. His enim ipsis spontanea illa perfici generatio potest. Omnino enim (ut sæpe retulimus) summa ratio cōstat, solum cœlumq[ue] obtinuisse aptissimum: hinc enim fertilitas, sterilitas ue exultat. At uero hæc ipsa illis certe aduersa uident, quæ in uita sua natura possunt mitescere: quippe cum ad meliorem aërem transferantur, diuersumq[ue] alimentum capiant: quibus res mutatio, & quasi naturæ dimotio sequit. Quin & in ipsis, quæ colimus, illud ipsum quodammodo testificari uidemus: sunt enim quæ cultum nimium, exquisitumq[ue] aspernentur. Ex quo intelligi potest, terminū eius quoq[ue] certum statui oportere: atq[ue] ita nihil quodammodo prohibet esse, quæ translata nullam penitus culturam desideret. Igitur non omnia cultione lætari manifestum hinc est. Forſitan em̃  
 40 alia nullam penitus curam desiderent: alia cur desiderent, latitant.

*Quæ opera agriculturæ sint in uniuersum.*

Caput II



Ed quum duo illa prædicta sint, quibus alimenta fertilitatesq[ue] admittuntur, cultura profectio, & agro unice auxiliatur, sed aërem commodiorem præstare utique non potest. Verum ad mutationes, atq[ue] uicissitudines temporum, arbores ipsas agrumq[ue] præparatum ita esse oportet, ut & pabuli fructus adit ad incrementa futura, & res nulla aduersa ualeat offendere. Nam id quoq[ue] in obseruatione habendum est. Sūt etenim necessariae amputationes, purgationes, decacuminationes, stercoreatio-

nes, fossiones, atque reliquæ curæ, quæ arboribus adhibentur. Et de segetibus uero pariratione animaduertisse oportet. Alijs enim non idem, alijs non tantundem, alijs non eodem modo, nec eodem tempore conuenit exhibere. Nonnullis fortè, nec ullo pacto præstari aliqua debeant. Quæ quidè omnia prudentes agricolæ generatim distinguunt, sicut & in ratione purgandi, alia ferro, alia manu, alia quibusdam aduncis detrahenda præcipiunt, ut oleæ, piri, mæli, ne laborent ulceribus propter ramorū fragilitatem & siccitatē: his enim præarida & tenella detrahi tantummodo iuuat. Vites quoque simili modo discernere decet, scilicet immature, sero-ue & in breui, longo uel palmitē amputandas, & quicquid eiusmodi, ita scilicet ut quæque ad finem redigant. Igitur agriculturæ spectatio, & per singula diuisio ista est. Sed disputatio ista, quæ rerum explicet causas, de singulis agatur necesse est, nec eas causas latere oportet. Qui enim sine causæ notione quicquid faciat, & consuetudinē, resque euenientes tantum sequatur, quod sibi statuit ut efficiat, fieri forsitan potest: non tamen cur ita effectū sit, nosse ualeat: ut in ratione medendi prorsus intelligere licet: perfectus tamen qui utranque rem teneat. Sin autem accidat, ut quis magis contemplationi deditus sit, hic certe rationis, & causæ rerū autor germanus existeret. Sed de multis altercatio partim simplici, absolutaque ratione, partim in meliorē, deteriorem-ue partem exoritur, ut uel in ceteris fieri artibus solet. Verum hic uel propriū quiddam euenit. Commoda enim tractus, quæ aliqui colunt, in uniuersum sapenumero capiunt, cum & interdum ratione agatur utraque: quod tamen sit melius, iudicio nullo discernitur, quasi pro statu aeris culturæ opus proueniat. Nunquid enim orbis uniuersi conditionē, circuitionemque potius, quam plantarū, ac seminum naturā se-qui oportet. Nam cum sæpe illius intemperantia deprauari cogantur, suis tamē hec uiribus partim sustinent, partim repugnant: sicut natura hominum, arte medendi tueri se, atque defendere solet. Ergo altercationes super illas artium cōmunes, his quoque de causis oriuntur. Ceterū multa etiam cōsensu omnium constant, quasi à rebus ipsis fidem sibi acquirerent: alia in uniuersum, alia generationis, agrorum diuisione, ut illico generationis, rationisque ratio mouet. Quæ quidè exponere haudquaquam difficile est.

*Quæ semina committi debeant terræ.*

Caput III

30



Emper enim solo turgenti semina mandare oportet. Sic enim optime germinatio agitur, sicut etiam animalium foetus tum probe conficit, cum uulua libenter semen susceperit. Turgescit solum, cum humectū, atque tepidum est, statumque temperatū aeris obtinet: tunc enim agile, fertile, atque letum consistit. Quod duobus fieri temporibus maxime arborum generi solet: Vere, ac autumno. Et quidè his temporibus arbores magis serimus, sed melius Vere: tunc enim solum humidū est, & sol tepefaciens elicit germen, & cœlum placidum, atque roscidum constat, ita ut ex his omnibus educatio, & germinatio prospere sequi possit. Habet tamen & autumnus naturæ confusionem quandam eiusmodi, quocirca germina eo quoque tempore proflire posse retulimus. Qui tem-  
pus hoc magis, quam uernum commendant, rationem assignant, quod solo adhuc tepido, plantæ melius radices concipiant. Initium autem ualidius semper antecessisse oporteat, à quo cæterorum omnium ortus, atque in totum uis uitalis producitur. Quamobrem germinationem ineunte Vere, probe uniuersimque acuitari existimant, quod iam humus temperiem sentire, atque intumescere cœperit: at Vere gelido adhuc solo (nondum enim hyemis algorem esse decussum) plantis depositis radices frigere prauēque germinare. Ideoque autumno ferendum potius omnia iu-  
bent, quæ scilicet germen possint educere. Sunt enim quæ nequeat, ut pirus, & mālus, & ex toto, quæ gracilentæ, lignosæque sunt: quippe cum sicca natura consistant, hyemēque

40

hyememq; ob debilitatem sufferre non ualeant. Item plantam autumnalem grauidam esse, iamq; ad pariendum propensam, uernam non pridem concipere incepisse. Itaq; alteri, quæ nuper conceperit, euenire, ut cæca ex germinibus p.eraq; pariat alteram uero, quæ diu in aluo gestauerit, incolumes, opimosq; eiudere partus. Has ferè rationes, & eiusmodi alias referunt.

*Quod satio uerna præfertur autumnali. Item secundum locorum naturam, sationum tempora esse custodienda.* Caput IIII



Aeterum (ut antè iam diximus) satio cõmunior omniũ, uel plurimorum tam fructuũ quàm plantarũ, tempori uerno tribuitur. Enimuero plantæ ipsæ concitatae iam sunt, & aër benignus, & germen ad elicendum idoneus. Omnino tempus id fecundissimũ est, & dies tepidiores, prolixioresq; faciunt, ut celerius germinent. Radicatio uel eo tempore ualenter fieri potest, cum propter impetũ naturalem plantarũ, tum propter humi turgorẽ, atq; etiam aërem iuuantẽ ad educandũ. Sol enim nõ modo quæ super terram extant, sed etiam quæ celantur sub terram uegetiora, melioraq; reddit. Argumentũ, quod radicis auctio aut nulla ulterius, quàm sol tepescere possit, aut deterior agitur. Hyems contrà mox post sationẽ secuta, plerisq; officit corticem em oleæ detrahit, fici succum intestinũ crassat, atq; coagit: & reliquis magna ferè parte causam offensæ aliquã infert. Sed hæc forsitan ille excludet, qui satum autumnalem asserit meliorẽ, ipsq; dicet esse cõmodiorem, quæ frigora sustinere possint. Verum cum hæc plura possunt argumẽta à natura ipsa deduci, tum quod arbores ipsæ uera no tempore ad germinandũ potissimò excitentur, tum quod satius eiusdem temporis cõmunior sit, nõ dubitem naturalius per uer conferri affirmare. Nam & ubi per ortum caniculæ, statimq; Etesiarũ arbores germinant sua germina, fructumq; pariunt, tunc porro consitiones sibi aguntur, utpote, cum multo melius sit cœli habitũ, & plantarũ naturalem impetũ obseruari. Sed fortè impetus quoq; ille ratione aëris circumfusi efficitur. Vbi uero imbres per æstatem crebrescunt, ut in Aethiopia & India, uel ut in Aegypto, cum Nilus restagnat, illic paulò ante imbres, aut post satũ conuenire consentaneũ est: tunc enim aëris consistit temperies. Necnõ & loca ipsa suæ ratione naturæ diuidi, atq; diuersis temporibus tribui licet, ut temperata Vere melius conferunt: diluta, & pluuia, & palustria, æstate sub ortũ syderis: sicut multa in agro Laconico serere solent sitientia & squalida autumnò. Sic enim fiet, ut cum hyeme telluris ima calida, summa frigida sint, uis augendi conclusa in profundo radices nimirũ subeat: quo aut amplius, ualidiusq; fuerit radicatũ, eo copiosius germen profiliet. Et de temporibus consitioni accommodandis satis dictum iam est.

*De scrobibus faciendis: quodq; per austrum melius fertur.*

Caput V



Vm autem solum humectum, ac facile peruium radicibus esse oporteat, ut longæ, crassæ, robustaq; fiant, idcirco scrobes longo tempore antè defodere decet, & maxime anno prius, quàm plantas terræ committas, ut humus solem, niuemq; tempore utroque combibat: hunc enim in modum soluta, suspensaq; redditur. Nonnulli tempus decernunt ab æstiuis solstitijs ad Arcturum: tunc enim solum tam extra, quàm in scrobibus diffundi maxime uolunt, nec quicquam penitus procreari. Conferunt autumno post Vergiliarum occasum, ubi imbrem obtinuerunt, ut solum humefactum possit alimenta præstare. Scrobes non protinus replent, ut prius partes infimæ seminis confibrentur, alioqui uires ad superiora feruntur. Alit enim, & auget omnia solis aërisq; potestas: sed cum alia in profundũ radices agant, alia per summa



ma terræ dispergant, idcirco scrobes non pari altitudine faciunt hīs, quæ in summo coherant, ceu oleæ, fico: sed quantum natura exigit, subministrant: lapides subijciunt, ut plantæ & per hyemem humore perfrui, & per æstatem possint refrigerari. Enimuero contra utrunq; tempus ita præparasse oportet, ut lapides humorem contineant, & æstate radicibus calorē propulsent. Alij sarmenta substernunt, alij uas fictile plenū aquæ apponunt, alij lignū infodiunt satis crassum, quod postea ex-  
trahunt, ut nunq; alimenti copia desit, ex humoris confluxu solo assidue humescen-  
te. Deniq; obtinendū est, ut tam ad imbres, quā ad solem, & aërem modicē actum sit: ijs enim ipsis alimenta, atq; incrementa proficiuntur. Sed cum solum flatibus  
aquilonijs cōcrescat, atq; siccescat: austrinis contrā labescat, atq; humescat, plantaq;  
pari ratione humidior, siccior ue seipsa reddatur, hac de causā melius per austrū feri-  
tur. Radicatur enim, germinaturq; celerius, cum planta turgens creditur solo tur-  
genti, cœlumq; adeo emollitū, atq; benignū. Quod enim in frugem bonam sit eua-  
surum, simul parte inferna, supernaq; citet germina, opus est. Aquilone autē aduer-  
sa omnia ueniunt: frigent etenim plantæ, atq; laborant: & solo gelato, neq; radicē eque  
demittere, neq; germen ædere possunt. Igitur obseruatio talis cœlo reddenda est.

De habitu plantarum quæ ferantur.

Caput VI



Emina uero ab arboribus nouis, aut certe uigentibus petere decet. Et  
omīno danda opera est, ut nitidissima, rectissima, atq; laudatissima sint. 20  
Enimuero quæ eiusmodi sunt, apprehendunt, conualescuntq; præci-  
pue cum iuuenilitate sint, & corpore pleno consent, melius germi-  
nant. Quod enim leue ac nitidū est, tanq; incolume, inoffensumq; con-  
stat. Contrā scaberrū, atq; nodatū, præsertim cæcis & euanidis nodis, quasi incolumi-  
tate orbatum est. Et quanq; sanos habeat nodos, quod tamen ædiderit, exile est, præ-  
terq; ea, quæ nodo crebro sponte suæ naturæ consistunt, ut palmites. Hinc enim &  
apud arbores ipsas uiuadices pleriq; faciunt. Alij thaleam ramis abscidunt, ne ui-  
res ad excitandū germen absumant. Ad hæc leuitas, rectitudoq; seminis meatū fa-  
cilem, expeditumq; præbet alimento fluenti, ut incrementa sequi possint celeriter.  
Recte illud quoq; animaduersum est, ut ex simili solo, aut nō deteriori, semen acci-  
piatur. Alterū enim mutationē nullam efficiet, alterū melius educabit. Quippe mu-  
ratio imbecilli cuiq; magna causa est. Imbecille autē semen est. Hac enim de causā si-  
tus quoq; eosdem seminibus reddunt, aquilonis spectatu, uel austrī, uel ortus, uel  
occasus: utq; apud parentes spectabant, ita seruandū censent, quā maxime possint,  
quod nihil naturæ, morisq; soliti immutetur: quasi mutationē pati minime ualeant.  
Nam & loca eisdem de causis perq; similia quaritant, & uiuadices ferentes terræ  
cōmittunt. Sic enim ualidiora, & quasi iam uitam adepta reddunt, & plantas radi-  
ce aliqua fibratas potissimō perunt: quod si minus consequi possint, à parte inferiori  
re arboris, potius quā à superiore accipiunt. Hæc enim uiuaciora intelligunt, ex-  
cepta uite, ac fico, & quicquid humidū sit, quemadmodū diximus. Quippe humida  
parte superiore melius germinant. Cætera ob siccitatem, tenuitatemq; sui corticis,  
aut nullatenus germināt, aut certe deterius. Quæ autē suffulta sunt fibris, quasi præ-  
conditā partem naturæ aliquā gerunt, qua uti protinus possunt, quēadmodum ui-  
uadices: quapropter recte præcipiunt, qui plantas eiusmodi deponi erectas cen-  
sent, nec aliqua parte subtracita: sicut illæ ferendæ sunt, quæ radice penitus carent,  
scilicet ut radix proueniat. Fit enim ut in obliquum depositis, radiculæ primæ are-  
scant. Stulte autem quæret alias, qui ultro quas habeat amiserit. Recte etiam plan-  
tam non multo excedere terra præcipiunt. Difficiliter etenim augescit, cum pars  
quæ laborat, amplior illa est, quæ terræ immersa nutritur: pleraq; etiam exarescūt,  
ut ficus,

ut ficus, & quicquid solutum. Tum etiam pabulum summatim magis ad germina procreanda deducitur, cum supra terram paululum extat: quod præcis quoque arboribus euenit: quippe quæ radice tenus maxime præcisæ sint, celerius redeunt, quam quæ alte à terra fuerint detruncatæ. Licet hoc idem uel in plantis uitium peruidere, & quicquid amputari in consuetudine desideret. Oleæ, ac myrti, & ad summam omnium, quæ ampliorē magnitudinē capiunt, plagas alleuatas contegunt, ne intrudatur sol, aut imber. Nam si id acciderit, morbi contrahendi periculum imminet. Circumlinunt alij luto tantum, alij scilla subdita lutum superimponunt, & testam adijciunt. Scilla enim plantam uiridem seruat: lutum scillam, testa lutum tuetur.

De usu stercore in consuetudine. Tum serbes soli uarietate diuersas  
esse oportere. Caput VII



Tercus, quod agrum & solutum, & tepidum reddat, quibus ambabus rationibus fertilitas profectio exoritur, certum est. Sed de usu ambigitur, nec eadem norma omnes utuntur: sed alij protinus terræ permittunt, plantæ aggregant: alij inter terræ superiorem atque inferiorem, medium disponunt. Hinc enim sursum ferri existimant, cum imber incesserit, atque ita succum commendabilem reddit: superne autem sole siccescere, nec imbrem partes imas posse attingere. Illud tamen consensu omnium constat, stercore non acri, & uehemente, sed leui, ac facili esse utendum. Quamobrem ruminantium præcipue sterco capiant. Quod enim acerbum, ac uehemens est, nimium calefacit, & interdum etiam exiccat. Agri quoque uniuscuiusque naturam decet animaduertere, ut cura suscipiat conueniens: uide licet si quis solo aestuoso ferat, serbes aqua nudius tertius debet implere, cumque totam imberberint, serere: ut terra facta humectior amplius comprehendat, meliusque radices eliciat. Si uero salsus, arenosusque seris, lapides circa stolonem plantæ dispones, terraque accumulabis, ut salugo admitti nequeat. Lutat & dulcem arenam aggerasse, & calculos ab amne, aut faucibus torrentis petitos, iniectisse. Nam ea quoque propulsant, & simul uim quandam efficiunt utilem. Sin autem locis uliginosis, aquosisque obserendum sit, fossas facies, alias obliquas quæ aquam recipiant, alias rectas: & lapidibus implebis, & terra, quo sarculum tangere nequeant: tum arenam, & terram inspicies. Hæc etenim omnia plurimum iuuant. Fossæ namque oblique recipientes humorem, solum siccius reddunt, & erectæ illæ lapidibus sua infima parte refertæ confluentem excipiunt. Quod si in eiusmodi solo lapides insint, elapidandum non est. Iam enim quod uiuet, nature opera adest. Denique quacumque fodiens lapides, aut glaream, aut arenam, aut terrenum uitiatum comperies, non commiscuisse, ne uel disgregasse terram eiusmodi remedium nullum est, sed eatenus serbe, uel fossa altiore perducta, glaream atque sabulum subferni oportet. Enim uero lapis si latus, atque perpetuus sit, arbori est noxæ: sin rotundus, minutusque subijciat, refrigerat, & aquam transmittit, & locum radicibus peruium præstat. Omnino quidem nullum elapidandum existimat solum ex tenui terra. Lapidem enim hyeme tepescere, æstate refrigerare posse affirmat. Pari ratione pro cæteris quoque agri differentiis, quæ prosint, accipies. Etenim (ut ex toto loquar) nullo inferius, sed omnium summum est, nosse quid quoque agro serendum sit: nec simplici ratione tantum, sed etiam in ipso continuo rure, cum partes singulæ inter se dispares, incomptæque constent. Ut enim sæpe retulimus, solum conueniens, plurimum & in comprehendendo, & in fructificando potest: quod cum in uniuersis generibus, tum in ipsis, quæ eandem speciem gerunt, licet percipere. Exempli gratia: ficus quoad dici simplicius potest, loca sitientia concupiscit: humida enim fructum putrefaciunt, aut non bene maturant, cum fructus etiam ipse humidus sit. Cæterum, quæ exigat ad aquam, ceu laconica, rigua querit. Pari modo &

uites, quæ solidæ, spissæq; sint ( ut antè iam diximus ) loca montuosa potius amant; solutæ uero ac humidæ, planis gaudent. Alimentū enim utræq; suæ naturæ modicè ita capere possunt, alteræ plus, alteræ minus. Ad summā, arbores melius in imis montiū fructificare putantur; argumētoq; generatio spontanea est. Vbi enim sponte natura ipsa progeneret, locū illic esse aptissimū creditur. Verum singulorū differentias potissimas esse nihil dubiū est. Imā enim montiū, multa & uaria sunt, atq; in totū quasi una differentia ista exultat imi summiq; ratione, cum aliæ permultæ, maioresq; sint, ut inter historias exposuimus. Ergo solum pratenſe, ac humidū, uitis esse habile plures fermè consentiunt: sicut solidum, & sitiens, oleis ac ficis. Vites em̄ alimentum humidius, molliusq; desiderant: oleæ uero, & fici, siccius, atq; calloſius. Ad summā, quæ sicca sunt, siccum quæritant agrum: quæ humida, humidū. Verū ( ut simplicius asseram ) ager omnibus optimus, qui solutus, leuis, humefactusq; est: hic enim ad alendū, & ad augendū præcipuus. Excipe tamen illa, quæ uiriū soliditate adeo copiam largam capiant alimentū, ut in luxuriā proruant, ceu amygdala. Huic enim gracile, serēnū, atq; apricū, longe cōmodius est. Contrā nuci enboicæ, opacum atq; roſcidum conueniūt. Necnon & ad flatus loca situm cōmode obtinere nō parum prodesse animaduertimus, quāobrem id quoq; considerandū est. Prorsus omnia locum spiritus placidi quæruunt: etenim alimenta locis eiufmodi meliora, fructusq; maturiores præbentur. Ventosum & inquietū nulla penē arbor urbana persequitur. Paruæ nanq; detortæ, exiguæq; proueniūt ex flatuū icū. Quibusdam etiam syluestribus, locus eiufmodi nocet. Fructus enim suos perficere nequeunt, sicut de nuce quoq; euboica narrant ad florem usq; tantūmodo proficisci, cum illæ, quæ locis tranquillis stant, ampla incremēta suscipere, fœcū dissimæq; euadere possint. Omnino enim ( quod sæpenumero diximus ) temperiem suæ naturæ conuenientem, omnia desiderare uidentur: pariter in cæteris rebus, & in mutationibus aëris. Sed de hoc generale, communeq; est.

De interualis plantarum.

Caput VIII

**I**Nterualla aut plantarū, quas seris, nō tam ratione loci, quā eorū quæ cōferenda acceperis, statui debent. Quippe animaduertendū, quæ umbras ament, quæ nō amēt: quæ radicem longā deducant, quæ breui niant. Altera em̄ amplo interuallo serenda sunt, altera breui. Umbras adamant, quibus fructus siccissimi, nucleosiq; sunt, ceu punicæ atque myrti: quæq; suapte natura soluta, sicca, atq; breuiſtūpia sunt, ut laurus. Horū etem̄ fructus soli expositus acerbus efficitur. Hæc propter suam infirmitatē quasi protectum desiderat, quo se à frigore, æstuq; possint defendere. Nullus enim mutuus radicum decursus, nullus implexus, rixatus uē improbus infestat, cum breuem agant radicem. Quidā amplo interuallo conseri omnia iubent, ne radices serpent inter sese, ne uē pabuli, flatusq; penuria minus augescere ualeant. Hi tamē haud recte præcipiunt, sed discernere decet, quēadmodū superius diximus. Quin & ratione locorum interualla dedisse non dedecet: locis etenim montuosis breuiora, quā planis sunt relinquenda. Montibus enim minus radices comæq; augescunt.

Plantam, dum prima fundit germina, non tangendam. De educatione, &amp; purificatione plantarum. De uicē amputanda.

Caput IX

**L**antam unamquāq; dum prima germina fundit, patere intactam manere, ut radicem libere capiat: nec quicq; mouere uelis, ut in uitis obseruatur: cum uero tenuerit, conualueritq; amputabis superiora, & quæ optima & aptissima sunt, tantū relinques. Sic enim arbores tractari necesse est: quanq; in cæteris detrahi, refecariq; impune omnia possint: quippe

quippe si plantam priusquam radiceatur, amputes atque sollicites, uehementer lae-  
detur, utpote adhuc imbecillis. Sed si cum radices utresq; ceperit, neq; offensa ulla  
sequetur, & plus alimenti ad ea quæ reliqueris, transducetur. Educatio uero & (ut  
uulgò dicitur) eruditio plantarum tanquam figuratio & formatio arborum est, alit,  
submissi, lati, reliquorumq; ratione. Omnia ferè quæ se in altum extollunt, compe-  
scenda agricolæ censent, præterquam illa quæ apta sint excelsa consistere, ceu pal-  
ma, pinus, cupressus. Minus enim fecunda redduntur, cum alimentum per lon-  
ginquum transeat spacium, & priusquam ad fructificandi partem perueniat, absum-  
matur. Sed ut ramis & germinibus scateant, opera danda est. Sic enim non modo  
10 copiose fructificant, sed etiam demeti facilius & omnino tractari commodius pos-  
sunt: quamobrem amputanda prohibendaq; germina illa sunt, quæ intempestiue  
excurrunt. Quæ quidem cultura atque conditio purgationi ferè proxima est, quæ  
perfectis adhibetur arboribus, de qua differere ante debemus, quam de reliquis  
agriculturæ officijs: hæc enim consequi uelut deinceps uidetur. Ergo genus id cu-  
ræ publicum atq; euidentissimū in uitiis est: omnes enim eo utuntur, omnesq;  
uites amputari necessarium arbitrantur, uelut ab ipsa compellatur natura, propter  
uberrimam germinationem. Qua de re quoniam cum de germinatione cæterisq;  
disputaremus, abunde dixerimus, ipsas rationes per se postea contemplari decebit.  
Nunc autem de cæteris differamus. Neque enim in his parum iuuabit scire species  
20 condidisse: quæq; improbe profilierūt, aut quæ fructum impediunt, detraxisse. Im-  
pediunt enim non solum hæc, sed etiam quædā remota, & ea omnino quæ intem-  
pestiue prouenerint, quapropter hæc recidendo uim germinandi reuocare ad ar-  
borem cōuenit. Fit enim ceu deriuatio quædam alimenti plantarum, prout aliquis  
deduxerit: quippe cum ad ea quæ relicta sint, pabulū confluat, eaq; tantū augeat.  
Quod propterea euenit, quia plantæ ipsæ partibus suis solertissime consent, atque  
etiam quotannis incrementū suscipiāt. Nam & si quis superna semper diminuerè  
uelit, cibus ad radices totus feretur, easq; adeò augebit, ut loca radicibus implean-  
tur ac perhorrescāt, demumq; parte superiore arbores augeri nullatenus ualeant,  
cum ima totum alimentum assidue petat. Fit enim ex diutina prauitate, ut talis au-  
30 ctio quasi in naturam uertatur. Vitis igitur semper amputari quotannis requirit, sci-  
licet ex summa facultate augescēdi. Cætera partim annis alternis, partim quadri-  
ennis post. Nihil enim pariter atq; uitis augescere potest. Si quid tamen huiusmodi  
sit, tantundē certe desideret. Recidere partem eius humidū superuacuum est: tum  
etiā uulnus facit, ut arbores languescāt, laborēq;. Quapropter post purgationem  
stercorandū, cultumq; reliquū adhibendū continuò censent, ut se recreare pabulo  
possint. Sed arida detracta tantūmodo debent: hæc enim nec laborē ex aliquo ulcere  
afferunt, & annexa impedimēto alimonix sunt. At in perpurgādo refecanda quæ  
fructū præstare nequeunt, & quæ incremēta cæterorū uetare possint, & quæ inter  
brachia cōstituerint (extrinsecus enim incremēta libere facitari oportet.) Adde quæ  
40 densa inter se sint, quæq; de medijs prouenerint. Hæc etenim omnia cum solem,  
tum flatū auferūt, ubi & perflari placide, & solē sentire cōmode arbores debeant.  
Quamobrem nō improbe illi faciūt, qui arbores ita disponunt, ut meridiē spectent,  
ceus ficos ac cæteras, & præcipue oleas.

Quo tempore arbores reciduntur, purgantur ue.

Caput X



Ed cum perpurgatio laboriosa plagarū causa sit, nō tempore quolibet,  
sed post uergilias perpurgandū, quippe cum arbores ualidissimæ sunt,  
cum humorem ad fructum consumplerint, & nondum alium suscepe-  
rint. Quæ autē in fructificando serotiores sint, has scilicet pro ratione  
purgabis post fructuum decerptionem. Fico peculiare notatur perpurgandū esse

antequam germinet. Ratio, quod ficus eo tempore coagmentari consolidariq; maxime possint: quod quidē obseruandum magnopere est. Quod enim imbecillis solutaq; sit autumno, & circa uergilias maxime laborat, cum ex temporis siccitate fieri unitas nequeat, putrescit imbre admissa, & turbinibus frigoribusq; languescit, atque emoritur. Hoc igitur arboribus imbecilibus atque solutis proprium datur. Recisio uero non pari mensura omnibus fieri solet, sed plus illis reciditur, quæ amplius curā istam desiderant, id est oleæ, punicæ, myrto. Quo enim his pauciora reliqueris, eo melius germinant, fructusq; melius ferunt. Quod propterea fit, quia germina densa inter se, tenuiaq; consistant, atq; celeriter proinde siccantur, ex quo euenit, ut & fruticis speciem arbores istæ omnium maxime gerant. Minus ea recidi desiderant quæ plagis infirmantur, ceu pirus, mālus, & quicquid siccum, & cortice tenui uestitum. Hæc enim ressecia uehementer laborant. Qua de causa manu his auferre præcipiunt, ut retulimus, aut ferro perquam leuissime: periculum nanque interitus propter ulcera imminet. Quemadmodum enim radicibus uulneratis, cum foditur, arbores deteriorescunt, & sæpe agrescunt ac exarescunt: sic etiam uulnere partis superioris noxam eandem his posse adferri credendum est, quæ nequeunt tolerare. Et de purgatione satis sit hæc dixisse.

De ablaqueatione & radicum resectione.

Caput XI



Ablaqueantur autem omnes penē arbores, radicesq; resecantur post consuetudinem, dum nouellæ scilicet sunt, ut alte descendant atque amplius incrementum suscipiant. Sed præcipue illæ quibus radix prima parte terræ natæ soleat, ut oleæ ac uitæ. Aetatem uero grandiores adeptæ cum fuerint, annuas radices, & in uniuersum per summa cepitum adhaerentes resecari par est, ut inferiores plures ac robustiores efficiantur. Has enim illæ uetant atque interimunt, nec alimentum subministrare arboribus queunt: inò uero & ipsæ tam æstu quam frigore uehementer laborant. Aridæ præterea detrahendæ sunt, quippe cum annexæ radicibus cæteris officiant, & uermes in arboribus creent. Reliquas haud quicquam tangi oportet. Neq; enim tam perpurgandæ radices sunt, quam partes superiores: quippe cum plus eas dispoliari damnosum est. Nec percipi potest unde nam deceat auferre: & simul undecunque radix proreperit, modò ualida sit, pabulum suggerere poterit. Sed melius certe si undique prodeat. Longitudo & latitudo quo amplior, eo commodior. Itaque illa tantum parasse oportet, quæ ad alimenti incrementiq; rationem pertineant. De rigatione & aquæ generibus satis ferè ante retulimus. Quantum enim utilitatis in aqua pluuia, uel certis anni temporibus, uel noctu, uel interditi sit, tantundem etiam in fluente, deductaq; erit. Aestate autem aquis fluentibus maxime non sine ratione utuntur, propter pluuiarum inopiam, & simul ad fructus enutriendos necessarium. Sunt tamen qui per id temporis auferendum potissimò censeant. Verum ut in cæteris omnibus, sic & in his mos solitus plurimum ualet, sit enim tanquam natura. Quamobrem quæ locis siccis ac sitientibus manent, nil plus quam quod sibi sit necessarium quarunt, rigatæq; deteriores redduntur, non secus ac illæ, quæ aquam nunquam desiderant. Periculum certe si postquam rigare cœpisti, non aquam crebre adhibeas, nam & pristinam alimoniam facultatem adimes, & nullam afferens aliam committes, ut æstu sæpe arbores exarescere possint. Fructus tamen penē omnium, qui plurimum aquæ capiunt, deteriores redduntur.

De siccis

## De succatione &amp; temporibus stercorandi.

## Caput XII



Empora stercorandi singulis statui pro sua purgatione par est: præsertim si post illam stercus sit continuò disponendum. Tum etiam nec tolerare crebram stercorationem arbores possunt, sed obarescunt uini-  
 10 mij calor. Haud enim eadem stercorandi ratio est quæ in segetibus, locisq; arboribus uacuis: quippe cum in illis stercus dispositum in partes per multas disgregetur, absumaturq; in arbusco radices ipsas subeat, nec uis tota calor possit excurrere. Ita enim calore multiplicato arbor perferuefacta exarescit. Nam triticum perit ex nimio stercore, si non imbres secuti sunt. Quocirca solo  
 20 pluuiò, crebra & largior stercoratio commodior est. Sticulis atque gracilibus modica prodest. Ob id forsitan, & acerrimū stercus minime arboribus conuenit. Atq; absurdum appareat, non id ualidissimis conuenire, quod ualidissimum est. Verum causam illud habet, quod superius diximus. Nam & in olerum genere hac eadem de causa succatio cum aquatione cōmoda est, & in totū quod aquæ usus frequens in eo genere sit, atque id ipsum natura humidum consistit. Nec temere tam copiose rigandum olera censent: hæc enim non fructū, sed folia ferant, contendunt. Cæterum & in arborum genere stercoribus nonnullis ex ualidiorum numero uti consueuerūt, potissimò cum fructus emollire, immutareq; uolunt, ceu suillo, quò putrica dulcescant, & nucleo uacua reddatur, & amygdalæ ex amaris in dulces trans-  
 30 seant. Vtq; myrtis etiam uehementius congerendum præcipiunt, uidelicet spurcitas pellium, urinamq; adhibere, cum germina prosiliuerint: quasi fructus ita reddi sine interiori nucleo possit. Quod quidem aliq; olea quoq; prodesse ad lætè fructificandum existimāt. Porro quod in principio insit, plurimum ualere credendum est. Siquidem & cucumerum semina, lacte mulso ue macerata, dulciorem faciant fructum. Hoc idem uel in cæteris oleribus fieri posse non inepte putaueris, uerum sapor acris illorum usui destinatus forsitan utilior est. Sed de his satis iam antè disseruimus. Stercus autē quod esse utile iudicaueris, semper pro uirium ratione disponere debes, minus scilicet si acre, plus si mollius sit.

Non omne stercus omnibus plantis conuenire.

## Caput XIII



Ecet præterea nosse, quod stercus singulis arboribus commodius sit. Non enim quemadmodum aqua eadem omnibus prodest, ita & stercus: sed ut solum singulis diuersum accommodatur, sic etiam stercus. Nam & pro aratibus discrimen exultat: qua de causa cum serunt, stercus ruminantium statim plantis subiiciunt (ut dictum est) quia leuissimum sit. Quod autē imbecille est, leuissimum profectò desiderat. Omnino in arborum cura quæ omnium communia sint, hæc uel modo, uel genere inter se different: atq; etiā fructuum ratione, ut amputatio, purgatio, fossio, stercoratio. Igitur uiribus uel quadriennio post, uel etiā longiori exacto tempore sumum disponunt. Nanq; si  
 40 citius stercorentur, nequeunt tolerare: nec ad præsidium adaquationis confugiendum est, sicut in arborum genere, cum illa penitus adurantur. Quamobrem (ut dictum est) agro pluuiò magis stercoratio prodest: alioqui periculum imminet, si non imber secutus sit.

De fisione &amp; eius utilitate.

## Caput XIII



Ossio omnibus prodest: tollit enim quæ impediunt uel auferant pabulum, ipsumq; solum humectius atq; suspensius reddit. Ad hæc aer humo permixtus (permisceatur enim necesse est, cum terra agitur) præbet uaporatum quendam humorem, atq; alimonium efficit. Quocirca solum squalidum atque sticulosum, fodere agitareq; sæpe oportet, ut antè iam di-

ximus. Palustribus quoque uliginosisq; fossio prodest: quanquam mirum appareat, solis inter se aduersis curam eandem posse conducere. Verum nihil mirandum id est: alterum enim siccatur, alterum humefacit, scilicet cum utrunq; contrario adiuuari desideret. Alimento autem meliori, uberioriq; cum ipsæ arbores uigent, tum fructus meliores creantur. Nam & nuclei minores, & eorum quæ ligno, crusta ue teguntur, ut amygdalæ, nucis euboicæ, tegmina ista tenuiora, intestina uero ampliora utique fiunt: quippe omnino alimenti copia humefacit, pulpamq; auget fructus. Quas ob res ambobus ratione sic euenit, quod si reliqua quoque adsit cultura, magis magisque ampliores, suauioresq; fructus perficiuntur, quoniam & plus alimenti, & amplior excoctio foret. Cornum (de hoc enim controuersa est) si uere narratur, immodice alimentum suscipit, itaq; minus saporis boni efficitur: quod & alijs fructibus euenit agro præpingui atq; succoso. Fossio hæc omnia subministrat arboribus, atq; in summa plurimum prodest, cum ea tollat quæ succum auferant.

De plantarum societate, item amicitia & inimicitia.

Caput XV



Am & ea quæ uel planta, uel semine iuxta feruntur, hac eadē de causa nocent omnia: & nonnulla etiam omnino interimunt, præterquam illa, quæ loco medellæ adiciantur, ut hordeum plantis uitium quidam interfecerunt, aut aliquid siccum, ut immodicum humorem absumeret. Et brassicis eruum sociant, ut ab erucis defenderentur, & quicquid eiusdem generis sit. Addo etiam quæ mutuo amore coniuncta inter se sunt, ut in arborum genere olea, & myrtus. Has enim mutuo complexu radicum degere Androtion refert, uirgasq; myrti per brachia oleæ prorepere atque dispergi, & fructum oleæ protectum, ut nullam uim solis, flatus ue pateretur, tenerum ac dulcem euadere, sed minorem quam locis soli expositis. Aliud non est quod feri uelit iuxta oleam. Pinus quoq; benigna omnibus propterea esse putatur, quod radice simplici, altaq; sit: feritur enim sub eam & myrtus, & laurus, & alia pleraq;: nec quicquam prohibet radix, quo minus hæc libere auferere ualeant. Ex quo intelligi potest, radicem plus infestare quam umbram: quippe cum pinus umbram amplissimam reddat. Et reliqua quoque paucis, altisq; nitentia radicibus, ad portionem societatem non negant. Necnon & ea quæ non eodem tempore germinant, fructumq; pariunt, copulari facile patiuntur. Hæc enim minimum auferunt alimentum, & tempora germinandi, atque fructificandi diuersa minus infestant. Molestissima tam uitæ, quam cæteris, ficus atque olea. Multum enim attrahunt alimentum, & umbram faciunt amplam. Amygdala quoque damnosa est, quoniam & uires solidas, & radicem habet numerosam. Sunt tamen qui inter uites ferendam censeant, tanquam innoxiam, & cibo mediocri contentam, & simul quod mature fructificet, nec late ad umbret, minime grauem. Sed hi non recte existimant. Umbra enim & fera feracitas non tam infestant, quam uires radicum, ut diximus: rapiunt enim alimentum suo amplo discursu, implexuq; enecant. Omnium facilissimæ, & innocentissimæ, malus & punica sunt, nec enim numerosam agunt radicem, & pabulo tolerabili egent, & citò senescunt, ut diu nequeant infestare. In summa tamen, omnia sua nocent societate: quanquam aliquando eueniat, ut altero ex sociatis euulso, reliquum obarefcere sit necesse. Sic enim uitibus accidisse notatum est, ubi fici maritæ sublatæ fuissent. Causa uero imputanda mutationi eorum est, quæ simul creuerint atq; coalescerint: enim uero tempus longinquum quasi naturam unam ex ambabus confederat. Nam si cum nouellæ adhuc essent, alterutram quis euulsiisset, reliqua non modo non pessum iuisset, uerum etiam auctior, ac melior euassisset. Atque de cæteris arboribus hæcenus.

De uitium cultura, rationeq; &amp; quæ sola uitibus conueniant.

Caput XVI



Uitibus, quæ non cum cæteris habent communia, neque inter primas rationes retulimus, hoc in loco reddemus. Cum igitur & genera uitium, & loca diuersa sint, hoc distinxisse oportet, quod genus cuiq; loco conueniat. Quippe si secundum naturam conseris, proba euadunt: si præter naturam, infœcunda. Naturæ autem rationem similitudine quadam ferè (ut diximus) capiunt. Serunt enim solo sitiænti, & solido uitēs solidas, tam generis nigri, quàm candidi: sed ex toto ferè nigrum solidius est. Solo autem pluuiio solutas committunt. Dignosci densæ, atque solutæ suis possunt medullis, quas in abscessis nouellis palmitibus scrutari oportet. Habet enim quæ soluta est, plus medullæ, quàm ligni, contrà quæ densa, plus ligni, quàm medullæ. Quod utraque solo illi conueniat, his rationibus constat, quibus enim plus inest medullæ, his meatus ampli, multiq; sunt: quibus autem minus, his angusti, & pauci. Quo fit, ut minus alimenti desiderent, quæ denso corpore constant, & simul humorem ad ætatem seruare facile possint. Sol enim ob densitatem haud æque potest educere. Cum igitur tam exigua detractio fiat, radices quàm satis sit ad fructificandum, suppeditant: solutæ autem illæ, cum detractio large accessio parçè ob telluris siccitatem agatur, palmites imbecilles fructusq; imperfectos progenerant. At agro pluuiio genus id conuenientissimum est, utpote, quod copiam alimenti largam desideret: & quamuis multum adimatur humoris, tamen quo sol magis educit, eo uitis plus & in amplitudine proficit, & in fœcunditate. Pabulo enim abundat, idq; exuperat, facilièq; percoquit. Nam & solum pratense uitibus optimum idcirco habetur, quia non modo facile nimisq; pingue, sed etiam humidum fit. Vitis enim plurimam desiderat aquam, eo quod in suo fructu humoris plurimum habeat: & imbribus certe ui sui humoris maxime resistere potest. Sin autem ager neque aridus, neque pluuius sit, sed medium teneat, media conferenda sunt, id est, quæ neque densa sint, neque soluta. Genera igitur singulis agri habitibus apta ita distinguimus.

Quales plantæ uitium serantur: &amp; tempora ferendæ uitis.

Caput XVII



Emina uero quoniam ualidissima esse oportet, idcirco ab agro frigidissimo peti quidam præcipiunt. Densissima enim magis solo etiam gracili comprehendere posse existimant. Qua de causa uiuiradices quoque solo pluuiio deponendas potius quàm cætera semina censent. Radices enim quas illa demiserint imbecilles, humor nimirum putrefacit. Viuiradices uero solidiores sunt, statimq; comprehendunt, ut impune ualeant permanere. Crassitudo plantarum solo pluuiio non inepte decernitur: uitibus enim maxime opus est, quemadmodum diximus. Sed squalenti, neque crassas, neque nimium tenues statuere debes. Alteræ nanque putrescere nequeant: alteræ, id est tenues atque imbecilles, ne priusquam cœperint germinare, exarescant, timendum est. Tempora quoque ferendi non eadem solo utriq; redduntur. Pluuium enim & frigidum paulo ante æquinoctium feri debet, quippe tunc siccissimum atque calidissimum est. Siticulosum & feruidum post solstitium. Id enim quo amplius imbrem senserit, eo melius germen effundet. Reliquis omnibus ad normam eorum temporum moderando, ferendi tempus accommodabis.



De scrobibus uitium: & pari ratione de refecandis uitium plantis, & tem-  
pore huius operis.

Caput XVIII



Vltum præterea terræ exequi pro soli ratione debebis, à scrobibus  
ipsis exorsus, uidelicet in pluuiis. Neque amplas, neque altas facies scro-  
bes, ne multa in eis aqua collecta putrefaciat semina. Hinc enim si ager  
pluuuius admodum sit, paio ferro feritur, nec terram aggerendam an-  
no eodem, neque postero, ut semine maxime humus afficetur. Sin au-  
tem siccum squalentemque colis, contrà agendum scilicet est. Torum enim si fieri  
possit, in scrobes defodere satius est, ut omni ex parte aquam suscipiat, sed si minus  
facere ita possis, foueis altissimis, amplissimisque peractis, terram plantis accumula-  
to, ut minime per æstatem feruescant. Cætera quoque ad hanc normam præpa-  
rasse oportet. Nam (ut simplicius loquar) uerissimum illud est, quod prius retu-  
limus, culturæ scilicet interesse, ut ager humidus siccetur, siccus autem humefiat.  
Quamobrem uerno tempore pastinari perquam altissime iubent, ut spiritus abun-  
de permixtus pabulum præbeat. Quippe (ut sæpe dictum iam est) aer quoque ali-  
mentum præstare potest. Montosis etiam uentosisque locis statuunt, quæ consitioni  
commoda sint. Scrobes enim pro moribus afflatuum præparant, & semina cum  
observatione ponunt eadem, ne aduersa flatibus germinant, frangi etenim ita ne-  
cesse est, ne ue delapsa præter naturam augerentur. Vitis enim cum ex his aliquid  
accedit, deterior proculdubio redditur. Pari modo & reliqua ratione agri decerni  
omnia debent. Vineta hunc in modum singulis locis disponi, & his de causis con-  
uenit. Refecari autem plantas breui relicto palmitate præstat ubique, ut radices ui-  
res, incrementaque capiant. Tum etiam solum magna ex parte ieiunum est, & quod  
alere nequeat, locis montosis & frigidis recisionem etiam uernam cauendam exis-  
timant, frigus etenim exiccat. Tempus tamen putandi ferè idem omnibus statuunt  
sub ipsam scilicet germinationem, ut planta plena humoris protinus exiccet, ut  
germen optime prodeat: quippe putationem istam non fructus, sed germinis gra-  
tia faciunt. Autumnalem uero fructui præparant: qua de causa post Vergiliarum  
occafum continuo illam adoriri oportet: tunc enim uites sibi maxime constant, &  
recisæ minime lachrymant, nec quicquam rumpuntur: quod quidem utrumque  
damnum, retonisæ post solstitium, & fauonijs status nimirum sentiunt, & plantæ  
ipsæ laborant, & gemina extremis exeunt gemmis iuxta cæsuram, quoniam ali-  
mentum partim effluxit, partim in summitate remanserit. Quæ rudi agro disposita  
sint, triennio post refecari par est: quippe cum hæc celerius germinant, quia solum  
nuper colu incepterit, & alacre semina educanda complexum sit. Quæ autem diu  
cultis mandaueris, hæc ferius amputabis. Vitis uero subtrus circum sua crura insti-  
tuenda, formandaque est. Nam si undique leuis, expoliataque sit, melior, fecundiorque  
euadet. Nec difficulter possit ita formari, si quis non eos reliquerit palmites, qui  
perpulchre excurrunt: sed illos qui aptissimi ad formationem destinatam consti-  
terint: quippe singulas gemmas singulis reliquisse abunde. At si nec istud certò fie-  
ri possit, quia scilicet uitis non per eandem tulerit partem, gemmæ prorsus internæ  
tollendæ sunt, ut ad exterius alimentum excurrans, uitæ scindat in brachia. Sem-  
per enim ad partem uiuam atque capacem perfluunt. Quamobrem uitem (ut di-  
ximus) pro uoluntate formare facile est, sed hoc in agro humecto atque frugali.  
Sicco enim, squalentique, palmites qui optime profuerint, reliquisse necessarium.  
Cum enim siccus ieiunusque sit, nunquam alio facile profert. Quapropter factum  
impetum conspectari satius est. Quin & afflatuum ratione rescidisse decet, nec  
præter naturam quicquam est enitendum. Plantas ad hunc modum, hisque de cau-  
sis tractare consueuerunt.



Iubus iam perfectis, primum ac summū falcatio dabitur: quippe cum  
 bene uitis putatur, & germen, & fructum melius affert, & uiuere  
 diutius potest. Secundū, & quodammodo illi proximum, decacumi-  
 natio est: enimuero in hac etiam scire necessarium, quānam reliquis-  
 se, quā uē detraxisse conducat, tam ad fructuum rationem, quā ad  
 totam uitis naturam. Reliqua cultura communior atq; facilior est. Nil tamen tam  
 facile est, ut non sit cum solertia. Omnes quippe uites, culturæ ingenium, modum  
 atq; rationem exposcūt. Differētia uero quam in operibus locorum ratio facit, cum  
 in omnibus constat, tum maxime in falcatione, officioq; putandi est; quam rem  
 prorsus generum agrorumq; ratione conātur discernere. Determinationē autem  
 rebus consummāt duabus, agrorum statu, & breuitate, longitudine uē recisionis.  
 Quæ enim ad institutionem, totamq; recisionem uitium pertinent, eadem facitari  
 ubiq; certum est. Quidam de generibus, agroq; simili idem ferme determinarunt,  
 uidelicet locis æstiuosis, & siccis, & genus eiusmodi uitium refecari ad breuem pal-  
 mitem, fœcūdiores enim reddūtur, quia uberius alere possint. Contrā ad longum,  
 locis aduersis, genusq; aduersum, ut humidis atq; succosis, & uites, quæ tali habitu  
 constent: nam & natura humidæ sunt, & summa potius parte fructificant. Alij in  
 uniuersum de omnibus statuunt, non agri ratione, sed generum, qualitarumq; in-  
 bentq; obseruari medullam (ut dictum est) in abscissis nouellis palmitibus. Nam si  
 multum medullæ habeant, multos, breuesq; palmites relinqui oportet, ut uitis bre-  
 uitate alere possit, multitudine large fructificet. Sin autē parum medullæ, multum  
 palmitis anniculi gerant, pauciores quidē, sed longiores palmites relinquendi sunt,  
 eoq; longiores ubiq; quo minus inest medullæ. Igitur in uniuersum refecandi mo-  
 dum ita determinant. Mensura autem palmitum semper ad rationem medullæ ita  
 capi omnino debet, ut palmiti amplectenti, medulla in latitudine respōdeat. Cum  
 enim uitis pariter ad suum habitum conseruandum, & ad fructum ferendum re-  
 ciditur, nullus dubitat, quin & diu uiuere possit, & fructu ualeat semper. Prorsus  
 si medulla partem maiorem cæsuræ occupet, fructus uberes, palmites imbecilles  
 creari, propter alimenti tenuitatem existimant. Contrā si palmes recisus solidus sit,  
 & iuuenili robore constet, parum fructus à parua medulla. Creari enim uiam à  
 medulla, & palmitem à palmitē amplectente medullam, argumētūq; uitē ipsam  
 potissimū esse. Germīna enim omnia, quæ nouellæ annotinis protulerint brachijs,  
 fructu carere propter exiguitatē medullæ, & nouellas minus fructificare quā ue-  
 teres, scilicet eadē de causa, cum carnē, & uinaceum medulla progeneret. Sed hoc  
 minus uerum apparet, siquidē medulla detracta caro creetur: uinaceti nequeat ge-  
 nerari, nisi fortē intima parte medulla detracta sic fiat, necesse sit. Sed de hoc aliās.  
 An autē omnino quæ medullam habeant ampliōrē, fructus meliores, uberioresq;  
 præstent: nihil ad præsentē referat disputationē. Publicam omniū amputationem  
 hanc esse autumant. Quæ autem palmites large, fructum parce producunt, his po-  
 stremos palmites relinqui longissimos uolūt: breues autē illos qui aduersum ipsum  
 caudicem extent, ut à breuibus uitis augetere possit, à postremis longissimis illis co-  
 piose fructificet, utpote à larga medulla. Cum autē germinant, omnia quæ fructu  
 carent, detrahi cēsent: quæ fructum gestant, dimittantur, cum uua floret: ut nec uitis  
 ad abscisum palmitem incrementum compellat, & quantum alimenti superfit, in  
 eadem parte coactum, uuam augeat. Semper enim ex recisione quærēdum id est,  
 ut & uitis conualescat, & fructus copia cōsequatur. Hæc igitur generalis quædam  
 atque communis omnium est.



Empus autē amputandi, alij locis tantummodo diuidunt, alij genera etiam tangunt. lubēt mature illas recidere, quæ in solo sicco & calido, cum primò sua demittere folia cessauere: quæ in frigido atq; pluuio positæ sunt, has paulò ante germinationem: quippe quæ in solo sunt sitiente, humorem suum seruâtes, ipsæ meliorescunt, & fructum uini suauioris progenerant: quæ uero in frigido sunt, emissio humore, nec ipso deteriores quicquam redduntur, & fructus fit incorruptior, & uini suauioris efficiens. Medium autē ac temperatum obtinentibus agrum, mediū tempus statuitur. Sed non desunt qui mature omnes amputari præcipiant (ut dictum iam est) quod palmites 10 crassiores iam efficiantur, & nulli oculi obrundantur, & si tempus serenum obtin-gat, plagæ siccantur. Quæ omnia plurimū profunt: hyberno etenim tempore gem-mæ pereunt frigore magna ex parte, & plagæ uis siccæ rumpuntur. Vere au-tem lachryma effluit, & permulti oculi excæcantur. Atqui nō his de causis festinan-dum quidam existimāt, sed ut uitis statim post uindemiam fructū ferat secundum. Simul enim binos fructus posse gestari denegant. Sed hi minime recte id asserunt. Fructus enim per æstatem conficitur, cum copîa adest humoris: quippe cum hac ra-tione generationem agi necesse sit. Argumentum, quod si quis hybernas uineas principio æstatis confoderit, palmites ex nimietate humoris, crebra gemma proue-nient: quod ipsa profectio folio efficit, quia nimirum implet, ut uis solis feruefaciēs 20 condensare, atq; ita gēmas reddere crebriores, uuasq; numerosiores elicere ualeat. Qui tamen ista præcipiunt, secus rationes assignant, quippe gracili, feruentiq; solo colendum mature autumant, ut humor ad maxime opportunos palmites ueniat, alimentumq; proinde per æstatem superfit. Quæ autē in solo humido positæ sunt, quæ uē in luxuriā prorepere solent, has recidi uerno tempore oportere, ut humor diffusio leuata plaga effluat tempestiue. Luxuriantur enim ex nimio humore, quem excoquere nequeunt, atq; sarmentis syluescunt. His dum plantæ sunt, hor-deum, fabasq; interfere placet, quoniam hæc exiccare omnium præcipue possit. Causæ, quas reddunt, hæc ferè sunt. Sed & ad agros, & ad mensuram refecandi, omnium diligentissima distinctio illa est, quæ utrorumq; ratione, id est agrorum ac 30 generum redditur. Sunt enim quæ fructum parere nequeant, etiam si recidantur ad breue, sed tamen ad germinandum contendunt, ut quæ aphytæa uocatur. Et apud Acanthum uero ad quatuor gemmas reciditur. Quibus autem palmites lon-gi relictū sint, celeriter ex fructuum largitate senescunt. Nouellas itaq; refecari ad breue perutile est, ut etiam radices melius cōcipere ualeant. Et de falcatione uitium hinc dabitur contemplandi facultas.

De uitibus decacuminandis, & quando germinent uitæ, & quousq;.

Caput XXI



Vic proxima cura, ac uelut secundum obtinens locum, decacuminat- 40 tio est. Quamobrem mox eam iustum est aggredi, decacuminareq; cum fructus incipit prouenire. Mox uinea confodienda profectio est: tunc enim fructus nouus, & recens æditum germen, sarculum tem-pestiue recipiunt, cum maxime augeri contendunt. Post hæc iterum decacuminandum antequam florere incipiant. Interim enim pendula racemū au-gescere solet, quia nondum acina constiterant: post ubi defloruerint, uua pendula iam constitit, acina consistere atque augeri incipiunt. Omnino decacuminatio ac folio, media tempestiue omnium maxime operum reddi exposcunt. Tunc enim 50 uitis augeat fructum, & germina, quibus anni posterioris fructum inchoare, scetifi-careq;

careq; incipit. Quod si fodiendi cura non omittatur, bene quæ tulerit, auget, & fructus futuri primordia bene concipit. Germinat uitis ad ortum usq; caniculæ. Cum autem hæc oriri incipit, cessat, quæ fructum futurum probe sit cõceptura. Quippe sole feruefaciente, summa pars germinū obdurefcit, atq; ita cessat auctio: quo factio germinis humorem consistere, fructumq; ex eo creari, naturæ lex est. Quæ tamen locis opacis, uel humidis manent, solem tolerant, & plus temporis augetcere possunt. Prorsus & distractio, & mutilatio certum tempus sibi deposcunt: sed id non æque obscurum, neq; difficile cognitu est.

De puluere uitibus excitando: & cur agricolæ ad uites sale utantur:

Tum de palma.

Caput XXII



10 **P**lueris excitationem primis temporibus, cum nigrescere uiræ incipiunt, damnnari, quousq; ad maturitatem perueniant, ratio est. Motus etenim percoquendi, motu altero auocatur, uetaturq;: quia de causa neherbam euellendam per id temporis censent. At omnino inutilis, noxiamq; putari, nulla ratio est. Vfus enim, & quod in alijs fieri solet, utilem esse planè confirmant. Cucumeres nanque puluere occultati, nutriti tenerioresq; reddi creduntur. Quamobrem Megarenses ita eos tractare consueverunt. Sed mirum uidetur, quod puluis qui tam siccus est, alere queat. Ratio tamen  
 20 esse in pluribus possit. Nam & quia citata humo, uaporati cuiusdam aeris alimentum reddatur, ut de solo uaporoso retulimus: & quia fructus obiectus puluere defendatur à solis feruore: & quia leuiter molliterq; siccens, amplius à uite pabulum attrahere possit. Quippe hæc omnia cum ad copiam alimentum, tum ad facultatem coquendi nimirum adiuuant: quapropter folijs quoque fructum integere solent. Cum itaque tegmine, & aqua quoad satis sit potiatur, lati, teneriq; ut debent, redduntur. Et de uitis dictum satis iam sit. Omnium autem maxime res peculiaris inter curas agricultorum sal esse uidetur, quod radicibus palmarum accumulatur. Nam & ad germinandum & fructificandū perutilis est. Medicandi enim tutandiq; ratione si eiusmodi quicquam adhibeatur, minime mirum, ut cinis fico, & rutæ: fa-  
 30 cit etenim siccitate sua, ut radices neq; uermem, neq; putredinem sentiant. De sale uero aut falsugine, quam adhibere consueuerunt (alijs enim falsugine, alijs sale utuntur) simplex ratio reddi potest, quod palmæ loca falsa plurimum concupiscunt: & argumentum, quod ubi palmarum copia est, solum tale spectatur, ut in Africa, Syria, atq; alijs tractibus. Quo fit, ut ubi falsugo nō sit, ope proxima salis subueniant. Verum hæc ratio communi utiq; iure dici de omnibus potest, quæ loca quarunt diuersa, initio à primis, summisq; generibus sumpto, ut aquatilibus, terrestribus, differētijsq; eorum. Singulis enim loca aptissima naturam dedisse certum est, ut & animalibus: quippe quæstio & ratio eadem est. Caterum si quid de his quoq; proprium exponendum sit, in solo atq; radicibus querenda causa est. Hæc enim qua-  
 40 litate quadam ex sale afficiuntur. Enimvero solum leue, solumq; redditur, radices uegetiores, crassioresq; fiunt: quippe cum plus pabuli trahant quibusdam partefactis mearibus: atq; etiā causa refrigerationis, quod sterus propter suū calorem efficere minime potest. Palma enim quantq; aërem circumfusum calidum quærat, ut fructus maturefcere possit, tamen radicibus refrigerari ob siccitatem desiderat, quod sal subministrat. Quamobrem apud Babylonios salis usus, non stercoreis est. Causam uero, qua sal palmæ tantummodo prodest, naturæ proprietati imputari par est. Materies enim radicesq; eius arboris plurimum à cæteris distant: quapropter sale remorsæ, alimentum uberius trahunt, quò & sibi satisfacere, & arborem totam augere facile possint.



Acit etiam cultus terræ, ut omnium radices ualidiores reddantur. Hinc enim nonnulla ex syluestrium numero in urbanum habitum transeunt. Et sterces quoque uehementissimum hoc idem potest efficere, ut feces pellicum, & urina: quod stercorendi genus myrtis statuitur. Huiusmodi quippe sterces subire arborem longe amplius potest. Nec non & arborum cæterarum radices remorderi desiderat, ut etiam in punice patet: (nam his quoque urinam infundunt, & pellicum feces accumulunt) non tamen pariter atque myrti, sed minus. Humida tamen carnosæque remorderi, & sic infarci minime cupiunt. Omnino mutationes arborum culturæ ratione exultant, ut ex acutis amaris ue transeant in dulces, ceu punice atque amygdalæ, & quicquid per alterationem suarum radicum natum sit immutari: quippe amygdala triennio post immutatur. Cultum enim per tantum temporis adhiberi par est. Radices punice plus etiam temporis persistunt. Fructus mutatio cum amplius alimentum percipitur, ratione consequitur. Coquitur alimentum perfectius cum radix qualitate quam quandam coeperit. Ad summam (ut etiam ante dictum de seminibus est) per moto, immutatoque principio, cætera quoque atque uniuersam naturæ conditionem permutari necesse est. Alimentum autem mouet atque immutat, si diutius ueniat. Nam & aqua feruenti cum quædam rigantur, meliorescunt, ut malus uerna, & myrtus. Hæc enim sine nucleo redditur, ut quidam affirmant. Deprehensum id est fortuito, cum myrtus iuxta balneum staret neglecta. Ab hac enim uacua nucleo reddita semina petentes serebant: atque ita genus huiusmodi Athenis esse inceperat. Sed hæc quoniam similitudinis aliquid proferunt, ad fidem rei propositæ faciendam retulimus. Aquæ autem falsæ quibusdam quoque oleribus congruunt. Et qua de causa nitro in nonnullis utuntur, expositum in primis rationibus est. Quamobrem hoc etiam utpote cõueniens, admittendum: his etenim ipsis atque alimento eorum quoque dulcedinem effici certum est. Verum hæc succo constant amaro. Palmis acerbitas inest, quam protinus salis uis à primis initijs tollit. Et de cæteris satis dictum est. Fructum autem perdurare in palma semina nunquam posse, nisi florem maris cum puluere super eam concusserint (ita enim quidam confirmant) peculiare profectò est: sed simile caprificationi ficorum, qua fructus perficitur. Ergo feminam minus ad perficiendum sibi sufficere aliquis potissimò diceret: sed hoc non in uno genere aut duobus, sed uel in omnibus, uel in pluribus constare deberet, naturam etenim generis ita iudicamus. Et in his tamen ipsis paucis generibus mirum, quod palmæ nulla ratio dari possit, cum caprificationis causa conspiciua esse putetur. Sed de his satis. Cæterorum peculiaria causas habent conspiciuas. Amygdalam enim dum fructum parit, neque rigandam, neque stercorendam, neque purgandam, præterquam aridis, neque ulla cura tractandam existimant: ne plus æquo ualidior reddita, fructum in flore amittat. Quamobrem agrum quoque minus frugalem quærere assolent: & si post hæc fructum parere non possit, radices resossas respoliatasque, hybernis frigoribus tradunt: & reliqua puniendi genera quæ retulimus, afferunt. Proxime illas quoque tractare consueuerunt, quibus cortex sponte detrahatur, ut uitem, iuniperum, tiliam, omnino eas quibus cortex disrumpitur. In his enim natura ipsa rem quæ cõmoda sit, uidetur ostendere, cum corticem disgreget, & tanquam alienum reiiciat. Damnosum autem est, omne alienum, sicut etiam quod aridum est. Et de sale hoc idem uero animaduertere licet, ubi proprietas aliqua sit ad naturam accommodata. Et de arboribus hinc ratio contemplandi sumenda est.



Is coronarium, & omnino suffruticeū, & ferme olerum genus respondent: quandoquidē uel in his alia omnium communia sunt, ceu rigatio, stercoreatio, sarritio: alia propria generatim habētur, ut purgatio in coronarijs pariter atq̃ oleribus, quippe serpyllum obarescit, nisi purgetur, & sisymbriū, & cætera. Rosas non solū præcidūt, uerumetiam adurunt: desinūt enim florere, syluescuntq̃ pastus fecunditate, nisi ita tractentur. Et brassica & ruta durescunt & exarescunt, sed dimutilatæ & in ramos dispersæ, ampliores, meliores, sapidiore redduntur. Enim uero germinatio diffusa, tam sa-  
 10 poris quā odoris acorem nimium tollit: quippe suauitas & temperantia in mediocritate consistit. At in olerum genere usus detractionis nullus est, præterquam in ijs quæ retonsa meliorescunt, ceu porrum: uel ex ijs aliquid quæ numerofo germine ampliuntur. Euulsio uero illorū quæ apposita sint, uel ipsorum congenerum cum densa inter se sunt, uelut purgatio proculdubio est, ut reliquis plus alimenti, incrementiq̃ acquiratur. Sunt nonnullis peculiaria, ut de ruta prædictum est, utq̃ in alijs patet: sed pauciora hæc sunt, & ferme conspicua.

De cultu segetum: quemadmodum agitare solum oporteat: de ratione sementis faciendæ:

quosdam agros communem curam negligere: arationem bonam caput esse in

agro colendo: tum de cura noualium.

Caput XXV



20 Eliquum & quasi arborum curæ obiectum, cultura segetum est, qua in parte agitatio soli præcipitur, & tempus sementis, & sarritio adhibenda possit fatum. Sed ante hæc uel etiā simul agrum cuiq̃ accommo-  
 dandum nosse oportet, ut etiam in arborum genere. Quin & in tra-  
 ctatione soli non desunt, quæ iudicium agricolæ prudētis desiderant, ut si aliud per æstatem potius, aliud per hyemem, uel confodiendum, uel relin-  
 quendum, uel aliquo modo tractandum sit. Quæ nonnulli discernunt: quippe so-  
 lum pluuium, solidum, ponderosum, & pingue, per æstatem & proscindendum,  
 & confodiendum affirmant: contrā sitiens, solutum, leue, & gracile per hyemem.  
 30 Enim uero illa æstiuua cultio assiccare attenuareq̃ potest, hyberna uero crassare achu-  
 mesacere, quæ scilicet natura indigens utriusq̃ soli desiderat. Et stercoreandum am-  
 plius solum gracile, minus frugale percensent: tum propter soli uirtutē, tum quod  
 stercore plus alimenti ministret, quā excoqui possit. Terrenum quoq̃ aduersi ha-  
 bitus intermisceri præcipiunt: exempli gratia, ponderoso leue, leui ponderosum,  
 macro pingue, & contrā. Pari modo, & rubrum & candidum, & si qua contrarie-  
 tas alia sit: quippe non modo quod deest replere admistio potest, sed etiam solum  
 omnino reddit ualidius, ut si quod defatigatum atque effoetum iam est, ferili cui-  
 40 quam terræ permisceatur, ferre iterum incipit, quasi nouum effectum sit, & quæ  
 sua natura sterilis sit, ceu argilla, si misceatur, feracem efficit. Altera enim alteri  
 stercoreis uice quodammodo fungitur. Quamobrem Megareses miscere ita con-  
 sueuerunt, & quinquennio aut sexennio possit alte defodientes, inquantum im-  
 ber ualeat peruenire, in ea terreni ad summa regerunt, quò seges renouelletur.  
 Pars enim ad alendum idonea labitur deorsum semper cum aqua. Solum siccum  
 & tepidum ante imbres feri præcipiunt, ut admixta humoris copia satis alere possit.  
 Et pluuium quoque eodem modo ferendum existimant, ut semina humo adhuc  
 tepida pullulent atque augeant, itaque imbres sufferre possint ualidius. At si ob-  
 serendum in humido sit, terra antè præcisā, serò semina committi melius ducūt. Ma-  
 tura semente rara solo mandari semina iubent, serotina autem densa. Altera enim  
 radicem abunde concipere nequeunt, altera optime radicanter, & germine multi-

dispargitur. Hæc igitur cæteraq; huiusmodi (plura etenim sunt) si quis culturas soli exequi diligentius uelit, ad rationem potius agrorum cōsiderasse oportet. Sunt enim qui cultum exquisitum pati minime possunt. Sed qui ita colat, plurimum aberrabit: quod illi euenerat, qui ex Corintho Syracusas profectus, culturam Corinthij agri in Syracusano seruauit. Cum enim lapides e segete frugali legisset, reddidit multo deteriorem: frumentum enim exarescebat, cum exemptis lapidibus nihil haberet, quo se posset protegere. Huic proximum est, quod actum in Syria referunt: solum enim aratro alte proficillum penitus resiccatū est, cum solis intrusu adeo percaluerit, ut propè ureretur. Vnde fit, ut aratris pusillis Syri utantur. Hæc igitur iudicium callidi coloni requirūt. Verum (ut communius atq; in uniuersum dicamus) 10 summum ac primū est omnium, agrum bene arasse. Semen enim solo commissum bene proficillo perbelle erumpit, cum terra iam mitigata, emollitaq; sit: tum sterco- rasse bene, & alium atq; alium cultū adhibuisse operæ pretium est, ut sarritionem, runcationem, & reliqua. Cura noualium tempore utroq; suscipitur, æstate ac hyeme, ut terra solem ac frigora sentiat, quemadmodum de conserendis quoq; arboribus proposuimus. Solum enim sæpe inuersum, rarum, leue, atq; materia uacū redditur, ita ut alere facillime possit. Ideoq; præcipiūt nuncq; legumina in noualibus ferere, nisi mature admodum fieri possit, ne æstiuam nouellationem impediant. Ni- uem hybernis noualibus prodesse existimāt, pruina uero nocere, corrodere nanq; 20 terram extenuareq;. Postquam primas arationes nouellarūt, rursus Vere cespitem inuerrere solent, ut nascentē herbam interimant: tum æstate arant, & cum serere uelint, proficindūt leuiter, utpote cum solum bene præagitatū præparatumq; esse, ac ea de re operam possimō dedisse oporteat, quemadmodum diximus. Quapropter bidentis culturam magis quā aratri commendāt. Id enim pleraq; intracta uideatur relinquere. Thessali uel bidente ualidiori ferramento utuntur (quod credo id esse quod pastinum uocant agricolæ Itali) quod miscum uocitant. Hoc enim altius descendens, plus terræ inuertit. Soli cultura hæc est. Euenit autē ijs qui in ea elaborauerint, ut minus in reliquis elaborandū sit. Contrā qui segnius illam susceperint, coguntur profectō, ut sæpe & sarriant, & runcent, cum herba multa erumpat. Sic enim semina pereunt. Prius autem quā frumētum herba nascitur, quoniam & 30 ualidior est, & prius inest in segete. Nam si frumentū citatius crescat, herba magna ex parte sirangulatur ac perit, & in totum non æque officere potest.

*Quæ semina cui solo conueniant, & quæ imbres desiderent magis: item quod solum le-*  
guminibus conueniat.

Caput XXVI



Olo pluuio atq; frigido conueniunt ad tritici pariter & hordei, atque cæterorum frumentorum fructificationem, soluta enim hæc sunt. Cætera plus imbris desiderant, & nigra magis quā candida, at si sicca & rubra, & in locis frigidis reuertentia. Item candida magis quā nigra, ut antequam imber desinat, grandescere possint: celerius enim 40 candida perficiuntur. Temperatis autem locis quæ media consistunt natura, mandari oportet. Sic hæc discerni quibusdam placuerat: alij secus indicant. Verum (ut simplicius agam) solum gracile, hordeum melius præstat. Pingue tritico accommodatius est. Hordeum enim minus ac leuius alimentum desiderat. Triticum largius, callosiusq; exposcit. Triticum trimestre solo tenui melius fit. Alimētum enim subministrari modicum eo potest, hoc est, leue leui. Africum & dracontias appellatum, & strangias, & selenusium, lætum exigunt agrum. Hæc enim uberius succos hauriunt. Argumētum calamus est, quē crassum gerunt. Ad summā, quodcunq; huiusmodi sit, solo frugali apte committitur. At si aliquod genus tunicis multis con- 50

tegitur,

regitur, ceu thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur: frigus enim huic nihil officere potest. Rarum, solutumq; ceu canchrydias uocatum, agro pluuiio ferendum profectio est, quippe cum alimenti copiam id quoq; desiderat: quamobrem & culmo crasso exurgit. Quin & in leguminum genere pariter intelligere licet. Solum enim lentum ac nigrum, cicer melius fert, leue melius fabam. Sic enim utriq; modice alimentum offertur. Et in ceteris uero semper ad alimentum referenda ratio est: nunquam tamen ratione aeris pretermissa, etenim solum apricum & ad summam serenum, infirmioribus commodius est: contrarium ualidioribus: lutosum siccis, & paruo alimento contentis, ut achilleidi: quippe hoc succos melius digerens facit candidiora: ferunt, & coctilia, & sicca loca quoq; soli exposita, plus enim uis solis percoquit. Triticum solo pluuiio uberius quam hordeum geritur, & omnino contra imbres ualidius est: fert idem etiam solo non stercoreto copiosius. Ratio, quod suo naturali calore plenius concoquere possit, & fimum non aequae requirat, quonia in se habeat quod ex fimo acquireretur. Ad summam, triticum robustius est, & maturius feritur, & locis frigidis magis committitur. Robur autem facere, caloris plane interest naturalis. Quin & quod tunicis inuolutum pluribus sit, sit ut tutius maneat: quapropter solum, quod longo intervallo temporis colitur, triticum magis quam hordeum fert. Triticum enim alimentum eius soli ualidius magis uincere potest. Omnino (ut simplici ratione dicam) publicae ac summae differentiae illae sunt, agri natura, seminum firmitas infirmitas ue, atq; aeris habitus: quae de causa haec considerari ubiq; necessarium. Frigora subsecuta omnibus in locis utilia sunt: sic enim fata plenius radican-  
 20 tur, cancrificanturq; ita, ut ineunte Vere haudquaquam modica magnitudine careant, sed praecipue in bonis. Austrinum enim atq; omnino serenum tempus celeriter aedit, eruginemq; foetificat. Quae dense fuerint seminata, spicam prius effundunt, quam quae rarenter, quod altera largius radicentur, & multiplicius deorsum scindantur, quia locus supersit, altera protinus sursum excurrant.

De uitijis segetum, erugine, erucis, &amp; uermibus.

Caput XXVII

30 **S**emina quoq; ad fertilitatem idonea, & uitia quae accidere solent, haud ignorare oportet. Locis enim cauis, & a flatu silentibus segetes erugine infestantur: aufugiunt hoc uitium quae stant non erecto, sed paruo cacumine. Quamobrem spicam inclinari utile est, ut imbres decendant, nec rores excipi possint. Inclinatur magis quae longae sint: manent erectius latae ac breues: quod sit, ut istae eruginem sentiant. Luuat & multo a folijs spicam distare, humor enim in folijs magis coepit. Itaq; si propinqua sit, tangitur statim: si remota, non aequae inficitur. Quamobrem hordeum achilleis uocatum, erugineosum, tam nigrum quam candidum est, spicam enim gerit erectam. Contra genus, quod ereocrithum uocamus, quia incuruatur, ab erugine innoxium est. Segetes  
 40 uento expositae minus erugine infestantur, motus enim humorem discutit. Nam & cum post imbrem flatus secutus, & nox deinde successerit, erugo minus constitit. Flatus enim humorem deiecit, & sol paululum immoratus nullam putredinem conficit, sed prius quam quicquam emarcescat, humor totus afficitur atq; absuntur: erugo autem quaedam putredo est, nec putridum esse quicq; potest sine alieno calore. Triticum plenissimum potissimo eruginem capit: ratio in calore est, quo etiam noctu luna putrefacere potest. Infirmita, fragiliaq; sunt omnia (ut simpliciter loquar) alba quam nigra, tam in plantis, quam in animalium genere. Igitur quod semina locis conuenienter eligi debeant, plerisque rationibus constat. Morbi autem (ut summa dixerim) omnibus seminibus ob alimentum coelestis temperiem eueniunt:



videlicet cū plus, minus uel alimēti præbetur, aut aër immodice humidus, siccus uel est, uel etiam cum non tempestiue humescit. Sic enim & uermes, ciceri, cicerculae, piscoq; innascuntur, & erucæ. Cicerculis, cum priusquam fuerint resiccata, dies interim feruidi accesserint; ciceri uero, cū salsugine ablata dulcedinē ceperit; quippe natura ubiq; animal gignit, modò calor cum humiditate ratione debita coëat. Humiditas enim ceu materia subiacet calori ad excoctionem conficiendam, quod uel in tritico euenire uidemus. Vermes enim eius radice creātur, cum post sementem flatus austrini crebre inceserint. Tunc enim radice humescente, & aëre calido, radicem caliditas putrefaciens animalia procreat. Vermis inde enatus continuo radicem erodit. Singulis enim ex eisdem rebus generationē, alimentumq; natura præscripserat. Alterum genus uermis ingignitur, cum humor effundi nequit cōclusus siccitate aëris circumfusi. Tunc enim calor cōfecta putredine animal cōtrahit. Tunc pabulum idem ei quoq; subministratur. Hoc idem & malis, & omnino arboribus euenire uidetur, quæ ex siti uermiculantur. Quod enim parum humoris sit, idq; in arbore maneat, putredinem conficit, ex qua uermis; contrā cum alimenti copia superpetit, tunc enim succus ad superiora transmittitur, & quia largior, uincit, nec potest putrefcere. Huic proximum quod etiam uiribus euenit. In his enim austro potissimum uermes ipse uocitati gignuntur, utpote cum istæ humescunt, atq; aër foetificet, tum ij quoq; materiem sibi congenerem statim erodūt. Item carpæ in oleis pari ratione creantur, & quæ in reliquis solent consistere, uel cum germinant, uel cum florent, uel etiam post florem. Enim uero omnia ex simili causa proueniūt. Sed uiribus hoc potissimum euenit, quia natura præhumidæ sint, & humor earum insipidus sit atq; aquosus. Humor enim qui talis est, facillime affici potest. Non nusquam ipse omnino nequeunt generari, scilicet loco placidi spiritus, neq; humido, neque succoso. Sed de morbis latius postea differemus.

*De satut temporibus in frumentis. Solstitijs non ferendum, nisi quedam.*

Caput XXVIII



Erere iubēt alij Vergilijs orientibus, tunc enim semina seruari possē in terra sicca, & irroscida arbitrantur: alij occidentibus, ut etiam Clistemus autor est, quod imbres die septimo ab occasu accedāt. Sed optimum fortē atq; tutissimum, solo turgenti semen committere. Cauendum tamen ne ponat in lutulento, aut semimadido, & semisiccaneo, quod quidam amphiergum uocant. Humidum enim limosumq; facit, ut semina diffundantur atq; lactescāt: & si siccetur, oblituit, obstruitq; nec transmeandi libertatem concedit. Semimadidum uero facile putrefacit. Tantum enim caloris humorisq; obtinet, ut mouere quidē semina possit, sed compellere germenq; effundere nequeat. Quamobrem sementem hanc omnium deterrimam putant. Quæ enim in sicco facta sit tempestiue, semen minime perdit. Solstitijs ferere tutum esse Clistemus negat. Enim uero terram per id temporis madidam ponderosamq; esse, atq; ita uaporosam, ac similem uelleribus male dilaniatis effici ait, nec posse uapores attrahere sursumq; transmittere, cum nō tantum caloris habent quantum sufficeret. Verum quæ ferotina sunt, solstitijs melius obseruntur. Et prodest feminibus in satū, & postea quā sata sunt, dies placidos complures incidere, ut ualeant pululare. Post hac frigus aquiloniū mediocriter utile est. Nihil enim ualide iam fixis constipatisq; nocet, sed constipando meliora, fecundioraq; reddit: quippe cum radice robustiore plus alimenti trahatur, & incrementum postmodum citatius ueniat. Quæ nanq; continuo se extollunt, gracilia, imbecilliaq; perficiūtur, tum etiam quæ intempestiue conceperint atque fuderint, pereunt. Omnino enim intempestiua educatio

educatio fluxa est. Quamobrem alij recidere, alij retondere consueuerunt. Iuuat etiam nix, quando terrā fermentet, & rarefaciat, & pabulū præbeat, & calore concluso radices augescere, corroborariq; faciat.

*Cur agri frigidi, calidiq; frumentarij sunt. Item annum fructificare, non tellurem.*

Caput XXXIX

**E**x quo illud quoq; palām sit, quod in quæstione uersatur: Cur ager frigidus, calidusq; frumentarius est, ceu Thracia, Pontus, Africa, Aegyptus. Etenim supra cætera, frigus etiam æstusq; aliquid conferunt: ut de mollitione terræ dictū iam est. Quippe nulla re minor, sed omnium maximus circumfusus aër animaduertitur, scilicet ad tempestiuitatem imbrium, uimq; flatus, & frigoris. Qualia enim hæc fuerint, talia quoq; semina red duntur. Vnde recte in prouerbio est: Annus fructificat, nō tellus. Situs quoq; agri plurimum ad flatum, solemq; ualet: quod etiam de arboribus diximus. Enim uero pleriq; agri, quamuis graciles uitiatq; fruges tamen perficere haud improbe possunt, quia commode ad hæc ipsa positionem obtineant. Omnino (ut summatim dixerim) ager bonæ frugis, frigora quoq; multa desiderat. Serenitates enim flatusq; austrini uitia magna ex parte sequestrant, eruginosasq; fruges efficiunt. Contrā hyemis constipatis, canceratisq; stirpibus magnitudinē modicam uerno tempore facit. Ter ram item si occupauerit cultam, rariorem solutionemq; reddit. Qua de causa incrementa, exortus, cōsummationesq; celeriter Vere actantur, adeo ut nihil pro sua estimatione posteriora uenire, sed etiam antecedere illa, quæ sata sunt in agro repido, uideantur. Sicut etiam arbores detruuncatæ: cum enim uehementer propter succi collectū, fauoremq; aëris excitentur, celeriter & augescunt, & consummantur. Igitur agri his inter se differentijs discrepant. Semina autem in ijs quoq; similia capi oportet ne qua mutatio consequatur. Atqui nōnulli ualidiora esse illa affirmant, quæ ager præbeat optimus: & hinc uires eorum perdurare biennio posse. Quod si ita est, proximum sanè illi occurrit, quod de arborum plantis asseritur, hoc est, optima, ualidissimaq; petere oportere. Quapropter utraque ratione rem agi conueniet.

*Inæqualitatem cœli non esse contemnendam.*

Caput XXX

**A**eris quoq; inæqualitatibus cura est adhibenda. Neq; enim quæ loca aprica, & propera tulerint, serotinis frigidisq; conueniunt: neq; contrā: altera enim festinare putatur, altera squalore, imbrisq; inopia pereunt. Quod enim serotina sint, lente concipiunt, pariuuntq;. Quocirca, ut ueniant posteriora, necesse est. Hoc idem frugibus quoq; euenire planè uidemus: quæ enim præcoquis, lætq; germinis sunt, ceu trimestria, hæc solo mature cōmissa præueniunt: nisi quid eiusmodi sit, ut hyemē anticipare debeat, quod possit radicem concipere. Sicut & fabam ea de causa mature oblerere solent, & simul, quia imbrem in flore amet, diuq; refloreat. Nam si sero seratur, imbrem haud assequi possit. Prodest fabæ imber cum floret, quia raro opere constat. Frumento incommodius est ratione prædicta: cæteris quoq; leguminibus innocens est, præterquam ciceri. Hoc enim abluta sanguine, tanquā re naturali, & sibi ingenta destitutum, radicitus statim tabescit, atq; ab erucis exeditur. Fœtificatur enim quæ admodum diximus. Sed semine in uino præmacurato minus posse ægrotare putatur, quod rationis est: sic enim aliquid acerbis habebit, quod possit resistere. Omnino enim si quis immutatum semen terræ mandauerit (ut antè iam diximus) tam plantas, quàm fructus permutari posse, ratio est. Quale namq; principium sit, tale illud quoq; sequatur, quod ab eo ipso principio prodit, necesse est. Ad hæc, alimentis

mutatis, tota quoque arborum genera permutari uidemus: quippe ex ferocibus urbana, mitiaque redduntur, & ex nigris in candida transeunt. Pari modo & fructus, Quapropter semen etiam qualitate affectu aliqua, nil mirum, si radicem protinus, & caulem alteret, & ultimo fructum immutet. Nullis irrorari, solesque sentire prodest flore delapso, sed frigore niueque opus est, ne residentem humorem sol feruefaciens eruginem creet. Hinc enim & agri rorulenti, & caui, & inflatiles potissimum erugine infestantur.

## THEOPHRASTI DE CAUSIS

## PLANTARVM LIBER QVARTVS.

10

*Cur seminibus vires proportionem non sint: semini adiunctam esse vim duplicem, agendi, patiendi.*

Caput I



QVONIAM plantarum complures sunt generationes, harumque communissima omnibus, quae semine facitatur, uel certe ipsae quae semen, fructumque ferant; dubitauerit sane quispiam, quare retque, cur non proportionem vires singulis seminibus insint, sed infirmiora sint, quae a ualidioribus prodeant: ut quae arbores generant, annuis esse infirmiora uidemus. Quippe utraque ratione confessum id ipsum habetur, quando etiam ab infirmioribus seminibus ualidiora proueniant. Semen enim arborem generat. Infirmitatis, robustisque argumenta haec sunt. Annua terrae commissa eadem permanent, suosque fructus similes praestant. Arborum semina immutantur, deteriusque fructificant: & altera consummatione sibi destinata celeriter reddunt, altera diuturne ac lente. Arbores enim quanquam robustiores, tardius fructus suos percoquant. Item arborum semina crusta, ligno uel natura operuit, ut oleae, pruni, uitis, piri, mali. Et haec rursus mole carnosae obdlexerat, frumenta uero nuda reliquit, & maxime triticum atque hordeum. : praeterquam quod tunicis praetenuibus uestiri uoluerit: atque semper illa, quod infirmius sit, huic maiorem impertit custodiam. Ambiguitates haec fere sunt. Principium uero de his differendi coepisse illud oportet, semen non solum vim agendi, sed etiam patiendi sortiri. Quod cum in omni parte naturae affirmari uerissime potest, tum in ipsa generatione latissime patet, utranque rationem, & quodammodo non minus illam patiendi uendicare sibi esse certum. Sic enim uis quoque seminibus indita ad agendum mouetur, quasi feruescerent. Quamobrem non omnia ex eadem causa germinant, sed cum aeris complexus aptus cuique occurrerit. Hoc igitur posito constat, quod non roboris, sed potius imbecillitatis germinandi celeritas est. Imbecille enim paritius est. Haec eadem ratio reddi potest de consummatione. Enim uero imbecilliora facilius & aeris habitus, & quae in eis sint elementa possunt perficere. Quod etiam in animalium genere patet. Semper enim quae robustiora sunt, diuturnius ex toto penitus partus suos ferunt atque educant. Tum & frugibus terrae plantae perexiguae subiacent: fructus arborum in mole maxima est, quae auocat ad se cibos, atque absomit, ut alia parum ferant, alia penitus sterilia sint, sicut & animalibus euenit, quae supra modum crassantur atque pinguescunt. Igitur festinatae consummationis causam non uiribus, sed his dare debemus: unde sit, ut etiam fecundiora eadem esse nimirum ratio sit. Sed forte de fecunditate aliquis contradicit, plura inquit esse quae arbores ferunt. Singulas enim pulpas permulta semina continere, arboremque semine unico generari. Sed haec leuiora, & quasi semota esse appareant. Genus autem, & similitudinem

dinem fructuum seruare arborum semina nequeunt, ambabus illis de causis: quia plus temporis terræ immerfa debilitentur, & quia ingens arborū moles largam nutrimenti copiam attrahat. Quod enim sterilitatis causa est, idem etiam prauitatis fructuum esse, ratio est. Annua contrā parū temporis in terra tenentur, & parū attrahunt alimentum, quapropter non primo fatu degenerāt, sed tertio. Tunc enim mutationes fieri solent. Itaq; quod illis ob alimentum copiam statim euenit, hoc frugibus cum diu permanserint, ratione occurrerit: praterquam quod altera in partem deteriorē semper mutantur, altera uel in meliorem pertranseant, si agri, cociq; status faueat. Sed hoc haud nostri propositi est. Degenerant autē penitus fruges illæ  
 10 possimō, quæ uiribus præstant, ut triticum atq; hordeum: hæc enim sola in lolium transeunt: sed magis triticum, quia ualidius est. Itaq; id quoq; non alia de causa euenit, quā quod plus alimentum trahatur. Lupinum enim omitto, quoniam id incoctile quasi toto est. Igitur ratio germinandi hinc colligi potest. Ad extra uero durandi peruiaciam alijs tempus aliter occurrit.

*Cur seminum arborum, frumentorumq; & leguminum, alia plus, alia minus durent.*

Caput II

**Q**uæ autem nonnulla arborum semina, quæ perire celerius possunt, non temere dixeris: ut ea quæ in pulpa conclusa sunt, uide licet pulpa uel separata, uel putrefacta. Nudum etenim semen resiccatur atque emoritur. Quæ autem corio integuntur, nec suo tegmine possunt absolui, hæc longius durant, sunt enim humidiora, & satis aërem recipere possunt. Sed maxime seruabilia, quæ ligno teguntur: & inter hæc primum obtinent illa, quæ denso putamine sunt, ipsaq; pinguiuscula constāt, ceu nux auellana: amara tamen ista efficiuntur. Amygdalæ minus perdurant, & minimum nuces iuglandes: quia præ raro, minimeq; continuo putamine obteguntur. Oleæ quoq; semen perdurat, & reliqua generis eiusdē. Omnium uero, quæ pulpa ambit, diuturnissimū palmæ est, utpote quod siccissimum sit atq; densissimum. Arborum  
 30 semina his de causis alia plus, alia minus perdurāt: proximis ferē causis, & frumenta seruantur. Aut enim, quod pluribus tunicis uestiantur, ceu milium: aut quod pingua sint, ut sesamum: aut quod aliquam acritudinem, amaritudinem uel habeant succi, ut lupinum, & cicer, quod & nigrescit, cum corrumpitur. Triticū magis hordeo, & leguminibus durat, quia calidius sit, & tunicis pluribus tegatur. Hordeum enim nudum propemodū est. Legumina tametsi crassiss putaminibus sunt, tamen corpore constant soluto, & dulcedinis aliquid habent, quæ quidem nō minus corruptionis causam posse afferre uidentur. Quapropter celerime suæ naturæ ruitur faba, & cicera. Sed dici fortasse uerissime potest, hæc perinde, ac locis ualent, posse durare: quippe cum apud Apolloniā maris Ionij fabas multos perdurare annos confirmet, multos etiam apud Cyzicum. Sed de perennitate eorum, atq; in  
 40 totum de ratione naturæ postea fortasse latius differemus. Nunc arborū comparatione differentias in his explicasse illas abunde est.

*De olerum differentijs in seruanda specie sua. Item, quæ oleribus, fructibusq; duratio.*

Caput III

**I**n genere olerum cætera suam speciem seruant: brassicam, & alia quædam mutari uidemus. Sed in ortu plus hæc certo inter se discrepant, quā frumenta. Alia enim die tertio exeunt, ut ocimum, cucumis, cucurbita: alia quinto, aut sexto: alia quinto & decimo, ut porrum: quadragesimo apium, nonnusquam & quinquagesimo. Hoc enim prouentu difficilimum omnium proditur. Coriannum quoque difficile pro

THEOPHRASTI DE CAUSIS

uenit: haud enim germen emittit, nisi aqua præmaceratam. Causam duritiæ haber: crusta etenim tegitur betarū disparitas, cum aliæ mēse posteriori emergant, aliæ duobus mēsis pōit, aliæ pluribus, nonnullæ etiā anno. Diritatem, ac peruicaciam quandam in percoquendo ad germen edendum significat. Quæ per æstatem ferimos est; hæc cōstat, quod ex imbecillitate celeriter auferunt, & ex eo ipso tempore prodeunt, quia hyemem nequeant tolerare; uel quod sicca sint, ceu ocimum, uel quod frigida, humidaq; ut cucumis, & portulaca. Abrotonum mirandū profectō appareat: cum enim calidum sit, loca aprica persequitur. Ratio in infirmitate est: uires enim tam contra frigus, quā contra æstum huic deficiunt. In totum uero calor inditus ad facile, beneq; germinandum haudquaquam præcipuus intelligitur: siquidem calida sunt, quæ acra. Porrum enim, & gethium, atq; etiā magis sartureia, & origanum difficile germinant. Humorem enim habeat aptum, & nō minus, sed forsitan magis temperiem ad agendum ac patiendum, oportet, quod germinaturum facile, beneq; sit. Omnino quoad genere amplecti possumus, siccissima seminum coronaria atq; olerum. Quamobrem uapores hæc celerrime attrahunt, & hinc ea suspendere solent, nec dispergunt aquam in domicilijs, nec afferunt ubi ullo pacto suspenderint. Perennitas his, frumentisq; repositis, uel ad sementes, uel ad ceteros usus proxima est: manent enim fecunda ad quadriennium maxime. Cetera quoq; ad usum ciborum plus temporis utilia durant, sicut frumentum: idq; ratione fit, ut etiā in animalibus prius uis generandi exoleat. Enimuero generandi principium in ijs est, quod tanquam semen aliquis dixerit. Reliquum uero tanquam alimentū, & materiam semini annexam. Verum totum appellare semen solemus, & hinc ea uiuere, atq; non uiuere dicimus, cum scilicet elemento illo incolumia, corrupta ue sunt, ut etiā oua. Euenit hoc idem & generi glandium, & reliquis fructibus. Ad germinandū tamen semen anniculum aptius esse nouellis non sine ratione credideris. Constat enim sibi, & quasi pressiora, percoctiora seipsis redduntur. Nam ijs quoq; digestio quædam acquiritur, cum exactum sit, quod fuerit alienum. Spacio tamen temporis longinquo senescant, morianturq; necesse est. Caulescunt celerrime, quæ semine ingenti prouenerint, utpote, quæ ualidissimam obtinuisse originem. Caulis enim perfectio quædam est, siquidem fructus finis rationē obtineat. Mox caulem agunt, quæ ex uetustioribus prodierint seminibus. Nam ijs quoq; uelut syncerior quædā uis, atq; largior inest. At nouellis permista, & ad nutrimentum propensior est, sicut etiā in alijs patet. Semper enim seriora cibi maioris sunt. Vnde fit, ut etsi non ea quæ semine ingenti exiuerint, prius caulescāt, quæ tamen ex uetustiori sunt, hæc anticipare ratio est. Quæ scilicet de re quædam contra disputant. Infirmitas enim celerius caulescere aiunt, ut in oleribus liquet. Causa uero quod passibilia sint, minusq; alimenti capiant: sic enim fit, ut celerius se perficere possint. Caulescere autem tanquam perfici est. Quamobrem & inter arbores, quæ uetustiores sunt, celerius pleniusq; fructus percoquunt: quæ uigent atate, uberior quidem, lætiusq; fructificant, sed lentius certe perficiunt. Sed si Vere, quæ ex uetustioribus sint, celerius caulescere aiunt, uetustiora celerius propterea generare posse uidetur, quod seminibus aliquid uelut materia, alimentumq; principijs cōiungatur, quod ante macerari oporteat, quā sit germinadum. Quin etiā illud dici de caule quidem potest, uetera minus radices agere, sed sursum potius tendere, atq; ita celerius se perficeret: quod uel in omnibus ferē uitā breuē agentibus constat, sicut etiā de trimestribus ferunt. Tempora tamen & uigores, & naturas singulorum haud prætermitti oportet. Sed hæc porro similitudinē nonnullam præsentat. Propria uero generatim tempora per se latius decet exponere, inuenietur tam eorum ipsorum, quā ceterorum comparisonem.

Cur arbores imperfecte generent.

Caput IIII



Rorsus absurdum simul & mirandum appareat, si qua ex imperfectis ualeant generare, præsertim arborum naturas uastiles, ceu salices, & ulmos. Imperfectum enim, quod crudum est. Ergo si uerum hoc sit, distinguere perfectionem debemus, ut alia usum hominis spectent, alia generationem. Aut enim ita perficitur fructus, ut cibus hominum sit, aut ita ut ualeat generare. Vnde sunt, qui uim plenè obtinent generandi, quanquam cibo minime idonei constant, alij forsitan econtrario. Sed fortè confectionem hoc in loco statuere colore, sapore, densitate, reliquisq; eiusmodi conuenit. Nam cibo quidem esse idoneum, ueteribus etiam, atq; alijs dabitur. Verum id principale non est, sed primatum uis obtinet generandi, etenim unumquodq; suæ ratione operæ iudicandum est. Atq; hæc dicta uelim per suppositionem.

Cur aliquo in genere, infecundæ semper sint perfectiores.

Caput V



Llud uero absurdum penitus est, si quo in genere infecundum id sit, quod perficitur, quanquam semine prodeat, ut in genere cupressi. Mas enim omnino infecundus est, & foeminae pleræq; fructu uiduæ constant. Aliqua enim inter congenera fructificare non posse minus absurdum. Nec in feminibus mirum, si quod læsum fuerit, infecundum sit, sed fortassis id quidem & necessarium est. At nihil penitus esse frugiferum, naturam quasi erroris arguit, ceu frustra quid egerit: quod rationibus quoq; illis aduersum est, quas antè exposuimus. At de ulmo, de salice ambigitur. Caprificus proculdubio generat, & flosculus thymi, & aliorum quorundam semina, quæ percipi sensu hominis nequeunt, sed flos tantummodo cernitur. Verum de arboribus alia quoque deduci in quæstionem forsitan possunt. Etenim quod in palmis perspicitur, absurdum profectò est, & rationem desiderat. Et aliqua esse tam ex quo semine, ceu cupressum, eodem utiq; spectat. Hæc enim, ut credatur deesse alijs quibus pabulum, faciunt: nisi fortè alijs genus aliud, tum materiæ, tum alimenti, natura præscripserit, satisq; sit aliquibus, si modo id habeant, quo possint seruari. In frumentorum autem genere, atque omnino in annuis, differentiæ tales decerni facilius possunt, quas scilicet recipiunt in germinatione, perfectione, atque reliquis passionibus, quæ eis euenire solitæ sunt.

An plantæ aliquæ (ut triticum in lolium) de specie in speciem transiunt faciant: cur ualidiora in infirmiora mutantur: quæ item in lolium transeant: quæ non transeant. Cur etiā linum in lolium: cur deniq; aliquibus noceant cultus.

Caput VI



Ed de mutatione in formam alienigenam, ceu ex tritico in lolium, & rursus ex lolio in triticum, & ex semine in auenam, mirandum sanè est, tum ob eam ipsam mutationem, tum ob eius peculiarem euentum. Hæc enim sola ex omni numero suam permutant naturam. Triticum enim, quod ex tipha, & semine fit, paratu quodam, atque arte consistit: sicut etiam ea, quæ præmacerata fructus afferunt dulciores. Absurdum præterea, quod cum nullum ex frumentis ualidius istis perspicitur, tam magnā mutationem recipiant. Corruptio enim facilius, quod inualidum est. Et generis autem mutatio talis, corruptio quædam est: & triticum magis hordeo ualidum. Item, quæ ualidiora sunt, transire solent in inualidiora: lolium autem tritico, & hordeo ualidius est: itaque simul euenit, ut eo quod secundum naturam est, ualidius constet,

quod præter naturam. Corruptio enim atq; mutatio, uel seminis sit, uel herbae, necesse est. Seminis igitur lactatio, aut putrefactio, aut in totum resolutio est: quorum nihil natura dari par est. Herbae autem mutatio radicibus iam peractis consequitur: radices ipsas mutari absurdum penitus est. Quamobrem his ipsis ut ratione uacantibus persuasum quibusdam est, nullam mutationem eiusmodi fieri posse: sed frequentia imbrium lolium prouenire, atq; consistere. Quod etiam per se facere ipsum, patet locis admodum pluuijs, nullo penitus tritico, hordeo uel disperfo. Sed obiectiones istae cōuinci à rebus ipsis planè uidentur. Permulti enim (ut aiunt) cum triticum, uel hordeum seruissent, lolium messuerūt. Ergo generis illam mutationem ratione utraque fieri posse, id est seminis alteratione, atq; radicis, debemus statuere. 10

Mutatio enim herbae, radicis causa euenit: nec temere inter se cōsentiunt, cum connexae sint, cōmunemq; sortiantur originem. Semen enim corruptum nihil penitus producere possit, idq; cōmune est: nec enim radix corrupta nutriendi possit fungi officio. Seminis autem corruptionem, non putrefactionem, non lactationem, non aliquam ex prædictis esse putandum: sed aliam, quæ præ nimia nutrimenti copia seminibus deliquescentibus euenit, quæ non ex toto semina perdit, sed uictio naturali principio in aliud genus traducit. Proximum quodammodo est, quod in animalibus euenit ad portionem, cum foemina marem deuterit, uel etiam cum maior aliqua mutatio præter naturæ operam fuerit: terram tanquam foeminā intelligere decet, 20 & portionem ad hunc modum statuere. Cum igitur terra imbrium frequentia largiorem alimenti copiam præstat, tunc degenerandi occasio euenit, quæ uim generandi non penitus tollit, sed in aliam alterat. Quod autem natura seminum uiuax sit (multo enim uiuacior, quam animalium) plus quoq; eam durare posse, ratio est. Nam et sine origine seminis pleraq; plantæ tum grandes, tum humiles, sponte naturæ consistunt. Quamobrè hinc etiam liquidò sit, non herbae, sed seminis alteratione, mutationem illam oriri, donec portionis seruetur existimatio. Sic enim & in animalium genere fieri solum est: tum etiam imbecille tunc est, cum germinis profiliendi mutatio agitur. Vbi uero germinatum, radicatumq; sit, planta uelut creata iam est: & diminutio de cætero in incremento, alimentoq; uel etiam ad uniuersam corruptionem, non ad mutationem subsequitur. Ad hæc, homines experti rem rusticam, folium 30 protinus nascens lolij esse affirmat, quod sit pinguius, & uiridius, & angustius, nec postmodum in eiusmodi formam transire. His igitur rationibus semen causam habere appareat. Cæterum alterum quoq; fieri potest, nec temere credes herbam mutari alterata radice, id enim fiat necesse est. Siquidem quodq; ortum à sua origine secundo incipiat. Constat hoc etiam in arboribus, quæ fructus suos cultura immutaret: nam & cum satis fere, in dulces gratos uel palato: uel ex nucleosis, in uacuos nucleos. Ratio enim huius quoque mutationis in alimenti copia est, cum imbres crebre incesse, & potissimum (ut placet quibusdam) tempore uerno: simul si soles incanderint, quasi hac utraque ratione mutationem illam exultare necesse sit. 40

Locis enim quibusdam palustribus omnino id euenit: & folium immutatur, ut omnibus palam sit. Quod si non imbres uerni acceperint, largam tritici copiam præstari autumant. Hoc igitur utraq; ratione fieri posse, ratio sit. Sed quauis utraq; eueniat, absurdum fortè non est, differētiam aliquam esse tum soli, tum aëris oportere: nam & cum satis fere, statim copiose pluuias incesse, damnosum admodum est. Fit enim, ut radices infirmiores agantur: quod autem infirmum est, affici facilius potest. Generis illa mutatio hac de causa euenit. Sola autem hæc illud pati, & quæ ualidiora esse uidentur (zea enim, id est semen, ualida est) unica hac ratione solentur. Quoniam enim ualidissima sint, radiceq; numerosa cohaereant, idcirco resistere firmitus possunt. Cætera quæ infirma sint, penitus pereunt. Item tempus, quo

quo ista seruntur, magis pluuium est, plusq; tempus in terra tenentur. Cetera ad Ver, & coelo iam indulgente sparguntur, & germinare confectum incipiunt. Quamobrem neutrum ex corruptione illorum, si quando corrumpuntur, consistere potest. Enimuero posse transire in lolium arbitrari absurdum omnino est; semper enim ad proximum, & quod congenere quodammodo sit, mutatio pro-  
 uenit. Vtrunque uero negatum his esse, imbecillitati tribui debet, cum omnino  
 intereant: sed potius illa transire in lolium possunt, quæ speciem tritico, hordeo uel  
 similem gerunt. Ex his tamen alia ob imbecillitatem tolerare nihil penitus queunt,  
 ut tipha. Alia in proximum potius transeunt, ceu semen in auenam, triticum uel  
 10 in tipham. Aut semen nunquam mutatur: quia plurimum illud, ac ualidissi-  
 mum alimentum, cuius causa mutatio sequitur, non effœminet, nec ad robustius  
 eucat, & omnino genere pristino expoliet. Quippe alioquin rectius quispiam ad-  
 miretur, quod non in agreste triticum transeat. Sed huius quoque proxima quæ-  
 dam ratio est, natura enim simpliciter, atque solute permutat. Mirum, & ratio-  
 nem desiderans, si linum quoque in lolium transeat: hæc enim inter se plurimum  
 distant, ni forte pabulum id etiam immodice trahat: quippe agrum amar succo-  
 sum. Ergo ex nimietate ista quoque mutatio euenit. Lupinum quanquam uali-  
 dum sit, matureq; obseratur, nunquam tamen in aliud transit, summi roboris  
 causa: nihil etenim est, quod uincere nequeat. Quippe quod mutationem sitre-  
 20 cepturum, neque impassibile, neque nimium passibile esse debet. Alterum enim  
 nihil moueri posset, alterum nullum sustineret motum, utpote imbecillum, sed pe-  
 nitus interit, ut dictum iam est. Intuendum, cetera quoque seminum genera tam  
 agrestia quam satia: an aliqua sint, quæ huiusmodi alterationem possint admit-  
 tere. Et de lolio satis dictum est. Mutationes enim quæ inter ipsa genera frumen-  
 ti eueniunt, ut cum ex tali tale, uel triticum, uel hordeum, uel aliquid ex ceteris  
 provenit, haudquaquam mirandæ sunt. Tempus enim & alimentum, & coelum  
 (ut antè iam diximus) alterationes efficiunt, animalium pariter & plantarum. Qua  
 quidem ratione omnino ad genus mutandum, qualitatem, quantitatemq; alimen-  
 ti conuenienter statuendum censemus. Nam & arborum, & omnino plantarum  
 30 mutationes, quas inter historias explicauimus, his eisdem de causis fieri solitæ sunt  
 (ut antè dictum est) cum alijs cultus noceat, ceu sisymbrio. Id enim quasi effœmi-  
 natur, & amisso sui odoris acore, transit in mentam: quippe alimentum, neglectusq;  
 causa, syluestris habitus provenit. Quædam omnino dispereunt, ut menta radi-  
 cibus complexu mutuo strangulatis. Populus alba, quæ in torum nigrae dissimi-  
 lis fronde, formaq; tota est, similima in senectâ efficitur, quia exsicceatur, & iei-  
 unius nutriatur. Sed de his latius alibi disseruimus: atque etiam de animalibus, sci-  
 licet illis quoque in generatione quicquam huiusmodi euenire, idq; pullis adultis  
 non amplius fieri, præterquam si quis auium alterationes unâ cum eis ipsis nascen-  
 40 tibus exoriri putauerit: tamen affectionibus potius corporis proximæ, quam mu-  
 tationibus esse uidentur.

*Cur aliqua semina non simul, sed particulatim generent.*

Caput VII



Aeteris uero de seminibus proclit procul maxime sunt, siquidem ue-  
 re narretur, adesse, quæ non simul generent, sed particulatim: ut de  
 auena & loro & bulbo fertur, quod alij negant. Sed aut radices reger-  
 minare anno posteriori, aut semina posterioris anni delapsa erumpe-  
 re aiunt. Alij uerò id esse autumant, argumentaq; afferunt, tam alia,  
 quam quod coloni, qui auenam omnem uelint delere, biennio cessare segetem pa-  
 tiuntur, quò semen utrunq; erumpat, & pascatur, demetaturq; uniuersus fructus.



Sed de bipartita germinatione ita, ut pars in annum prorogetur sequentem, ambigi etiam aliter potest: quandoquidem semen, quod continuum ac bifidum est, ut ceratur, simulque decidit, parte altera immutetur, ac pullulet, altera indomitum anno toto permaneat. Quo enim pars quam inquirunt permanere, infirmior semine toto est, eo affici deberet facilius tam ad eruptionem, quam ad totam corruptionem. Præterea cum altera pars germen ediderit, reliqua seiungatur, necesse est: nam si coniuncta sit, quamvis nullius affectionis particeps fuerit, tamen euulsis radicibus illam quoque euelli necesse est: quod sæpe coloni faciunt. Sed nunquam hac ratione semen deleri affirmant. Tutè autem in terra posse durare aliquantum, usque tempus sit germinandi idoneum, ratio est, & in multis hoc idem animaduertimus. 10  
At annum expectare integrum posse, mirum profectò est: necnon & partem alteram esse perfectam, alteram imperfectam. Eandemque perfici anno post arbitrari minime rationis est. Nec enim infirma, sed ualida est auena, ut plura perficere ualeat: & simul quæ multò infirmiora sunt, hoc possunt efficere. Ad hæc perfectio naturalis est, quæ maxime conuenit, & quæ sola fortassis perfectio appellanda est. Tunc enim semen alimentum suum capebat, quo incrementum, atque perfectio ministratur. Seiunctum uero, aut penitus interiit, aut nihil perfici potest: tunica uero multiplici tegi, & bromo, & semini datum est, itaque illa quoque inoffensa permanere deberent. Quæ repugnant, hæc ferè sunt. Cæterum si qua reddenda ratio est, illam fortasse aliquis possimò dicet, quod non utraque pars seminis perficiatur, ut germen possit elidere: sed simile quicquam eueniat, ut in animalibus quibusdam oua 20 gignentibus. Post partum enim oua aluntur, perficiunturque alia in aqua & mari, alia in terra & aëre: atque ita uim adipiscuntur, qua possint animalia parere, quod parentes, quæ gestarunt ac pepererunt, facere nequeunt. Quin & alia ratione uerum id esse apparet, cum semina non protinus à tritura meliora sint, quam certo tempore possint: neque nouella anniculis præsent, ut diximus: sed ueluti excoctionem quandam potestatemque capiant opus sit, exacto scilicet quod in eis fuerit alienum. Quid ergo (dixerit forte quispiam) uetat, in ijs quoque aliquid huiusmodi euenire, ut semina & perficiantur, & corroborentur, excocta quodammodo, quum intestino, tum externo calore? An hoc minime rationis sit, cum calor in terra conclusus alimentum potius coquat quam trahat: præsertim cum semina ista nata sint in aëre perfici, alimentumque non crudum, sed præmaceratum à caule, atque radicibus capiant. Item ouorum illorum una omnium excoctio, atque perfectio, siue extrinsecus, siue intrinsecus est. Horum autem pars imperfecta relinquitur, quippe alterum secundum naturam, alterum minus naturæ opera quodammodo euenit: cum planta adhuc bonis uiribus sit, nec à coctione perfectiore arceatur conditione aliqua temporis, nisi quis semina prius quam perficiantur, exilire, ob suæ naturæ imbecillitatem, putauerit. Ita etenim sit, & multo etiam hordeum antecedit auena, ut culmus stare inanis. Hoc igitur ad rationem essentiae redigendum est: & ali uero ac perfici semina posse, rerum ambientium opera, non abest à ratione. Indomita 40 enim permanere, præsertim cum tam multis tunicis integantur, minus mirum. Nam & alia permulta, uel potius omnia seruari ad tempus usque conueniens, certum est, quemadmodum diximus. Mirabilis enim quod de betis dictum iam est, non modo uno mense, & duobus, & tribus, uerum etiam anno integro possint, nonnullas erumpere: quanquam hortus assidue rigetur, colaturque. Loti quoque semen, uel certe quod fructum complectitur, tale est: quia facile absolui non potest, neque parem capere crassitudinem. Bulbi autem semen differt etiam magnitudine: cogitandum tamen de hoc est. Igitur si aliqua semina tam difficulter erumpant, ut longo tempore possint edant germen in lucem: cōstat quod hæc dum in terra laterent, excoquuntur, perficiunturque ad

ad germen agendum. Quamobrem id quoque fidem aliquam possit asserere. Sed quod pleracq; etiam plantæ annexa perficiantur, ut sata protinus ualeant pullulare, ratio hæc non uacat obiectione prorsus. Longe ipsæ quæ de seminibus ac fructibus querimus maius, nec eidem subditum rationi, quod loro euenit arbori, fructu loro herbæ proximū parienti; quodq; de lactaria, & myrtaria cognominata, proditum est. Hæc non arbor, sed frutex terrenus est: quippe utranque non simul omnibus ramulis, sed alternatim fructificare confirmant: quapropter uirium partionem in radicibus fieri necesse est. Sed de his cogitandum amplius est.

De ratione satus, & differentijs frugum: curq; legumina ab ima parte radicem, & ger-  
men fundant, frumenta uero à duabus. Caput VIII



Ruges autem si quas differentias uel in ortu, uel in fructu, uel in al-  
qua parte suæ substantiæ recipiāt, explicare deinceps tentandum est.  
Ergo triticum, hordeū, atq; similia mature feruntur: legumina ad ue-  
ris teporem, præterquam faba, & lupinum. Ratio, quod frumēta non  
protinus sursum contendunt, sed ante radices plenē concipiant, ut se  
culmo simplici attollere possint. Radicantur autem probe, dum coërcentur stipan-  
turq; frigore, ita ut multas fibrarum origines concipiant. Legumina uero radice  
singula, ualidaq; nituntur, & sursum confestim impetum faciunt: ita uerno tem-  
pori percommode tribuuntur: enim uero natura eorum familiaris magna parte  
aëris est. Fabam mature obserere solent (ut dictum est) causa imbecillitatis, quò se-  
renis diebus radices concipiat, quibus ualenter frigori, ac tempestatibus possit resi-  
stere. Lupinum terræ mandatur statim ex aris, quia non nisi solo adhuc tepido spar-  
sum germen bene profundit. Ratio, quia quod durum natura, & quasi incoctile  
est prorsus, id multū caloris desiderat: argumento nimia eius amaritudo est. Quod  
si agri calorem nactum sit, macerari, ac probe germen suum potest proferre. Sin-  
minus, prauè germinat, & simile euenit, ut si quis exiguò igne ualidissimum quic-  
quam excoquere tenter. Idcirco solum quoque frugale aspernari, arenaceum &  
exile amare uidetur, hoc enim facilius sentit calorem, & ueluti celerius confici po-  
test. Nec alte abscondi uult, sed it per summa, ut frui calore amplius possit, atque  
sublime radices melius capit & germinat. Sed hæc ferme operæ agriculturæ deie-  
ganda potius sunt. Naturæ autē illa, quod legumina de eadem parte radicem, atq;  
germen suum emittunt, quorum alterū summa continuo petat, alterum ima subit.  
At hordeum, triticum, atq; omnino frumenta, extremo utroque pullulant. Radix  
enim de crasso quod spicæ adhæret, enascitur: de tenui autem, unde arista porrigi-  
tur, caulis exit scilicet proportionē alterum à superiori, alterum ab inferiori, cum ra-  
dix & caulis ita maneant. Causa uero ex natura eorū petenda est, quod legumina,  
quia bipartito, & compacti claudantur corpore, unicum quoddam germinandi  
initium habere in extremo ambarum partium possint, quod annexum uelut ex-  
trinfecus cernitur, qua siliquæ copulantur. Quod enim contenta in uasculis sint,  
principium habere illud necessarium est, aliter enim cibum non possint accipere.  
Altera autem parte secundum haberi principium fieri non potest, cum continua  
inter se sint, & siliqua undiq; ambiantur. Causam uero quamobrem ita consent,  
substantia eorum sortita est. His igitur recte natura eodem in loco principium  
utrunque posuerat. Frumentis autem quia distincta inhæreant, & tegmine com-  
muni nullo contineantur, atque etiam recta quodammodo specie insituantur, or-  
tum distinxit, fecitq; ut ab uno quidem initio uterque ortus incipiat, sed continuo  
quodam, ac transcendēte ad utrunq; extremū. Quod etiā in germinatione perspi-  
citur, porrigens se per incisuram frumenti. Ergo causam, cur hæc nō pari modo se

habeant, illam existimandum. Pariter uero in utroque genere illud inest, ut radices exortus & nexus seu ligamen, quo uel spicæ, uel siliquæ adherent, ex eodem sint, quo utriq; alimenta subministrantur: quippe culmo & primo germine radix alimentum dispensat: fructibus uero nexus, qui uel siliquæ, uel spicæ semen coniungit. Ortum ad hunc modum licebit discernere.

*Cur legumina celeriter orientur, & minus terram consumant, quam frumenta. Curq; cicer solum emacret, quamuis celeriter nascatur. Item quæ fruges anno sequentii repullulent.*

## CAPVT IX



Elerem germinationem leguminibus temporis ratione reddere possumus, quia mollius atq; fecundius hyberno tempore sit. Verū eius utriusq; conditionis causam imbecillitas habet, quæ facit ut & ad uer oblerantur, & celerius enascantur. Quod enim infirmius est (ut sæpe retulimus) facilius affici, sentireq; potest. Largaq; fecunditatis forsitan eandem uel certe proximam rationem reddere iustum est: legumina enim multo fecundius ferunt. Eodem spectat ut & celerius perficiantur, minusq; uim terræ consumant. Hæc enim omnia, & quæ eiusdem generis sunt, eueniunt ferme (ut in summa loquar) ex causa imbecillitatis. Quippe cum ea quæ infirmiora sunt, & educare, & perfici facilius possint, ut unā & fructificetur uberius, & terra minus hoc fatu consumatur, & primus exortus facilius atq; celerius agatur: præterquam si quid tegminis ambientis firmitate uteretur, ceu faba: huic enim tardi prouentus causa, crassitudo putaminis est: & si satæ impluerit, multo lentius prouenit, quasi terra pauimentaretur, solidareturq;. Frumentis illa quoq; ad moram percoctionis, consumptionemq; terræ cōfessa sunt, uidelicet numerus radices, & lentitia fructus. Enimuero quæ lenta, & pura sunt, pigre in arborum etiam genere coquuntur. Quamobrem triticū serius, hordeoq; minus fertile est. Et radices uero frumentorum, quia multæ sint atq; altæ, uim terræ magis cōsumunt: legumina contrā, quia fructu terrestri, & radice simplici summaq; sint, & rara serantur, uberius ferunt, & solū minus consumunt, & citius proinde excoquunt. Vis enim tota sursum contendēs, cum nihil auocet radix, copiose fructificat, & fauente aëre facile coquit. Nam quibus radix numerosior altaq; est, ipsi fructus lignosi consistunt. Breui agrum emacrat cicer: quamobrem hoc solum nouale nō facit, nec solo quolibet, sed bono tantū perficitur. Prorsus in hoc minime rationis esse uidetur celeritas consummandi, siquidem quadraginta diebus, aut paulo pluribus perfici ualeat. Verum causam dixerim uires, quibus & cætera superare, & se tam citò possit perficere: quandoquidem & aqua minima indigeat, & hac, ut tantummodo pullulet: inde autē seipsum plenē enutrit, nisi fortē salugo quoq; ad perficiendum aliquid conferat, humorem scilicet exiccando, qui modum excedit. Nam & in generatione iuuare quodammodo, & familiaris ciceris esse uidetur. Argumentum, quod quæ iuxta mare posita sunt, meliora euadant, & quod abluta salugine perit atque uermiculatur. Sed quæ de causa in hoc solo ita eueniat, querendum: ni fortē proprium id essentia ciceris sit. Sed de his causis eiusmodi reddidisse par est. Sola autem de radicibus enascuntur anno sequente triticum atque hordeum: quin & anno primo hæc prærunta regerminant culmo è latere subnascente: ratio, quod hæc sola radices copiam, uimq; obtinent. Legumina enim radice una, surculosa, summa innituntur. Adde etiam illa quæ conculcata ab exercitu adeo, ut nihil perspicui possit, restibilia tamen efficiuntur. Omnibus tamen his exigua spica, imperfectaq; funditur, utpote quæ secūda emerferit.

*Cur legumina minus apta sint cibis hominum, quàm frumenta: curq; cetera animalia hordeo, quàm tritico melius alantur, contrà quàm homines. Quæ item facilia, difficiliaue in cibos animalium sint.* Caput X



Ed cur cibo legumina difficiliora sint homini, quàm frumentū, quæuis in terra minus temporis fuerint, causa explicanda est. Ergo id ipsum, quod plus temporis fuerit, ad facilitatē quoq; referre uidetur. Quamobrē & trimestre triticum, atq; hordeum facilius est: quasi minus terræ in seminibus insit propter temporis breuitatem. Ac cæteris animalibus & grata, & facilima ista sunt: contrà uero, quæ nobis facilia, hæc illis difficilima, quanq; ualidioribus. Multa enim intereunt tritico satiata, quæuis minimū terræ id habeat. Igitur ad has quæstiones, & si qua eiusmodi alia sit, in uniuersum, principiū illud sumendū est, non omnibus eadem esse in cibo idonea, sed singulis pro sua natura cibis statutus est. Quod cum in multis palam est, tum omnium ferme consensu in ceruis patet: scit, qui uiperas edunt, quibus cætera moriunt: tamenli multo maiora, robustioraq; sunt. Licet & in alijs illud quidē uidere, ut ictu intereant, quo nihil homines patiuntur, ceu serpentes ictu scorpionū. Hoc igitur posito, nō procul à ratione est, ut cæteris animalibus, cum cibo terrestriori uelcantur, talis potius competat: purus autem ille alienus, atq; incommodus sit, disrumpanturq; si ex dulcedine, uoluptateq; plus comederint. Hoc igitur commune, generaleq; est: propriū uero, quod alios quoq; inflari eueniat, uel omnibus, uel certe ijs, quæ habent echinum. Triticū enim crudū conflat, nec ex facili cōfici potest, multoq; fastidiosior eius palea est. Insuper quoque plurimū facit. Peregrina enim quæuis facilia sint, tamen immodice sumpta perturbant, atq; fastidiū inferunt. Hæc igitur quanq; diuersa appareant, ratione tamē non carent. Ad summā uero (ut formula dicam) facilitatis, difficultatis ue cibi, tam nobis, quàm cæteris cuiusq; naturæ, ager & aer differentiam faciunt. Enim uero, quæ locis placide spiratis, gracilibusq; nascuntur, hæc facilima sunt: quæ gelidis, atq; pluuijs, difficiliora, quia largius, ualidiusq; alimentū hæc habeant. Ob id inter frumenta, quæ Athenas uehunt, Siculum ualidissimum habitum est, & hoc longe pigrius Boeoticū, ut inter historias diximus: etenim ager ille præpinguis, aerq; frigidus est, & reliqui quoq; fructus illius regionis tritico in grauitate respōdent. Piesangensis agri triticum est, quod immodice sumptū disrumpit (ut dictū est) præ nimio scilicet fastidio. Ponticū facilimū, ac durissimū est, quæuis in aere gelido. Ratio, quod & semen, & solum leuius sit: & nix iuuat certe ad excoquendū. Semina autē non parum momenti habere, constat sanē ex trimestribus, & si qua tempore breuiori perfici ualeant. Quod enim nō multum terræ attraherent, sed leuiori pabulo uegetarentur, usum quoq; ciborū faciunt leuiorem. Tempus quoq; nōnihil conferre uidetur, quo minus diu in terra semina maneant, ut si terræ iam turgescenti cōmittant. Quippe si male euenit, ut in ijs, quæ nō frigida, sed feruenti aquæ coquenda immittimus. Nec enim illa morositatem ullam recipiunt. At si ex ijs, quæ breui perficiuntur tempore, graue aliquid sit, ut quod in Lemno fieri narrant, causam seminis ipsius naturæ, tribuere decet. Et de his satis dictum.

*Cur legumina diutius floreant, quàm frumenta: & flos non simul omnibus partibus exeat.* Caput XI



Lorent diutius legumina, quàm frumenta, quia flos frumenti imbecillior est: perfici autē ocys in omni genere, quæ sunt imbecilliora, iam diximus. Ex quo fit, ut etiam pluuiam altera nequeant tolerare, altera & queant eam, & adepta bene succedant. Sed hoc forsitan per accidens est, quod tota planta humore adepta, melius uegetetur: cum fructus,

quo perficiat, iuuari desiderat: & præcipue faba, quia rara, & fertilis flore, fructuq; omniū maxime sit. Cicer tamen madefactum perit, ob eam quā retulimus causam. Frumentum ratio potissimū reddi imbecillitate utiq; potest. Nequeunt enim sufferre, sed pereunt, atq; decidunt, ut etiam quibusdā arboribus accidit. Aliās enim erugine infestantur, aliās uehemēter humescunt. Florem quoq; nō simul omnibus emergere partibus, rationi utiq; datur: sunt enim distincta inter se omnia semina, & ex partu fecundo. Alia enim turgescunt, alia florent, alia in summitate præaugescunt. Quamobrem alia perfecta, & arida sunt, quāuis alimento proxima sint, alia in summitate uirescunt. Hoc tamen nō propriū, sed cæterorū etiam plurimum cōmune animaduertitur. Sūt enim complura, quæ particularim florent, atq; fructificāt, simulq; 10 germen sursum impellunt: unde fit, ut alia perfecta sint, alia imperfecta, alia futura. Nec quicq; alimentum transcurso, atq; relatio, ali uetat inferiora. Omnibus enim causis subiacet, ex quo succos hauriunt, uelut ex aliquo induciu. His igitur floris prouentus diuturnus, ac nullis imbribus obnoxius est ratione. Cæteris cum deflorescunt, imber enoxat, sed maxime frumento, ac faba, utpote imbecillioribus. De differentijs, quas inter se recipiunt, hæc teneas.

*Cur congenera non perficiantur omnia eodem tempore: deq; causis differentiarum, quibus congenera distinguuntur.*

Caput XII

**D**E congeneribus quæret fortasse aliquis, cur non pari tempore perfici 20 omnia possint: sed triticum aliud bimestre, aliud trimestre sit, sic & hordeum modo simili. Et si sit, quod etiam festinantius perfici possit, maior profectio ad genus hybernū differentia exultabit. Necnon & de cæteris eodem modo quærere licet: sed maxime de ijs, quæ diximus, quæstio foret, ni forte & eorum tantūmodo differentias istas esse quispiam credat: nec sine ratione. Legumina enim sata per hyemem haud possint algorem sufferre suæ causa imbecillitatis, præterq; pauca quædā. Eruum etenim seritur quidē sato maturo: at hordeo, tritico, atq; reliquis, quæ spica pusilla, infirmaq; sunt, anceps satio datur. Hoc igitur uelut in uniuersum generi ad genus notatum est. Temporis disparitatē communem cum arboribus habent. Sunt enim in singulis generibus alia præcoques, 30 alia serotina: ut uitis, ficus, mālus, pirus. Ratio in utroq; genere, quod propriæ naturæ differentia sit, q̄uis nomine indicentur cōmuni: ut & in animalū genere, natura canis varia notatur conditione. Huic proxima causa est, quamobrē alia properant, alia differunt. Enim uero siue calor, siue algor, siue aliquid causam istam habeat, nō aliter reddenda ratio est. Atq; in uniuersum differendū ita censemus. Frugibus uero ex ijs, quæ eueniunt, conspectius assignari ratio potest. Triticum enim quod hyeme seritur, quia numerosa radice sit, uiresq; suas ad se radicandū primum intendat, multitudinem culmi educit, est etenim multicalamū: trimestre contra paucis radicibus, paucisq; culmis consistit, qua de causa sursum cōtinuo nititur, atq; celeriter consummat: quod enim minus est, perfici facilius potest. Hinc etiam alterū large fructificat, alterum parçē: & alterum facile, alterū graue est (ut antē iam diximus) cum plus alimenti, & turbulentius trahat. Ex cursu quoq; ratione propere agitur, cum in condendis radicibus haud multū teratur temporis, utpote paucis. Qualitas quoque temporis plurimū fauet, nam & radicosum illud, si eo tempore obseratur, uelocius enascetur, & in culmos spargetur pauciores, & spicam paruam, atq; paucis fertilem geret: & trimestre, si mature seratur, frigus tolerare nō poterit suæ causa imbecillitatis. Sed mirū, atq; diuersum eueniat, si quod tempore breuiori conficitur, graue, fastidiosumq; sit ut Aenenses de eo referūt, cuius cura æquinoctio delegata est. Reliquū est, ut propriæ naturæ causa detur, quam in pluribus differentias recipere 40 magnas

magnas, cum in exortu, cōsummationeq̃, tum in proprijs speciebus uidemus, ceu magnitudinis atq̃ paruitatis, & figuræ. Adde copiam paleæ, & incōmoditatem ratione usus cibarij hominū. Forſitan & genera regiones efficiunt, uel omnia, uel certe aliqua: affimilant enim ſibiſpſis quodāmodo, & aut differentiā aliquam generis pariunt, aut etiā minus utile reddunt, ut tritico Thracio euenit. Fit enim multis cum tunicis, ſeroq̃ prouenit: quod utrunq̃ uis ſanē frigoris facit. Qua de cauſa cæteris quoq̃ agris, i hracium iſtud ſatum mature, ſerò erumpit, ac augeſcit: et quod mature apud alios ſeritur, ſerò apud alios exit. Conſuetudo enim uelut natura effecta eſt. Nam, & quod in Aſiano agro Aepiſynangis uocitato habet uim diſrumpendi, quodq̃ magnitudine nuclei eſt, agri proprietate, naturæq̃ uires eiufmodi ſortiuntur: nec aliò translata ſeruari incōmutabilia poſſint. Quod enim de uitibus aiunt, quot agrorum genera, totidem & uitium eſſe, hoc uere in uniuerſum aſſeri poteſt. Nec minus locum habet in cæteris, ſi quis cum agro, cœli quoq̃ adiſciat qualitatem. Hinc enim fructuū diuerſitates exultant, quanq̃ ſeminibus poſitis ex eadem parente petitis: hinc deniq̃ ſterilitates ſequuntur, cum planta in alieno agro nequeat hoſpitari. Cum enim ex duabus, aut etiā pluribus rebus, quæ uim habeant, quicquā conſiterit, pro ratione differentiæ rerum illarum, totum quoq̃ diſſerre neceſſe eſt. Quod etiam in genere animalium euenit: nam & in mare, & ſœmina, & agro, & aëre, & omnino alimentis differentiæ capiunt. Itaq̃ generū proprietates exultant, & ſæpe euenit, ut quod negaret natura, legē naturali proueniat: cum ſcilicet diu permaſerit multiplicatūq̃ ſit. Sed cōmune hoc eſt, atq̃ uniuerſum aſſeritur. Frugum autem differentiæ ob eas, quas retulimus, cauſas, oriri ſolite ſunt: nam & celerioris cōſummationis apud nōnullos, ut in Aegypto, menſe priuſquā in Græcia perfici poſſunt, clementiā habilitatemq̃ ad alendum aëris cauſam dixerim. Ad ſummam, omnis ratio ex his duobus petenda eſt, uidelicet ſolo, & aëre, ut dictū iam eſt: quod enim in Melo in cōſummandis frugibus euenit, ut qui nouiſſimo ſeruifſet, cum primis metere poſſit, agri habitudini fertili tribuendū eſt. Aëris enim ſimilis omnino percipitur qualitas. Nam quod nō pari tempore ſemina perficiunt, ut animalia, qualiſcunq̃ regio ſit, minus admirari debemus. Genus etenim animalium, quę potiſſima ſint principia, in ſe habet: ſemen autē & planta, ex toto ſua principia uel omnia in aëre potiſſus habet, uel certe ea quidem, quæ ad germinationē, & omnino ad generationem, corruptionemq̃ pertineant. Quāobrem qualis fuerit annus, talis & fructificatio cum cæteris in rebus, tum in celeritate, tarditate ue ſequitur. His reſponderet quodāmodo, nec procul eſt ratio, qua nullū ſemen, nulla penitus planta prius mouetur, ſed normam ſuæ regionis ſemper conſeruat: quod de ſeminibus pleriq̃ admirantur: quoniā ad æſtatem nōnulla permaneant, nec poſſint ullo pacto corrumpi, quāuis imbres, ſerenitatesq̃ fuerint. Non enī pullulaſſe, minus diſſonat rationi, cum complexū non obtinuerit ſibi conuenientē. Cauſam uero firmitati ambientium non inepte tribueris. Sunt enim alia lignoſa, ceu ſemina florum: alia tunicis inteſta permultis, alia tutelæ alijs eiufmodi præmunita: & hæc cōmunia naturæ quodammodo intelliguntur.

Quamobrem ſemina coſtilia, & incoſtilia ſiant.

Caput XIII



E ſeminibus uero quærendū eſt, quāobrem coſtilia, & incoſtilia ſiant. Vtrum ratione agri, an aëris, an certæ affectionis: & omnia ne, an aliqua tam perdura effici poſſint. Fabis enim, ac lenibus id potiſſimum euenire uidemus. Fit ſæpe, ut & ager aliās coſtilia, aliās & incoſtilia ferat, tamen ſi eodem modo colatur: & ex continuis ſegetibus ſulco tantummodo arcente, altera coſtilia proſert, ſemina quoq̃ aliās ex in-

coctilibus coctilia prodeunt, aliās contrā ex coctilibus incoctilia, ut in exortu, germi-  
natione, crassatione, copia, bonitateq; nihil interfit, utrum coctilia sint, an incoctilia.  
Ergo de his, & si quid aliud possit huic quaestioni subiūgi, primum illud dicendum,  
quod coctile & incoctile, ad seruefactionē, resolutionēq; atq; (ut summam dixē-  
rim) ad nostri usus rationem dici solitum est. Quod enim resolui facile potest, & co-  
ctura celeriter immutatur, id coctile est: contrā quod resolui, immutariq; nequit, uel  
quod agre mutatur, hoc incoctile est. Tale aut sit utrunq; necesse est, si alterum ra-  
rum, molleq; sit, alterū densum, durumq;. Sic enim alterum caliditatem, humidita-  
temq;, quibus resolutio agitur, suscipere ualeat, alterum nequeat, sed sua densitate,  
duritateq; indomitū semper resistet. Cum igitur coctile, & incoctile ad hunc modū 10  
distingui debeat: animaduertendum, quibus nam rationibus ea ipsa eueniant. Sim-  
plex igitur, ueraq; ratio illa est, quā & inter primas disputationes reddidimus: quod  
alimenti causa hac omnia facit, id est qualitate, quantitateq; eius. Sic enim ali-  
mentum cōmutare nimirum potest. Euenit namq; ut quā in locis calidis, stercoro-  
sis, tenuibus, soli q; expōitis sint, alimentū leue, atq; facile habeant: itaq; fructum ra-  
rum, mollemq; praestant. Hac enim de causa non nisi coctilia sunt in Lemno, quia  
huiusmodi solum est: quippe omnino agrum eiusmodi coctilem quidā appellant,  
atq; in eo coctili fieri coctilia uolunt. Sunt & quā affert Aegyptus coctilia, soli &  
aëris causa: calor enim coctilitati atq; omnino digestionī perneccessarius est. Quā-  
propter quā stercorantur, antecedere ea, quā non stercorantur, uicenis ferme die 20  
bus autmant. Quā igitur agro seruenti, leuiq; proueniunt, his de causis coctilia  
sunt: contrā quā terra frigida, spissa, lenta, & quasi figulari, atq; etiam pratensi, ma-  
dida, & palustri exurgunt, omnia hac incoctilia propter copiam, uiresq; alimenti,  
& densa duraq; sunt ex permissione terrenā, atq; frigidaē partis. Congelatio enim  
& condensatio, ex eisdem quibus induratio fieri solet: ex quo fit, ut locis palustribus  
atq; praemadidis, inutilia ex toto creentur. Nihil enim remitti in aqua possunt, quā-  
obrem nō nisi suum pabulo sunt. Has ferē causas tribuere solo debemus. Sed cum  
aquā quoq; coelestis, & aëris qualitas alimentū augeant: idcirco imbribus incoctilia  
potius sunt, utpote cum plus alimenti, & crudius subministraretur. Hoc enim idem  
propē solum quoq; eiusmodi facit, & aër si ea frigiditate sit, quā nō flatilis, sed aqua 30  
tilis quadam constet: sic enim coaget, spissabitq;. Cum igitur causā in hac digerenē,  
nihil uetat, quo minus ager etiam idem, aliās coctilia, aliās incoctilia ferat, ubi scilicet  
pluuiā, ac coeli conditiones nō similes, sed aduersē inceserint. Etiam segetum, quas  
sulcus tantūmodo disgregat, altera coctilia, altera incoctilia facere potest, siquidem  
solum diuersum sit. Ut enim in metallis, sic & in aruis putandum, uenas spaciari ut-  
cinas, diuersas inter sese, quā suis uiribus differentias reddere possint, tamen si aëris  
idem status seruatur. Itaq; interdum segetis quoq; eiusdem aliquam talem esse parti-  
culam patitur ratio naturā. Idem eueniet, & si aëris, flatus ue frigiditas talis accedat,  
ut uel totum, uel pars concrecant: quod etiam in corruptione euenire uidemus,  
cum alia diuersa, alia similia sint, & si qua in ipsis seminibus dissimilis habitudo sit. In- 40  
firmiora enim facilius affici certum est. Infirmitas autem uel natura fieri possit, si  
quam mutationem receperit.

*Cur in eodem caule, in eademq; siliqua, fabae aliae coctiles, aliae incoctiles sint: ac de fabis circa Phil-  
lippos. Item omnia legumina coctilia, & incoctilia fieri, non tantum fabam, ac lentem. Nec  
non unde alia meliora, alia deteriora eueniant.*

Caput XIII



Va de causa nihil prohibet inter fabas caulis eiusdem, alias coctiles esse,  
alias incoctiles. Idem & in eadem siliqua euenit, ut quidam referunt, si  
uere aiunt. Etenim fieri potest, ut alia ualida, alia inualida sit. Fabae infir-  
mitatis argumento uel illud potest deduci, quod sola mutare suum colo-  
rem ui-

rem uidetur, ut nigra ex candidis efficiatur. Concretionem uero, condensationēq;  
 esse ui frigoris, quæ incoctilia reddat, testificare illud quoq; uidetur, quod apud Phi-  
 lippos euenire fabis solitum est. Flarus enim in eo loco uehementer frigidus est, &  
 fabę incoctiles plerāq; efficiuntur. At si in paleis torrefactis in area relinquuntur, ni-  
 hil se mutant, sed incoctiles permanent: cum enim à paleis, tum suo mutuo conta-  
 ctu teguntur, simulq; terræ calore conseruantur. Contrā, si exaltentur, sublimescēq;  
 capiantur, flarus amplius ualeat, nulloq; tegmine defendente, facile subit, atq; coa-  
 git: tum etiam dispoliatæ tunc primum suis paleis, & calore circunplectente destitu-  
 tæ, infirmissimæ fiunt. Magna autem cōmutatio mouere plurimū potest: sed si pōst,  
 10 quā tempus præterijt, & quasi firmitus sibi iam consistere, diuentilentur, nullam  
 offensam ex flatu capiunt. Iam enim, & putamen ambiens id robustius factum est.  
 Incoctiles autem effici, si diutius relinquuntur sub diuo, ut quidam aiunt, ratio est.  
 Plus enim quā modicum sit, refrigerantur, simulq; indurantur. Huic proximum  
 quodāmodo est, ut pluuia, quæ protinus à satione secuta est, incoctilem reddat: qđ  
 enim in pullulando infirmam inuenit, rigere uehementissime facit: quod quidē ad  
 cocturam, non ad exortum enoxat. Nec temere dixerim eorum alterum esse, alte-  
 rum abesse, cum uis illa in alijs, propterq; alia sit. Tum enim infœcundum, & ger-  
 minis sterile, uel difficulter aucile quicquā redditur, cum initia generationis urun-  
 tur. Ex coctilibus quoq; satis, iterum incoctilia fieri, ratio est: nam ab eisdem aduerso  
 20 modo dispositis, non temere facilitas percoquendi proueniet. Itaq; si aer, aqua, & so-  
 lum ita se habeat, quidnam causæ sit, cur non semina quoq; mutantur. Sin autem  
 euenit, ut putamen coctilium remittatur, incoctilium obtendatur, ut quidam aiunt:  
 & altera oscitate colorem suum immutent, altera minus, & solutiora cum demetun-  
 tur, coctilia reddantur (etenim id quoq; narratur) nihil absurdum: quippe obten-  
 tio illa duritie concretionis, crassationisq; est: quorum nihil alienū ab ijs est, quę sunt  
 incoctilia. Et nihil immutari oris halitū posse, illius sanē est, quod prædurum, indo-  
 mitumq; possit persistere: aduerso autem reddi aduersum debet. Minus quoq; in  
 meise resoluī, duritie, concretionisq; datur. Quod enim durum admodum est, resol-  
 30 uti haud facile potest: quod etiam in area si euenit, incoctilia fieri quidam dixerūt:  
 sed hoc minus uerisimile est. Solis etenim siccitas, etsi minus suauiā reddit, coctilia ta-  
 men nihilominus, sed magis potest efficere. Cæterum si uerum id etiam est, prioria  
 bus rationibus nihil repugnat: nec quicquam dissonat, si cum uetustescunt, incocti-  
 liora reddantur. Sicciora enim sic quoq; efficiuntur, tam ex aëre circunfuso, quā  
 exhalatione humoris interni. Celerius quoq; magisq; corrumpi, quæ coctilia sunt,  
 ratio exigit: dulciora enim hæc sunt, & proinde magis possunt animalia gignere.  
 Concocta quoq; eadem plenius sunt, quod etiam ipsum facit ut celerius immuten-  
 tur, & hæc dari prædictis rationibus possint. Sola autem ex leguminibus, uel etiam  
 ex omni frumentorū numero fabam, & lentem incoctilia fieri, falsū dici existiman-  
 dum. Sed quod hæc maxime experimur propter usum frequentem, hinc sola hæc  
 40 incoctilia dicimus. Cæteris item mola frangentes uti solemus, his autem integris,  
 quæ certe non parua differentia est: etenim si attenuatis ijs quoq; uteremur, non  
 æque incoctilia esse percipiamus. Igitur & in cicere, & in reliquis incoctilitas depre-  
 henditur. Cæterum si quis illa tantummodo incoctilia esse contendat, nec istud irra-  
 tionabile est: sunt enim cæteris ferme debiliora: debile autem facilius affici necesse  
 est. Quod uulgariter queritur, quamobrem ea, quæ cornu contigerit, incoctilia fi-  
 ant, Nunquid stulta omnino quæstio sit: lapis enim multo durior est, cui semina sæ-  
 pe occurrunt: & nullo minus incoctilia fiunt, etiam si in cornu nihil offenderint, nec  
 bobus arerur. Atq; de his satis. Quæ aut ex congeneribus non unā cum cæteris ex-  
 eunt, sed multo pōst (ut dictum de beta est) proximam huic causam habent, ut ante



iam diximus. Quemadmodum enim ad coctionem, & omnino ad seruesactionem incoctile aliquid est, ita etiam ad exortum, germinationemque esse potest. Et hoc enim seminum imperfectio quædam est, pariterque in omnibus euenit. Verum de his cogitandum amplius est. Validiora, uegetiora, suauiora, insuauiora uel, atque ad usum cibarium meliora, deteriora uel, pro locorum natura redduntur, ut diximus: quod sicciora, spissiora, constantioraque procreantur locis montuosis, quam planis, atque etiam magis, quam pluuijs. Sunt enim illa spirantiora, & in uegetando temperantiora: non enim cum semina plurima, crassissimaque euadunt, suauia quoque eadem esse necesse: sed alia opus est habitudine. Sarratio quoque plurimum conferre ad suauitatem uidetur, luuat & uegetiora demeti, humore namque uniuerso consumpto, cum ad cibum deteriora, tum minora efficiuntur. Legumina uero, & ut melius legantur, uegetiora demetuntur: arefacta enim defluunt. Lupinum post dies feruentes aëre humefactio, mane demetitur, quoniam si prius tangatur, decedit, & capi non potest: sed hæc operarum potius præceptio est, naturæ officio illa dari oportet. Flatum inter esse crassare semina, & aquiloniorum, ad summamque frigidorum præcipue: aduersos his extenuare, atque corrumpere constat. Pereunt quædam imbre, flatuque in tempestiuo, ut de cicere florente retulimus. Faba, triticum, atque hordeum etiam post florem, si adhuc humida, tenellaque afflatu uehementer uexentur, facile pereunt. Educitur enim quod in his tenuissimum est, & conflata inter se euanescent. Cum euauerint, pluuia secuta hordeo nocet, tritico prodest. Hordeum enim nudum, et omnino debilius est: triticum contra tunicis instructum, densius, ac robustius est: ut illud paruo indigeat alimento, & ferme tanto duntaxat, quantum æris opera minifiretur: hoc largius agi exposcat. Item triticum, quia ualidius est, alimenti copiam uiuacit, magisque excoquit, nec nimium recipit suæ causæ densitatis. Hordeum contra plus attrahit pabuli, quia rarum natura est, idque excoquere nequit, quoniam inualidum est, & cum riguum imbre fuerit, sol una cum aduentitio humore internum quoque, & proprium educit. Et a flatibus uero concussum, magis hoc perditur, utpote quod imbecillius est.

*Cur frumentum demissum condatur in metas. Curque erugo triticum, hordeumque magis infestet, quam ceteras fruges. Item cur faba eruginem inter legumina maxime sentiat. Deque uermiculatone frugum.*

Caput XV



Ed quaeritur quamobrem frumentum, quod crassum, & iam siccum propemodum demissum est, si expandatur, non solum non melius, sed etiam deterius fiat: Sin autem componatur in metas, crassius, meliusque efficietur. Nonnulli etiam aquam conspergere assolent. Ratio, quod tunc humescit. Secutus etiam sol deterius facit, cum alieno humore proprium quoque educit, itaque comprimit semen. At cum in acerruum extructum sit, uapor terræ pretenuis atque animalis, semina subit, crassioraque reddit. Quod idem etiam euenit, cum in horreis fuscum repositum sit, & mensuram hinc auget: uaporem enim prætenuem ascendente recipiens, coalescit. Quamobrem alte demittunt, ut plus uaporis obrineat. Hæc igitur rem confirmant, atque etiam terra, quæ infecta in corruptum tueretur, ac tumefacit. Adde etiam quod semina ipsa per se, sine ullis radicibus, nutrimenti aliquid possint attrahere: unde fit, ut & a flatibus, & ab aëre semina uegetari possent, non & temere credas. Erugo quauis commune omnium uitium sit, tamen frumenta magis infestat, & magis triticum, atque hordeum: quod alterum nudum est, alterum tunicis integitur pluribus, & folium spicæ gerit proximum, unde frugem suam effundit: residet enim in eo humor putrefactus, qui eruginem creat. Adde quod spicam gerat etiam, densioremque: hinc enim humor minus potest

nus potest defluere: qua de causa spicam aliquantulū inclinari melius est. Sic enim quod continuū est, dissolui, atq; decidere celerius potest. Hæc eadem causa reddenda etiam hordeo est, scilicet cæterorum omnium comparatione. Habet enim prædicta omnium maxime cæterorum. Faba inter legumina magis eruginem sentit, tum quia folia multa undiq; gerit, tum quia densa obleritur, tum etiam quia humorē maxime ad se trahit suæ raritudinis causa. Adde quia fructum terræ proximiorē gerit. Putrescunt enim inferiora potissimum, quoniam minus persilantur. Et ad summam, legumina huiusmodi omnia eadem facilius abolentur. Erugo autem putredo quædam residentis humoris est. Quamobrem si copiosæ pluuiæ fuerint, erugo nulla consistit: diluitur enim, atq; detergitur. Sed si stillicidia, uel etiam rores plures inceserint, folq; secutus sit, flatusq; desit, nimirum putrent. Quapropter locis editis, commodeq; persflatis, minus erugo creatur: cauis rorulentisq; magis, & plenioribus: quoniam lunæ quoq; caliditas putredinem auget, & omnino aer humidior. Sed omnium fragilissimum pisum est, quippe eruginem uehementissime sentit, quia multifolium, terrenum, amplum, uagumq; est. Implet etenim locum totum, etiam si amplo interuallo positū sit: & frigoribus, atq; gelationibus id obnoxium maxime, quia radice imbecilla cohæreat. Vermem maxime sentiunt triticū, atq; cicer, uerum nō eadem parte utrūq; sed alterū in fructu, alterū in radice: ambo tamē dulcedinis causa: cicer abluta fælugine, uti retulimus, triticū radice humefacta. Euenit uero, ut triticum bestiolas ita gignat, quia dulcius, quā hordeum est: qua de causa palea quoq; huius furuior. Vermis generatus in eo, ubi alimentū assumpsit, quod in culmo est, spicam aggredit, & uel totā erodit, uel alterā partem. Sed hæc, cæteraq; eiusmodi uel in loco morbi habenda sunt, quorū causas assignare haud difficile est.

*De satu, rationeq; fructuum æstiuorum. Curq; fertilissima sint, quæ fructum exiguum pariunt. Item quæ optime reponantur: & quæ corrupta bestiolas non creent. Cap. XVI*

**I**Æstiuus autem fructibus, seu sesama, triono, milio, panico, dictū facile id cuiq; est, ea uidelicet, quia imbecilla sint, & perici celeriter possint, tempore feri æstiuo. Sed quænam sit eorum natura, quærendū. Neq; enim terram sapit, quemadmodum illa leguminum, neq; leuior omnino. Sesama enim pinguiuscula est, coctionemq; desiderat, & hæc radice singulari cohæret: at milium numerosa radice, altaq; est, ac multiplici culmo exurgit. Itaq; cum alimentum, uiresq; in partem digerantur utraq; diuturnius esse debet. Sesama enim quia stirpe simplici, altaq; sursum uires suas omnes intendit. Sed repugnat huic illa pinguedo. Lenra enim, glutinosaq; plus excoctionis desiderant. Hæc autem (ut dictum iam est) fecundissima omnia sunt. Ergo de his cogitandum latius est. Cum uero ex toto propemodum, quæ fructum exiguum ferunt, fertiliora sint ista, quæ modo enumerauimus: & lens, & reliqua generis eiusdem: atque etiam illa, quæ fertilissima uocitantur, ut cuminum, atque papauer: denique omne olerum genus, & quæ in uasculis fructificant: quærendum, quænam eorum causa sit, utrum quia minora sunt, confici possunt facilius. Nam & animalia quædam talia esse uidemus, præcipue quæ oua, uermesq; gignunt. At ratio hæc extrinsecus, aliquam uero interiorē petendum. Nam ea quoque re ab animalibus differunt, quod illorum oua ab aëre circumfuso aluntur, perficiunturq; omnino grauida feru redduntur, ut inter priores rationes retulimus: at fructuum educatio, atq; perfectio, in ipsis plantis peragitur, ut uiribus assidue melioribus opus sit. Omnium optime reponuntur milium, panicum, sesama, lupinum, cicer. Milium, & panicum, quia tunica multiplici integuntur, & sicca sunt: sesama, quia pinguis: lupinum & cicer, quia amaritudinem quandam, & acridinem habent: quæ quidem quali-

rates seruare impune possunt, ut dictum est. Quamobrem & corrupta hæc, nullas bestiolas creant, quemadmodum nec semina olerum. Etenim ea quoque nulla animalia contrahunt, nec quaecumque sicca, & acria. Euenit namque, ut ueluti permistio quædã alimenti extrinsecus fiat. Singula pro suo humore peculiare animal creant, ceu triticum, atque hordeum curculionem: fabæ, quod aliqui midam uocant. Simili modo & lens, lenticula, pisum, & alia. Ratio communis plurimum est. Non enim solum in fructibus, uerum etiam in arboribus, atque etiam in lignis, atque ad summam, in omnibus inanimentibus, quæ bestiolas gignunt, uaria specie foeticatur, utpote ex alia atque alia generandi materia.

Quo modo triticum putrescat, hordeumque, & faba. Item quæ non marcescant. Ac cur frumentum contusum, uetusque, feruenti perfrustum aqua pullulet. Cap. XVII



**T**riticum puluerulentum putrescit celerius: & quod in domicilijs opere rectorio leuigatis conditum est, celerius, quam quod non leuigatis conditum est: quoniam id caloris plus sentiat. Puluis enim calidus est, utpote siccus, & illimentum calcis calorem susceptum utique seruat. Nam & cum uniuersum, altumque aceruatum est, putret. Sic enim plus calor exoritur. Hordeum multo celerius, quam triticum tunditur: quia solutius, ac nudius est. Sed celerrime faba: protinus enim à messe condita perit non nusquam, ut in Thesalia. Prorsus perinde ac loca ualent, semina durare posse appareat. Seruatur enim apud nonnullos faba omnino indomita, ceu apud Apolloniam, & Tarentum (ut inter historias dictum est) & contusam reparari posse affirmant. Sed de hoc cogitandum. Nonnunquam sponte suæ naturæ tunduntur, lupinum, milium, auena, lolium, sesama: alia, quod plenè id habeant, quod arcere, tutarique possit, ut cicera, hæc tamen, & sicca, atque calida est. Frumento sponte contuso præsentissimum remedium areæ illatum peruenit. Horum rationes hinc peti oportet. Quod autem à quibusdam quaeritur, quamobrem contusum, uetusque frumentum, aqua perfrustum feruenti pullulet: sic enim periculum faciunt, an uim habeat pullulandi: putrescens autem nunquam germen emitte ualeat, quanquam putredo quoque humore, caloreque fieri solita sit: hoc per æquiocationem esse ambigui, prorsus appareat. Calor enim, cui uis corrumpendi datur, plurimum differt ab eo calore, qui uim obtinet generandi. Et de humore pari modo loquendum est. Calor autem, qui putredinem creat, alienus, aduersusque est. At qui feruenti aqua inducitur, conuenit, ac modice applicatur, quemadmodum frumentum desiderat, quod germinaturum est. Nam simile quodammodo est, ut si quis quaerat, quamobrè calor, & humor, modo sanitatem, modo morbum corporibus faciant. Constat enim, quod non ut idem, sed diuersi, aduersique illud faciant. Aqua uero feruenti solent perfundere, propter seminum imbecillitatem, ne quasi gelentur, quoniam celeriter sentiunt. Nam penitus quod corruptum non est, uel frigida pullulum ostendere potest. Accidit uero, ut & tondantur, & putrescant causa alieni caloris.

# THEOPHRASTI DE CAUSIS

## PLANTARVM LIBER QVINTVS.

*De operositate in plantis: et quæ præter naturam parari arte queant. Ac de ficorum generibus plurimis: Curq; aliquæ præcoquant.* Caput I



FORVM quæ in arboribus, plantisq; fieri solita sunt, alia sponte  
 10 proueniunt, alia paratu, & opera hominis existunt: quæ utraq;  
 digerere item possumus. Eorum enim quæ sponte procedunt,  
 alia natura consistunt, alia præter naturam: quippe cum in plan-  
 tarum etiam genere quiddam eiusmodi, ut in animalibus fiat:  
 ceu si quid non sibi germen conueniens, fructum ue tulerit:  
 aut si non suo tempore, aut si non partibus solitis, aut si eiusmodi  
 aliquid commisum sit. Hæc enim omnia natura penitus negat. Quæ uero ars,  
 curaq; affert, aut fauent naturæ ad fructuum bonitatem & copiam, aut proprietatem,  
 operosamq; naturam fructuum creant: ut cum uua sine uinaceo exoritur:  
 uel cum ex eodem palmitis nigre, candidæq; uuæ proueniunt: aut etiam cum in eadem  
 uua coloris illa eadem exultat uarietas: & quæcunque eiusmodi alia facere  
 consueuerunt agricolæ: sunt enim complura. Sed cum de ijs, quæ secundum naturam  
 20 sunt, quæq; naturam adiuuant, antè iam disputatum sit: superest, ut de ijs,  
 quæ præter naturam eueniunt, quæq; operose excogitantur, disseramus: & primum  
 de ijs, quæ præter naturam uel certò sunt, uel esse apparent. Nam eorum  
 quoque ratio est, ut cum intempestiue fructificatur, nec de eisdem fructus proueniunt,  
 ceu si quando ficus per hyemem Vere appropinquante fructum attulerit:  
 & punica, uitisq; ramis prægrandibus, uel caudice fructificauerit: & quicquid his  
 proximum. Igitur ad hæc ipsa sumendum in primis est, illis duntaxat hæc accidere  
 posse, quæ humida, atque fertilissima sunt, qualia prædicta quoque patescunt. Humida  
 enim, ac fertilissima hæc omnia sunt. Siccis enim, minusq; fertilibus nullis eueniunt.  
 30 Secundum ad germinationem, fructificationemq; intempestiuam subiaceat,  
 aliqua germinandi principia obtinere ramos, siue scapos, siue stipites, siue quod  
 tandem placeat partes postremas arborum nominare. Nullum enim uocabulum  
 commune omnium est, sed aliæ proprias quasdam appellationes sortitæ sunt, ut  
 thalia, crada, palmes. Quod aliqua germinandi principia obtinent, constat ex ijs,  
 quæ defixa, germen sæpenumero emiserunt, quanquam ima pars nullis penitus  
 radicibus niteretur: ut uallum uitineum, & ficulneum, & oleagineum. Interdum  
 etiam non defixa, sed à parente decisa tantummodo germinant, ut palmitēs, & lig-  
 gna oleæ. Tertium ponatur, germinationem intempestiuam fieri posse hyeme  
 40 placida, austro ue sequente. Ex his enim minime irrationabilis euentus talis appareat,  
 cum uis generandi, humorq; fecundus aggregentur, aliàs per se, aliàs ex  
 parte residua humoris prægressi, quo fructus prodierat, quemadmodum etiam in  
 fico. Cum enim plus illius humoris in hac superfuert, aer mitis, tepidus, humidusq;  
 secutus, mox germina euocat. Quod ita fieri constat profectò ea ratione,  
 quod fructus posteri de parte eadem nascuntur, qua præcoques: & forsân præco-  
 ques etiam ipsa aëris mollitia præcurrunt, maturanturq; celerius. Sin autem minus  
 hoc ita sit, ac cætera omnia hisdem, proximis ue de causis ueniunt, id est alia  
 quibus humoris residuis, uel alijs ex integro consistentibus, uel etiam ratione utraque.  
 Est enim natura eius arboris ad utrumque aptissima, cum humida sit, pro-  
 naq; ad partum. Itaque si tempus serenum diutius fuerit, colorisq; immutatio trahi-  
 tur, Succus enim haud excoqui potest, sed maturitatis imaginatio in colore tantum

ferè est. Caprificus tamē iuuantē iam tempore maturari aliquatenus possunt, quas etiam ipsas secundū naturam quodāmodo esse censendū est. Semper enim eodem, certoq; tenore temporis solent enasci, sicut & fructus earum ficorū, quas biferas uocant. Verum similitudinē cepisse eouq; par est, ut proxima quēdam omnium ratio notescat, scilicet ex collectu uirum, atq; humoris. Quāobrem ab auersis folijs hæc omnia enascuntur, nō ab aduersis, quemadmodū ficus erumpit. Quæ præcoques pariunt, imbecilliores sunt, ut differre non ualeant, factō illuc impetu humoris. Omīno genus ficorum multiforme quicq; & uarium est. Aliæ nanq; caprificus tantummodo ferunt, ficus aut nullas, ceu illæ, quæ caprificus candidas cibo idoneas afferunt. Aliæ tam ficus, quā caprificus nigras uel ingustabiles, uel cibo idoneas pariunt à tergo folij, caprificum tamen ab auerso folio generant. Culices quoq; creare solitæ sunt, quæ caprificus nullas penitus ferunt. Item quædā præcoques gignunt, ceu laconica, & leucomphalia, & plures alię quēdam minime. Nec earum, quę gignunt, differentia continuo, sed diuerso habitu est. Alias enim gignunt, alias nō gignunt: ferunt nō modo apud foliū ipsum, uerum etiam multo inferius: nonnullæ etiam ex parte admodū crassa. Euenit, ut aliquæ posteriores quoq; nonnullas præcoques ualeant maturare. Non enim omnes simul, sed alias prius, alias paulō ante caprificus ferunt, quæ certe proximiores germini, atq; ficibus sunt: sed prius decidunt illæ, minusq; concoquuntur. Quæ fisis eueniunt, hæc sunt: nec temere quicq; euenire appareat. Non enim omnes præcoques ferre, sed eas duntaxat, quæ humidiores sunt, uiresq; ad trahendū obtinent. Ratio est, quoniam ex alimentī residuo poma eiusmodi pariant: nec procul rationi est, humorem totum minus excoqui potuisse, cum uires plus attraxerint, quā percoquere possint. Accedit autem his ipsis intercapedo, quia non semper eodem habitu sint: debiliorem enim, ac deterius cultam minus humoris posse capessere certum est. Quod si copiose nihil hauserit, nec relinquere quicquam posse sciendum. Nam si pariter culta sit, cœlumq; fauerit, nihil est quod etiam anno sequente proferre nequeat. Interdum si cura defuerit, eueniet illud quoq; ut præcoques ferre possit, fructum autem nequeat. Quod propterea euenit, quia alterum iam pridem confectum, paratumq; adest: alterum tanquam denuō confici opus est. Nec eas, quæ ex crassa illa prodierint parte, percoqui potius quā summitate enatas, ratio uult. Alimentum enim & calor summa potius petere solent, atq; omnino arbor ad germen producendū enititur. Itaq; cum unā etiam calor sursum feratur, utraq; sit ratio, ut pars aliqua relinquatur. Quamobrem & germinationes, & florum particulatim prouentus, & fructificationes posteriores sunt. Sed de his satis dictum est.

*Cur uites aliquę prouentus suos accelerent: curq; partes insolite interdum germinet. Cap. II*



Roximum autem huic quod uitibus euenit, nam illæ quoque germen suorum prouentum nonnunq; accelerant, collecto illo fecundo, germinatoreq; humore. Locus tamen germinandi certus ijs est. Gemma etenim dehiscēte germen emergit. Augescit uero, proinde ac cœli qualitas, & temporis spaciū fuerint. Omnia fermē, quæ natura sua uel germinant, uel florent, hoc idem facere assolent. Quæ enim propere concepissent, sape tempore inuitante sereno, ante statum tempus pariunt, atq; educant, dum cœli feruetur æqualitas. Igitur germinationes intempestiuas his de causis fieri arbitrandum est. Illas uero, quæ non parte solita, sed uel ramo prægrandi, uel caudice agantur, haud procul his esse credendū. Cum enim uis generandi in eas partes sese collegerit, mox germen exoritur: quippe cū ibi principiū id cōstitit, affluens alimentū subiecto assimilatur, necesse est; ut uel in cæteris fieri solet. Nec temere col-

leſtus ille conſiſtit, ubi quiſquā eiufmodi habitus conditus fuerit. Sed longe probabilius, quā in genere animalū agitur, cum ex pectore cornu erumpit, uel cum aliquid eiufmodi euenit. Hæc enim diuerſitas maior eſt, quo plantæ magis, quā animalia partibus conſtent ſimilibus. Si uero, & germen aliquod præcurrerit fructui, minus admiranda res utiq; ſit. Interdū enim uel palmes de caudice prouenit, qui ſi cum uires ceperit, fructū præſtat, nihil temere faciet. Sed abſurdius certe cum fructus ipſe uel ramo prægrandi, uel caudice promitur, quod puniceis euenit: cauſam tamen prædictā eſſe illam exiſtimandū. Diuerſitates autem huiuſcemodi minus à ſolito diſcrepant, cum diſcrimen cōmittitur loci, ut cum ficus fructum ab aduerſis ſolijs tulerit. Cōmutatio enim parua hæc eſt, nec locus iſte alienus omnino ab eiufmodi euentu percipit. Ratio enim, quod aggregatio imbecillia, confluxus in eam partē ualidior fuerit. Itaq; humoris collectu iſto ſeriere pomis præcoquibus arbor digeſſit, atq; exarat: quin & illa ratione minus abſurdum id eſſe appareat. Eſt enim genus quoddā eiufmodi, quod auerſiferū uocant. Enim uero ſi quid congener fructum ita natum ſit parere, cæteris quoq; aſſociatis idem euenire interdum haudquaquē abſurdum eſt, ſcilicet ubi ſimilis condita fuerit habitudo. Nam & ramis prægrandibus aliā quādo tuliffe, ſi qua fertilis ac ualida ſit, ſimilitudinē quādam ſici egyptiæ reſert: quippe cum illa fructum ſuo caudice ferat, quoniā fertilis, ualidaq; ſit ad fructificandū. Huius enim argumentū illud poteſt deduci, quod ſæpius paribus ferat eiſdem, fructu decerpto priori: nec plenē maturitatem fructus capere poteſt, niſi ſcalpatur, perungaturq; oleo (ut dictum eſt) propter aſſluentia pabuli. Scalptu etenim ſiſio aliquid humoris detrahitur, & oleum ſeruſfaciens cum ſole, pomum apertum celeriter coquit. Proximū id quodāmodo illis uidetur, quæ particulatim floreſcunt à parte ima exorſa. Etenim, quæ inter ea uiribus ualent, & quaſi perfectæ ſunt, partim florent, partim fructificant: quæ imbecilliora ſunt, uel parte ſuperna augeſcunt, & germinant, quodq; aſſidue perficitur, floreſcere incipit. Alimenti uero influxum pro ſua natura, ſuiſq; uiribus unumquodq; diſpenſat. Quod ſi perfectum, atq; ualidum ſit, fructum parere continuo incipit: ſed imperfectum, ac debile ante augeſcit, corroboraturq; quā aliquid pariat. Et de his hæc dixiſſe ſat eſt.

30 Vnde uariatio fructuum in eadem planta proueniat: unde etiam uarietas in radice plantarum, & aliæ mutationes eueniant. Caput III



40 Ruſtum immutationes, ſi qui uel ex candidis tranſeant in nigros, uel ex dulcibus in acutos, aut e contrario, quemadmodū fico, uiui, atq; puniceæ euenire prodiit eſt, locis quibuſdam nulla in admiratione ſunt, neq; ullo modo abſurdæ uidentur: quoniā natura alias hoc modo, alias illo, & partibus quoq; non pariter ferat, ut in uite ſumida uocitata, pateſcit. Hæc enim uuas alias candidas, alias nigras aſſerre uidetur: & alias omnes candidas nigras ſue promiſcue generat. Quamobrem nec augures hoc iudicare tanquam oſtentum conſueuerunt. Quod enim ſolitum, oſtentum eſſe non poteſt. Ratio uarietatis, quod color earum uuarum, neq; niger, neq; candidus eſt, ſed ſumo proximus, à quo & nomen uitis accepit. Itaq; ubi uel aliqua parua mutatio euenit, calorem omnino ſuum cōmutaſſe uidentur, utpote, quæ neutrum colorem ſincere poſſideant. Quapropter uerſicolores uuæ interdū perficiunt, ut aliæ ad albedinē, aliæ ad nigredinē potius inclinent: cauſam alimēto, uirisq; ipſius habitu reddi oportet. Hoc igitur (ut dictū eſt) concedi ex ſacili poteſt. Quod aut puniceis euenit, ſi mutatio facta totarū ſit arborum, proximū illi profectū eſt, quod in Cilicia, & Aegypto fieri perhibent, ſiquidem ſponte mutatio ueniat. Affectio enim, & uis illa, naturæ agri tribuenda eſt. At ſi non arbores totæ mutantur, ſed interdum id aliquibus eueniat,

alimento, & habitudini causa imputanda est. Sin autē enormiter tulerint, radicibus causa dabitur, & si qua pars alia principalis sit: quod alia nutrimentū aliud ceperit, uel etiam uarie coxerit, atq; reddiderit. Caelū quoq; nōnihil efficere posse credendum est. His enim ipsis de causis oriri differentias, certū est. Sed omnium absurdissimum hoc in loco partitio radicū appareat. Interdū enim altera parte uel nullas, uel certe pauciores radices arbores gerunt, quanq̃ undiq; fructus pariter ferant, scilicet alimenti quaqueuersus permissione; ceterū si quæ desint, pabulū singulis ab arbore dispensiatur: si uero undiq; adsint, suæ parti unaquæq; ministrat, cum meatus recto (ut ita dixerim) tramite porrigant sese, portioneq; radicis suæ respondeant. Venit quippe, ut pleræq; plantæ parte altera uiuant, demūq; repleantur penē undiq; alijs recreatis, alijs ob ariditatem delapsis. Sin aut palmitū quoq; diuersi generis com pactio, fidem aliquā facit, quando uitis, quæ una est, parte utraq; fructū ferat diuersum, ceu alimentū nulla fieri possit confusio, sed recto tramite fluatur assidue, uti ea quoq; licebit: hoc tamen minime fit, & fidem proinde minime facere potest. Ceteræ cōmutationes prædictis causis maiore ex parte proueniunt æque in omnibus, siue colore, siue sapore, siue aliquo alio immutent. Enimuero alimenta dispositiones arborum alterare, promouereq; possunt, uel dum superant, uel dum superant, quæ admodū etiam in frugibus euenit. In his tamen semper in partem deteriorē mutatio fit: sed in mitigatis, excultisq; similitudo planē animaduertit. Omnino (ut dictū est) paruum in his fieri posse mutationē credendum, ubi nihil ager mutatus est. Sed hæc spacio temporis longinquo perficiunt, nec annus sufficit unus, sicut in ijs, quæ ex syluestri habitu transeunt in urbanū: uel contrā, ex urbano in agrestem mutantur. Magno igitur argumento ad fidem immutationis, agrorū cura etiam est, quæ radicibus, alimentisq; adhibita, mutationē facere potest. Sed tam breui effici posse, incredibile est, nisi quis & tempus latere, & mutationē esse perexiguam dixerit. Nam in annuis quidem hoc haud temere ueniat: neq; in quibus eueniat, si quando euenire possit, æque mirandū est: ceu cum ex tritico lolii proueniat. Id enim sepenumero fit, & causam scire quodāmodo arbitramur. Imbres nanq; id possunt efficere. At si ex lolio in triticum redeat, hoc certe admirabilius est. Ergo ceu imbecillitatē quandam, uel morbū seminis intelligere licet, quæ alimenti cœliq; mutatio tollere possit, Sed hæc latius dicta sunt, quoniā ad causam confirmandā ea quoq; assumenda censuissimus, quæ latissime patent.

*Cur fructus aliquando sine folijs uisuntur: lignaq; interim separata ab sua arbore germinant: & statim lignæ interdum desudant. Item cur plantæ in plantis nascantur, & arbor prostrata interdum resurgat.*

Caput IIII



Item autem sine folijs fructū aliquādo tulisse, si ex toto dixeris, incredibile est: sed si exiguo quodā productio germine, eoq; mox imbecillitate sua delapso, uuas sine folijs extitisse inquis, res uerisimilior redditur: tanq; ad fructū edendum amplior, uehementiorq; impetus factus sit. Quod uere arboribus nonnullis idem propemodū euenit, cum abunde fructificat, ceu amygdalæ: quippe cum & propter nimiam fructuū multitudinem folia cerni nō possint, & alia imbecilla, exiguaq; prodeant. Quoniā natura se totam ad fructum generandū contulerit, sicut etiam uitis, cum floret, si sero inceperit, fructū sine folijs seruat: & ficus quoq; delapsis folijs poma diutius retinet. Cum enim fructus constiterint, firmitus adherent, quā frondes: alij ex soliditate peciolij, atq; retinaculi sui: alij quia frigore constipantur. Frigus enim humorem foliorū penitus tollit: fructum, quia largior, & calidior est, tollere ex toto nō potest, sed constitit, atq; condensat. Huic proximum, & si qua olea folijs aliquando amissis fructum attulerat:

attulerat: folium enim utpote imbecillius frigori magis obnoxium, uel alicui euen-  
tui factum est: quippe fructus maturi, sponte ruunt. Sed antè, quàm sint maturi, ua-  
lenter adhærent, quamobrem perticis oleas percutiunt. Hæc igitur cætera, quæ eius-  
modi primordia tum quædam naturalia, ex seipsis, tum ex circumfuso aëre capiunt.  
Nam & ligna, quæ sponte germen emittunt, ceu oleaginea, et quicquid generis eius-  
dem, quæ ad prodigia, ostentaq; referunt, ratione non carent. Sunt enim natura ui-  
uacia, pronæ ad germen fundendū suæ densitatis, humiditatisq; causa: quod cum  
extrinsecus liquoris aliquid senserint, quamprimū germina ædunt. Enimuero ma-  
gna ex parte obruta, & locis humidis posita germinant, præterq; si quid præcisum  
10 paulò post pullulauit, quod humorem in se aggregatū satis haberet, tempusq; unū  
germinandi proximum esset. Cui simile quodāmodo scillæ euenit, ac cæteris quæ  
suspensa germen emittunt. Proxima etiā illa, quæ de lignis nascuntur, & præci-  
pue quæ de abiete, quæ lucinas augures uocant. Aëre nanq; eblandito, atq; remis-  
so, hæc erumpere potissimū solent, ubi intestinus humor collectus, & exterus quos-  
que occurrens concreuerunt, atq; in rotundum conglobati fuerint. Adde his sta-  
tuas, quæ exudant: cælo enim austrino, humectisq; ita afficiuntur: nec omnis, sed in  
quibus aliquid pinguedinis inest, ut cedrus, cupressus, olea, quæ quidem prodigia,  
& ostenta esse creduntur. Cæteros huiusmodi euentus, quos narrant, ut laurum  
aliquando in platano surrexisse: uel in summa, germinationes, quæ in sede aliena  
20 prouenerint: hæc omnia ex aliquo latitante primordio exoriri putandum est, putre-  
dine uel aliqua immutatione facta in arbore. Ex primordio latitante inquam, si se-  
men delapsū excipiat in arbore, cōprehendaturq; putredine aliqua subiacente  
terrena. Sic enim aliud in alio nasci, & adolescere potest. Sed eiusmodi germinatio  
uisco proxima est, aut platano: quanq; est longior, quæ ex aëneo prouenerat tripode.  
Vel potius hæc omnia germinationi proxima illi sunt, quæ ex terra contrahitur.  
Nihil enim prodire potest, nisi aliqua terrena putredo antecesserit: sicut neq; ex pa-  
rieribus quicquā prouenit, nisi confluxus aliquis, putredoq; talis fuerit, qua planta  
erumpere nata sit, atq; etiā alimentum postea inluat: sic enim eorum incremen-  
tum accedit. Sed hæc sponte quoq; uel omnia, uel certe aliqua fiunt: forsitan & se-  
30 minibus delapsis putredine, collectuq; humoris fauente pleraq; exeunt. Laurus, et  
quicquid eiusmodi, fructu suo creatur. Veruntamen si hæc etiā putredine consi-  
stere possint, nihil ad causam refert: sin autem arbor aliquando tempestate prostrata  
refutibus sponte facta, & uitæ reddita est, ut in Philippis salix, & platanus in An-  
tandro, quarum alteri nihil detractum est, præterq; pars ramorum, quæ in prostra-  
tu perfracta fuerit; alteri, id est platano rami amputati sunt, & pars aliqua circūdo-  
lata. Causam hanc esse putarunt, quod arbor prostrata parte altera plurimum terre  
euulserit: mox flatus noctu ingens aduersusq; secutus eam promouerit, ramisq; oc-  
currens seq; insinuans erexerit. Sic enim euenisse in Philippis proditū est. Reliqua  
uero permota pariter est, terræq; euulsum non minus habebat: & quia detruncata  
40 est, facilius exurgere potuit. Sedenim his nulla causa naturalis reddenda forsitan  
est. Quæ aut in ipsis plantis eueniūt, ex prædictis assequi, contemplariq; tentandū.

*Quamobrem uas sine uinaceis parentur, ac in eodem palmitē uua nigra, & alba spectetur. Item  
cur uarij fructus in eadem arbore, & cur mutescant terra obruti.* Caput V



Equitur, ut ea nunc explicemus, quæ arte, paratūq; operoso efficiant:  
quorum causas cōspectiores esse aliquis putet, quemadmodum certe  
sunt. Vuas enim uinaceis uacuas faciunt, detracta medulla palmitis,  
qua uinaceū gignitur. Palmes idem uuam nigram simul & candidam  
fert, & in eadē uua acina alia nigra, alia candida coherent, cum utriusq;



malleoli dimidiam partem superiorem contuderunt: deinde æqualiter compositos, arteq; colligatos defixerunt. Sic enim compages una ex utroq; coagmētatur: quippe cum omne uiuum cum uiuo sociabile sit: & maxime, quæ societatem generis habent, cum colluxata in naturam conflantur unicam. Sed uterq; per se alimentū sine confusione transmittit: itaq; fit, ut fructus reddatur uarius, prout utriq; conueniat. Quod etiam fluuij faciunt inuicem congregientes, ut Cephissus, & Melas in Bœotia. Seruat enim uterq; suum meatum: in his tamen nec inuicem alimenta iunguntur, sed æque distantia deriuantur, & perfluunt. Hæc eadem causa est, & cum arbor uaria granata mālā ue fert. Virgas etenim malleo uelut præmollientes, ut parte contusa facilius inter se cohæreant, mox arcuissime colligatas deponunt: tum arbor una ex coitu compositarum uirgarum exurgit, sed singulæ genus suum conferuant, alimentumq; per se trahunt atq; excoquunt: nec aliud cōmune inter se quam mutuum illum complexum, coagmentationemq; gerunt. Huic proximum uel maioribus euenit, & maxime ijs, quæ natura syluestria sunt. Ficus enim, & quicquid generis eiusdem, arboris complectens caudicem cohæret, atq; unam efficit molem. Quæ quidem partim homines de industria faciunt, partim ipsa sponte unitatem eiusmodi capiunt, quæ scilicet non aduersa inter se sunt, sed mutuo deiunguntur amore. Vbi enim alterum complexum alterum sit, uelut natura unica ex ambobus consistit. Quamobrem si quis alterutrum detrahat, uel dissoluat, utrumq; exareseat, necesse est: sicut & inter uersigenera, quæ simul enata, educataq; fuerint, ut de uite fico nupta, & ipsa marita retulimus. Nam quæ suo complexu, irrepratuq; nocent, ut edera, hæc naturæ unitatem facere nequeunt. Alterum enim moriatur, necesse est. Varios igitur fructus ab eadem produci arbore his de causis opinari cōueniet. Res enim similis quodammodo est, ut si quis arborem unam furculis pluribus, ac uarij generis inserat. Primordia enim, naturasq; plures unice substantiæ inijciat: sicut illic ex primordijs pluribus natura una conflatur. Fructuum magnitudo, quos ramis suis annexos olis inclusos flexu sequaci deducios in terram obruunt, ceu punicearum, aut mālorum, ratione contingit. Quantum enim humoris à sole, aëreque detrahitur, olla coërcendo utiq; seruat, & simul uaporem ex humo attrahit fructus, quo se alere potest. Arborem enim alimentū transmittere tam intempestiue, minus rationabile est, nisi admodum parcè. Qua de causa granum punici nihilo maius effici potest, cortex autem in plenum crassefcit, ceu nihil ad illud alimentū perueniat. Sucus etenim omnium proprius ut tantum naturali confici, atq; excoqui posse uidetur. Quamobrem mālā deteriora, insipidioraq; fiunt: at cortex granati uel extrinsecus recipit incrementum, utpote qui minus naturæ conueniat. Vapouris uero attractio, qua nutrimentum, profectusq; accedit, ratione minime caret, quemadmodū ari, & cæterorū, quæ ante iam diximus. Pari modo & oleribus sanè euenit, quorum radices olitores percrassant folijs direptis quorundā: ut raphani per hyemem, cum maxime uigent, terraq; aggerata, ut nec imbres possint admitti. Sic enim per æstatem mira crassitudine distenduntur.

Quæ cura colatur apium, curq; ei cachrylium iungatur. Cur item fructus uirides cōseruentur. Tū de cucumeribus præcoquibus: & quamobrem speciem suam apium mutet. Caput VI



Pium uero radice tenus circumfodientes cachrylio plene obducunt, mox insuper terram accumulāt. Ratio, quod totum alimentū radices absumunt, nec ad germīna quicq; transmittunt: quod si diuidatur, plus incrementi sequatur, necesse est. Quæ igitur germen ab imis educere possint, ut cepæ, & quædā alia generis syluestris, radices mittūt. Sed raphanus, quia nullam uim germinandi ab imis obtinet, alimentumq; capit, quod nō sursum

sursum transmittere apta sit: idcirco subtus crassatur, amplissimaque efficitur. Causa uero, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo congestitiae datur, quæ aquam arceret, & in totum, omne quod alienum est, admitti non patitur. Aprijs uero cachrylium iungitur, quia calidum, densumque est, iuuat enim ad alimentum trahendum uis sua utique densitatis, idemque retinet, nec sursum transmittit, simulque sui caloris beneficio potest concoquere. Itaque cum alimenti copia large accedat, percoquaturque, incrementum quoque large consequitur. Eodem profecto uel ea pertinent, quæ cucumeribus, cucurbitisque euenirent in mollitia, & incremento, si quis paruos, paruasque absconderit. Sic enim nulla pars alimenti à sole detrahitur, nec flatibus resiccatur: quibus causis moles augeri non possunt: ut etiam arboribus euenit, quæ locis soli, uentoque expositis manent. His illi quoque respondent, qui in ferula, uel tubo fictili includunt: plus enim alimentum præbetur, quoniam nulla pars exhalatur, nec exsiccat. Crescunt uero in longitudinem, & quia nutrimentum facilius recto tramite fluit, et quia nihil est quod auocet, aduerfereturque. Ratio similis facit, ut uirides quoque ualeant perdurare, si quis apud puteum serat, cumque tempestiui iam sunt, dimissos in puteum bene operiat: sic enim soli, afflatus uel haud quicquam siccare potest: & aqua subdita uapor ascendens facit, ut nullam sentiant siccitatem, sed quasi recenti habitu uiuant. Durant autem diu ex pabuli facultate, quod radices assidue mittunt. Quippe radices diu uiuere possunt cura adhibita. Quamobrem si quis postquam fructificauerint, germina decidat, & radices terra tute operiat, atque conculcet, rursus ex eisdem radicibus cucumeres deproment, et multo maturius, quam qui semine ueniant: quoniam radix iam adest, & terra congesta, conculcataque tepesciens satis germen celerius elicit. Nam & temporis ipse non parum confert ad præcoquam germinationem. Argumentum hoc quoque euidentissimum, quod si quis hyberno tempore femina cucumeris serat in calathis, rigetque aqua tepida, & soli exponat, & igni admoveat, ac postea cum tempus seminandi fuerit, totos cophinos demittat in terra, præcoques admodum faciet. Et hæc prædictas causas sortiuntur. Figuram autem, & speciem suam apium mutat, si satum conculcet, cylindricum superinvoluto coercetur. Fit etenim crispum, quoniam incrementum transire facile nequeat. & uasis quoque, in quo positum fuerit speciem imitatur: quod propterea euenit, quia nutrimentum, cum prohibetur, arcereturque à uase circumueniente, fertur ad id quod aduocet, libertatemque permeandi concedit: fit enim uelut riui cuiusdam deductio. Itaque speciem uasis ambientis capessit. Euenit hoc idem quodammodo & generi animalium in magnitudine, paruitate, breuitate, & longitudine. Quippe illa formata iam sunt: hæc uero cum generentur, formam recipiunt. Quapropter cum apium transferre oportet, palum defigere tantum præcipiunt, quantum apium efficere libeat. Radix enim totum locum implere facile potest.

Quibus rationibus & radices, & germina augeri contingat. Curque scille, lentiscone inserta melius ueniant. Cur item in fisco rutam serant. Quamque ob causam cinis radicibus congeratur, feminasque inuoluant stercore. Quæ ex seminibus coctiora, dulcioraque euadant. Tum quæ de tractione immutentur.

Caput VII



Vic proxima quodammodo est in mitigandis arboribus radicum auctio. Cum enim transire libere possint, alimentumque obtinere copiam, amplius tum in longitudinem, tum in crassitudinem augetur. Necnon & qui femina plura in linteolo colligata seruierit, radices & germina faciat ampliora. Quamobrem serere quædam hac ratione consueuerunt, ceu porrum, apium, atque alia quædam. Pius enim ualent, quæ plura, atque ex his omnibus natura una constitit. At sunt, quæ uis temporis, quo serunt, diuersam speciem capiant, ceu rapa, si quis protinus ab area serit, ampla efficitur: quod ideo fit, quia plenius radica-

tur, dilataturq; amplius. Meliora euadūt & quę lentisco, aut scillę inserta terrę man-  
dantur: habet etenim utraq; humorē, caloremq; aliquē, & fit uelut insitio quādam.  
Omnino quicquid in alio feri possit, melius redditur, ceu ruta in fico: sic enim opti-  
mam posse fieri creditur. Cortici infixam ferere, & terra occultare consueuere. Eue-  
nit nanq; ut humor lacteus ille fici, super alimoniā auxiliari quoq; suo calore ualeat  
opportune, sicut & cinis congestus radicibus: siue ne radices uermiculent, seu etiam  
falsugine coalescant. Habet enim similem quandam uim calefaciendi: quippe lentis  
amplitudo efficitur, si semen stercore bubulo inuolutū feratur. luuat etenim calor,  
& siccitas stercoreis: ciceris aut, si cū putaminibus aqua premaceratū feratur. Minus  
etenim est, quod putrescat, alimentūq; primū largius ministrat, & si cum ceteris ob-  
feratur, maturius ueniet. Hęc admiranda & penitus à natura negata putant: uerū  
tamen mutationes eiusmodi sponie quoq; & arte naturę ratione eueniunt, ut in ti-  
pha, & semine tritico obducto. Sicut etiam, quę ex seminibus cociliiora nitro præ-  
macerata euadunt, aut quę melle, lacte ue pari ratione macerata dulciora reddun-  
tur. Quale nanq; semen terrę committit, tale quoq; progeneret, aptum est. Com-  
mittitur aut alteratum & cōmutatum. Duabus enim in rebus quodāmodo principium  
omniū immutat, id est, aut in qualitate, aut in quantitate, ceu tiphę & semi-  
ni, quod pars aliqua desit, quę si detrahatur principio, generationē minus impedit:  
sed si exempta sepius sit, & uelut penitus semen dispoliet, atq; affici opportunius re-  
linquatur, tum in qualitate mutatur, nec eandem multitudinē paleę retinet. Eue-  
nit quoq; alijs, ut partibus quibusdam detractis, nōnihil differentię oriatur, ceu uiti  
palmitis medulla exempta, uua sine uinaceis gignitur. Quod quidē fidem nonnul-  
lam illis forsitan faciat, qui semen à parte unaquaq; transmitti asserunt. Sed huius  
solutio eadem est, quam de animalibus diximus. Hęc igitur propter prædictas cau-  
sas commutari putandum.

*Quamobrem sifymbrium in mentam, & ocimum in serpyllum transeant. Que in aliam speciem  
transeant, ut eruca in aureliam, atq; ea in papilionem.*

Caput VIII



Sifymbrij uero mutatio in mentā, uelut prædictis opposita scilicet est, cū  
ex neglectu eueniat. Fit enim, cum quis nō excolit, neq; curam solitam  
adhibet, ut radices amplius deducant, quā in partem uel tota cōuersa  
debilior pars superna consistit, odoriscq; sui uehementiā amittit, quāsi  
ex ambobus illis, germine atque odore, similitudo proueniat. Quippe  
acritudine exolecente reliquus odor, quia mollis quidā, remissuscq; est, proxime ad  
mentam accedit. Quamobrē transferre sæpenumero iubent, ne istud eueniat. Hęc  
sifymbrij causa est. Ocimū aut, quod loco soli exposito situm est, transit in serpyllū,  
quia uehementē siccatur. Folio nanq; minus, odoreq; uehementius redditur: quip-  
pe cum alimentū quoq; minus habeant, quę siccæ sunt. Sed eiusmodi mutationes ita  
euenire putandū, ut aliquid similitudinis faciant, nō ut omnino speciem exprimāt  
alienam. Populus alba, fronde latiore, cortice leuiore, atq; omnino succo lætiore, q̃  
nigra est: sed eadem in senectā ob alimenti inopiam, haud procul est à ratione, ut &  
frondem angustiorē, & corticem scabriorem habeat: & quicquid euenire ijs soleat,  
quę nō æque alimentū abundant. Omnino fortasse mirū nō minus est, quod in hac  
euenit, cum in proximis, atq; simile quodāmodo transeat. Nam et in animalibus mu-  
tationes eiusmodi pleraq; uidemus, alias in generatione, ut cum in ceteris, tum in  
ijs, quos papiliones uocamus. Enim uero ex eruca aurelia nascit, mox de ea papilio.  
Id enim nō alijs, q̃ papilionū generi euenit. Alias in ijs, quę perfectæ iam sint, affe-  
ctione, dispositioneq; corporis perspicuas, quas anni tempora faciunt, ceu in au-  
bus. Quippe in his potissimū & dicitur, & conspicua est colorū, totorūq; corporum  
immu-

immutatio, ut esse alię uideant. Hęc igit (ut dictū iam est) naturali tribui rationi par est. At quę principio dicim, secundū naturā potius euenire arbitrari certe oportet.

*De morbis, corruptioneque plantarum. Præterea morborum initia aut intrinsecus contrahi, aut extrinsecus.* Caput IX

**S**equitur, ut loco postremæ contemplationis de morbis, & corruptione plantarū loquamur: quę quidē ratio euentus ancipitis est, quoniam & secundū naturam, & præter naturā consistit. Iam enim corruptiones alias secundū naturam, alias præter naturā euenire omnes dicere solent. Morbus aut partim omnino præter naturam esse appareat. Est enim discessus quidā, atque perturbatio rei, quæ secundū naturam sit: partim, quia solitus est, & sæpenumero accidit, secundū naturam esse asserimus: in animalibus pariter & plantis, affectiones scilicet discernendo eas, quæ uiolentæ sunt, planeque extrinsecus ueniunt, id est uulnerum, plagarūque causa. Quæ enim algore, aut ardore, aut aliqua ratione aëris accidant, hæc præter naturā esse nunquam censemus, quāuis ea quoque uiolenta quodammodo, atque extrinsecus occurrant. Sedenim hoc neque proprium plantarum generi deditur, cum & in animalibus idem sit; neque refert ad eam rem, quam in præsentia quærimus. Morborū aut initia, sicut & in animalium genere, uel intrinsecus, uel extrinsecus contrahunt. Et corruptio quoque pari ratione exortitur, aut in totum, aut certe quoad minus possint fructificare. Intrinsecus inquam, cum nutrimenti copia, uel inopia fuerit, aut qualitatis plus, minus uel accesserit: extrinsecus aut, cum aut frigora supra modū, aut æstus, aut imbres, aut squalores, aut aliqua cœli grauitas fuerit. Adde plagas, & ulcera, quæ ligone, uel falce, uel aliqua eiusmodi causa ueniunt; nam & deorum numine aliqua damnoſa urgere creditur, ceu grandine. At si inopia quoque fecunditas uel alimentum extrinsecus sit, ut placet quibusdā, nil referat. Omnia uero, quę cœlū iniecerit, uehementius imbecilliora infestant, utpote, quę minus tolerare excessum ualeant. Infirmissimo uero habitu sunt, primū cum turgescunt, atque germinare occipiunt: deinde cum fructū creauerunt, quasi humor defuerit: tum enim summa mutatio est. Qua de causa, genus agreste maxime ante germinationē, aut sub ipsam germinationē laborat, ubi grando, aut flatus prægelidus, uel præferuidus inuasit: uincunt enim ab intemperie. Hyems tempestiua prodest, tam agrestibus, quā satiuis. Facit enim constipando, & condensando, ut magis ualeant, atque proinde ut melius germinant. Hęc igitur arborū genera communia intelligere licet.

*Agrestium plantarum morbos tradi nullos, sed urbanarum complures: atque alios carere nomine, alios nominari, seu scabiem, radicationem, syderationem, uermiculationem.* Cap. X

**A**grestium morbi nulli tradunt, sed urbanarū complures, & forsitan ita est propter infirmitatē horum. Alij nomine uacant, alij nominant, ceu scabies, radicatio, syderatio, uermiculatio. Syderant præcipue plantæ nouellæ, ac surculi suæ causa imbecillitatis: quod accidit, cum siccata relure humorē trahere nequeant: quapropter plurima pereunt sub sydu: ac maiores ætate utpote ualidiores, magis resistunt, & alimentū à longe trahunt. Item humor in ueteribus pinguior, & ad fructificandū maturior, quā in iuuenibus est, quæque ostenderint, cuncta educant. Omnino mutationē minus suffere possunt, quę imbecilliora sunt. Necnō & humescunt quodāmodo magis sub sydu arbores, ut antè retulimus. Quāobrem eo tempore germinū germinatio accedit. Syderatio his de causis accidit, atque etiam ictu iniurioso, & uulnere. Nam ea quoque ratione infirmiora redduntur. Vermiculantur magis quæ ætate prouectiores sunt, quod & ipsum euenire uidet iniuria circumsodientū, aut cum sit propter squalorē labora-

uerint: quippe ex ictu putrescunt, ulcerataque uermes per saniem creant: quādamo-  
dum & alijs omnibus euenit. Sitis autem idem propterea facit, quia minus humoris, quā  
fatis sit, habeant. Fit enim uelut dimotio ex natura: dimotionē mutatio atque alteratio  
sequitur: mutatione animal ex sanie gignitur. Accidit hoc uel illis, quæ arefcunt: sic  
enim calor redditur efficacior. Vermiculantur maxime māli, quamobrem in locis  
feruidis obnoxia sunt: radices enim breui siccescunt.

*Publicos maxime omnium morbos uermiculationem, & syderationem. Tum quæ magis, minus  
ue his infestentur. Item ubi sphacelismum fieri dicant.* Caput XI



Publici tamen omnium maxime morbi, prædictus hic atque syderatio con-  
stat. Nulla enim ferè sunt, quæ non uermibus infestentur: alia tamē plu-  
ribus, celeriusque intereunt, ut mālus, ficus, pirus: alia paucioribus, atque  
ægrius moriunt. Minime uermiculantur, quæ acerba, & uehementia  
sunt, non modo quia minus putrescunt, uerumetiam quia acerbitas par-  
tum animalium prohibet. Argumento laurus est, quæ cum breui putrescit, non breui  
uermiculatur. Nam ea de causa nec caprificus similiter, atque ficus putrescit: lac enim  
eius acerbior est omnino. Quæ dulciora sunt, celerius putrescunt: etenim succus eorum  
mutationē facilius recipit, quoniam imbecillior est. Hinc māli, & puniceæ dulces magis  
putrescunt, quā acidæ, & omnium maxime uernæ, succi scilicet imbecillitate, atque  
totius naturæ. Omnia, quæ lentisco inserta terræ mandant, minus uermiculationē  
sentiant, odoris, feruorisque causa. Genera hæc morborum causis prædictis ueniunt,  
Quidā & sphacelismum, id est morbum radices, extrinsecus plagis, atque uulneribus fie-  
ri aiunt, ut in animalium genere. Translatum enim id nomen à similitudine illius uitij  
est. Sed minime in omnibus uerum hoc esse uidemus: siquidem cicer radicitus inas-  
rescens intereat, cum in flore falsuginem imber eluerit. Enim uero iactura falsuginis  
uelut sphacelismus est. Quin & alia pleraque, sine ictu uitio illo uidentur aglescere.  
Et syderationem sphacelismum quidam appellant. Sed hoc nominis fortè differentia  
est. Copia enim alimenti nimia, uel inopia, arbores eo quoque modo intereunt: ni for-  
tè succi potius cruditate, ac ui extrinsecus occurrente: ut cum post fructificationem  
humore adhuc tenui causa imbecillitatis gelicidium uehemens consecutum sit. Hæc  
etenim ratione intereunt: quippe succus serosus & tenuis frigidus, & crassus, & tan-  
quam pinguis, calidus est. Igitur hæc corruptio accidit siue copia, siue cruditate, siue  
etiam utraq; ratione, atque etiam imbecillitate placuerit.

*De alijs quibusdam morbis, ut squalor. De morbo ficus, qui glabratio dicitur. Deque articulatione  
uitium morbo. Item de scabie, impetigine, roratione.* Caput XII



Tob alimenti inopia, aliter corruptio sequitur, cum radices sublimes,  
prospiceatque fuerint (humorem enim transmittere nequeunt propter  
solis ardorem) itaque succus uritur, crassaturque plus, quā commodum  
sit: unde morbus, atque interitus. Huic proximū accidit, cum ob aquæ  
inopiam squalent. Neque enim tunc humorē possunt transmittere, lu-  
uat, tuereturque contra humoris penuriam solum assidue appellare, coaquareque, sic  
enim per æstatem humoris aliquid trahent, & per hyemem calor aderit amplius,  
qui alimentum dispenset, quod large imbrum copia subministrat. Tunc enim quia  
nequeunt uegetari, pallent atque intereunt arbores, modo frumenti. Quippe quod  
pabulum euincere, atque percoquere nequit, ieiunio laboret necesse est. Interdum  
non penitus pereunt, sed tantum agrotant, ut minus queant fructificare. Quod  
enim pabulum non excoquit, neque euincit, iam fructificare minime potest. Ficus  
morbum quendam in radicibus, & paulo superius sentit, quem glabrationem ap-  
pellant, qui certe ex nimietate humoris solet accidere. Articulatio quoque uitis ni-  
mietati

mietati protus tribuitur, & quaecumq; fructificare nequeant, propter luxuriã germinis eodem proculdubio pertinent. Nec enim ista pabulum excoquere possunt, sed & ad germinandum uis tota conuertitur, quasi detracta fluxu rapido nimij alimenti. Accidit magna ex parte fico scabies, oleæ impetigo, uiti roratio, ut & Ceide-  
mus autor est. Fructus enim prætenuis, fluxusq; utpote crudus creatur. Remediũ  
esse potest, uel cum nimia nutrimenti ubertas detrahitur, quemadmodum & amy-  
gdalas, & punicas castigare aliqui solent: uel cum arbor firmior, atq; robustior red-  
ditur. Hoc enim amputatio fici ministrat, cum germina inchoat, ne sua opacitate suc  
cum percrasset. Depampinatio quoq; uitium, & prægrandium foliorum contortio  
10 per totam ætatem identidem facit, ut quidam præcipiunt. Item resectio summarũ  
radicũ, & sarmenta superiniecta, & demissæ propagines, eodem proculdubio per-  
tinent. Adde suffossiones, & ablaqueationes, quibus radices deteguntur, ut flati-  
bus, atq; frigorigibus assuescant, ut quidam præcipiunt: cauendo ne quid paxillus of-  
ficiat. Hæc etenim omnia alimentũ diminuunt, uiresq; augent. Contrà, illis, quæ ob  
alimenti inopiam deficiunt uiribus, foissio, atq; reliqua cura exhibita recreat uires, si  
mul & alimenti copiam præstat.

Cur fico scabies accidat. Cur item uites articulentur, geminamq; esse rorationis causam. Atq; unde  
oculorum obtusio accidat. Deq; fructuum morbis, crambosq; animali. Caput XIII

20



Vnt qui scabiẽm alia quoq; ratione fieri posse arbitrant, id est cum plu-  
uia lenta Vergilijs exorientibus fuerit. Tum enim humor uitiatuſ ille  
refermentatur, & referueſcens erumpit, ut puſtula. At ſi copioſe aqua  
inceſſerit, cauſa, quæ ſcabiẽm creat, eluetur. Forſitan & interdũ detru-  
ſa inſorſus abolet, ac deſinit. Euenit per idẽm tempus, ut et caprificus  
& groſſi delabantur, quod eas humor nimĩũ ſubeat. Scabiẽm his de cauſis fico acci-  
dere aiunt. Vitis autẽ articulatio uenit, aut ſtatu ablatiſ germinibus, aut imperitiã cul-  
turæ conciliſ, aut tertiò in ſupinũ exciſiſ. Sic em̃ humor largiũſ collectuſ uehemen-  
ter ad germinandũ excurrit, ita ut nihil queat fructificare. Rorationiſ gemina cauſa  
eſt: aut enim, quod roreſ ſtatim poſt ſlorem inciderint, aut quod exuperantiã fue-  
rit. Quod ſi ita ſit, aẽrem dixerim in profluuiũ ſloriſ humidiorẽ, uelut eruginẽ  
30 procreare: exuperantiã uero quaſi auocare, dimouereq; alimentum uidetur. Itaq; utraq; de cauſa deſi-  
uere acina, quæq; permanere potuerit eſſe exigua ratio eſt. Ocu-  
lorum obtuſio accidit, cum acriter frigent. Proximũ illi eſt, quod agreſtib; euenit,  
ſi cum germina ſua feſtinantiũſ inchoant, gelatio conſecuta eſt. Floſ quoq; intempe-  
ſtiuiſ ratione hac eadẽm perit: ſtatuſ etenim geliduſ adhuc imbecilli occurſans, to-  
tum perſundit. Arborum morbi, & uitia hæc ſunt. Fructuum autẽ ut uuarum  
crambuſ uocatur, hoc animal eſt eruginiſ ſimile, naſcitur quũ tempore humido re-  
ſidente humore ſol acrior conſecutuſ inuſſerit: quod etiã pampiniſ accidere con-  
ſtat. Måli, oleæ, atq; fici fructuſ uermiculuſ ſentiunt. Sed mãla, & ficuſ quotiẽ uitiũ  
40 hoc acciderit, pereunt. Oliuæ, ſi ſub cute uermes naſcantur, pereunt, quoniã pe-  
nituſ adimuntur: ſed ſi ipſo nucleo, augentur. Caro enim non tangitur. Prohibent  
illoſ ſtatuſ, & pluuiæ, quæ ſunt ſub arcuſum. Facit enim refrigeratio, ut fugiant  
om̃eſ. Aegrotãt ſape & ficuſ, & reliqui fructuſ. Cauſam autẽ (ut ſimpliciter loquar)  
aut ipſa arbor, eiũſq; diſpoſitio habet: ut cum in amygdaliſ humor gummoſuſ effi-  
citur: aut iſſ attribui decet, quæ in aẽre eueniunt. Oleæ arachnium quoq; innaſcitur  
humiditate quadãm aëriſ proximi, quod fructum adimit: germinatur ramis annicu-  
liſ, cum imbreſ ſecuti ſint. Qua quidẽm germinatione fructuſ amittitur, quia pabu-  
lum eo fluit. Quandoquidẽm & fructuſ nondum uireſ cõceperit, humore autẽm  
aggregato, mox germen proſilit.

De uarijs ratione cœli, uentorum, & imbrium. Quodq; præcipuum discrimen sit in fructuum uermibus. Tum de cœrasta. Caput XIII



Effimū & oleis, uitibus, & alijs omnibus, si dum florent, impluerit. De fluunt etenim flores, & fructus, causa imbecillitatis. Ad sunt & propria uitia locorum, ut apud Miletum, atq; Tarentum oleis euenit. Quippe apud Miletū, cum florent, si aër austrinus, serenuscq; sit, erucæ uariū genus creatur: quarum aliæ frondem erodunt, aliæ florem, luvat contra hoc, si æstus sit consecutus: omnes etenim disrumpunt, atq; intereunt. Apud Tarentum cum florent, aliās desiderio flatus erugine infestantur, aliās habitu quodam ex mari caliginoso, crassoq; floribus residente, odorem florum amittūt. Qua de causa, cum arbores maximæ, atq; pulcherrimæ illic sint, fructum tamen minimū reddunt. Omnino singula loca sua uitia habent, alia ex solo, alia ex aëre, alia ex utroq; Sed cōmunis omnium causa flatibus datur, qui per æstatem feruidi, per uer frigidi admodum ueniant, cum arbores germina, floresq; suos incipiunt adere. In totum enim uere in ijs quoq; alferi potest, excessu, defectu ue alimentī, aut æstus, aut frigoris, languorem accidere. Ad do etiam si flatus, & pluuię non tempestiue accesserint. Accidit enim ut aliās fructus amittant, propter aquæ penuriam, ceu fici: aliās deteriorius fructificent, cum uel putrescunt, strangulanturq; nimio humore. Vel contrā plus, quā sit commodum, desiderio humoris siccescunt, cum etiam æstus plerūq; tum uuas, tum oliuas, atq; alios fructus adurunt. Vermiculorū multi & specie inter se differunt. Discrimen tamen præcipuum in his est, quod in alia arbore, fructu ue alio nati, translati in aliud genus seruari nequeant: quod ratione utiq; sit. Alimentum enim cuiq; ex propria subministratur materia. Sed peculiare, quod de eo notatur, quem cœrastam appellant. Hunc enim, & in olea creari, & in fico parere asseuerant. Habet ficus & suos uermiculos, & illos quoq; enutrit, quos alienos receperit: omnes tamen in cœrastam figurantur, & sonum ædunt paruuli stridoris. De morbis dixisse hæc, satis est.

De corruptione plantarum: quodq; arbores quædam obesitate, ut & animalia strangulentur. Caput XV



De corruptionibus arborum primū illud significasse oportet: alias secundum naturam accidere, ceu ariditates in senectia, cum imbecillitate languescunt, quasi expirent sponte, atq; aboleantur: alias præter naturam extrinsecus aduentare. Quarum alias uiolentas putari, ut si arbor præcisa, aut uulnerata, mortua sit: alias minus, ut quæ propter frigora, tempestates ue accidunt: atq; minime omnium uiolentas esse, quas morbus attulerit: sicur & in animalium genere. Sunt enim istæ maxime diuturnæ, quæ obrem nec præter naturā esse apparent, æque in animalibus, atq; in plantis: quippe cum naturæ inter sit, ut uires paulatim deficiant. Est præter prædictas, alia quoq; corruptio, quæ nimia fertilitate exultat. Quippe omnino quæ large fructificant, uitę sunt breuis, ut dictum est. Exarescunt enim, quia totus humor ad fructū consumitur. quod accidit pluribus: nam & nouellæ oleæ pereunt ex fertilitate, quod prius, quā perficiant, alimentum incrementi sui ad fructificandum consumunt. Sed corruptionē hanc, neq; secundum naturam esse, neq; extrinsecus, uiolenterq; dixerim euenire: sed ipsis arboribus imputem, quæ plus, quā modicum sit, ad fructum generandum citantur: sic tamen ut aëris, cœlicq; uniuersi status, causa quodammodo altera cōiungatur. Sequitur enim talis fecunditas eblandito aëre, temperieq; optima condito. Hanc igitur siue secundum naturam, siue præter naturam, siue etiam mediā quandam statuere placeat, nihil refert. Arborum autem genus etiam aliquod fortasse est, cui

est, cui corruptio secundū naturam sponte, nec ullo pacto afflictato, sed bene uigenti eueniat, ut pino, cum radices mutæ in tedam fuerint. Ita enim fit ex nimietate nutritionis, atq; excessus: cumq; per tedam transmittere pabulum arbores nequeant, moriuntur. Quod proximum illi uidetur, quod animalibus euenit, quæ extra modum crassantur, atq; pinguescunt. Cum enim auram attrahere nequeant, nec ullo pacto spiritu uti possint, propter obesitatem, condensationemq; & illa strangulantur, & pinus. Quamobrem non inepte rustici uocabulum istud de pino usurpant. Pinum enim strangulari aiunt obesitate, atq; pinguedine. Quippe omnia spiritum desiderant aliquem, uel solutionem, uel meatuum libertatem. Ergo corruptiones huiusmodi naturales potius esse putauerim: illas autem utro nomine appellasse conueniat, nihil refert: ut iam dictum est.

*De causis corruptionis secundum naturam. Plures fieri corruptionis causas rigore, & frigoribus.*

*Qui flatus urant, & quamobrem. Cur frigus urat: tum quæ loca urantur frigore.*

Caput XVI



Ed de his dicendum, quæ secundū naturam eueniunt: quoniā hæ simplices quædam, atq; conspicuæ sunt. Harū igitur causæ in duobus uersantur, id est in excessu frigoris, atq; æstus. Nam quæ ob inopiam alimentum eueniunt: exempli gratia, uel quia humor deest, uel quia ager uitatus est: hæ sui generis sunt, atq; latissime patent. Sed pauciores illæ profectō, quas affert æstus, nisi squalores uehementēs infestent: qui tamen & ipsi cætera potius necant, quàm arbores. Nec nisi perpetui, diutiniq; fuerint, illas perdere possint annuis ardoribus, qui tempestiue sub caniculam fieri soliti sunt. Plantæ solæ nouellæ syderantur, & si quid mancum, imbecillum uel sit, neq; enim hæc possunt sufficere. Plura uero intereūt rigore, modisq; pluribus. Aliās enim algoris uehementia gelat, aliās flatus prægelidus ruit: nōnunq; etiā silente, uel certe leuiter citato spiritu, nō tamen puro aëre, sed turbido, atq; caliginoso, itidem euenit. Sic enim ferme gelatio arborum sequitur, siue cœlum serenū sit, siue non serenū. Quippe circa Arcadiam, Euboiāq; cœlo sereno, uentoq; flante potius gelatur. At in Thessalia, locisq; proximis, aëre immoto, caliginosoq;. Cæterū flatus potius hæc affectio euenit, cum montes singula circundantes loca niuem exceperint. Hinc enim flatus, & frigora eueniunt, quæ densare, ac urere possunt. Interdū etiā sine uento aër subiens ipse idem facit. Quod autē referunt, minus gelari circa Euboiā atq; Boeotiā, Iacu Orchomenio inundante: alterutra fortasse ratione intelligi potest, id est, aut per euentū, quod eo tempore annus magis pluuius sit, nixq; proinde nō urgeat, atq; uapores humidiores cicerent, utpote à largiore humore. Talis etenim uapor minus frigidus, aut noxius est. Patuit hoc locis quibusdā, quæ tepida reddita sunt, quoniā fluminum alluuiæ loca uicina cōcreuerint. Flatus qui adurunt locis Græciæ, ueniunt ab occasu, ut olympias, qui tum alibi, tum apud Chalcidem luctum uocitatum face re assoler. In Thessalia enim, & qui ab occasu, & qui ad exortu aspirant, gelare nimium possunt. Tempus huiusmodi afflatus maxime circa solstitiū sub diem quadragesimū est, tum enim aër penitus alget. Quæ eueniunt hæc ferē sunt: causa autē (ut in uniuersum agatur) manifesta propemodū est. Calor enim pulsus à frigore secum humore educit, ita ut exhalef, diffleturq;: quod maiore ex parte ips euenit, quæ eminent supra terrā. Radices enim, partesq; imæ, indomitæ manent. Sape etiā aliquid ipsius caudicis, frigoris iniuriā aufugit. Cæterū radices quoq; interdū uis aggreditur frigoris, ut arbor tota exarescat. Omino em origo, accessusq; frigoris defuper, mox inde uelut per introitū ad ima defluit. Quāobrem coloni, apud quos istud euenit, bene uites operiūt, & ficos fruticosa specie reddunt: nec terræ magno cumulo opus



est, sed mediocris seruire utiq; potest. Quidā extrema tantūmodo palmitū, & ramorum sici operiūt, ut in Ponto, & in Media, tanq; aditum frigori negent. Etenim si ea tutē integant, sicut & alia quādā nuda munire consueuerūt, nullam capiunt noxā, cum nullus aditus frigori pateat. Transiit enim ā summis ad ima, & radices, uis frigoris. A dustio aut huiusmodi uehemens est, non secus, atq; si ā solis ardore, ac mora longinqui temporis fieret, scilicet propter uim uehementissimā frigoris. Hāc em̄ humorem simul & calorem amplius, frequentiusq; educit. Caua aut, & angusta, atq; fluminibus loca apposita, & omnino quæ ab omni sileant flatu, magis laborare ratio est: præsertim enim spiritus locis eiusmodi consistit, diutissimeq; moratur, itaque efficacius agere potest. Etenim ubi nō flatus, sed præsentia, flatusq; aeris hanc adducit iniuriam, ut in Thessalia, & Macedonia, tum alibi, tum apud Philippos, ibi profectō loca fossionis concauæ magis laborant. Aër enim immotus gelatur, agrumq; totus diutius congelascere facit, ac locis supinis nulla penitus aquæ, aut aeris fieri gelatio potest. Motus etenim prohibet.

*Cur minus firma frigore aliquando minus laborent : deq; uentis uernaculis. Caput XVII*



Ed mirum sanē illud est, rationemq; desiderat, quod non ea, quæ infirmissima sunt laborare solent, sed interdū quæ egregie robore ualent. Oleam enim, & sicum aduri nihil mirum, cum alterius radices per summam cespitem natent, alterius nō sublimiter soium cohereant, sed etiam raræ sint, ut frigus etiam desuper inuadere possit. Et uitis uero nōnihil causæ sua natura, & ulcere iniuriosæ cæsuræ ostendit. At oleastrū magis olea laborasse, & punicam nullam cepisse iniuriam, quæ imbecilla contra frigora est (concreuit etenim celerrime) mirū certe id est. Quippe si gelationes, quas algores, flatusq; faciunt, differant inter se, haud ratio abesse uidetur, ut illa potius sequacia temporis sint, quæ infirmissima exant: nisi fortē idem in ijs quoq; euenit, quod prius diximus. Dens enim magis insidet, atq; immanet frigus, quā rarior: rara autē ipsa mirum penetrat: quod et ut mālū nō congelascant, causa est, quamuis imbecilles admodum sunt, ut in Thessalia exitit: facit etenim raritas arboris, ut frigus transeat, nec aliqua parte arceatur. Quod autem diu nō immoratur, nec uniuersum continet, efficax id esse non potest: sicut etiam de fulmine intelligere licet. Porro alterutrū opus est, aut nihil sibi admittant uim frigoris, ut quæ densa, & ualida sunt (talīs em̄ pirus, & omne genus agreste, atq; etiam magis, quā steriles, ceu ulmus, & ostrya) aut cum admiserint, statim transmittant, expellantq; nec usquam retineant. Causa eorum petenda hinc est. Impetus autem flatuū, loca quæ inuaserit, perfundit, ac diluit, quasi flumen irrumperet. Quemadmodū cum pestilens incesserit lues, quæ propter sæpe quæ tangunt, ac proxima sunt, euadunt indomita, & adeo uis illa rapax, celeriter plerunq; transcurrit, ut gemmas eiusdē palmitis partim congelet, partim incolumes relinquat. Sæpe etiam uite tota ā niue abscondita, quod sit locis prægelidis, si postremos palmites nudos excipiat, hosce urit, ac inde ad radices pertransit. Flatus in Ponto congelant, cum cælo sereno, ac sudo quādā in modum squamarum perferuntur: quæ quidem ampliuscula sunt, dumq; feruntur admodū patent, dilapsa minime durant. Quare constat, quod aliqua in aëre gelatio, more pruinae consistit. Cum igitur aër concrescens flatu percitus occurrat, squamasq; illas deducit, gelatus ratione consequitur. Flatus autem locis natura frigidis quidam uernaculi sunt, ut in Ponto, & Thracia: tepidioribus uero extrinsecus ueniunt, ceu Euboeæ. Natura quoq; planē indicat ipsa, non flatu aliquo stabili, uniuersoq; sed temere passim uagante iniuriam illam afferri. Aliter enim nunq; intacta euaderent, quæ proxima essent. Igitur flatibus eam quoq; proprietatem possumus adnotare.

De corā



Elucidium humi damnosum admodum est, cum arbores ablaqueatas, dispoliatasq; cespere occupauerit, sed maxime si adit aqua restagnans. Quippe si diutius frigus durauerit, radices infirmas dispoliatasq; subiens penitus congelabit. Nam etsi omnino solum agitatam inuenerit, uehementius offenderit. Penetrat enim liberius, quod rarum est: resistit ualentius, quod fuerit stercoreatum. Stercus enim utpote calidum iuuat. Quin & si niue delapsa, soloq; fermentato frigus, pruina, geluq; successerit, minus ægre ratione utiq; congelabitur. Raritas enim facit, ut seges facilius sentiat. Sed perniciosius gelicidium terræ arboribus euenit, quàm aque. Magis enim radices id tangere potest. Damnosius uero utrunq; redditur, cum pluuia & gelu miscentur inter se uicibus, sæpeq; alternantur. Hac etenim ratione uires omnes tollunt, quod nō æque glacie perpetua euenit, præterq; si diutissime infestauerint. Calor enim conclusus, coarctatusq; assidue satis ruetur. Omīno damnosior glacies illa est, quæ subtus inuadit agrū tenuem, solum, siticulosumq;. Haud enim calore potest æque resolui, & ulterius irrepit, atq; radices attingit. Euenit autem, ut germinū congelatio, & omnino superiorum partiū sæpenumero fiat; radicum perraro, & apud paucos. Ratio, quod radices terram protegentem, & frigus arcuentem obtineant, ad quā etiam calor compellitur. Interdum nec superiora ipsa intereūt, sed potius leuiter uruntur. Atq; hæc nō protinus auferre oportet. Enimvero sæpe Vere ineunte illa quoq; germinare incipiunt. Quippe, quæ exaruisse uisa sunt, humescere rursus, reddiq; uiridia possunt. Qua de causā mirandum non est, sicubi ita euenierit, ut olea tum fronde, tum toto corpore arefacta apparens posset regerminare. Haud enim arefactio fuit, sed esse quædam apparuit ex siccitate, atq; calore, quæ uim genitalem frondis non attigit. Atq; etiam minus germinis, et rami. Idem uel alijs quibusdam eueniat, sed consentaneum maxime illis, quæ natura calida sunt, frondemq; gerunt carnosam. Imbecilla enim atq; gracilia facile abolescunt, ceu myrtus: hæc enim celerrime uritur, quia & ipsi ramuli tenues, tenelliq; sunt, & tota arbor minus calida est, & proinde ad gelu facilissima. Laurus etiam quamuis rara, tamen resistit, perduratq; sui caloris potentia. Punica uero, & ficus raræ, humidæq; minusq; calidæ sunt.

Cur arborum, quæ congelauerint, germinatio uelox sit. Cur item nix non gelet, pruina gelet.. Caput XIX



Rborum quæ congelauerint, germinatio uelox, frequensq; est: sit enim, ut radix corroboretur, collectuq; reficiatur alimentum anniculi, quod haud dispensatum, transmissumq; est. Item alimentum primum, quod non effuse, ualenterq; fuerit distributum, consumi tunc ad germen citandum, ratio est. Itaq; incrementum, atq; fructificatio celeriter ueniunt. Hoc igitur nihil dubium est. Quod autem quidā mirantē niuem gelare nequire, pruina autem posse, quæ niue infirmior est, nulla ratione admirari debemus. Primum, quod nix non omnibus partibus residet, sed à palmitibus aut germinibus statim liquefens delabitur: & pruina hæc diu inherendo exurit, tum etiam habitus palmitis causam habere uidetur: quippe cum nix ante, quàm germen prodierit, cadat: pruina uero ubi proxime prodijt, cum infirmissimū est. Interdum etiam cum turgescit, quo tempore nō minus fragile est. Iam enim humescit, rarefcitq;. Ad hæc, pruina niue tenuior est: itaq; ratione utraq; uehementius congelatur. Sed nec illo modo nix residere palmitibus possit, nisi uitis tota celetur: quod si euenierit, calor à niue undiq; integente concludetur, frigusq; foras uersus arcebitur. Quemadmodū à terra fieri solet, in totum uim quoq; incidendi pruina, quā nix efficaciorē sortiri putatur: & noualia proinde

meliorescere pruina, existimant. Glebas enim diffundi subeunte, mordenteq, quoniam constantior est. Tenuior niue propterea est, quia nix ex nube consistit, & uelut spuma est quædam, spiritum in se admodum continens. Ipsa autem pruina per se constat tenuiori quodam aëre, humoreq, condita est. Horum igitur causas ita interpretari censendum.

*Vtrum gelatio aëris crassitudine accidat, an tenuitate. Hinc rationes ad utranq, partem.*

Caput XX



Elatio uero utrum crassitate aëris, an tenuitate conficiatur: & si ratione utraq, utra magis querendū, quis profectio existimet. Nam si aër nunquam geleatur celo minus sereno, nullo pacto gelationis causam habere aëris crassitudo appareat. Quippe serenus, ac sudus aër, tenuior, & proinde dissolutioni habilior est. Gelatio autem non nisi subeunte illo quod incidat, fieri possit. Item refrigerat facilius, & omnino sentit celerius, qui tenuis est. Hinc enim & aqua præcalescens refrigerat, gelaturq, celerius, quia ex calore tenuior facta est. Confirmare hoc idem & loca putantur, quæ suda, & subdualia uocamus: plus enim, ac sæpius in his congelatur. Nonnusquam etiam parui interualli discrimine, ut apud Corinthum, Cranium, & Olympium: quamuis uici na inter se sint, diræ tamen serenitates fieri circa Craniū solent, ita, ut & plantarum affectione, & hominis sensus res percipi possit. Alibi longiusculo interuallo idem animaduertimus. Omnino loca, quæ antè nunq, glacie rigescebant, propter aëris crassitudinem, nunc congelascunt aëre commutato, ut apud Larissam Thessaliæ. Prius enim, quod aqua stagnante, pigraq, campus esset repletus, aër crassius, & calidior erat: postea uero aquaeducta, colligiq, prohibita, aër frigidior est redditus, & gelationes plures secuta sunt. Cuius rei argumentum afferunt, quod tunc olea cum alibi, tum in ipsa urbe magnæ, & optime aderant, nunc autem nusquam habentur: et uites quoq, tunc nunq, congelabantur, nunc persæpe. Aqua autem non semper agrum reddi frigidior, sed etiam ijs, quæ prius iam diximus: argumentum, quod circa euenerat. Hæc enim tepidior nunc esse putatur, quia Ebrus amnis propius. His de causis aër tenuis gelationi aptior esse appareat: at illis contra, crassior potius habilior esse creditur. Est enim stabilior, atq, immotior: qui autem est immotus, facilius congelatur. Item styges locis istiusmodi fiunt, quæ maxime corpora subeunt. Haud enim quisquam uitare potest, etiam si in lecto contactus admodum iaceat. Confirmat etiam illud, quod montibus minus, quam planis gelatur. Aër enim tenuior, atq, agilior ubi est, fidem ijs quoq, loca singula faciunt. Quippe cum circa Cithrum Thessaliæ maxime ferè congelatur, qui locus cauius, ac riguus est: & apud Philippos antè magis congelabatur, sed nunc quod aquam ager forbuerit, atq, ita maiore ex parte resiccatus sit, totusq, excoli inceperit, multo minus rigescit. At qui tenuior ager redditus est, et quia absumpta fuerit aqua, & quia excultus sit ager (incultus enim, neglectusq, frigidior) & aërem habet crassiores. Neq, enim solis eque sentit ardorem, neq, perflatur spiritibus propter materiam: tum etiam aquas stagnantes, pigrasq, locus ille complures habet: quod idem, & apud Crenides olim fuisse proditum, cum Thraces eum locum inhabitabant. Totus etenim campus scatebat arboribus, aquisq, permeabat. Cum igitur nunc magis, quam antè, locis his congeletur, aquarum copia resiccata, non aëris tenuitati causa tribuenda est, ut placeat quibusdā. Tales in utranq, partem rationes possunt afferri: forsitan quia utroq, modo fieri gelatio potest. Id enim ex prædictis patescit. Sed differt etiam locus a loco, quod plus crassetur, aut attenuetur. Aquosus enim, turbulentusq, non eque efficax est, nec rursus qui prætenuis est: agilis enim minusq, stabilis. Gelatio autem spacio

confi-

conficitur temporis. Ad hæc qualitatem quandam illis, quæ sequantur, totiꝫ statui coeli, & quicquid extrinsecus ueniat, inesse oportet. Nam si mutationes, remissionesq; crebris inter se uicibus alternentur, nulla possit fieri gelatio: sed (quæ ad summum referre liceat) celerius affici potest, qui tenuior est. Frigefactus tamen qui crassior, frigidior reddit, sicuti & calidior. Caliditas enim, aut frigiditas in eo firmitus continetur, quemadmodum & in cæteris, quæ callosiora, corpulentioraq; sunt. Quamobrem sicubi non dilutus, sed crassus simul, & siccus sit, non absq; ratione hic facilius congelascet. Sed de his satis.

De perniciæ arborum per æstus nimios: deq; uolentis affectionibus, & quæ hominis sunt iniuria. Tum quomodo sterco exitio sit. Caput XXI



Æstus autē nimius plantas, & omnino nouellas arbores perdit ratione infirmitatis: sicut etiam illa, quibus uita annua data est. At uero quæ ra-  
dices conceperint, & iam factæ grandiusculæ sint, has nihil interimere  
potest, quia subire, atque uitalem originem æque attingere nequeat.  
Sed si quid offendere possit, germina, fructusq; adurit: quippe in to-  
tum frigiditas alienior à natura forsitan est. Quoad enim loqui simplicius sit, omnia  
excessu rerum, quæ uitam tuentur, intereunt. Enimuero inter agros, alius ex ni-  
mia pinguedine sterilefcit, alius ex immodica macie. Et aër quoque impedimento  
est, cum in alterutram partem modus defuerit. Necnon & aquæ inopia, multi-  
tudo uel officit. Nam & stabilis aqua, si arboris magnitudinem excesserit, perdet: ut  
cum imbres percubuerunt, aut loca inundationibus concreuerunt, quod etiam  
circa Pheneum euenerat. Vbi tamen aqua possit effluere, arbores melius tolerant,  
quamuis alte ingurgitatae. Iuuant enim motus, ut nunquam uires deficiantur con-  
tra præsentem alluuiem. Hæc illis de causis fieri arbitrandum. Sequitur ut de uo-  
lentis affectionibus disseramus: & si quæ aliæ non aëre aut natura, sed hominis  
iniuria ueniant, has quoque adijciamus, ut eam, quam corticis in orbem detractio,  
aut uulnus aliquod inferat: quæq; appolitis quibusdam exulter, ceu de putami-  
nibus fabarum narratur, & quicquid eiusmodi: ac primum de fabis. Enimuero  
fabarum putamina radicibus, aut germinibus appolita, uitam penitus tollunt: non  
tamen omnibus, sed ijs quæ nuper profluere, urpote imbecillioribus. Quod ea  
de causâ hæc facere possunt, quia sua duritia, siccitateq; alimentum, partim tra-  
hendo, partim arcendo auferunt: alimento etenim destituta protinus moriuntur.  
Sed hæc, & quicquid generis eiusdem, tanquam germinationi aduersa interimunt.  
Quædam autem ex eorum numero, quæ conueniunt, iuuareq; possunt, exitio  
aliquando sunt, si immodica, aut uehementiora, aut minus tempestiua exhibean-  
tur: ut sterco si crebrius, uel effusius, uel uehementius, ceu fex pellium, dispo-  
natur. Hæc enim propè omnia posse interire creduntur, si intemperata sit, atque  
indomita. Periculum idem impendit, & si calidum, aut siccum, aut omnino ue-  
hemens, minusq; plantæ conueniens sterco fundatur. Sunt enim (quemadmo-  
dum diximus) quæ singulis sationibus congruant: nec idem sterco commune  
omnium est, modo aquæ: quanquam ea quoq; radices sua multitudine inebrians  
putrefacit: longeque magis si plantæ nouellæ, nec nimium aquæ cupientes sint, ceu  
cupressus, & reliquæ sicæ, aut si quis non tempestiue, uel ijs, uel purgatione, fos-  
sione uel utetur. Omnia nanque dant causam emoriendi. Temporibus au-  
tem singulis horis, cum ad hæc ipsa, tum ad sequentia, deus au-  
tor est. Corruptions, quæ per alimenti excessum,  
defectum uel, aut per intempestiuitatem  
operis eueniant, hæc sunt.

De pernicio, quæ uicinitate iuxta satorum, aut contagione sponte se associantium affertur.

Item quæ herbe alias interimant: quodq; oleum, & pix, & pingue  
plantas enecent.

Caput XXXII



Væ autem uicinitate iuxta satorum, aut cōtagione sponte se associantium conferuntur, has alimentis prorsus rapina solet committere, eoq; celerius, quo ualidiora, pluraq; sint, quæ infestant, ceu quæ syluestria sunt, quæ radice numerosa coherent, quæ multo indigent alimento, quæ abscindere, amplexu, strangulare, atq; irrepere apta sunt, ut edera. Nam uiscum quoq; & omnino quæ aliquā plantam pro sede capiūt, interimere possunt. Edera, & aurio, nimio pabuli desiderio, falsugineq; sibi ingenta arbores necant: sed aurio perniciosior est, quod plus habet falsuginis. Necesse alijs quoq; ab alijs accidunt propriæ, ceu in minoribus patet. Quippe orobancha uocata eruum necat amplexu, compressuq; suo: & limodorū, scœnumgracum interimunt protinus radici adnascens: & alia cladem alijs inferunt, ut quæ cum singulis frugibus simul proueniūt, ceu lolii, & auena, tritico atq; hordeo, & lappa lenti, & alia alijs. Omnia tamen idcirco interimunt, quia pabulum tollunt, tam quod terra minifret, quàm quod à sole, & aëre ueniat. atq; eorum quidem ratio manifesta ferè est. Oleum autem, & pix, atq; pingue (nam ea quoq; necandi uim habēt, & maxime contra plantas nouellas, quare tangi eas minime sinunt, sed tutissime circumdāt uiminibus) causam illam habēt, quod sua caliditate, atq; tenuitate labili longe effunduntur, & condensant, aduruntq; corticem. Argumentum, quod cortex durefcit atq; detrahitur, quo laborante, per durefcenceq; alimentum transire nō potest. Vim adurendi longe, subeundiq; haberi, argumento illud etiam est, quod qui agrum syluestrem, in aruorum formam traducūt, radicū residuis oleum, aut picem infundunt, aut adipe ungunt, quæ omnino afficiant, præsertim pix, utpote quæ ualidissima est.

De corruptionibus, quæ aut ictu, aut aliquarum partium detractione, aut diminutione, aut omnino sublatione fiunt: quæ præterea plagam tollerent, aut non tollerent.

Hinc quæ dissecta, scissaq; cōdant.

Caput XXXIII



Estant corruptiones, quæ uiolentæ appellantur, quæ fieri solent ictu, aut detractione partium aliquarū, aut dimutatione, aut omnino sublatione. Quædam enim ubi altius uulnus ceperint, intereunt, siccitatis imbecillitatisq; suæ ratione. Palma uulnerata quoq; in cerebro, perit. Vis enim uitalis, germinatrixq; sita in eo est. Quamobrē cum id resciscarum; aut omnino alterarum sit, intrusu aeris, caloriscq; alieni corrūpitur, partisq; superioris corruptio mox ad ima descendit. Huius ergo peculiaris quædam natura est, ut & pars conspicui possit uitæ præstitrix. Sed sunt, quæ non plagam tolerant solum, sed etiam lignis detractis caudici, indomita maneant, ut quæ humida sunt, probeq; germinant, ceu ulmus, platanus: pars maior eorum, quæ iuxta aquas uiuiscunt. Pinus teda quoque detracta seruari potest: huic etiam pinguedo pro magno habetur. Sed hæc omnia, cæteraq; non nisi bene adulta fuisse possunt, & hinc quamuis putruerint, seruari tamen, ac uiuere queunt. Nam & pinum haud semper redificare consueuere, sed cum uiget, atateq; maior est. Caret enim teda nouella, qua humorem non excoquit, neq; aggregat: sed totum ad germina, incrementaq; altitudinis absorbit. Statim enim ac dilatari inceperit, uis illa, & habitudo tedæ uidetur consequi. Quæ autem uulnerata, aut castigata, meliora feruiliaq; euadunt, hæc quoq; posse fuisse certū est plagam. Igitur & discissionem hæc tolerant, sed uitis, ficus, punica, olea, amygdala, & mālus, non ea solum, sed etiā fissiorem caudicis sustinent. Cætera omnia fixo caudice pereunt. Etenim quæ ita uulnerata,

rata, fissâ uel rursus comprimuntur, & coeunt, hæc uelut ad sanitatem reducta uiuunt, non sicut illa nihil perfissa deficiunt. Causam talis tolerantiae humor, & naturalis resolutio dant. Quippe alimentum, quantum abunde sit, capiunt: neque resiccantur, neque à frigore quicquam læduntur fissuræ causa. Quod si ita est, hinc ea quæ ex urbanorum genere fissionem tolerant, seu ficus, olea, amygdala, posse id sustinere credendum, quod partes dissectas celerrime comprimant, concrementisq;. Vnde & difficile ista scinduntur, quia tenaci compage constant. Talis enim succus ex ficorum, & oleæ pinguiusculus ille humor, & quisque pinguedinem fortiens. Vitis quoque materies eiusdem generis est. Argumentum quod palmites perfici, & medulla exempta celeriter coeunt. atque etiam magis arundo: hæc enim sponte coit, atque concorporatur. Pîrum quoque scindi quidam dixere. Sed de his cogitandum.

De corticis detractiōe in orbem: deq; medulla exempta, ac decacuminatione, mutilationeq; plantarum. Caput XXXIIII



Orticis autem in orbem detractio communis omnium, aut certe plurimorum interitus est, de qua prius satis retulimus. Seu enim pars arborum uitalis hæc sit (ut placet quibusdam) ratione optima sequetur interitus: seu hæc condensata arborem contagione deprauet totam, ratione id quoque eueniet. Medulla autem aliquatenus exempta, nunquam arbor emoritur: at si tota detracta sit, moriendum omnino est, ut Archades aiunt. Nec pinus aut abies seruari amplius potest. Causam haud temere illam putaueris, quod medulla pars humidissima, & uitalis præcipue adest: cuius rei argumentum, quod materies, quæ medulla uiduata non est, peruertitur, recuraturq; iam confecta, usque dum penitus resiccetur. Quapropter abietis, pinisq; materiem filo medio findunt, nec quicquam medullæ relinquunt. Itaq; si hæc aliquatenus detrahatur, nihil absurdum arborem posse durare: sicut etiam, si cortex aliquatenus detrahatur: sed si tota dematur, exarescat arbor necesse est, seu destituta uitali quodam principio, aut suo natuo humore. Decacuminationis, dis-

30 mutilationisq; ratio in paucis cogitanda est. Pauca enim sunt, quæ mori ea de causa possunt: quippe decacuminatione abies, pinus, larix, & palma duntaxat pereunt. Quidam & cedrum, & cupressum annumerant. Vocant decacuminationes, cum detracta coma, arboris extremitas præcidetur. Quod non sine ratione arbores prædictas interimit, cum sicca natura sint, & meatu condantur reclusissimo, & unica radice inhæreant. Vulnus enim infestat, facitq; ut & frigus, & ardor, facilius subeat: præsertim cum undique inferitur, & ex proceritate, atque meatuum reclusitudine, non pigre ad radices quoque deueniat. Ita multis de causis arbores istæ decacuminatæ intereunt. Negata his omnibus à natura nepotum procreatio est, tam siccitate radices, quam quod impetu suo toto sursum contendunt,

40 atque etiam quia radice singulari nitantur, alteq; descendant. Nusquam enim altimonie quicquam superfluit, nec uero dimorum aliorum se uertit. Itaque sit, ut nullum sit exurgendæ prolis initium. Quando igitur hæc omnia infunt, in his singulis ferme arboribus corruptionem illam omnino sectari necesse est. Dimutilatione autem paucissima pereunt. Sola enim uitis nouella maxime interit, & si quid tenellum, imbecillum, atque reclusum sit. Hæc enim istis moriendi causam committunt. Sed plura certe deteriora redduntur. Amygdala enim amara efficitur, & punica durior: & alia quædam mutari planè uidemus. Ratio explicata est, quod principio alterato, finis quoq; alteratio sequitur.

*De animalium depastione, & corruptione seminum. Item plurimum ad seminum uitam tuendam locum referre.*

*Caput XXV*



Vin & depastio animalium damnosa admodum est, quod dum germen cedit ac detrahit, simul quoque adurit. Fit enim hinc, ut plantæ grauius infestentur. Peculiare, quod de palma, & picea proditur, has scilicet dimutatione non interire, sed sterilefcere. Rationem superioribus proximam esse existimandum, quod principio alterato, imbecillioriq; reddito, uires deficiunt: & fructus idcirco utpote ultimus, creari minime omnium potest. Præterea iam germen adest, & quali peracta res est fructus: quod autem est futurum imbecillius illo est, quod peractum iam est. Sed his tantummodo istud euenit, quia hæc paucifera sunt, pigreque fructificant, ratione quidem nostratis regionis. Suis etenim locis steriles fortasse non fiunt. Nec mirum si qua parte decisa, non totæ deficiant. Principium autem plurimum posse, tamen si multiplici ratione iam liquet, tamen germina quoque ipsa confirmant, cum afflictae tur, tam in alijs, quam uel maxime in uitium genere. Quippe ex eis primis germinibus, nil amplius germinatur, sed protinus ipse germinandi effluxus cessat, atque extinguitur, quasi uitis excæcata, & manca quodammodo fuerit. Principium enim & ualidissimum, & infirmissimum est, non tamen modo eodem. Nam uitem fertilem admodum germinibus esse, germinationes sequentis temporis latissime indicant. Sunt & seminum corruptiones, eorum scilicet, quæ non secundum naturam feruntur, arborum pariter & frumentorum, & omnium cæterorum, quorum & tempora certa sunt. Viuunt etenim omnia ad quoddam tempus, deinde intereunt. Viuere inquam non actu, sed potentia. Pereunt naturali sorte, cum exiccata penitus sint, & calor, humorque totus exactus fuerit. Reliqui omnes exaruerunt, uel inuita natura eueniunt: ut cum innatis bestiolis exeduntur, aut cum humescunt, uel aliter commutantur. Quamobrem, quæ multiplici continentur uagina, aut diuersa tunica uestiuntur, aut pinguis, uel acris, uel amara, uel ossea, & siccissima sunt, hæc omnia diu perdurant, reliqua celeriter uitiantur. Alia enim inter se seruescunt, ceu frumenta & legumina: alia ex aëre, alijsque extrinsecus rationibus humefacta, ut olera, & quæ coronaria uocitamus. Glabrantur enim quodammodo, ut animalia gignant, quibus pereant. Quæ inter legumina excoqui facilius possunt, celerius pereunt, utpote dulciora. Partus enim bestiarum causam dulcedo ministrat: tum etiam sua imbecillitate deprauantur, & quia iam uelut finem suum attigerint. Frumentum quoque celerius deficit, quod dulcius est. Locus tamen plurimum ad perennitatem seminum refert, si siccus ac frigidus est. Diutius enim locis eiusmodi durant, ut in Media, & Paphlagonia: & in his feruabiliora, quæ locis editioribus recondita fuerint. Pari modo, & si quis eiusmodi locus alius sit, diu seruat: quippe ambo illa arcentur, quæ solent corrumpere, calor, & humor. Nam & terra, quam frumentis respergunt, identidem facit. Siccat enim atque refrigerat. Arborum enim semina, quæ mollia, carnosaque sunt, ceu amygdala, nux, glans, putamine ambiente seruantur: quæ sicca, lignosaque sunt, ut uinaceum, & eiusmodi, suis etiam uiribus resistere queunt. Verum (ut simpliciori ratione loquar) omnia diuturniora redduntur putaminis circundantis præsidio, nam & uinaceum, & granum ficulneum, & reliqua generis eiusdem, tegumentis suis exuta longe amplius resiccantur. Sed omnium istiusmodi maxime illa permanent, quæ nudo continentur, ceu semen oleæ: & quicquid ligni, aut ossis speciem gerit, ut semen palmæ, & cnici, & reliqua cnicei generis: densa enim hæc omnia sunt, protectuque munita tutissime. Semen autem illud interius alijs absolutum, conspectumque inest, alijs indifcretum atque incertum, ut palmulis.

## THEOPHRASTI DE CAUSIS

PLANTARVM LIBER SEXTVS.

*Quid sit sapor: quid odor. Item saporum genera, dulce, pingue, austerum, acerbum, acre, salsum, amarum, acidum. Vtrum affectionibus sensuum, an figuris sapores definiantur. Platonis determinatio de saporibus.*

## Caput I



DE SAPORE atque odore, quoniam ea quoque plantis conueniunt, tentandum pari ratione, atque de cæteris, disputare, ac reddere, quæ, quibusq; de causis generibus eueniant singulis. Ergo quam sit generis utriusq; natura, amboq; mixta quodammodo esse, pro ratione alibi determinatum à nobis abunde est. Sapor enim partis siccæ, terrenæq; in humore demistio est, uel partis siccæ per humorem ex ui caloris percolatio: quod forte nihilo differt. Odor autem est partis siccæ, sapidæ, indiaphanæ, hoc est translucido corpore demistio. Id enim æris, atque aquæ commune est. Eadem ferme saporis & odoris affectio est, sed non in eisdem utrunque proficitur. Hæc igitur iacent hunc in modum determinata. Saporum autem genera numero quidem complecti facile est: exempli gratia, dulcis, pinguis, austerus, acerbus, acris, salus, amarus, acidus. Sed naturam explicare cuiusque difficile: quippe primum illud ipsum discutiendum: Vtrum affectionibus sensuum reddenda ratio sit, an figuris, quibus singuli consent, ut Democritus censet: ni forte figuræ etiam istæ redigi ad potentias quodammodo possint, illarumq; gratia subiungantur: an alio modo, si quis extra prædictos alius esse possit. Affectionibus sensuum, inquam, ut si quis dulcem, qui humorem linguæ confertum discernat, dixerit esse, aut saporem, qui leniat, aut saporem tenuem, uel leuem. Acerbum, qui resciet, aut leuiter denset eundem illum humorem. Acrem, qui deliquendi, aut mordendi uim habeat, aut qui calorem humoris consorti, loco superno excernit, aut saporem denique uim adustoriam, uel calefactoriam sortientem. Salsum, qui assiccet, & mordeat. Amarum, qui humorem corrumpit, aut coagit, aut mordet, aut saporem denique asperum, uel maxime asperum. Austerum, qui abstergere potest, sensum, aut sensus humorem, aut humorem per summa residentem mordet, uel coagit, uel assiccat: aut omnino acerbiter leuem atq; mollissimam. Aut si (quem admodum Plato) uirium differentias in uniuersum reddideris, aggregandi scilicet segregandiq; ratione, addito leuitatis, asperitatis ue usu, generatimq; digesseris: ut acerba, quæ uenas adurunt, assiccant, atque exasperant. Austera, quæ his magis possint abstergere atque eluere quicquid linguæ inhæreat. Amara, quæ extra modum detergunt, ut aliquid ipsius quoq; naturæ absumerent, ceu nitrum. Salta, quæ temperatiora his sunt, minusq; abstergunt, & amaritudinis uacant asperitate, gratiaq; magis palato hominis sunt. Acræ, quæ oris calore seruescunt mutuo feruescunt, leuigataq; sursum leuitate sua feruntur ad sensus capitis, atque incidere possunt. Acida, quæ putredine attenuata iam fuerint, uenasq; subeant angustas, & agitent, fermentent, spumam excitent, atq; attrahere possint. Quæ autem omnibus prædictis aduersa passio, seu affectio sit, hæc dulcedini conuenit, cum scilicet saporem leniter mulcet, & mitigat, quæ asperitate horrescunt. Aggregat hæc affectio, & componit, quæ diffusa sint præter naturam: contra, quæ consistunt, duraq; sunt, laxat, & discutit. Ita Plato ratione potentia saporis determinat.



*Figuram singulis saporibus reddi à Democrito : tum contra Democriti sententiam de saporibus.*

*Caput II*



Democritus figuram singulis reddit, ac dulcem esse saporem, qui rotundus, ampliusque est. Acerbum, qui figura magna perficitur. Asperum, qui multis angulis, minimeque orbiculatus est. Acutum (ut nomen indicat ipsum) qui mole constat acuta, & nucis pineæ speciem gerit, & incuruus, tenuis, nulloque orbe conglobatus est. Acrem, qui orbiculatus, tenuis, angulatus, atque incuruus est. Salsum, qui angulatus, magnus, distortusque est, & cruribus paribus constat. Amarum, qui rotundus, levis, atque distortus parua cum magnitudine est. Pinguem, qui tenuis, rotundus, parvusque est. Igitur modi tantum inter se distant: sed forte (ut dictum est) ratio quoque figurarum saporum vires secuta est, atque illarum gratia excogitata. Ipsarum etenim uirium causas hunc in modum satis assignasse existimant, quibus scilicet de causis sapor alius astringit, affliccat, atque coagit: alius lenit, æquat, atque componit: alius excernit, diffunditque, aut aliquid eiusmodi facit. Illud tamen ab his fortasse quis exigeret, ut subiectum quoque aliqua cum qualitate reddatur. Non enim solum quod agit, uerum etiam, quod afficitur, nosse oportet: præsertim si non idem sapor percipiatur ab omnibus, ut etiam Democritus ait. Quippe nihil prohibet, ut quod homini dulce est, id amarum aliqua ex cæteris animalibus sentiant. Constat enim quod subiectum sensus affectum qualitate alia est, quando figura saporis cum eadem sit, non tamen idem agere in omnibus possit. Quod si ita est, subiectorum quoque similitudinem pro causa accepisse par est. Quamobrem differere de his profecto debemus. Ad hæc argumento est, haud unam potentiam esse figuræ eiusdem, quod contraria in alio, atque alio agere potest. Enimvero singula in suam ducere potestatem nequire, non æque mirum: sicut neque ignem omnia minus urere posse miramur. At si aduersis inter se qualitatibus afficiat, hoc certe, quamobrem ita sit, explicari magis desiderat: quanquam illius quoque rationem nonnullam reddidi oporteat. Igitur de igne si qua perurere nequeat, aut de aqua, si qua humefacere minus ualeat, haud ægre ratio reddi potest: sed si contrarium agerent, prorsus maiorem parerent quæstionem. Ergo figura autoribus de his omnibus assignanda est. Qui autem per vires saporum rationem exponere maluerit, quale subiectum sit sensus uniuscuiusque, dicant duntaxat necesse est: quippe illius quoque naturam, atque habitum nosse operæ precium est. Quandoquidem & qualiter pars corporis potestatem sentiendi obtineat: forsitan & cum ex pluribus quicquam unum constiterit, cuiusque illorum uim, atque substantiam haudquaquam latere oportet. Absurdum uel illud autoribus figurarum occurrat, ut quæ similia inter se sunt, uim diuersam agendi ex magnitudine, paruitate uel habeant: uiribus enim non formæ, sed molis uolentiam, & omnino plus, minus uel fortasse aliquis tribuet: at non itidem posse, aut agere forma communiarbitrari, ratio nulla est. Nam si figura consimiles sunt, eandem habeant rationem necesse est: quod uel in cæteris patet. Triangulus enim pedaneus, & centipedeaneus, æque treis habent æquales duobus rectis: & quadratum quoque pedaneum, & centipedeaneum quaternis angulis rectis pariter constant. Quamobrem quæ ex his prouenirent, quantitate quidem differrent, sed forma nihilo essent diuersa: sed enim vires, quæ figuris, aut formis reddantur plures, atque pluribus excitent quæstiones.

Saporem

*saporem, odoremq; non nisi permixtione effici: tum tribus generibus, plâis scilicet & animalibus, & ijs, quæ arte commiscetur, & sapores, & odores uersari.* Caput III



Aporem autē & odorem permixtione quodāmodo effici, hinc etiā constant. Nihil enim simplicium numero saporem, aut odorē habere uidetur, nisi misturā recipiat, ut aër, uel ignis, uel aqua. Nam & aqua per se insipida est. Qua de causā ueteres auctores dixere, tālem esse aquam, qualis terra, per quam fluit. Et mare uero, & quæ nitrosā, atq; punda, & acidā aquæ sunt, admixtione nō uacant: quo fit, ut odor præcipue mare comiteatur. Terra, & lapis nullius saporis sunt, nisi aliquam istiusmodi misturam capeant. quanquam terra potius habere sapore appareat: ut quæ adusta, & cinerea est, amara sentitur, & argilla dulcis: nec ratio deest, quoniā permixtione partis terrenæ sapor exulter. Metalla uero, & lapidum genera nonnulla nō modo saporem, uerumetiā odorem habere certum est. Igitur hæc omnia mixtione quadam, alterationeq; tum sapida, tum olida effici solent. Quippe cinis per uisionem alteratus est: & omnino, quæ igne domantur, saporem quendā recipiunt, uel simplicia, uel commista humoribus. Naturam igitur saporis, humorisq; tālem esse, & ante, & nunc explicatum est. Sed cum tribus generibus odores, saporesq; uersantur, id est plâis, animalibus, atq; ijs, quæ arte commiscetur, paranturq; aut etiā sponte alterantur, alijs in melius, alijs in deterius, ceu quæ putrescunt: de his omnibus disputare commodius est, quā res, de qua agitur desideret. Quocirca de naturalibus differendū in primis. Omnium namq; principium natura est: atq; eorum exponendi potius illi sunt, qui in simplicibus, ac omnino rebus inanimalibus inesse uidentur: & qui in genere plantarum, fructuumq; habentur. Nam id quoq; prius animalū genere statui debet. Tum etiā nobis studium cōtemplandi de his in præsentia est, uelut hoc prioribus rationibus sit annexum, atq; continuum. Ergo humorum sapores, qui in gremio terræ consistunt (hi namq; certissimi habentur) ceu acuti, & reliqui, ob easdem quodāmodo causas, aut proximas, quibus in plantis prouenire nihil dubiū est: non tamen numero pares, neq; similes illis sunt, sed turbidiores: quoniā non eodem modo, neq; proximo excoquantur. Numero autē illis comparari nō possunt, quia fructuum sapore permulti, atq; dissimiles sunt. Et quidam nullatenus in terrenis illis nolescunt, ceu austerus, acris, & alij pleriq;: nisi quis permixtionem, confusionemq; cæterorum hosce dixerit, genere autem esse eosdem. Quod si ita est, innumeri prorsus sapores fieri possint. Mixtionum etenim rationes innumeræ sunt, atq; etiā quod plus, minus uel adsit, differentiā faciet. Itaq; plures sunt, qui generis habet societate, ceu austeri, pingues, amari, dulces. Quapropter ueteres naturæ interpretes, sapores esse innumeros asseruerūt: sicuti & rerum mistarum numerū certum nullū putarent. Qualis enim mistura, putredoq; fuerit humoris, talē quoq; sapore produci. Cæterum quoq; melius qui genera numero certo cōplexi sunt, hisq; descriptis mistorum exinde differentiā capiūt. Porro cōditio terræ suū habet salsum sapore. Nullus enim fructus, nullū putamen saporis illius est. Sed huius causam postea reddemus.

*Saporum septem putari genera, sicut & odorum, colorumq;. Vtrum ex saporibus alios tanquam principia, alios tanquam priuationes dici oporteat. Vtrum præterea cætera animalia secundū naturam sint, an secundū priuationem.* Caput IIII



Aporum autem genera septem esse putantur, sicut & odorum, atq; colorum: hoc tamen ita erit, si falsum non aliud, quā amarum potuerit: quemadmodum & si fuscum colorem, non aliud, quā nigrum. At si secernes, octauū hunc esse necesse sit. Quippe dulcis, pinguis, amarus, austerus, acris, acutus, acerbusq; enumerantur, falsusq;

octauus subiungitur. Sunt qui uinosum quoque adijciendum putarunt. Fructibus enim eum pluribus inest, & in terra nonnunquam talis comprehenditur sapor. Ad hæc, lactis sapor redigendus ad dulcem, minus appareat. Hic enim interdum tanquam species dulcis obijci potest. Nec uero uini saporem tribuere alicui facile est: sed sui generis esse is quoque uidetur, qui & dulcem, & acerbum, & asperum possit recipere. Verum hoc nihil forsitan refert, ad cæterorum contemplationem. Numerus autem septem illorum, principalis naturæ familiarissimus est. Sed utrum alios tanquam principia, alios tanquam priuationes dici oporteat: exempli gratia, dulcem, pinguem, & reliquos his consociatos pro principijs: ex his namque generationes, nutritionesque proueniunt: cæteros autem pro priuationibus: an omnes, esse naturales censendum putauerim, tum & generandi, nutriendique rationem eosdem habere uerissimum sit. Nil enim ferè generari, aut nutriri per cæteros potest. Sed si plura naturæ tribui, quam pauciora dignius sit: cæteros prorsus magis, aut certe non minus secundum naturam esse credendum, cum paucos pars illa obtineat. Proxima ferè quaestio est, quæ de cæteris animalibus comparatione hominis agitur: Vtrum cætera animalia secundum naturam sint, an secundum priuationem. Pariter enim in his, atque in plantis, peculiaris quædam essentia intelligi potest. Ergo si priuatio, in imperfectione, indigentiaque uersatur: hæc autem, & generare, & educare possint, multoque ualidiora cæteris sint, haud quicquam secundum priuationem dici hæc debeat. Item in genere quidem plantarum simul euenit, ut non perfecte fructifescatur, & minus amara sint, quibus sapor iste ingenuus, ut in felle terræ, absinthio, & in cæteris generis eiusdem, patescit: quasi natura eò tendat, dulcedoque cruditas sit, aut incoctionis defectus. Semper enim natura suo subiecto simile alimentum reddere uult, tam in animalibus, quam in plantis. Tunc enim singulis commutari, & confici alimonia solet, cum euincunt, quod coeperint. At si adsint, quæ feruefactis aliquibus possint nutriri, quod in animalibus euenit, quibus uel generatio inde est, nec alimentum, nec prima coagmentatio fidem faciet ei satis, quod secundum naturam sit: sed singulis per mixturæ ratione argumenta partiti necesse sit. Nec enim omnes dulces saporibus idonei hominibus, sed alij insaniam important, ceti radix, quæ carduo similis est, & alia quædam. Alij somnum conciliant, & si copiosius dentur, mortem afferunt, ceu mandragoras. Nonnulli letales omnino sunt. Multis locis in multis cum radices ignotas edissent dulces atque suauis, interiere: & alia istiusmodi complura notantur, quæ uel nocent, uel etiam omnino interimunt: quanquam gustu suauia, aut certe facilia: contra pleraque insuauia, & amara iuuant, ut quæ superius diximus, fel terræ, & absinthium, & quæ uenenosiores gustus important: quippe multa ex his quoque prodesse uidemus. Sunt, quorum sapor, quia cibo per se minime idoneus sit, pro condimento cæteris additur, ut falsus, atque acutus. Hos enim nisi temperemus, exuperare non possumus: sicut etiam ex cæteris animalibus pleraque nequeunt. Quamobrem illis quoque saporibus cæteros admiscere solemus. Pleraque etiam sibi ipsa, quæ remedio forent, comperiunt, ceu aues: quo quidem argumento consistere appareat, genera saporum non ita esse distincta, ut aliud uelut naturale sit, aliud innaturale, priuationisque ascribendum: sed quod nobis ineptum in cibo sit, hoc alijs esse aptum: quodque alijs aptum, alijs esse ineptum. Prout enim naturarum conditiones se habeant, ita singulis alimenta conueniunt. Pari modo & uoluptates, & anxietates, & remedia contra affectiones, dispositionesque aduersas singulis natura statuerat. Quod pleraque animalia facere latissime patet, non modo contra affectiones, quæ sponte accesserint: sed etiam in pastibus ipsis, cum aliquo noxio comesto, mox aliud, quod iuuat, assumunt: ceu uiperæ rutam, ubi allium comederunt, cum & in odoribus eadē ratio est. Enim uero alijs alijs aduersi, nec quicquam

commodi sentiuntur, non ita solum, ut non indigeant, neq̃ querant, sed etiam ab his perimantur, quæ nobis suauissime olent, ceu uultures ab unguētis, & cantharosis. Necnon & apes uehementer eos oppugnare uidentur, qui uncti sunt.

*Ex brutis uel nullum, uel breue admodum esse, quod odorem persequatur. Item hominum odoratum esse deterrimum. Animalia etiam cætera odorem sentire, sed non discernere.*

Caput V



10 **M**inino inter bruta uel nullum, uel certe breue admodum est, quod odorem persequitur gratia suauitatis: sed ita facit, ut per euentum ita occurrit, cum scilicet cibus reddit odorē. Quippe appetitus ad ipsum pabulum, eiusq̃ est. Si quid tamen uel istiusmodi est, haud quaquam hominibus cōstat. Nam & pardalim cæteris animalibus suauiter olere quidam affirmant: & uenari in senecta nimirum bestias alliciendo gratia sui odoris: at nobis nullam odoris affert suauitatem. Nisi uerum etiam illud dixeris, ut certe est uerum, olfactum homines habere omnium fermē deterrimum. Itaque multi odores, suauitatesq̃ eorum, uel grauitates nimirum latere hominem possunt. Nec mirum, quod cætera animalia, quæ olfactum obtinent exquisitiorem, gratiam odoris non sentiunt, neque diiudicant. Forsitan enim sentiunt, sed eorum naturæ nihil conueniunt, quinimō aduersantur (ut de uulturibus dictum est) utq̃ omne insectorum genus oleo infestantur. Fugiant enim uehementer eius odorem: sed alia forte alium nara sunt aspernari. Temere tamen contra positionem illam pinguis fa-  
20 poris euenire istud appareat, cum nulla res conueniens corrumpere possit, nisi suo excessu. Sed huius ratio acritudini attribuenda est, sicut etiam origani, & generis eiusdem. Hæc enim omnia fugiunt. Sentire autē nihil posse (ut referunt) incertum homini est, ni forte meatus quoque habere causam dixeris, ut nonnulli naturæ interpretēs uoluerē, quod minus congrueret: ideoq̃ ratione magnitudinis animalia diuiserunt, paruāq̃ asseruerunt sentire, quæ paruis conueniant: magna, quæ magnis. Sed illi non satis fortasse, neque apte digesserant. Non enim meatibus sensus perficitur, sed pro dispositione, temperamentoq̃ potius sensatio & insensatio red-  
30 di debeat, in quibus suauitas, aut insuauitas consistere solita est, quod etiam hominibus euenit. Non enim idem odor gratus omnibus, sed potius ex foetidis, atq̃ grauius, aliqui communes omnibus inferuntur, ut qui ex quibusdam hiatibus, aut speluncis letales afflant omnes homines, qui accesserint. Sin autem illi quoque spirantibus tantummodo pestem inferat, at istud quidem latissime, sicut de saporibus patet. Odores etiam esse qui conueniunt singulis, suauemq̃ olentiam, quæ cibum non comitetur, nullis, uel certe paucis gratam occurrere, & hoc an commodum ali cui sit, incertius sanē est. Sed hæc latius fortasse, quàm res desideret, de qua agitur, differuimus. Redeundum eodem est, unde nostra processit ratio.

*Saporem dulcem maxime conuenire naturæ. Quamobrem plantæ singulæ saporem habeant suum.*

Caput VI



40 **V**iusq̃ saporis, odorisq̃ natura profectio, quemadmodum & animasium, est, quæ singulis dispositionibus, temperamentisq̃ conueniat. Cæterum quantum in uniuersum, communeq̃ res exprimi possit, dulces, & qui in eiusmodi genere consocientur, aptiores sunt ad alendum, propiusq̃ ad naturam accedunt. Sed forte nonnihil repugnare appareat, quod ratione minus respondere existimes: quando dulcis sapor gratus omnibus sit, odor autem eodem accipi modo non possit, ni forte ob imbecillitatem sensus humani oblitescat. Sed fortasse nec illud uerum omnino est, quod de dulci

retulimus. Sed de his satis dictum iam est. Plantarum autem uel potius omnium, quibus insunt sapor, quomobrem singula saporem habeant suum, exempli gratia, dulcem, aut amaram, aut pinguem, causa prima assignanda est coagmentationis: de qua determinandum, alij per figuras censentes, ut Democritus, rationes sese aliquas reddere arbitratur. Quod idem uolunt, & qui per eam coagmentationem de singulis rationem propriam reddunt. Alij per excoctionem, cruditatemque dulcia, & amara, & reliqua malunt discernere: sed forte prohibere appareant, quæ paulo ante diximus. Quippe omnia per excoctionem prius assimilari uidentur, tam in animalibus, quam in plantis. Verum ita dicendum: Sapores tum dulces, tum qui omnino alere possint, atque omnem odorum suauitatem confectione, concoctionemque prouenire. Nam quantum ad genus redigere liceat, percoctiora ceteris sunt, quæ istiusmodi cernimus. Constat hoc uel in ijs, quæ genere copulantur eodem. Sunt enim quæ excocta fuerunt, saporis odorisque melioris, quam quæ crudiora sentimus, dummodo utraque ritu concoctionis suæ coqui occeperint. Sed hæc latius posthac exponemus.

*Omnes plantas generandis saporibus transire per excoctionem ex alia in aliam qualitatem saporis: uinosaque plures sortita esse sapor.* Caput VII



Vnc illud ex cæteris primum sumpsisse oportet, quod uniuersæ stirpium naturæ commune est. Omnes etenim plantæ in generandis saporibus transeunt per excoctionem ex alia in aliam qualitatem saporis: exempli gratia, quod quidem simpliciter dici potest, ex genere priuationis ad formæ habitum: ceu ex amaro, aut acerbo in dulcem, uel pinguem, uel aliquem istius consociabilem. At quoad particulatim res exprimi possit, proinde genera saporum sequuntur, atque natura singulis distinctionem statuerit: & in alia plures, alia in pauciores transire solita sunt. Enim uero alia ex amaro in acerbum, ceu oliua: alia ex acerbo in dulcem, aut acutum, ceu pira, & cætera. Etenim quæ acuta sunt, acerba prius fuere: alia primum acerba fuerunt, mox acuta, deinde dulcia redduntur, ut uuæ: quippe (ut summa dicam) plurimas alterationes uua recipere apta est, & omnino quæ saporem uinosum sortita sunt. Primum enim dilutus quasi sapor sentitur, proxime acerbus, tum acutus, inde ultimo dulcis: sic & morum acutum ex acerbo, & dulce ex acuto efficitur. Et in alijs uero idem hoc euenit. Quippe uinosæ dulcedini proxime adiacet sapor acutus. Quomobrem qui quarunt, cur morum cum rubet, acutius est, quam cum albescit, cum propius tunc ad finem excoctionis sit, non recte quarunt. Tunc enim uelut generatio ipsius destinati saporis obtingit. Prius autem cum albescit, acerbitas remotior à dulcedine, atque communior est. Qua de causa & siccius albescens humectius est, cum rubescit, ceu iam succum, saporemque suum adipisci occipiat. Omnino quisque fructus primum siccus consistit, mox humescit. Et hæc generatio est saporum, humore scilicet plenius influente, ac uelut articulo perfectius, & assidue maiorem in modum augente. Quo fit, ut non temere maior pars fructuum acerba principio esse soleat, quoniam sicca est. Sed omnium humidorum siccissima esse putantur, quorum succus lacteus est, ut ficus. His igitur uelut materiam quandam saporis exhibent, illi quibus priuationem tribuimus, unde scilicet ad percoctionem transitur: cæteris autem illis ceu pro essentia, sineque interdum cruditatis qualitas est. Sunt enim fructus complures, qui & amari, & acerbis, & acuti suapte natura perficiuntur: quorum scilicet succis minus humiditatis, saporisque datum est.

*Omnes fructus plantæ saporem aliquatenus monstrare: & crudos amplius, maturos minus.  
Item sapes in aliquibus ex crudis, ac pluribus transire ad perfectionem, in aliquibus  
insipidos perdurare: tum quemadmodum dulcis, & amarus sapor principia  
cæterorum intelligantur.* Caput VIII



Mnes autem fructus saporem quoque plantæ aliquatenus monstrant, quod forsitan ita fiat necesse est, cum inde suam isti trahant originem: sed crudi magis, maturi minus, utpote cum humoris effusio, quo plus temporis processerit, eo purior facitetur. Hiorum coagmentatio talis est. Quædam principio uelut insipida, dilutaque sunt, ceu frumenrat exempli gratia, triticum, hordeum, atque similia, quorum & perfectio statim ab ea ipsa qualitate accedit, antequam plures fiant mutationes. Neque enim dulcedo procul ab ea est, itaque nihil est opus uaria mutatione. Quapropter gemina quædam ratio generandi saporis esse uidetur, utraque pro natura rei composita. Altera enim ex crudis, ac pluribus transire ad perfectionem: altera quasi insipida, insuauisque, simplici generandi, alterandique uia ex natura subiecta confici solita est: quarum (ut simplicius loquar) altera in annuis potius, altera in arboribus est, utpote quibus plus coctionis desideretur. Sed forsitan melius exponetur, si non annuis, & arboribus, sed omnino ratione temperamenti determinemus. Quale namque hoc sit, talis mutatio sequatur ratio est, nam & amygdala principio aquosa sentitur, quandiu uiridis sit, atque recens: siccescens autem, pinguiuscula redditur. Sic & alia quædam in eodem genere perficiuntur, quorum & putamina uel acerba sunt, uel acuta, modo amygdalæ, quod omnes sordes, omnemque terræ callum eo uis naturæ secernit. Igitur natura quasi ex quibusdam commixtis saporibus excernere percoctione saporem simplicem intelligitur, quocirca res e contrario, quam in cæteris euenire appareat. Quippe cæterorum generatio permissione conficitur, horum ueluti per detractionem, seu detractionemque: ac ibi ex principijs, hic ipsius principij. Principium enim dulce est, id autem (ut simplicius agam) præcoctio spectat. Sed hæc minus sunt disputationis propostita. Tum etiam illud absurdum, si omnia saporum genera ex amaro & dulci commixtis exultent, ut ex elementis omnia corpora. Sed rursus absurdum occurreret aliud, si ex his nihil, hæc ex cæteris prodeiret. Haud enim natura talis principiorum est, nisi forte multifariam principij dici potest, modisque pluribus usurpetur: quod ita esse uidetur, cum uelut per consolationem seu coordinationem aliqua explicantur. Sed determinare de his nihil disputationis præsentis interest.

*Quod humor sit saporum communis materia. Causa uero agens, & internus, & externus calor. Qui item sapes maxime perspicui euadant.* Caput IX



Aporum autem generationes rationibus supradictis, aut ex forma in formam, aut ex contrarijs in contrarios acquiri putandum est. Omnium uero communis materia humor subest. Alterat autem, agitque calor, cum internus, tum externus: hic enim (ut dictum est) plantarum generi maxime accommodatur, nec sicut in animalibus internus habetur accommodatior. Nam in illis quoque mutationes, alterationesque saporum fieri solent. Quæ cum ita sint, quonam pacto uicissim generatio fiat, à Democrito petat aliquis. Aut enim figuras commutari, ut ex scalenis, atque acuto constitutibus angulo orbiculato efficiantur, omnibus scilicet inhaerentibus illis, ceu acerbo, acuto, dulci: aut priorum figuras excerni, reliquas autem remanere: aut tertium alias exire, alias subire necesse est. Sed cum transfigurari impossibile sit (quod enim incorporeum est, nullam sibi admittit affectionem) restat, ut uel aliæ subeant, aliæ exeant: uel omnibus inhaerentibus illis acerbo, acuto, dulci, priorum figuræ excernantur, reli-

quæ remaneant, quæ singulis ualeant conuenire. Sed ne ista quidem fieri ratione aliqua possunt, adijci nanque oportet, quod hæc agat atque efficiat. Sedenim ratio hæc de pluribus fortasse petenda est: quippe omnium generationes ille hunc in modum exponit, ceu substantiæ, quantitatis, qualitatibus. Caterorum autem excoctio, quæ calore subministratur, alia excernit, ac euaporat, alia crassat atque coagit, alia attenuat, alia (ut simplici ratione dicam) alterat, quemadmodum uel in ijs agitur, quæ igne feruescunt. Omnino assumendum est, cunctos sapores inesse potentia, immutationeque. Sed fieri atque esse, non nisi actu contingere. Prorsus peracta excoctione succorum, alij statim sensu percipiuntur, ceu dulcis & pinguis. Hic enim quibusdam exprimi atque defluere potest, & quidem segregatio eius ita maxima ex parte fieri solita est. Alij non æque perspicui sunt, ceu uinosus in myrto, atque etiam minus qui pinguis in eodem est. Habet enim talem quoque humorem, qui uino cum sacclatur, residet atque innatat: quem detrahunt, & ad lumen lucernarum utuntur. Omnes synceriores efficiuntur suis pulpis expressi, multoque magis qui expressi diu immoti manserunt. Sic enim diluta pars exhalatur, & terrena subsidet, in totumque calor intestinis coroboratur. Nam & decerptis fructibus alteratio succi tonide consequitur modis: & nuces, ac cætera, quæ pari ratione oleum reddunt, spacio temporis longiori, amplius propter prædictas causas oleantur. Quare constat (quod dictum iam est) cunctos potentia inesse, actiones uero per alterationes oriri. Sunt certe mutationes succorum, quemadmodum in ipsis fructibus: sic etiam cum expressi fuerunt, in sapores excoctionis pariter, & corruptionis.

*Quare uinum ex uetustate amarum fiat, curque coalescat. Item quemadmodum sapores corrumpantur: hinc omnes fructus calore concoqui.* Caput X



Ater hoc maxime in uino, quippe hoc procedens suo uigore, & densens, & quasi senescens, certis quibusdam saporibus immutatur. Enimuero si ex uetustate uelut secundum naturam fuerit alteratum, amarum efficitur: quod propterea euenit: quoniam aëre circumfuso, exactum sit id quod tenue, ac idoneum potui fuerit: hoc enim exollescente, relinquitur quod terrenum est, atque amarum. Sed si tanquam per uiolentiam, & præter naturam mutatum sit, coalescit: id enim saporis contrarium esse natura uoluit. Pari modo uel cæteris euenit, ut inde corruptio exulter, unde naturalis generatio prodijt: quippe ex acuto in acutum, uelut in materiam, resoluitur. Quod cum fuerit, mutari rursus, atque restitui raro euenit: & tunc forte, cum aut mari commissum sit, aut syderis ortu fuerit leuiter, per summaque immutatum. Vitium enim tum etiam simile accidit, nisi uehemens sit. Sed de his apertius postea differemus. Corruptio autem, & alteratio, accidere cæteris uitijis solent. Quod enim corrumpitur, perhumescit, & sæpenumero coalescit: quod senescit, ac uetustescit, exiccatur, parte hic etiam terrena tantum extante. Omnino singulæ corruptiones, aut rei alienæ admittance, aut propriæ defectu, temporis causa eueniunt. Pereunt uero permissiones, alias externis aliquibus immixtis, alias parte alia uitata, aut modum excedente interna. Sed forte uerius dixerim, parte aliqua commota, corruptaque totum perire: sic enim fructus corrumpitur, & lac, & uinum, & reliqua generis eiusdem. Nec uero minus certa mutatio in his est. In contrarium enim omnia transeunt. Plures tamen esse contrarietates intelliguntur, atque hoc quidem manifestum est. Fructus autem cuiusque concoctio, ut subministratur caloris, ut dictum est. Sed quæ serò perficiuntur, ut frigoris maturari uidentur, temporis causa. Calor enim, quod sæpe dicimus, concoquit, dum circumobstatur, atque in se ueritur.

*Oleam post arcturum nihil plus olei facere. Tum copiam olei non alimenti ubertate, atq; in pleno corpore oliuarum collocandam esse.* Caput XI



Eccliare quod de olea notatur, si uerum est. Nihil enim plus olei post arcturum fieri posse autumant, simulq; nucleum tum obdurefceret: quo facto, non amplius humorem posse in oleum uerti. Quãobrem si qua naturali ratione agendū, qualitati aëris ambientis causam impu-  
tare debemus, nō occasu syderis, qui certe pro casu habendus est: atq; utrum fortasse illorū ob eandem causam euenit. Sed ambigūt argumento uerisimili-  
fatis, qd imbris subssecutū nullū penitus incrementū pabulo accedit: sensu quoq;  
10 experimētoq; confirmat. Cum enim albæ adhuc oliuæ torquent, minus olei emit-  
tunt, omniumq; præcipue illæ profundunt, quas nouissime collegerunt. Facit em̃  
perfectio, ut parte aquosa humoris sublata, reliquum amplius coqui ualeat. Ratio,  
quæ repugnat, hæc est. Sed fieri potest, ut ob aquosam partem, atq; amurcam, plus  
esse olei appareat. Nam & prius, quàm nigrescant, habere oleum constat: & synce-  
rius tum esse, ac albius, argumento est, quod ex phaulijs promitur. Nec mirum, si  
quam in eo, quod albis exprimitur, sentimus amaritudinē, quæ postea excocto fru-  
ctu aboleatur. Hoc enim nō parsimonix, aut copix, argumento est: sed corporis am-  
bientis qualitate succum affici aliquatenus indicat: quod quidem & uasa faciunt.  
Minus autem solitum esse expectare, ut pulpa excoquatur, constat eo quod albis  
20 adhuc proficiat oliuis. Sic fit, ut neque potentia, & actu distinguere sit. Materiam  
enim, ex qua sit futurum, iam obtinet. Quæ igitur ratio, modus ue quisnam sit,  
si uere, uel simpliciter, uel aliquatenus plus esse dicatur: Quippe ratione caret  
utrunq;, sed alterum magis: at nō eadem percoctio succi, pulpæq; sit ad usum ciba-  
rium. Pulpam enim gratam esse gustatu oportet: succus alteratione partis terrenæ,  
aut putredine, ut quidam uolunt, perficitur. Drupas enim putredine statuit. Oleū  
uero non nisi ea ipsa succi mutatione creatur: quod quia difficilius sit, non temere  
dixerim a calore confici ampliori: statimq; dum succus minus parti aquosæ, terre-  
neq; permixtus est. Igitur ante arcturum ambo illa contingunt. Est enim & tempus  
feruentius, & succus purgator. Contrā autem post arcturum, pulpa enim tum au-  
30 gescit, atq; perficitur. Copiam uero olei, nō alimenti ubertate, neq; in pleno corpo-  
re oliuarū collocandā esse, multis rationibus patet. Imbres etenim minus olei faciūt,  
& riguæ oliuæ deterius fundunt: quibus quia caro multa, nucleus paruus. Hæ par-  
cissime præstant oleum, ceu phauliæ, tanquam uires hac in parte naturæ deficient.  
nec uero in locis frigidis olei copiam largiunt, sed carnis: quod questionē utiq; citat.

*Quãobrem uitis loco frigido, sapore non careat, oliua careat. Quodq; genus olearum, quæ ægy-  
ptiæ appellantur, ubertate, ac magnitudine fructus excellat. Odorata item saporem gustati-  
bus exprimere, quasi non modo sensus uicini inter se sint, uerumetiam quæ sub sensum uenire  
ualeant, proxima quodammodo inter se collocari natura uoluerit.* Caput XII



40 Vamobrem uitis locis prægelidis sapore non caret, oliua autem caret.  
Sed ratio in eo fanē est, quod superius diximus, uidelicet, quod uires  
ad carnem conficiendā intendunt: uiræ autem sapor in ipsa carne con-  
sistit. Addo etiam, quod prius fortasse, ac principalius sit, calorem, qui  
oleo conficiendo sufficiat, minus ualidum esse: itaq; fieri, ut Vere nula-  
lum, estate minus bonū creetur, atq; autumno meliorescat. Sol enim nō amplius eo  
tempore exuperare nimis ualeat. Quod etiam argumento causæ sit, quãobrem æsta-  
te oleum fieri solet, succum enim uinosum, aut aquosum frigus coquere satis po-  
test, at oleosum nō potest. Aquæ pluuiæ, aut conductitiæ carnem (sicut dictum est)  
augent. Oleum nihil se carni permiscet, sed per se manet, quemadmodum cum ex-



pressum est. Genus olearum, quod ægyptium appellamus, ubertate ac magnitudine fructus excellit; reliquum abunde oleum fert. Sunt enim complura genera, ut in historijs dictum est. Igitur olei generationi causa talis reddenda est: de cæteris autem pinguibus opinandum, quemadmodum inter omnes conuenit autores. Si uero reliqua tempore discordent, distinguendum, aut singulorum naturas, aut qualis pinguedo sit, aut etiam modum generandi: cum tamen diu manserūt, ceu nuces, uim certe, ut dictum est, obtinent. A cōtionē uero temporis spaciū educit, cum aquo-  
so illo humore exhausto pinguis consistere, & coqui cœperit. At sunt, quibus pinguedo sicca admodum est, nisi forte calor circumobstans possit id quoq; in aliquibus efficere. Ex omnibus, quæ saporem aliquem obtinent, quædam odorata quoq; illico sunt: maior tamen pars odorem quendam gustantibus copulatum cum sapore ostendit. Nonnulla etiam uel confricata duntaxat, & permota, reddunt odorem. Rursum, quæ odorata sunt, saporem gustantibus, aut manducantibus expriment, quasi non modo sensus uicini inter se sint, uerumetiam quæ sub sensum uenire ualeant, proxima quodammodo inter se collocari natura uoluerit. Vnde haud perperam dictum appareat, odores pro saporum ratione consistere. Hæc enim opinio planè illi respondet, quæ cognatione aliqua coniungi istos inter se, atque eodem quodammodo oriri significat. Quod quidem utrumque genus quid sit, aut qua ratione, cum idem esset, differat, tamen inter se explicari certe oportet.

Non omnes odores reddi appellationibus posse. Species item plures uniuscuiusque saporum generis annotari. Dulce etiam principium saporis esse, amarum odoris.

20

Caput XIII



Erum non omnes odores, appellationibus reddi fortasse possunt eisdem. Quippe amarum odorem, aut salsum, aut pinguem, aut acerbum nominare minus quispiam uelit: neque enim saporum omnia genera odorum rationem sequuntur. Nihil tamen id prohibet, quo minus hæc inuicem coniungantur, & utrumque alterum quodammodo consequatur. Plures autem uniuscuiusque saporum generis species annotantur, ut dulcis, amari, ac reliquorum. Melleus enim, & uinosus, & lacteus, & aquo-  
sus, dulcis species sunt. Forsitan & plus, minus uel, differentiam facit. Sed potissimum ratione subiectorum commiscendorum discrimen exoritur. & cæteris quoque pari modo intelligendum, atque de his inter omnes ferè autores conuenit. Sensum autem illum odoris, qui gustatu percipitur, non temere adiungi genus olerum indicat, quod agnomen à gratia palati accepit, ceu anethum, fœniculum, iris, & reliqua generis eiusdem, quorum pleraque nihil penitus olent: atque etiam latius illa significant, quæ præarida sine ullo odore sunt, ceu lens, cnicum, & eiusmodi. Hæc enim perfracta statim ac manducantur, sufferuescunt uaporem emittunt præteruenem, qui sursum per meatus ad olfactum transmittitur, & saporem quoque reddunt eadem, dum manducantur. Omnia propè odorata amara sunt, sed causam huius postea dicemus. Cum uero illa duo contraria inter se sint, dulce, atque amarum: alterum uelut inijtum grati saporis, alterum grati odoris esse uidetur, & quodammodo magis primordium dixerim amarum grati odoris. Quippe odoratum quoniam amarum sit, comperire difficile est. At boni saporis complura inuenies, quæ dulcia non sint, quæ ferè odorem quoque in gustatu, olfactuq; reddere apta nouimus: quod dulcedo raro, & perexigue facit: quam utrumque ex cōctione proueniat. Sed  
de his postea.

Cur in

*Cur in plantis sapes omnes, præter salsum, spectentur. Tum, quare falsugo aliquibus plantis aliquatenus accidat, amaritudo uero aliquibus plantarum partibus.*

Caput XIII



Vm autem saporum genera plura sint, quæret sanè quispiam, quam-  
 obrem cæteri omnes in plantis, & fructibus fieri solent: ut amarus,  
 acerbus, acutus, & reliqui: falsus nunquam fieri potest. Nihil enim in  
 genere plantarum falsum percipitur, scilicet ita ut in se talem fortietur  
 saporem. Sunt enim quorum summam partem duntaxat falsugo que-  
 10 dam obducit, ut cicer. Causa, quod falsum nullam alimoniam, nullam generatio-  
 nem præstare potest. Argumentum, quod nihil penè locis eiusmodi gignitur. Vi-  
 res enim illud erodit, ac eximit, ut facultas generandi uetetur. Quod igitur cæteris,  
 ne generentur causæ sit, id certe neque ex se quicquam creare posse, ratio est. Nam  
 & ea, quæ in mari nascuntur, non sine dulcedine, aut aliqua cæterorum saporum  
 qualitate proveniunt, atque consistunt: ut pisces, & reliquum animalium genus,  
 quod mari uersatur. Ergo causam in uniuersum hanc opinari dignius est. Illud enim  
 ex quo futurum aliquid sit, commutabile esse, necesse est: falsum affici nequit, atq;  
 incommutabile est: quamobrem neque perfectum quicquam, neque aliquid ullo  
 pacto generari ex eo potest. Omnino in singulis, & consequi solitis, illud etiam con-  
 sentire appareat: ut sol, & calor, quia in omnibus humorem leuissimum, atque ad  
 20 alendum aptissimum attrahit: falsus, quia natura ponderosus, minimeq; cibo ido-  
 neus est, à nullo hauritur. Adde, quod nullam putredinem, nullam alterationem  
 humor istiusmodi recipere potest. Quæ cum ita sint, auersam penitus à plantis esse  
 qualitatem eius saporis necesse est. Ad hæc, quoniam genus plantarum nullam  
 uim excrementorum egerendorum obtineat, nihil attrahat sibi, quod minus alere  
 possit, uerisimile est. Quippe egestionem quoque illius aliquam subsequi oportet:  
 non solis ui prouocari, & per summa erumpere. Lara enim ubique, magnaq;  
 affertur humoribus, incomplexa tamen, inconglutinataq;. Democrito placet, quod  
 nullum adsit scalenum, sed angulos omnia imitentur. Hæc si plantarum uetent per-  
 30 missionem, licet animaduertere. De his autem, quæ in uniuersum prius exposita  
 sunt, quæret sanè aliquis, quamobrem falsugo innasci, aut subnasci aliquibus soleat.  
 Nam si intrinsecus sit, alimento, natureq; conuenire, haud temere confirmetur: sed  
 si extrinsecus ueniat, & hoc quidem minus, quærendum item unde, atque ex quo.  
 Aut enim ex aëre, aut ex uapore, qui sursum feratur, aut radicibus tracta per sum-  
 ma, deinde erumpi, tanquam aliquid sordium. Quippe falsugo per summa consi-  
 stere omnino uidetur. Ergo si radicibus trahitur, ratio palam est: at si minus, mirum,  
 cur ciceri, & reliquis huiusmodi residere tantummodo apta sit. Quæ enim falsu-  
 gine ægrotent, ceu rosa, & quædam alia, hæc disputationem aliam desiderant. Ci-  
 ceri uero & familiaris, & perutilis falsilago est. Abluta enim in flore fructuq; proue-  
 niente, statim planta radicibus arefactis, emoritur. Itaque constat naturam id quali-  
 40 tatis natuum esse ciceri uoluisse, ut ualeat conseruari. Omnino quædam suis in fo-  
 lijs, ramisq;, talem fortiuntur saporem, qui ablutis gustatu aquæ percipitur: nec in  
 his modo, sed in fructibus quoque ipsis itidem est: quod sensus late iudicat, si quis  
 non fructum manducet, sed linguam ei duntaxat apponat. Quippe non in pulpa,  
 sed in putamine fructus falsugo posita est: quo fit, ut semen reconditum, & incorru-  
 ptum seruetur: nec secus à falsugine custodiatur, quam cum in uasculo conclusum  
 plantæ adhæreat, quasi genus istud saporis sui gratia custodiendi à natura acceperit,  
 quandiu uiride sit, caulis, atque siliquæ munitur falsugine, ut dictum est. Cum ue-  
 ro siccescere coepit, suo quoque putamine saporem istiusmodi recipit, tanquam in-  
 trinsecus æditum. Enimvero foras uersus rem huiusmodi excerni cōsentaneum

est, utpote alienam: quemadmodū & amaritudo cucumerum, quam per summitatem sentimus. Genus quoque pirorum Cariae domesticū fertur, lanugine tam salia obductum, ut nisi aqua subluatur, edi non possit. Nihil igitur mirum, si eiusmodi plura creantur. Neque enim illud procul praedictis est, glandibus extremis amaritudinem insidere, & bulbis cacumine appellato, & alijs acritudinem sitilo spicae intestino teneri. Haec tamen alicuius ratione similitudinis addita sint. Rem autem naturalem esse, atque nativam, hinc latissime constat: ubicunque enim seratur nascaturque, aliquid falsuginis capiat, necesse est, etiam si solum nihil sapiat salis. Nam ea quidem, quae locis salis proveniant, haud temere falsuginem ceperint, sicut alia pleraque, & aurio. Nonnulla etiam suauiora, melioraque reddi ratio est, ceu brassica. Acritatem enim & amaritudinem brassicae insitam, falsugo absumit: tum etiam fragile quoddam efficit corpus totum nimio humore sublato. Quippe sal ad trahendum, absumendumque humorem, aptissimum est. Patet hoc vel etiam cruda: frangi etenim aliquas perhibent delapsas in terram. Cum igitur talis igni mandatur, facillime coquitur, & tenera, dulcisque sentitur, scilicet ut consentaneum est. Nam & qui nitrum insiciunt, hoc idem conantur efficere: veruntamen non pridem incipiunt. Natura vero iam pridem orsa, paulatimque prosequens, talem reddiderat. Quapropter nec id aversum a ratione est, ut circa solstitium, aut circa sydus, non nusquam & omnino per aestatem meliorescat, ut apud Eretriam. Tum enim falsugo acrius agit, evincitque, utpote cum ea ipsa largior sit, humor autem contractior. In Aegypto quoque, & locis eiusmodi omnibus, optimam fieri ratio est. Sed haec latius fortasse adiecimus. Falsugo autem siue a radicibus trahatur, siue a solis ardore ad summa ducatur, neutra sane ratione immobilis esse possit in terra, qua de re disputare incepimus. Sed de his satis.

*Qui sapes humidi, siccae intelligantur. Quodque vinum ex hordeo triticoque conficiatur. Cur item odores non ex totis plantis, sed e partibus quibusdam reddantur. Quodque saporis, aut odoris suavitatis aliquorum insit radicibus. Et quod tanquam ventres plantarum sint radices. Quare etiam plantae quaedam pinguedine, ut animalia suffocentur. Caput XV*

**L**lud autem humidum ne, an siccum potius, singulis saporum generibus datum sit, declarandum nunc est: utpote ad saporum naturam accedens modatissimum prorsus. Acutus et austerus, humiditatis potius esse videtur, quam siccitatis. Contra acris, dulcisque, siccitatis potius, quam humiditatis. Et quidem humores, cum crassescunt, dulciores redduntur: ni forte haec pro nihilo sint putanda, illudque melius dici possit, omnes ex utraque re, hoc est humiditate, siccitateque consistere: quantaque earum altera materiam magis res praesentiet. Quod si ita est, omnes eadem origine prodeunt, omnesque in siccitate positi sunt, sicut dictum iam est: sed alios succo expressio, de sede sua educimus, ut uva rum, & oliuarum: alios aqua etiam modica infusa excernimus, ut nucum, & ficum. Nonnullos dimouendo ex propria natura, putrefaciendoque leuiter, potari habiles faciunt: ut qui vinum ex hordeo, tritico uel conficiunt, aut quod zethum Aegyptus appellat: quorum omnium principia, viresque, naturae conueniunt: quae uero utendicausa sunt, haec solertiae potius, ingenioque hominis tribuendum. Sed quae ars, & ingenium faciat, ipsa per se existimare dignius est. Saporum autem naturalium affectiones, generationesque, praedictis his rationibus contemplari certe oportet. His igitur positis, exploratisque, dubitauerit quispiam, quareque, cur non partibus eisdem omnium sapor, aut odor efficitur: sed aliorum parte superiore, aliorum inferiore, ac circa radices, nec omnium, quae parte superiore habeant, norma eadem est: sed alia in fructu, alia in fronde, alia in flore, alia in ramorum summitate, suum habeant sapor, aut odorem: magisque odor, quam sapor sede uaria collocatur. Nam & cortice suo non-

suo nonnulla suauiter olent. Flores eorū, quæ tota sunt odorata, nulli (ut ita loquar) odorati creant, ceu serpylli, sisymbrij, helenij. Atqui ratio exigit, ut quod in cæteris quantq̃ inodoratis odoratissimū est, idem etiam inodoratis sit odoratissimū. Mirum etiam florem quorundā odorem suauissimū reddere, quorum nulla pars alia bene olet, quod in uiolis, rosissq̃ patet. Prædictū etiam illud, radicibus aliquorū saporis, aut odoris suauitatem esse, in dictam quæstionem adducit. Ambo etenim ista ex coctione conficiunt: quodq̃ plurimū, recensq̃ assidue obtinet alimentum, cæterisq̃ transmittit omnibus, hoc ita percoqui, ut saporis, uel odoris gratia adipiscatur, nulla ratio sit. Nec enim animalū uentribus contingere istud uidemus. Igitur de his, cæterisq̃ similibus principio illo sumpto, quod sæpe dicimus, uidelicet per coctionem hæc omnia confici solere. Mox adiiciendū, quod de beta dictum antea est, uidelicet radices tanq̃ uentres esse plantarū, quoniā cibus in his aliquatenus alteratur. Quæ cum ita se habeant, nihil impedimento est, quo minus saporis, odoris uel suauitatem obtineant: modò confusione tali elementorū conditæ sint, ut rei capaces esse ualeant. Nam & in animalū uentribus quamuis sordes pleræq̃ sint, tamen subiacet ali- quid humoris, qui grato sapor, excoctioniq̃ datur, uelut alteratio talis ea parte potissimum fieri possit, quod etiam in arboribus constat, quæ pinguescere admodū solitæ sunt. Pinus enim radicem agit tæda totam refert, ut ante dictū est. Ratio eadē, quæ in animalibus est, quod pars alimentī, quæ ferbuerit, excoctaq̃ sit, quoniā purgatissima est, assidet: & collecta, densataq̃ pinguedinē reddit. Reliqua uero sursum transmissum, partes, quæ supra terram eminent, nutrit: nō per illam pinguedinem subiens, sed per alios quosdā meatus. Nam quæ in tædam omī ex parte mutatæ sint, obesitate moriunt, ut dictum est. Cum enim nullū transitū habeat spiritus, stranguantur: sicut animalibus accidit, quæ ultra modū pinguerint. Quippe meatus omēs frequentia pinguedinis obruant, ut spiratio ad finem usq̃ transire minime ualeat. Quibus igitur, uel nulla penitus, uel nō multa, callosaq̃ inest pinguedo, his nunq̃ talis crassatio euenit: at quibus inest, ipsi nimirū euenit, scilicet ut feruoris exuperantis.

*Cur partes in plantis crispiores, aliæ alijs extent. Cur etiam sapor, aut odor, aut suauitas, ita in alijs quibus insit radicibus, ut nulla pars alia bene olida, beneq̃ sapida sit. Caput XVI*



**P**roximum huic, quod in crispitudine lignorū efficienda animaduertimus. Semper enim caudices crispiores extant, quàm rami: & ramorū ipsoꝝ primæ partes densissimæ, atq̃ crassissimæ sunt. Quod ita euenit, quia his in locis alimentū magis immoratur, atq̃ consistit. Quæ de causa & incrementū agitur in profundū. At cum ultra ad germen efundendum transcurrit, simplicius, atq̃ in longitudinem potius auget. Quod igitur his in locis alimentū se aliquantisper firmat, & quasi conuoluit, efficitur, ut & spissa, & crispaligna creentur. Cæteris, quia ulterius assidue tendit, nihil tale exultat. Quæ obrem in nouellis nulla est crispitudo: uis enim tota ad augendum contendit. Sed ubi in longitudinē augeri cessarunt, crispari deinde, dilatariq̃ incipiunt, sicut etiam animalia. Eadem causa est, & quamobrem tædam, picemq̃, aut resinam nullam penitus nouellæ arbores habent. Alimentum etenim totum ad incrementa, fructificationemq̃ absūmitur. Quippe postea in tædam uertuntur, atq̃ omnino fructibus illum destinatum humorem magna parte usurpant. Tunc enim uelut sordes naturales quædam hæc relinquuntur, cum uis augendæ longitudinis destitit, & radix, atq̃ uniuersa arbor plus roboris capere inceperit. Hæc propter causæ cognationem hoc in loco inferere placuit. Sapor autem, aut odor, aut suauitas aliquarum radicū, ita ut nulla pars alia bene olida, uel bene sapida sit, prædicta euenit ratione. Constat hoc idem in minoribus etiam, ut in herbis, oleribus, atq̃ fructibus nonnullis.

lis, quorum radices sunt dulces, reliqua uero minime respondent radicibus: exempli gratia, graminis, gladioli, betæ, apij, equapij, atq; eorum quæ in paludibus, aut fluuijs idonea cibo proueniunt. Radices enim & caules plurimū dulces, ac cibo aptissimi sunt, folia minime. Causa in his omnibus, aut quod superiora humidiora sunt, atq; dilutiora, ut betæ, ut cunctorū palustrium. Vnā enim & aquosa sunt, & tenuia & excoctione carent, cui efficere saporem datum est. Radix tamen & caulis, quia minus habent humoris, dulcedinem obtinere aliquam possunt, aut e contrario scilicet quia superiora nimis sicca, ut graminis, & omnino eorum, quæ arundinacea sunt. Quippe pars eorū superior sicca, inferior rosida est. Sapor autē neq; in siccitate, neq; in humiditate nimia potest consistere. Itaq; efficitur, ut graminis, & syrinchij, & reli-  
 quorum generis eiusdem radices sint dulces: partes uero superiores ex causa siccitatis insuauēs, & propemodū insipidæ extant. Hoc idem & in apio, atq; equapio plantæ animaduertitur. Radices enim eorum carnosæ sunt, gratæq; palato: folia sicciora, ueluti acriora. Pari modo de cæteris quoq; licet differere. Omnia enim ferè in his ipsis rationibus continentur. Quamobrem ubi plus alimonie subministratur, uel superiora eorum, quæ suapte natura sicca sunt, cibo idonea perficiuntur, ut in Aegyptio arundinis, quæ in paludibus est. Dulcis enim cætera quoq; sua extrema parte sentitur, sed breui admodum. At illa propter copiam alimenti tenera, dulcisq; parte ampliore exurgit. Radices etiam suam dulcedinem seruant, usq; quo resiccantur, resiccata statim eam amittunt. Siccitas enim neq; cibo idonea, neq; sapida est: 20  
 quapropter caulium quoq; uigor certus statuitur.

*Cur uiridia, aut nihil oleant, aut non æque sicca uero nimirum redolcant. Quodq; in quorundam radicibus præcipue sapes insint, ut omnium acrium, & quamobrem. Item de succorum nominibus, quib; humor communi nomine careat.*

Caput XVII



T uero odor e contrario ferme in his. Virides enim aut nihil olent, aut non æque: siccatæ nimirum redolent, ut iridis radix, atq; etiam arundinum, & iuncorum, atq; omnino generis aquatiliū. Nam & gladiolus, quauis odoratus, & siccus suapte natura sit, tamen minus redolet: 30  
 recens: sed eorum etiam uigor certus intelligi debet, ut sicciscentia suapte modum reddi hebetiora, necesse sit. Verum hoc (ut supra dictum est) consentaneum ferè est. Sapores autem in cæteris quoq; suas uires, pari ratione habere consistat. Quorundam enim in radicibus sunt præcipue, ut omnium acrium, ceu alliorum, ceparum, radicularū. Quod idem de uenenosis etiam dici potest, quæ & ipsæ carnosæ omnes creantur. Cæterū uires uenenosarum perennes sunt, in totum enim ualidiores ex siccitate redduntur, quia pars aquosa humoris exacta est. Ex hac etenim ratione succi corporati etiam utiles sunt, cum corporatio nonnihil segregata parte aquosa proueniat. Quamobrem præparare consueuerunt, alia siccantes, atq; 40  
 succantes: alia infecantes, quo solis ac aeris uis coagere melius possit, ut resinam, & reliqua generis eiusdem, & thus, & myrrham, & laserpitium. Affertur infectio alijs tam radice, quam parte superiore, ceu uenenosis quibusdam, & laseris. Quippe radix, & caulis infecatur, atq; succus manet utrinq; alijs radice, aut caule tantum, scilicet prout succum emittere aptiora sunt. Nam si radices habent succosiores, radici infertur incisio: si partes supernas, cauli. Quibus enim radices siccatæ, surculosæq; sunt, his nuncq; stercus disponunt. Eadem ratio lachrymarū etiam est, quæ sponte concrescunt, tam spinarum, quam arborum, ut amygdalæ, pini, abietis, terebinthi: quarum alia bene sapida, beneq; olida sunt: alia insipida, atq; inolida, ut gummæ, spinæ ægyptiæ. Vocant alia succos, alia lachrymas: communius tamen uocabulum est succ-

est succus. Sed fortè nil refert. Humor enim, qui singulis uaria excoctione conueniat, communi nomine caret. Quod uero inter humores alij callofiores, lentioresq; sunt, alij aquosi, minusq; lenti: hinc alij densari possunt, alij nequeunt. Nonnullis etiam aliquid miscet, quo densentur, atq; concrecant.

*Cur alia in caulibus, alia in radicibus uires habeant. Curq; in eadem planta diuersi odores, saporesq; sint.* Caput X V III



Ausam uero, ut alia in radicibus, alia in caulibus uires habeant, illam sane opinari decet, quam prius retulimus. Quorum enim natura minus parte utraq; modica est ad uim illam condendam, quod altera satis, altera minus humiditatis, aut siccitatis habuerit, atq; etiam, quorum substantiam plus in alterutra partem uergi natura uoluerit: hæc aut parte superiore, aut radice potius uires continent: sicut incrementi quoq; & magnitudinis ratio anceps est. Cucumeres enim, cucurbitæ, & alia pleraq; parte ampliantur superna, luxurianturq;. Radice tamen pusilla inhaerent, scilla, bulbis: deniq; omnia, quæ radice sunt capitata contra partem superiorem, tenuem, imbecillemq; radices amplas, carnosasq; gerunt. Prorsus in quibus acedo inest, uel aliqua eiusmodi uis radicibus potius inest, ut in cepe, allio, & scilla: quod ratione optima euenit, cum natura eo potius tendat. Vires enim naturam sectari, necesse est: quod in uenenis maxima ferè parte uidemus. Quippe radices uenenosiores, potentioresq; sunt. Causam duo illa, quæ superius diximus, habent, id est quod neq; præhumida, neq; præarida sint. Altera enim ex humoris nimietate percoqui nequeunt: altera quasi materia uacant ad coctionem suscipiendam, suæ causa siccitatis. Singula autem pro sua natura, potestateq; coquuntur, ut dictum est. Igitur e contrario quasi sapores, odores, atque omnino uires eiusmodi alijs super alijs subter haberi, ex supra dictis inueniri oportet. Causa uero quamobrem neque sapores, neque odores parte eadem omnibus habentur supernis, haud procul prædictis ferè rationibus est. Nam (quod simpliciter dici potest) singula partes aliquid similitudinis habent, tum in sapore, tum in odore: sed differunt, quod magis, minus uel habent. Patet hoc in eis arboribus, quæ syncerius olent, & sapiunt: ut in abiete, pino, cupressu, larice. Adde etiam in fico: aquosiores enim non æque istud confirmant. Imò uero differentiam hæc suscipiunt illam, ut alia sapida, alia insipida, uel male sapida sint: & alia odorata, alia inodorata. Necnon et odorum saporumq; uarietate discordantia prodeunt, ceu uitis, pampinus, & uua. Deniq; omnium ferè, tam foliorum, quam fructuum: ratio, quod alterum crudum, alterum coctum est: uel potius, quod neque ex eadem materia sit utrunque: sed alterum uelut ex purgata, synceraq; alterum ex impura, callosaq;. Sunt certe ex callofiore, corporatioreq; germina, rami, stipites, totaq; moles. Itaq; cum materie dissimiles sint, finem quoq; pro sua natura dissimilem habeat unumquodque necesse est: quod etiam in animalium genere constat: uel potius ediuersum, quia finem suum habeat unumquodq;, materiam quoque habeat diuersam, necesse est. Omnium uero (ut simplicius loquar) finis pro subiecta natura statutus est: quæ cum uaria, & in sapore, & in odore, & in inodoratione sit, discrimenq; ad sensum hominis redigatur, hinc diuersitas partium exulter, necesse est. Nihil enim prohibet, foliorum temperamentum gustui modicum esse interdum: fructuum autem immodicum, ac uehementius, uel in acerbitate, uel in austeritate, uel in amaritudine, uel in alia quadam dispositione. Quod etiam in olerum genere perspicuum est. Quippe folia moderata, & grata sunt: semina uero acria, uel amara, & ex toto uehementiora sentimus: ita, ut contra, quam in arborum fructibus, ac terræ frugibus res eueniat, Fructus enim illarum utiles, folia inutilia sunt. Horum autem folia

tantummodo usui sunt: semina non nisi medicaminis forte dari rationi commode possint. Quod igitur in his liquet, nihil prohibet in tilia quoque, ceterisque nonnullis arboribus effici, ut fructus ingustabilis, frons dulcis, atque gustabilis sit. Fructus enim naturae conditionem puram continet, atque synceram. Enimvero siue nimium siccus, lignosusque sit, seu austerus, amarus uel, aut male olidus, aut aliam quampiam difficultatem sortitus, ingustabilis redditur. At frons quia humidior, ac pensilis est, moderationem aliquam obtinet, quod etiam in lasere, atque alijs plerisque acribus patet. Folium enim laseris suaue, fructusque mollis est, propter humorem. Quippe acrimoniam moderat permixtus humor aquosus. Itaque aliquam saporis gratiam generat. Contrā, siccitas uehementiora omnia reddit.

*Cur quaedam, cum uiridia sunt, mandi possint: cum uero siccescunt humoris temperie sublata, ingustabilia relinquuntur. Curque in quibusdam radices ingustabiles sint, caules autem mandi nimirum possint, et contrā.*

Caput XIX



Mnino multis id euenit, ut cum uiridia sunt, mandi nimirum possint, saporisque aliquam reddant suauitatem, propter commistionem aquosi humoris: cum autem siccescunt humoris temperie sublata, ingustabilia relinquuntur: ut germina uitium, & stipitum, & aculeatorum quorundam, & leguminū aliquorū, ut cicere, fabae. Ad summā, eorū quae dulcedinis aliquid reddunt, cōmune id omnium propemodū sit, quorum succi per se acerbiores, aut acriores, aut amariores. Temperati enim a natura humore aquoso meliores, dulcioresque sapores suscipiunt: quod & in myrtis, ac punicis fieri certum est. At si qua talis natura arborū, aut omnino plantarū est, ut fructus uiribus synceris progeneret: folia tamen partesque alias creet per mistionem: nil prohibet (sicut dictum est) mandi folia posse, fructum uero ingustabilem esse. Proximū his, & in radicibus quoque cibo idoneis est, quarum folia ingustabilia penē sunt, utpote sicca, spinosaque. Caules autem mandi nimirum possunt, & radices ipsae suauitatem etiam reddunt. At sunt e contrario, quorum cetera cibo apta, & suaui sunt. Radices autem ingustabiles, quia lignosae, amaraeque, aut denique male sapidae, uel insipidae sunt. Differentiam haud parua natura quoque uaria animalū facit. Etenim quae nobis insipida sunt, quia quantum in his amaritudinis, difficultatisque fuerit percoctum, excretumque est solis opera, ut sesama, ut erisimum. Haec enim uiridia tangi a nullo animali uidentur propter amaritudinem, & grauitatem saporis: sed siccata acceptiora euadunt, fructusque eorum suaues efficiuntur. Atque eorum causas huiusmodi putandum est. De fructibus, qui cibo idonei sunt, ratio facilius reddi potest. Horum quippe humores, puri, syncerique sunt, uelut a natura liquati, purgatique, ut & pluribus, & magis ualeant conuenire.

*De uenenosis plantis. Curque eorum partes tantum medicae sint. Item alium agrum ad alia medicamenta utilem esse.*

Caput XX



Ed de uenenosis, & his omnino, quae uires obtineant aliquas, considerandū deinceps est. Quippe in his, neque uires eadem intelligunt, neque pares in omnibus illico a radicibus sumpto initio intuendi. Nec enim superioribus omnibus, ceu folijs, ramis, fructibus eadē uis inest: & differre quidē pluris, minorisque ratione aliquid, esse consentaneū dixerim. At aliqua esse, quae penitus nequeunt agere, quod pars reliqua potest, ut semen, & cau

& caulem: quod radix, uel ediuerso radicem, quod semen, & caulis, hoc magis mirandum. Ergo causas ex prædictis petendum. Cum enim naturam, atque temperiem suam unumquodque habeat, uires quoque uarias habeat, necesse est: ut alia colliquare possint, atque discernere, alia nequeant: & alia magis possint, alia minus, & feruefacere, & coquere, & frigefacere, & siccare: & reliqua pari ratione addendum. Sed fructus maxime discrepare consentaneum est: siquidem non uniuersa natura radices, & fructus, & cæterarum partium similis sit. Sed aliæ incoctæ penitus sint, aliæ coctæ, & omnino constantes ex pluribus. Itaque efficitur, ut & sapore, & uiribus, inter se plurimum distent. Ita enim, tum in agrestibus, tum  
 10 in urbanis uidemus: quorum radices amaræ, lactuosæq; sunt, horum fructus esse prædulces, quasi ex incocto, percoctos. Quod idem uiribus quoque uenenorum euenisse putandum. Quamobrem non temere fit, ut in alijs radix, in alijs pars aliqua ex cæteris plantæ eiusdem amplius ualeat. Nam & radices amplius a radicibus differunt. In ijs etiam, quæ generis copulantur societate, & semina seminibus, & reliquæ partes multo inter se uiribus distant, propter agri, coeliq; conditionem: sicut & frumentum, & cæteræ fruges pondere propter alimentorum uarietatem. Quapropter medicamina longe præstantiora medicaminibus expiorantur, quæ longo intervallo minime distant, ut elleborum nascens in Oera monte, melius Parnasico est. Validius enim esse illud putatur, minusq; aptum medicamini.  
 20 ni. Causa quamobrem ualidum ita sit, similis atque in fructibus. Aëris enim duritia, nutrimentiq; largitate grauitas in eo quoque tractu sicut in Bœotia prouenit. Porro alius ager ad alias uires idoneus est, quemadmodum in fructibus quoque perficiendis animaduertimus. Sunt etenim loca, quæ ne excoquere quidem uilo modo uires medicas ualeant. Quippe multis in locis, & niger elleborus, & aliæ radices hebetes, imbecillesq; comperiuntur. Vnde credi haud temere possit, aëre frigido, & solo aperto, atque etiam alimento modico opus esse. Et quidem uenena in montibus plurima nasci uidentur, & in ijs maxime qui altissimi sunt, atque amplissimi. Et de his satis dictum iam est.

De causa odorum. Curq; in eadem planta partes aliæ odoratæ, aliæ inodoratæ. Cur etiam in arboribus flores, qui minores sunt, odoratiores sentiamus. Cur præterea odor in flore aut sit, aut non sit. Caput XXI



De odoribus, quoniam ij quoque particulatim fieri solent, causas easdem, aut certas proximas esse putandum. Excoctio nanque alijs in flore potius, alijs in fructu, alijs in folijs, ramisq; aquosis, & quasi insipidis, aut acribus. In flore, ut rosa, croco, & reliquis generis eiusdem, quorum quæ minus bene sapida sunt, odoribus etiam suis grauitatem quandam præsentant, ut lilium, lirium, & eiusmodi. Quædam nullam penitus reddunt suauitatem odoris, sed grauitè redolent: quod à sapore quodammodo fieri, nec esse rationem odoris ab illo remotam, certum est. Enim  
 40 uero, quæ diluta, & insipida sunt, hæc penè omnia inolida quoque sentimus. Quippe in his (ut ita loquar) duobus exordia qualitatis inolida habentur, cum & sapor natura quadam aquosa est, & humor aquæ nimium reddit. Alterum enim misceri quasi non potest, alterum autem ex nimietate tolli necesse est: itaque id etiam misceri quodammodo nequit: quæ quidem res à ratione odoris uersa penitus est. Odor enim mistione quadam consistit. Quæ autem alimento uberiori, uehementioriq; nutriuntur, ceu palustria, hæc odores etiam proximos suo alimento graues scilicet quosdam, ac turbidos reddunt. Cum igitur alijs in radicibus mistura eiusmodi, atque moderatio sit, alijs in ramis, ac folijs, alijs in fructu, plura



bus uero in flore: has easdem partes in singulis odoratas esse ratio est. Ideoque flores arborum, qui minores sunt, odoratiores sentimus. Plus enim terræ humori in maioribus inest. Si tamen hæc ratio minus placeat, aliam quæres. Igitur in uniuersum, atque simpliciter satis fortasse dicta hæc sunt. At uero in eo, quod prædicta temperamenta singulatim animaduertere deceat: non temere plurimis odorem esse in flore appareat. Agitur enim in eo prima quasi, & leuissima coctio, siue siccitas, siue aliqua mutatio uenerit. Cum uero fructus inceptus sit, odor non amplius permanet, quia plus iam adest humoris: præterquam si qua humore tali suapte natura sint, ut odorem ualeant conseruare. Ex toto penè fructus, qui gustu suaues sunt, bene olent. Nam & málum, & pirum, & mespilum tale est. Adde quos priuatim acceptos uocamus, ut cedrida, & terebinthum, & similes: quosque pingues sentimus, ut fructum abietis, pini, piceæ, lauri.

*Cur dulcia minus oleant. Curque odor in ijs sit, in quibus inest aliquid acrimoniæ. In quibus item locis odorata nascantur. Præterea odorum alios ualidos, alios infirmos esse. Tum qui in succis durent.*

Caput XXXII

**E**X dulcibus nullus ferè bene olet. Nam & málà dulcia odorem minime omnium reddunt, & eo minus, quo dulciora sunt. Ratio, quod succus dulcis crassior, atque terrestrior est, præsertim cum mistus fuerit in fructu. Odor autem humoris tenuioris, siccioris, aptique diffilari potius est, de quibus posthac etiam disseremus. Verum ( ut iummatim agamus) odor & foliorum, & ramorum, & in totum arborum, atque plantarum in eisdem generibus est, in quibus aliquid acredinis, aut pinguedinis inest: quemadmodum certe fructus quoque supradicti se habent, & quidam etiam ex uinosis. Fructus etenim myrti odoratus, & ea quoque odorem aliquem reddit, & quæcumque talem acrimoniam, siue pinguis, siue uinosa, siue etiam alius succi in suis fructibus habeat. Eadem ratio in genere quoque herbarum est, quas coronarias appellamus, ut serpylli, sisymbrij, cæterorumque: in oleribus, ceu ruta, apio, menta. Siccitas enim, & acritas, uel acerbitas his innotescit, non in fructibus, neque in cæteris, quæ humoris eiusmodi sunt. In omnibus uero, tum in his, tum cæteris odoratis redditum illud per definitionem omnino inest, ut demissum sicco, quod sapidum est, uim aliam quam pariat odoris. Prorsus odoratiores, suauioraque, tam tota, quam particulatim locis placidi spiritus, ac siccis proueniunt: scilicet exhausto humore aquoso, excoctoque reliquo melius. Siccitas enim (ut simplicius loquar) odori conuenientior est, & omnia odorata eo potius uergunt. Argumento etiam illud est, quod tractibus æstiuosis plura, melioraque odoratorum genera prodeunt. Melius enim ibi concoquitur, & quædam siccata olent. Viridia nihil olent, ut calamus, iuncus: nonnulla etiam plenius olent siccata, ut iris, ac fertula campana. Sic et cœnanthes odoratiores est. Non tamen omnia ita se habent: sed adsunt, quæ diuerso naturam sortita sint, quæ profecto diuississe oportet. Diuisio uero simplex occurrit. Aliorum enim odores exiles, ut florum ferè omnium, qui uirides, atque recentes sunt, odoratiores: temporis autem spacio decurso, exhalationis causa hebetescunt. Aliorum odor ualidior est, ut eorum, quæ terrena magis, & in terrenioribus posita sunt: quibusque uis quædam aquosa permixta est, qua siccata, inueterataque, ad quoddam usque temporis spacium odoratiores redduntur. Cuius generis poma cotonea sunt, quæque ex coronariorum numero acrem reddunt odorem, ut abrotonum præcipue, & sampucium, & crocum. Vnde enim & quantum humoris aquosi est, exhalatur, & alimenti cessat accessio: & quædam ueluti coctionis aliquid per seipsa recipiunt. Vnde fit, ut à suis decerpta arboribus odoratiores reddantur, ut málà, & quædam alia. Euenit, ut inter herbacea, quæ uiridia

uiridia sint, nihil oleant propter humorem: sicca autem oleant, ut alia quaedam, & foenum graecum. Nam & uinum tunc maxime constans perficitur, atque odorem capessit, cum pars eius aquosa diffusa, exacta est. Haec igitur omnia odoratoria in uetustate efficiuntur.

*Cur debilia celerius euanescent. Cur etiam nimium exiccata deterius oleant. Tum quamobrem flos eorum, quae toto corpore odorata sunt, non spiret.* Caput XXXIII



Vae autem debilia sunt, celeriter euanescent, ut uiolae tam nigrae, quam candidae, amarae, maleque olidae in uetustate redduntur: nec sic uti rosae suum odorem etiam siccae conseruant, dum deficiant penitus: uirides tamen a longe redolent, siccae non nisi proxime admodum. Ratio, quod induratae quodammodo defectu proprii caloris halitum reddere nequeunt. Nam ad usum quidam unguentarii eas quoque aliquatenus siccare consueuerunt, ut odorem synceriores relinquunt. Bertula campana uel plus temporis odorata edurat. Ceterum adsunt, quae inter odorata nimium exiccata deterius oleant, eo quod acriorem, durioremque reddant odorem. Est enim quemadmodum uini, atque in totum succi, saporis uel duritia, uehementiaque, sic etiam odoris: quod & inter agrestia quibusdam euenire uidetur, ceu serpylo, & sisymbrio, & in genere olerum rutae praecipue. Sunt enim odores eorum duri, expertesque omnino dulcedinis. At urbanorum odores una cum remissione dulcedinis quoque aliquid, benignitatisque habent. Est enim ut in sapore, ita etiam in odore dulcedo. Et ceterae propemodum generum appellationes, tanquam naturae eorum non multo inter se distent. Sed quoniam odores sint diutini, & qui siccatis meliores reddantur, ceteraque similia, spectari ex praedictis oportet: quaeque a nobis sunt praetermissa, facile per haec eadem conspici a ceteris possint. Quae autem non particularim, sed toto corpore odorata sunt, de his quaeret sane aliquis, quod prius dictum iam est, quamobrem flos odoratus esse non potest. An non ex ratione id quaeret: nam & ceteris odore carentibus flos istiusmodi deest, sed in his potissimum enotatur: quia ratio, naturaque odoris praecesserit. Causa illa esse uidetur, quod generatio floris concoctio quaedam est: quod autem coquitur, in mutatione illius est, quod iam antea esset. Quae igitur odorata ipsa non sunt, horum flos, cum humor concoquitur, odorem aliquem capit: quoniam concoctio in mutatione est. Contra quae odorata sunt, horum odorem permutatione variare necesse est: quod si plene sint odorata, flos minus odoratus proueniet. Haec enim diuersas ueluti heberatio pristini odoris, ac uirium esse uidetur. Quapropter florem tunc olere posse affirmant. Sed hoc an ita sit, cogitandum. Fidem enim aliquam affert. Simile tum euenire uidetur, ut in succis coctis, atque in crudis, cum ignem sentiunt aut solem: quippe facta mutatione, alteri in melius, alteri in deterius commutantur. Vis enim caloris alteros coquit, alteros ex sua perfecta conditione dimouet. Cum enim res finem suum attigerit, mutationem in deterius fieri necesse est. Quod etiam hac in parte euenire uidetur, cum odor emolliiri inceperit. Fit enim uelut remissio synceri odoris: tum etiam euenit, ut succus eiusmodi, qui suapte natura siccus est, in prouentu floris humescat, si secus generatio fieri non possit, atque ita sequatur remissio. Sin autem non humore, sed dulcedine opus sit ad fructuum generationem (Omnia namque ex dulci creantur, & hinc flores magna ex parte dulces sentimus) ea quoque ipsa ratione dissolui, effeminarique odorem consentaneum est, quasi dulcescat exempta scilicet acedine illa syncera. Horum igitur causam talem esse existimandum.

*Cur fructus agrestes odoratiore urbanis suis generis sint. De causa odoris in uino: & quamobrem, quod morale uocatur, celerius purgetur. Item si in succo est saporis gratia, & odor de succo provenit, qualis uterq; sit.*

Caput XXIIII



U<sup>r</sup> autem fructus agrestes odoratiore urbanis suis generis sunt, ut m<sup>a</sup>la, pira, sorba, melpila, & reliqua: atq; ipsorum m<sup>a</sup>lorum tam syluestrium, qu<sup>am</sup> urbanor<sup>um</sup>, qu<sup>ae</sup> acerbissima sunt, suauissime olent. Atqui cum odor per coctionem acquiratur, qu<sup>ae</sup> maxime cocta sint, haec olere melius putaueris oportere. Ergo de his dici quidem in uniuersum potest, agrestia duriora esse: quod in ceteris quoq; rebus natur<sup>ae</sup> animaduertitur. Sed conuenientius ratio assignetur, si quis coquendi genera saporis, atq; odoris discernere ualeat, ita, ut quo in genere uis saporis, odoris u<sup>e</sup> consistat, compertum sit. Enimvero differentiae aliquid inesse uidetur, siue differant inter se, siue idem sint aliqua co<sup>m</sup>mutatione: sed hoc diuisioni generali mandandum utiq; sit. Ad rem autem nobis propositam illud satis est, quod & latissime pater: dulcedin<sup>e</sup>, & ex toto saporis suauitudin<sup>e</sup> fieri non nisi succo crassescente solere: qua de causa fructus senescentes, soleq; feruescentes dulciores omnes efficiuntur. Crassantur enim exempta parte humoris aquosa. Odoris autem ratio in priore quadam, minusq; perfecta coctione uersatur. Argumentu<sup>m</sup>, quod ipsa etiam odorata, ut pira, m<sup>a</sup>la, & cetera plus redunt odoris, si cocta in plenu<sup>m</sup> non sunt. Atqui saporis excoctio tum potissimu<sup>m</sup> consummatur, cum in plenu<sup>m</sup> excoquitur. & quidem in primis succorum mutationibus uidere id licet. Vberius namq; odores inde exultant, ceu simul, & flatilis queda<sup>m</sup> esset odoris conditio, & succus suam haberet naturam, ad quam cum uenisset crassatus, excoctusq; minus quidem odoris spirare, dulcedinem tamen conuenient<sup>e</sup>, atq; in totum sensui accommodatam possit acquirere. Agreste igitur genus ad priorem usq; tantummodo coctionem deueniens, odorem quoq; ratione adipiscitur plenior<sup>e</sup>. Urbanum, cum perfectiorem attingat cocturam, alimentoq; abundet, propter uehementior<sup>e</sup> coctionem succos suos in dulcedinem, odorisq; hebetudinem uertit. Tum etiam humiditatem, siccitatem, largitatem alimoniae, parsimoniam u<sup>e</sup>, comoditatemq; afflatus conferre aliquid ad odorem uerisimile est. Siquid<sup>e</sup> omnino, quae arida, locisq; aridis sunt, quae paruo alimento contenta degunt: quae placida<sup>m</sup> asperantur, odoratiora proculdubio sint. Humor enim largius se permiscens, odore<sup>m</sup> hebetat. Quapropter locis opacis, dilutisq; odorata nunq; proueniunt. Nimiru<sup>m</sup> ergo dum crassantur, mutatione<sup>m</sup> illam recipiunt, sicut dictum est. Omnino (quod simpliciter dici potest) genus agreste siccius, ieiunius, spiratius, feruentius, atq; etiam succo tenuius est, nec succum carni permistu<sup>m</sup> gerit modo urbani. Quae quidem omnia iuuant ad odorem efficiendu<sup>m</sup>. Licet hoc in uino etiam peruidere: quod em<sup>o</sup> dulce, molle u<sup>e</sup> est, caret odore: quod tenuius inter cetera est, hoc odoratius. & celerius hoc, q<sup>uod</sup> pingue, crassumq; consistit, atq; perficitur. Item una cum odore euenit, ut fece sidente, uel segregatio humoris, partisq; terrenae, exhalatioq; sortis aquosae efficiat: ita ut ex his omnibus suauis illa exoriat<sup>ur</sup> olentia, id est attenuat<sup>io</sup>, segregat<sup>io</sup>, exhalat<sup>io</sup>. Nam & in ipso dolio pars uini, quae est iuxta fecem, minus redolet. Haec eadem causa est, & quamobrem genus uini, quod morale uocatum est, celerius purgetur, consistatq;. Est etenim tenuius, & obiter quasi uitio mistur<sup>ae</sup> immune. Confirmatur id etiam, quod ex tenuioribus, & succo probatis, spiratisq; commode odoratoria proueniunt, & ex uetustioribus potius, qu<sup>am</sup> nouellis. Item quod, quae large olent, ac ualide, mollitiam in gustatu nulla praesentant: utpote cum simul manere nequeant, odor suauis, & plenius ille, ac ualidius: quod etiam in unguentis, incensis, coronamentis, ceterisq; odoratis euenire uidet<sup>ur</sup>. Haec etenim omnia amara sunt, maleq; sapida, sicuti amygdala. Et motana uero uinor<sup>um</sup> genera, odor<sup>e</sup> pleraq; obtinent,

obtinent, quæ dura, minusq; in sapore commendata existunt. His igitur omnibus constat aliud esse, quod faciat odoris suauitatem: si tamen causæ odoris, saporisq; modus adsit, quod ex ambobus exulter, suauissimum est. Prefertim, cum in quibusdam agrestibus acrodo, atque synceritas rædio admodum sit, ut retulimus: ceu in serpyllo, abrotono, ruta, permistioneq; natui humoris temperatiora, suauioraq; reddantur. At si alterum immodicè adsit, quarimus certè quòd deest. Simul enim quodammodo in eiusmodi gustabilium genere odoris, atque saporis delectatio est. Sed discernere, explicareq; in uniuersum tentandū, quemadmodum diximus: ut si in succo dulcedo sit, aut aliqua genera saporis: odor autem de succo proueniat, qualis nam sit uterq; & quo modo habeat. Illud igitur ex prædictis iam patet, quod principio quærebat: quamobrem fructus agrestes sint odoratiore, atq; proinde euenire appareat, ut in perfectis, & priuatissimis potius consistat odoris suauitas: siquidem ex his alia amara sint, alia acra, alia exilia, alia acerba, alia aliquid habeant rædij. Nec temere forsitan. Exit enim halitus quidam de his maiorem in modum, qui si temperata sunt, modicus sensui occurrat: sin minus, difficilis, grauisq; est. Nec in priuatione genus id collocandum, sed aliquam potius naturam aliam fortitum appareat: siquidem nonnullam uim extremorum obtinent efficiendorū. Igitur odor his de causis in succis minus dulcibus, atq; insuauibus inest. Odorum autem (ut ita dixerim) omnium potestas pro subiectæ naturæ ratione proculdubio est.

*Cur aliqui flores suauiores distantes, quàm proximi sentiantur. Et cur odores plurimi mane sentiantur, crescente die minus, meridie minime. Tum de herba, cui nomen hesperidi. Item quæ ætas plantis ad odorem aptissima. Et quibus rebus odores hebetentur. Cur præterea arcus celestis loca ubi consueuerit atq; arbores reddat odoratas. Cur deniq; incensa redoleat. CAP. XXV.*



Aeternum aliqui ex numero florū distantes odoratiore, quàm proximi sentiuntur: quod etiam in uiolis deprehensum est. Ratio, quòd ad locum remotiorem odor purus, syncerusq; deferatur. Effluunt enim de cæteris etiā partibus plantæ aliqua, quæ longinquius transire non possunt, quia terrena magis, crassioraq; sunt. Quippe in uniuersum odorum generi imbecilli synceritas ualentiore mistura conueniens commodior est, sicuti & saporibus. Exempli gratia, myrtus mulso macerata, melius quàm syncera redolere incensa putatur. Odor enim melior, atq; dulcior redditur temperatus. Hoc idem & succis euenit. Sunt enim qui misturam desiderant ad acquirendam suauitatem. Omnino (ut simplicius agam) odores plurimi syncerioresq; mane sentiuntur, die crescente minus, meridie minime, quòd sol omnia seccat: & quemadmodum horis diei, ita etiā anni temporibus pro ratione mutantur. Præterquam si qua suos odores, maturitatesq; tempore alio capere solent: aut cœli temperies aliqua ad odores conficiendos accommodata contingat: ut in herba, cui nomen hesperidi, patet: hæc enim nocte plus redolet, quàm interdiu. Cæteris autem suo spacio non ultimo, sed medio cum maxime uigent, quæq; odoratissima sunt, uel ubi paululum à suo uigore declinarunt. Haud enim fortasse coequendi ratio eadem est saporis, atq; odoris. Nouella etenim planta alimentum excoquere nequit, utpote quæ plus attrahat, quàm possit conficere. Annosa imbecillis penitus ob inopiam caloris insita est. Cæterum uetustè odoratiore sunt, quàm nouellæ. Minus enim humoris in his est, itaq; magis ualent exuperare: sicut etiā quæ solo gracili posita sunt. Licet tamen simpliciter illud asserere: omnia quæ uigent præstantiora tum sapore, tum odore intelligi, modo finem hunc natura illis statuerit: frigore geluq; tam sapores, quàm odores hebetiores ob densa-


tionem redduntur. Nil enim concreta exprimere possunt, tum etiam obliterantur quodammodo ex uiolentia frigoris: nec modo illa, sed etiam sensus tollitur: quippe utraq; ex suo statu frigoris iniuria dimouentur, quanquam acrius illa, quam sensus: nam & fructuum dulcedinem frigus per gelationem euaporando, educendoq; eximit. Pari modo & nimietas aestuum saporibus officit: alia namq; exurit, alia non concoquit, alia ueluti putrida, & praeumida reddit (ut de ficibus dictum est) odores forsitan nonnullorum magis conseruat: & forte illos creare potest, qui familiares locis aridis sunt. Hos enim constat esse omnino synceros. Multos tamen peruerit, qui scilicet consistunt in fructibus: quia succosiores, indistinctiq; isti sunt. Quippe odor non nisi maturescenibus fructibus consistere potest. In totum mistura modum inesse, naturamq; siccitatis in ratione odoris, quae quodammodo innotescere conuenit. Siccitas etenim est, quae odores uel omnium, uel certe aliquorum facere potest. Quod obiter in terra quoq; perspicuum est, ubi tempore aestiuo solo adusto imbres accesserint. Humor enim admissus, feruentiq; pulueri permixtus, odorem generat. Quod idem in ceteris etiam facit: nam & quod de arcu caelesti referunt, arbores, & loca reddere odorata, ubicunq; constiterit, tale est. Reddidit enim non in omnibus modis odorata, sed si qua materia combusta proxime sit. Nec id forsitan per se agit, sed quodammodo per euentum: Impluit enim locis, ubi constiterit. Quippe materia combusta admissus humor uaporem quendam, odoremq; excitat. Neq; enim aqua multum descendit, sed magna parte guttae irrorant, ita ut caliditatis, siccitatisq; modus non desit. Materia quoq; ipsa certa sit qualitaris, opus est. Non enim in qualibet, neq; quibusuis modis illud fieri potest. Omnino uel in ceteris crematio, atq; permissio creabunt odorem, si modice fuerint. Nam & incensa ex hac ratione imposita igni, redolent, molli scilicet, nec rapido cuiquam & perurenti: sic enim modus seruatur odoribus, aliter corruptio sequitur.

*Cur animal nullum odoratum sit, cum in genere plantarum odora comperiri permulta possint. Curq; aliqua foetida homini sint: brutis uero odorata. Item saporis, odorisq; agri, caeli alimentae ratione consistere. CAP. XXVI.*

**V**ic sane proxima, & eadem fere causa est: quamobrem in arboribus, & ad summam in genere plantarum odora comperiri permulta possint, animal nullum penitus odoratum sit: nisi quis pardalim dixerit sensui belluarum bene olere, ut dictum iam est. Genus etenim animalium siccum, & calidum suapte natura est: itaq; halitus eius tenuior, atq; purior. Plantae plus habent humoris, naturalioresq; (ut ita dixerim) extant, ideoq; halitum quoq; earum talem esse necessarium. Omnino alimentum simplex plantarum est, nec quicquam superuacuum habet: animalium uarium est, multaq; habens superuacua. Confert autem & aliquid ad odorem conficiendum, naturam qualitate antecessisse idonea. Principium enim, & res prima natura est. Neq; enim arbores omnes suauiter olent, quia non consimili temperamento sunt conditae. Haec ita esse censendum: ni forte odor, quem animalia reddere nata sint, certus esse humano sensui nequeat, eo, quod hominis olfactus omnium deterrimus est. Quippe ceterae animantes & a longe sentiunt, & quae proxima sunt, percipiunt exquisitius. Vnde alia grata, alia penitus in sua uia hic concurrunt: sicut etiam homini alia magis alijs grata redolent. Nonnulla etiam omnino uitamus. Sed mirum (quod antea diximus) si quod nobis foetidum inodoratumq; sit, gratum illis occurrat. At mirum istud non sit, quandoquidem & alijs euenire hoc idem uidemus in ipsis protinus alimentis, quorum temperamenta potissimum causam habere quispiam crederet; utpote, quae in aequalia sint, atq;

atq; inormia. Figuras enim illas Democriti affectiones, mutationesq; certas effi-  
cere posse arbitrandū, cum certas habent formas (ut dictum est) hæc ita asseruisse  
par est. Quod autē paulò ante diximus, nunc etiā asserendum; prorsus enim odo-  
ris, saporisq; ratio qualitatē quandam & agri, & cœli, & alimenti exposcit. Nec  
excedere, nec deficere, nec auersum esse subiectis alimentum oportet. Quippe  
quod excedit, coctioni impedimēto est. Quod deficit, uelut materia caret. Quod  
alienū est, fungi naturæ officio nequit. Quicquid in cultu, curaq; uersatur, & ut  
solum conueniat, & calores, ac frigora sentiat. Hunc enim in modum alimentū,  
facultas quoq; coquendi subministratur: fructusq; perinde atq; saporis exultat  
ueritas, ut illa inter se differant, hoc ita esse argumentis pluribus constat. Alia em̄  
10 alio in agro bene olida, bene sapida, frugifera, sterilia, germinis fertilia, infertilia.  
Nam ea quoq; sub eandem causam ueniunt, de quibus non nisi cœli statū, ac ter-  
ræ alimentum pro causis assignare debemus. Enim uero quæ uetent, augeāt, faci-  
antq; cocturam, iucunditatemq; saporis hæc sunt. Sed cum saporū, odorūq; ua-  
ria difformatura sit, idcirco temperamentū non unum omnium est, nec alimen-  
tum commodum omnibus unū, sed singulis quod propriæ naturæ respondeat.

Quamobrem non omnia odoratorum genera locis omnibus feruidis prodeant. Et myr-  
ti Aegyptiæ cur odoratissima sint, cum cætera inodorata gignantur. Cur item in  
Aegypto cætera præter myrtum, inodorata sunt. CAP. XXVII.

20  Nde illius etiam quæstionis solutio exultat: Quamobrem cum lo-  
ca feruida odoris fertilia sint: nec omnia genera odoratorum locis  
omnibus feruidis prodeant, atque etiam magis illius: quamobrem  
quæ alibi carent odore, hæc locis feruidis odorata sint, ut calamus,  
& iuncus in Syria: quæ autem odorata alibi, nihilo odoratiora com-  
periantur locis eiusmodi, immo uerò hebetiora, ut quidam aiunt. Quanquam ut  
odoratiora sint, ratio postulare uidetur. Hæc enim omnia prædicta causa conti-  
net. Quippe cœli & alimenti conditio alia conueni: alijs, præsertim cum etiam  
ipsa genera diuersa inter se sint. Quapropter & Syriæ ipsius pars exigua est, quæ  
calamum ferat, & iuncum. Loca item quæ succum balsami, ac cætera odorata  
30 pariunt, suis domesticis aptissimè se accommodant: cæterisq; quæ alibi odorata  
nascuntur, minus sufficiunt, sicut & fructibus euenit. Non enim parem calorem  
desyderant omnia, neq; similem, sed alia maiorem, molliorem ac minorē. Quod  
etiam in ijs patet, quæ aqua coquuntur: & ad summam in ijs, quæ arte conficiun-  
tur: nonnusquam etiam ex singulis idem constat. Etenim in Aegypto flores, co-  
ronomena q; deterrima ferè omnium generantur: quia cœlum caliginosum, ac  
roschidum est. Quippe locis eiusmodi nullus penè odor cōtrahi potest, quoniam  
deest facultas coquendi: sed potius aridis, in his enim planè excoquitur. Nam ea  
quæ apud Cyrenam proueniunt, non nisi ratione siccitatis odorata consistunt,  
tum cætera, tum uel maxime rosa, & crocum. Ager enim ille tenuis, siccus, nec ni-  
40 mium feruidus, aère tamen puro, sitienti q; ambitus: quæ quidem ad odorē cre-  
andum aptissima, Rosa uerò, & crocum paruo alimento contenta sunt, & proin-  
de cæteris odoratiora creantur. Sed mirabilius, quod de myrtis Aegyptijs fertur:  
quantum enim cætera inodorata penitus sunt, illæ tamen odoris suauitate ex-  
cellunt: nec quicquam iuuat siccitatē, caliditatem, cætera q; ferè, quæ sensus perci-  
pit, non minus in quibusdam ex reliquis, sed magis inesse. At est forsitan genus,  
quod translatum in alios tractus, ut Cyprium, Rhodum, Cnidum, nonnihil sua-  
rum uirium seruet: nihil tamen idem, sed fronde etiam redditur ampliore. Quip-  
pe tenuis illa Aegyptia est, & odore longè præstantior: itaque loci natura illius

- causa potissima est, proprietatemque admirabilem præ cæteris gignit. Nam & quod fructu exiguo, nec candido, sed nigro genus hoc est, nihil odoris rationi repugnat. Fit enim utrumque causa siccitatis: & quidem causam fructus exiguitati assignant, quod aqua deest cœlestis. Quanquā fructus desiderat, rores enim haud satis auxiliari ualere. Sed hoc, & quicquid eiusmodi causæ sit, ut pleraque loca uires peculiare possideant, priuatus disputari certe desiderat. Communis enim sententia, quæ a gros permultos habere inæqualitates asseritur, uera quidem: sed priuatas etiam uires, ac differentias exigit. Proximū igitur esse illud quoque uidetur, quod punicis in Lycia euenit: ut enim sapor illic peculiaris, sic in Aegypto
- 10 suauius illa odoris peculiaris est. Sed uicinitatem, naturamque amnis causam illic esse putauerim. Punica enim aquarum auida est, & mutari eam confirmat ex acida in dulcem, si aquæ copiam obtineat. Itaque amnis perfluentis rigationem non modo quantitatem augeri, sed etiam qualitatis mutationem asserri eiusmodi mirum non est. Aegypto autem rationem peculiarem comperire tentandum, quæ suauius odoris conueniat. Ergo talis inde præcipue oriri posse uidetur, si omnia componantur in unum, uidelicet genus myrti commune ac proprium, & solum, & cœlum. Planta etenim ipsa sicca omnino est, & genus illud Aegyptium plus quam cætera siccet: quod frondis angustia, & fructus exiguitate, coloreque constat. Hæc enim siccitate omnia ueniunt, siccum parum habere humoris certum
- 20 est. Quod paruum est, facile excoqui potest, suauius odoris excoctione consistit, quæ olfactui congruit: hæc neque dulcis est, neque ullam saporis gratiam habet, atque ratione plantæ hæc antecedunt: soli autem, & aeris opera, quod solum siccum, aer mollis, ac placidus est, quæ utraque cocturam plurimum auget: alterum quia concoquit, alterum quia humefacit. Nam & in hac parte syluestres odoratiores urbanis: & quæ in apricis positæ sunt, præstantiores umbratilibus exeunt: præcipue quæ meridiem spectant. Quæ quidem omnes minus alimentum hauriunt, meliusque quod hauserint, coquunt. Itaque efficitur, ut non in longitudinem crescant, sed fruticosæ euadant: quippe quæ crassitudinem capiant, findanturque multipliciter: eo quod initia multa capeffunt feruore scilicet percoquente, dirigenteque
- 30 quaque uersus. At illæ quæ loca tenent umbrosa, impetum naturalem in unum tantummodo faciunt. Quocirca uirgæ non in crassitudinem, sed in longitudinem potius adolefcunt, & baculis perquam idoneæ fiunt, ut tum alibi, tum circa Cisthum patescit. Sed hoc omnium arborum commune fortasse est. Reliquum est, ut causam, quæ odorata cætera esse nequeant, explanemus. Rori causa danda est, qui abunde descendens humefacit flores largius, utpote natura humidiores: reliqua leuius, quæ sicca excretaque sunt. Quamobrem myrtus humiditatis huiusmodi ualentius resistere potest. Argumento illud etiam est, quod de ea superius diximus. Fructum enim pusillum ferre propterea creditur, quia non satis cœlesti aqua potitur. Igitur causas myrti per illa ipsa indagare tentandum.

40

*Cur frigida locis odorata proueniant. Tum de iride illyrica. Cur item aqua nullum possint recipere odorem: uinum & oleum possint. Cur præterea unguentarij in oleo reponant odores. CAP. XXVIII.*



Dororum autem quæ tractus frigidi pariunt, rationē calori in terra concluso imputare debemus. Vis enim caloris est, quæ ubique excoquit. Sed alias extemplo occurrit, alias se telluri insinuat. Quem admodū in autumnali fructuum maturitate patescit, proximū enim quod euenit est. Quippe calor, qui pulsus est à frigore, circumobstitens in terra excoquit. Verum neque limosam, neque pinguem, neque lentam, glutinosamque

nosamq; terram esse oportet. Humoris enim, lentorisq; causa nō æque calor suo fungetur officio: sed talem esse profecto res exigit, ut neq; frigiditatem aëris circumfusi admitat, & quantum calor in se tenet, obturare, seruareq; polleat. Hac enim de causa iris melior in Illyride, quā in Macedonia est; in Thracia uero, cæterisq; frigidioribus locis, ac minus cocturæ idoneis odore penitus caret. Ager enim præpinguis, & humor multus, & hyems uehemens prohibent. Tepidis tamen atq; gracilibus minus odorata creatur propter mollitiem aëris. Haud enim parilis effici circumobstantia potest: nempe uires ad coquendū idoneæ ex am-  
 10 bobus illis solo, & aëre petendæ sunt: quemadmodum de his quoque odoratis agendum, quæ super terram excellunt. Sed de his satis dicta hæc sint. Odores autem uicissim nullus fructus, neque pars ulla arboris recipit: ita scilicet, ut aliquid certi odoris spirare possit. Quamobrem quædam acria iuxta serere cōsueuimus, ut cepas, & illa iuxta coronarias plantas: id enim iuuare ad creandū odoris suauitatem affirmāt: quod si uere narratur, alterum ex duobus illis causam dixerim: aut quod quantum mali odoris adsit, hæc detrahunt, aliter enim unumquodque re sibi simili, quodq; sibi cognatum sit, nimirū attrahit: itaq; parte aliena illa sub-  
 20 lata, residuum purius, odoratiushq; relinquitur: aut quod locum sua caliditate, edacitateq; exiccent, siccis etenim locis omnia proceniunt odoratiora. Sed hoc uelut per suppositionem dictum accipies. Succī uero expressi odores facili trahūt,  
 30 & maxime oleum, & uinum, quæ quidem res minus dari rationi posse uidetur. Cur enim aqua, quæ tenuissima est, omniq; odore, saporeq; uidua, & omnino syncera, & niūda, nullum potest recipere odorem. Quæ autem sapida, olida, crassioraq; sunt, recipere possunt. Vinum tamen, etiam si res odorata non sit, iniecta, sed iuxta posita, odorem potest attrahere, quod calorem in se aliquem habet. Vis enim caloris est, quæ attrahit. Quod cum aqua nullatenus habet (est enim natura frigida) nihil attrahere potest. Item quod suscepturum, seruaturumq; sit odorē, non tam tenue, simplexq; esse, quā aqua debet. Odor enim receptus in eo delabitur atq; effunditur, quasi fundus nullus sit, qui obistere possit: sed callosius, ac densius esse oportet. Tale enim ad suscipiendum, seruandumq; odorem aptissimum est, dum ad utrunq; se modicē habeat: quod quidem utrunq; uino, & oleo cōtingit. Et unguetarij uerō odores in oleo reponunt, cū enim aliās ad usum accōmodatur, tum seruare odorē maxime omniū potest: quia incommutabile permanet, aqua protinus exhalat, & quasi eluit, atq; discernit. Tenuitas uerō (ut diximus) inuutilis est, neq; em̄ aër retinere odorē potest, sed trāsmittere tantū idoneus.

*Quæ sicca odorem potissimum suscipiant. Item quando uestigia leporum certius redolent.*

*Tum quando nullo odoris transitu solum affici potest. Curq; odoratiora sint alia ex urbanis, alia ex syluestribus. Cur etiam uestigia leporum autumno præcipue redolent. CAP. XXXIX.*



40

**F** siccis ea potissimum odorem suscipiunt, quæ soluta, inolida, atq; insipida sunt, ceu lanæ, uestimenta, & quicquid generis eiusdem. Cæterum possunt & quæ saporem, odoremq; reddunt, ceu mālum: hoc enim trahit, ac suscipit humorū odores. Quippe (ut simpliciter loquar) quod odorem sit recepturum, neq; præaridum, ut cinerem, aut arenam, neq; præhumidum esse oportet: alterum enim nullo odoris transitu affici potest, alterum diffundit, ac diluit omnem odorem. Hinc enim & uestigia leporum leuiter irrorato solo certius redolent: altius enim impressa, firmiter adherent, nec sublimiter uagantia delitescunt: quemadmodum cum arida humus est, neq; demersa in profundum abolentur, ut cum terra limosa ob imbrem uel austrum est. Flatus enim, & aquæ aduersantur, perimuntq; odores. Quapro-



pter medius habitus est, qui digitorum uelut abstergimenta retineat, atque de his  
 satis. Cum autem odoratorum alia syluestria, alia urbana sint: præstantia odoris  
 non alterius tantum generis est. Nam & urbanum præcellit, ut rosa; & agreste,  
 ut uiola nigra, & crocum. Serpyllum tamen, & helenium acriora, sicut etiam in  
 genere olerum, ruta, Causam (ut in uniuersum exprimi potest) id habet, quod an  
 te iam dictum est, Vtraque enim utroq; illo humiditate, siccitateq; moderantur,  
 ex quibus odores scilicet omnes oriuntur. At quod singulatim patescit, uiola ni-  
 gra, & crocum neque multum alimenti desiderant, & satis ex sese habent: sunt  
 etenim capitata, Quamobrem genus satium suam alimoniam copiam excoque-  
 re nequit: & hinc etiam fit, ut cinerem alijs congerant, alijs respergant. Rosa, ser-  
 10 pyllum, & similia generis agrestis sicca plus quam modicum est, efficiuntur: ita-  
 que rosa exilis, & nullo penè odore creatur: quia debito caret humore. Neque  
 enim uiola candida, locis admodum sitientibus: atque tenuibus odorata consi-  
 stit: nec ubi cælum uehementer feruidum est, quia extra modum siccatur. Serpyl-  
 lum, helenium, & reliqua generis eiusdem acres reddunt odores, causa siccitatis:  
 Cum tamen in urbanum habitum traducuntur, mollius redolent. Moderationē  
 autem, causam tum odoris, tum coctionis existere nullum dubium est. Nam &  
 eorum odores, quæ bene olent, præter uim naturalem, aeris etiam mediam tem-  
 periem exigunt, quò misceri possint, omniq; liberentur impedimento. Et in ue-  
 20 stigijs quoque leporum simile quiddam euenire uidetur, ut paulò antè comme-  
 morauimus, neq; enim æstate redolent, neque hyeme, neq; uere, sed autumnō  
 præcipue: quippe in hyeme nimis humida, in æstate sicca immodice sunt:  
 quamobrem meridie hebetissima. In uere florum odores perturbât,  
 atq; impediūt imbres: autumnus modice se habet ad omnia. Er-  
 go de odore, saporeq; plantarū, & fructuū contempla-  
 ri ex prædictis debemus: quæ autem ex mistis  
 one, affectioneq; mutua, & uiribus  
 oriuntur, hæc seorsum per se  
 explanari dignius est.

VOCABVLA LATINA, ET GRAECA SECVNDVM LATI  
narum literarum ordinem, ex libris de Plantis Theophra  
sti, Theodoro Gaza interprete.

**A** Bies, ἡ ἐλάτνη, est e-  
tiam plantæ cuius-  
dam maritimæ spe-  
cies, quæ petris adnascit.  
ablaqueare, ῥιζοτομεῖν.  
abrotonum, ῥ ἄβροτονου.  
abumthium, ῥ ἄβινθίου.  
acantica spina, ἡ ἀκανθὴ  
ἢ ἀκανθα.  
acanus, ὁ ἀκένθος.  
acharnica rigua, ederae spe-  
cies, ὁ ἀχαιρινὸς ἀφ' ὁδο-  
μέου.  
acer, ἡ ἀκένθος, alibi σφρό-  
δαμνος.  
achillea ordea, αἱ ἀχιλλεῖαι  
κευδαί.  
acini punici mālī, ἡ σκκοί φλ-  
ρίωτες.  
acinus, oleaster, ὁ κύνθος.  
aconitum, ῥ ἀκόνιτον.  
acorna, ἡ ἀκοννα.  
aculeofa, suffrutex, ἡ πολυ-  
ἀκανθός.  
acuta spina, ὁ ξύνικανθος, ἢ  
ὁ ξύνικανθός.  
acylus fructus phellodrys-  
os & ilicis, ὁ ἄκυνθος.  
acraria, suffrutex, ὁ χελιδνός.  
ad nepotum procreationē  
inhabile, ῥ ἀππαράβλαστον.  
ægis primo innascit, ἡ αἰγίς.  
æmodorū fœnogræco in-  
nascitur, & cumino, ῥ αἶ-  
μύδιωρον.  
æquus frutex, ὁ ἴσος.  
agritatoriū, ῥ ἐλατνέουρον. Plī-  
nius tamen græco utitur  
nomine.  
alba populus, ἡ λευκὴ.  
albumcum, ὁ ἀνθελκός, alibi  
ἀσφῶδελον albumcum inter-  
pretatur.  
alga, ὁ φύκος, eodem loco  
ῥ φύκος.  
alica, alij nucleus,  
allij nucleus,  
allium,  
alnus,  
amaracus, ὁ ἀμάρωνος, ἢ  
ῥ ἀμάρωνος.  
amarago herba, ἡ πικρίς.  
amentum, ἡ χέχρυνος.  
amerina, ἡ ἀμρινος.  
amomum, ῥ ἀμωμου.  
amygdala, ἡ ἀμυγδαλίαν.  
anchufa herba, ἡ ἀγχουσα.  
andryala ex olerum gene-  
re, ἡ ἀνδρύαλα.  
anefum, ῥ ἀνήσωρον.  
anethum, ῥ ἀνέθον.  
anthesdon, ἡ ἀνθιδών, me-  
spili species.  
anthes, flos phlei, ἡ ἀνθὴ φλ-  
ει.  
antirrhizum, ῥ ἀντιρρίζον.  
apargia herba, ἡ ἀπαργία.  
apharca, ἡ ἀφάρκη.  
aphaca, ex olerum genere,  
ἡ ἀφάκη.  
aphia herba, ἡ ἀφία.  
apiastum, ῥ μελισσόφυλλον.  
apium, ῥ σέλινον.  
aquatio, ὁ ἰστιάς.  
aquifolia, ἡ ἀγρία.  
arachidna, ἡ ἀραχιδνός.  
aracum, ῥ ἀρακόν.  
aracus, lenti innascitur, ὁ  
ἀράκος.  
arbor, ῥ δένδρον.  
arbutus, ἡ κομάρη.  
archinium, siue arachiniū,  
oleæ morbus, ῥ ἀρχίνιον.  
aria, ἡ ἀρία.  
arietinum cicer, ὁ λευκὸς ῥι-  
βινός.  
arū, ῥ ἀρόν, alibi ἀρόν arrus  
arvensia, ἡ ἀρουντία.  
arundo, ὁ χρίλαμος.  
afcalionis capæ, ῥ ἀσκα-  
λόνια λευκόμενα.

B

**B**acca laurina, ἡ δ' αὖτις  
bacula, ἡ σκυμνῶδα.  
bēta, τὸ τέτυλον, idem τὸ  
τύλον & τὸ τυπλῆς.  
bēta sylvestris, frutex, ἡ λε-  
μονία.  
betula, ἡ σκυμνῶδα.  
bibinella, ἡ θρυλλῶδα.  
blecho blechonis, ἡ βλεχῶδα.  
blechrus, ἡ βλεχρῶδα.  
blerum, το βλεχρῶδα.  
blitum, τὸ βλίτῶδα.  
bœonia radix, ἡ βωιωτία ἢ  
φάνις.  
bœonicus cucumis, ὁ βωι-  
πὸς σίκυθ.  
brassica radix, ἡ βράφανθ.  
brassica sylvestris, ἡ βράφανθ.  
bromus, ὁ βρόμος.  
bubula fraxinus, ἡ βουμέλια.  
alibi ἡ βουμέλιος.  
bulbus, ὁ βολεός.

bulbina, ἡ βολεῖνη.  
buprestis herba, ἡ βύπρεστις.  
butomus, ὁ βούτομος.  
buxus, ἡ πύξος.  
buxus asinina, ἡ ὀνόπυφος.

## C

**C**actus ē spinoso gene-  
re suffrutex, ἡ κάκτος.  
cæci nodi, ex quibus prodi-  
re nō potest ramus: sicuti  
γόμφιοι, ex quibus prodit.  
ἡ ὄρει τυφλοί.  
cædua, ἡ λανειζομένη.  
cadytas herba, ὁ καδύτας.  
calamus odoratus, ὁ κάλα-  
μος θυάδης.  
calor, τὸ θερμὸν.  
chalbana gummi, est gal-  
banum, ἡ χαλβαίνη.  
camacias tritici species, ὁ  
καμακίας.  
canaria herba, ὁ κανάριος.  
canna, ὁ δύναις.  
canchrydias tritici species,  
ὁ κανγκυδιάς πυρός.  
canchrys roris marini fru-  
ctus, ἡ κανγκυρίς.  
chandralia, ἡ χανδράλις.  
canina sentis, alibi caniru-  
bus, τὸ καννόςθετον.  
cantharis bestiola, quæ tri-  
tico innascitur, ἡ κανθαρίς.  
capparis, inturis, ἡ κάπα-  
ρις.  
capillus ueneris, τὸ ἀδανθρὸν.  
capreolus, ἡ ἐλεξίς.  
caprificus, ὁ ἐρεινός, καὶ  
ὁ λωυθός.  
caprificatio, ὁ ἐρεινισμός.  
carbo, ὁ αὐθραξ.  
cardamomum, τὸ καρδιό-  
μωμον.  
carduus pinea, ἡ κάρδινα, ἀλ-  
βιξία.  
carduus, ὁ σκόλυμος.  
carica, ἡ ἰχάρις herba est, quā  
ἀλὴ ἄπιον, idest pīum ap=

pellant.  
caro, ἡ σάρξ.  
caro, fructus pulpa, τὸ πω-  
ρικασπιον.  
carpinus, ἡ ζυγία.  
castia, ἡ κασία καὶ τὸ λανειρομ.  
casta, ἡ πταινία, hanc alij  
γλυκυσίδην dulcissidā uo-  
cant.  
castanea, ἡ δίσος βάλανθ.  
caudex, τὸ στέλεχος.  
caulias succus ex cæso cau-  
le, ὁ λανλίας.  
caulis, ὁ λανλός.  
carya, ἡ καρύνα.  
cedria, ἡ κεδρία.  
cedrus, ἡ κεδρός.  
cedrula, ἡ κεδρίς.  
celastrus, τὸ κελάστρον.  
celtis, siue lotus faba græca  
ὁ λωτός.  
centaurium, τὸ κενταύριον.  
centeria planta est, ἡ κεν-  
τερία.  
centinæ culicum genus, αἱ  
κεντίναι.  
cepe, τὸ κρόμμυον.  
cepæ gnidiæ, τὰ κινδία.  
κερόμυνα.  
cepæ creticæ, τὰ κρετικὰ.  
κερόμυνα.  
cepigethyum, τὸ κρομμυ-  
γίδιον.  
cera, eadē quæ brassica syl-  
uestris, ἡ κέρια.  
cerasus, ἡ κερσός.  
cerastes, uermis in arbori-  
bus, ὁ κεράστης.  
cerebrum in palmis, ὁ ἐγκέ-  
φαλος.  
cerinthus, τὸ κερίνθον.  
ceronia, siliquæ species, ita  
ab Ionibus appellatur, ἡ  
κέρωνια.  
cetrus, ὁ ἀγρίλων, ἡ ἄπρις.  
cicera, ὁ ὠχρός.  
cicer, ὁ ὀρέβινθος.  
cicercula, ὁ λάδινθος.  
cicuta, τὸ κόνιον.

cinamomum, τὸ λινάμωμον.  
cingulum algæ species, ὁ  
ζωστήρ.  
circumnatio, ἡ ἀμφοτέρωθεν.  
circumauctio, ἡ ἀμφαυξίς.  
clauicula ederæ species, ἡ  
ἐλεξίς.  
clauus, oleæ morbus, qui et  
fungus, & olla, ὁ ἥλος.  
cleonæa radix, ἡ κλειωναία  
ραφανίς.  
cneum, ὁ λυήκος.  
cneorus, frutex, ὁ λανειρος.  
cnicum, ὁ λνίκος.  
coctibile, de leguminibus  
dicitur, τὸ τέρραμον.  
coix, ἡ κόϊξ.  
coloctia, ἡ κολοκίτις.  
colus, ἡ κλάκατη.  
columbinum cicer, ὁ ὀροβι-  
αίος ὀρέβινθος.  
commacum, τὸ κομάκιον.  
comythes, ubi frequēs ha-  
rundo in stagnorum lo-  
cis terra pingui & lata,  
κομάκτις.  
conus, ὁ κώνος.  
consecratrix, iris, ἡ ἱρίς.  
cor, idem quod medulla,  
& matrix, ἡ καρδία.  
corchorus, ὁ κόρχος.  
coriannum, τὸ κορίαννον.  
coriannifum, τὸ κοριαννισόν.  
corinthia radix, ἡ κορινθία  
ραφανίς.  
coma, τὰ κωνία.  
cornus, κωνία.  
cornus foemina, foemini-  
cornus, ἡ θηλυκωνία.  
cornicularia, papaueris syl-  
uestris species, ἡ κορινθία.  
coronarij generis, τὰ στεφα-  
νωματικά.  
coronaria, idest quibus ad  
coronas utimur, τὰ στεφα-  
νωματικά.  
corrudago, ἡ ἀσπαράγία.  
corfium, loti radix, τὸ κό-  
ρισον.  
cortex,

cortex, ὁ φλοιός.  
 corymbia, edera species, ἡ κορυμβία.  
 costus, ὁ κόστος.  
 cotonea mālus, ἡ κυδωνία.  
 coturnix, plantago ab alijs dicta, ἡ ὄρνις.  
 cardatio, in fico morbus, ὁ καρδάτιος.  
 cradae, αἱ κράται.  
 cranium, τὸ κρανίον.  
 crataegus, ἡ κράταιγος, καὶ κράταιγόν.  
 crataeus, ἡ κράταιος.  
 crispa brassica, ἡ ἐλάφυλος ῥάφανος.  
 crocus & crocum, ὁ κρόκος.  
 croton, ὁ κρότων ἄρβωρος, & aliud morbi genus, uide γόγγροι.  
 cucuphora, arbor, τὸ κυδωνόφυτον.  
 cucurbita, ὁ κολοκύνθη, καὶ κολοκύνθη.  
 cucumis, ἡ σίκυς, ὁ σίκυος.  
 alibi.  
 cucumis sylvestris, ὁ σίκυος ἄγριος.  
 culices caprificuū, οἱ ψύλλοι.  
 culmus, ὁ κάλαμος.  
 cuminum, τὸ κύμινον.  
 cunila, τὸ κύμιλον.  
 cupressus, ἡ κυπρίσιος.  
 cutis, τὸ δέρμα.  
 cycæ, palmarum genus, αἱ κύκται.  
 cylix, ἡ κύλιξ.  
 cyma, ἡ κύμα.  
 cyprium allium, τὸ κύπριον ὁ σκόρδον.  
 cytilus, ὁ κύτιος.

## D

Decacuminaio, ἡ δέκακοπή.  
 delyderium flos, ὁ δελιδάριος.  
 dictamnium, τὸ δίκταμον.  
 dracunculus herba, τὸ δράκοντιον.

drupæ oliuæ, ἡ δρυπίς.  
 drypis, ex humili materia planta, ἡ δρυπίς.  
 dulcis radix, θυγαλκή, καὶ ἡ σκυθική dicitur.

## E

E Benus, ἡ ἐβένος.  
 Edera, ὁ ἐδέρας.  
 elium, suffrutex, καλὴ.  
 elleborus, ὁ ἐλλέβορος, uera trum.  
 elleborina herba, ἡ ἐλλέβορινα.  
 endothicum, herba ex oleum genere, τὸ ἐνδοτικόν.  
 epimelum, herba flore carens, τὸ ἐπίμελον.  
 equapium, τὸ ἵπποσέλιον.  
 equestris, radix in Scythia nascens, ἡ ἵπποκί.  
 equicoeniculum, τὸ ἵππομαράθρον.  
 erica, ἡ ἐρίκη.  
 eringium, suffrutex, τὸ ἐρίγιον.  
 eruanga, eruo innascens, ἡ ἐροβόλχη.  
 eruca, τὸ ἐρύκωρον.  
 euboicum, τὸ εὐβοϊκόν.  
 euonymus, arbor, ὁ εὐώνυμος.

## F

Faba, ὁ φάβος.  
 fabetum, ὁ φαβός.  
 fagus, ἡ φηγός.  
 febrifugia, fel terre, centauryum, τὸ λεντανεύριον, καὶ ἡ λεντανεύριος.  
 ferula, ἡ νάρθηξ.  
 ferulago, ἡ νάρθηκία.  
 ficus Aegyptia, ἡ συκὴ αἰγυπιακή.  
 ficus, ἡ συκὴ, est etiam maritima planta.  
 fictitia myrtha, πλατὴ σμύρνη.

fidicula, polypodium, τὸ πολυπόδιον.  
 filicula, τὸ τευχμαίνος.  
 filix, ἡ φελίς.  
 filix foemina, ἡ θηλυφελίς.  
 fimus, ἡ κόπρος.  
 fimus stipularis, ἡ κόπρος συρματίτις.  
 fissiles cepæ, τὰ χιεύς.  
 fistularia harundo, ἡ σίεψ.  
 foeminifica, herba, τὸ θυλήνον.  
 foeniculus, τὸ μάραθρον.  
 foenum graecum, ἡ βόναρος, καὶ ἡ θυλή.  
 flamma, seu flammula, suffrutex, & flos coronamētis aptus, ἡ φλόξ.  
 fleus, ὁ φλεως.  
 flos, τὸ αὐθός.  
 fluida, frutex, ὁ ῥόδος, medicamentum etiam inibi.  
 folium, τὸ φύλλον.  
 follio, ἡ σκαπτίνη.  
 fraus, herba, ἡ ἀπείτη.  
 fraxinus, ἡ μελιά.  
 fremium, ἡ ἀνέμων, καὶ ἀνέμωνια alibi.  
 frondiflora, herba τὸ φυλλανθός, in codice tamen graeco scriptum est ἀφυλλανθός.  
 fructus, ὁ κερπός.  
 fruges, ἡ σιτῆρά.  
 frumentum, ὁ σίτος.  
 frumentago, ὁ σιτανίας.  
 frutex, ὁ θάμνος.  
 fruteticus, ὁ ἐλὴ λαχμάδης.  
 fungus, ὁ μύκης.  
 fungus, oleæ morbus ita dictus, ὁ μύκης.  
 furfur, τὸ πίτυρον.  
 fusus, agrestis suffrutex, ἡ ἀγρακτυλὴ.  
 fusus agrestis, ἡ φόνος.

- G** **A**lla, ἡ λυκίς. **g**allica, γαλένος, ὁ γαλέ-  
νορ, αὐτὸ γαλένος.  
**g**allica mespili species, ἡ αὐ-  
θνοσιδής.  
**g**ardia cepæ, τὰ γάρδα.  
herumna.  
**g**eminalis, τὸ ὀρμυσιον.  
**g**emma in uite, ὁ ὀφθαλμός.  
**g**eniculum, ut in harundi-  
nibus, τὸ γόνυ.  
**g**ermen, ὁ βλαστός, καὶ τὸ  
βλάστημα.  
**g**erminatio, ἡ βλάστησις.  
**g**ethyum, τὸ γήθιον.  
**g**ith, τὸ γήθιον.  
**g**ladiolus, ὁ λυπείρος.  
**g**lans, ἡ βάλανος.  
**g**lans peculiaris Aegypti  
planta, ἡ βάλανος.  
**g**ongri in arboribus & pre-  
cipue in olea nascuntur.  
οἱ γόνγροι, id autē & τὸ πρέ-  
μιον.  
**g**remnum, & ὁ λυπείρος.  
id est croton appel-  
latur.  
**g**ramen, ἡ ἄρσισ.  
**g**rana ficaria, quæ fibubus  
insunt, αἱ λεγχαμίδες.  
**g**ranum gnidium, ὁ λινιδί-  
ος κόκος.  
**g**rossi qui & grossuli ficus,  
τὰ ὀρίνα.  
**g**ummi, τὸ κόμμι. Reor ta-  
men interpretandam uir-  
gam sanguineam.  
**H** **A**rundo laconica, ὁ  
καλαμος λακωνικός.  
**h**emodorum fenograc-  
innascitur & cumino, τὸ  
αἰμόδωρον.  
**h**arundo sagittaria, ὁ καλα-  
μος βεξίνος, quam ὀρνιθίων,  
id est creticam uocant.  
**h**arundo, spadonis nomi-  
ne, ὁ καλαμος ὀνοχίας.  
**h**arundo bombycia, καλα-  
μος βομβυκίας.  
**h**arundo armamentaria, ὁ  
καλαμος (δολυγίτης).  
**h**arundo texilis, ὁ καλαμος  
πλόκιμος.  
**h**arundo tibialis, ὁ καλαμος  
αὐλιπτικός.  
**h**arundo uallatoria, ὁ καλα-  
μος χαρρακίας.  
**h**astula regia, ἡ ἀσφόδελος.  
**h**edera, ὁ λυθός.  
**h**elenium, τὸ ἑλερίον.  
**h**elica, falicis species, ἡ  
ἐλίκη.  
**h**erba lanaria, τὸ σρούθιον.  
**h**erba, ἡ πέα, & quæ specia-  
liter herba appellatur.  
**h**erbacea, τὰ ποωδέα.  
**h**erbula indifferenter, τὸ  
πόαριον.  
**h**erculacea, spinæ genus,  
ἡ ἥρακλεια.  
**h**erculana panace, τὸ ἥρα-  
κλειον πάντακος.  
**h**erculana, ἡ ἥρακλεια.  
**h**erculanum papauer, ἡ ἥρα-  
κλεια μήκων.  
**h**ibiscum, ἡ ἄλτεια.  
**h**ippophaës, quod ex la-  
ctaria conficitur, τὸ ἵππο-  
φάεις.  
**h**ircibarbula herba, ὁ ἥρα-  
πώγων.  
**h**ircispina, ἡ ἥραγακκίδα.  
**h**ircularæ uites, αἱ τραγώ-  
σαι ἄμπειλοι.  
**h**irundinaria, τὸ χελιδόνιον.  
**h**umilis materia, τὰ ὑλή-  
ματα.  
**h**umirubus, ὁ χαμαίβαθος.  
**h**umor, τὸ ὑγρόν.  
**h**ycinthus, ὁ ὑάκινθος.  
**h**yphear, fructus quidam  
ilicis, τὸ ὑφέαρ.  
**I** **A**fona, ἡ ἰασόνι.  
**i**cma, ἡ ἱκμα.  
**i**dea pinus, ἡ ἰδέα πίτυς.  
**i**lex, ὁ πρίνος.  
**i**ncostibile, de legumini-  
bus dicitur, τὸ ἀπράσιον.  
**i**nguinalis herba, ὁ ἀσι-  
είσκος.  
**i**noculatio, ἡ ὀφθαλμιασμός.  
**i**nsitio, ἡ ἐμφυτεια.  
**i**nsitiones, αἱ ἐμφυτειαί.  
**i**ntubus, ἡ λυχάριον.  
**i**ntubus, siue ampulla, seu  
cichorea, τὸ λυχάριον.  
**i**ntubus erraticus, τὸ λυχά-  
ριον ἄγριον.  
**i**ouis flamma, ὁ διόςπυρος,  
arbor.  
**i**ouis flos, τὸ διός αὐρε.  
**i**phyum, τὸ ἵφνον.  
**i**pnum, τὸ ἵπνον.  
**i**psipis, uermis, ὁ ἵψις.  
**i**ris consecratrix, ἡ ἱεῖς.  
**i**rrigatio, aquatio, ἡ ὑδρεία.  
**i**syrrinchium, τὸ ἰσσυρίγγιον.  
**i**uba, quam scilicet militæ,  
& quæcunq; militæ co-  
mam proferunt, ἡ φοβή.  
**i**uncus, ὁ χοῖνος.  
**i**uniperus, ἡ ἀρκύνης.  
**i**xina spina, ἡ ἱξίνη ἀκανθα.  
**L** **A**brusca, ἡ σάφυλη.  
**l**acatha, ἡ λακάθια.  
**l**achryma, petris adnasci-  
tur, τὸ δάκρυον.  
**l**aconica lactuca, ἡ λακωνι-  
κὴ δεσδιακίνη.  
**l**aconicus cucumis, ὁ λακω-  
νικός σίκκος.  
**l**actifucatio, ὁ ὀπισμός.  
**l**actuca, ἡ δεσδιακίνη, καὶ ἡ  
δεσδεάξ.  
**l**actuca caprina, seu lacta-  
ria, τὸ μηκόνιον, αὐτὸ πιθύ-  
μαλλος.  
**l**anugineus, ὁ γροῦδης.  
**l**appa, in lente nascitur, ἡ  
ἀππεινή.  
**l**appa herba, ἡ ἡπαρίνη, αἷα  
βί ἀππεινή.  
**l**appago, τὸ ἵπποφονον, αὐτὸ  
ἵπποφονος.  
**l**atex,

larix, picea, <sup>ἡ πίτυς.</sup>	χρᾶς χρία.	mīlium, <sup>ὁ κέγγρος.</sup>
laſerpiciū laſer, <sup>τὸ σίλαιο.</sup>	malum terre, <sup>ἡ ἀριστελοχία, ἢ</sup>	mnaſium, <sup>τὸ μνάσιον.</sup>
laterale, germen, <sup>ἡ πρῶτα ἐλα-</sup>	ἡ κυκλάμινος, <sup>ἢ καὶ τὸ κυκλα-</sup>	moly, <sup>τὸ μάλυ.</sup>
ensis.	μινον.	montapium, <sup>τὸ ὄροσελινον.</sup>
laticaulis, lactuca, <sup>ἡ πλατύ-</sup>	mālum perſicum, <sup>τὸ μήλον</sup>	montulmus, ulmi ſpecies,
καυλὸς βελιδιανή.	πορσιον.	<sup>ἡ ὄρεσθιλέα.</sup>
latifolia, eſculus, roboris	mālus, <sup>ἡ μηλιά.</sup>	morus, <sup>ἡ συκάμινος.</sup>
ſpecies, <sup>ἡ πλατύφυλλον.</sup>	mālus perſica, <sup>ἡ μηλιά</sup>	morus Aegyptia, <sup>ἡ συκάμι-</sup>
taurus, <sup>ἡ διάφνη, καὶ διαφνίς.</sup>	σκή.	nos Aiyvηtia.
lectirotaria, ſpecies aceris,	mālus uerna, <sup>ἡ μηλιά ἐαρινή.</sup>	mula, herba, <sup>ἡ ἡμίονος.</sup>
<sup>ἡ κλινότροχος.</sup>	mālus medica, <sup>ἡ μηλιά</sup>	multiplex, <sup>τὸ πολύχου.</sup>
legumina, <sup>τὸ ὁσρέα.</sup>	μηδική.	muralis herba, <sup>τὸ πρῶτον.</sup>
legumina chedropa, <sup>τὸ χεδ-</sup>	mandragora, <sup>ὁ μανδραγόρας</sup>	muralis herba, ſeu muricia
ροπα.	marifica, herba, <sup>τὸ ἀρρῶν</sup>	da, <sup>τὸ μνόφονον.</sup>
lemna, <sup>ἡ μύνα.</sup>	γονον.	muſcus, alibi bryum, algæ
lens, <sup>ὁ φακός.</sup>	marifcus, iunci ſpecies, <sup>ὁ</sup>	ſpecies, <sup>τὸ βρύον.</sup>
lentifcus, <sup>ὁ ὀνός.</sup>	ολόχρινος.	myrrha, <sup>ἡ σμύρνα.</sup>
leuis braſſica, <sup>ἡ λευκοκαυλὸς</sup>	maritima pinus, <sup>παραλία</sup>	mintha ſtillaticia, <sup>ἡ σκότη</sup>
ῥάφανος.	πίτυς.	σμύρνα.
lignum, <sup>τὸ ξύλον.</sup>	maritimum granū, ſpecies	myrica, tamarix, <sup>ἡ μυρική.</sup>
liguſticum, <sup>τὸ πένανθος.</sup>	lactaria, <sup>ὁ πρῶτος κακός.</sup>	myrtaria, lactaria, <sup>ὁ μυρτίτης</sup>
lilium, <sup>τὸ κρίνον, ἢ κρινονία.</sup>	marrubium, <sup>τὸ πρῶτον.</sup>	πιδύμαλλον.
limonium, <sup>ἡ λαμονία genus</sup>	maſcula lactaria, <sup>ὁ ἀρρῶν</sup>	myrtus, <sup>ὁ μυρτίνος, alibi ἡ</sup>
fremij, id eſt αὐτομάνης.	θύμαλλον.	μυρτίνη.
lingua ceruina, <sup>τὸ σκολο-</sup>	maſpetum, laſſerpitiij ſpe-	
πιδύριον.	cies, <sup>τὸ μάσπετον.</sup>	
linogeniſta, <sup>τὸ λινόγενος.</sup>	medica herba, <sup>ἡ μηδική, uel</sup>	
linum, <sup>τὸ λίνον.</sup>	μηδική.	
lirium, idem quod narcis-	medulla, <sup>ὁ μυελός, idē quod</sup>	
ſus; poſtea enumerās flo-	μήτρα.	
res ait, <sup>μέλα ἢ τοῦτο ὁ νάρκισ-</sup>	medulla mollis, <sup>ἡ γνῶριον.</sup>	
σος, <sup>καὶ τὸ λείριον.</sup>	medulla, <sup>ἡ μήτρα, alibi ma-</sup>	
liquatio, <sup>ὁ χυλισμός.</sup>	trix.	
lolium, <sup>ἡ αἶρεα.</sup>	melampodium, <sup>τὸ μελαμ-</sup>	
lotus, herba, <sup>τὸ λότην.</sup>	πόδιον.	
lucernula, <sup>ἡ λυχνίς.</sup>	melampyrum, in frumen-	
lucina, arbor, <sup>ἡ ἐλάδης.</sup>	tis Siculis naſcitur, quem	
lupinum, <sup>ὁ ὀφρύς.</sup>	admodum & lolium, <sup>τὸ</sup>	
luſium, quod eſt uelut a-	μελάμπυρον.	
gis in pino, <sup>τὸ λῶσον.</sup>	meſfrugum herba, <sup>ὁ μελίαν</sup>	
	σίτος.	
M	melothrus herba, <sup>ἡ μύ-</sup>	
Adonais, <sup>ὁ μαδοναίς,</sup>	λωθρος.	
nympha eſt.	melothrum ſuffrutex, <sup>τὸ μύ-</sup>	
magydaris, <sup>ἡ μαγυδάρις.</sup>	λωθρον.	
malinathalla, in Aegypto	menſiflora, <sup>ἡ μύναδος.</sup>	
planta naſcens, <sup>ἡ μαλινά-</sup>	mentha, <sup>ἡ μίνθη.</sup>	
θάλλω.	mentaſtrum, <sup>τὸ ἡδύοσμον.</sup>	
malua, <sup>ἡ μαλέχη.</sup>	meſpilus, <sup>ἡ μεσπίλη.</sup>	
malua ſylueſtris, <sup>ἡ μαλά-</sup>		

nux castanea, ἡ **καστανή**  
 nux iuglans, nux euboica,  
 nux perfica, ἡ **δουβίκη** κα-  
 ρύνα, καὶ **λαρύνα** πόρσις.  
 nux lactaria fructus, ἡ **κα-  
 ρύνη**.  
 nux pinus, ὁ **σφόβιλος**.  
 nymphæa, ἡ **νυμφαία**.

**O**culus caninus, ὁ **λύ-  
 νοψ**, alibi canaria.  
 ocymum, ἡ **ἀκνίον**.  
 œnanthe, quæ uisiflora lati-  
 ne dici potest, ἡ **οἰνανθή**.  
 œnothera, ὁ **οἰνοθήρας**.  
 olea, ἡ **ἐλαια**.  
 olea sylvestris, ἡ **ἀγρίελαιος**.  
 oleagnus, ἐλαιάγνος, plan-  
 ta in lacu orchmenio na-  
 scens.  
 oleaster, ὁ **κύνινος**.  
 olera, τὰ **λάχανα**.  
 oleri arbores, τὰ **δενδρὸς-  
 λάχανα**.  
 olitor, ἡ **λιπαρός**.  
 olla, morbus oleæ ita appel-  
 latus, ἡ **λοπάς**.  
 ononis suffrutex, ἡ **ὄνονις**.  
 onus, uermis genus in Af-  
 rica, ὁ **ὄνος**.  
 opition, ὁ **ὀπιτιον**.  
 orbis in ligno, ἡ **σπίρα**.  
 ordeago, ὁ **λεριταίνιος**.  
 ordeum, ἡ **λεριθί**.  
 origanum, ἡ **ὀρίανον**, καὶ  
 ὀρίανον.  
 oryza, ἡ **ὄρυζα**.  
 ostrya, ἡ **ὄστρεα**. ostrys idem  
 ἡ **ὄστρεος**.

**P**adus, arbor uel fru-  
 tex, ἡ **πάδος**.  
 palea, ἡ **ἀχνη**.  
 paliurus, ὁ **παλιούρος**.  
 palma, ἡ **φοίνις**, est etiā spe-  
 cies plantæ marinæ.  
 palmites, τὰ **λιθόμαλα**.  
 palud apium, ἡ **ἐλαιοσέλινο**.

panacea, ἡ **πανακία**.  
 panace æsculapica, ἡ **πάντα-  
 κία** ἀσκληπείον.  
 panace chironæa, ἡ **χειρῶ-  
 νειον** πάντακία.  
 panicum, ὁ **ἐλυμος**, καὶ **μέλιτος**.  
 papauer, ἡ **μήκων**.  
 papauer erraticum, ἡ **φοιὰς**  
 μήκων.  
 papyrus, ὁ **πάπυρος**.  
 pastinaca, τὸ **δάκτυλον**.  
 heciolus, ἡ **λεριθί**.  
 pediculum, ὁ **μήκος**.  
 pennis, quæ cernis produ-  
 cit, ὁ **φάσκος**.  
 pepo, cucumis, ὁ **σίκινος**.  
 perdicium, ἡ **πόρδινος**.  
 perissus, uesficaria spec-  
 ies, ὁ **πόριστος**.  
 persea, peculiaris Aegypti  
 arbor, ἡ **πορσεία**.  
 perficium, ἡ **πέρσιον**.  
 pes gallinaceus, herba ex  
 olerū genere, ἡ **καυκαλός**.  
 petina, ἡ **πτινή**.  
 petraum, ἡ **πέρσιον**.  
 peucedanū, ἡ **ποδουκένδιον**.  
 phalangium, bestioia in e-  
 ruo nascens, ἡ **φαλαγγίον**.  
 phellodrys, ita ab Arcadi-  
 bus appellata arbor, ἡ **φελ-  
 λόδρυνος**.  
 philyca, ἡ **φιλύκη**.  
 piper, ἡ **πέρσιον**.  
 picus martius, auis, ὁ **πικ-  
 κολάπτης**.  
 picea agrestis, ἡ **πίτυς** ἀγρία.  
 picea pediculifera, ἡ **πίτυς**  
 φθεγοφόρος.  
 pilus, qui ē roboribus na-  
 scitur, ὁ **πίλος**.  
 pinus confiera, ἡ **ποδουκέν-  
 νοφόρος**.  
 pinus picosa, ἡ **πικνίον** πι-  
 τώδης.  
 pinus, pinafter, pinastrum,  
 ἡ **ποδουκέν**.  
 piræa, frutex, ἡ **παιραία**.  
 piraster, ἡ **παιράς**.

pirus phocis, ἡ **ἄπιος** φοκίς.  
 pirus, ἡ **ἄπιος**.  
 pixum, legumen, ὁ **πίσος**.  
 pix, ἡ **πίση**.  
 placida, species roboris, ἡ  
 ἡμείος.  
 plantago, ἡ **ὄρνις**.  
 plantago, quæ & ἀγνόγλωσ-  
 σον, agnina lingua, ὁ **σελε-  
 φούρος**.  
 planta, ἡ **φυτὴ**.  
 platanus, ἡ **πλάτανος**.  
 pollicaria, ἡ **κύνις**.  
 polium herba, ἡ **πόλιον**.  
 pollium, ἡ **χρυσόλιον**.  
 poma arbuti, τὰ **μυμάκινλα**.  
 populus, nigra populus,  
 αἰγυρῶ.  
 procellia, ex olerum gene-  
 re, ἡ **πρωχίος**.  
 portulaca, herba, ἡ **κω-  
 δονία**.  
 portulaca, arbor, ἡ **κωδονία**.  
 porricida, bestioia quæ por-  
 ris, atq; alijs pluribus her-  
 bis innascitur, ἡ **πρωσσ-  
 κωνίς**.  
 porrum, est & algæ spec-  
 ies, ἡ **πρωσσον**.  
 prunus, ἡ **κοκκύλος**, καὶ **κοκ-  
 κινία**.  
 pternix, caulis ex cactō spi-  
 na exiens, ὁ **πέρσιος**.  
 pugio, herba, ἡ **ξίφιον**, ali-  
 bi ξίφις.  
 pumex, ἡ **κίονος**.  
 punica, ἡ **φοιὰς**, καὶ **βοά**.  
 punica, quæ nucleo caret  
 interiori, ἡ **φοιὰς** ἀκέρηνος.

**Q**uadratoria, ἡ **τέτρα-  
 γωνία**.  
 quercus, ἡ **μύδιον**.  
 quinquefolium, τὸ **πεντα-  
 φύλλον**.  
 quinquepeta, ἡ **πεντάπεταλον**.  
**R**acemus, ὁ **βότρυς**.  
 Radicias, succi qui  
 ex caſa

ex caesa radice prodit, $\delta$ $\rho\iota\zeta\iota\alpha\varsigma$ .	rum plantarum, ut cumi- n $\acute{\iota}$ , $\acute{\eta}$ $\acute{\alpha}\lambda\mu\eta$ .	planta nascens, $\acute{\eta}$ $\sigma\acute{\iota}\delta\eta$ .
radicidium, $\acute{\eta}$ $\rho\iota\zeta\omicron\mu\acute{\iota}\alpha$ .	salvia, $\acute{\epsilon}\lambda\lambda\acute{\iota}\sigma\phi\alpha\kappa\omicron\varsigma$ .	silago, herba, $\delta$ $\lambda\omicron\rho\omega\nu\acute{o}\pi\omicron\varsigma$ .
radix, $\acute{\eta}$ $\rho\acute{\iota}\zeta\alpha$ .	sambucus, $\acute{\eta}$ $\acute{\alpha}\kappa\tau\acute{\eta}$ $\delta\epsilon$ $\acute{\alpha}\lambda\epsilon\omicron\varsigma$ .	siligo, $\acute{\eta}$ $\delta\lambda\upsilon\rho\alpha$ .
radix lithalassia, $\acute{\eta}$ $\rho\alpha\phi\alpha\nu\acute{\iota}\varsigma$ .	samoethraciæ cepæ, $\tau\acute{\alpha}$ $\sigma\mu\omicron\delta\epsilon\alpha\kappa\iota\alpha$ $\lambda\epsilon\omicron\mu\mu\eta\alpha$ .	siliqua, quam sicum Aegy- ptiam appellât, $\acute{\eta}$ $\lambda\epsilon\omega\nu\acute{\iota}\alpha$ .
lithalassia, $\acute{\eta}$ $\kappa\alpha\iota$ $\theta\rho\alpha\kappa\acute{\iota}\alpha$ , thracia.	sansucum, $\tau\circ$ $\acute{\alpha}\mu\acute{\alpha}\rho\alpha\kappa\omicron\mu$ , $\kappa\alpha\iota$ $\delta\acute{\iota}\lambda\chi\theta$ .	siliqua, speciali nomine, $\delta$
radicatio, $\delta$ $\sigma\phi\alpha\kappa\epsilon\lambda\iota\sigma\mu\acute{o}\varsigma$ .	sapor, $\delta$ $\lambda\upsilon\lambda\acute{o}\varsigma$ , $\kappa\alpha\iota$ $\lambda\upsilon\mu\acute{o}\varsigma$ .	siliquæ, $\omicron\acute{\iota}$ $\lambda\omicron\beta\omicron\acute{\iota}$ .
rami, $\omicron\acute{\iota}$ $\lambda\acute{\omega}\nu\delta\omicron\nu$ .	sari, $\tau\omicron$ $\sigma\acute{\alpha}\tau\epsilon\iota$ .	sinapi, $\tau\omicron$ $\nu\acute{\alpha}\tau\omega\nu$ , $\kappa\alpha\iota$ $\sigma\acute{\iota}\nu\eta\pi\iota$ .
rhamnus, $\delta$ $\rho\acute{\alpha}\mu\omicron\varsigma$ .	sarculatio, $\acute{\eta}$ $\delta\sigma\kappa\alpha\lambda\iota\sigma\iota\varsigma$ .	silymbrium, $\tau\omicron$ $\sigma\iota\sigma\upsilon\mu\beta\omicron\iota\omicron\mu$ .
ramulus, furculus, $\delta$ $\lambda\acute{\alpha}\lambda\acute{\alpha}\delta\epsilon\varsigma$ .	sarmenta, palmites, $\tau\acute{\alpha}$ $\lambda\acute{\iota}\nu\mu\alpha\tau\alpha$ .	situs, serēdi tempus, $\alpha\epsilon\tau\acute{o}\varsigma$ .
ramus, $\tau\circ$ $\lambda\acute{\alpha}\pi\tau\alpha\delta\omicron\nu$ .	satureia, $\acute{\eta}$ $\delta\upsilon\mu\beta\epsilon\alpha$ $\kappa\alpha\iota$ $\tau\circ$ $\delta\upsilon\mu$ $\beta\epsilon\alpha$ .	smerea, suffrutex, $\acute{\eta}$ $\sigma\mu\epsilon\acute{\rho}\epsilon\alpha$ .
ramus, prægrandis ramus, $\delta$ $\acute{\alpha}\kappa\epsilon\tau\acute{\epsilon}\mu\mu$ .	satus, $\acute{\eta}$ $\sigma\alpha\sigma\omicron\alpha$ .	smilax, $\delta$ $\sigma\mu\acute{\iota}\lambda\alpha\acute{\xi}$ , alibi ede- ram Ciliciam uocat,
rapa, $\acute{\eta}$ $\gamma\omicron\gamma\upsilon\lambda\acute{\iota}\varsigma$ .	satus, serēdi tempus, $\alpha\epsilon\tau\acute{o}\varsigma$ .	solanus, herba, $\delta$ $\sigma\tau\acute{\upsilon}\chi\eta\varsigma$ , ali- bi uefficariam uocat.
raphanus, radix, radícula, $\acute{\eta}$ $\rho\alpha\phi\alpha\nu\acute{\iota}\varsigma$ .	scalas, fructus cacti, $\delta$ $\sigma\kappa\alpha\lambda\iota\alpha\varsigma$ .	solaris, herba, $\tau\circ$ $\acute{\eta}\lambda\iota\omicron\phi\acute{o}\pi\iota\omicron\mu$ .
recticortex, species robo- ris, $\acute{\eta}$ $\delta\iota\upsilon\delta\upsilon\phi\iota\omicron\theta$ .	scammonia, $\acute{\eta}$ $\sigma\kappa\alpha\mu\mu\omega\nu\acute{\iota}\alpha$ .	sonchus, $\delta$ $\sigma\acute{o}\gamma\chi\epsilon\varsigma$ .
refina, $\acute{\eta}$ $\rho\epsilon\tau\iota\eta\eta$ .	scandix, $\acute{\eta}$ $\sigma\kappa\acute{\alpha}\nu\delta\iota\acute{\xi}$ .	forba, $\tau\epsilon$ $\omicron\upsilon\alpha$ .
rhutrum, suffrutex, $\tau\omicron$ $\rho\acute{\upsilon}\tau\eta\varsigma$ .	scilla, $\delta\epsilon$ squilla, $\acute{\eta}$ $\sigma\kappa\acute{\iota}\lambda\lambda\alpha$ .	forbus, $\acute{\eta}$ $\delta\eta$ , $\kappa\alpha\iota$ $\acute{\eta}$ $\omicron\iota\alpha$ , $\kappa\alpha\iota$ $\omicron\iota\eta$ .
rigatio, $\acute{\eta}$ $\alpha\epsilon\tau\acute{o}\varsigma$ .	scilla epimenidia, $\acute{\eta}$ $\omega\pi\eta\mu\epsilon\acute{\iota}$ $\delta\iota\omicron\varsigma$ $\sigma\kappa\acute{\iota}\lambda\lambda\alpha$ .	sphacelus, herba saluæ fe- re similis, $\sigma\phi\acute{\alpha}\kappa\epsilon\lambda\theta$ .
robur, quercus, $\acute{\eta}$ $\delta\eta\upsilon\varsigma$ , est etiam marinum quiddā, quod petris adnascitur.	scissima agrestis, $\delta\epsilon\upsilon\eta$ $\alpha\epsilon\tau\acute{o}\varsigma$ .	sphondyla, bestiola quæ dam, $\acute{\eta}$ $\sigma\phi\omicron\nu\delta\iota\upsilon\lambda\eta$ .
robur nigrū, $\tau\omicron$ $\mu\epsilon\lambda\alpha\iota\delta\eta\upsilon\omicron\mu$ .	scythius cucumis, $\delta$ $\sigma\kappa\upsilon\tau\alpha\lambda\acute{\iota}\theta$ $\sigma\acute{\iota}\kappa\upsilon\varsigma$ .	spatha palmar, $\acute{\eta}$ $\sigma\pi\acute{\alpha}\delta\eta$ .
roratio, morbus uitis, $\acute{\eta}$ $\rho\acute{o}\alpha\varsigma$ .	scythica radix, $\acute{\eta}$ $\sigma\kappa\upsilon\theta\iota\kappa\acute{o}$ .	spica, $\sigma\acute{\iota}\chi\upsilon\varsigma$ .
rosa, $\acute{\eta}$ $\rho\omicron\delta\iota\omega\nu\acute{\iota}\alpha$ .	securina, quæ aphacæ inna- scitur, $\delta$ $\omega\iota\lambda\epsilon\kappa\iota\omega\varsigma$ .	spina, $\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\omicron\varsigma$ .
rosa canina, $\tau\omicron$ $\lambda\omega\upsilon\acute{o}\rho\omicron\delta\omicron\nu$ .	semen, $\tau\circ$ $\sigma\pi\acute{\epsilon}\rho\mu\alpha$ , $\acute{\eta}$ $\rho\epsilon\acute{\iota}\alpha$ .	spina cædida, $\acute{\eta}$ $\lambda\omicron\delta\upsilon\kappa\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\acute{\iota}\alpha$ .
rosmarinus, $\acute{\eta}$ $\lambda\epsilon\beta\alpha\omega\pi\iota\varsigma$ .	semētes, id est tempora qui- bus quæq; herbæ proue- niunt, $\omicron\acute{\iota}$ $\alpha\epsilon\tau\acute{o}\tau\iota$ .	spina muralis, $\acute{\eta}$ $\mu\upsilon\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\omicron\varsigma$ .
rotundi caulis lactuca, $\acute{\eta}$ $\rho\omicron\gamma\gamma\upsilon\lambda\acute{o}\kappa\alpha\upsilon\lambda\theta$ $\theta\epsilon\omega\delta\alpha\kappa\iota\eta\eta$ .	semifertarius, $\tau\circ$ $\acute{\eta}\mu\acute{\iota}\epsilon\lambda\theta$ .	spina, arbor peculiaris Aeg- gypti, $\acute{\eta}$ $\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\omicron\varsigma$ .
rubeia, suffrutex, rubia ali- bi, $\tau\circ$ $\rho\acute{o}\delta\iota\delta\iota\omega\nu\acute{\iota}\alpha$ .	semperuiua, $\tau\circ$ $\acute{\alpha}\epsilon\iota\omega\mu$ .	spina dipsas, seu sitiens, $\acute{\eta}$ $\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\alpha$ $\delta\iota\upsilon\phi\acute{\iota}\alpha\varsigma$ .
rubigo, morbus feminum, $\acute{\eta}$ $\rho\epsilon\upsilon\sigma\iota\beta\eta$ .	senecio, herba ex olerum genere, $\acute{\eta}$ $\acute{\eta}\epsilon\gamma\epsilon\tau\epsilon\omega\mu$ .	spina regia, $\acute{\eta}$ $\acute{\alpha}\kappa\alpha\upsilon\theta\alpha$ $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\kappa\acute{\eta}$ .
rubus, $\delta$ $\beta\acute{\alpha}\rho\sigma$ .	serpyllum, $\delta$ $\epsilon\pi\upsilon\pi\upsilon\lambda\theta$ .	spodias, $\acute{\eta}$ $\sigma\pi\omicron\delta\acute{\iota}\alpha\varsigma$ .
rumex, $\tau\omicron$ $\lambda\acute{\alpha}\pi\tau\alpha\delta\omicron\nu$ .	sesamum, $\tau\circ$ $\sigma\acute{\eta}\zeta\alpha\mu\omicron\mu$ , scemi- nino nomine sesamam transfert.	squalor, $\delta$ $\omega\iota\gamma\mu\acute{o}\varsigma$ .
ruta, $\tau\omicron$ $\omega\eta\gamma\alpha\upsilon\omicron\mu$ .	sefel, $\tau\circ$ $\sigma\acute{\epsilon}\sigma\epsilon\lambda\iota$ .	stercoratio, $\acute{\eta}$ $\lambda\omicron\phi\epsilon\pi\eta\sigma\iota\varsigma$ .
rutula, $\tau\omicron$ $\pi\kappa\upsilon\gamma\alpha\iota\omicron\mu$ .	setanica cepæ, $\tau\acute{\alpha}$ $\sigma\eta\tau\acute{\alpha}\nu\eta\alpha$ $\lambda\epsilon\omicron\mu\mu\alpha$ .	siba, frutex, $\acute{\eta}$ $\sigma\iota\beta\acute{\eta}$ .
	sicula beta, $\tau\omicron$ $\sigma\iota\kappa\epsilon\lambda\iota\kappa\acute{o}\mu$ $\tau\delta\upsilon\tau\lambda\omicron\mu$ .	stimulus in lapide, $\tau\circ$ $\lambda\epsilon\gamma\eta\tau\omicron\mu$ .
	sida, in orchomenio lacu	stœba, frutex, $\acute{\eta}$ $\sigma\tau\omicron\iota\beta\acute{\eta}$ .
		struthea malus, $\acute{\eta}$ $\sigma\tau\omicron\upsilon\delta\iota\theta$ $\mu\epsilon\lambda\acute{\epsilon}\alpha$ .
		stlegys, tritici species, $\delta$ $\sigma\lambda\epsilon\gamma\upsilon\varsigma$ $\omega\upsilon\tau\acute{o}\varsigma$ .
		struthus, herba, $\delta$ $\sigma\tau\omicron\upsilon\theta\acute{o}\varsigma$ .
		styrax, $\delta$ $\sigma\tau\acute{\upsilon}\rho\alpha\acute{\xi}$ .
		suber,

S

**S**alix,  $\acute{\eta}$   $\iota\tau\acute{\epsilon}\alpha$ .  
 salix frugiperdi,  $\omega\lambda\epsilon\sigma\iota\kappa\alpha\tau\alpha\theta$   $\iota\tau\acute{\epsilon}\alpha$ .  
 salicortex, species roboris,  $\acute{\eta}$   $\acute{\alpha}\lambda\iota\phi\lambda\omicron\iota\omicron\varsigma$ .  
 salugo, morbus nonnulla



suber, ἡ ὕλη, ὃ ὁ φελός.  
succatio, ἡ χυλώσις.  
succus, liquor, ὁ ὅπος.  
suffrutex, frutex, τὸ φρυγαννόν.  
furculus, ramulus, ὁ κλάδος.

## T

**T**Abes, affectio quædā  
arborum, ἡ ἐκπλαξίς.  
tabitudo, morbus cicercis,  
ὁ σφακελισμός.  
taxus, ἡ μίλος, alibi μίλδος.  
terebinthus, ὁ τερβινθος, ὃ  
τέρμινθος.

teredo, ἡ τερηδόνη.  
testiculus, ὁ ὄρχις.  
tetralix, suffrutex, ἡ τετραλίξ.  
thescum, herba, τὸ θήσκειον.  
thalea, ἡ θάληα.  
thapsia, ἡ θαψία.  
thelyphonum, τὸ θηλύφονον.

thyrorus; uessicariae spe-  
cies, ὁ θύρορος.  
thuia, ἡ θύα, alibi θύα. &  
thuium, τὸ θύιον, eadem est  
arbor.

thus, ὁ λιβανώτης, καὶ ὁ λί-  
βανος.  
thymus, ὁ θύμος.  
tilia, ἡ τίλις.  
tinea, ὁ θρίψ.  
tipha, ἡ τίφη.  
tiphyum, τὸ τίφυον.  
tribulus, ὁ τρίβυλος.

trimestre genus est hordei,  
τὸ τρίμηνον. puto tamen  
Theodorum legisse τὸ τρι-  
μηνιον.  
trinodis, arboris nomen,  
τρίοζος.

trionum, τὸ ὀβύσιμον, alibi  
erysimum.

trifago, herba, ἡ χειμιάδους.  
triteltiger, accipiter, ὁ τρι-  
τόξος.

triticum, ὁ πυρός.

triticum ponticum atrum,  
ὁ μελάμπυρος ποταμικός.

tuber terræ, ὁ λυκλάμινος.  
tuber, τὸ οἰδιον, alibi ὕδνον.

turdaria herba, ὁ ὀνοκίχλος.

turgor, id est cum arbores  
turgent, ὁ λοπατός.

## V

**V**eneria, ἡ ἄκορος.  
uenæ, αἱ φλέβες, ἡ  
φλέψ.

ueratrum, ὁ ἐλλέβορος.

uerbascum, ἡ φλόμος.

ueriquercus, ἡ ἐτυμόδους.

uernilago, suffrutex, uer-

milago alibi, ὁ χειμαλέων.

uessicaria herba, τὸ σφυγνόν.

uillus, nucus iulus, ὁ ἰούλος.

uinaceum, seu acinus, τὸ  
γίγαρον.

uincaperuinca, ἡ χαμαι-  
δάφνη.

uĩngum, τὸ οὐγγόν.

uiola, ἡ ἰωνία, ὃ τὸ ἰον.

uiola alba, τὸ λευκόν.

uiola nigra, τὸ μελανόν.

uiola matronalis, τὸ λευκόν.

uiola flammea, flammula,  
τὸ φλόγιον.

uirga, ἡ ῥάβδος.

uirgulta, τὰ φρυγαννώδη.

uisum, ἡ ἱξία.

uiuisflora, herba, ἡ οἰνωθῆ.

uiris, ἡ ἄμωλος. est etiam in  
mari nascens planta.

uitis insana, ἡ ἄμωλος.

turdaria herba, ὁ ὀνοκίχλος.

uitis canthara, ἡ ἄμωλος.

lauidάρεος.

uitis, quam uocat capniū,

ἡ κάπνιος ἄμωλος.

ulmus, ἡ πελέα.

unedo, ἡ νηλεία, καὶ ὁ οἰναρος.

uniflora, τὸ μονόφλοον.

uoluctum, ἡ ἄσινη, καὶ τὸ  
κλύμνον.

uredo, arborū affectio quæ  
dam, ὁ κλαυθμός.

urica, uermis in cicere na-

scens, ἡ κάμω.

urtica, ἡ ἀκακύνθη.

F I N I S.

ERRATA, QVAE RELECTO VOLVMI-  
NE DEPREHENDIMVS.

Pag. 1. ver. 1. & pag. 2. ver. 21. Theodori Gazæ. 11. 32. ad affectiones. 13. 20. consummari. 22. 23. pro-  
uenit. 27. 18. ligno. Quidam. ver. 20. Talem. 29. 39. ulmi folliculis. 36. 25. gignit. 55. 6. quasdam perra-  
ras. 55. 26. quod uel. 56. 43. componunt. 78. 37. consummetur. 84. 6. utiq. 87. 37. improbo, frigido.  
90. 39. alijs minime plura. 92. 9. Quin & ver. 10. coagmentantur. 97. 15. eundemq. 101. 10. quodq. ra-  
dices 104. 17. canchrydias itiengys. alexand. ver. 23. & canchrydias 114. 37. humilioremq. 126. 40. sub-  
rutilum: alterum. 128. 14. satis ualet. 133. 33. ex oriente. 151. 12. argumenti. 154. 46. fauonius. 160. 47. ul-  
deantur. 173. 28. materiam. 177. 3. folent. Sitientia. 189. 10. ad palmas sale. 191. 49. multiplici. 192. 35. So-  
la pluuia atq. frigida. 201. 10. ab una parte. 214. 48. fructuum. 215. 43. maiores fiant terra. 231. 29. hu-  
moris confert. 232. 28. reddi. 233. 30. sapores permulti. 238. 16. intestinus. 243. 20. Reliquum. 250. 1. fui  
generis. ver. 4. fui generis. ver. 47. plenus ille ac ualidus. 251. 45. infiti.

BASILEAE APVD ANDREAM CRATANDRVM, MENSE  
MARTIO, ANNO M. D. XXXIIII.

